



بالقزحية والبطيخية والقرصية والندولية  
والبريطانية والاندلسية والبريانية  
المواد والمعادن

# إدوار غَالِب المَوْسُوعَة

٢٤٢٠ صفحة • ٣١٤٦٤ مائة  
٦٩٦٢ رسمًا • ٢٤ لوحة ملونة

## في علوم الطَّبِيعَة

تبحث في الزراعة والنبات والحَيَوَان والجيولوجيا



دار المسروق بيروت







مخطوطات ،  
دارالمشهورت ش.م.م  
ص.ب. ٩٤٦ - بيروت ، لبنان

الطبعة :  
المكتبة الشرقية - ساحة البوابة  
ص.ب. ٦٩٨٦ - بيروت ، لبنان



الموسوعة في علوم الطبيعة

الرسوم :

جورج ديب

جورج غنطوس

جان قرطباوي

جهاد جبر

سليم غصن

المجموعة : ISBN 2-7214-2148-4

المجلد الثاني : ISBN 2-7214-2550-6

يحتوي هذا المجلد من

القصص والروايات

١٠٢٠٨ مؤاد

٢٢٧٧ رسا

٨ لوحات ملونة

الأستاذ غالي

مهندس زراعي

# الموسوعة في علوم الطبيعة

تبحث في الزراعة والنبات والحيوان والطير والسمك والحشرات والفطور  
والبحر والشجر والأرض والحيوانية والنباتية والمصطلحات العلمية على اختلافها  
أخصها الفيزياء والكيمياء والرياضة والجيولوجية والطب والحقائق  
وتتألف من أربعة مجلدات يحتوي آخرها على مسارد للمصطلحات باللغات :  
الألمانية ، الإنكليزية ، الإيطالية ، الفرنسية ، اللاتينية ، واليونانية

طبعة ثانية محدّدة

المجلد الثاني

من الرأ إلى الفاء



السرعويات . مستطيلة الجثة ، قصيرة القوائم ، غبراء الصلحة العليا من قفن الرأس الى الذنب ، سوداء الصلحة السفلى من الرأس الى الذنب . اذنانها صغيرة مستديرة . حلبيها كثيف وليليط . اطرافها طويلة حادة || مسرحها من الفروب الى الفجر . قوتها البسل والفسار والجردان والحيات والمصافير والدويبات والثآليل وجملود وبعض الالحجار . له نوعان ، يليان .

#### ١١١٦١ - راتيل أبو كعب \*

*Mellivora leuconota, Ratelus capensis* (S). Ratel du Cap (F). Ratel of Cap (E). نوع من الراتل موطنه افريقية الشرقية والجنوبية . طوله نحو ٨٥ سم . ذيله ٢٨ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٥ سم . يألف الجبال والاحراج والبراري على السواء ويسلك الاشجار بفضة .

#### ١١١٦٢ - راتيل أبو كيم \* ، شُصُر ، صلوص

*Mellivora indica, Ratelus indicus* (S). Ratel de l'Inde (F). Indian ratel (E). نوع من الراتل موطنه الهند وبلاد فارس وبنارها . طوله نحو ٨٠ سم . ذيله ١٢ سم . اما ارتفاعه فنحو ٢٤ سم . يألف الجبال والاحراج ، يربط في المناطق الكثيرة الغصاب والوشاد .

#### ١١١٦٣ - راتيل \* ، راتيل

*Pliétrope* (F). *Plietotropic* (E). صفة الجين الوراثي الذي يحقق جمع السيات المتباينة .

#### ١١١٦٤ - راتنج

*Résine* (F). *Resin* (E). ونهم من قال راتنج . مواد ثلاثية صلبة لزجة تنفصها بعض النباتات لاسيما الصنوبريات والبطيانيات .

١١١٥٣ - واهك  
قال ابو حنيفة : « شجرة ترتفع على ساق ثم تنفرع لها ورق ملود احمرش » . وقال غيره : « شجرة جبلية كانها غطلة ولها زهرة بيضاء لينة كانها ثقل » . ج . راد .

#### ١١١٥٤ - رايض

الرايض نيم لير من كوكبة التنين مركزة على اللسان .

#### ١١١٥٥ - رايض حرارة

*Thermostat* (F). *Thermostat* (E). جهاز آلي يستخدم في تكييف الحرارة المطلوبة وتثبيت استمرارها على درجة معينة .

#### ١١١٥٦ - رايضة

*Lieuse* (F). *Bruden* (E). أداة آلية تجمع قيرط للزراع وترطبها .

#### ١١١٥٧ - رايضة ، خاضعة

*Phytophage* (F). *Plant-eating* (E). هي كل حشرة قوتها النبات .

#### ١١١٥٨ - رايضة

*Colline* (F). *Hill* (E). ما ارتفع من الارض وكان دون الجبل .

#### ١١١٥٩ - رايض زراعي

*Rente convenancière* (F). *Fifty rent* (E). هو الذي ينشأ على ارض زراعية ولا يجوز لمستعته ان يسترده ولكنه يجوز للمدين بعد التحرر منه بالتخلي عن الارض .

#### ١١١٦٠ - راتيل ، اكيل العسل

*Mellivora, Ratel* (S). *Ratel* (F). جنس حيوانات راسية بطيئة الحركة ، كسولة من فصيلة



راتل ابو كعب



راتل ابو كيم

## ١١١٧٦ - راتنج الصنوبر \* واكع ، كاشيف

Réactif (F).

Reactif, Reagent (E).

كل مادة كبروية يساعد اندمجا على الكشف عن حقيقة الجسم للألوان معروفة.



راتون غاسل

## ١١١٧٧ - رادون

Safran (F). Saffron (E).

هو الزعفران ، أعلاه .

## ١١١٧٨ - راديوم

عنصر معدني نادر الوجود اكتشف عام ١٨٩٩ بمقرور عام ١٩٠٤ على يد العلماء يار وباري كوري وبيرون .  
لونه ابيض فضي يضيء في الظلام . اشتد فسفورية بريقها فستحي . يتفكك بسرعة اذا تعرض للهواء || يوزن (يو-٢٢٦) وزنه الانوي ٢٢٦,٠٥ وقه ٨٨ يتصهر في ٩٦٠° سم .  
يتميز بلشائه الاشعاعي العظيم وخاصيته في اعادة الانسجة الحية التي يستخدمها الطب في معالجة الاجزاء المعطوبة من الجسم || يوجد في بعض انواع الفحم المستخرجة من مناجم بوهيمية وفي الكونوق والولايات المتحدة وكندا .



راتون متحي

## ١١١٧٩ - زكار الجذع \* ، صمغية زكاه

Xanthochrous hispida, Polyporus hispida (S). Polypore hispida (F). Hardwood (E).

فطر من السميات يركب بعض الاشجار الحرجية والزراعية اعصها اللدب والصرة والفت والتوت والجزع والتخلع .  
اروسه مستديرة قطرها سم ١٠ . وهي مقنطة الجاهب للقائم على الجذع . لونها اصفر يتقلق ثم يحل ويضيء بالسمرة . لهاها مفتحي التركيب ، غزير العصاره ، اصفر اللون في اول عهد ثم يحل عند ادراكه وخلو من العصاره || يوفاته صفر ، يضيء الشكل ، قياسها ٥x٧ ميكرون || مشيجه يدخل من الاجزاء اليابسة فيتمركز بين القشرة والخشب اليابس ثم ينش في الشكير والخشب ويمتد حتى القلب || يكافئ بتفتيل وتطهير الجروح اليابسة ويطلي جروح الجلود والاضغاب بأحد المادجين الخاصة او السليكي .



زار الجذع

## ١١١٨٠ - زكار الصنوبر \* ، صمغية الصنوبر

Xanthochrous pini, Polyporus pini (S). Pourriture rouge du pin, Polypore des pins (F).

فطر من السميات يركب الصنوبر العسر الذي صار حره لانتعاب الراتنج || مشيجه يدخل وأسا الى قلب الجذع حيث يتمركز ثم ينتشر من الداخل الى الخارج وين مركز انطلاقه الى اعل ويسهل بذات المساحة التي تراوح من المتر الى المترين فيطبع الخشب كما يبدو في الرسم بعد ان يصفى عروقه || اما الفطر فاروسه قنفسية الشكل ، جانية الانكاز عديدة الاغاديه المستديرة . قطرها نحو سم . لونها الى الصفرة الشبه . لهاها فليبي ناشف التسج حطلي اللون الزاقي || يوفاته شفاقة تبنيه الموج يضيء الشكل قياسها ٥x٦ ميكرون || يكافئ بتطهير جروح الخز عند نهاية الانتعاب وبتأرجع الفطور قبل ادراكها .



زار الصنوبر



زار الكشمش

## ١١١٨١ - زكار الكشمش \* ، صمغية الكشمش

Xanthochrous ribis (S). Polypore du grosellier (F).

فطر من السميات يركب سوق الكشمش عند سطح التربة فيسقط اللحاء والتشكير دين ان يتدهما الى الخشب . اروسه قمية الشكل فائقة الحافة المنخفضة لتضدية ، لونها اصعب حطلي ثم يميل الى الحزوة . لهاها اصفر نحاسي

## ١١١٧٥ - راتنج الصنوبر

Barra

عصاره صمغية راتنجية تسيل من حز سوق الصنوبر البحري .

## ١١١٦٦ - راتنجي

Résineux (F). Résinois (E).

اسم شامل يطلق على كل شجرة راتنجية العصاره اعصها الاجار الفصيلة الصنوبرية .

## ١١١٦٧ - راتون ، واكئون

Procyon (S).

Raton (F). Racocon (E).

جنس حيوانات لبونة من فصيلة الراتونيات . موطنها البلاد الالبريكية . تشبه الدب والفرير . اصولها لبدة قصيرة . انها تقسم نحو اربعة جراء ر بها نحو الحول || له نصان الراتون الفاسل والراتون المنفي .

## ١١١٦٨ - راتون غاسل \*

Procyon lotor (S).

Raton laveur (F). Maspach (E).

نوع من الراتون . عروقه اربعة مشفرة من المكسيك الى السكا . طوله من ٨٠ الى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٣٢ الى ٣٦ سم . ثوبه المتقلب الى الفلحة للبراء يطولها موج اصفر || يالفت خطوط السموات والانهار يعيش في البر واللاه وعلى الاشجار . لا يأكل شيئا الا بعد غلاء . قوته التار والمحبوب والجذور والغير والاسماك .

## ١١١٦٩ - راتون متحي \*

Procyon cancrivorus (S).

Raton crabier (F). Agouara, Crab-eater (E).

نوع من الراتون . موطنه امريكا الجنوبية . طوله نحو ٧٥ سم . ارتفاعه ٣٢ . ثوبه الى السمرة يطو جسمه خطوط بيض حازية . لا ينسل اكله . قوته التار والجذور لكنه يرغب في بعض انواع السرطان اعصها المنع .

## ١١١٧٠ - راتونيات

Procyonidae (S).

Procyonidae, Ratons (F). Procyoni, Racocons (E).

فصيلة حيوانات من الثدييات للارام القرازم . تأتي بين السنوريات والدييات . اجناسها خمسة : البساري والبيدا والراتون والكواكي والكنكاجو ، جميعا امريكية الموطن .

## ١١١٧١ - راجيجية

Probabilisme (F).

Probabilism (E).

الراجسية مذهب فلسفي اجتاهي يقول بأهمية السلوك وفقاً لرأي الرايغ .

## ١١١٧٢ - راج ، واكف ، وحيق

Vin (F). Wine (E).

هي الخمر ، شراب كحول يمتل من اختيار صدير المنب .

## ١١١٧٣ - راحة الأسمد

هو صليغ الادم ، اعلاه .

## ١١١٧٤ - راجيق

Melliphage (F).

Melliphagous (E).

نعت تعريفي يطلق على الطيور والاشجار التي ترتشف رحيق الازهار . ج رواحق .

## ١١١٧٥ - راجيم

Couvée (femelle) (F).

Brooding-hen (E).

اثنى الطير في زين حفسها البيض . ويقال ارضع الطائر وارضعت اللداجة على يعضها فهي مرغم .

**١١١٩١ - رأس الثعبان** Rastaban (F).  
Dragon's Head (E).  
رأس الثعبان ويسمى أيضاً رأس الثعبان نجم ثير من الموائد وهي اربعة انجم مركزها على رأس الثعبان .

**١١١٩٢ - رأس الجاني** Ras Algehi  
رأس الجاني ويسمى أيضاً كلب الرامي ، نجم ثير من كوكبة الجاني مركزه على الرأس .

**١١١٩٣ - رأس الحشيش** رأس الحشيش هو الكرشون ، اطلبه .

**١١١٩٤ - رأس الدفوري** رأس الدفوري هو القطريون الاسمر ، اطلبه .

**١١١٩٥ - رأس الشبح** رأس الشبح هو الاقسون ، اطلبه .

**١١١٩٦ - رأس البصفور** \*  
Clinopodium vulgare, Melissa clinopodium (S).  
Clinopode, Grand basilic sauvage (F). Wild basil,  
Horse-thyme (E). Gemeiner wirseldost (D).  
Basilico salvatico, Clinopodio (I).  
نبات عشبي بري طبعي معمر من فصيلة الشفويات ينبت في ضباب ورماد مناطق حوض البحر المتوسط . ساقه فروع متفرعة كثيفة الزغب . اوراقه لاطئة متقابلة صغيرة . ثمرها ككثير المروق والشرابين ، مزغب الصلصة ، خشن الملمس . ازهاره ابطية الاركاناز ، غنية التجميع ، موهبة الكأس والتملل وهي بيضاء اللون ليلكية المواج . يقال ان اوراقه وازهاره طيبة تفيد المعدة .

**١١١٩٧ - رأس الفول** Algol  
رأس الفول نجم ثير من كوكبة سيابس .

**١١١٩٨ - رأس النضل** Chaintre, Fourrière,  
Tournière (F). Balk, Headland (E).  
المكان في ابل الحقل وآخرو حيث تنقل سكة الحراثت وتور العواب .

**١١١٩٩ - رأس الهر** رأس الهر هو الجليج ، اطلبه .

**١١٢٠٠ - رأس مال ، وسمكال** Capital  
هو مجموع الثروة المخصصة .

**١١٢٠١ - رأس مال الشركة ، وسمكال الشركة** Capital social (F). Registered capital (E).  
هو مجموع المبالغ المدفوعة او الاموال المقدمة الى الشركة .

**١١٢٠٢ - راسب** Précipité (F). Precipitate (E).  
عكر او دودي يحصل في بعض السوائل ويذهب سفلاً من جواره استعمال بعض المواد الكيماوية .

**١١٢٠٣ - راسبية** Diluvium  
غرين جيولوجي قديم تجمع في الحقبة الرابعة او قبلها بتأثير مياه الانهر والبحار والمثلج .

**١١٢٠٤ - رأسمالية** Capitalat, Capitalisme (F).  
Capitalism (E).  
هي سيادة الراسماليين والرأسماليين وهي من النظم الاقتصادية السائرة الى الاستغلال وذلك لان معظم العالم يدين بالتروسيه ويستسلم الى سلطان الدولة .

مكون من طبقتين تفصلها اقلية خشلة ليفية صلبة سدواء اللون . الطبقة العليا استنجية التركيب خشة والسفل فليزية جامدة || يوفداته سطحية مستديرة قطرها من ٢ الى ٥ ميكرون || يكافئ بانتراخ الفطور قبل ادراكها ويتظهر اللحاء والشكير بعد تنظفه . ومن الضروري اجتناب زراعة الكشش في الاثرية القوية الانتماع .

**١١١٨٢ - رازيانج** هو الشيار ، اطلبه .

**١١١٨٣ - رازيانج كبير ، برهيلية** Hippomarstrum (S). Hippomaratre (F). Rosemary  
frankincense (E). Languedockische nussdold (D).  
Ipomaratro (I).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحليسيات . انواعه عديدة منبها الاراضي الملساة . اوراقها خرقية غززية . ازهارها صفراء . عرفها مستحب الرائحة تفوح من اللس .

**١١١٨٤ - رازيانج \* ، متشغيل ، إينانة** Enanthe (S). Enanthe (F). Water dropwort (E).  
Pferdesaat (D). Enanto (I).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الحليسيات . انواعه نحو ٣٠ جميعها متقية او مائية . اوراقها مشرعة التصل . ازهارها مزواجية بيضاء اللون || يستخرج من جذور بعض انواعها عصارة صفراء اللون سامة بيمتة . اشهر انواعه الرازيانة المائية .

**١١١٨٥ - رازيانج مائية \* ، متشغيل مائي ، إينانة متقية** Enanthe phellandrium (S). Phellandre, Fenouil  
d'eau, Cigué aquatique (F). Water hemlock, Filipendula (E). Echce pferdesaat (D). Feilandrio, Filipendula, Clcuta aquatica (I).  
نوع من الرازيانة يعيش في المناطق وعلى ضفاف الانهار . يملو نحو المتر . سمه ذائق ميمت . يستعمل في بعض المستحضرات الطبية .

**١١١٨٦ - رأس** Tête (F). Head (E).  
عصر من اعضاء الجسم الحيواني يتكون من طبقة عظمية لا قياسية الشكل تدعى الجسدية تحوى المخ والخيخ والانتخاع للمستطيل . خلافا لشجرة عظمية يملعها الجمل الذي يكدو الشعر . ويمرر الرأس على فتحتين القم والالاف وما طريقا التنفس والاكل وعلى اعضاء الحس وهي العينان والاذنان والالاف واللسان .

**١١١٨٧ - رأس الأسد** Razalas  
رأس الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الاصفر .

**١١١٨٨ - رأس الأفعى** رأس الأفعى هو الاحيون ، اطلبه .

**١١١٨٩ - رأس الثعبان** رأس الثعبان هو البقران ، اطلبه .

**١١١٩٠ - رأس القوم المومع** Pollux  
نجم ثير من برج الثوابين ، يبعد عن الارض نحو ٣٢ سنة ضوئية .



رازيانج كبير



رازيانة



رازيانة مائية



رأس البصفور



رأسن حمامي



رأسن طيني



رأسن من السج



رأسن كبير الزهر



رأسن



رأسية الحدائق

جميعها صغيرة القند المولدا ترواح من ١٧ الى ٢٠ سم. أجسامها أحليجية الشكل. رؤوسها خفيفة، قصيرة المظهر. زعانفها الظهرية مستطيلة، تسامية المناس. أثوابها تراوح بين العطلة والحرة. سهلها أزرق الخمار || لحوبها مستطيلة الصف مأكولة.

١١٢١٤ - رأسية \* Capitula (F). Capitula (E). شكل من الزباني قوله فواصل اسطوانية متتامة تملظ تدريجيا عند الفواصل الثلاث الأخيرة.

١١٢١٥ - رأسيات Céphalés (F). Céphalates (E). قسم من الرؤويات يشمل رؤيات الاربل ومعديات الاربل ومجنحات الاربل.

١١٢١٦ - رأسيات الأرجل Céphalopodes (F). صف حيوانات من الرؤويات. Cephapods (E).

١١٢١٧ - رأسية، فيفالكثف Cephalanthus (S). Céphalantho (F).

جنس نباتات برية وريشية من فصيلة الفويات. دعت رأسية لان تنورها انبالي ويستدير كالرأس. انوعها عديدة جميعها شجيرات تمل من مترين الى ثلاثة امتار. تكثر في المواقع الرطبة وعلى ضفاف الجبترات والمنائق. فروعها طويلة متعاقبة. اوراقها مستطيلة معتقة. ازهارها لورية التجميع، كبيرة الحجم، بيضاء اللون || اشهر انوعها رأسية الحدائق.

١١٢١٨ - رأسية الحدائق، فيفالكثف غربي Cephalanthus occidentalis (S). Céphalantho occidentalis, Bois à boutons (F). Button-bush, Globe flower bush (E). Amerikische kopfbäume (D). Cefalanto, Legno da bottono (I).

هو النوع الزراعي النضوي، يمل نحو ٣ امتار. اوراقه بيضية، مستطيلة، ذلقة الزام الاخير. ازهاره عطرة نوتيا الى الابيض يملو موج اصفر || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١١٢١٩ - ركشة Rachis القشة هي محور البنية والحرة والمفرد والاوراق المركبة وغيرها. وين اسمها الزند والقت.

١١٢٢٠ - ركش Filter (F). Fiter (E). اداة تصفى بها السوائل من ماء وغيره.

١١٢٢١ - ركشبة الندي في لغة التيبيل، اطلمها.

١١٢٢٢ - ركش Commensal تمت تمرير يطلق على كل حشرة تلازم غيرها وتعيش على حسابها.

١١٢٢٣ - ركشيدكا، حشلة، مقرب Telescope (F). Telescope (E). جهاز خاص برصد الاجرام السماوية.

١١٢٢٤ - ركش Berger (F). Shephard (E). هو من ولي امر التبعيل.

١١٢٢٥ - ركشي Erral الفري نجم من كوكبية يقاس مركزه على الرجل اليسرى.

١١٢٠٥ - رأسن Inula (S). Aunbe, Inula (F). Inula (E). Alant (D). Enula (I). جنس نباتات حشية معمرة من فصيلة المركبات الابوية الزهر. انوعها عديدة مظهرها بري ويصغها رشي. اوراقها متتامة لا قياسية الانتساب. انوعها خفيفة رؤوسية صفراء القرس || احرف انوعها يظهروها يق.

١١٢٠٦ - رأسن البتراشيت هو البرنوب، اطلمها.

١١٢٠٧ - رأسن حشامي \* Inula ensifolia (S). Auné ensiforme (F). حشية معمرة تمل من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها غليظة زبلاء اللحاء، متتامة الوراق السنانية الضيقة، تفصلها خلي البشرة خاني المرواح المتزاوية. رؤوسها الزهرية متتامة القند، قطرها يراوح من ٦ الى ٦ سم. قناباتها الخارية مستطيلة حشامية الشكل || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١١٢٠٨ - رأسن دقيق هو الحليون، اطلمها.

١١٢٠٩ - رأسن طيني، جناح رؤسي، ركشجيل شامي، قسقت شامي

Inula helenium, I. campana, Corytaria helenium (S). Auné grande, Elecampane, Oeil de cheval (F). Common inula, Elcampane, Horse-slder (E). Echter alant, Alantator (D). Enula elenio, Enula campana, Ochio di cavallo (I).

حشية طيبة برية معمرة تمل من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها حاشنة كبيرة القند، السفلية منها تمل نحو ٨٠ سم. والمطلية طول من ١٥ الى ٢٥. نصلها ازهر الصفحة السفلى الطولاني. حشها صلب القروح، رؤوسها الزهرية كبيرة القند، قطرها نحو ٧ سم. ازهاره يستمر من ايار الى ايلول.

١١٢١٠ - رأسن عتي المسح \* Inula oculus-christi (S). Auné oeil du Christ (F). حشية سرولية معمرة تمل من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقها معتقة، متتامة. نصلها خلي البشرة باحت الحشا الاطمل. حلق ازهارها كبير القند، رؤوسها معتقة قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١١٢١١ - رأسن هدي Inula glandulosa (S). Auné glandulosa (F). حشية معمرة تمل من ٦٠ الى ١٢٠ سم. ساقها زغبية اللحاء تنتمي بزهر رؤوسية واحدة، قناباتها غزيرة الشكل. اوراقها صغرية القند، لسة، خيفة. نصلها خلي البشرة على صفحتي. حشاها مبرر الحد الدنية الطاهرة. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١١٢١٢ - رأسن كبير الزهر \* Inula grandiflora (S). Auné à grande fleur (F). حشية سرولية معمرة تمل من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها لاطنة تمل نحو ١٠ سم. رؤوسها الزهرية كبيرة القند، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ سم. لسنتها برتقالية اللون. ازهاره يستمر طول شهر حزيران.

١١٢١٣ - رأسن \* قارة البحر Novacula (S). Rason, Rasoir, Rat de mer (F). Razor-fish (E). جنس اسماك بحرية من شائكات الزانف وفصيلة الكوسيات. انواعه المعروفة قليلة العدد. اسماها بجار البلاد الحارة.

١١٢٣٩ - راقود \*  
*Platycephalus* (S).  
*Platycephale* (F). Flathead (E).  
جنس سمكة بحرية من شراكات الزعانف وفسيلة الطرقيليات  
أنواعه المعروفة ٣٠ أصنافا بحار البلاد الحارة . جميعها  
متريلة الشكل ، مفلطحة الرأس ، مستطيلة الزعانف الظهرية  
وبطنية ، صغيرة الفصوص الخشنة . منشفة الأثواب .  
تسرح في السمك ، تألف المناطق الرملية حيث يطيب لها  
الاستقرار والاعتناء بانتظار الاقتراس .

١١٢٤٠ - راقوش ، راقولاريه \*  
*Ramularia*  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرامليات يركب النصل  
على صفحته فيوشه يقع مختلفة الألوان يذبل فيها الأبيض  
والأصفر والأصفر || منشفة شديدة الرقة والمليونة ، داخل  
وتخلوي الانتشاب . جريه الكنيدي قصيرة ، شفاقة ،  
غنية التجميع ، كنانته مستطيلة ، قليلة التشعب ،  
أسطوانية ، مؤنثة . يورفاته مختلفة الألوان والشكل تنظ  
فيها الاستطالة || أنواعه كثيرة البد اعرفها ما يتبع .

١١٢٤١ - راقوش الإجماسي \*  
*Ramularia magnusana* (S).  
فطر مجهرى يركب ثمار الأجاس والتفاح المغفولة .  
مظهره الخارجي يقع قطرهاراوح من ١ إلى ٦ م . تملأ  
بشرة الشرة فتشققها ببناء مشبي التركيب ، خلي الشكل  
يبدو أبيض اللون ثم يتحول إلى الوردي وينتهي بالأصفر .  
أضراره لا تقتضى البشرة . يذرك بالتوبة وباجتناب الحرارة  
والمرطوبه .

١١٢٤٢ - راقوش البنفسج \*  
*Ramularia lactea* (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق البنفسج . مظهره الخارجي  
يقع شبه مستديرة قطرها نحو ٥ م . تملأ نصل الأوراق  
وقد تصيب الحاليق والأزهار . تبدو صفراء اللون ثم تتحول  
إلى الأبيض تحرقها حالات تلية || يجب قياس التسج  
وتسج الأوراق يذبل الأزهار || يكافح منه ظهوره  
بالتصاع الأوراق المبردة وينضج النبات بأشد الفوطير  
للمركزة على التماس .

١١٢٤٣ - راقوش الدويكييات \*  
*Ramularia primulae* (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق الدويكييات وأصغرها زهرة الربيع .  
مظهره الخارجي يقع مستديرة أو مقرنة الزوايا تبدو النصل  
على صفحته تبدو على العليا صفراء اللون ثم تتحول إلى  
الجلوة وتكون على السطح خلية بيضاء || يكافح منه  
ظهوره باستهلاك مركبات التماس .

١١٢٤٤ - راقوش الشوندر \*  
*Ramularia beticola* (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق الشوندر في أواخر الصيف .  
مظهره الخارجي يقع صغيرة مقرنة الزوايا قطرها من ٢ إلى  
٣ م . توشم النصل على صفحته . تبدو حطية اللون  
حراء الإخار ثم خلية بيضاء || أضراره زديدة لا تستوجب  
المكافحة .

١١٢٤٥ - راقوش الحشيش \*  
*Ramularia cynarae* (S).  
فطر مجهرى يركب أوراق الحشيش والاراضي شوكي والقرطم  
والكرزنت || مظهره الخارجي يقع قسيحة مقرنة الزوايا  
تملأ النصل على صفحته فتبدو على العليا صفراء اللون وعلى  
السطح ريدانية خلية كثيفة الزغب || أضراره زديدة  
لا تستوجب المكافحة .

١١٢٣٦ - راكمي ، ليرويس ، عسور  
*Eros, Amor* (F). *Eros* (E).  
الراعي كوكب سيار يتبع النظام الشمسي . مركزه بين  
الأرض والمريخ . دورته حول الشمس تستمر نحو ٦٤٢  
يوماً .

١١٢٣٧ - راكمي الجوزاء  
راعي الجوزاء كوكب .

١١٢٣٨ - راكمي الحنور  
راعي الحنور نجم ثير من كوكبة حور وسية مركزه على  
رأس الحور .

١١٢٣٩ - راكمي الشفاه  
*la Bourvier* (F).  
راعي الشفاه كوكبة نجم شالية المقيع تسمى هراء ، أغلبها .

١١٢٣٠ - راكمي النعام  
راعي النعام كوكب .

١١٢٣١ - راكميكة  
*Phagocyte* (F). *Phagocyte* (E).  
في اللقطة ، أغلبها . والراعية ج . دواع من وضع البازي .

١١٢٣٢ - راكمين \*  
*Prémonitoire* (F).  
*Premonitory* (E).  
نعت تعريفي يطلق على الأمراض أو الأضرار التي تسبق  
نغوب المرض . أو على العلامات التي تنذر بقررب ونوع  
الحوادث .

١١٢٣٣ - راكميد هو الجندل ، ج روافه .

١١٢٣٤ - راكمية ، عكلية ، ميخل  
*Lavie* (F).  
*Lever* (E).  
فصيب صلب يتحرك حول نقطة ثابتة تسمى نقطة الارتكاز  
يستعمل لرغ الانتقال والمحنور وما أشبه || والرافعة  
أنواع منها التي تقع نقطة ارتكازها بين القوة والمقاومة .  
وبها التي تقع فيها المقاربة بين القوة ومحور الارتكاز .  
وبها التي تقع فيها القوة بين المقاربة ومحور الارتكاز .

١١٢٣٥ - راكميا  
*Raphia* (F). *Raffia* (E).  
جنس نخيل غليظ الجذع ، مستطيل المسط ، كبير الشبة  
الشدلية ، حشني الثآبر . أنواعه صلبة ، موطنها أفريقية  
وأمركية الجنوبية ويندغسر || أعرف أنواعه وأشهرها يتبع .

١١٢٣٦ - راكميا الخنصر \*  
*Raphia vinifera* (S).  
نوع من الرافيا الصنعية . ثمارها سكرية المادة سريعة  
الاختصار يصطنع منها شراب كحولي يسمى نبيد التخل .

١١٢٣٧ - راكميا الرباط  
*Raphia ruffia* (S).  
نوع من الرافيا الزراعية الصنعية . سفنها يطول نحو  
٢٠ م . الياف سفها خفيفة متينة ناعمة عيكة تستعمل  
في عدة صناعات . وهي أيضاً شائعة الاستعمال كرباط  
زراعي تشبه به اللطام وغيرها .

١١٢٣٨ - راكمي  
*Hercule* (F). *Hercules* (E).  
هو الجاني ، كوكبة نجم شالية المقيع .



رافيا الحمر



راقود



راقوش الاجاس



راقوش البنفسج



راقوش الدويكييات



راقوش الشوندر



راقوش الحشيش



٨ الى ١٥ سم. ازهارها قليلة العدد ، كبيرة الحجم ،  
بنفسجية اللون ، صفر المآبر لا تتورمها صيفي .



رام

Podostem aster (S). \* **راموس أسود** \*  
Podostem noir (F). Podostem aster (E).

نوع من الراموس . حشرة من مفصليات الاجنحة عثفلات  
الاجزاء رضية الحسوليوات . موطنها بين من الشرق الاذن  
الى اوروبا . الحشرة الجملانة تعيش على الزئاجر . البرقة  
دائمة قوتها المواد الخشبية المنحلة ، يكثر وسوحها في جلود  
واضغان الانجار النخرة || جسمه اعليجي الشكل ،  
محبب الصفعة العليا ، يطول من ١١ الى ١٢ سم. عيانه  
بارزتان . زبانه غيظيان . غذاء لافحات . ثوبه الى  
السواد الاسفع المالح .



راستي

١١٢٥٨ - **راكسي** \* ، **قشب سيام**

Bushmania nivea, Urtica nivea, U. utilis, U. tensissima (S). Ramele argentata, Ortia argentata, O. de  
China, Chanvre de Saigon (F). Ramee grass, China  
grass (E). Rame, Chinanessal (D). Ortica de lino,  
Canapa di Siam (I).

نبات حشبي لني صناعي ممر من فصيلة القراسيات .  
يطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوريته ضخمة ، كثيرة  
الفرع الكثيفة الانتشاب . اوراته معققة بنفسية  
اعليجية ، تصلها نفي الصفعة السفلى ، يطول نحو  
١٥ سم . عتقه احمر اللون خلي البشرة || ازهاره عتقوي  
اسطواني . الياله عتية شاملة الاستعمال في صناعة الادواق  
التندية .



رايسر اسود

١١٢٥٩ - **راكسيات** \*  
Myoporaceae (S). Myoporaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . اجناسها وانواعها نحو  
٥٠ اسماؤها تمتد من الشرق الاوسط الى اليابان || جمع  
نباتاتها هيرات وجينات . اوراتها متعققة في معظم الانواع  
ومتعاقبة في بعضها . تصلها شقيقة ، مستطيلة ، لزجة .  
ازهارها ابطة الانتشاب وطرية ، شمية التجميع او فردية .  
ثمارها عتية رباعية البزور || نصال اوراتها وطلاء سوطها  
وافنداعها ملينة بالجايوب الراتنجية الفتنة بالادعانة الطرية  
الحصية المعروف || اشهر اجناسها القرام .



رامي

١١٢٦٠ - **راكيج** \* هو التارجيل المعروف ، اعطيه .

١١٢٦١ - **راكين** \*  
Ranina (S). Ranina (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات رضية الارانيات .  
انواعه المرفوعة قليلة العدد اسماؤها البحر الاخر والحيث  
العتي || اجناسها مبطلة مختلفة الحجم ، تطول من ٥  
الى ٧ سم . وتفرس من ٤ الى ٥ سم . دويوها قليلة  
الاجساد . قوائمها قصيرة ، غليظة ، محرمة الاطراف .  
ملاقطها عصبية ، كلابية الشكل || اشهر انواعه الرانين  
المسنن .

١١٢٦٢ - **راكين مسنن** \*  
Ranina dentata (S). Ranine dentée (F).

نوع من الرانين يكثر وجوده في المحيط المتشدي . يعيش  
قرب الشط . دويته جويي اللون ، اسفع المالح ، مسنن  
الحافة الامامية .



راين

١١٢٦٦ - **راكُون** هو الراتين ، اعطيه .

١١٢٦٧ - **راكل** \*  
Astruchon (F). Young ostrich (E).  
هو المحل اي ذلك النعام المحل يحي رآله ، ج رآله  
ورآله .

١١٢٦٨ - **رام** \*  
Mydoporum (S). Myopora (F).  
جنس نباتات عتية ممر من فصيلة الراميات انواعه  
نحو ٢٠ معظمها بري وبعضها ترابي . اوراته متعاقبة  
مستطيلة التصل الضيق . ازهاره نوري التجميع ابلي  
الارتكاز . ازهاره بيض او حر . ثماره عتية رباعية  
البزور .

١١٢٦٩ - **راكمه** القامة : مستقيم مجتمع فيه الماء .

١١٢٧٠ - **راكمج** \*  
Laurre (F). Trap (E).  
القرايح : ملحوظ تصاد به الجوارح كالسقاقر ونحوها .

١١٢٧١ - **راكميس** ، **دجوي** \*  
Nocturne (F). Nocturnal (E).

كل دابة مسرحها الليل هي راس . وقد كثر استناد  
الرواس الى طير الليل .

١١٢٧٢ - **راكمي** \*  
Appellat (F). Decoy-bird (E).  
الرائق : الطائر الذي ينصبه الصياد لينع عليه البازي  
فصيده .

١١٢٧٣ - **راكميل** \*  
Sillicole (F). Sillicle (E).  
لعت تعمرلي يملأ على النباتات التي تعيش ويجود في الرمل .

١١٢٧٤ - **راكمندي** \*  
Ramondia (S). Ramondia (F). Ramondia (E).

جنس نباتات عتية برية وتربيتية ممر من فصيلة  
الجسبريات . مرفوعة التبريد على اسم العلامة رامندي  
(١٨٢٧-١٧٥٣) || انواعه المرفوعة اربعة ، اسماؤها  
الشرق الاوسط وبعض مناطق اوروبا الجنوبية والغربية .  
جميعها سريرية ، فريقة ، عادمة الساق قروسة الادواق  
الخشنة المزينة النصال . ازهارها قليلة العدد ترتكز على  
شراخ دقيق يطول من ٥ الى ١٥ سم .

١١٢٧٥ - **راكمندي اسفع** \* ، **راكمندي صوفي** \*  
Ramondia serbica, Jankaea ferruginea (S).  
Ramondie de Serbie, Jankaea ferruginea (F).

نوع من الرامندي ، عتية سريرية ، فريقة ، ممر .  
منبتها العلوي بعض مناطق البلاد المحتلة الحرارة اخصها  
سربيا || اوراتها مشيرة تطول نحو ٣ سم . نصالها خلية  
الصفعة العليا البحرية اللون ، صفاء الصفعة السفلى .  
شراخها الزهري يطول من ٧ الى ٢٢ سم . ازهارها قليلة  
العدد متوسطة الحجم ، صفراء اللون ، زرق المآبر ||  
تنويرها صيفي .

١١٢٧٦ - **راكمندي ميكوني** \*  
Ramondia Myconi (S). Ramondie de Myconi (F).

نوع من الرامندي . عتية فريقة ممر . منبتها المناطق  
المحتلة الحرارة من ارتفاع ٦٠٠ الى ١٦٠٠ م . من سطح  
البحر || اوراتها تطول نحو ٧ سم . نصالها عثن للمسح  
مسنن الحافة ، زرق اخير اللون على الصفعة العليا ،  
اصعبه على الصفعة السفلى . شراخها الزهري يطول من

١١٢٦٢ - **رَالِيَّيْنِيَّاتٌ •**  
**Raninidae (S).**  
**Raninidae (F).**  
 فصيلة دوبيات بحرية من التثريات عشاريات الاربل المتلوات. اجناسها وانواعها المروعة قليلة العدد اعطائها بجماد البلاد الحارة والاسوائية || اعرف اجنتها واسمها افرانين الذي يعتبر قيس الفصيلة .


١١٢٦٤ - **رَاهِيَّةٌ هي البنية ، اطليا .**



راهوب الثرؤل راهوب اسود

١١٢٧٢ - **رَاهُوبُ الدَّيْع •**  
**Ustilago scorzonerae (S).** Charbon du scorzonère (F).

فطر مجهري طويل العمر يعيش في الاربعة واخليا ، يصيب الديع في المواقع الرطبة حيث يطب رويزات الازهار || مظهره الخارجي يتور بوبية لونها الى السمره تملو الرويزات ثم تطلق من غيرات هبابية شديدة السواد. يكافح باجتناب زرع الديع في الامكان الرطبة .



راهوب الحفظة (١) (٢)

١١٢٧٧ - **رَاهُوبُ الدَّخْن •**  
**Ustilago crameri (S).** Charbon du millet (F).

فطر مجهري يصيب البن من اختلاف انواعه . مركب مريض الزهرة فيسبب انتفاخه واحول مادته ثم تحوّلها الى كتلة بوبية قهقرها نحو ٤ م. لونها الى السمره || اضراره تختلط باختلاف العوامل الجوية لذلك تراوح من ١٠ الى ٧٥ ٪ || يكافح اما بتطليس البذار مدة خمس دقائق في ملووب الفرمول المحلول ٠.٢ ٪ حيث يمكن منع الحبوب المطبوقة لانها لا تنقص في الماء او باستعمال املاح اللثيق او املاح النحاس واخصها كربونيد النحاس .



راهوب الدخن

١١٢٧٤ - **رَاهُوبُ الذَّرَّةِ الصَّغْرَاء •**  
**Ustilago maydis, U. mayz-seae, U. zeae (S).** Charbon du maïs (F). Common smut of corn (E). Mais-brand (D).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الذرة الصفراء في جميع اقطار العالم وفي جميع اقسامها التربةية والحوالية من الجذور الى الازهار فيؤذيها ويضرها او يملها ويقتع عموما . مظهره الخارجي كتل سود مختلفة الاشكال والاحجام ، تركب الاضواء بعد ان تحوّل لونها الى غيرات بوبية مشربة السواد يراوح قهقرها من ٧ الى ١٥ ميكرون . يكافح باستعمال اللدرة الزراعية الثلاثية وذلك لان استعمال الفولتير يظهر البذار ولكنه لا يظهر التربة التي يارى اليها والتي تحضنه من عام الى عامين .



راهوب الدخن

١١٢٧٥ - **رَاهُوبُ الزَّرِّيْق •**  
**Ustilago vaillantii (S).** Charbon des lis (F).

فطر مجهري يصيب بعض الزريقات اخصها الاشتر والحمل . يعيش داخل نسج الاسطاط ويتكاثر في اواخر الازهار متخفلا على جذرات البوع ثم يحول التكاثر الى حفاق بوبية تنطلق من غيرات هبابية لونها الى السمره الحفظة . يكافح بتقلع وتلف الجصل المصاب .



راهوب الذرة الصفراء (١) (٢)

١١٢٧٦ - **رَاهُوبُ الشَّعِير •**

**Ustilago nuda, U. segetum (S).** Charbon nu de l'orge (F). Loose smut of barley (E). Gerstenflugbrand (D).

فطر مجهري واسع الانتشار يصيب الشعير في اختلاف انواعه وضرره . مركب السبال عند ازهارها فيملب الزهر وكه بقصي على كامل السلبة تنسل بمجموعة متتابعة منتصبة من الكتل البنية . واذا تركب تنسل الزهرات بسبب اضراره وذووله بعد تحطيطه وترقيعه || يكافح بجمه



راهوب الذرة الصفراء (٣)



راهوب الشعير

١١٢٦٥ - **رَاهِيَّةٌ •**  
**Veine de l'intérieur du fémur (F).**  
**Vein of the inner femur (E).**  
 الراش والراشة : عرق باطن ذراع الدابة . وما راهاش . ج رواحش .

١١٢٦٦ - **رَاهِمَةٌ •**  
 الصفرة الثابتة . وأرواحس هي الصغور المتراصة الثابتة .

١١٢٦٧ - **رَاهِم •**  
 نمت وصفي للاجتناب التي لا تبلى .

١١٢٦٨ - **رَاهُوب •**  
**Ustilago (S).**  
**Charbon (F).** Smut (E).  
 جنس فطور مجهرية طفيلية من الراهويات . تتميز بطليها الفردية وركزها السريمة الانغلاق التي تنشأ وتكاثّر على الاضواء الثانية في النبات النصار || انواعه عديدة . اسمرها ما يلي .

١١٢٦٩ - **رَاهُوبُ اسْوَد •**  
**Ustilago nigra (S).** Charbon nu noir de l'orge (F).  
 فطر مجهري يصيب سبائل الشعير ليملها . مظهره الخارجي كتل سود ميمرة تركب جميع اقسية الزهر حتى الراشات التي لا تقريبا . يوبعا طلياله شفوية التكاثر الرباعي العرقي || اضراره زفيدة ، يكافح بظهور البذار وباجتناب الزرع في المواقع الرطبة .

١١٢٧٠ - **رَاهُوبُ الثَّرْوُول •**  
**Ustilago bromivora (S).** Charbon des bromes (F).  
 فطر مجهري يصيب مختلف انواع الثرؤل في اضراره ليملها . مركب الزهرة يقضي على المبيض والاشعية بعد ان يحولها الى بؤرة من الثبار والبرغ كلبية الشكل سواد اللون فهو جامدة لزجة ثم تنسل تدريجيا وتطالير تفسح لها كالمذاب || يكافح مكافئة راهوب الدخن اذا كانت زراعتة تدخل في نطاق النباتات المليفنة .

١١٢٧١ - **رَاهُوبُ الحَفْظَة •**  
**Ustilago tritici (S).** Charbon du blé (F). Loose smut of wheat (E). Welzenflugbrand (D).

فطر مجهري طفيل واسع الانتشار يصوب الحفظة وقد شجود عليها في جميع اقطار العالم ما عدا امريكا الجنوبية التي لا تزال حقلها سليمة || مركب سبائل الحفظة فيملب بقى سبها او شوبها ريمها . وقد تركب عقد السلاميات وانماذ المصنف || مظهره الخارجي يتور بوبية كثيفة التجميع شفاطة البؤرة الناعمة السريمة الملب . التي تنطلق من غيرات كروية سود قهقرها نحو ٥ ميكرون . يكافح باستعمال الفلواقي المختلفة التالية :

١ - في الاساليب الزراعية القائمة على اجتناب للمواقع الميرة او على تغيير البذار او على جمع وسرق جميع السبائل المصابة .

ريشاسي



راهوب الشعير المغلف (١)

للشعير الشفاف. فيها عيوب الازمية والقصب وقد يصيب الحلايا || تتميز بصفتها البعاطي. دملها جولية غير انقباضية. يوقتها لا تياسة وكثرة البند || ظورها تسبب عدة وسوم، واشهرها الرسوم القصبية والازمية. أشهر اجناسها التكتفوره والراووب والسجاد والشيزونه والعلطل والقصبية والغرزبة .

Abellie (F). Bee (E).

١١٢٨٤ - رَاهُوبِيَّة

في النحلة سميت بالرأية لسكونها في طراها .

Rheum (S).

١١٢٨٥ - رَاوَنْد \* وَرَنْد

Rhubarbe (F). Rhubarb (E).



راهوب الشوان

جنس نباتات طبية عشبية جلجورية ممرمة من فصيلة البطيانيات. انواعه عديدة جميعها غنية الارواء الكبيرة القده ، نصلها شارب الصفحة المشعبة . انزاعها متشكلي يرتكز على شارب قصبية الانقباض . انزاعها متشوية . ثمارها عنية || افرق انواعه وافردها ما يج .

Rheum australe (S).

١١٢٨٦ - رَاوَلَّةُ الْجَنْتُوبِ

Rhubarbe australe (F).

نوع من الراوند الشرقي يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه صتيرة القده قليلة الشكل تطلو من ١٠ الى ١٤ سم . انزاعه حر || جذوره طيبة شاملة الاستعمال .



راهوب الشوان المغلف

Rheum emodi (S).

١١٢٨٧ - رَاوَنْدُ حَمَلَايَا

Rhubarbe de l'Himalaya (F).

نوع من الراوند موطنه سفوح جبال حلايا . يملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه كبيرة القده تطلو نحو ٦٠ سم . نصلها اشعر اللون ناعم البشرة . انزاعه وثماره حر .



راهوب الرنقليات

١١٢٨٨ - رَاوَنْدُ ذَكَرٍ ، اُطْرُوَكْدِي

Rheum raphanoticum (S). Rhubarbe raphanotic, R. anglicum, R. des moines (F). Raphanotic, Garden rhubarb, Pie rhubarb (E). Pontischer rhubarber, Garten rhubarber (D). Barbato raphanotic, Raphanotic (I).

نوع من الراوند التريبي يملو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . اوراقه قليلة الشكل تطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . وصفتها كذلك . نصلها رغو النسيج متنازع التصنيع حايل المضار . غلظها مأكولة || انزاعه كثيرة البند لونها الى الياض الاسفر .



راهوب المصان

١١٢٨٩ - رَاوَنْدُ رِيشَاسِي ، رِيشَاس ، رِيشَاس

Rheum ribes (S).

يَشَمِيصَا

Rhubarbe-groseille (F). Currant fruited rhubarb, Gooseberry currant (E). Persischer rhubarber (D). Rabarbaro acido, R. polposo (I).

نوع من الراوند ومونيات زراعي ممر موطنه الشرق الاوسط يملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه قليلة الشكل تطلو من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض من ٢٠ الى ٤٠ نصلها جلدي النسيج ، لونه الى المفسرة الزرقاء ، نصلها مأكولة وترب . ثماره مأكولة لكنها حارة الحامض ويستعمل منها وين نمل الارواق حامض اللون . كما يصنع من عصير ثماره بعض المربيات الصحية المشهورة ويستخرج من ايضا بدلتشعير نيك كولي يعرف بخر الرياس || غزوره عديدة تختلف باختلاف لون الثمار بين الاسود والاحمر والياض



راهوب التجر



راوند

ورقه فور ظهوره كما يحسن اجتناب الزرع في المواتع الربية .

١١٢٧٧ - رُاهُوبُ الشَّعِيرِ المُتَغَلَّف \*

Ustilago hordei, U. jenseni (S). Charbon couvert de l'orge (F). Covered smut of barley (E). Gestenhardtbrand (D).

فطر مجهري مركب سنابل الشعير فيسبب مواد الحب الى كل من الراوب الاسود الفضي وذلك بعد ان يعلب الراشة ويحب الاشنية || يكاثف كثير من الراوب.

١١٢٧٨ - رُاهُوبُ الشُّوْقَان \*

Ustilago avenae, Uredo segetum avenae, U. avenae foliolosa (S). Charbon nu de l'avoine (F). Loose smut of oats (E). Haferflugbrand (D).

فطر مجهري مركب الشوان فيسبب الحب وقد يقضي على كامل التشكيل || يثمر بطور كروية تتكون داخل الزهرة على الحب ثم تنم الزهرة مع اشدتها وتظهر شويوب سود موهوبة بدلا من شويوب الشوان || يكاثف بتطور البذار اما متفيرا بثر يوات النسل او نمتا يحيط القريب او باستحار غيرها من الفواظير الفعالة الحديثة .

١١٢٧٩ - رُاهُوبُ الشُّوْقَان المُتَغَلَّف \*

Ustilago levis, U. avenae levis, U. kolleri (S). Charbon couvert de l'avoine (F).

فطر مجهري يصيب الشوان به تأثير زهره ليركب المبيض وينشأ عليه ثم يم كامل اخفية الزهرة || مظهره الخارجي كحل من البثور البولية الازمية المكاثفة القليلة التصنيع والاختلال || يكاثف باجتناب زراعته في المواتع الربية ويتطور البذار .

١١٢٨٠ - رُاهُوبُ الرَنْقَلِيَّاتِ \* ، رَاهُوبُ بَنَفْسِيَّةِ \*

Ustilago violacea (S). Charbon violacé (F).

فطر مجهري يصيب نحو ١٠٠ نوع من الرنقليات . مركب مآبر الزهر فيمنع تكوين جذبات الولع به ان يحول المآبر الى بطور بولية لونها الى البشبي الباق . اضراره زهيدة لا تنوب المكاثفة اما يحسن قطع وسرق الانزاع المصابة اجتنابا لتفشي الوسم .

١١٢٨١ - رُاهُوبُ المَصَّان \*

Ustilago sacchari, U. scitamina (S). Charbon des cannes à sucre (F).

فطر مجهري مركب نواحي المصان على اختلاف انواعه من التريبي الى قصب السكر || مظهره الخارجي تأثير في التريبي يثوب عام فظيل القلب الثاني مع اوراقه الحامية ثم ظهور فتائل سود تملو الاثرار وتصل على وسمه || يكاثف باختلاص ورقق القصبان المصابة .

١١٢٨٢ - رُاهُوبُ التَجِيرِ \* ، رَاهُوبُ حَبِيطِي \*

Ustilago striformis, U. linearis, Tilletia striformis (S). Charbon linéaire (F).

فطر مجهري طويل الحاية يثوب نحو خمس سنوات في الترية وعلى النبات المتشادر . مركب التجير على اختلاف انواعه . مظهره الخارجي خطوط غيبطة فضية اللون تركب نصل الارواق بمزائة البروق تخفي على اللسع دون الكثرة وتركب سيقان المشاكل الزهرية تنصلها .

١١٢٨٣ - رُاهُوبِيَّات \*

Ustilaginaceae (S). Ustilaginaceae (E).

فصيلة فطور مجهرية طفيلية من رتبة البعاطيات غزيرة

Genetta (S). Genetta (F).  
Genet, Genett (E).

جنس حيوانات لاحمة من فصيلة الزباديات . انولاه ستة موطنها افريقية واروپية والشرق الاوسط . اجسامها مستطيلة وذناها ايضاً . قوائمها قصيرة خامية الاصابع ، طويلة الاظافر المنقطة . اذناها متوسطة القد . اذنيها مشرعة ، تخرج ظهورها عابق اللون وسيد الخط || تألف الجبال والبراري . تسرح في الليل . ترتاد اجوف الاشجار وشفاها . قوتها القوارض والحشرات والقويبات والحشرات . الاثني تنصع جرواً واحداً في الحول ترصده نحو ثلاثة اشهر || اما انولاه الستة فهي ما يتبع .

Genetta pradina (S). رُبّاح اُرُقَط  
Genetta pradina (F).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى السنغال ، طولهُ نحو ٨٠ سم . صفة قصير الحلب . ثوبه عابق اللون ككتيف التنصير ، خطوط ذنبه غامقة مستمرة .

Genetta rubiginosa (S). رُبّاح اُمْدَا  
Genetta rubiginosa (F).

نوع من الرباح ، موطنه المخرقية الجنوبية . طولهُ نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الشهباء ، تنصير املر . خطوط ذنبه متفرقة .

Genetta senegalensis (S). رُبّاح السنغال ، جَرَنْطِط  
Genetta du Sénégal (F).  
Pale genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه يمتد من السنغال الى القطب . طولهُ نحو ٨٥ سم . ثوبه الى الصبغة الباهتة ، تنصير لا قياسي الشكل ، ريشته ريشة اللد لا نطاسية .

Genetta felina (S). رُبّاح الفايون ، زُوَيْكَا  
Genetta felina (F).

نوع من الرباح ، موطنه الفايون والكنغو وشفاها النيل الازرق . وهو قريب اليه من الزباد ، طولهُ نحو ٨٧ سم . ثوبه الى الصبغة الرملية . تنصير يبعثي الشكل .

Genetta tigrina (S). رُبّاح دَنْكَلَة \* ، كَدَيْس الزباد  
Genetta tigrina, Genetta de Dongola (F).

نوع من الرباح ، موطنه افريقية الشرقية اعصها دَنْكَلَة والذوبة . طولهُ نحو ٩٠ سم . ثوبه الى الصبغة الخفيفة . تنصير جروي اللون . خطوط ذنبه مستمرة .

Genetta vulgaris (S). رُبّاح شاك \*  
Genetta commune (F). Common genet (E).

نوع من الرباح ، موطنه الشرق الاوسط واروپية . طولهُ نحو ٩٥ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٤٠ اما ارتفاعه فهو ١٥ سم . ثوبه الى الصبغة الغبراء ، تنصير الى اجنوة السرد . خطوط ذنبه متوسطة العرض || يعيش في الجبال في الجرة وقرب الماء . يسرح في الليل يتسلق الاشجار ويمر في الماء ويسبح . يسكن ويقيم العلم ، يصطاد الجرازين والفئار .

١١٣٠٧ - رُبّاح هو القردوح السي ، اطلبه .

١١٣٠٨ - رُبّاح اَبُو الهول هو القردوح الشحوت ، اطلبه .

١١٣٠٩ - رُبّاح زَيْتُونِي هو قردوح الحيفة ، اطلبه .

والاصغر والمشيخ . || والرياس يطلق الحيات ويقوي الاضاء والهمم ويزيل شعث الرقبة الجفنة والفتقان والبياسير .

Rheum compactum (S). رَاوَلْد كَتِيْف  
Rhubarbe compacte (F).

نوع من الراوند . هذه الصين . يملو نحو ١٠٠ سم . اوراقه كبيرة اللد مفرصة . فصلها متصع الصفحة ، جامد النسيج السيك ، مسن الحافة ، جميل الخضار القرامي . اثماره بيض || جلوره طيبة لكنّها اقل جودة ونحوها من جلور الراوند الجنوبي .

Rheum palmatum (S). رَاوَلْد كَتِي  
Rhubarbe palmée (F).

نوع من الراوند الشرقي . يملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة اللد مفرصة . مستطيلة المثلث ، كثيفة التنصل للمصص المايك الخضار . خضارته الزهري وضلوع اوراقه ومروها الى الجفوة || اثماره الى البياس الاخضر .

Rheum officinale (S). رَاوَلْد مَعْرُونِي ، رَاوَلْد صَبِي  
Rhubarb (E). Echter rhubarb (D). Rabarbaro, Rubarbo (I).

نوع من الراوند وهو نبات طبي وزراعي زَيْتُونِي . يملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقه كبيرة اللد خمسية التضاميص فصلها جميل الخضار الباهت مسن الحافة . اثماره كثيفة التجميع خضراء اللون || جلوره طيبة عديدة المنافع . تدخل في عدة مستحضرات وتساعد الهضم وتدر الصفراء . وهو مفو للمعدة ، منه الهضم ، يقضي مل البوليسر والاسك . ويستعمل في حوضه المعدة واضطرابات الهضم لا سيما عند الاطفال .

Débouraou (F). Clansser (E). رَاوَرُو  
آلة تستعمل في ترويق الحمور البيضاء وفي تنظيف المسائل من الزسل والمادان من القواب .

١١٢٩٤ - رَاوَلْب ، حَكَاوَر ، مَعْرُور ، جَمَكِيد  
Caillé, Coagulé (F).

لبن راب لمشر ولا يزال ذلك اسمه حتى يتّرع منه زبده .

Eteandard (F). Flag (E). رَاوَكَة  
بنة في الازمة شلت من ريفاتها لعلت واصبحت كالراية .

Compote, Jus (F). رُوْبَة  
صارة الفار المغلية المكثفة .

Patron رُوْبَة المَعْسَل  
١١٢٩٧

Usure (F). Usury (E). رُوْبَا  
الربا الاقراض بفائدة يتجاوز عيق الفائدة القانونية او عيق الفائدة الحاصل به عادة بين المتقارفين .

١١٢٩٩ - رُوْبَاو \*  
Stratocumulus, Cumulostratus (S).

ضرب من النجوم وهو محاب متواصل الطبقات والارصفة ايضى اللون او اريد .



رباح دَنْكَلَة



رباح شائع





رَبَاعِيَّة

الظهر، جالس البطن. يطول من ٣٥ إلى ٥٠ سم. ثوبها جميل الألوان. ظهورها الى الزرقاء السمجنونية. جانبهاها ويطبقها الى الصفرة الغنية. رأسها وأعناقها مرقوشة باللحمي. فنتها يتجق بالاسود. وأنها مستدل الجرم. قصير الخطم يملو حول ذبهي اللون فوق كل عين. شقلها مستدل الانفراج. فكاهما متعادلان. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. صيهاا كيرتان مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة الشكل. زعنفتها الذيلية حلالية التقدير || لحما فاخر الصف، مغروب فيه.

١١٣٤٦ - رُبَان ٥  
Naucratis (S).  
Pilot (F). Pilot-fish (E).

جنس اسماك بحرية من شالكانات الزعانف وفصيلته الاستمرديات. انواعها المعروفة قليلة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اعليجية الشكل. سفها صغير لثد. زعانفها الظهرية مستطيلة تتقدمها اربعة مناسخ مستقلة لحمية. زعانفها الشرجية فارقة || أشهر انواعها الربان للبلد.

١١٣٤٧ - رُبَان مَبْدُول ٥  
Naucratis ductor (S). Pilota commun, Fanfre (F). Common Pilot-fish (E).

سمكة من الربان. اصلهاا بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تتميز بمواكبها البياض والسن في رحلاتها عبر البحر ذهابا وايابا من بلاد الى بلاد || جسمها اعليجي الشكل يطول نحو ٣٠ سم. رأسها مستدل الجسم، شبه مخروطي الشكل. قصير الخطم. مستدير الظهر || ثوبها الى السمرة الفضية والذهبية الممزج يبق عند الظهر وبغير عند البطن ويمتلكه ثلاثة احزمة متفارقة العرض شديدة السمرة || لحماا كامن الصف، مأكول قل من مريض فيه.

١١٣٤٨ - رُبَالِد ٥  
Archives (F).  
Archives, Record office (E).

هي المخطوطات الكتابية من وثائق وغيرها، وأحدثها ربيدة.

١١٣٤٩ - رُبَيْد ٥  
Caroubier (F). Carob-tree (E).

هي شجرة الخروب الجوي او شجرة الخروب المأكولة الثمار.

١١٣٥٠ - رُبَيْح ٥  
Profit (F).

هو ما تحقق من مكسب. والربح يقسم الى قسمين : ربح اجبالي او قائم وربح صاف.

١١٣٥٢ - رُبَيْح فَالْت ٥  
Lucrum cessans (F).

هو الربح المتوقف حصوله فيا او نفذ المتعاقد التزامه لان التقاعده في تقرير التوضيح من القصر في حساب الخساسة

القبضية التي وقت الربح العمل الذي فات من عدم تنفيذ الالتزام. بالكليل مهذب || أشهر انواعها ما يقع.

١١٣٥٣ - رُبَيْد ٥  
Buphthalmum (S).  
Buphthalmum, Œil de boeuf (F).

الاسم العلمي من اليونانية بمعنى عين الثور || جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة بعضها زراعي تربسي، اورقاته متعاقبة. اثمارا وريسية ملقحة البتلات، حشوية الغلاف القرصي. يزوره متوتبة باكليل مهذب || أشهر انواعها ما يقع.

وربايات المياشيم والكل والاذنيات، كثيرة الوباس الفكية التي تحيط بالثم || اصداهاا شبه قرصية الشكل مجرولة عديدة الجيوب او الحبر || أشهر مرتباتها او فصائلها المستويات والوثقيات والمقرنات.

١١٣٣٨ - رُبَاعِيَّة ٥  
Mitoyenne (F). Midway (E).

من الانسان القاطنة الاسلمية وهي السن التي بين الثانية والثاب.

١١٣٣٩ - رُبَاعِيَّة الاجزاء ٥  
Tétramères (F).

رُبَيْة حشرات من نمديات الاجنحة. Tétramer (E).

١١٣٤٠ - رُبَاعِيَّة القُرُوع ٥  
Tétractinellidés (F).

رُبَيْة من الاسفنج السواني. Tetractinellidés (E).

١١٣٤١ - رُبَاعِيَّة ٥، كُرُوب علكي ٥  
Brassica oleracea napus (S). Rutabaga, Navet de Suède, Turnep (F). Swedish turnip (E).

نبات عشبي زراعي علفي محول من فصيلة الصليبيات. جته يضي الشكل كبير الحجم اسم الفشار اصفر القباب الجملد || يزرع كالقث يحول في جميع الاثربة لكنه يرضب في الملقح التي تكثر فيها الرطوبة الجزية ويقل فيها الاشعاع الشمسي || يستعمل كمكاف للبر والحليب والخبازير والشم.

١١٣٤٢ - رُبَالِي ٥  
Plotax (F).

هو الربي من الاسماك البحرية الصغيرة اللد.

١١٣٤٣ - رُبَال ٥  
Chrysophrys (S).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبوريات. الواء عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة. اجسامها اعليجية الشكل، تطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. لونها صغيرة، زعانفها الظهرية مستطيلة شالكة. اثارهاا ملحية اللون تشبه القريدي. لحماا لذينة اللحم.

١١٣٤٤ - رُبَال ٥، بَرْدَة ٥، اَبُو بَصَل ٥  
Chrysophrys berda (S).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة الاسبوريات ورُبَيْة شالكانات الزعانف. اصلهاا بعض اقالي البحر الابيض المتوسط والحيها الاطلسي. تتميز من اسماك الهامح والثفاف، مسرحها الاضواء القربية الثور || جسمها اعليجي الشكل، طولا يراوح من ٢٠ الى ٣٠ سم. ثوبها الى الوردي اللحي المالح يملو شمشة زرقاء في الظهر وقبة فضية المالح في البطن. زعانفها حشلية اللون باستثناء الصدريه لانها شفافة. رأسها مستدل الجرم، قصير الخطم. شقلها مستدل الانفراج. اسنانها ثلاثية الصفوف في الفك الاعلى، ورباعيتها في الفك الاسفل. صيهاا كيرتان، مستديرتان، جاسطتان. زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة. زعنفتها الذيلية فارقة || لحماا ابيض اللون، فاخر الصف.

١١٣٤٥ - رُبَال ٥  
Chrysophrys surata (S). Daurade vulgaire, D. blunée (F). Common Dorsé, Gilt-poll, Gilt-head, Chad (E).

نوع من الربال. اصلهاا منظم اقالي البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تتميز من اسماك الهامح والثفاف || جسمها شبه اعليجي الشكل، مقوس



رَبَال



رَبَال بَرْدَة



رَبَال مَبْدُولَة



رَبَال مَبْدُول

## الْفُتَّاح



رَبْدٌ صَفْصَالِي الْوَرَق

الصفة المفضة. ازهارها بنفسجية. ثمارها صلبة كروية سوداء، تليق لا تزكّل || رغب في الازفة المنسقة الانسلاج والطرود. مَطْمُوم اليانحين على الربرق ينشر طولاً لينة. ثمارها لليلة المسم.

## ١١٣٦١ - رُبْدِيَّاتٌ ٥ Hypodermatacides

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات ورتبة الزبقات. تتميز ببنيتها وبسببها الثاقرة في النسيج النباتي المنساعة. نكتاتها شفعية، رباعية أو خماسية. نكتاتها عديدة، عجيبة أو صقية، فراء الرووس || استنساخ عديدة منها واحد يوم الاقتصاد الزراعي ينهي الحروب.

## ١١٣٦٢ - رُبْدِيَّاتٌ

رُبْدِيَّاتٌ الكيش عن القم: ترك غرابها عن حياء.

## ١١٣٦٣ - رُبْدِيَّاتٌ

Intestine (F). Bowels (E).

الرُبْدِيَّاتٌ هي الاسماء.

## ١١٣٦٤ - رُبْدِيَّاتٌ

Fondation (F).

Foundation, Ground-work (E).

الرُبْدِيَّاتٌ: أساس البناء وما على الأرض من التربة.

## ١١٣٦٥ - رُبْدِيَّاتٌ

Attelage (F). Harnessing (E).

قرن أو شد الحواب بالجرور.

## ١١٣٦٦ - رُبْدِيَّاتٌ

Ligature (F).

هو تكتيت أعضاء النبات أو بعضها برباط.

## ١١٣٦٧ - رُبْدِيَّاتٌ الْكَرْمَةِ

Accolage ou acollement de la vigne (F). Nailing up or joining of vine (E).

هو رفع وربط مروع الكرمة بالمساكن.

## ١١٣٦٨ - رُبْدِيَّاتٌ الشَّرَاحِ

Liaison de contentieux

## ١١٣٦٩ - رُبْدِيَّاتٌ

الرُبْدِيَّاتٌ نيم صير من كوكبة الثنتين مركزة في وسط المواليد.

## ١١٣٧٠ - رُبْدِيَّاتٌ

Eumétrique (F). Eumetrical (E).

نمت تعريض يطلق في تمشيت القواطع على كل حيوان مربوع الجذعة متوسط القذ والوزن.

## ١١٣٧١ - رُبْدِيَّاتٌ

Irrigation (F).

الرُبْدِيَّاتٌ والرّي والاسقاء واحد.

## ١١٣٧٢ - رُبْدِيَّاتٌ ٥، قَسْمِيْلِيْلَا ٥ Phacidiella

جنس فطور مجهرية من الرُيْبَاتِيَّات. يتميز ببنيتها المنسقة المستندرة، ببنيه البيضي الشكل الوحيد الخلية وبنيكاته البنفسجية الزرقاء الاصل || اشهر انواعه رَيْع الفُتَّاح.

## ١١٣٧٣ - رُبْدِيَّاتٌ الْفُتَّاح ٥، قَسْمِيْلِيْلَا دِيْسِكُوْلُوْر Phacidiella discolor, Phacidium discolor, Phacidio-

pycnis furfuracea, F. nolorum, Discula pyri, Fackelia conspicua (S).

فطر مجهرى يركب الفُتَّاح والاباجس والسفرييل في انصافها وثمارها نُوْلِيْلَا || يصيب انصاف وانفاد الاجزاء الصمغية فيقرح قشورها ويصلبها. مظهره الخارجى يقع فمسية، منخفضة الوصل الاصل، مرتفعة الحافة الحطية المنددة. وهو على الكار عند تمام ادراكها وفي انهاء خزنها يتسحق



رَيْع الفُتَّاح

## ١١٣٥٤ - رُبْدٌ صَفْصَالِي الْوَرَق \* Bupthalmum salicifolium (S). Bupthalmum à feuilles

de saule, Cèl de bœuf à feuilles de saule (F).

نوع من الربد يعلو من ٣٠ الى ١٥٠ سم. ساقه نحلة اوراقه سنانية طولها نحو ١٠ سم. عرضها ٢، نصلها جلد النسيج الرقيق، ازغب البشرة على صفحيه. ازهاره كبيرة القذ فردية الارزكانز.

## ١١٣٥٥ - رُبْدٌ ظَرْيْف \* Bupthalmum speciosum, Telekia speciosa (S).

Bupthalmum élégant, Cèl de bœuf élégant, Télékia élégant (F).

نوع من الربد يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، اوراقه قلبية الشكل منسقة، نصلها حالى بشرة الصفة العليا، ازغب السفلى. ازهاره كبيرة القذ قطرها نحو ٨ سم.

## ١١٣٥٦ - رُبْدٌ فَائِصِر Bupthalmum speciosissimum, Telekia speciosissi-

ma (S). Bupthalmum superbe, Cèl de bœuf superbe, Télékia superbe (F).

نوع من الربد، يعلو نحو ٥٠ سم. ساقه غليظة قوية. اوراقه حاشية كبيرة القذ مميكة النصل الجلدي الازغب. ازهاره كبيرة، قطرها نحو ٦ سم.

## ١١٣٥٧ - رُبْدٌ ثَقِيْنٌ وَرْدٌ الْحِمَاكِر Bupthalmum graveolens (S). Bupthalmum fétide,

Cèl de bœuf fétide (F). Oxyeye (E). Rindsuge (D). Bufalmo, Occhio di bus (I).

نوع من الربد، يعلو نحو ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة المنح مميكة النصل الباهت الخضار. ازهاره شارفة البتلات، لونها الى الصفرة الباقية. يكثر في الاراضي البور للتصحة الانساج.

## ١١٣٥٨ - رُبْدٌ دُوْر ٥ Rhipidura (S).

Rhipidura (F).

طائر من الجواثم سليات المتأخر وفصيلة المهابيات. موطنه ماليزيه والجزر المجاورة. يألّف النابات وصفات مجاري الماء. قوته الاذباب والحوم || جسمه صغير القذ، مستطيل الزنبد المردسي الشكل. ثوبه الى النضجة الطلاء. عجماره وزوره وفتيقه الى القليلة، ويعلو في تحريه من قاعدته الشفق الى النطق، جذة حابطة السرعة كما في الرأس الى يذئ عن في الاثمار الزرقية. عته كاللحوب جيد الحيك بالخشيش الناعم. الاتى تحضن بتناوبة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات على مرتين في الحمل. القرعشم يستمر نحو ١٢ يوما.

## ١١٣٥٩ - رُبْدٌ مَرْبُوب Troupeau de ruminants sauvages (F). Drove of savage

ruminants (E).

سجامة البقر الوحشي وسائر الحيوانات المجترية.

## ١١٣٦٠ - رُبْدٌ رَقِي، أَفَاقِيَّة، مَعْدُ أَسْوَد، عَصَب الدُّنْب Melongena noire, Morella noire, Amourette,

Tue-chien (F). Black nightshade, Hound's-berry (E). Schwarzer nachtschatten (D). Morella, Solano nero, Solatro ortense (I).

جنية رية مدمرة من الفصيلة الباذنجانية. يالها غليظة، فراءها، شاككة. اوراقها كبيرة القذ منسقة، نصلها مكيح



رل



رية النخيل



رية شية



رية منقطة



ريدان مرعوي

مستديرة حنية خلية حنطية اللون تركب البشرة المخدوشة والمطوية تتجمل في اغلال أخلايا والانساد || يكلف بقلع ورق الاضمان والانتاد المصابة ثم تطهير الجروح بمطول سلفات الحديد او سلفات النحاس .

١١٣٧٤ - **زيتونات** *Phacidia*  
عزاة فلور مجهرية من فصيلة الحشريات زيتونية الزيتيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بقصصها اللاتقياس الذي يتفصل من النخبة او يلتصم بها . مدينتها مستديرة منبسطة . يوفها يضي الشكل خلف وسيد الخلية . نكتاتها بنفسجية الزام الاصل || لشجر اجناسها التي تمرى الثبات ثلاثة : الربيع والخريف والشتاء .

١١٣٧٥ - **زيتونة** *Empria* (F). *Expropiation* (E).

١١٣٧٦ - **زيتوني** ، **زيتاني** *Plotax*  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات صغيرة القد مفلطحة مستديرة زاهية الالوان البديدة ، تكثر في البحار الحسنة .

١١٣٧٧ - **زيتون** ، **زيتون** *Randia* (S). *قرصم العنكب* *Randia* (F). *Ink plant, Ink-berry* (E). *Randia* (D). *Randia* (I).

جلس بنات وهجرات برية وزيتونية من فصيلة الغويات . انواعها عديدة جميعها فراء السوك ، بعضها شاك . اورقاتها متقابلة او رمية ثلاثية ، احليجية الشكل ، مياوية التصل ، مستكة . انهارها فردية التجميع ابيلة الاوتكار . ثمارها منية منية ثنائية البقلة . ترب في الاراضي الرطبة . تكثر في المناطق وعلى ضفاف الانهر . يستخرج من ثمارها صباغ ازرق قاصر الصنف .

١١٣٧٨ - **زيتون** *Phyllon* الشجرة العظيمة الواسعة .

١١٣٧٩ - **زيتون**  
الشاة التي وضعت سديتا . وتيل الرب من المخر والرفوت من الفسفن وجسمها رباب .

١١٣٨٠ - **زيتونة النخيل** *Phyllonatus stenus* (S).  
غشاء من فصيلة الجليات ، طولها نحو ٢٠ م . ورضها ١٢ ، رأسها مريض ملح بقرن مدب . لونها كستنائي موله لل سمرة . تحمها مستدير الطرف . تعيش بين النخيل وترب في المناطق الرطبة . ريقها تركب جلور لكوية ولطوية حتى سطح التربة .

١١٣٨١ - **زيتونة شبيهة** *Pentodon idiota* (S). *Pentodon nigaud* (F). *Pentodon idiota* (E).

حشرة غاشلة واحدة من فصيلة الجليات ورقية ممدات الاجنحة . موطنها الشرق الاوسط . تألف المزارع والبساتين والكروم والرواقين . خنافسها تعيش على اوراق النبات . يرقاتها تركب الجلور التاكوب والشمرة || جسمها يضي الشكل ، متوسط القد ، يطول من ١٨ الى ٢٠ م . ويعرض من ١٢ الى ١٣ م . ثوبا الى السواد اللامع يعطو ظل دقيق . رأسها مستدك الجسم ، قصير الخط ، ضلع الكنكيز اللزبين . زبابها صيران ، صمغيا اطراف . عيناها صغيرتان بارزتان ، ظهرها مستدك الاحدياب مشطوم الطرف لا يلمس كامل البطن . غذاءها متباينة الحشيز الخفيف . اصنافها خاسية المنقل || جلها ثلاث اطول . تخرج الحشرة الجملانة من مكنتها في نيسان وتبقى

حتى اواخر ايلول . تسرح من الشروق الى نحو الساعة العاشرة ومن العصر الى الدخلة . تساد بعد ظهورها بثلاثة اشهر . تنجح المكن في التربة على عمق ٥ او ٦ سم . || البرقة عند بلوغها الادراك الجسموري الذي يحصل بعد التقف ينمو ٢٦ شهرا تقو نحو ٣٠ م . ثوبا الى البياض الابهر . جسمها مستطيل الجسم ، مقوس الشكل ، مستضخم الرأس الاسود ، ضلع الكنكيز ، سداسي الرواجب المسر || طور الاكمال الذي يستمر نحو حشرة اسابيع يقضي في التربة على عمق نحو ٢٠ سم . داخل جراب غش من القراب والغاب .

١١٣٨٢ - **زيتونة منقطة** *Pentodon punctatus* (S). *Pentodon punctatus* (F).

غشاء من فصيلة الجليات . جسمها يطول نحو ٢٢ م . ويعرض نحو ١٤ م . رأسها مستعرض الشكل . ظهرها محبوس . ثوبا الى السمرة اسود المولج . غذاءها مجذعان جينوط دقيقة تلوو كالنقط المتتابعة || ريقها كبيرة القد ، مقوسة الشكل ، غبراء اللون ، تعيش نحو ثلاث سنوات ، تركب جلور النبات من اي جنس ونوع .

١١٣٨٣ - **زيتونة** *Dividende* (F). *Dividend* (E).  
هي الحصة من الربح الصحيح وله تكون حقيقية او صورية .

١١٣٨٤ - **زيتونة** *الريد* ، *تمر لصد ثم نضج بالماء* .

١١٣٨٥ - **زيتونة** ، **زيتونة** *Ornithopus* ، *Pied d'oiseau* (F). *Ornithopus* (S). *Ornithopus* (D). *Ornithopus* (I).  
جنس نباتات عشبية برية وطلزية من فصيلة القنطاريات القراشية . انواعها ستة ترب في الازرة الرطبة والقليلة الانساج . اورقاتها متعاقبة مركبة ورية ، وريقها احليجية صغيرة . انهارها محورية ، ثمانية صوبانية التجميع ، يضاء اللون او وردية . زمامها فردية اسطوانية الشكل متفاوتة الطول حوية المقعدة تشبه رجل الطير . يزودها صغيرة شبه كروية . اشهر انواعها على ل .

١١٣٨٦ - **زيتونة القرم** *Ornithopus perpusillus* (S). *Ornithopus nain* (F).  
نوع من الريدان البري النجسي الصينى القد . انهاره يبيض . يقال انه من النباتات الطبية يدر البول .

١١٣٨٧ - **زيتونة مرعوي** *Ornithopus sativus* (S). *Ornithopus cultivé*, *Serradelle*, *Serradelle* (F). *Serradilla*, *Common bird's-foot* (E). *Serradella*, *Kleiner vogelfuss* (D). *Ornithopus sativa*, *Serradilla* (I).

نوع من الريدان الكلاسي ، زهره ودي اللون ، يزرع في الحقول والمراعي . حلقه جيد الصنف رغب فيه الماشية .

١١٣٨٨ - **زيتون** *Printemps* (F). *Spring* (E).  
فصل من فصل السنة بين الشتاء والصيف . مدته ثلاثة اشهر من ٢١ آذار الى ٢٠ حزيران . يمتدنى زهره نزل الشمس من برج الحمل . وفيه يستوي الليل والنهار ويتبدل الزمان ويطلب الهواء ويب القمم وتكون الشروق وتسل الاودية وتنبع العين ويورق الشجر ويتلاذ الزهر في الربيع والحقل || يخدم ان لا تبلغ الشمس آخر الاجزاء حيث يقلل الصيف .



١١٣٨٩ - رَيْكِي (E). Vernal, Spring-like (F). Vernal (F).  
نمت ترميز يطلق حل ما يخص بالربيع .

١١٣٩٠ - رَيْمِيَّات (S). Primulaceae (S).  
Primulacées (F). Primulacées (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدة القلمة ، تشل علة أجناس وأنواع ، أشهرها زهرة الربيع وبخجور مريم وسحيفة الخلة .

١١٣٩١ - رَيْمِيَّة (S). Autosome (F). Autosome (E).  
اسم يطلق حل مجموعة الشعب المجاورة في كل حيوية حيوانية .

١١٣٩٢ - رَيْت (E). Sanglier (F). Wild boar (E).  
الرت هو الخنزير الوحشي . الذكور ينحى الشعر والانيث الرث . أنواعه عديدة موطنها العالم القديم ، أمورها وأشهرها الأربعة التالية :

١١٣٩٣ - رَيْت أَصْفَر \* (S). Sus cristatus (S).  
Sanglier à crinière (F).  
نوع من الخنزير الوحشي يتميز بطوله الطويلة الحلب الأسود الممتدة من اللذن إلى الكفل . ذنبه قليل الحلب . أذنه مرطاب الصفعة الخشبية ، عليه الناعالية . جنته متوسعة اللد طولا نحو ١٥٠ سم . طولها ٩٠ || موطنه الهند حتى ارتفاع ٤٥٠٠ م . ويرتبط وبشر الجوز الأخرى || أذنه تقص من ٤ إلى ٦ خناثيس مرتين في العام .

١١٣٩٤ - رَيْت قَرْم \* (S). Sus salvanius (S).  
Sanglier nain (F).  
نوع من الخنزير الوحشي ، موطنه مغرب جلايا . جنته صغيرة اللد طولا نحو ٦٠ سم . طولها ٣٠ بذيله ٣ سم . يعيش طمان صغيرة براوح صعدا من ٥ إلى ٢٠ . يألف الأراج والادغال والأراضي الطبيعية الرطبة الاضباب . أذنه تقص مرة واحدة في العام من ٦ إلى ٨ خناثيس .

١١٣٩٥ - رَيْت مَجْدُول \* (S). Sus scrofa (S).  
Sanglier commun (F). Common wild boar (E).  
نوع من الخنزير الوحشي ، فروبه عديدة موطنها آسيا والشرق الأوسط وأروبة وجزر المتوسط وأفريقية الشمالية حتى مصر واليونان || جسمه غليظ الجف ، طوله نحو ٢٠٠ سم . طول ١٠٠ ذنبه ٢٥ . أما وزنه فيراوح بين ١٥٠ و ٢٠٠ كيلو . قوائمه قصيرة قوية ، رأسه شحم فنتليته مسطوية . أذنه متضبة ، عليه كثيف التجميع يغلف ويطل عند شبح الظهر || يعيش جهامات غطفة المدمد . يألف النباتات والحقول المزروعة . يسرح في الليل . أذنه تقص من ٦ إلى ١٠ خناثيس مرتين في السنة .

١١٣٩٦ - رَيْت مُسْتَج \* (S). Sus vittatus (S).  
Sanglier rayé (F).  
نوع من الخنزير الوحشي ، فروبه عديدة ، موطنها جلايا وسوريا وبورنيو وأندونيسيا . يتميز بفروه المسج وبذفرته السوداء التي تمتد من القفص إلى أوائل الظهر . جنته متوسعة اللد طولها نحو ١٢٠ سم . وطولها ٦٠ || يألف الأراج والمناقع والاضباب الكثيفة للفضة . أذنه تقص من ٦ إلى ٨ خناثيس .

١١٣٩٧ - رَيْكِيَّة (F). Phytoclasie (F).  
الرتاية مبحث من مجموعة مباحث علم النبات يخص بالتصنيف والتسمية .

١١٣٩٨ - رَيْكَاچ (F). Lithologie (F).  
العالم يتركب الحجارة .

١١٣٩٩ - رَيْكَاچِيَّة (E). Lithologie (F). Lithologie (E).  
علم الحجارة وتركيبها .

١١٤٠٠ - رَيْكَاچِيَّة ٥ ، كَرَامِيَرِيَّة (F). Ratanhia, Krameria (S). Ratanhia, Krameria (F).  
جنس نباتات جنينية طيبة معمرة من المستنقعات وخصلة اللينيات . الأنواع المعروفة ٢٠ أصلها البلاد الأمريكية تكثر في بوليفيا والبيرو . سوقها فروع . أوراقها سنائية متعاقبة ، تصالها صغيرة اللد جالسة . أزهارها فردية التجميع عوروية الأرتكاز . يتكرر فيها اللون الأحمر . ثمارها كروية ناشقة تلتف بعض البسات المستدرة || جلودها لينة التركيب لينة الانتشابه والامتداد ، تنجها بجواري اللون في بعض المواد المقوية لشفة الجزلة التبع || أشهر أنواعها ما تبع .

١١٤٠١ - رَيْكَاچِيَّة حَرَاء (S). Ratanhia indica (S).  
Kraméria rouge, K. de Savatille (F).

١١٤٠٢ - رَيْكَاچِيَّة غِيَرَاء (S). Ratanhia secundiflora (S).  
Kraméria grisea, K. du Mexique (F).

١١٤٠٣ - رَيْكَاچِيَّة عَزْلِيَّة (S). Ratanhia officinal (S).  
Kraméria officinale, K. triandra (F).

١١٤٠٤ - رَيْكِيَّة (E). Ordre (F). Order (E).  
هي في تصنيف الاحياء جلاع القصاصات لمتشابهة .

١١٤٠٥ - رَيْكِيَّة (F). Marche de l'escalier (F).  
الركبة : الواحدة من درجات الدرج .

١١٤٠٦ - رَيْكَم \* (S). Rotama (S). Rétama (F).  
جنس نباتات معمرة برية ورزينة من فصيلة القزليات . أنواعه قليلة مهمها الشرق الأوسط . جميعها نباتات تملو من المترين إلى الثلاثة أمتار . سوقها فروع اسلية الشكل . فروعها الزهرية عريانة أما الفلقة فلها أوراق صغيرة بسيطة مسطوية التصل الحسوي أو خشبي . أزهارها عتويدي التجميع ، عوروي الأرتكاز . أزهارها صغيرة اللد ، كثيرة البدد ، يضاء اللون || تنموها يستمر من شباط إلى أواخر نيسان .

١١٤٠٧ - رَيْكَمِيَّة (E). Gommage (F). Tapping (E).  
استئصال أو امتصاص راتنج الحسوريات وذلك بحر سوق هذه الأشجار والقطاط ما يحل منها من الراتنج .

١١٤٠٨ - رَيْكُوج ، رَيْدَب (F). Cul-de-sac (F).  
Blind alley (E).  
كل منجم لا يخرج فيه وكل طريق غير ناظ .

١١٤٠٩ - رَيْكِيَّة ، رَيْكِيَّة (E). Sous-ordre (F).  
Sub-ordre (E).  
الرتيبة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الرتبة وقبل الفصيلة .



رت اصفر



رت مبلول



رتم

المعدية الى التي الاسمر . وراجها البنية طول دقيقة ||  
طور الكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوما يتقشر عن  
صلبة متينة الحيك تسجها البرقة التي صلح النمل بعد  
ان تطويه وتبكيه بخيط حريرية متصالية .

١١٤١٧ - رتيلا Ranger (F). To range (E).

رثت اللباجة فيها : حته . ورت البيض في الحانسة :  
رتبه .

١١٤١٨ - رتيلا الرجمة : يراض في طرف انت الفرس .

Rhytisma

١١٤١٩ - رتيلا

جنس فطور مجهرية من الرينيات وفصيلة الفشاريات  
يتميز برتيمة تنشأ وتنمو في نصل الورقة المنحار تحت  
الباسة الادمية . تحضن في داخلها الاصلان التي تضم البرغ .  
فيها كيف الثمة ، بسيط التركيب ، غيبلي الشكل ،  
شثان || انواحه قليلة اشهرها رتة القيقب ورتمة  
المنصفان .

١١٤٢٠ - رتيلا المنصفان

Rhytisma salicinum, Melasma salicina (S). Maladie  
des croutes noires du saule (F).

فطر مجهرى يصيب اوراق المنصفان فيشوها || مظهره  
الخارجي يقع بجبهة ناعقة لا قياسية الشكل والحجم ، لونها  
ال اسمر ، تركب نصل الازراق على صفاته العليا  
تستند النصل وتحميه وتشويه || اغزاره طفيفة لا  
تستويب المكافئة .

١١٤٢١ - رتيلا القيقب

Rhytisma acerinum, Melasma acerina (S). Maladie  
des croutes noires de l'arabe (F). lar spot of maple  
(E). Pechfleckkrankheit des ahorns (D).

فطر مجهرى يصيب القيقب في اوراقه فيضها . مظهره  
الخارجي يقع لا قياسية للشكل والحجم تكثر فيها الاستدارة .  
قطرها يراوح من ٧ الى ١٨ سم . تركب نصل الازراق  
على صفاتها العليا تحت حمز فضيو صفراء اللون ثم سمراء  
يعطيها اطار مذهب || اغزاره محدودة الاثني لا تستلزم  
المكافئة . حل ان استمال سائل بورود مرة واحدة  
الانواع يفيد . ومنهم من استعمل الاسمدة الازوتية لانها  
تقوي مناعة الازراق وتضع الرتمة .

١١٤٢٢ - رتيلا Archrite (F). Arthritis (E).

في التهاب المفصل . اطلبه .

Trechidas (S).

١١٤٢٣ - رتيليات

Tréhidés (F). Trechidas (E).

فصيلة حشرات قانصة ناعمة من رتبة غدييات الاجنحة .  
اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها من حشرات الاناث  
الغارة والمتدلة الحرارة || جميعها صغيرة القدر قلي تتجاوز  
طول الواحدة منها ١٠ سم . رؤوسها كروية الشكل ،  
صغيرة العين الناشرة ، مستطيلة الزباني المشارية النصل .  
كرواسها قليلة الشكل . امامها لاسقة ثمانية الاعاديد  
القطبية المتوازية . اطرافها مخيطة الالوان || تسرح في  
النبات رتييت في الليل . تسمى بسرعة ورشاة وتعتبر غثة ||  
قوتها ما تهرس لها من الحشرات الدنيا واليدان || اشهر  
اجناسها الرتيطة والسحيرة والبنوس .

١١٤٢٤ - رتيكة ، صغو سيلندريوم

Septocylindrium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الرططيات . مشجبه داخلي

Tarentula (S).

١١٤١٠ - رتيلا

Tarentule (F). Tarantula (E).

جنس حشرات من المناكب ينتمي الى فصيلة الحنكيات .  
انواحه قليلة جميعها متوسطة القد ، قانصة ، مقفرة وبامة .

١١٤١١ - رتيلا الالبية

Araignée des caves (F).

دورية من المناكب تدعى شبيعة ، اطلبها .

١١٤١٢ - رتيلات Araneida (S). Aranides (F).

Aranéids, Spiders (E). Spinnen (D).

في المناكب رتبة من الحنكيات مدينة الفسائل والاجناس  
والانواع .

Lygodium (S).

١١٤١٣ - رتيمة

Lygodier, Lygodion (F). Climbing fern, Snake's  
tongue fern (E). Schlingfarn, Kletterfarn (D).  
Ligodia (I).

جنس نباتات مرصعية من فصيلة الرتييات . انواحه  
المعروفة ١٥ جميعها نباتات عارضة ملتفة ممره . يقال  
لها لا تغل من القنواله الخلية وقد تنفع الصدر والامعاء .

Schizaeaca (S).

١١٤١٤ - رتيميات

Schizaeacés (F). Schizaeaceae (E).

فصيلة من الرعس اجناسها نحو ١٦ . انواحه كثيرة  
العدد جميعها رية ، منبها المناطق الحارة الرطبة . اشهر  
اجناسها الرتيمة .

Lais (F). Wild sow (E).

١١٤١٥ - رت

انثى الرت اي الخنزير البري .

١١٤١٦ - رتاعة ملوثة ، لايمة اوزاك

الاشجار الثميرة

Lyonetia clerckella (S).

Minuse des feuilles des arbres fruitiers (F).

Apple leaf miner (E). Obstbaum-Miniermotte,  
Schlangenniniermotte (D).

حشرة من فصيلة القويديات ورتية سرشقيات الاجنحة .  
اصطلاحا تمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا واثريقية الشالية .  
تألف الممرات التي يكثر فيها التفاح والكرز والخوخ .  
فراشتها جارية قوتها حريق الانظار . سرشقا لايمة قوتها  
غللا نصل الازراق || جسمها نحيل قثيف ، يطول  
نحو ٤ سم . سبطها من ٨ الى ١٠ سم . رأسها معتدل الحجم ،  
شبه مكور الشكل . عيناه صغيرتان ، بارزتان . زباناها  
عيطان . ملساها قصيرة ، مرشها معتدل الطول . جوشها  
الذهب اللين كالطين . رواشتها صغيرة ، الاسمانيا الى  
الانفصان الى الذهبية الخطية . اما الاحداث فالى الذهبية  
الزاهرة || لها ثلاثة اصيلان في الحول . تسرح في النهار  
وتسكن في الليل . تبارش الانثى متع المكن بعد الكوم  
يومين وتقسر عليه نحو خمسة ايام وتزود مبيدات في  
الصفحات السفلى من نصل الازراق . يتغذى المكن بعد  
منحه بنحو ٨ ايام من اسارع دقيقة تلم النصل في تسجيده  
المادي تحت البشرة وتقدر فيه انفاقا مستطيلة ، متعربة  
تتم فيها حتى نهاية الطور الاسروي اي نحو ٢٥ يوما ||  
السرقة عند بلوغها الاذراك تمام تطول نحو ١٠ سم . جسمها  
وشهي الشكل ، تنبي اللون ، اسمر الرأس . منها ورواجها



رتيلا



رتيطة



رت



رتاعة ملوثة



رتة المنصفان



رتة القيقب



رَبِيعَةُ الْجُدُور



رَبِيعَةُ الْقَطَن



رَجَانِيَّة



رَجَرَج

١١٤٣٥ - رَجُوجُ \*  
Gnetum (S). Gnèta (F).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة الغليقيات. منها  
البلاد الحارة. أنوعها نحو ١٥ منها الجنبات للمادة المارضة  
ومنها الشجيرات القزواء البقاء. أوراقها مسننة، متعابلة،  
بيضية للتصلب المسح. أزهارها مثلية التجميع أبلي الارتكاز  
اشهر أنوعها ثلاثة التالية.

١١٤٣٦ - رَجُوجُ جَمَاوُ  
Gnetum gnemon (S).  
Gnète de java (F).  
نوع من الرجرج الزراعي. أوراقه النامية مأكولة وبلورة  
كلية.

١١٤٣٧ - رَجُوجُ طَبِي  
Gnetum urens (S).  
Gnète rafraichissante (F).  
نوع من الرجرج الزراعي. بلورة مأكولة. يستخرج  
من ساقه عصارة لزجة مرطبة عديدة المنافع الطبية.

١١٤٣٨ - رَجُوجُ لَسِيْمِي  
Gnetum fusciculare (S).  
Gnète textile (F).  
نوع من الرجرج الزراعي الصناعي. يستخلص من ثمره  
اللياف صناعية نسجية.

١١٤٣٩ - رَجَمَكَة  
Réclapés, Reçu (F).  
Receipt, Received (E).  
عمر أو وصل تدون فيه بالتفصيل وأيسر البضائع التي  
صار استعمالها.

١١٤٤٠ - رَجَمِي  
Rétroactif (F). Retroactive (E).  
جار معلوم على الماضي.

١١٤٤١ - رَجَمِيَّة  
Rétroactivité (F).  
Retroactivity (E).  
هي ربيعة الأثر أي نقل أثر القانون أو الحكم أو أي  
عمل قانوني إلى الماضي.

١١٤٤٢ - رَجَمِيَّةُ الْقَرْط  
Rétroactivité de la condition (F). Retroactivity of  
condition (E).  
هي نقل أثر الشرط إلى يوم العقد القانوني فلذا حل الشرط  
المؤقت حدث أثره منذ يوم تحرير العقد وإذا كان الشرط  
فائضا اعتبر العقد كأن لم يكن قط.

١١٤٤٣ - رَجَلِي  
Pied (F). Foot (E).  
هي لقائمة وتسمى الحافر في الخيل والخف في الأبل والغلف  
في البقر والفسان.

١١٤٤٤ - رَجَلِي، رَجَلِيَّة  
Multitude, Troupe (F).  
Multitude, Troop (E).  
سرب أو جماعة الجراد وما أشبه، ج أربال.

١١٤٤٥ - رَجَلُ الْأَرْتَب  
هو نقل البر، أطلقه.

١١٤٤٦ - رَجَلُ الْأَسَد  
هو اللذان الجلي، أطلقه.

١١٤٤٧ - رَجَلُ الْإَوْد  
راج أئنة.

١١٤٤٨ - رَجُلُ الْجَبَارِ الْبَيْسَرِي  
Rigel Elgebar (F). Rigel (E).  
نجم نير من كوكبة الجبار أي الجزء. مركزة على القدم  
البيسري. ويسمى أيضاً رجل الجزء البيسري. يد من  
الأرض نحو ٦١٠ سنة ضوئية.

الانتشاب، جربه الكندية مهمة الفوض، شديدة  
الانصر. كائناته قلاعية، مؤثرة، ضمية التجميع. أنوعه  
نحو ٢٥ جميعها ملازمة أعرضها ربيعة الجذور وبيعة  
القطن.

١١٤٤٩ - رَبِيعَةُ الْجُدُور \*  
Septocylindrium radicolium (S).

نار مجهرى يركب جلود الانجبار المظلمة القلوية منها  
الفتح والكلز والبيون نيفنها ويسرع في ينسها.

١١٤٥٠ - رَبِيعَةُ الْقَطَن \*  
Septocylindrium areola (S).

نار مجهرى يركب أوراق القطن دون أن يؤذيها || مظهره  
الخارجي بلطح مسطوية طويلا نحو ١٠ م. لعن التصل  
على صفحت العليا. تبهر غشاء اللين ثم تتحول إلى السمرة  
ويبقى حل حالها ولونها حتى آخر جهدها.

١١٤٥١ - رَجَمَكَة، سَيْسَمُولُوجِيَّة  
Séismologie, Sismologie (F). Seismology (E).

الرجاجة أو السيسمولوجية علم يبحث في الزلازل والاضرابات  
الارضية.

١١٤٥٢ - رَجَمَاع  
Retour (F). Return (E).  
وقت الرجوع أو زمن الرجاء هو زمن رجوع العبد بعد  
نظامها.

١١٤٥٣ - رَجَمَكَة  
Stabulation (F). Sealing (E).  
الرجانة والرفين هي تربة الدواجن في المرائب والاصطبلات  
والمرح لا في المراعي.

١١٤٥٤ - رَجَمَان \*  
Madrépore (F). Madrepore (E).  
نوع من الرجانة، مهد عمار البلاد الحارة والاسوائية  
ركبته مسنة جمعية التركيب كثيرة الفروع والشعاب  
والانفاق.

١١٤٥٥ - رَجَمَانِيَّة \*  
Madréporaires (F).  
فئة من المرجانيات البحرية وهي حيوانات بحرية من صف  
المجمعات تتميز بأفرانها المصية المتماكة وبعناقها  
الكبيرة المشعبة التي تصنع كالشعاف.

١١٤٥٦ - رَجَمَانِي \*  
Madréporique (F).  
Madreporic (E).

لعت تمريلي يطلق على الشعاف والصفور البحرية  
الشرة والمشعبة كدائع الرجان.

١١٤٥٧ - رَجَمَانِيَّة \*  
Rajania (F).

جنس نباتات جنبية عارفة من فصيلة البهتودويات.  
أنوعها المعروفة ستة أصنافا أمريكية الوسطى والأنتيل.  
جلودها مسقوية. سوقها لينة ملتفة. أوراقها مسننة  
متعابلة قليلة التصل. أزهارها ثنائية المسكن. أزهارها  
مثلية التجميع، أبلي الارتكاز. ثمارها تغلف بعض  
الزور اللينة اللزجة اللزجة الجناح. عاتقها ديماسية لايبة  
مأكولة تستعمل استعمال الأنعام أي البطاطا الصينية.

١١٤٥٨ - رَجَمِيَّة  
رجب النخلة: بين نمحا دكائا تتعد عليه لصفها. ووضع  
الشوك حوطا لئلا يصل إليها اسد.

## ١١٤٦٠ - رجل القط المزمري

*Antennaria plantaginifolia* (S). Pied-de-chat à feuilles de plantain (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٤٠ سم. وراكها قليلة، مستطيلة، كسبة التواقي. أوراقها غنية، نصلها لساني الشكل خلي البشرة ثلاث الفلوع. رؤسها الزهرية بيض وغضر || أزهارها يسمر من نيسان الى تموز.

١١٤٦١ - رجل البقرة اطبل كالية المروج.

## ١١٤٦٢ - رجل المعزى، حشيشة المعزى

*Aegopodium podagraria* (S). *Aegopode podagraria*, *Egopode aux gouteux*, *Herbe aux gouteux*, *H. de St Gérard*, *Pied de chèvre* (F). *Gosswed*, *Bishop's weed* (E). *Gemeiner giersch*, *Podagrakaut* (D). *Egopodo podagraria* (I).

نبات حشبي يري طبي معمر من فصيلة الخيميات ينبت في الأماكن الظليلة، منافعه الطبية عديدة وبهية || ساقه غليظة جيواد تلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. أوراقه كبيرة، مركبة، سداسية، وريقاته ثلاثية التجميع، يهسية الشكل، مسنة النصل الباهت الخضار.

## ١١٤٦٣ - رجل قنطوروس

نجم نير من كوكبة قنطوروس.

١١٤٦٤ - رجلته هي البقلة الحسقاء، اطبلها.

## ١١٤٦٥ - رجلكتات

*Portulacaceae* (S). *Portulacacées* (F). *Portulacaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القنات، اجناسها وانواعها عديدة. اشهر نباتاتها الرجلية.

## ١١٤٦٦ - رجلتين

*Stabular* (F). *To stall* (E).

رجل ورجل اكدية : حبسها في رابضها على اللطف.

١١٤٦٧ - رجلتين هي الرجلية، راجسها.

١١٤٦٨ - رجلجوع هو الايلولة، اطبلها.

## ١١٤٦٩ - رجلجولة

*Coralliphila* (S). *Coralliphila* (F).

جنس حيوانات بحرية من الرجويات معديات الازبل وفصيلة الرجويات. انواعها المعروفة قليلة البد نحو سبعة. اعطتها بحار البلاد الحارة اغصها البحر الاخر. تميش لاصقة بدائع المرجان والبرجان || اصداها صغيرة حوشة شبه يهسية الشكل مقطوعة القاعدة تبدو كالجلب الومعة. اعقابها عازنة ومثللة.

## ١١٤٧٠ - رجلجوانيات

*Coralliphilidae* (S). *Coralliphilidae* (F).

فصيلة من الرجويات معديات الازبل. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة معظمها يعيش على بدائع البرجان والمرجان في بحار المناطق الحارة || اصداها خشن، حوشة، متباينة الاشكال للاخفاسية، قليلة القليلة، قصيرة الحارزة الصغيرة || اعرف اجناسها واشهرها الرجوة والسحيفة.

## ١١٤٤٩ - رجل الجبار البني

نجم نير من كوكبة الجبار مركزه على القدم البني. ويصير ايضاً رجل الجوزاء البني.

١١٤٥٠ - رجل الحشام هو لكجان الصلبي، اطبله.

## ١١٤٥١ - رجل النبة

*Arctopus* (S). *Oursin*, *Pied d'ours* (F). *Bears paw* (E). *Bärenfuss* (D). *Plè d'orso* (I).

نبات حشبي يري من الخيميات. ساقه متعصبة تنتهي بهية من الاوراق الكبيرة اللد يطواها الازهار الصيواني التجميع. أوراقه متعصبة كبيرة، نصلها طبي المسام، غاوش الصفة للهارية المنددة. أزهاره بيض.

١١٤٥٢ - رجل الذئب هي الخفرة، اطبلها.

١١٤٥٣ - رجل الصنقاء راجع غريق نجس.

## ١١٤٥٤ - رجل القربك المداد

هو الحضان المداد، اطبله.

١١٤٥٥ - رجل القبرة اطبل مائق الحدائق.

## ١١٤٥٦ - رجل القط، رجل المرأة أشتيكورية

*Antennaria* (S). *Antennaire*, *Pied-de-chat*, *Haplidule* (F). *Cat's-foot*, *Cat's-ear* (E). *Echterkatzenpfötchen*, *Chatza-dépli* (D). *Piede di gatto*, *Zamba di gatto* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المركبات الانيوبية الزهر. انواعها عديدة معظمها يري ويهسية زراعي زريفي. سيقها زبداء. أوراقها متعصبة، نصلها خلي الصلصة السفلى. أزهارها انبوبية لا لسين ط. قوحياتها صفراء. رؤسها بلون القناب || اعرف انواعها واشهرها الاربية النائية.

## ١١٤٥٧ - رجل القط الأمريكي

*Antennaria microphylla* (S). *Pied-de-chat microphylla* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ٢٠ سم. وراكها قصيرة كاسية التواقي، ساقها كثيفة الزغب اللد. أوراقها السفلى غنية التجميع خلية النصل. رؤسها الزهرية كثيرة العدد، نورية التجميع، يهفاء اللون || أزهارها يسمر من حزيران الى آب.

## ١١٤٥٨ - رجل القط الجبتي

*Antennaria alpina* (S). *Pied-de-chat alpestre* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو نحو ١٠ سم. وراكها دقيقة كاسية. أوراقها السفلى اعليجية سلمية تطول نحو ٣ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية الى الخضار الاخر. قناباتها مديدة الحافة المسنة || أزهارها يسمر من نيسان الى آب.

## ١١٤٥٩ - رجل القط الشائع

*Antennaria dioica* (S). *Pied-de-chat commun* (F).

نوع من رجل القط وهي عشبة تنمو من ١٠ الى ٤٠ سم. صفوها مديدة. ساقها متعصبة كثيفة الزغب اللدني. وراكها مستطيلة كاسية. أوراقها صغيرة تطول نحو ٢ سم. نصلها خلي البشرة. رؤسها الزهرية يهفاء اللون. او دية او قلبية || أزهارها يسمر من نيسان الى حزيران.



رجل القط الشائع



رجل المعزى

## ١١٤٧٦ - رُحْبِيَّات - مَعْتَرِي

Mellifera, Nectarifera (F). Melliferous (E).  
هو كل نبات من أي فصيلة كان سوت أزهاره رحيقاً  
تجبره النحل || ونباتات الرحاقة عديدة الخلقيا في  
(نبات رحيق).

Mérite (F). Méritis (E).

## ١١٤٧٧ - رُحْبَان

الباب الرسم عقب الولادة .

Séchoir à fruits (F).

Drying-room (E).

## ١١٤٧٨ - رُحْبَانَة

هو الموضع الذي تجفف فيه الثمار ، راجع جبرين .

## ١١٤٧٩ - رُحْبَانَة

الارض الواسعة السريعة النبات . ج رحاب .



رجوم ثنائي الشريط

Elope (S). Elope (F).

## ١١٤٨٠ - رُحْبَة

جنس سيات حبيطة سامة من فصيلة الرحيات . أنواعها  
المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع مناطق البلاد الاستوائية  
والحارة من افريقية الى الهند وأمريكا وأستراليا || أجسامها  
شبه اسطوانية الشكل ، مسطحة ، قليلة الفصانة ، لطيفة  
من ١٠٠ الى ١٤٠ سم. رؤوسها صغيرة ، بيضبة الشوكة.  
الأوليا ملوكة ، مظلمة مطوق . أطولها سوداء اللون تحويها  
خطوط بيضاء || اذرف أنواعها الرسة المرجانية Elope  
corallinus (S). ثوبها الى الحرة المرجانية السقاء  
المواج يعطوها أطواق سود .

Scolétes (F).

## ١١٤٨١ - رُحْل

لعت تعريفي يطلق على الجهات غير المستقرة في مكان  
مين واحد .

## ١١٤٨٢ - رُحْل

هو الانخفاض ، اطله .

Bât (F). Pack-saddle (E).

## ١١٤٨٣ - رُحْل ، قُتْب

مركب الدواب يختص عادة بالابل والبغال والحير .

Matrice, Uterus (F).

## ١١٤٨٤ - رُحْم

Womb, Uterus (E).  
جزء من أعضاء التناسل في الحيوانات العليا يدعى عضو  
الحمل يحصل بالهبل والفرج بواسطة قناة الرحم . وهو  
مضلي التركيب مبطن بشفا . غاملي وقلته الاحتفاظ  
بالريضة المنصبة التي تتحول الى جنين .

Hystericaceae (S).

## ١١٤٨٥ - رُحْمِيَّات

Hystericacées (F). Hystericacées (E).  
فصيلة البطور الرحية . أجسامها وأشواها كثيرة العدد  
مظلمة من البطور البحرية .

Protopterus (S).

## ١١٤٨٦ - رُحْشَاكَة

Protoptera (F). Protopterus (E).  
سكة نهوية وحيدة الجنس والنوع من رنودجات التنفس  
وفصيلة رنحاشيات. موطنها مستنقعات افريقية الاستوائية ||  
جسمها مستطيل الخيطيط يطول نحو ٧٥ سم. رأسها شبه  
خروطي الشكل . حيناها صيرتتان ماصتان . زعنفتها  
الظفرية مستطيلة ، قاطبة ، تتصل بالشرعية عند طرف  
الذيل . زعانفها الصدرية والحشوية عسبة ، مسطحة ،  
عذبة الشكل . ثوبها الى الشبهة السراء يطولها توشم

## ١١٤٧١ - رُحْبِيَّات \* Argiopides (S).

Argiopides (F). Argiopides (E).

فصيلة عناكب من رتبة الرتيلاوات . أجسامها وأشواها  
كبيرة البدن الذي يجاوز الألف || أطولها البلاد الحارة  
والمعتدة الحرارة من المالن القديم والجديد || أجسامها  
متباينة القده منها الصغيرة والوسلى والكبيرة جميعها ثنائية  
الرؤيا سداسية للشان بمجزة الشياش بقفات حادة  
حسنة نحو الداخل || أولياها مختلفة الألوان والزراركن .  
جميعها ناصبة كبيرة الشح . مكادها كروية كثار الرمان ،  
علوية القوة ، تحبها بين الحجازة وعلى النباتات العذلة  
اغصانها الشائكة .

Regain (F).

## ١١٤٧٢ - رُجْبِيَّات ، رُجْبَان

Second crop, New lease (E).

هو الكلاء الناتج من الحقة الثانية . وهو الأوراق الناتجة  
عن القروع كما في التبغ .

Pédicelle (F).

Pedical (E).

هو الزئاد الصغير حامل الزهرة . وهو أيضاً الملاقق القرمي  
المركب كما في التبغ .

Rhagium (S).

## ١١٤٧٤ - رُجْجُوم

Rhagie (F). Rhagium (E).

جنس حشرات من عذبات الاجنحة وفصيلة القرنيات .  
أنواعها المعروفة حة || أجسامها مسطحة القده ، أطولها  
تواضع من ١٦ الى ٢٦ سم. أولياها مختلفة الألوان يسلطها  
خل دقيق ضفير تكثر فيه الشبهة || تسرح في التبار .  
تظهر في أوائل الربيع وتبقى حتى أواسط الصيف . مرتها  
الانحلال الخرجية || يرقاتها صغيرة ، غليظة ، سمراء اللون ،  
تمتدش على الجلود اليابسة ان قائمة أو مضطوية واغصانها  
جلود التنوب والشرين والسرور والسنديان والكنستانه .

## ١١٤٧٥ - رُجْجُوم ثنائي الشريط

Rhagium bifasciatum (S). Rhagie bifasciá (F).

Rhagium bifasciatum (E).

حشرة خاضعة من فصيلة القرنيات ورتبة مفدمات الاجنحة .  
تأكل الاجراع والنباتات . غناشها تقتل من جميع اجزاء  
النبات . يرقاتها غاشية تركب جلود الانجار اليابسة  
ويجودها واضعائها || جسمها مستطيل القده يطول من ١٧  
الى ٢١ سم. ثوبها الى السمرة الخطية تشبه سمرة في الرأس  
والكوكيل وأعلى الظهران . غناها مجلجتان مبطن من البتج  
الحمر . رأسها شبه مربع الجرم . حيناها كبريتان .  
زبانها كبريان ، مسطقتان الى الرواء . ظهرها مستطير  
المؤخر الثلاث . غناها كفيقتا الحمل القصير . أصاها  
الجلجلة البعل الظاهرة || جبلها ثلاثي الحمل . تظهر الحشرة  
الجلجلة في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف . تمتع  
تسرح في التبار . تشابه بعد ظهورها بثلاثة أسابيع . تمتع  
المكن في صدور الجلود وشقوقها || البقرة عند بلوغها  
الادراك تمام تطول نحو ٢٢ سم. جسمها حدي التركيب ،  
مستطيل الجرم ، عادم الرؤوب ، حشفي اللون ، اشقر  
المواج ، اسمر الرأس ، يمتد الحبل الدقيق || طور  
الاكامل الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما يتغذى في طور  
الترية ضمن صلبة من المواد النباتية والعشوية المعجنة  
بالرأل .



رحة



رحاشة

Rhinanthus major (S). - رَحْمَاءٌ كَبِيرٌ \*  
Rhinanthus à grandes fleurs (F). Rattle (E). Grasse klapper (D). Corona di re (I).

نوع من الرخاخ السريع النمو يكثر بين الزروع ليضربها ويقتسمها اللدء. أزهاره كبيرة القد صفراء اللون || أبادته واجبة ثم يستأهل أحد العواشب الحشرية .

Hippoglossus (S). - رَحْمَاشٌ \*  
Fletan (F). Halibut (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من المسافات وقصيلة المفلطحات. أنواعه المعروفة عديدة أصنافها بحار البلاد الباردة والمتتلة الحرارة || جميعها كبيرة القد ، أهليجية الشكل ، دقيقة الصف الصغير . زعانفها الظهرية والبطنية قاسية تمتد من المتي إلى الذنب . زعانفها الشرجية مقطوعة الأطراف || أحرر أنواعه وأشهرها الرخاشة الميولولة .

١١٤٩٩ - رَحْمَاشَةٌ مَبْدُولَةٌ \*  
Hippoglossus vulgaris (S). Fletan commun, Fletan halibut (F). Common Halibut (E).

سمكة من الرخاش . طولها نحو ٢٠٠ سم. نوبها إلى السمرة الخفيفة يعلوها موج أصفر تشوبه بعض الخضرة || أصنافها بحار البلاد الباردة والمتسرفة نحو المعتدلة . ويوجدوا في البحر المتوسط محصور بعض المناطق أخضها الممتدة من جبل طارق إلى بحار اليونان والبحر الأسود || سمها لهذا العلم مرغوب فيه .

١١٥٠٠ - رَحْمَاءٌ ، صَرْمَرٌ (E). Marble (F). Marble  
جسم حجري صلب تعريفه الكيماوي مركب كربونات الكالسيوم المتبلور. ألوانه عديدة يكثر فيها الأبيض الحليبي. وهو من الأحجار التي استخدمها الإنسان في البناء والتمتعت منذ أقدم العصور .

١١٥٠١ - رَحْمَاشِي  
الرخاشي والرخاشة ضرب من الخلفة غبراء الخضرة لما زهرة بيضاء نقيه ولها عرق أبيض تحفره الحمر بوجواهرها والويش كله يأكل ذلك العرق خللاته وطيبه (أبو حنيفة) || وقيل لبث تجمده السامة ، وهي بقلة غبراء تصرب إلى البيضاء وهي حلو لما أصل أبيض كأنه المنقر ، إذا انتزع صلب لبناً (اللسان) .

١١٥٠٢ - رَحْمَاشَةٌ ، هي الإجازة ، أطليا .

١١٥٠٣ - رَحْمَاشَةٌ نَقْلٌ (E). Pernit (F). Passavant  
جواز ينقل الكحول أو بعض المستحضرات والفلات .

١١٥٠٤ - رَحْمِيفٌ (E). Soft (F). Mou  
نمت وصفي . الفلين خشب ريش لين .

١١٥٠٥ - رَحْمِيفٌ الرضف والرضفة : الزبد الرقيق .

١١٥٠٦ - رَحْمِلٌ ، رَحْمَلٌ ، رَحْمَلَةٌ (E). Agnelle (F). Ewe lamb (E).  
الأنثى من ولد الفان . ج. رمال .

١١٥٠٧ - رَحْمَاءٌ ، عَقَابٌ رَحْمَاءٌ ، أَخْوَقٌ  
Halietus leucocapillus (S). Pygargus leucocapillus (E). Alge à tête blanche (F). White headed eagle (E).  
طائر من الشياط ينتمي إلى عمارة العقبان وقصيلة الصقريات.

أسد || تعيش في الاممال حتى الضحل ثم تنقش في السلي وتحتنك إلى أن تمتد المياه فحضر المستنق || لحبها متوسط الصف ، مأكول .

١١٤٨٧ - رَحْمَاشِيَّاتٌ \*  
Protoceparidae, Lapidoseiridae (S). Lapidoseiridae (F). Protoceparidae, Lapidoseiridae (E).

نصيلة اسماك نهرية من مزدوجيات التنفس . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها من اسماك منقح المناطق الاستوائية والحارة || أحرر اجناسها وأشهرها الرخاشة والثغافنة .

١١٤٨٨ - رَحْمِيفَةٌ (E). Cabestan (F). Capetan (E).  
آلة لرفع الاثقال العظيمة .

١١٤٨٩ - رَحْمِيٌّ \*  
Meule (F). Millstone (E).  
حجر الطمن . ج. أرءاء ورشي وأرعية . وهي من الوسائل البدائية للمستخدمة لطحن الحبوب أو جرشها . تتركب الحجر الاسفل منها وقد يطور حوله الحجر المألوي .  
١١٤٩٠ - رَحْمِيٌّ هي الاسباع ، اطليه .

١١٤٩١ - رَحْمِيفَاتٌ \*  
Elapidae (S). Elapidae (E).

نصيلة حيات عبيقة من امبيات الاغناد . أنواعها المعروفة نحو ٧٠ تنضم إلى بضعة اجناس . أصنافها البلاد الاستوائية والحارة . اجسامها مستعيلة قريبة الشبه بالاحتاش . رؤوسها صغيرة شبه بيضة الثورن . ألوانها ملونة يكثر فيها التطويق وبعضها يحمل من خطين إلى خمسة خطوط قاسية || جميع أنواعها سامة وبعضها شديد الاذى || أشهر اجناسها واسمها الرسة والبنفا .

١١٤٩٢ - رَحْمِيفٌ ، مَعْمَرٌ الزَهْرُ (E). Nectar  
غصارة سكرية لزجة مختلفة التركيب تفرزها غدد خاصة في الزهر ليحبسها النحل .

١١٤٩٣ - رَحْمٌ \*  
Aepyornis (S). Rock (F).  
طائر صليب عظم القد كان في جزائر الهند وانقرض وقد مر على بعض رؤته في منفسكر . يقال ان طول الرفة يراوح من ٣٠ إلى ٤٢ سم .

١١٤٩٤ - رَحْمَاءٌ (E). Vent faible (F). Weak wind (E).  
الريح اللينة التي تتفادح الصاليج .

١١٤٩٥ - رَحْمَاءٌ (F). Rhinanthus (S). Rhinanthus (F).  
جنس نباتات مشبية برية هشة من نصيلة الخنازيريات . أنواعه قليلة . سوقها منتصبية لينة . أوراقها كملحة حاشنة متعاقبة . نصلها سناني الصفصمة ، سنن الحافة . أزهارها فردية ، أبيلية الاكروكاز ، صفراء اللون غالباً .

١١٤٩٦ - رَحْمَاءٌ عَرَبُ الدَبِكِ \*  
Rhinanthus crista-galli (S). Rhinante crête-de-coq, Cocrête, Croquette (F). Cock's-comb, Rattle grass, Yellow rattle (E). Klapper, Gelberackkerkraut (D). Cauterelle, Pidocchio dei prati (I).

نوع من الرخاخ الوردي يكثر بين الزروع فيسبح من النباتات الضارة لانه يسبق الزروع في ازدهار النامسر اللذائبة . يقضى عليه باستأهل أسد العواشب .



رشي



رخاخ عرب الدبك



رخاخ كبير



رخاشة مبدولة



رخاء

موطنه العالم يحوي جميع القنارات، يكثر في أمريكا. طوله نحو ٨٠ سم. والآنق ٩٠ سم. ثوبه إلى البصرة للسفاد. بطنه مشط بالابيض. رأسه وعينه وذنبه بيض. منقاره وخطابه صفر. قوته الاسماك والطيور والقناريس والامام كالكتم والماعز وما اشبه.

١١٥٠٨ - رَحْمَة \* شَوْحَة  
Pernopterus (S). Alimoche, Vautour d'Egypte, Poule des Pharaons (F). Egyptian vulture, Pharaoh's hen (E). طائر من الكوراس ووحيد الجنبس والنوع ينتمي إلى فصيلة السرايات وهو اسفر النور جنة واربعها انتشاراً. طوله نحو ٦٠ سم. وبسطه ١٦٠. ثوبه ابيض البلى. رأسه ازغب الريش الاصفر يبدو كالاسلم. عنقه اخضر اصفر. مشرقه اسمر. ريشه وردي اللون تلوها ماجة وبدا. قوائم سفله سود، مناكبه وصامية، اناجره طمل. عينه قزوينية. موطنه بلاد حوض البحر المتوسط والبحر الاحمر والخليج الفارسي. نظامه الحياتي جماعي. اسرابه كثيرة العدد تعيش قرب المدن والساكن وتراقب القنوليل قوته الجيف والقيامة. يصيد القناريس والصنابير عندما يصفه الجرح. ينش منه في صعدور الصغور الثالثة. اناده ينفث ٣ نغبات تحضنها نحو ٣٠ بيضاً. اما كنية الفرخة فأم جمران رداءة وأم صبيبة وأم قيس وأم كير.

#### ١١٥٠٩ - رَحْوَنَات، لَيْسَات

Malacostracae, Mollusques (F). Malacoza (E). شعبة حيوانات تشمل ذوات الصلغتين والملميات والرأسيات.

#### ١١٥١٠ - رَحْمِيلَان \* Phaleris cristata (S). Parakeet auklet (E).

طائر ووحيد الجنبس والنوع من جماعة البهائم فضيلة الطيريات. اصطناعه المناطق القطبية الاسيوية والامريكية. ينزح في الشتاء نحو الصين وكوريا وكندا. ملتحمة الجناحي جماعي. جماعته اسراب لا يوصى لها عدد. قوته الحشرات والحمام والفاصيص والاسماك الصغيرة والقشريات. جسمه صغير القد يطول نحو ٢٥ سم. منقاره صغير الحجم، احمر اللون، شبه غرغوبلي الشكل. حلقه عينه عسلية اللون. جناحه قصيران، ذلقتان، لاسفان. ذنبه غرغوبلي الشكل، شديد القصير. ريشه دقيقتان. ثوبه العلوي إلى البصرة المرحقة بالابيض تلوها زركشة يضاء. ثوبه السفلي إلى الريدة الزرقاء المالح. ذوده ابيض. رأسه متعرج بقرعة صغيرة من الريش اللينق الناعم. كسلة عينه يضاء اللون تمتد حتى العين. ريشه إلى البصرة الزرقاء. الآنق ابيض قدماً من الذكر وتحتل بنفس القلوب. موطنه كل نقرة على حضور المهادج او فيها. الآنق تحضن بتناوبة الذكر ويضع واحدة اصغر من بيضة المهادج. القرحم يمتد نحو اربعة اسابيع. الصغير يمدوم على سطح الميم بيه التفاف ياسبور.

#### ١١٥١١ - رَحْمِيم \* Ptilonorynchus violaceus (S). Ptilonorynchus satiné (F). Ptilonorynchus violaceus (E).

طائر من فصيلة الرخميمات. موطنه استراليا. يألف الادغال والارواح الكثيفة الانجار. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٣٠ سم. ثوب الذكر إلى الزرقاء السوداء المسطحة المالح. جناحه وذنبه إلى السواد القمعي. حلقه عينه زرقاء اما اطرافها فاحمر. منقاره ازرق اللون، اصفر الملقط. رجلاه إلى الحمرة. ظهر الاثنى اخضر اللون.

جناحاه وذنباه إلى البصرة المافية. بطنه إلى الاخضر الاصفر يطول توشم حلالي الشكل عند اطراف الريش. قوته الكبار لا يتركها أبداً كانت. واعصها اللين والدرق والمشمش والوز والبرقال ثم البزور وبيض الحشرات. يذنب منه في الانجار الداسية ويقت بالقرب منه، على يده بيضة انمار. مسرماً يزنه بمختلف الاشياء الملوثة تنسبه مدة من القصبان المحبوبة تملأها الاثنى كلما دعت الحاجة الطبيعية إلى الكرم. اما الاشياء الملوثة التي يزغرف بها المسرح فهي الريش الجميلة والاصناف الملوثة وبيض الحصى وكسر الزجاج ... الآنق تحضن من مريث إلى ثلاث مرات في الحبل وتضع في كل مرة من بيضتين إلى ثلاث يبيضات ترعها بتناوبة الذكر نحو ١٥ بيضاً.

#### ١١٥١٢ - رَحْمِيمَة \* Ptilonorynchus (S). Ptilonorynchus (E).

فصيلة طير من الجلوم. اجتماعها والاعمال المعروفة قليلة العدد. اصطناعها بعض مناطق استراليا وفيه الجاهدة. اجسامها متوسطة القد، جميلة الالوان المتطاحة. تتميز بالمسارح المزينة والمزخرفة التي تقيها بالقرب من عشائها. اعرف انواعها واشهرها الرخم.

#### ١١٥١٤ - رَد \* Remedant (F). Produce (E).

الرذ هو الانتاج أو الرعي. يقال شجرة كثيرة الرذ.

#### ١١٥١٥ - رَد \* Récusation (F). Challenge (E).

حق ينص عنه القانون وبين اسبابه يمنع احد المتخاصمين اللجوء إلى طلب رد القاضي ورد الحكم ورد الخير ورد الشهود.

#### ١١٥١٦ - رَد \* إِزْجَاع Resttution

احادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل ارتكاب البصرة.

#### ١١٥١٧ - رَد \* المَيْح Rédhibition (F).

هو نسخ البيع الذي يميزه القانون في حالات خاصة عددة قولها حين غني يجعل المبيع غير قابل للاستعمال أو يحد من استعماله.

#### ١١٥١٨ - رَدَك Annulement of sale (E).

هو نسخ البيع الذي يميزه القانون في حالات خاصة عددة قولها حين غني يجعل المبيع غير قابل للاستعمال أو يحد من استعماله.

#### ١١٥١٩ - رَدَامَة \* Cynonycteris (S).

جنس حيوانات من فصيلة البطاطيات. انواعها ٩ ثلاثة منها اسيرة وستة افريقية. جميعها ثائرة، متوسطة القد قصرة للذنب، سوية اللون، تعيش جماعات صغيرة متفرقة وراوح عددها من ١٠ إلى ٦٠. مسرحتها بيده المرى قابله يطير نحو ٥٠ كم. اقليةها فحج الارباب. ينتم من اسية إلى افريقية. اشهر انواعها ما يتبع.

#### ١١٥٢٠ - رَدَامَة حَنْطَلَة \* Cynonycteris straminea (S). Cynonycteris pallid (F).

ردامة صغيرة القد، طوله نحو ١٥ سم. وبسطه ٤٥. كوكها حنكي اللون، بطنها زاهر الليل، رأسها وعنقها وظهورها إلى البصرة. مؤنثها يمتد من صغار إلى الحليمة والفاويز. تألف الانجار الحرجية. قوتها الكبار.



رخة



رخيلان



رخم

الثانة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها بحار البلاد المظلة الحرارة . جميع انواعها تسره في المياه العذبة حيث تنمك نحو ١٥ اسبوعاً ثم تموت الى البحر الى البحر انوعها الرذانة .

١١٥٢٧ - رَدَج (F). To grind (E).  
الردج الصيرير بالاحتكاك المتبادل بين قطعتين .

١١٥٢٨ - رَدَج  
الردج : ما يخرج من بطن المهر او السخلة قبل الأكل .  
مثل التي من الصبي .

١١٥٢٩ - رَدَجِي Marchand ambulant de légumes  
هو البقال المتنقل .

١١٥٣٠ - رَدْع Bourbe (F). Mud (E).  
وسل المائع والاهوار .

١١٥٣١ - رَدَف Tréou (F). Tribe (E).  
الردف في تصنيف الحيوان يأتي تحت الفصيلة وفوق الهامة والجلس .

١١٥٣٢ - رَدَف، كَمَل، قَطَن Croupe (F).  
حيز القاذية وغيرها .

١١٥٣٣ - رَدَف، ذَكَب Daneb  
الردف او القذف نجم نير من كوكبة الدجاجة . مركزه حل القذف . يبعد عن الارض نحو ٤٠٠ سنة ضوئية .

١١٥٣٤ - رَدْفِيل أَزْرَق النَّحْس \* Rhodophyllus lividus (S).  
Rhodophyllus livide (F).  
نظر جحلي شديد الازرق وقد يمتد من فصيلة الدفاريديات . يوجد في المراعي الجبلية . يعيش على التلال . ساقه ضخمة مستعدة الارتفاع ، فبراه اللون . لكته كبيرة القد . للنبوة الشكل ، حليقة ، لونها الى الزرق الفاتحة الى السواد . قطرها نحو ١٢ سم . اطراسها ليكنية اللون .

١١٥٣٥ - رَدَم Terressement (F).  
Earth work, Embankment (E).  
ما يوضع في المنخفض من تراب وصخور لرفع مستواه .

١١٥٣٦ - رَدَسِي \* Rudéral (F). Rudéral (E).  
نمت تمريفي يطلق على كل نبات يعيش بين الاتعاش والردم .

١١٥٣٧ - رَدَن ، رَدَن Rayonne (F).  
Rayon, Artificial silk (E).  
سند نسجي يشق من البوليوز ، يستعمل استعمال الحرير ويصنع الحرير التباقي .

١١٥٣٨ - رَدَن، حَكَل Dévidage (F).  
Winding, Reeling off (E).  
هو استخلاص خيوط الشرائق أو المردان وما اشبه .

١١٥٣٩ - رَدَن Rldé (F). Wrinkled (E).  
نمت وصي يطلق على كل ما هو مضفر وتعدد من الجلود والقشور والجلود وما شاكلها .

## ١١٥٢١ - رَدَّاسَة صَحْرَاء

Cynonycteris amplexicauda (S). Cynonycteris fauve (F).  
رداسة متوسطة القد ، طولها نحو ٢٠ سم . قوتها الى الصحراء . موطنها يمتد من الخليج الفارسي الى الهند والهند الصينية والفلبين || تألف الكهوف القريبة من الشواطئ . يسرعها من الفسق الى القنبر . قوتها النار والرخويات البحرية .

## ١١٥٢٢ - رَدَّاسَة مَصْرِيَّة

Cynonycteris egyptiacus (S). Cynonycteris d'Egypte (F).  
رداسة صغيرة القد ، مسطيلة البنية . طولها نحو ١٦ سم وبسطها ١٠٠ سم . قوتها الى الريدة الثبراء ، ظهرها اغم من بطنها . جوانبها صفراء للونج || موطنها مصر وجولوها من الحبشة الى سورية . تألف الاشجار والكهوف والبيوت الخربة || قوتها النار .

١١٥٢٣ - رَدَاغ Terrain bourbeux (F).  
Muddy ground (E).  
تربة كثرت فيها نسبة الرودغ .

## ١١٥٢٤ - رَدَّالَة السِّنْدِيَّان

Mythinna acetosellae (S).  
Mythinna acetosellae (F). Mythinna acetosellae (E).  
حشرة من فصيلة الشقيبات ورؤية حشرقيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار . مرتبها غاشلة قوتها اوراق السنديان || جسمها معتدل القد بطول نحو ١٨ م . بطنها نحو ٤٢ م . رأسها صغير الحجم . صينها كيرقان . زباناها خيطيان . مرتبها مسطيل . جوشها احمر اللون صتاي اللونج . يطلى الى الحشرة الخنطية اللونج || وثنائها الامنيان الى الحشرة الخنطية بطولها ثلاث بقع متعابية لامتداوية الحجم . وثنائها الخلفيان الى الخنطية الاكف || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتمتد المكان على الصفحات السفلى من اتصال الاوراق || السرعة تطول نحو ٤٥ م . جسمها اسطواني الشكل . مشدود القشار . ثوبا الى الطحلة الرداء يطولها رقعة يضاء وسط ثبجي اسود وعتان جانبيتان اسفراوان . ملاتي سكرها الى السواد النحسي . رأسها ورواجها سود . منها الى الطحلة الغبراء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتعق في التربة ضمن جلابب من العين .



رَدَّالَة السِّنْدِيَّان



رَدَّالَة



رَدْفِيل أَزْرَق النَّحْس

١١٥٢٥ - رَدَّالَة \* Osmerus eperlanus (S).  
Eperlan (F). Smelt, Sparling (E).

سمكة بحرية نهريّة من فصيلة الردانيات . اعطائها معظم بحار المناطق المعتدلة الحرارة . تقترب من الشطوط في فصل الربيع وتقتل الاخوار والابهار حيث تسره ثم تموت الى البحر || جسمها شبه اعطليبي الشكل بطول من ٢٥ الى ٣٠ م . رأسها مخروطي الشكل . لها ولس تشق الذي ينحني خلف مؤخرة العين . زعنفتها الذيلية ثاقبة . ظهرها الى الخلفار الالاس البحري اللونج ايملاها وبطنها الى الريدة الفضية || لحمها مأكول ، متوسط الصفت .

١١٥٢٦ - رَدَّالِيَّات \* Osmeridae (S).  
Osmeridae (F). Osmeridae (E).

فصيلة اسماك بحرية نهريّة من كائلات النظام مفتوحات



## ١١٥٤٠ - رَدْسَة \*

*Rhodanthe* (S).  
*Rhodanthe* (F).

فروعها منتصبه فناء ، أوراقها سنانية ، طولها نحو ٧ سم .  
وتفرض ٤ ، نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي البروق ،  
ذاتي الزوايا الأخير . أزهارها غبراء اللون . ثمارها إلى  
السواد اللامع || أزهارها يستمر من نيسان إلى تموز .

١١٥٤٥ - رَدْلِي الصِين \*  
*Cortaria terminalis* (S).  
*Redoul à fleurs terminales* (F).

جنية سمرة ، رفة ، صغيرة القدر ، طولها نحو ٧ سم . ساقها  
فروعها وفانها زياد اللحاء . أوراقها بيضيه  
الشكل ، نصلها خالي البروق ، جامد السطح ، ذرب  
الزوايا الأخير ، مدبب المنصه ، خلى الصلصة السفلى .  
أزهارها تاجية صفراء اللون . ثمارها إلى الصفرة الزاهية .  
أزهارها يستمر طوال شهر حزيران .

١١٥٤٦ - رَدْلِي الهند \*  
*Cortaria nepalensis* (S).  
*Redoul du Népal* (F).

جنية سبروتية سمرة ، طولها نحو ثلاثة أمتار . ساقها فروع  
أوراقها بيضيه الشكل . نصلها جامد الصلصة .  
خالي البروق ، مدبب المنصه || أزهارها وثمارها حنطية  
اللون . أزهارها يستمر طوال شهر أيار .

١١٥٤٧ - رَدْلِي اليابان \*  
*Cortaria japonica* (S).  
*Redoul du Japon* (F).

جنية سبروتية سمرة طولها نحو ١٠٠ سم . ساقها فروع  
أوراقها حلزونية مستطيلة ذرية . أزهارها وريدية اللون .  
ثمارها تمر بمختلف مشح الآخر إلى أن تنتهي ، منه الأدراك ،  
بالحمرة السوداء اللامع || أزهارها يستمر من نيسان إلى  
أيار .

١١٥٤٨ - رَدْلِيَات \*  
*Cortariaceae* (S).  
*Cortariaceae* (F). *Cortariaceae* (E).

فصلية نباتية من ذوات القلتين تحمل جسا واحداً جميع  
بعض الأنواع البرية والبريتية .

١١٥٤٩ - رَدِي \*  
*Repris*  
حالة كل نبات بعد غرسه أي رده إلى التربة لحاجة  
دوره الحياتية .

١١٥٥٠ - رَدِيَة ، اَلْثَرْتَرِيَة \*  
*Alternaria*

جنس فطور مجهرية من مارة زهرجاتية بفصلية الحياتية .  
كتائله جلمونية الشكل ، حليته أو حبيباته الطرف  
مكيفة من حدة بويقات مستديرة أو مرقطة الجوانب ،  
حليته الوسط ، مستطيلة القطب || أنثاه الملقحة عديدة  
أمرها ما يتبع .

١١٥٥١ - رَدِيَة البَاذَنْجَانِيَّات \* ، رَدِيَة  
الْبَطَاطَا

*Alternaria solani*, *Al. deud*, *Macrosporium solani*  
(S). *Alternaria des solanées*, *Taches noires des*  
*feuilles de pomme de terre* (F). *Early blight of potato*  
(E). *Dörrfleckenkrankheit der Karoffeln* (D).

فطر مجهرى يظلل حل أوراق بعض النباتات الباذنجانية  
أخصها البطاطا والبندورة || مظهره الحامض ، حل البطاطا ،  
يتبع كثيرة سمراء اللون ، تركب نصل الأوراق . تبو  
ستيرة الحجم ثم تتسع فيبلغ قطرها نحو ١٠ سم . نسب  
ذليل التصل ثم يسهل له وهو إلى البندورة يتبع لا تميز  
الشكل والحجم ، سمراء اللون ، ربادية اللون ، عديدة  
المحالات المتتالية الفقراء الخشار . قطرها براوح من ١٠  
إلى ١٠ سم . تركب التصل فتقويه وقد تصيب الثمار عند



ردس



ردول آي الورق



ردول اليابان



ردية الباذنجانيات

## ١١٥٤١ - رَدْلِيَة مَشْكُونَة \*

*Reduvius personatus* (S). *Réduve masqué* (F).

حشرة قانصة من فصيلة الردفيات . جسمها متوسط القدر ،  
مبشر الحلب ، يطول نحو ١٧ م . رأسها شبه بلوطي الشكل ،  
متكاثف الحلب . عظمها شديد النشط . عينها صغيرتان .  
زبالها مستطيلتان ، مهدبان . حنقها انبوي . يحلبها  
مهدب القسم الامامي ، مقعر الخلفي . حنطتها مزوانية  
صغيرة . علوانها لاسف . قوائمها مجنحة الاضداد ، كثيفة  
الحلب || ثمرها إلى البني يطول مواج براوح من الحنطى إلى  
الامر || ممرهاا دجوي . تمحص دم الحشرات والذباب  
والحمام . ريقاتها قانصة ، قوتها قوت الحشرة الجملانة .

١١٥٤٢ - رَدْلِيَّات \*  
*Reduviidae* (S). *Reduviidae* (F). *Reduviidae*, *Assassin bugs* (E).  
*Rauwanzen* (D).

فصلية حشرات نالمة من رتبة غمظانات الاجنحة وطبقة  
نصلهاا الجناح . اسماها واجناسها وانواعها كثيرة العدد ،  
تتجاوز الالاف ، منتشرة في معظم اقطار العالم اخصها  
الاقليم المنصورة نحو الحارة || اجسامها صغيرة أو غمظنة .  
رؤوسها صغيرة . اعينها واسعة . انطباعها نقطة مجوزة  
بجاة ذرية تتركب منها بعض السموم المفردة . عيونها جالية ،  
صغيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية مستطيلة ، ثلاثية  
الفصل . قوائمها نطيفة ، والزواج الامامي حدة بعض  
الاجناس مجهر ، كما في البرصية ، للاعتصاف || جميعها  
قانصة تقضي على الكثير من الحشرات الفسادة وينها البعوض  
والسكيت والذباب والبق .. ممرهاا دجوي ينه من  
غريب الشمس إلى الفجر .

١١٥٤٣ - رَدْلِي ، عَشِيَّة الدَّيَّاهِين \*  
*Cortaria* (S). *عَشِيَّة الدَّيَّاهِين* (F).

جنس نباتات حمرة من فصيلة الرديريات . اقلامه ٨  
سوطها فروعها فناء . أوراقها منقطة ، متعاقبة ، سنانية الشكل  
نصلها جلدي الصلصة ، ثلاثي أو خالي البروق || أزهارها  
عتقوية التجميع . أزهارها صغيرة القدر عائدة التبرج ،  
غشائية الفصل والاسدية ، غشائية البتات والاكرايل المنبسط  
التجميع الشكل || جميع اعضاءه النباتية من فروع دقيقة  
وانقان وغلاف واوراق وأزهار تحوى مادة قلوية حسالية  
تسمى كوريارين (*Cortiarins*) تستعمل في دغ الحلود  
القاعرة الثنية || اعرف أنوعها واشهرها ما يلي .

١١٥٤٤ - رَدْلِي آسِي الورق \* ، عَشِيَّة الدَّيَّاهِين  
الْأَسِيَّة الْوَرَقِي

*Cortaria myrsifolia* (S).  
*Redoul à feuilles de myrte* Corroyère, *Herbe aux*  
*caneurs* (F). *Myrtle leaved cancer's tree*, *Myrtle*  
*leaved sumach* (E). *Myrtenblättriger gerberstrauch*  
(D). *Cortaria a foglie di mirto* (I).

جنية سبروتية مبذولة سمرة غزيرة الحواد الباذنجانية طول  
من ٣٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها فروع ربادية التصلع ،

أدراكها فضرح البشرة وتغور في اللب الذي ينمل ويغفن .  
يكافح حته ظهوره أما يتغص ثنابت بورو الحلول  
فوق الصفر .

Cladode

١١٥٥٧ - رَدَّةٌ

ورقة كاذبة أو شبه ورقة تكون في سوق بعض النباتات  
كما في الصنوبر . ج رداثن .

Radiola (S).

١١٥٥٨ - رَدَّةٌ

Radiola (F). Radiola (E).

جنس نباتات عشبية حولية بريمة من فصيلة الكتانية .  
أنواعها المبرقة قليلة السند منها جبل حوض البحر  
الابيض المتوسط || سوطها قراء متشعبة . أوراقها متعاقبة ،  
شبه بيضية النصال . أزهارها علقي التجميع . أزهارها  
صغيرة يضاء اللون || أشهر أنواعها الرديولة الكتانية  
(R. linoides) . منها الطوي بين جبلي صين وكينكية .  
تؤمرها صيني .

Pluie fine (F). Thin rain (E).

١١٥٥٩ - رَدَاذٌ

هو المطر الضئيل . قال الاصمعي اعف المطر واضفه  
الثلج ثم الرذاذ .

Hygrométrie (F). Hygrometry (E). رَدَاكَةٌ

١١٥٦٠ - رَدَاكَةٌ

علم يبحث في قياس الرطوبة الجوية .

Balançier (F).

١١٥٦١ - رَدَانٌ

Balançer, Poisers (E).

الوزان ويعدى رقاص التوازن ، عضو دقيق صغير ، شبه  
دبوس الشكل ، ينتهب في البرساده أي في الحلقة الصدرية  
الثالثة ، حته الحشرات من ذوات الجناحين . رها وزانان  
أين وأيسر تصممها الحشرة في توبيه طيراتها وتسدده .

Hyposmétric (F). Hypsometry (E). رَدَاكَةٌ

١١٥٦٢ - رَدَاكَةٌ

علم تحديد الارتفاعات .

Atelopodidae (S).

١١٥٦٣ - رَدَائِيَّاتٌ

Atelopodidae (F). Atelopodidae (E).

فصيلة حيوانات دواء قاذبة من لة الخديعيات وبرتية  
السوطيات وبرتية البتراوات أي دمجات اللب || أجناسها  
وأنواعها عديدة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية . جسمها  
صغيرة القفد تشبه عسلاوة سطح ضلعي قوسها الجسدي  
في مركز ثلاثها || أشهر أجناسها الرزان والرندودة  
والهندوديات والكلوكا ...

١١٥٦٤ - رَدَّحٌ ، رَدَّاحٌ ، رَدَّحٌ ، رَدَّحٌ

Echassage, Pissalage (F). Fropping (E).

غرز المرازح والسمايك بجانب النباتات لدم سوطها أو  
نومها .

Rangée d'arbres (F).

١١٥٦٥ - رَدَدَقٌ

Tidy of trees (E). الصف أو السطر من الأشجار المشجرة .

Plantation en lignes (F).

١١٥٦٦ - رَدَدَكَةٌ

Planting in ranges (F).

هي الزراعة بالسطر ترتكز على الإبعاد المتساوية والخطوط  
المتوازية .

١١٥٥٢ - رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ

Alternaria citri (S). Black rot des oranges (F).

فطر مجهرى يصيب البرتقال في مجامع المدركة فيغفن المروق  
والفرايين الداخلية التي تسبب اخراج الكثرة ثم امراها  
وتصلبها إلى أن يقضي عليها الففن من الداخل فتتشقق  
أو تحنط وتيس || أسرارها زبيدة لا تستوجب العناية  
لأنها لا تتجاوز ٣ أو ٥ ٪ .

١١٥٥٣ - رَدِيَّةُ التَّبَعِ

Alternaria tenuis, Al. longipes (S). Maladie du plant de tabac (F).

فطر مجهرى يتطفل على عدة نباتات اغصها التبغ عندما  
يكون في المثلث || مظهره الخارجي ذيبل يحل بالأوراق  
والسوق ينغص ظهور اوغص خلية سراء اللون تركب السوق  
والأوراق قطعها وتعطفها بمادة حنطية لزجة تغص عليها  
وتتسبب || يكافح أولا بتطهير البذار قبل استعماله في  
مواقع كانت موبوءة . وتطهير يكون أما بتغص البذور  
مدة ١٥ دقيقة في نترات النحاس الحلول ٪ ١ أو بتغصها  
بالملاح الزئبق . منهم من استعمل بكتريزات النحاس  
بمعدل غرام واحد لكل كيلو زر || ثانياً بالقتل وحرق  
الشقق الموصية وتغير أو تفصع للشقق الباقية بأحد  
الطواير المركزة على التخلص أو على بعض المواد الكيماوية  
الثابتة الاستعمال حالياً .

١١٥٥٤ - رَدِيَّةُ الشَّامِ

Alternaria nigrescens (S).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الشام يقضي عليها .  
مظهره الخارجي يقع فسيحة إلى قياسية الشكل تركب الأوراق  
فتلويها وتغص على نحو اللبنة . وقد يصيب الثمار فيشتمها  
بقص خلية رديئة اللون يطغى سوط زئبق تفرح الكشور  
وتصلبها || ينشط كثيراً في المواقع الرطبة الحارة || يكافح  
عند ظهوره باستعمال المركب التالي :

سلفات النحاس ١٠٠٠ غرام  
كلس ١٥٠٠ غرام  
كلورور الامونيوم ٣٥٠ غرام  
ماء ١٠٠٠ لتر

١١٥٥٥ - رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ

Alternaria dianthi (S).

فطر مجهرى يتطفل على القرنفل قرب زين أزهاره فيؤذي .  
مظهره الخارجي يقع زبديئة مستديرة أو بيضية الشكل تركب  
الأوراق والسوق ثم تنتشر فيبلغ قطرها نحو ١٠ م وطولها  
نحو ١٥ م . تسبب بياس وأصدام البشرة وانفلاق الطبقة  
الاحدية التي ينشأها القطر || يكافح حته ظهور الموسم  
بأسال أكسيكلورير النحاس الحلول ٪ ١ .

١١٥٥٦ - رَدِيَّةُ الْمَلْفُونِ

Alternaria oleracea, Al. brassicae (S).

فطر مجهرى يتطفل على أوراق الملفوف وغيره من النباتات  
الزراعية والبرية كالفصل والشتور والخرقة والقريل ...  
مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون ، حنطية  
الحالة ، سفراء أشكل تركب الأوراق الباقية الخارجية  
فصلها ويستمر إذاها على الملفوف المغطى || يكافح  
بأستعمال أسال بورو الحلول ٪ ١ كما يحسن حفظ الملفوف



رَدِيَّةُ الْبُرْتَقَالِ



رَدِيَّةُ التَّبَعِ



رَدِيَّةُ الشَّامِ



رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ (١)



رَدِيَّةُ الْقُرْنَلِ (٢)



رَدِيَّةُ الْمَلْفُونِ

## ١١٥٦٧ - زُرْع

Hygrometricité, Hygroscopicité (F). Hygrometry, Hygroscopicity (E).

قابلة الجسم الطبيعية لاختبار الرطوبة وهي أيضاً نسبة الرطوبة للغرور استيعابها.

## ١١٥٦٨ - وَزْم، حَزْم

Botzage, Emballage (F). Tying up in bundles, Packing (E).

هو شد الشيء بعد جمعه وضمه. وهو تغليف الشيء بعد صفه بترتيب.

## ١١٥٦٩ - وَزْمَة، حُمْمَة، وَزِم

Botte (F). Bunch, Bundle (E).

ما حزم من البقل.

## ١١٥٧٠ - وَزْنَامَة زُرَاعِيَّة

هي التقويم الزراعي، اطله.

## ١١٥٧١ - وَزْنَة

Mare (F). Pool (E).

هي المستنقع الصغير مفيض الماء رقيقه. ج. زران.

## ١١٥٧٢ - زُرْوَان

Chloridium (S).

جنس طيور مجهرية من الدخيات وفصيلة اللخيات. مشبه غزير المادة. جبره الكهنية مشبهه. كئالده مستطيلة أو كروية || أنزعه حديدية مظلمة رية تشبه على الاختشاب اليابسة ومنها طفيلية تركيب الأوراق. أمزها زروان الخرز.

## ١١٥٧٣ - زُرْوَان المَوَز

Chloridium musca (S).

ظفر مجهرى ركب أوراق اللوز فيوش التسل في بلغم الأرم يهش البقع الصغيرة المستديرة السراة اللوز ثم يتكاثر وتنتشر الفس كامل التسل الذي يابل ويبيض.

يكتاثر عند ظهوره بامتثال سائل يورجو الحلقى من ٨٠ الى ١٥٠ ٪.

## ١١٥٧٤ - زُرْوَد

Rhysodes (S).

Rhysode (F). Rhysodes (E).

جنس حشرات من مفدمات الاجنحة وفصيلة الرزوديات. أنزوله المروفة نحو ٣٠ مشطرة في مظهر اصفاق البلاد الحارة من المالين القديم والجديد. تعيش في الغابات وفي البراري المظلة. جميعها مفترسة || أجسامها مستطيلة اشكل و حديدية الصلصات العليا، طول من ٨ الى ١٢ م. وزودية صغيرة. ميوها ناشرة، قرنها الاستشعارية قنادية مركبة من ١١ فصلة. قوائمها قصيرة. الحادها لاسفة، ضعدة، مقطوعة الاطراف. ألوانها شائعة الاوان تكثر فيها السمرة الكستنية والسمرة والجلاوية والسمرة الزرقونية.

## ١١٥٧٥ - زُرْوَدِيَّات

Rhysodidae (S).

Rhysodidae (F). Rhysodidae (E).

فصيلة حشرات من مفدمات الاجنحة. أجسامها وأنزوها المروفة قليلة العدد اصفاها معظم مناطق البلاد الحارة من المالين القديم والجديد || جميع أجناسها مفترسة، صغيرة القد، ضلعية التأثير، قائمة الاطواب || أشهر أجناسها الرزود.

## ١١٥٧٦ - زُرْبَر

Rhexia (S).

Rhexe, Quadratea (F). Rhexia, Meadow beauty (E).

Rhede, Ankerblume (D). Ressa (I).

جنس نباتات عشبية ريشية من فصيلة الميكانيات. أنزوله

عديدة بعضها ترشبي والآخر بري وسبلي. سوقها متعصبة مريكة الفلوع. أوراقها متعاقبة قصيرة النشق، نصلها اطليسي الشكل، بارز الحروق، خلى البشرة. أنزوها متكوني أو نووي التجميع، هامى الارتكاز. أنزوها خالية البتلات، ألوانها من الاحمر الى الاخضر.

## ١١٥٧٧ - زُرْبَع

Hydrophile (S). Hydrophil (E).

الزريع والرف لله واحد. تمت ترشبي يطلق على النباتات الشفرة الى الماء وحل الاشياء التي تنصص للماء.

## ١١٥٧٨ - زُرْبِكَل

Rafial

عاشوب، يرتكز على كلورات الصيدا، ينقص على جميع النباتات الضارة بما فيها التنبليات || يستعمل محلولاً ٢ ٪ بمعدل لتر ونصف اللتر المتر المربع الواحد.

## ١١٥٧٩ - زُرْن

Digitaria sanguinalis (S).

Digitaria sanguine (F).

نبات عشبي جلجوري بري معمر من أجنات التنبليات. يكثر في الأترية الرطبة والخروية. وهو مبلق في جميع البلاد الحارة والمعتدلة. يعتبر من النباتات الضارة الكثيرة الأذى.

## ١١٥٨٠ - زُرْس

Besa

ج. رفس.

## ١١٥٨١ - زُرْس

Mineral (F). Ore (E).

الزرس هو المعدن. ج. زرسا.

## ١١٥٨٢ - زُرْسَة نَسَكِيَّة البَقْع

Rhizophagus bipustulatus (S).

Rhizophage bipunctatus, R. bipustulid (F).

Rhizophagus bipustulatus (E).

حشرة وائمة وقائصة من فصيلة الرسايات ودية مفدمات الاجنحة. تألف الإحراج. غشائتها تموش على رصق الأزارع وظلمها. يرقاتها تموش في سراديب الحشرات الخاشية ساحة وادها لاقراسها || جسمها صغير القد بطول من ٣ الى ٤ م. ثوبها الى السواد الفضي معلق في مؤخر كل حمة بقية صغيرة حمراء. وأنها مستطلة الجسم. ميوها صغيرتان. زياناها صغيرتان، صفيا الاطراف. ظفرهاا مقطوع الطرف اللاصق. أوساها خماسية الشكل متد الاانان دباعيتها في الزوج الحلقى عند الذكور || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجلاوية في أوائل الربيع وتموش حتى أوائل الصيف. تسرح في أبنار. تسافه بعد ظهورها بأسبوعين. تمتع المكان تحت القشور وبينها || البرقة عند بلوغها الإدراك أقام طول نحو ٦ م. جسمها شبه مدرفي الشكل، سداسي الرواجب، الخبز، إمبر الفواصل والرأس وظرف التشرج || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع وينتهي في آخر نفق ويته البرقة ضمن صليجة شايوة أفتاد المركب الشفايا الخشبية والقضوية المسجورة بالريال.

١١٥٨٣ - زُرْسَائِيَّات

Rhizophagidae (S).

Rhizophagidae (F). Rhizophagidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائصة من غشيات الاجنحة. أجناسها وأنزوها المروفة قليلة العدد مشطرة في مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش على الأزارع وتحت ماء الانجار. يرقاتها قانصة تسمى وراه البطرشيات ||

## ١١٥٨٤ - زُرْسَائِيَّات

Rhizophagidae (S).

Rhizophagidae (F). Rhizophagidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائصة من غشيات الاجنحة. أجناسها وأنزوها المروفة قليلة العدد مشطرة في مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تعيش على الأزارع وتحت ماء الانجار. يرقاتها قانصة تسمى وراه البطرشيات ||



زور



زور



زور



رساة ثنائية البقع

القوم. أنواعها المعروفة عديدة معظمها من اسماك بحار البلاد المعتدلة الحرارة. سرسها اساطم الاغواط والمجاذع و اجسامها شبه اهلبيجية الشكل ، مبططة الجرم ، تطول من ٤٥ الى ٧٠ سم. زعانفها الظهرية والبطنية منفصلة لا تتصل بالذيلية. اثنوبيا تختلط مع الانواع لكنها لا تظهر من الرقعة || لحومها جيدة الصنف ، مستحبة العلم || اشهر انواعها وأعرها الثلاثة التالية :

#### ١١٥٨٩ - رُسَامَة مَسْكَانِيَّة ٥

*Platessa cynoglossus* (S). *Pile cynoglossae* (F).  
*Cynoglossum plaice* (E).

مسكة من الرغاف. اساطنها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي. سرسها اساطم الاغواط || جسمها مثالي الشكل ، قريب الشبه بلسان الكلب ، يطول نحو ٥٠ سم. ثوبيا الى الزبدية الخطية تعلوها رقعة مفسوخة التوزيع تتخللها بقع قاتمة || لحمها فاخر الصنف.

#### ١١٥٩٠ - رُسَامَة شَالِيَّة ٥

*Platessa vulgaris*, *Pleuronectes platessa* (S).  
*Pile franche*, *Carrelet* (F). *Common plaice* (E).

مسكة من الرغاف. اساطنها البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال. سرسها اساطم الاغواط ولتقاف و اجسمها شبه اهلبيجي الشكل ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٧٠ سم. حياتها على الصلصة البني. ثوبيا في الصلصة البني الى الخضار الخطي المزج يعطو تجميع اسمر وتبيج يرتقالي. صفحاتها اليسرى الى السفلى تراوح من الزبدية الغبراء الى الخطي الاخر المزج. وتتميز بصف من الثوب الصغيرة يمتد من العينين الى الزعنفة الصدرية || لحمها جيد الصنف ، مغروبو فيه .

#### ١١٥٩١ - رُسَامَة صَغِيرَة الرَأْس ٥

*Platessa microcephala* (S). *Pile microcephale* (F).  
*Microcephalus plaice* (E).

مسكة من الرغاف. اساطنها المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط. سرسها اساطم الاغواط والمجاذع و اجسمها شبه اهلبيجي الشوزن ، مبطط الجرم ، يطول نحو ٤٠ سم. تتميز بصغر الرأس. ثوبيا الى الخضار الخطي الاسمر المزج تعلوه رقعة يبراه لاسفوخة التوزيع || لحمها جيد الصنف ، مغروبو فيه .

#### ١١٥٩٢ - رُسَامَات ٥

*Attacidae*, *Saturnidae* (S). *Attacidae*, *Saturnidae* (E).  
نفسية حشرات من سرشيات الاجنسة. اجناسها المعروفة نحو ١٠٠ وانواعها نحو ١٢٠٠ منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها كبيرة القند او موشوخة. اثنوبيا متباينة الالوان الجسدية. قرونها الاستعمارية مشطية مزبوجة عند الذكور ، مسنة عند الاناث. ملاحسا الفككية قصيرة وبراشفها كذلك. عينيا بسيطة. قرونها الامامية عادمة الغالب. ارباخ ذكرها وسيدة المغلة || يرقاقها خاضعة، جرداء القشار ، زياه الحسام المستطيلة الملب. رباط خادراتها شرجي السلك تتدل به .

#### ١١٥٩٣ - رُسَامَة الْإِحْصَاء ٥

*Grand paon de nuit* (F). رابح ابر الوشي الليلي .

#### ١١٥٩٤ - رُسَامَة ٥

*Croquis* (F). *First sketch* (E). هي الرسم الاعادي .

اجسامها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل ، مستعرضة الرزوس. قرونها الاستعمارية صغيرة مركبة من ١١ فصلة. كليلها واغدادها مستطيلة. جرانها نشطة. ارباقها خلية المغل عند الاناث ، رباعيتها في الزوج الخلفي عند الذكور || اشهر اجناسها الرسامة .

#### ١١٥٨٨ - رُسَامَس ٥

*Rhizostoma* (S).  
*Rhizostoma* (F). *Rhizostoma* (E).  
جنس حيوانات بحرية من قراصات البحر الموصيات في علم الرساميات. انواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم. جميعها كبيرة القند ، فكية التركيب ، قلنسوة المغلة الشفوية ، عادة الالاف الحاررية . ملاحها الفكية رباعية الازواج ، وفكية الشكل ، محجمة الاطراف || تتوهم على سطح الماء. اثنوبيا تترالج بين الابيض والاسمر والازرق. اعداب شفطها شالكة تلهم الجله ان لاسه. وينها انواع تغلف برشاش ناظط يلدح كثرار النار .

اشهر انواعه :

*Rhizostoma cuvieri* (S)

رُسَامَة الْاَطْلَس

*Rhizostoma pulmo* (S)

رُسَامَة الْمُطَوِّص

*Rhizostomidae* (S).

١١٥٨٥ - رُسَامَاتِيَّات ٥

*Rhizostomidae* (F). *Rhizostomidae* (E).

فصيلة مدوس من قراصات البحر. اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اشهر اجناسها الراس .

#### ١١٥٨٦ - رُسَام ٥

*Heptanchus* (S).  
*Heptanchus* (F). *Heptanchus* (E).  
جنس اسماك بحرية سرلوة مفترسة من فصيلة الجلوليات وثية الاخلوق || انواعها المعروفة ثلاثة اساطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها كبيرة القند. قريية الفكية بقرقوش. اجسامها وشية. دروسها شبه مغروطة الشكل. انواعها سفلية الارتكاز ، متاخرة من المقاطع. اسكانها الخيشوية فلدج سباحة الازواج || اشهر انواعها الرسامة السراء .

#### ١١٥٨٧ - رُسَامَة سَمَرَك ٥

*Heptanchus cinereus* (S).  
*Heptanche cendré*, *H. gris*, *Cendré*, *Mouge gris*, *Parion* (F). *Gray Heptanchus* (E).

مسكة بحرية سرلوة مفترسة من الرساج. اساطنها معظم اقطاع البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اهلبيجية البنية. سرسها الاغواط والمجاذع. اخلقاتها شرسة لكنها تبسط عن الانسان || جسمها رشي الشكل يطول من ٣٠٠ الى ٣٥٠ سم. مسكها متوسط الخشونة ، قليل الثوبيل المبيضة. ثوبيا الى الزبدية تعلوه مابة زرقاء مع اقترابه من ثوبيل الظهور ويغير ويغير عند الجبل. رأسها مغروطة الشكل. لها سفلى الارتكاز. شفطها معتدل الانفراج. اسنانها كبيرة ، ذرية. عيناها مستديرتان. ناشرتان. فوطها الجفني يحتل مركز الزعنفة الخشوية || تصاد من ابل مسكها وزيتها واساطنها. لحمها كامن الصنف .

#### ١١٥٨٨ - رُسَام ٥

*Platessa* (S).  
*Pile* (F). *Plaice* (E).

جنس اسماك بحرية يبرضة من الملساوات وفصيلة جانبيات



رُسَام



رُسَامَة مَرَاه



رُسَامَة شَالِيَّة

وفصيلة الرسات. انواعها المعروفة قليلة العدد اصطلحاً معظم بحار العالم. معظم انواعها يعيش على القيع ويقسم الآخر على الحث الآخر || اصطلحاً صغيرة لاجل شكله الذي يختلف مع النوع. معطها بعض القواعد ، خاصي الدورة الحلقوية اوسباحتها .

#### ١١٦٠١ - رَسَمِيَّةُ الْغَلَبِ

*Proctemma guttata* (F). *Proctemma des bois* (F).  
حشرة خاضعة من فصيلة البتيديات ودية مخلفات الاجنحة. جسمها شبه المثلثي الشكل بطول نحو ١٢ م. || رأسها صغير ، أزرق اللون. غطها معتل القه ، طليق ، ميتا صغيرتان ، تلتزتان ، زباناها دقيقان ، مستطيلان . كوسلها أزرق اللون ، على الجانب الدقيق . حجبها صغيرة ، سوداء . حجبها صغيرةتان . ظهورها لينة ، أحر اللون تلوها رقة بيضاء ومبراة . يلبها الى اسف السراء المواجه . قوامها حر ، كثيفة الحب || تألف الثافات . مرتها الاشباب البيرة .



رَسَان لَرِيْق

#### ١١٦٠٢ - رَسِيْلِيَّةُ

*Aristella* (S). *Aristella* (F).  
نبات عشبي يري رموي حولي من التيجليات يكثر بين الزروع وفي الارض المصاة .



رَسَم

#### ١١٦٠٣ - رَسَمُ

*Paturon* (F). *Pastorn* (E).  
جزء قائمة الفرس بين الحطب والأفرة .

#### ١١٦٠٤ - رَسَمُ

*Taras* (F). *Tarus* (E).  
جزء من ريش الخاتر والحشرة يقع بين اساق والغالب .

#### ١١٦٠٥ - رَسَكَسْ

*Rascasse blanche* (F).  
سمكة بحرية كدس كروب احسن ، اطبا .

#### ١١٦٠٦ - رَسَكَسْ أَحْمَرُ

*Rascasse rouge* (F).  
سمكة بحرية كدس جلاع ربي ، اطبا .

#### ١١٦٠٧ - رَسَكَسْ أَسْمَرُ

*Rascasse brune* (F).  
سمكة بحرية كدس جلاع رموي ، اطبا .

#### ١١٦٠٨ - رَسَلُ وَرُؤُوسُهُ

*Hormones*  
مواد عضوية قهرزا يفس اعضاء الجسم الحيواني فتقثر في سائر الاضداد التي تنتقل اليها بواسطة الدم || وهي في النباتات مواد عضوية تقتر في الثمر البطولي والشمري . ولرسل هو الحلب ، اطبا .

#### ١١٦٠٩ - رَسَمُ

*Lever d'un plan* (F).  
*To make a plan* (E).  
وضع غطط الشيء .

#### ١١٦١٠ - رَسَمُ

*Droit* (F). *Right* (E).  
نقطة تحديدية تطلق بالمسئ الخالي من المرافرة غير المرافرة أو غير للفرقة . وهي تستعمل في صيغ عديدة لأخصها :

*Droit de licence* رسم الاجازة  
*Droit de coponacemation* رسم الاستاذك  
*Droit de posta* رسم البريد  
*Droit de transmission* رسم التوصيل  
*Droit de transcription* رسم التسجيل  
*Droit d'enregistrement* رسم التسجيل  
*Droit de douane* رسم الجمر



رَسَم

#### ١١٥٩٥ - رَسَانٌ ، أَمْلُورُ

*Ophurus* (S). *Ophurus* (F). *Ophurus* (E).

جنس اسماك بحرية يوزع من مفتحات المثانة وفصيلة الرسانيات. انواعها المعروفة خمسة ، اصطلحاً بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة منها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي والمحيط الهادي || جميعها انقلبية الشكل ، مستطيلة الجسم المحيط . جلودها عادية السهف . رؤوسها اسطوانية . اعظامها ذقة . اخدائها كبيرة . اسنانها كثيرة العدد ، صغيرة الحجم ، ذرية || احرف انولها واشهرها رسان البرق .

#### ١١٥٩٦ - رَسَانُ الْبَرَقِ \* ، بَرَكِيلُ الْبَحْرِ

*Ophurus serpens* (S). *Ophurus serpens* (F). *Ophurus serpent* (F).

سمكة بحرية يوزع من الزمان . اصطلحاً البحر الابيض المتوسط . تكثر من اسماك المهادس والثقات الجيدة القور || جسمها ضيق مستطيل يبدو كأنه انبوي الشكل . طولها من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . جلدها ملس البشرة ، حاد السهف . رؤوسها ثنائي اللون ، ظهرها وبياناتها الى الصفرة المظلمة يعلوها موجاح سطلي ، يلبها الى البياض الفضي التني الموجاح . رؤوسها اميق غضاباً من ظهرها وتتقل بالاسود وهو اسفني الشكل ، ذلق اسفل المقرن الحاد . زعنفتها الصدرية صغيرة ، شائعة ، مقدافية الشكل ، وها زعنفتان على وسمري . الزعنفة الظهرية خط شديد السرة ، قليل المرض الذي لا يتجاوز ٥ م . يمتد من اوائل الظهر الى طرف الذنب . يقابله خط مائل طولي وعرضي وغضابها يمدى الزعنفة الشرجية ، يمتد من قاعدة المق الى طرف الذنب . اما الزعنفات الحوضية والذيلية فلا وجود لها || جلدها كامن الصفت قل من يرغب فيه .

#### ١١٥٩٧ - رَسَانِيَّاتٌ

*Ophuriidae* (S). *Ophuriidae* (F). *Ophuriidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية يوزع من القطبوات مفتحات المثانة . انواعها المعروفة عشرة تجتمع الى جنسين الرسان والشليف || اصطلحاً بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . معطها من اسماك الجلاج . سرسها الثقات الجيدة القور || اجسامها مستطيلة منقوشة . جلودها مائلة ، عادية السهف . رؤوسها اسطوانية . يقابلهما ذقة مستطيلة . زعنفتها الظهرية والشرجية قليلة العرض تمتد حتى اطراف الذنب . زعنفتها الحوضية والذيلية متصلة || لحومها غسولة الصفت أو كاضعة قل من يرغب فيها .

#### ١١٥٩٨ - رَسَبٌ

*Sédiment* (F). *Sediment, Deposit* (E).

الرسب هكر السوائل واغلامها عندما تستقر في القاع .

#### ١١٥٩٩ - رَسَمٌ

*Arum arizarum*, *Arizarum vulgare* (S). *Gouté à capuchon* (F). *Friar's cow* (E). *Kappenzahrwurz*, *Kohzahrwur* (D). *Arizzaro*, *Gillico* (I).

نبات عشبي ثديي مفر من سبط الفرسيات وفصيلة القلقانيات . يسلته صفولية بيضه الشكل . اوراقه سنالية وشرناه اوسوي الخوف يعلو من ٢٠ الى ٥٠ سم .

#### ١١٦٠٠ - رَسَمَةٌ

*Rissois* (S). *Rissois* (F). *Rissois* (E).

جلس سوزانات بحرية من الرضويات مغليات الاربل

**Rissolidae (S). رَسِيَّات ١١٦١٩**  
**Rissolidés (F). Rissolidae (E).**  
 فصيلة ديديات بحرية من الرنغويات مديات الرجل  
 أمانيات الخياشيم . اجناسها وأنواعها المعروفة قليلة العدد  
 مبرزة في منظر بحار العالم || اصداؤها صغيرة اللد ، بطيئة ،  
 تمش على التنبوت البحرية اخصها الخناوات || اعرف  
 اجناسها واشهرها الرسة .

**Epigone (F). Epigone (E). رُسيَّكة ١١٦٢٠**  
 الرسيكة مذادة الاجينة عند الطالب والكدييات .

**Sipunculus (S). Siponice (F). رُسيَّع ١١٦٢١**  
 جنس ديدان بحرية من فصيلة الرسييات . انواعها المعروفة  
 عديدة منتشرة في منظر بحار العالم . اجسامها شبه اسطوانية  
 الشكل تطول من ٨ الى ٢٥ سم . وهي سرعة عادمة السمك  
 والمناخس . افواهها مستطيلة ، مخروطية ، جمحة ||  
 اعرف انواعها واشهرها الرسيع الامشط .

**Sipunculus nudus (S). Siponice nu (F). رُسيَّع امشط ١١٦٢٢**  
 نوع من الرسيع . يعيش في جميع بحار البلاد المتحدة الحرارة .  
 يتكرر وجوده في البسر الابيض المنحط . طوله نحو ١٦ سم .  
 ثوبه الى الشقشة السمراء الموج .

**Sipunculidae (S). رُسيَّعيات ١١٦٢٣**  
**Sipunculidés (F). Sipunculidae (E).**  
 فصيلة ديدان بحرية من الجفريات . اجناسها وأنواعها  
 عديدة منتشرة في جميع بحار العالم || اشهر اجناسها الرسيع .

**Métacarse (F). Metatarsus (E). رُسيَّع ١١٦٢٤**  
 هو في الحشرات فصلة الرسيع الاول .

**Equisse (F). رُسيَّمة ١١٦٢٥**  
**Sketch, Rough (E).**  
 الرسمة الرسم الاعدادي او التخطيط الاعدادي او المسودة .

**Bassinage (F). Sprinkling (E). رُسيَّع ١١٦٢٦**  
 هو الاسقاء بالرفاذ كما بالرشة .

**Faon (F). Fawn (E). رُشَاء، رَشَاء ١١٦٢٧**  
 ولد الطيئة الذي قد تحرك ورشي . ج ارشاء .

**Tige rampante des cucurbitacées (F). Creeping stem of cucurbitaceous (E). رُشَاء ١١٦٢٨**  
 حبل اي ساق نباتات الفصيلة القرعية . ج ارشية . يقال  
 ارشية البطيخ والتملين والحنتل .

**رُشَاء ١١٦٢٩**  
 الرشاء مجموعة كواكب كثيرة صغار من برج الحوت .  
 وهي على صورة السمكة يقال لها بطن الحوت . وفي سرها  
 كوكب نير يدعى عقد الحليتين ينزل القمر آخر ليلة  
 من الشهر .

**Droit de tonnage رسم الحمولة**  
**Droit de sortie رسم الخروج**  
**Droit d'entrée رسم الدخول**  
**Droit d'octroi رسم الدخولة**  
**Droit de timbre رسم النسخة**  
**Droit de quai رسم الرصيف**  
**Droit de garantie رسم الضمان**  
**Droit de navigation رسم الملاحة**  
**Droit ad valorem رسم بحسب السعر**  
**Droit gradué رسم تدريجي**  
**Droit progressif رسم تصاعدي**  
**Droit fixe رسم ثابت**  
**Droit de passeport رسم جواز السفر**  
**Droit au comptant رسم فوري**  
**Droit constaté رسم محقق**  
**Droit proportionnel رسم نسبي**  
**Droit de circulation رسم نقل البضائع**  
**Droit de mutation رسم نقل الملكية**



رسمتور تدريجي

**Eristura (S). رَسْمُور ١١٦١١**  
**Eristura (F). Eristura (E).**  
 جنس طير من كليات القدم وفصيلة البليات . انواعه  
 المعروفة ستة . جميعها مستطيلة الجسم ، مخروطية الذنب  
 المتحد الحنج ، قصبة السبق والمناقاد المستدير الطرف .  
 شكلها بين الناق والفسافس . اثوابها متباينة الالوان المزينة  
 والبيجة || اعرف انواعه واشهرها الرسمتور التدريجي .

**Eristura leucocephala (S). رَسْمُور كُدُرُجي ١١٦١٢**  
**Eristura leucocephala, Canard faucon, C. culvris (F). Pintail duck (E).**

نوع من الرسمتور . اطناها تمتد من اواسط القارة الاسيوية  
 الى اطراف اوروبية اجنوبية والشرقية يحوي جبراتها وانهارها  
 كل سنة في شعابه وايابه المصيف والمشتي || جسمه كبير  
 اللد . ثوبه الى الصبغة الصفراء المجلدة بالاسود والاشفق  
 والافير . راسه مستدل الجرم ، ابيض اللون تطوي بقجة  
 سوداء . متفاده حنطي اللون ، اسود القاطعة . ورجلاه الى  
 الصفار الزيتي || الانثى تبيض من ٨ الى ١٥ بيضات  
 تحضنها نحو اربعة اسابيع بينا الذكر يؤمن لها الغذاء .



رسيع امشط

**١١٦١٣ - رَسْمَكَة هي التائيل ، راجه .**  
**١١٦١٤ - رُسُو هو الأوطى ، راجه .**  
**١١٦١٥ - رُسُوبِي**

**Sédimentaire (F). Sedimentary (E).**  
 تمت تعريفه يطلق على ما هو مركب من رسوب .

**Stoicism (F). Stoicism (E). رُسُوبِيَّة ١١٦١٦**  
 الرسوبية او فلسفة زينون ، ملهب فلسفي يقول بنبات  
 الجنان وببشة الخلق والعدم .

**١١٦١٧ - رَسْمُور الفَيْث هو الزرقاق ، اطليه .**  
**١١٦١٨ - رُسِيَّات**  
 سيط من فصيلة القلقاسيات ، اشهر اجناسه الرسة .  
**Arées (F).**

## ١١٦٣٠ - رَشَاءٌ

قيل فيها : هجرة لسمو فوق القامة ورفها كورق المروح ولا ثمرة لها ولا يأكلها شيء . وقيل أيضاً : حشبة تشبه الزنفرة وهي مثل الجنبه ولها قضبان كثيرة البقد وهي مرة جداً شديدة الخضرة لزجة تبت بالقيام منسطة على الأرض ورفها لطيفة معدة والناس يطبخونها وهي غير بقلة تبت بنبج . ج رشأ ورشأ .

## ١١٦٣١ - رَشَاحٌ

مادة فعالة توجد في بعض النباتات الطبية ، استعملها بسبب بعض الافراتازات المائلة من مرقعة او مدرة البول او مسهلة .

## ١١٦٣٢ - رَشَادٌ \* ، حَرْفٌ

Lepidium sativum, Nasturtium (S). Cresson alénois, Passerage cultivé, Nasitor, Cressonnette (F). Gartenkresse, Tongue-grass (E). Gartenkresse, Kresse (D). Carconallo, Crescione, Agresto (I). بقلة حولية من فصيلة الصليبيات . اورائها حريفة مأكولة لا تخلو من الفوائد الصحية ، ترطب في الأتربة القليلة والمتوسطة الاندماج الممكن سقايتها كلما دعت الحاجة .

## ١١٦٣٣ - رَشَادُ الْبَحْرِ

هو الفصيلة ، اطليا .

## ١١٦٣٤ - رَشَادُ بَرْيٍ ، رَشَاءٌ

هو حرف الماء ، اطليه .

## ١١٦٣٥ - رَشَاشٌ ، مَطْفَرَةٌ

Jet d'eau (F). Waterspout (E). ثقب أو جهاز يطر من الماء .

## ١١٦٣٦ - رَشَاشَةٌ \*

Aspergillum (S). Aspergille, Arrosoir (F). Aspergillum (E). جلس حوليات بحرية من الرضويات فضيحية التناجيم وفصيلة المتشويات || أنواعها القادرة المتحصرة قويس في بيضان الطبقة التالية . اما الانواع الماصرة فأصلها بحار البلاد الحارة . تعيش في رمال الشواطئ المغمورة بالماء وتنفور فيها محوياً ضمن البوب كلسي المادة ينتهي بفشاء مستدير الشكل حديد الثوب الفتيقة كتفرب المرثة .

## ١١٦٣٧ - رَشَائِكَةٌ \*

Hydrocyon (S). سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من ملتويات الثلاثة فضيلة المرقنات . موطنها الأبحار الاثريفة انحصا النيل والقيصر . طولها يراوح من ٨٠ الى ١٠٠ سم . ظهورها اخضر اللون . بطنها ووجوانها فضية . لحمها لذيق الطعم . لكنها كثيرة السمك .

## ١١٦٣٨ - رَشَيشَةٌ

Coque de la noix de coco (F). Shell of cocco-nut (E). قشرة الترابيل افرغت من لبها ويندفع بها .

## ١١٦٣٩ - رَشِشٌ ، مَصْلُوبٌ ، تَشْرُفٌ ، لَشْفٌ ، لَشْجٌ ، رَشَلٌ

Suintement (F). Oozing, Sweating (E). هو الماء ينضخ بقله من الجوامع الجامع .

## ١١٦٤٠ - رَشْدِيَّةٌ

هي القلقبان ، اطليه .

## ١١٦٤١ - رَشْكٌ

Bélier (F). الرشك دويبة من العقارب تدعى عقرب اكه . اطليه .

## ١١٦٤٢ - رَشْمٌ

اطل ما يظهر من اللبت .

## ١١٦٤٣ - رَشُونَةٌ \*

Commensalisme (F). Commensalism (E). حالة العلاقات الحية التي تعيش وتتغذى مع غيرها .

## ١١٦٤٤ - رَشِيجٌ \*

Actinolema (S). Actinoleme (F). جنس اشباح حولية برية من فصيلة الهيميات . انواعه المعروفة قليلة العدد منها بعض اصقاع الشرق الاذل || سطها فرام تملو من ٤٥ الى ٧٥ سم . اورائها متعاقبة . السفلى شافية التصال معادة للتسكين . العليا ربيعية الشكل ، ثلاثية الاناياب . ازهارها سبوانية التجميع ، تاجي الارتكاز . ازهارها صغيرة اللد لها الى الصغار الباحت .

## ١١٦٤٥ - رَشِيكَةٌ

هي الايريه ، اطليا .

## ١١٦٤٦ - رَشِمٌ

هو الجرشية ، اطليا .

## ١١٦٤٧ - رَشْمٌ ، رَشَمٌ ، رَشْمٌ

Damage (F). Ramming (E). طَبْ هو رص القرب او طيه وقد يتم بواسطة اللساة او للساعة او المطبة .

## ١١٦٤٨ - رَشْمُ الْبَضَالِجِ

Arrimage (F). Stowage (E). ايداع البضائع وستلها في حبر السفينة .

## ١١٦٤٩ - رَشَادٌ \*

Tityra (S). Tityra Bécarde (F). Tityra (E). جنس طير من الجوارم مليات التأثير وفصيلة القطنيات . انواعه المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في مختلف مناطق امريكا الجنوبية . تألف الثنايات ويقيم على قفز الاشجار تترصد الحشرات لارتقامها || اجسامها ربة طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . اوانها مختلفة الالوان تكثر فيها النقطة الذهبية والسواد والياض . تتميز بتناجيمها الفضلية وبأذنانها المقعرة || قوتها الحشرات على اختلاف انواعها وبعض الثمار النعينة البرية .

## ١١٦٥٠ - رَصَاصٌ

Ploab (F). Lead (E). معدن متجانس اللون ، قليل الوزن ، شديد اللبونة ، سريع التآكل في الهواء الرطب . رمزه (Pb) ) قلته النروي ١١٦٣٥ ، وزنه الاتني ٢٠٦,٩١ ، ينصهر في ٣٢٤ °س . ويغل بعد الاحرار بين ١٦٠٠ و ١٨٠٠ °س . وهو لا يذوب سراً قياً في الطبقة الاندما . عاماته الطبيعية عديدة الاشكال والتركيب تعرف بالمالجيه . اهم البلاد المنتجة لغامات الرلايات الفضة والمكسيك واستراليا وكندا || هو كثير الاستعمال الصناعي اما بجنس من اسلحه على الصمة الملة لانها سامة .

## ١١٦٥١ - رَصَاصِيَّاتٌ

Plombaginacous (S). Plombaginacous (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدات القتالة . انواعها المعروفة زهاء ٢٠٠ منها تلم وطولها بحار المناطق الحارة والمعتدة . سطها عشبي وبعضها لني . اورائها متعاقبة . ازهارها سبيل التجميع ، علمي الارتكاز .



رشد



رشد



رشد



رشد

1١٦٦٢ - رُصَامَة، وَصْف، وَحَاف Banc (F).

ج ارضة ووصف. Bench, Layer bed (E).

1١٦٦٣ - رُصَامَة

هو الحبار من القرد المقدسة، اطليه.

1١٦٦٤ - رُصَامَة Semnophthecidae (S).

Semnophthecidae (F). Semnophthecidae (E).

هي الحباريات فصيلة قرد من سفليات التخرن تشمل اربعة اجناس: الحبار والحور والزيك والقطروب.

1١٦٦٥ - رُصَامَة، كَدَه Talure (F). Graze (E).

حارث اية تحل بالاجار في هياكلها الخشبية تقسب حسب اللحاء وتصينه.

1١٦٦٦ - رُصَامَة Consentement (F). Consent (E).

هو احزاب المرء من قبوله الارتباط مع غيره بقصد قانوني طوعاً واختياراً || وهو ايضاً احزاب المرء من الموافقة على حل الغير سواء كانت هذه الموافقة منطقياً بما ام مسكوتاً عنها.

1١٦٦٧ - رُصَامَة قطع الثلج والبرد.

1١٦٦٨ - رُصَامَة، اِرْصَاع Allaitement (F).

Nursing, Suckling (E).  
التغذية بالحليب من الولادة الى النظام.

1١٦٦٩ - رُصَامَة Biberon (F). Bottle (E).

قنينة أو جهاز غاص صديد الثلمات وضع لارضاع ارباد الحيوانات عند تملر الرضاع الطبيعي.

1١٦٧٠ - رُصَامَة البُكر هي أم الحيات، اطليا.

1١٦٧١ - رُصَامَة، مَنَارَة، مَنَارَة، فُتَاح، زُرْبَعَة Emblavement, Emblavure (F). Wheat-sowing (E).

هو الحقل الذي كُرب وسمد وبلر وأثير أي دفن بذر.

1١٦٧٢ - رُصَامَة Acronychia (S).

Acronychie (F).

جنس شجيرات ونباتات برية وصربية من فصيلة السذابيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، منظرها لطيف. مهدا يمتد من الهند الى ماليزيا واورشالية || سوقها فراه. اوراقها متعاقبة، معتقة، شبه بيضبة الشكل، جلدية التصلب. ازهارها خضراء، قصيرة التيجات، رباعية التركيب. مبيضها رباعي الفصوص. ثمارها صغيرة، جلدية السقذ، لا تكفل.

أعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

1١٦٧٣ - رُصَامَة رَائِصِيَّة Acronychia resinosa (S).

Acronychie résineuse (F). مهدا الهند حيث يستعملون جنورها دلماً في معالجة داء المفاصل.

1١٦٧٤ - رُصَامَة عَطْرَة Acronychia odorata (S).

Acronychie odorata (F). مهدا الكوششن حيث يستعملون براعمها كإدام.

1١٦٥٢ - رُصَامِيَّة، حَشِيكَة الأَسْطَن Plumbago (S).

Plombagine, Dentaire (F). Leadwort (E).

جنس نباتات عشبية ليفية برية طيبة من فصيلة الرصاصيات. انواعها عديدة تألفت البشوط البحرية. سوقها فراه. اوراقها متعاقبة لمطية صغرة القد. ازهارها رصاصية اللون. تربتها وسيد التلال وأقل الخليلي. يتلها خماسية الفلق. اشدتها ومالها وبسابع كمارها خماسية للتركيب. اشهر انواعها واعرفها ما يلي.

1١٦٥٣ - رُصَامِيَّة أُرُوبِيَّة Plumbago europaea (S).

Dentaire d'Europe, Malherbe (F). Toothwort, European leadwort (E). Europäische bleiwort (D). Dentalaria, Lappoline (I). بجلة معمرة، تملر من ٣ الى ١٢٠ سم. فروصها مضلعة، اوراقها معتقة، اذنية. نصلها جامد للصبح، مسن الحلة، عايق الخضار. ازهارها مستقيمة لونها الى اليتلجي. ازهارها يستمر من آب الى تشرين.

1١٦٥٤ - رُصَامِيَّة الرُوس Plumbago capensis (S).

Dentaire du Cap (F). بجلة معمرة تملر من المتر الى المترين. ساقها ليفية سرعية سرعية اللحاء. فروصها متعقبة. اوراقها لمطية، نصلها سرنى الصغرة السلول. ازهارها صغرة لند لونها الى الزرق الباهت || ازهارها يستمر في الصيف والخريف.

1١٦٥٥ - رُصَامِيَّة زُرْكَه Plumbago corulea (S).

Dentaire bleue (F). Blue leadwort (E). بجلة معمرة، تملر نحو المتر، فروصها معتقة. اوراقها ضيقة، ذلقة. ازهارها خضراء، لنية، كلفة التجميع، زرقاء اللون || ازهارها صبي.

1١٦٥٦ - رُصَامِيَّة صَغِيرَة الزُّهْر Plumbago micrantha (S).

Dentaire à petites fleurs (F). عشبة سولية تملر نحو ٦٠ سم. مهدا سيرة. تزدح لزين. ازهارها اربمانية صغرة القد || ازهارها صبي.

1١٦٥٧ - رُصَامَة جَوِّي Observations météorologiques (F).

Meteorological observations (E). الرصد الجوي هو ضبط العوامل الجوية المختلفة أهمها الحرارة، والضغط، والرياح والرطوبة وكتبتا، وقياس المطر، واتجاه الرياح وصرتها، وبنية الاضام والسدم الخ.

1١٦٥٨ - رُصَامَة Larves des abeilles (F).

Larva of bees (E). هو التحل في طوره البرقي الذي يمتد من نصف المي الى نهاية الترق.

1١٦٥٩ - رُصَامَة

الرصع هو سفاد الطائر (من كراع) ويقال راصع الطائر لئله، سائدا (التاج) || والرصع هو البلق، اطليه.

1١٦٦٠ - رُصَامَة نبات طبي يلقى الخضرية، راجمها.

1١٦٦١ - رُصَامَة Solde (F).

Balance (between debit and credit) (E). هو ما بقي من دين بعد حسم المبالغ المفقطة.



رصاصية أوروبية



رُصَامَة



مسئلة الاطراف. انزهارها حشوي التجميع هجين القروع.  
انزهارها حدية ، بيضاء اللون ، قرمزية الاطراف ||  
تنويرها خريفي .

### ١١٦٨٢ - رُضَمٌ

رضع القنوة : كمرها . والررضع هو القنرى المروض .

### ١١٦٨٣ - رُضَمٌ

الرضع شجر قمرها الايل . الواحدة رضة (السان) .



رضبة

١١٦٨٤ - رُضَمَةٌ ، دَاحِشَةٌ  
Rotula (F).  
Pazella (E).  
الظلم للمدور المتشرك في رأس الركة . ج. رصف ورضفات.

١١٦٨٥ - رُضَمٌ ، كَرَبِيَّةٌ ، زَرْعٌ  
Emblaver (F).  
To sow with wheat etc. (E).  
حرث البربة وبعدها وبذرها .

### ١١٦٨٦ - رُضَمَةٌ

Pierre non taillée (F).  
Unperced stone (E).  
هي الحجر المستخرج من القلغ قبل تقميمه . وهي الدبشة  
الصالحة لبناء . ج. رضم ورضم .



رضفة

١١٦٨٧ - رُطَبُوسٌ  
Aramus (S).  
Courlan, Courliri (F). Courlan (E).

جنس طير من طول الساق وعضلة انفطليات. انواعه  
المعروفة نحو ٢٠ منتشرة في معظم اقطار العالم . جميعها  
متوسطة القند ريشة القوائم ضاربة للفضاء الجالبة المستطيلة .  
الارياح متراكبة الالوان التي تتراوح من الاصهب الصباني  
الى الخفي الاصفر يعلوها تشيع زيتوني واسود . عينها  
حور الاحداق . مناقبها الى الصدر الاخضر المواجه .  
ارياحها جذوية || قتها الحشرات والقصاصير الصغيرة  
ويضيها ويوزر النباتات النجيلية .



رُطَبُوسٌ

١١٦٨٨ - رُطَبٌ  
Constipation  
هو الاسساك عارض سببه اختلال في الجهاز الهضمي .

### ١١٦٨٩ - رُطَامَةٌ ، لُكَّةٌ سَوْدَاةٌ

Centroplophus niger (S). Centroplophus niger (F).  
Centroplophus niger (E).

سمكة بحرية يعيش من الاسقمريات شائكات الزعانف .  
اصطادها معظم اقاليم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق  
البحر الاطلسي || جسمها وشي الشكل يبلغ من ٣٠ الى ٦٠ سم.  
حراشها صغيرة معينة . قروها الى الصدر  
الالسي الزيتي المواجه ، يمتد فنتحت سمرة في الظهر وتقل  
في البطن . رأسها مستد الجرم ، مستفص الارتكاز ،  
قصير الخطم المستعير . عينها كبرتان جاسفتان زعنفتها  
الظهرية مستطيلة قاطبة عمدة . زعنفتها الخشوية مستطيلة  
قليلة العرض . زعنفتها الذيلية ذائقة || لحمها مأكول يراوح  
بين الجيد والوسط .



رُطَامَةٌ

١١٦٩٠ - رُطَبٌ

Dattes mûres (F).  
Mature dates (E).  
نضج البسر قبل ان يضر . الواحدة ربة . ج. أرطاب  
ورطاب .

### ١١٦٩١ - رُطَبَةٌ

هي القصة وهي نقل الروج . اطلها .

### ١١٦٩٥ - رُضَمَةٌ غَارِيَّةُ الْوَرَقِ

Acronychia laurifolia (S).  
Acronychia à feuilles de laurier (F).

مهدا جايا . لحاء جلوعها مرة المذاق ، حارة ، تستعمل  
في معالجة الاسهال والجذام .

### ١١٦٩٦ - رُضَمَةٌ

Echeveria (S).  
Echéverie (F). Echeveria (E).  
جنس نبات عشبية معمرة من فصيلة الخلدات .  
اوراقها ضيقة التجميع تنوعها الشاربغ الزهرية . انزهارها  
خاسية البيلات النافذة الاكثار || قزوع القرن ضمن  
البوت وفي الحدائق  
انواعها المعروفة متوسطة البدن ، انزهارها التالية :

١١٦٩٧ - رُضَمَةٌ بَهِيَّةٌ  
Echeveria fulgens (S).  
Echéverie écaistante (F).

نوع من الرضية . مهدا بعض اقاليم امريكا الوسطى  
والمكسيك . شراخها يرتفع من ٢٠ الى ٥٠ سم . اوراقها  
ضيقة التجميع تطلو نحو ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٤ سم .  
نصالحا بحرية الخضار ، متواجبة الحمار . انزهارها حشوي  
التجميع . انزهارها صفر القواعد وازام الاول ، مرجانية  
لامعة في البقي || تنويرها يستمر من تشرين الثاني الى  
نيسان .

### ١١٦٩٨ - رُضَمَةٌ جَبَّارَةٌ

Echeveria gigantea (S). Echéverie géante (F).  
نوع من الرضية . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع نحو  
٢٠٠ سم . اوراقها سانية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم .  
وتعرض من ١٢ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،  
خلية البشرة . انزهارها عقودي التجميع . انزهارها عاجية  
اللون مرققة بالاصفر || تنويرها خريفي .

### ١١٦٩٩ - رُضَمَةٌ حَاكِدَةٌ

Echeveria secunda (S). Echéverie unilatérale (F).  
نوع من الرضية . مهدا امريكا الجنوبية . شراخها يرتفع  
نحو ٣٠ سم . اوراقها اسطوانية الشكل تطلو نحو ٤ سم .  
وتعرض نحو ٢ سم . انزهارها عقودي التجميع ، حاكه  
الارتكاز ، مقوس الشكل . انزهارها متحدة الحجم ، لونها  
الصفرة الحمر المواجه || تنويرها يستمر من نيسان  
الى ايار .

### ١١٦٩٠ - رُضَمَةٌ قَرْمِزِيَّةٌ

Echeveria coccinea (S). Echéverie écarlate (F).  
نوع من الرضية . مهدا المكسيك . شراخها يرتفع من  
٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مسطوية الشكل ، خلية التصل ،  
ضيقة التجميع ، تطلو نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٣ سم .  
انزهارها عقودي . بيلات انزهارها قرمزية اللون من الخارج ،  
صفراء اللون من الداخل ، قطرها نحو ٢ سم . || تنويرها  
سيفي .

### ١١٦٩١ - رُضَمَةٌ مُعَدَّبَةٌ الْأَزْهَارِ

Echeveria gibbiflora (S).  
Echéverie à fleurs gibbeuses (F).  
نوع من الرضية . مهدا بعض مناطق المكسيك . شراخها  
يرتفع من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها تطلو من ١٥ الى  
٢٥ سم . وتعرض من ٧ الى ١٥ سم . نصالحا بحرية الخضار ،

الزراعي. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٠ سم. ازهارها قرمزية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢٠ إلى ٢٥ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٢ - رُطْبِيَّةٌ مُبْجَعَةٌ ٥

*Gasteria maculata* (S). *Gastérie tachetée* (F).

نوع من الرطبة. ساقها قصيرة ترتفع من ١٢ إلى ١٧ سم. اوراقها لحمية، مشققة، منسببة، تطول من ١٠ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. نصلها غويوب الصفرة العليا، بتسجي الذي يملو تبيج ابيض. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها مرجانية اللون. قطر الزهرة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٣ - رُطْبِيَّةٌ مُثَلَّثَةٌ ٥

*Gasteria verrucosa* (S). *Gastérie verruqueuse* (F).

نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها لحمية ثنائية الصف. تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١ سم. نصلها مثالي البشرة على الصفيحتين العليا والسفلى. لون الاوراق الى الخضار اللقائم والتأليل الى البياض المخبر. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٢٥ سم. ازهارها بياض الانتشاب والزام الاكل والثاني، وردية الزم الثالث، خضر الزام الرابع. قطر الزهرة يراوح من ٢ إلى ٣ سم. || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٤ - رَعَادَة ٥ هو الحبارى الاروية، اطلها.

*Tropedidae* (S). **رَعَادَات ٥**

*Torpédidés, Torpédinidés* (F). *Torpédidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة الاشلاق، اجناسها واوراقها عديدة اشهرها الرعادة.

#### ١١٧٠٦ - رَعَادَة ٥

*Torpedo* (S). *Torpille* (F). *Torpedo* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرعادات، اوراقها عديدة تكثر في بحار البلاد الحارة جميعها مكهنة. اذا مسها الانسان خدعت يده وعنده حتى يرتد ما دام السمك حيا.

#### ١١٧٠٧ - رَعَادَة الثيل ٥ هي فترة الليل، اطلها.

#### ١١٧٠٨ - رَعَادَة مَبْدُولَة ٥

*Torpedo marmorata* (S). *Torpille commune, T. marbrée* (F). *Cramp-fish, Numb-fish* (E).

سكة بحرية سرلو مفترسة من فصيلة الرعادات ورتبة الاشلاق. اصلاها البحر الابيض المتوسط وبعض اقلام المحيط الاطلسي وبحر الشمال. تعتبر من اسماك الباج. مسرعا اسماك الغنات. تتميز بجهاز حشلي خاص يتألف من الرأس من الجانبين واوراء مركب من مئات الموارير المسددة الزوايا والاضلع تحمل كتل كهربائية يحيط تقريباها يعض للمقر وتؤثرها نحو المئة في الثانية. اذا مسها الانسان تخدر ويرتد || جسمها قريب الشبه بالشفتين، يطول نحو ١٠٠ سم. مسكها مائل القشار. ثوبها الملوي الى الخشن الاصفر يملو موج وردي عند الذكر وخشعة بتج مستديرة زرقاء اللون، يبيضه الطوق. بضع الاكل بحرية اللون، غراء الطوق، فها سفلى الاركان. شقها متدل الانفراج. استاتها متتابعة الصفوف البدة. نياما تفران جانبيا. عينها صغيرتان، سطحيان. زمامتها الظهريه اثنتان

*Soupeur* (F).

#### ١١٦٩٢ - رُطْل ٥

رفع الشيء يده تقديرا لوزنه. *To weigh in one's hand* (E).

*Rotol*

#### ١١٦٩٣ - رُطْل ٥

سدة من الموازين القديمة قدرها اثنتا عشرة اوقية. وهو بالنسبة الى الموازين المشرية، المتصلة حاليا في معظم البلاد العربية، يساوي ٢٥٠٠ غ.

*Humidité* (F). *Humidity* (E).

#### ١١٦٩٤ - رُطْبِيَّة ٥

حالة كل جسم او شيء رطب يحوي بعض الماء.

*Humidité relative* (F). *Relative humidity* (E).

#### ١١٦٩٥ - رُطْبِيَّةٌ لَيْسِيَّة ٥

*Humidité spécifique* (F). *Specific humidity* (E).

#### ١١٦٩٦ - رُطْبِيَّةٌ نَوْعِيَّة ٥

*Gasteria* (S). **رُطْبِيَّة ٥**

*Gastérie* (F). *Gasteria* (E).

جنس نباتات لحمية مسرة صغيرة القد من فصيلة الزنبقيات. منها بعض مناطق افريقية الجنوبية. ساقها صلبة او جعدة او منسمة. اوراقها لحمية، قرصية مشققة. ازهارها متباينة الالوان || تزور لقرنين ضمن البيوت وفي الحدائق التي لا تحصى البرد. تزهر في الاربعة المتوسطة الانساج الوافرة النخس الطفالية من عضوية ومعدنية. ازهارها كثيرة البند اشهرها التالية :

*Gasteria pulchra* (S). **رُطْبِيَّةٌ أَيْفِيَّة ٥**

*Gastérie gracieuse* (F).

نوع من الرطبة. ساقها موزلة تطول من ١٥ إلى ٢٠ سم. اوراقها لحمية، ماسية، مطلة الزوايا، تطول من ٢٠ إلى ٢٥ سم. لونها الى الخضار اللانس يملو تبيج ابيض واجر. ازهرها عقودي التجميع يرتكز على زناد يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها قرمزية اللون || تنويرها شتوي.

*Gasteria nigricans* (S). **رُطْبِيَّةٌ سَوْدَاة ٥**

*Gastérie noiretre* (F).

نوع من الرطبة. ساقها جعدة. اوراقها لحمية مشققة، شكلها شكل السان تطول من ١٠ إلى ٢٠ سم. وتعرض من ٣ إلى ٤ سم. لونها الى الخضار اللانس السابق تملو رقة بياض. ازهرها عقودي التجميع. نژادها يطول من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ازهارها الى الحمرة الزنجفيرية السياه الموج || تنويرها شتوي.

#### ١١٧٠٠ - رُطْبِيَّةٌ كَطْرَكَة ٥

*Gasteria carinata* (S). *Gastérie carinée* (F).

نوع من الرطبة. ساقها مقرة. اوراقها مشققة لبدة. نصلها لحمية، محرمة الشكل، مطلة الاصلع الكثرة، تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. وتملو بعض التمثل الدقيقة. لونها الى الخضار اللانس المنقط بالابيض. ازهرها عقودي معتل الانتشاب، نژاده يرتفع نحو ٣٠ سم. ازهارها حراء اللون خرية الموج || تنويرها شتوي.

*Gasteria nidea* (S). **رُطْبِيَّةٌ لَامِيَّة ٥**

*Gastérie luisante* (F).

نوع من الرطبة. ساقها مقرة. ساقها مشققة تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ سم. صفحاتها العليا مقعرة ماسية. صفحاتها السفلى مخددة. لونها الى الخضار



رَعَادَة



رَعَادَة مَبْدُولَة

١١٧١٣ - وَحَشَاتُكَ Odonata (S), Odonates (F), Odonata (E), Wasserjungfern (D).

رَبَّةٌ حشرات من الرُحَامَاتِ . أجسامها مستطيلة . رؤوسها كبيرة . عينها مركبة بارزة . قرونها الاستفصارية قصيرة ودقيقة . أجنحتها غشائية شبكية ، جواربها دقيقة . فصائلها وأجناسها وألوانها عديدة تقسم إلى مرتبتين : الرماشات الكبيرة والرماشات الصغيرة .

١١٧١٤ - وَحَشَاتُكَ صَغِيرَةٌ Zygoptera (S), Zygoptères, Damselflies (F), Zygoptera, Damselflies (E), Gleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات أجسامها نحيلة مستطيلة . حورياتها تكتسب بنحائم دقيقة مركزها في مؤخر البطن . أشهر فصائلها أكتيميات .

١١٧١٥ - وَحَشَاتُكَ كَبِيرَةٌ Anisoptera (S), Anisoptères, Libellules (F), Anisoptera, Dragonflies (E), Ungleichflügelige Libellen (D).

مرتبة من الرماشات تتميز بأجسامها المستطيلة ورؤوسها الكبيرة المستعرجة . تكتسب بنحائم دقيقة مركزها جدار المستقيم الداخل . أشهر فصائلها البسويات والسرديات .

١١٧١٦ - وَحَشَاتُكَ قَتِيلٌ Anisoptera (S), Anisoptères, Libellules (F), Anisoptera, Dragonflies (E), Ungleichflügelige Libellen (D).

هي فترة قتل ، أطلبها .

١١٧١٧ - وَحَشٌ Epistaxis, Saignement du nez (F), Epistaxis, Bleeding at the nose (E).

هو الأنف الذي يخرج الدم من الأنف . أسبابه عديدة أهمها التهاب للأنف وضربة الرأس .

١١٧١٨ - وَحَامٌ ، سَكَاوَةٌ ، وَحَالٌ Morve (F), Snot, Glanders (E).

مرض معد يسبب ذوات الحمار وقد ينتقل إلى الإنسان فيكون قتالاً له .

١١٧١٩ - وَحَامَةٌ ، وَحَامِيٌّ ، شَجَرَةُ الْمَسَافِرِ Ravenala (S), Ravenala, Ravenala, Urnula, Arbre du voyageur (F).

جنس أشجار برية زوارجية من فصيلة اللوزيات . ثغفه للوز ولأنه مثل سما . مهبط مدسفر وما حولها من جزر المحيط الهادي . جلدها متعصب . أوراقها حلالية ، مروحية الإزتكاز ، قطرها من ٣ إلى ٤ أمتار وتوفر نحو المتر . أزهارها عتقودية التجميع . أزهارها بيضاء ، ثمراها كمار صميكة الثغور تملأ حدة بزور فضية الشكل فيه بالود اللثوية المأكولة بعد طعمها وطيبها . تقدرها صناعية يستخرج منها دهن نباتي لا بأس به . أما سبب تسميتها بشجرة المسافر فيعود إلى أنقذات أوراقها الخاصة التي تحفظ للماء زلالاً بارداً يروي حثث الكائنات .

١١٧٢٠ - وَحَبَلٌ Anémomètre (F), Anémomètre (E).

جهاز قياس سرعة الريح وحظها .

١١٧٢١ - وَحَبَلٌ هو الزعفران ، أطلبه .

١١٧٢٢ - وَحَبَلَةٌ الرحلة : ويح لا تكدي معها لعم استقرارها .

١١٧٢٣ - وَحَشٌ Balaustra

زهر الزمان البري . واحدة ردة .

زعتلها الدالية مجذافية الشكل . شوارها الجني يتدكر بين الزعنفتين العلويتين . مسكها جيد الصنف ، شائع الاستعمال المناعي . لحمها بين المتوسط والكامن ، قل من يربط فيه .

١١٧٢٤ - وَحَشٌ Stomias (S), Stomias (F), Stomias (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الرماصات . أنواعه المعروفة من الآن خمسة ، أربعة منها مسرحة المحيط الأطلسي والمهادي ونوع واحد يقطن في البحر الأبيض المتوسط . تتميز من أسماك التناف والباحاج التي لا تقترب من سطح الماء أبداً . أجسامها مستطيلة الشكل مضغوطة كالانقليس . رؤوسها عظيمة ، عظامها عظيمة ، أشداقها كبيرة قافرة . أسنانها متبادلة ، مستطيلة ، حادة . تحمل في فكوكها السفل علبه أو علبات متغايرة الأشكال . زعانفها الظهرية والشرجية طرية الإزتكاز متعالية . زعانفها الأخرى متبادلة الإزتكاز والأحجام . حراشفها سداسية أو خماسية الأضلاع . ألوانها قاتمة يكثر فيها الكسوتي الجلوي للملج والرماسي الأزرق الملج والأخضر اللامع الأسيد الملج . تتميز بما تحمله من عمول مضطربة مبرمة على كامل سطح الجسم في أماكن معينة أعينها الصفحة السفل من الفك والظن والدلب . أعرف أنواعه وأشهرها الرماطة الأصلية .

١١٧٢٥ - وَحَامَةٌ أَصْلَبَةٌ Stomias boa (S), Stomias boa (F), Stomias boa (E).

نوع من الرماص . مكمة بحرية بيوض . أصلها معظم إقليم البحر الأبيض المتوسط . تتميز من الأسماك الجبية . مسرحة الغاف التي يراوح مقبها بين ٢٥ و ١٠٠ م . . جسمها قريب الشبه بالانقليس ، بطول من ٢٥ إلى ٣٠ سم . توجها إلى الرماصي الأزرق الملج تبق زرقته عند تيج الظهر وتقتف وتتصل إلى شوبة في البطن . رأسها قلاب ، مستطيل الشكل ، الفس الخلف . فيها واسع الشفة الكبير . أسنانها متبادلة ، حادة ، ذرية ، فكها السفل يحمل علبه سوطية الشكل . عينها كيرتان ، حلوتان . زعنفتها الظهرية واحدة ، بعيدة عن الرأس ، قريبة من الدلب . زعنفتها الدالية مزوانية الشكل . إجهتها السفلي يتألف من بفس العمول المبرمة على سطح الجسم ومن صف من الدلب الصغيرة المتشابهة الإبعاد يطرقة سطح السفل من الجسم بحافة ذلك . لحمها متوسط الصنف ، كبير اللادة الزرقية .

١١٧٢٦ - وَحَامَاتِيَّاتٌ Stomiatidae (S), Stomiatidae (F), Stomiatidae (E).

فصيلة أسماك بحرية من مقوصات الخاتة . أجناسها وأزواجها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من أسماك الأخطبوط والباحاج . أصلها معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . أجسامها قريبة الشبه بأجسام الانقليس . رؤوسها قلابية ، عظيمة ، متبادلة ، مقوسة ، حادة الأطراف . ألوانها تراوح من الزبد الرماسية الملج إلى البنية الكسوتية تتخللها أجزاء مضطربة مبرمة على كامل سطح الجسم .

١١٧٢٧ - وَحَشٌ Tremblade, Tremblante (F), Quivering, Trembling (E).

مرض عصبي أو ميكروبي يسبب التشنج .



رماطة أصليّة



رماطة

أرجوانية يقطها خط أبيض . كانوا وما زالوا يستعملون جذليهما في بعض المستحضرات الطبية .

#### ١١٧٣٨ - زَعْفَرَانِيَّة \* Nosodendron (S).

Nosodendron (F). Nosodendron (E).

جنس حشرات من فصيلة العنكبوتيات ورتبة غمديات الاجنحة . انواعه المروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٤ الى ٧ م . رؤوسها مستعرضة ، قليلة النشور ، مستطيلة الاضلاع . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية دبسية الاطراف . كواسلها صغيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب الفلق الاصفر نظامي الخطوط الناعمة . قوائمها نشيطة . اثارها وسيدة اللون القاتم يكثر فيها الاسود والاكستني || تألفت الحراجل الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة الصديقية التي تروشح من جروح السوق والاغصان . يرقاتها دلمة .

#### ١١٧٣٩ - زَعْفَرَانِيَّة \* Nosodendridae (S).

Nosodendridae (F). Nosodendridae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم حراج العالم || اجسامها صغيرة ، بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٨ م . رؤوسها مستعرضة القعن ، قليلة البروز . عيونها صغيرة . تأثيرها وعلامتها نظامية . قرونها الاستشعارية قصيرة ، دبسية الاطراف ، خماسية الفصل . كواسلها قصيرة وعريضة . اغمارها لاحقة تملؤها حزم من الحلب ، نظامية الصفوف ، صفراء اللون . قوائمها نشيطة . ارسلها خماسية الشكل || تألفت القبابات والحراجل الكثيفة الاشجار . تعيش على العصارة النباتية التي تروشح من جروح الاغصان والسوق وصل المواد المنسقة . يرقاتها دلمة || اشهر اجناسها العنكبوت .

#### ١١٧٤٠ - زَعْفَرَانِيَّة \* Plutes fines (F). Drizzle (E).

الاضطار الخفاف .

#### ١١٧٤١ - زَعْفَرَانِيَّة \* Paltre (F).

To graza, To feed, To tend (E).

البرجح الماشية وسرعا لتأكل .

#### ١١٧٤٢ - وَحْيُ الْإِبِل \* Echinops sphaerocephalus (S).

Echinops commune (S). Echinops commune (F). Boulette commune (F). Globe thistle (E). Riesen-kugeldistel, Kugeldistel (D). Echinopo commune, Cardo pallirola (I).

وين اسمها مرغوليا شائعة ، شبه الجبال الشام ، ستاني . نبات عشبي بري معمر من فصيلة المركبات الابيوية الزهر . يطول من ١٥٠ الى ٢٠٠ م . ساقه وقروعه وارواها خضراء لينة . اوراقه عريضة اللسان قليلة النشور . رؤوساته الزهرية مكورة ، قطرها من ٤ الى ٨ م . لونها الى الزرقاء الباهتة .

#### ١١٧٤٣ - وَحْيُ الْحَمَام Varbens (S).

Vervaine (F). Vervain (E).

جنس نباتات برية وريبية من فصيلة الساجيات . انواعه كثيرة العدد . سيقانها مفلعة ، عشبية او خشبية . اوراقها متعاقبة ، كاملة او مفروقة ، لاحقة ، حاشية او معتقة واذينية . اغمارها سنبل او لوري التجميع . اغمارها صغيرة القند ، عديدة الالوان ، عطرية البرف || احرف واشهر انواعه للزينة ما يتبع .

#### ١١٧٤٤ - زَعْفَرَانِيَّة Caronule (F). Caruncle (E).

زائدة لحمية تكون على رأس أو عتق أو مقار بعض الطيور كما في البليك الحليبي . ج . عتات .

#### ١١٧٤٥ - زَعْفَرَانِيَّة Barbillon (F).

Little barbel, Wattle (E).

زائدة لحمية مسطرفة تشبه الزنقة تكون تحت فلق البليك ، وما يشبهه .

#### ١١٧٤٦ - زَعْفَرَانِيَّة Pulicaria (S). Pulicaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة المركبات . انواعه المروفة نحو ٢٠ جميعها نباتات عشبية حولية وعملية ، اوراقها لسنة ، حاشية ، متعاقبة . اغمارها رؤسية صفراء اللون . اشهرها زمرع ايوب .

#### ١١٧٤٧ - زَعْفَرَانِيَّة \* Pulicaria dysenterica (S).

Pulicaria dysenterica (S). Pulicaria dysenterica, Herbe de St Roch, Inule des prés (F). Common fleabane (E). Grosses flöhkraut (D). Pulicaria svedese, Inula pratense (I).

نوع من الزمرع البري مشهور بمقاومة الحليبي . يسلح نساد المدة ويقضي على الزحار .

#### ١١٧٤٨ - زَعْفَرَانِيَّة Secouer (F). To shake (E).

رض الريح الشجرة : سركها .

#### ١١٧٤٩ - زَعْفَرَانِيَّة Abeille mille (F).

Masculine bee, Drone (E).

هو ذكر النحل ، ويسمى اليمسور .

#### ١١٧٥٠ - زَعْفَرَانِيَّة Troupeau de solipèdes (F).

Soliped drove (E).

الرجل ج ارمال هو القطيع من الخيل والحمر الوحشية .

#### ١١٧٥١ - زَعْفَرَانِيَّة Bourgeonner, Débourner (F).

To bud (E).

رمل الشجر والكرم : خرجت رملته اي برامحه وزماته .

#### ١١٧٥٢ - زَعْفَرَانِيَّة Broutille (F).

Sprigs, Small-wood (E).

الطرف الغض لتنامي من الكبرية . ج . رطل . والزينة هي نخلة النخل وقيل النامة .

#### ١١٧٥٣ - زَعْفَرَانِيَّة Graisse (F). Grease (E).

الزوم هو الشمع .

#### ١١٧٥٤ - زَعْفَرَانِيَّة Insolation (F).

Insolation, Sun-stroke (E).

عارض يصيب الحيوان وهو ضرب من الاحتقان الشمسي سببه تأثير الشمس في جبهة الحيوان .

#### ١١٧٥٥ - زَعْفَرَانِيَّة Danaë inurum, D. racemosa (S).

Danaë, Fragon à grappes, Laurier d'Alexandrie (F). Alexandrian gree laurel (E). Echtes minsterstraubchen (D). Pugnapoco a grappolo (I).

جنية برية وريبية تملر من ١٠٠ الى ١٥٠ م . رؤوسها مستطيلة . اغمارها عقودية التجميع غضراء اللون . علامها



زمرع ايوب



زحنا



زعرين



دعي الابل

## ١١٧٤٤- رعي الحام الأثوسي

*Verbena arnoides* (S). *Verveine-arnois* (F).  
حشبة حولية ، تملو نحو ١٥ سم . ساقها فروع . فروعها  
انفية الانتساب نحيلة . اوراقها ثلاثية التفريش ، نصلها  
خلي البشرة على مسطحه . ازهارها صغيرة اللد لا حار  
مهدب لها . لوها الى الزرة الزاهية || ازهارها يستمر  
من تموز الى آب .

## ١١٧٤٥- رعي الحام الأمريكي

*Verbena bonariensis* (S). *Verveine de Buenos-Aires* (F).  
حشبة معمرة ، تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقها منتصبه  
زقية . اوراقها لائقة . نصلها حشن للملس على مسطحه .  
ازهارها مستطيلة زياه التبرج ، لوها الى الزرة الباحة .  
ازهارها يستمر من تموز الى آب .

## ١١٧٤٦- رعي الحام الطوقريوني

*Verbena teuroides* (S). *Verveine germandrée* (F).  
حشبة معمرة ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . فروعها  
منزوية الانتساب ، انفية . اوراقها قصيرة المدق انفية .  
نصلها مستطيل الشكل ، ذق البقعة ، منن الحلقه ،  
حشن اللروق ، خلي الصفحة السفل . ازهارها يرض  
ثم لتصرف الى البردي . عرفها ليلي || ازهارها سني .

## ١١٧٤٧- رعي الحام الكبير

*Verbena sulfurea* (S). *Verveine jaune-soufre* (F).  
حشبة حولية ، تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فروع . فروعها  
ضيقه الانتساب . اوراقها قديه التفريش خليه البصل ،  
ملطفه الاطراف . ازهارها خليه التبرج ، كبريتية اللون .  
ازهارها سني .

## ١١٧٤٨- رعي الحام الكندي

*Verbena canadensis* (S). *Verveine du Canada* (F).  
حشبة حولية ، تملو نحو ٣٠ سم . ساقها فروع . اوراقها  
مستعرضه برفشه طول من ٣ الى ٥ سم . ازهارها قصيرة  
مستعرضه ، قليلة البرف البلي ، لوها يختلف مع فروعها  
فيها الازرق والبنسجي والاريجوني || ازهارها يستمر  
من تموز الى آب .

## ١١٧٤٩- رعي الحام المخزني ، باموسكروني ، حشبة الأوجام

*Verbena officinalis* (S). *Verveine officinale*, *Herbe sacrée* (F). *Vervain*, *Holy-herb*, *Pigeon's-grass* (E). *Echtes elsenkraut* (D). *Verbena officinale*, *Colombaria* (I).

حشبة معمرة ، تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . ساقها فروع .  
فروعها منتصبه . اوراقها احيوية مفرشه . نصلها أثقب  
الصفحة السفل . ازهارها صغيرة اللد ودية اللون يوشوا  
مولج اخضر . وفي من الاشباب الكثره المنافع الحميمه .  
يستخرج منها بالتطهير طوط فاعرة الصفه طرزة  
الاستعمال || كالت ولا تزال تستعمل لد البرق ولزيادة  
القوة الجسدية || ازهارها سني .

## ١١٧٥٠- رعي الحام الخطوط

*Verbena venosa* (S). *Verveine veinée* (F).  
حشبة معمرة ، تملو نحو ٥٠ سم . ساقها منتصبه زياه  
اللهم . اوراقها لائقة نصف حاشية . نصلها حشن  
الصفحة العليا ، الملس السفل خلي البصل . ازهارها  
فولحة العرف لوها الى البلي الازرق || ازهارها يستمر  
من حزيران الى آب .

## ١١٧٥١- رعي

*Endophyllum*  
جنس طوط مجهرية من فصيلة الرعيثيات . انواعه قليلة  
تنتقل على بعض النباتات كتحذيا || اشهر انواعه الثلاثة  
التالية .

## ١١٧٥٢- رعي الثريبيون

*Endophyllum euphorbiae-silvaticae* (S).  
نوع من الرعيث يركب التولي حيث تستقل مشايه وتمنع  
النبات حسن الازهار . ين من مبيد رافعة سطرية ذكية  
وتقلص في غشار الورق . اما ذمها فتركب الوراق  
على مسطحها السفل || يكلف بمركبات النسل منه  
ظهور عوارض اللوم .

## ١١٧٥٣- رعي الثكودين

*Endophyllum valerianae* (S).  
نوع قليل الانتشار يتقل على السرق والاوراق ليؤذيها  
ويمنع الازهار || يكلف باستعمال احد مركبات النسل  
نفسها على الوراق عند ظهور عوارض اللوم .

## ١١٧٥٤- رعي حبي العالم

*Endophyllum sempervivi* (S).  
نوع من الرعيث يركب لاه الجملين فيمنطقها بنبوت  
الكروية الصغيرة البرتقالية اللون ثم يقرصها ويصلها  
وقد ييبب يلبها وينتج || يكلف بقتلح النباتات  
المصابة ويتطهر التربة .

## ١١٧٥٥- رعيثيات

*Endophylacae* (S). *Endophylacae* (E).  
فصيلة طوط مجهرية من رتبة الحمايات تدعى بمشايها  
للتضارة المتتابة فمن فصات بعضها المسقلان . لاس  
بريقاتها دعائي الشكل التيدي الانفصال || اجنتها  
الاقتصادية قليلة . اعرفها الرعيث .

## ١١٧٥٦- رعيثيات

*Odonoptera* (S). *Odonoptera* (E).  
طليقة سحرات قارضة مجنسة مستطيلة الاجسام . رؤوسها  
كبيرة اللد ، حوتها بارزة . فروعها الاستعمارية شديدة  
القص . رؤوسها مستطيلة ، غشائية ، كثيرة العروق  
الخشكية . اقنوبها عديدة الااليان || نصلهاها واجنتها  
واانواعها كثيرة اللد تضم الى رتيين : الطرايات والجليليات  
ومن نصلهاها المشهورة : النتيحات واليسوسيات .

## ١١٧٥٧- رعيثات

*Bélemet* (F). *Bélemet* (E).  
صوت ذوات الخف .

## ١١٧٥٨- رعيثات

*Procellaria* (S). *Pétrel* (E).  
جنس طوط مائية من كليات القمم وفصيلة البراقليات .  
انواعه المروفة حمة جميعها متوسطة اللد فشطلة ترائق  
البراقليات في سفراء حمة ايام لانتقاط بقايا اللطخ || اجسامها  
تطو من ٥٠ الى ٥٠ سم . اجنتها مستطيلة ذلقة  
الاطراف . اذنتها قصيرة . منقايها ضيقة ، متوسطة  
اللد ، لمطوية الصفحة العليا ، ضده السفل ، مجنسة  
النمط القروية . غنايتها واسعة الليرة . ارضانها كاتمة .  
شثرة اصابعها كاملة تمتد حتى الخالب || قتها القشرية  
ويشث الحيتان والاسماك . سرحها بجار البلاد الحارة ولباردة .  
توم على الماء وتجوم فوقه ولا تقرب البر الا في زمن الجفاف



رعي الحام الطوقريوني



رعي الحام الكندي



رعي الحام الفربيوني



رعيث

## ١١٧٦٦ - زُفَّاءُ جُورْتِنَا \* Epinephela

Jurtina, Maniola Jurtina (S). Epinéphèle Jurtina, Myrcil (F). Epinephela Jurtina (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ١٧ م. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. رأسها صغير الحجم. صيغتها كيرتانا. زياتها صوفانيان. جوشها كسني اللون صناعي الموج عند الاثنى، اسمره عند الذكر. بطنها ليد الحبل القصير يتصل بحروب الجوشن عند الشقين. ورأسها كسنتية، سمراء الموج عند الذكر، حطيت عند الاثنى، الزوج الامامي عند الذكر خصب بتقطة بيضاء المركز حطية الجوزلب || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في ايار. تسرح في التبار تماثل بعد ظهورها بشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال الاوراق || السرة تطل نحو ٣٥ م. جسمها اسطواني الشكل، ماس القشار. ثوبا الى الرعدة الصفراء الموج يملوها ثلاثة خطوط منها خط قوسي وخطان جانبيان جميعها الى الخضار الداكن. رأسها اسود. شريحها مجهز بزايدة مفلقة. مدنها ورواجها الى الطحلة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة بين الجحالة ونحتها.

Terre sablonneuse (F).

Sandy soil (E).

Trachée-artere (F).

Windpipe (E).

Prémontion (F).

Pramontion (E).

لرقانة احساس يستقبل العمل ويشير به.

## ١١٧٧٠ - زُفَّاءُ Desiderata

١١٧٧١ - زُفَّاءُ Procellariidae (S).

Procellariidae (F). Procellariidae (E).

فصيلة طيور مائية من كليات القدم مستطيلات الاجنح. اجناسها وانواعها قليلة العدد، اسطها منظر بحار العالم الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ٤٠ م. رأسها صغير الحجم. صيغتها كيرتانا. زياتها صوفانيان مستطيلان. مرشفها خفيف الجسم. جوشها كسني اللون عند الذكر، حطية عند الاثنى. بطنها ليد الحبل يتصل بحروب الجوشن عند الشقين. ورأسها، عند الشقين، الى الشقرة يملوها تبقي حطية وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في التبار. تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطل نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني، ماس القشار. ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها خمسة خطوط عتائية منها خط قوسي. رأسها جلوي اللون. شريحها مجهز بزايدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجحالة ضمن غلاف ضوي المادة.

Artère mammaire (F).

Mammary artery (E).

حرق غليظ ينشئ في الفرج يدر اللبن.

## ١١٧٧٣ - زُفُّل

هو ذن لحام السنايل في الزرع. او عندما يحاوذ سنيل لزراع الاغلام.

١١٧٧٤ - زُفُّل Anserine (F). Goose-foot (E).

الزهر هو الاكثية، نبات بري طبي. ج. اذغال.

والخضن. انثاها تحضن بيضة واحدة نحو خمسة اسابيع. للذكور كوين الغذاء.

اعرف انواعه :

١١٧٥٩ - زُفَّاءُ الجليد، فُلْزَار Procellaria glacialis (S). Pétrol glaciel, Fulmar (F).

١١٧٦٠ - زُفَّاءُ القُطْب Procellaria capensis (S). Pétrel du Cap (F).

١١٧٦١ - زُفَّاءُ الهيد، حَالِيَة Procellaria hastata (S). Pétrel haste (F).

١١٧٦٢ - زُفَّاءُ، زُفَّاءُ Permeable (F).

Permeable (E).

اوس زفاب تأخذ الماء الكثير ولا تسيل الا من مطر كثير.

١١٧٦٣ - زُفَّاءُ، زُفَّاءُ Permeabilité (F).

Permeability (E).

صفة الارض الزفاب يبي قابلية نفوذ للسوائل والغازات في التربة وفي غيرها من الاجسام.

١١٧٦٤ - زُفَّاءُ Ereos (S).

Ereos (F). Ereos (E).

جنس حشرات مائية قاصصة من غديات الاجنح وفصيلة التكروليات. انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الاصقاع الباردة. تعيش في الجيبرات والمناقع والاهوار ويباري الماء القليلة الانسياب. قوتها كل ما تيسر لها من مواد عضوية سمي كانت او ميتة || اجسامها متوسطة القد، احليجية الشكل، مستعدة الاندياب، مجاذبة الجرايز الحليقة، محببة الامامية عند الذكور || زياتها مائية قاصصة مؤدية لا تنف من سره السمك.

## ١١٧٦٥ - زُفَّاءُ يَتُون \* Epinephela

Epinephela tithonus, Maniola tithonus (S).

Epinéphèle tithon, Tithon (F). Epinephela tithonus (E).

حشرة من فصيلة المهابيات ورتبة حرشفيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى اوروبا. فراشها جارية قوتها مفر الاضرار. سرقتها غاشلة قوتها نصف التجميلات || جسمها متوسط لحد يطل نحو ٤٠ م. رأسها صغير الحجم. صيغتها كيرتانا. زياتها صوفانيان مستطيلان. مرشفها خفيف الجسم. جوشها كسني اللون عند الذكر، حطية عند الاثنى. بطنها ليد الحبل يتصل بحروب الجوشن عند الشقين. ورأسها، عند الشقين، الى الشقرة يملوها تبقي حطية وتتقيد اسود وتبيض اسمر وتمتع الحبل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في التبار. تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة اسابع وتمتع المكن لطعام السفل من نصال البصيف || السرة عند بلوغها الكمال الجسدي تطل نحو ٣٠ م. جسمها اسطواني، ماس القشار. ثوبا الى الكهبة الخضراء يملوها خمسة خطوط عتائية منها خط قوسي. رأسها جلوي اللون. شريحها مجهز بزايدة مفلقة الى ثلثين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع يتقضي في التربة تحت الجحالة ضمن غلاف ضوي المادة.



زُفَّاءُ بِيرون



زُفَّاءُ جُورْتِنَا

## ١١٧٨١ - رُغِيَّة ٥

Rhyssa (S).

Rhyssa (F). Rhyssa (E).

جنس حشرات من غشائيات الاجنحة المنصورة الاشرافيات الحافرات وصليبة التنسيبات. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع اقطار العالم || اجسامها دقيقة مستطيلة. اطولها الكاملة، من الرأس الى طرف المرنج، تراوح من ٨ الى ١٦ سم. انوثها مثابثة الاناثن لكثير فيها الشبهة الخفية بالاصغر || تتميز بصقلتها الاجسام والرقائق والقرنات والمراوات. مرزاتها خفية تحترق الفكر والمخبط تحير من الحشرات اللطيفة لانها تنبت الككن في بطون يرقات الحشرات الماشية لتضفي عليها.



رغل

## ١١٧٨٢ - رُغِيَّة ٤ ميردوم Mesoderme (F).

Mesoderm (E).

الرغيلة في علم النبات الغلاف النشائي الذي يلبس الجباب وتكسفه القشرة || وفي في علم الحيوان (لرولوجية) انشاء الاصطاء بين البشريين الخارجية والداخلية.

## ١١٧٨٣ - رُغِيَّة ٣ سمراء ٥

Apotomus latigens (S). Apotome brun (F).

Apotomus latigens (E).

حشرة قانصة من فصيلة الرغيات ورتبة غشائيات الاجنحة. موطنها بغض الاقاليم الممتدة الحارة من حوض البحر الابيض المتوسط. تألف الموطن الريانية التي لا تخلو من المشب. خنافسها تعيش على الحوام والحشرات الدنيا ولقديان اللقية. يرقاتها تعيش في اول مدها على المواد المضوية ثم على ما تستطيع اقتباسه من الحشرات والحوام || جسمها صغير اللد يظلم من ٥ الى ٦ سم. فوها الى السرة الزائفة السفاه. رأسها صغير الجرم، مستطيل الخيط، زباناها دوقان، مستطيلان. عيناه صغيرتان. ظهورها ثنائي التتخيد القدي القاطب. ارسافها خافية الشلل || الاثني اصغر قفا من الذكر واجبت ثوباً من وقصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف. تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها انتم تطول نحو ١٠ سم. جسمها اسطواني الشكل، تني اللون، اسمر الخيد، اغبر اللدب، اسود الرأس والشرح || طور الاكمال يستمر نحو ٣٥ يوماً وينتهي بظهور الحشرة الجملانة في اواسط سزيان.



رغيف أشعث



رغية

## ١١٧٨٤ - رُغِيَّات ٥

Apotomidae (S).

Apotomidae (F). Apotomidae (E).

فصيلة حشرات قانصة نافعة من رتبة غشائيات الاجنحة. اجناسها وانواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة || جميعها صغيرة اللد قلما يتجاوز طول الواحدة منها ١٠ سم. رؤوسها اسطوانية الجرم، مستطيلة الزوايا المغارية الفصل. كواسها كاسية الشكل. اجسامها خلية التشار. الحامداها ثمانية الاغابيد القاطبة الشاذية || تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسي بسرعة وشرقة وتطير بشفة. قوتها ما تيسر لها من الحوام والحشرات الدنيا ولقديان || اشهر اجناسها الرغافة.



رُغِيَّة ممره

## ١١٧٨٥ - رُغِيَّة ٤ الرقادة ٥

## ١١٧٨٦ - رُغِيَّة ٤

Comprese (F). Comprese (E).

في الصبية المطهرة البعيدة الطوق التي تقسم بها الجرج.

## ١١٧٧٥ - رُغُل ٥، قُرْثِيَّة ٥

Vernonia (S).

Vernonie (F). Vernonia (E).

جنس نباتات عشبية جلمورية طيبة معمرة من فصيلة المركبات معقودة التبريف على اسم اليوناني فرزين || انواعها المعروفة عديدة. اصطانها معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدة الحارة || سيقانها خالية المصارة ترتكز على جذائير غليظة. اوراقها متعاقبة صليبة ضيقة متصل الجامد. ازهارها فردية، طرية الانكثار، يلفظ لهما اللون الازرقاني. بزورها صغرية، مزوانية الشكل، خنثة، ممره || جلودها دافئة الحسى، نقيته ومباردة لقميد. اوراقها وازهارها تتصلل استمال الناي.

## ١١٧٧٦ - رُغُل ٤

Agneau, Chevreau (F).

Lamb, Small goat (E).

صغير النجمة او الغزل لا يزال يرغل امه.

## ١١٧٧٧ - رُغُل ٤

Erg (F). Erg (E).

الرغنة اسم يطلق على كل منطقة صحراوية تشاه الكتيان المتحركة. اما المناطق المصرية المرتفعة التباد تسمى حادة.

## ١١٧٧٨ - رُغِيَّات ٥، قُرْثِيَّة ٥

Rhagonycha (S). Rhagonyche (F).

جنس حشرات من فصيلة الدراحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصطانها الشرق الاوسط واروبة. جميعها مستطيلة الشكل، صغيرة اللد. اطولها تراوح من ٧ الى ١٨ سم. انوثها مختلفة الاناثن لكثير فيها الاصغر والالتهيب الخراج بالاحمل او الازرق او الالاصد || تسرح في النهار. التطير في اواسط الربيع وتبقى حتى اواخر الصيف. مرزاتها الازهار || يرقاتها تبارية مقترنة تقضي على معظم الاساريع وتضعها بنشاط.

## ١١٧٧٩ - رُغِيَّات ٥ أشعث ٥

Rhagonycha fulva (S). Rhagonyche rous,

Rhagonyche rous (F). Rhagonycha fulva (E).

حشرة واشعة خاضعة من فصيلة الدراحيات ورتبة غشائيات الاجنحة. تألف الموطن التي تكثر فيها الازهار واغصانها الازهار البرية. خنافسها تعيش على بتلات الازهار ورسيتها. يرقاتها تعيش على المواد المضوية وعلى ما تقتريه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير اللد يظلم من ٧ الى ١٠ سم. ثوبا الى الشبهة الضفراء يقيم عند اطراف الظهران. رأسها صغير الجرم. زباناها عيطيان. عيناه صغيرتان. ظهورها لا يلبس كامل البطن. يظلم اسفر اللون، معظمه اللطوف. ارسافها خافية العقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اواسط تموز. تسرح في النهار. تساقه بعد ظهورها بالرقاة عند بلوغها الازداد اكتم تطول نحو ١٨ سم. جسمها مبطل الجرم، اسمر اللون، حنلي الخراج، سداسي الزوايا السمر، مستطيل الرأس الجلوي، ضليح التأثير، مدبب اللطوف || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٥٥ يوماً وينتهي في القرية.

## ١١٧٨٠ - رُغُوَّة السَّحَر ٥

Magnésie(F). Magnest(E).

في سيليكات المغنيزيم الطبيعي يستعمل في عدة صناعات دقيقة.

١١٧٩٨ - رَقْلَانِيَّات \* Melanconiales

مرتبة تطور مجهرية من رتبة الزويجات تتميز بكتلتها الكثيفة في السرة. فيها عضون الجوانب يكتشفه جمل دقيق قصير. اجناسها عديدة تجمعها فصيلة واحدة تدعى الرقليات.

١١٧٩٩ - رَقْلَة \* Melanconis

جنس تطور مجهرية من الرقليات يتميز ببوطه الشفاف لثنائي الخلية. له نوع واحد يحم الاقتصاد الزراعي ينسب رقة الكسنة.

١١٨٠٠ - رَقْلَة الكَسَنَة \* Melanconis

Melanconis modonis, M. perniciosum, Fusilcocum perniciosum, Coryneum modonum, C. perniciosum, C. kunzei castaneae (S). فطر مجهرى يصيب احضان الكسنة فيؤذيها ويسبب يباسها. مظهره الخارجي يقع منخفضه مسطيلة مدبة افراس والحطب بارزة الحافة تركيب لحاء الاحضان فضيت اخلايا وتقل الاوعية وتقرئ سير النسيج وتبادل. وقد تقضي عليه عندما تطرق النمن فتقبل الاوراق وتبقيها الاثان والاثناد والنمن. يكافح بقطع وسرق الاحضان المبرورة ثم تطهير الجروح بحلول سلفات الحديد او سلفات النحاس.

١١٨٠١ - رَقْلِيَّات \* Melanconidaceae (S).

Melanconidaceae, Melanconidaceae (F). Melanconidaceae, Melanconidaceae (E). فصيلة تطور مجهرية من الرقليات ورتبة الزويجات تتميز بوسيلة جنية جليلة تقوم على جعلها احضان غليظة طليقة. بعضها غروطي او اسطواني او غيبي الشكل، ثنائي الخلية، شفعي الشكلية المتفرعة. اجناسها المؤلفة ١٦ البستوريزه، البوليبيوريه، الرقة، السيلفولوم، البوليبيوريه، السيلبيسوريه، البيلندروبيوريوم، القنيسمة، الكريبتوسبيوريوم، الكورينيوم (الرقة)، اللصوص، الليبريللا، المرسيه، الميكسيديوم والتيموسوريه.

١١٨٠٢ - رَقْل \* Mammite (F).

Mammitis, Mastitis (E). نوع من الالتهاب وهو مرض يصيب الفرج فيؤذي.

١١٨٠٣ - رَقْلَة Consorts

الشركاء في المصير، اصحاب المصلحة الواحدة.

١١٨٠٤ - رَقْل \* Penna (F).

Feather of the tail or wing (E). كل ريشة غليظة طويلة من ريش ذنب الطائر وجسدها. ج. رَقَال.

١١٨٠٥ - رَقْلِيَّات Rafflesiaceae (S).

Rafflesiaceae (F). Rafflesiaceae (E). فصيلة نباتية من ثنائيات الفلقة، عديمات الضلالت، مستفضات المبيض. اجناسها وانواعها قليلة جميعها اصحاب استوائية اللينث طليقية تركز تركيز وتقوم على مشرة ليفية تلشب في لحاء حوائلها.

١١٨٠٦ - رَقْلِيَّة Rafflesia (F).

Rafflesia (E). جنس نباتات مشبية طفيلية من فصيلة الرقليات. انواعها ثلاثة، بعضها قصيرة مدادة. اوراقها حشوية. ازهارها لحمية كبيرة اللد. قطرها نحو المتر. وزنها ٧ كيلو. بتلاتها رباعية يضاء اللون، قرمها احمر قرميدي تفوح منها رائحة كريهة لا يقربها شيء.

١١٧٩٧ - رَقَال \* Emasculation des fleurs (F).

Emasculation of flowers (E). اقتلاع تلك الزهر منأ ثابريه منها.

١١٧٩٨ - رَقَال، صَيَّاد السمك Ceryle (F).

Ceryle, Kingfisher (E). جنس طير من القريات، انواعه ١٤، موطنها الماء. يتكر ويصيدها في المناطق الخالية والمصلحة. تتميز بمناظريها القوية المسطحة، وابجنتها المتوصلة اللد، باذانها المرصية المستدرة وباصفاها القصيرة. الواجهات متعددة الاالوان لكنها بين القربى ورفقا وزمرا. انها تدر في صلعو المستور. تبيض ٧ بويضات تحضنها وحدها من ال ١٤ الى ١٦ يوما. احرف واشهر انواعها ما يلي.

١١٧٩٩ - رَقَال السَّال Ceryle alcyon (S).

Ceryle-alcyon (F). طائر من الرقالات، طولها يراوح من ٢٩ الى ٣٠ سم. لونه رمادي اللون ازرق المواجه. صدره مشع بالازرق. يلمه ابيض حلي. جنتاه مرتزبان بالابيض. ذنبه غيق الرقة الماجية. قوته الاسماك والقشريات والصفادع والورق والجنادب والجراد.

١١٧٩٠ - رَقَال شامع Ceryle rudis (S).

Ceryle rudis (S). Ceryle-alcyon (F). طائر من الرقالات، طولها نحو ٢٧ سم. رأسه قنري. الريش السطح. لونه ابيض الظاهر، ابيض الباطن والصدور واليدين. صدره مطوق بقلادتين نصفيين لونها الى السرة الفصحى. موطنه آسيا الغربية وافريقية الشرقية والشمالية. يالاف القشريات البحرية ويرب الانهر ويجاري الماء. قوته الاسماك الصغيرة والقشريات والصفادع والحشرات اعصها الجنادب والجراد.

١١٧٩١ - رَقَش Pelle (F).

Shovel (E). اداة يستعمل لجرف التراب ونحو.

١١٧٩٢ - رَقْش، لَزَاكَة Matolevée (F).

Replevin, With drawal (E). هو يقع سحر او ابطال فاعله رهن مقاري او مقايمة شمع في قضية.

١١٧٩٣ - رَقْش، تَحْل Dérangement (F).

Distorting (E). اخراج الشيء من التربة كالحراث في آخر التلم واربوية الشجرة والجذور المقطوعة الخ.

١١٧٩٤ - رَقْش الاعتِاق Levée de scellés (F).

Take of seals (E). عمل يقوم به القضاي المختص فيترفع الاعتام التي اصفاها بعد ان يتحقق من صلاحيتها.

١١٧٩٥ - رَقْش الفِركاب Dégrièvement (F).

Reduction, Allowance (E). هو ان ترفع الضريبة او تخفف من المكلف.

١١٧٩٦ - رَقْش اليد، كَفَّ اليد Démiselement (F).

Parting with (E). هو الانتعاش او المنع من ادارة مال او عين.

١١٧٩٧ - رَقْش هو تبن القرة.



رقال شامع



رقة الكسنة



Non rustique (F). No rustic (E). **١١٨١٥ - رَفْثَة**  
تمت ترجمتي يطلع على النباتات المطلوبة التي تستعمل  
التخصص في التربة والغنية بالملح.

١١٨١٦ - **رَفْثُوج** هو اصل كرب التل.

١١٨١٧ - **رَفْثِيل** \* Parodia, Stilet (F).

طار من الجوام من المناظر وخصلة القرويات. موطنه  
جنينة الجندية. يألف النباتات قوية الحشرات والاساريع  
والقديدان والآفات العنيدة واليزور البرية || جسم صغير  
القد يطول من ١٨ إلى ٢٠ سم. ثوب الذكر إلى السواد  
الحلي الاحمر اللامع. زوره وصدره والقدم الاسفل من  
عسرية الى الصفراء النحاسي الاسفم. رأسه متوج بست  
رفال دقيقة مستطيلة تتجهى بست سطحات صغيرة نحاسية  
اللون. الاثني حادة الزرقاء وثوبها البولي الى الشحنة  
السمر. زودها وصدرها وظهرها الى الشحنة الصفراء.



رفثاء الخدائق

١١٨١٨ - **رَفْثِيح** Turgide (F).  
Turgid, Swollen (E).

تمت ترجمتي يطلع على اعضاء الحيوان واثبات التي تتورم  
تلقائياً أو عرضاً تشبه وكأنها رافثة.

١١٨١٩ - **رَفْثِيلِد** هو نظرية القرويات، المطالب.

١١٨٢٠ - **رَفْثِيْدَكَة** Fleure (F). Fleure (E).

الرغبة وتسمى الرباط الجنين، غشاء يصنع بين التربة  
والقوة اي الزودين عند الحشرات.



رَفْثِيل

١١٨٢١ - **رَفْثِيْدِيْدَات** \* Rhipidoloma (S).  
Rhipidoloma (F). Rhipidoloma (E).

نصيلة حشرات مفترسة من رتبة شبكات الجناح. اجسامها  
المروعة قليلة المد، اما انواعها فتمتد ٨٥ منتشرة في  
معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها متوسطة  
القد، شبه اطيالية الشكل، تطول من ١٠ الى ٢٠ سم.  
بسطة اجسامها تتراوح من ١٢ الى ٣٠ سم. رؤوسها ناعمة.  
جهازها القوي نظامي. اذناها مستعرض. جفاتها مستطيلة.  
تاكثيرها قليلة للتص، بمجزة بلستان قريبة. ملابها مربعة،  
الفكية رباحية الاجزاء، المشفوية لثامتها. قرونها  
الاستشارية قصيرة ونحيلة. عيونها جانبية. زانها صغيرة،  
ثلاثية. كواسلها مستطيلة. اجسامها شبه مثانة. يأنف  
مخارية السم. مرازات اثنائها مستطيلة، مبطنة || تألف  
الحراج والنباتات. جميعها رافثة، لامة في دورها البري  
والحشري || اشهر اجسامها الرفيدة والبنقة والاثولة والاسنة.



رفثة

١١٨٢٢ - **رَفْثِيْدَة** \* Brenthos (S).

Brenthos, Brenthe (F).  
جنس حشرات سوسية غاشية من عفايات الاجنحة وخصلة  
الزقليات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق  
الحارة من الماين القديم والحديث || اجسامها مغزوية  
الشكل، مستطيلة. رؤوسها دقيقة، عظمها غائرة  
اللون، متنفقة القدم. قرونها الاستشارية غطيلة،  
محبة، تنقب عنه طرف الخلف، قبل انتقاله الى قوتها  
المواد الحشوية. تألف النباتات وتعيش تحت لحاء الانجار  
القابلة والميتة.

Ceufs des rapaces (F). **١١٨٠٧ - رَفْثَن**  
Eggs of rapacious birds (E).

الرفن : بيض كواسر الطير اعصاها المتعبان. الواحدة رفنة.

١١٨٠٨ - **رَفْثَنَاء** **اِرِيْثَنُوس** Erianthus (S).  
Erianthe (F).

جنس نباتات عشبية حولية ومعمرة من فصيلة النجيليات.  
انواعها المعروفة نحو ٢٠ منها واحد زراعي رئيسي.

١١٨٠٩ - **رَفْثَنَاء** **الْحَدَاكِي** \* Erianthus ravennae (S). Erianthe de Ravenna, Canne

de Ravenna (F). Plum-grass, Ravenna-grass (E). Woll-  
zucker, Ravenna seidengrass (D). Erba ravenna (I).  
نوع من الرفثاء وهي عشبة ثريبتية معمرة، تطول من المتر  
الى المترين. ساقها ليفية. اوراقها جامدة، صلبة،  
ذائقة، بتفصيص اللين. ازهارها حركولي التجميع هري  
الشكل يطول نحو ٦٠ سم. ازهارها ثوبها بنفسجية ثم  
تتحرف الى الالباض || ترغب في التربة الكلسية القليلة  
الرطوبة.

١١٨١٠ - **رَفْثِي** \* Ové (F). Oves (E).

تمت رمي يطلع على كل فيه شكله شكل الرنة اي  
البيضة.

١١٨١١ - **رَفْثِيْكَة** Rafnia (S). Rafnia (F).

جنس نباتات معقوفة التعريف على اسم العلامة اليوناني  
الدائري « رَفْن » . انواعها ٢٢ جميعها معمرة، معظمها  
بري وبعضها رئيسي. موطنها افريقية افريقية، منها  
الجبنة والجبلة. وهي تنتمي الى فصيلة القرويات الغراسية.  
اوراقها بسطة كاملة. نصلها وسيد العرق. ازهارها  
لا قياسية التجميع والارتكاز. كوروسها خاصة للتخصص  
اللاشمالي، قرويتها فراشية الشكل، راياتها مستديرة،  
يقلب فيها اللون الاصفر. ثمارها سفلية جالسة. زودها  
مستطيلة مغلطة || تتكاثر بالبر والعل. ترغب في  
التربة الدنيابة القليلة الانساج، الوارفة النمر الضوي  
المتمثل || اشهر انواعها الزبينية الثلاثة التالية.

١١٨١٢ - **رَفْثِيْكَة** **اِهْلِيْلِيْكِيَّة** Rafnia elliptica (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة صغيرة تطول من ٤٠ الى ١٠٠  
سم. قرونها مزاكية شفعية. اوراقها اطيالية الشكل  
تطول من ٥ الى ٨ سم. نصلها بحري اللون ذي الزام  
الاجبر. ازهارها محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع  
صفراء اللون || ازهارها يستمر من اواخر ايار الى  
اوائل تموز.

١١٨١٣ - **رَفْثِيْكَة** **ثلاثية** **الأزهار** Rafnia triflora (S).

نوع من الرفنية وهي جبنة ثنائية الشكل تطول من ٦٠  
الى ١٢٠ سم. قرونها منشية فارفة. اوراقها بيضيه  
الشكل مستديرة القاعدية، مدية الطرف. نصلها بحري  
اللون، عاكب المراج غليظ من ٥ الى ٨ سم. ازهارها صفراء  
اللون محورية الارتكاز، فردية او ثنائية التجميع || ازهارها  
يستمر من اوائل حزيران الى اواسط تموز.

١١٨١٤ - **رَفْثِيْكَة** **مُغْرَكَة** Rafnia angulata (S).

نوع من الرفنية وهي بجلة معمرة تطول من ٣٠ الى ٦٠ سم.  
قرونها مقربة الزوايا، غائرة، منشية. اوراقها مغزوية  
الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم. نصلها بحري اللون مدبب  
المقمة. ازهارها الى الصفراء الكبريتي || ازهارها يستمر  
طوال شهر ايار.

11823 - رقائقات \*  
Haut-fond (F).  
Shoal, Shallow (E).  
ساحل قليل النور.

11824 - رقائقة \*  
Funaria (S).  
Funaire (F). Funaria (E).  
جنس طحالب من فصيلة المرصيات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منها البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم. جميعها من الطحالب الشطئية الحولية التي تعيش في التربة. بعضها دقيقة صغرة تنتمي بإيكاس البرغ الحولية الشكل. سراسفها متراكبة تملأ أسافل السوق. يكثر وجودها قرب مشاعر القمم.

11825 - رقائقة \*  
Cartographie (F).  
Chartography, Mapping (E).  
الرقطة فن رسم الخرائط الجغرافية.

11826 - رقائقة حشلية \*  
Cartographie pédologique (F). Sol Mapping (E).  
فرع من الرقطة يختص بوضع الخرائط الحشلية.

11827 - رقائقية \*  
Cartographie (F).  
Chartographical (E).  
نمت تعريفها يطلق كل ما له علاقة بالرقطة.

11828 - رقائقة \*  
Trichilla (S). Trichillie (F).  
Trichilla (E). Mafurabum (D). Trichilla (I).  
جنس الحجار ومجمرات برية وزراعية من فصيلة الازديديات. أنواعه المعروفة زهاء ١١٢. أصنافها البلاد الحارة والاستوائية بعضها جالسة. أصنافها متفرجة الانتشار. أوراتها مركبة وتزيه يكثر فيها التثليث. أزهارها عككولي التجميع محوري وطرفي الارتكاز. أزهارها كبيرة القدر عطفلة الأوان لا تقاسم الانتظام البلي || أشهر أنواعها ما يتبع.

11829 - رقائقة \*  
Trichilla hirsuta (S).  
Trichillie bois de fer (F). Bestard Iron wood (E).  
نوع من الرقاق، مجمرته تملأ نحو ٤ أمتار، أوراتها مركبة خاسية، وريقاتها لا تقاسم الشكل، تصلها أزغب الصفحة السفلى. أزهاره عككولية التجميع، خلية البشرة، هاجية اللون. غشيه شديد الصلابة، أسمر اللون، قلعر الصفص | أزهاره يستمر طولها شهر حزيران.

11830 - رقائقة \*  
Trichilla glabra (S).  
نوع من الرقاق، مجمرته تملأ نحو ٦ أمتار، أوراتها مركبة ثلاثية. وريقاتها لافتة بيبضة الشكل مقطوعة القاعدة مدببة الطرف. تصلها جامد الصفحة بجمل أفضار اللاص. أزهاره عككولية التجميع مغلقة الشكل، لونها الأبيض الباهي. أزهاره يستمر طولها شهر حزيران.

11831 - رقائقة \*  
Trichilla spondiodes (S).  
Trichillie tendre (F). White butter wood (E).  
نوع من الرقاق، مجمرته تملأ نحو ٦ أمتار، غشها أخضر اللون، قليل الصلابة، سهل الانعطاف. أوراتها مركبة لا تقاسم التجميع، وريقاتها تعد ٧ أو ٩ أو ١١ وهي اعطيلية الشكل مدببة الطرف. تصلها جامد الصفحة الملساء، جمل أفضار الزمعي || أزهاره صفراء اللون، تبتية الملوحة، كثيفة التجميع، محورية وطرفية الارتكاز. أزهاره يستمر طولها شهر حزيران.

11832 - رقائقة \*  
Commerce des cortéales (F).  
Corn-trade (E).  
هي التجارة بالمحاصيل الزراعية.

11833 - رقائقة \*  
Hibernation  
نور الحيلة وتكادشها بعض اليت في الثبات وفي بعض الحيوانات والورديات || وهناك أيضاً الرقاد الصبي المعروف بالعمود الصبي، الحليه.

11823 - رقائقات \*  
Branchidae (S).  
Branchidae (F). Branchidae (E).  
فصيلة حشرات سوسية الشكل من غديات الاجنحة. اجناسها وأنواعها كثيرة العدد معظمها غشيب وبعضها يعيش برقة النمل في جلوج الاشجار القديمة النشرة || أصنافها البلاد الحارة والاستوائية || أشهر اجناسها الرقطة.

11824 - رقائقة \*  
Raffinose, Maltose (F). Raffinose, Maltose (E).  
نوع من السكر، يوجد خاصة في ثفل الشندر وفي الجزر وقد يستخلص من بعض أنواع الاروكاليتوس. بلوراته ابرية الشكل لا تقاسم الرصف.

11825 - رقائقة \*  
Chelys (S). Chélyde (F). Chelys (E).  
جنس سلاح من فصيلة الرقيات. أنواعها عديدة، جميعها مقترنة، كبيرة القدر، طولها يراوح من المتر الى المترين. رؤوسها مفلطحة، اصنافها مستطيلة سفينة الجمل. ذيلها قليل الاحدياب، قعره مربي الشكل بين التمديد || قوتها الامساك والقتليات والقضاد والقرير والورغ والحيات. وهي من السلاحف البدوية التي تسرح في الليل. تعيش في المياه العذبة وعلى غشاف الأبر.

11826 - رقائقة \*  
Contrôle (F). Control (E)

11827 - رقائقة \*  
Crithagra (S). Crithagre (F).  
جنس طير من الجوارم غروطيات المتأخر وضليسة الشفرويات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠ أصنافها معظم المناطق الحارة من البلاد الافريقية. ملجئها الحياتي جامي. اسرارها مغلفة الجلد. تألف الثنايات والبراري والمخلول المزدببة. قوتها الحبوب والبروز والحشرات الصغيرة حل اغطالها || اجسامها صغرة القدر ثرية الشبه بالوردي، تعلل من ١٢ الى ١٦ سم. ألوانها مزودة وبيضة يكثر فيها الاصفر والابيض والاشهب. مناقبها غروطية، قوية. اجنحتها كبيرة. أذناها مقعرة الاطراف || اعرف أنواعه وأشهرها رقاق الحليشة.

11828 - رقائقة \*  
Crithagra abyssinica (S). Crithagre d'Abyssinie (F).  
طائر من الرقاق. موطنه بعض مناطق الحليشة. يألف الثنايات والبراري. ملجئها الحياتي جامي. سره يبد أكثر من ١٠٠ زوج. قوته الحشرات والحبوب والبروز || جسمه صغير القدر تعلل نحو ١٥ سم. رأسه ألوانه الفشار الاسمر. رفاقه وذنبه الى الشفة السمره. صفراء وزودو الى الصفرة. جناحه الى الشفة يملأها تدبج اخضر. بطنه الى الرقبة المصانة الملوحة. ذنبه مقعر الطرف || الاثنى اصفر قدام من الذكر واقل تزويجه منه || يذئن في الاشجار ويركضه منه عند تصالب الاناث. الاثنى تحضن بتناوبة الذكر من ٣ الى ٥ بيضات حل ثلاث او اربع مرات في الحلي.

11829 - رقائقة \*  
Commerce des cortéales (F).  
Corn-trade (E).  
هي التجارة بالمحاصيل الزراعية.

11830 - رقائقة \*  
Hibernation  
نور الحيلة وتكادشها بعض اليت في الثبات وفي بعض الحيوانات والورديات || وهناك أيضاً الرقاد الصبي المعروف بالعمود الصبي، الحليه.



رق



رقاق الحليشة



رقاقمة



رقاع قائل

صغيرة غروطية . اضطهادها ذلقة ، مستقلة انفراج الشفق . زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة تمتد حتى الذيل . الصدرية مستعرضة . الحوضية محرمة . الذيلية نازقة ، حلالية الشكل . لحونها مأكولة متوسطة الصنف .

١١٨٤٦ - رَقْشَاتُ ٥  
*Malacanthidae* (S). *Malacanthidae* (F). *Malacanthidae* (E).

صلة اسمك بحجرة بيضيه من شاكيات الزانف . اجناسها وانواعها الممرقة قليلة المدد اعطائها بجار البلاد الحارة || اجسامها مبطلة ، مستطيلة ، شبيهة ، تطول من ١٨ الى ٢٦ سم . تتميز بهنفا الشدبة الصغر المهدب ، وبرؤوسها الصغيرة الغروطية الشكل . الذيلية نازقة الى القسلة السمره الفضية الملوحة || اشهر اجناسها الرقاقة .



رقاقة

١١٨٤٧ - رَقْشَانُ ٥ الرقان : الحناء والقران .

١١٨٤٨ - رَقْشَة ٥  
*Fasche* (F). *Faggot* (E).  
الرقية والصناعة والكيش : اغشاب وافصان واشباب توضع في مجاري الماء لاضراس السيل الطبيعي والتحصيل بعض الماء الى مجرى آخر .

١١٨٤٩ - رَقْشَة ٥  
*Mailure* (F). *Speckles* (E).  
رقشة مستديرة تتألف اللؤلؤ السادة تكون على اجنحة البعير .



رقشة الاجاس

١١٨٥٠ - رَقْشَة ٥ ، كورينوم ٥ ، خردكة ٥

*Coryneum*  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الرقنيات . انواعه عديدة منها مؤذية وبعضها شديدة الاذى || ويسته كتيبة محصورة للثآليل ، حمية او حسية الشكل ، كالثآليل كروية او شبيهة مستطيلة ، غشبية الانقسام ، مقفورة . انبعاث الى الصبغة الخفيفة || احرف ولشهر انواعه ما يلي .

١١٨٥١ - رَقْشَة الْإِجَاصِ ٥ ، كورينوم الْإِجَاصِ ٥  
*Coryneum folitolum* (S).

فطر مجهرى يركب اوراق الاجاص والفلح وقد يصيب الثآليل والاناث || مظهره الخارجى يقع لا قياسية الشكل تبدو سمراء اللون ثم لفضية تنفوخ بالنسج المتناثرة التي تبس وتتيزق || وهو على الثآليل يثور مبهمة ترسية السطح تركب البشرة وتنفوخ في اللب فتتصلب || يكثف كثير من الفطور المؤذية .



رقشة الوزيات (١)

١١٨٥٢ - رَقْشَة الْوَزِيَّاتِ ٥ ، كورينوم الْوَزِيَّاتِ ٥  
*Coryneum baijerinckii* (S). *Cribra de amygdalis* (F). *Blight of stone fruits* (E). *Dörrfleckenkrankheit des steinobstes* (D).

فطر مجهرى يصيب اكثر الوزيات منها اللوز والكرز والقدراون والمشمش والغوخ || مظهره الخارجى يقع صغيرة لونها الى الحمره ، اطرافها اسمر التهديب ، فطرها يراوح من ٢ الى ٥ سم . تركب فصل الادران خذبل السج المتناثرة وتسبب يأسها واختناها ونفخها || وهو على الاناث والافاناث يثور لثولية ترسية ، تركب السواد فطنها وتنفوخ مير السج في الاموية || وهو على الثآليل يثور صغيرة مستديرة مقفورة السطح ، كتيبة التجميع ، انبعاث الى الملوحة ثم تنصرف الى الاسمر . تركب البشرة فتتهدب وتصلب سطح اللب || افزاره لا قياسية القبع والتناثر لها منطقة ببولام شتى تنبذ الى البرية والمخج والمناخ والاقليم || يكثف باستمال مائل يورده او غيره من الفطور الحديثة .



رقشة الوزيات (٢)

١١٨٤٥ - رَقْشَة عَطَر ٥  
*Trichilia odorata* (S).  
نوع من الرقاق ، شجرته تملو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقه مركبة خماسية . ورقهاها اوليجية الشكل ، متصلها جليل الخشار يطول من ٦ الى ١٥ سم . ازهارها طرفية الارتكاز ، مستطيلة الذليبات ، صفراء اللون ، حطرية العرف المنسحب . ازهارها يستمر من اوتائل حزيران الى اواسط تموز .

١١٨٤٦ - رَقْشَة مُهْرَج ٥ ، خَشَبُ الْمَسْك ٥  
*Trichilia ametica* (S). *Trichilia musquée* (F). *Rosa tree of Arabia* (E).  
نوع من الرقاق ، منته الجزيرة العربية ، شجرته تنلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقه مركبة ثلاثية . ازهاره ليلكية اللون بكيفة التجميع ، طرفية ومجورية الارتكاز . غشبه شديدة الصلابة فانصر الصنف حطر الزائفة يدعى غشبه المسك || ازهاره وثماره طيبة مقبنة .

١١٨٤٧ - رَقْشَة آخَرُ الرِّاسِ ٥  
*Melanerpes erythrocephalus* (S). *Melanerpe à tête rouge* (F).

طائر من فصيلة النقراريات . موطنه بعض مناطق امريكا الشمالية . جسمه يطول نحو ٢٥ سم . يسلط نحو ٣٨ سم . لونه يقع الالوان . رأسه معتقه الى الحمرة الشفافة . ظهره وجناحه وذنبه الى السواد العايق . اياهه وبلطه وركبها الى البياض اللامع . حلقه عينه كسنتية اللون . منقاده وساقاه الى الزرقاة اسمره || اخلاطه رضية لكث كثير الحذر . قوته الحشرات واسارها ولا ينف من الثآليل البرية والثرامية كالثآليل والصغر والكرز والفلح والين ... || يذنب منه في تجاريف الاشجار المنفوخة . الاثنى تبيض من ٧ الى ١٢ بيضات تحضنها وسجها دون الذكر الذي يئن لما اللداه .

١١٨٤٨ - رَقْشَة نَاعِل ٥  
*Melanerpes formicivorus* (S). *Melanerpe fourmilier* (F).

نوع آخر من الرقاق . موطنه بعض المناطق الامريكية اغصنها المكسوك وكرونية || جسمه يطول نحو ٢٤ سم . يسلط نحو ٢٧ سم . لونه الى السواد اللامع يطو تقيز ابيض في الجناحين والصدر والاطلين . رأسه الى الحمرة الشفافة . منته سطوفة بقلادة كبريتية الصفار . حلقه عينه صفراء . منقاده وساقاه الى السواد الاسمر || اخلاطه رضية ، قليل الحذر ، لا ينفى الاقتراب من الانسان . قوته الحشرات على اخلاطها واغصنها النمل . يتنيز يتنيزن البلوط في تجاريف الاشجار فيؤن بذلك خذيرة فصل الشتاء والثلج || يذنب منه في نيسان في تجاريف الاشجار و بين اوراق البوكا . الاثنى تبيض من ٥ الى ٦ بيضات تحضنها وسجها دون الذكر الذي يئن لما اللداه .

١١٨٤٩ - رَقْشَة ٥  
*Uranometria* (F). *Uranometry* (E).  
الرقاعة ثنيان يحرم الرقيق كليا او جزئيا مع تحديد محورها الصادية .

١١٨٥٠ - رَقْشَة ٥  
*Malacanthus* (S). *Malacanthie* (F).  
جنس اسمك بحجرة من شاكيات الزانف وفصيلة الرقاقات . انواعها للممرقة ثلاثة موطنها بجار البلاد الحارة || اجسامها شبه رشيعة الشكل تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . رؤوسها

بيضية الشوزن ، قاعدتها اي وابطالها المتني اضعف من سنيتها اي طرفها .

١١٨٦٧- ركيبي هو البطيخ ، اطليه .

١١٨٦٨- ركيبات Chelydae (S).  
Chelydés (F). Chelydae (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاسل ، اجناسها وانواعها عديدة ، جميعها قازية مقترمة دجاجة المسرح . تألفت ليلية الطلية الرأكة . دقائقها ملحومة القليل والزغب . ذيلها يضيء الشكل نائي القتر الارسوبي القالب || اشهر اجناسها الفرق .

١١٨٦٩- ركيبي

هو الناطر من الحيات الخفية . ج ركب وركيبات .

١١٨٧٠- ركيبي الشمس راجع هليوتوب .

١١٨٧١- ركيبي خداع

Tarbophis trompeur (F).  
سنة من البوكافيات تدعى ناطر مأكو ، اطليه .

١١٨٧٢- ركيبيذكة Marcotte (F). Laver (E).  
النسن الذي يمسك ويرقد .

١١٨٧٣- ركيبيذكة Diagramas (S).  
Diagramme (F).

جنس اسماك بحرية من كاملات العظام شاككات الزمانف وفصيلة القرشيات . انواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك بحار البلاد الحارة || اجناسها اعاليجية الشكل ، مضطلة التعليل ، تطليق من ١٨ إلى ٢٨ سم . اولياها تراوح من البقرة الى الربة والطحلة جميعها فضية الموانع مرقوشة بالاسمر من الرأس الى الذيل . كثافة ريشها تفيض مع الانواع . تتميز بحياتها الكبيرة الجاسطة ، بظهورها المخسورة المزهر وزمانفها الظهري المستطيلة الشاككة القسم الاسامي || لحومها متوسطة الصنف ، مأكولة .

١١٨٧٤- ركيبيات الصدك

Leptostracés, Phyllocarides (F).  
رتبة من القشريات العليا ، فصائلها و اجناسها وانواعها قليلة العدد . جميعها صلبة القدر قريبة الشبه بالاربيان الصغير . حوضها مزينة . ارجلها الصدرية متساوية ثنائية المخادف || اشهر اجناسها التبلانة .

١١٨٧٥- ركيبيات المتأثير Tenuirostra (S).  
Ténuirostres (F). Tenuirostra (E).

مرتبة من الطيور الجوارح عديدة الفصائل والاجناس والانواع . اشهر فصائلها المدهديات والنتقولات .

١١٨٧٦- ركيبي هي الجريجر ، اطليه .

١١٨٧٧- ركاسة مُحَرَّزَة

Colydium crenatum (S). Colydie crénelée (F).  
Colydium crenatum (E).

حشرة دامة قرصاية من فصيلة الركايات ورتبة مضطلة الاجنسة . تألفت الارواح والحدائق والجائان . شتاتها ويرقاتها تعيش تحت لحاء الاشجار في سرايب الحشرات

١١٨٧٨- ركاسة الورديات \* كورييوم الورديات  
Coryneum microstictum (S).

فطر مجهرى واسع الانتشار ركب بعض نباتات الفصيلة الوردية اعصها لورد والعليق والزعور والقتب || مظهره الخارجي ليلع مسطلة بنفسجية او سمراء اللون ركب السوق القنية والقصبان النامية تسحب جفاف وتنضج الطرية والصلابة التي لا تلبث ان تلوى || يكافح باقتطاع وحرق الاعضاء الموصولة وينضج النبات ، يمد تطهير جرحه ، يسهل الفطريات الفسالة القريبة المتناثر .

١١٨٥٤- رتيعة Panachure (F). Sreak (E).

يقع يبيض في خضرة النبات .

١١٨٥٥- رتيعة سمكة بحرية ونبوية من اللاتس .

١١٨٥٦- رتيعة Fougerale (F).

Fern-patch, Fernary (E).  
مكان يكثر فيه الفخار والبرنس والقيشار وما اشبه .

١١٨٥٧- رتيعة حمراء Pie-rouge (F).

نمت وصني يبرر من شكل غاص من الثوب البش .  
فاخرة الرقاه الحمراء هي ذات الثوب الاحمر عليه يقع يبيض .

١١٨٥٨- رتيعة سدقاء Pie-noire

البقرة الرقاه السوداء هي ذات الثوب الاسود عليه يقع يبيض .

١١٨٥٩- رتيعة Grain, Texture

رتبة الشيء اصله الحكمي للموس . وتتمثل غاصة في التصير من صفت الخشب . فتقلى من غيب الجوز صلب الرتبة الناعمة وعن الازديت اصله الرتبة .

١١٨٦٠- رتيعة

الرتبة : شجرة عظيمة ، ساقها كالدبل ورقها كورق القرق ونمرا كالتين . ج رقب (السان) .

١١٨٦١- رتيعة Palmer elevé (F).

Raised palm-tree (E).  
الرتبة : شجيرة طويلة التي تقوى اليه . ج رقل ورتال .

١١٨٦٢- رتيعة

قال ابو حنيفة : الرتبة من اسرار البقول . وقيل : انها من العشب العظام تنبت مسطحة غضة كباراً وهي من اول العشب عربياً ، تنبت في السهل (السان) وما كان الجبازي .

١١٨٦٣- رتيعة Parterre (F). Flower-bed (E).

جزء من حديقة خصص لزراعة الزهور .

١١٨٦٤- رتيعة Hachurer


خط الرسم وتعبو بخطوط متوازية الامداد فارقة .

١١٨٦٥- رتيعة Œufs des vautours (F).

Eggs of vultures (E).  
هو يبيض النصور حل اختلاف اجناسها وانواعها .

١١٨٦٦- رتيعة Obovale, Obovâle, Obovoide (F). Ob-ovoid (E).

نمت تعريفى يطلق ، في علم النبات ، على كل ورقة



رقيقة الورديات .



رشي



ركاسة مُحَرَّزَة

١١٨٨٤ - رِكَاةة (F). Fixisme (F).  
الركانة نظرية بيولوجية تقول باستقرار الانواع الحيوانية ونباتية الحياة على حالتها .

١١٨٨٥ - رِكَب الْجَمَلُ هي الاثنية البيضاء، اطلها .  
١١٨٨٦ - رِكَبَان  
ركبان النمل: سوابقه التي تخرج من البطن في اوله .

١١٨٨٧ - رِكْبَة (F). Genou (F).  
ضو الركبل الامامية بين الساق والركبتين .

١١٨٨٨ - رِكْبَة ذات الكَرْسِيَّ Rochbah  
ركبة ذات الكرسي نيم نير من كوكبة ذات الكرسي .

١١٨٨٩ - رِكْع Flanc du montagne (F).  
Flank of mountain (E).  
ناسية الجبل . ج. ركوع وركع .

١١٨٩٠ - رِكْحَة Cour de ferme (F).  
Farm-yard (E)  
مساحة دار المزرعة . ج. ركح .

١١٨٩١ - رِكْوَر Doser (F).  
To put the right quantity (E).  
حدد نسبة المادة المضافة الى سائر اجزاء المركب . او  
حدد كمية المادة المضافة الجائر لتقويها واستعمالها في متة  
او ألف جزء من الملاء .

١١٨٩٢ - رِكْوَرَة Rejet, Rejeton (F).  
Shoot, Sprout (E).  
الفصيلة النابتة على ابروة الشجرة او على جذعها .

١١٨٩٣ - رِكْسِيَة \* (F). Rhexin (S). Rhexide (F).  
جنس نباتات حولية وسمرة ، بيرة وازينية من فصيلة  
المستويات . انما هو المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
والآخر جنسي معمر || سيقانها تنصب مربعة الزوايا .  
اوراقها متقابلة لائفة . ناصالها اهلالية الشكل ، نافرة  
البرق والاصباغ . خلية البشرة ، حيلة انفسار الالسن .  
ازهارها حركولي التجميع ، طرفي الاوتكاز . ازهارها  
خامسة البتلات ، كثيرة الالوان السطعية المنسقة .  
الوانها تتراوح من الاصفر الى الاحمر الابيضاني || تزود  
في الحقائق . ترطب في القارة المعتدلة الانتاج .

١١٨٩٤ - رِكْس، رِكْش، رِكْش Binage (F). Ploughing (E).  
كري التربة لتفكيك تماسكها حول النبات . ولان تغيير  
وطونها وتلطيف انفعالات الحماز وعمل الميكروبات  
المحوية .

١١٨٩٥ - رِكْل هو الكركرات المروف ، اطله .

١١٨٩٦ - رِكْلَة Botte de légumes (F).  
Bundla of greens (E).  
الحزمة من البقل .

١١٨٩٧ - رِكْلَة Artefact (F).  
Artifical, Artifact (E).  
الركلة البقل الصناعي الذي يذو في الحديقة المحيوية او  
الحلية النباتية بعد ساجتها بالثقاب التي تقضي على الحياة  
وقد تشبه بعض الشيء الماعالم الاسيانية .

الغاشية قوتها طراس الحشرات والمواد النباتية المفضلة ||  
جسمها صغير اقله يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبها الى السواد  
الضحي باستثناء الغديين فانها الى الجفوة تفرسها عند  
متصفها جلدة سوداء . رأسها كبير الجرم . حناتها بارزتان .  
زبانها غطيان ، صفيا الاطراف . فكها ضليخان .  
ظهورها قليل الاحديداد مستدير الخواصر اللاصف . غمدان  
متسايتا التحزير القاطب . ارسافها رباعية البقل || لها  
جبل واحد في الجول . تظهر الحشرة الجملدة في اوائل  
الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في الليل وتستنك  
في النهار || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول من ٦  
الى ٧ م. جسمها سحكي التركيب ، محبوس الظاهر ،  
مبطط اللدب ، سداسي الرواجب ، حطلي اللون ، اسمر  
الفراسيل والراس ، مهذب السكم من الجانبين في طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في آخر  
نلق ويته البرقة ضمن سلسلة خاوية الفشاء .

١١٨٩٨ - رِكَايَات \* (S). Colydiidae (F).  
Colydiidae (F).  
فصيلة حشرات دامتة قرضاية من وثية لمديات الاجنسة .

اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
العالم . تعيش تحت لحاء الاجار في سراديب الحشرات  
الخافية . قوتها طراس الحشرات وبرازها والمواد النباتية  
المتحللة || اجسامها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ،  
ستعمرة الترويس ، متباينة الزوايا المشاوية الفصل .  
كواسها واخمادها تلتك الانظار لما تتصل به من نقوش .  
جرامها مستطلة . ارسافها رباعية البقل || اشهر اجناسها  
الركاسة والديتية .

١١٨٩٩ - رِكَال ، وَعْثَة Lazérite (F).  
Lazarite (E).  
نوع من التراب الصلصالي الاحمر اللون يكثر بربوده في  
المناطق الاستوائية الرطبة . يتميز بوفرة ما يحويه من  
الاولوين واكاسيد الحديد . وهو عند جفافه ، او في المراتع  
المعدية الرطوبة ، شديدة الانحدار قليل الخير والانتارة .

١١٨٨٠ - رِكَالِي ، وَعْثِي \* (F). Lazériteque (F).  
Lazérite (E).  
صفة الركال اي التراب الصلصالي الاحمر اللون الشديد  
الاندماج .

١١٨٨١ - رِكَام ، رِكْمِي ، مِكْمَر \* Cumulo-nimbus  
Cumulo-nimbus  
ضيم تندر بالماءفة او بالمر القريب مظهرها كحل  
ملبدة متراكبة سمراء اللون منخفضة الارتفاع تصل الى  
امطار غزيرة .

١١٨٨٢ - رِكَام، رِمْل مَكْمَر Falun, Trex (F).  
Shell-marl (E).  
دواسب بحرية للملأ صدفية المنصر الرئيسي تحوي نحو  
٦٠ ٪ من كربونات الكلس و ٢٠ ٪ من الرمل تتصل  
كصدمات كلسية تقيد التربة والزرعة .

١١٨٨٣ - رِكَامَة Agglomérat (F).  
Agglomerate (E).  
الركامة الاعتلاط الطبيعي للزرات شق .



ركام



ركسية

## Sympodita (F). ١١٩١٠ - رَمَّانَة

الرَمَّانَة القسم القاعدي من زوائد القشريات يتكون من فصليتين تتهيأ بمقدولين بمقدولين منفصلين .

## Sympodique (F). ١١٩١١ - رَمَّانَة

نمت تعريف يطلق على كل عضو شكله الخارجي يماثل Sympodia (E).

## Nesocia (S). ١١٩١٢ - رَمَّانَة

Nésocia, Nesokia (F), Nesokia (E).  
جنس جرذان كبيرة القد أنثيا وادي عايقه . أخطاها قصيرة مقطوعة . أذناها مستديرة . أظفارها مستطيلة حراشف الجلد . أرجلها مستعرضة . أظفارها قوية . مخففتها تقيه قباج الخيزير . أركاها انفاق مستطيلة يتخللها دهاليز وصغير جانبيه || أنثاه سبعة موطنها الشرق . أعرفها ركين سرنيد وركين البنغال .

## Nesocia bangalensis (S). ١١٩١٣ - رَمَّانَة

Nésocle du Bengale, Nesokia, Rat du Bengale, Kok (F), Indian nesokia, Kok (E).  
نوع من الركين موطنه البنغال وبورما . طوله نحو ٥٠ سم . يعيش قرب الماء يحزن نحو ٢٠ كيلو من غلظ الجيوب يدغوا إلى الشتاء || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٤ دوسة .

## Nesocia bandicota (S). ١١٩١٤ - رَمَّانَة

Nésocle bandicot, Rat bandicot, Rat perchal (F). Nesocia bandicoost (E).  
نوع من الركين موطنه سرنيد وبورما وجنوب الهند . طوله يراوح من ٧٠ إلى ٧٥ سم . ظهر أرمه اللون . يمشي الأشول . قوائمها سود . أظفاره طويلة || أنثاه تضع من ٨ إلى ١٢ دوسة .

## Fibriste (F). ١١٩١٥ - رَمَّانَة

نمت تعريف يطلق على من يقر نظرية الركانة .

## Rollulus (S). Rouloul (F). ١١٩١٦ - رَمَّانَة

جنس طير من عارة الحجلية وفصيلة الطيوريات قريب الشبه من الجبل لكنه أشفق جسمًا وأطول ساقًا . قويه إلى الصبغة البرداء يملو تأذير وذوئيم || أنثاه أربعة موطنها الهند وبورما حتى ملقه .

## Brouter (F). To browse (E). ١١٩١٧ - رَمَّانَة

رم الحيوان الثبات : تناوله بفمه فأكله . وفي الحديث : « للبقير رَم من كل شجر » .

## Brachynidae (S). ١١٩١٨ - رَمَّانَة

Brachynidae (F), Brachynidae (E).  
فصيلة حشرات نافعة من رتبة عديدات الأرجحة . اجنتها وأنواعها كثيرة العدد تعيش تحت الحجارة وفي انفاق تحفرها في التربة الحسنة لأنها تفضلها على غيرها . تحمل في مؤخر بطنها جرابين كبيرين ينفتحان على الترح تغذت منها بسائل ينخرج في الهواء لونه إلى الطلعة البفراء يضيء في الظلام لانه لا يتخلل من التدفقور .

## Brachynus (S). ١١٩١٩ - رَمَّانَة

Brachyne, Bombardier (F), Brachynous, Bomber (E).  
جنس عنافس وأجنحة ناهمة من فصيلة الرنانات . أنثاه

## Reclusia (S). ١١٨٩٨ - مَكْلُوزَة

Reclusie (F), Reclusia (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرغويات سديجات الارجل وبصلة الجنسنيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة . جميعها عينة مقترنة . ملجئها الحياتي جامع . أسرابها وقررة البند || أصدافها رقيقة و صغرة القد . يعلية ، حلزونة الإقطاب ، بحرية اللون أو زرقاء .

## ١١٨٩٩ - مَكْلُوس ، مَكْلُوس

هو السوس ، نبات حسي طيب ، الحلبة .

## Agréat (F), Aggregata (E). ١١٩٠٠ - رَمَّانَة

مجموعة مواد مختلفة سبائك

## Empoter (F). To pot (E). ١١٩٠١ - رَمَّانَة

فرس في مركب أو في أصيص .

## Stolon ١١٩٠٢ - رَمَّانَة

رشد حوائط ينبت من الأرض ويتبرز له جذور عند المفصل تنبته من أمه فإذا فصل أصبح نباتًا مستقل .

## Stolonifère (F), Stoloniferous (E). ١١٩٠٣ - رَمَّانَة

نمت تعريف يطلق على كل نبات له ركب أو يتكاثر بركبه .  
Rhacoditum ١١٩٠٤ - رَمَّانَة

جنس طيور مجهرية من الشنيات . أنواعها قليلة جميعها ربة فائقة تلتصق الحفص والاشخاب في المواقف الظليلة الرطبة || مظهرها الخارجي نواص خلي ، متكون في الشكل ، كثيف التجميع ، أسمر اللون ينش جوانب قمر الدنان وبالإبراميل والمواقع الرطبة من الألية .  
Racumin 57 ١١٩٠٥ - رَمَّانَة

مسروق سام يرتكز على مادة الكوبرين يستعمل القضاء على الجرذان والثيران . واستعماله قد يكون أضرًا في المواقف المظروقة من هذه البورويات أو طمسًا ينشأ على يفس المواد التي ترض لها هذه البورويات اغصها الخيزر المنقوع والبطاطا المسلوقة وبنايا السمك واللحم .  
١١٩٠٦ - رَمَّانَة

Andropogon annulatus (S), Andropogon annulatre (F), Blue grass (E), Bartsgrass, Blutgrass (O), Barbons (I).  
نبات حشوي بري حولي معروف ويطي من فصيلة النجيليات . أروته قرصية ممراسة الاشطاء . أوارته عصفية التصل متصبة . سبائك كثيفة الزغب والخمل . يحسن اقتطاعه للعلف قبل الإسبال .

## Puits (F), Well (E). ١١٩٠٧ - رَمَّانَة

في البئر ذات الماء .

## Pileis (F), Piles (E). ١١٩٠٨ - رَمَّانَة

مجموعة أوتاد تترز في قمر الماء لتدعيم أسس بناء .

## Symode (F). ١١٩٠٩ - رَمَّانَة

Symode, Sympodium (E).  
نمت تعريف يطلق على كل جلع أو جمود متراكب السكم المتلاصقة المتزايدة ستة بعد ستة .



ركوب



ركيب



ركيزة



ركين البنغال



رول



رَمَّاتَة حَمْرَاء الرُّس

والزريق والسليتيوم || اما نسب هذه العناصر فلا قياسية لانها تختلف من نبات الى آخر وبين سائر اعضاء النبات الواسط || اما من الناحية الزراعية الاقتصادية ويوجه عام فتوصف ما يحوي الرماد من مختلف العناصر الغذائية الرئيسية يمكن تلخيصه كما يلي :

نوع الرماد	قشوري	يوتاس	كلس
اخشاب المحالوات	٣٥ %	١٠ %	٣٠ %
اخشاب الصنوبريات	٣٥ %	٦ %	٤٥ %
سوق التبنوخ	٣ %	١٥-٢٠ %	٥٠-٢٠ %

١١٩٢٦ - رَمَّادَة في فريون القنجر ، اطاليا .



رَمَّال

١١٩٢٧ - رَمَّال Rhinocryptus (S). Rhinocrypta (F).

طائر وسيد الجنس والنوع من الجواثم فضيلة الطيوريات . موطنه جزر الزايك . تألف النباتات وضفاف مجاري الماء . ملجئه الخافي جماعي . جماعته قليلة العدد . قوته الخمول والحشرات والبهتان والثمار الننية والبروز || جسمه صغير القند يطل نحو ١٨ سم . رأسه متوج بفتحة لينة مرتدة الى الوراء . جناحاه مثلاً الطويل ، ذنبه مقعوم الطرف . رأسه الى الشبهة القروية الخولج مثقبة بالايض . رداؤه وجناحاه وذنبه الى الخصار الاسف . زوره وسعد الى الشبهة . يطن الى الفتحة || يطن حث الى الانجرار الرقبة . الاثني تحسن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

١١٩٢٨ - رَمَّاس Emballonura (S).

Emballonura (F). جلس خلفهم من حمارة للرماسات . انواعه اربعة جميعها صغيرة القند مستطيلة الرأس القرطسية ، مجمة الفتحة . موطنها الملايو . تسرح من القس الى القبر . قوتها الحشرات . تعيش جماعات قليلة العدد . تألف الانجرار الحرجية والناور .

١١٩٢٩ - رَمَّاسَة Emballonuridae (F).

Emballonurina (F). حمارة من فصيلة الرماسيات . اجناسها سبعة تتميز باذنانها المنفصلة عن الفتحة الجدي || اما اجناسها فهي : الشمس والشمس والشمس والشمس والشمس والشمس .

١١٩٣٠ - رَمَّاسِيَّات Emballonuridae (S).

Emballonuridae (F). Emballonuridae (F). فصيلة من الخفاش . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، تبسها حمارة الرماسات والمحمارة .

١١٩٣١ - رَمَّادَة Arène (F). Arène (F).

الرمادة ميدان في وسط ملعب او نحو كان يصعد ، عند الاقلام من يوتان ورويان وفيرم ، كمترك المبارزة والمجاجة والمصارعة .

١١٩٣٢ - رَمَّال Arénicole (F).

Arénicole (F). نعت ترمي يطلق على كل حشرة تعيش في الرمال كالديدان وغيرها .

نحو ١٦٠ مثقفة في جميع العالم . تعيش تحت الانقاض والحجارة تقترس الحشرات الضارة وتقاوم عن نفسها بفساد فسقوري تغلق من غثي شرجها فينجبر عن رائحة كروية منتنة .

١١٩٢٠ - رَمَّاتَة حَمْرَاء الرُّس ، قَدَدَالِ اَحْمَر

Brachynus creptans (S). Brachynus creptans (F). Cracking brachynous (E). حشرة نافعة من الرماتات . تألف الاراضي الجصية الجبلية . طولها نحو ٩ م . رأسها يقدّم جيشها الى الحرة . محمداً ويطنها زرق . مولج ثوبها الى الحشرة المابقة . قوتها الاروق وبعض حشرات الاجنحة .

١١٩٢١ - رَمَّاح Pteridophora (S).

Pteridophora (F). جنس طير من الجواثم نباتات المتأثير فضيلة القرويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها وامرغها رباح ابرتي (P. Alberti) . قدره قدر السمعة ثوبه الى الصبهة يسر ويرق في الرأس والظهر والجناح والذنب ويترى ويصفر والصدر والبطن والاذنيك . يمشي برشتين لونها الى الزرقة الجصيلة المشعاع المولج تنشيان عند مدني الرأس طول الواحد منها نصف طول الجسم .

١١٩٢٢ - رَمَّاح الجحر Poison-pique (F).

سمكة بحرية تسمى عذابة ، اطاليا .

١١٩٢٣ - رَمَّادَة Polyodon (S).

Spatulaire (F). Polyodon (E). جنس اسماك نهرية من الاسماك فضيلة الرماسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها انهر ومجرات المناطق النائية || اجناسها كثيرة ، مستطيلة ، شبه وشية الشكل ، طولها من ٣ الى ٦ اذات . مسوكها مرفوعة بشمل خطية التركيب ، نجمة الشكل . رؤوسها حلقة مجهزة بزوائد خضروفية تمتد كالربع فوق القف . افواهها كبيرة ، مستعرضة الاشكال || تصاد من اجل صيدها ابله الصنف اما لحومها فيقله قل من يرغب فيها .

١١٩٢٤ - رَمَّاحِيَّات Polyodontidae (S).

Spatulairidae (S). Polyodontidae (S). Spatulairidae (F). فصيلة اسماك نهرية من اللامسات الجنايات . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اجناسها انهر ومجرات المناطق النائية || اجناسها مستطيلة شبه وشية الشكل . مسوكها مشعلة . رؤوسها مجهزة بزوائد خضروفية تمتد كالربع فوق القف . اشهر اجناسها الرماحة .

١١٩٢٥ - رَمَّاد لَبَّائِي Cendre végétale (F).

Vegetable ashes (F). هو ما يبقى بعد حرق المواد النباتية . تركيبة المتصري يسم الى فئتين : فئة النحاس الرئيسية التي تشمل الليتاسيوم والصوديوم والكلسيوم والمنيزيوم والحديد والقصفر والكلريت والسليسيوم والكلور . فئة العناصر الثانوية التي تشمل البروم والمنيزيوم والنحاس والزنك والكلوريت والنيكل والباريوم والسترونيوم والزنك والليتيوم واليتان والرماس والسليسيوم والزنك والبروم والباريوم والليتيوم والكلور والفضة والليسيوم واليود والبروم



رَمَّال

## ١١٩٢٢ - رَمَالَةُ الْمُتَوَسِّط \*

Ammodytes cicarellus (S).

Ammodyte cicarellae, Cicarella, Equille de la Méditerranée (F). Sand-cal, Sand-lance (E).

سمكة بحرية من فصيلة الرماليات . اصطناعها منظم شطوط البحر الأبيض المتوسط . تعيش متنمة في الرمال والأشواك || جلبها شبه ريشي الشكل ، مستندة المقدم والمؤخر . طولها يراوح من ١٥ إلى ١٨ سم . رأسها صغير الحجم . خطمها غزيرولي الشوذن . فكها السفلي يتقدم العلوي . زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل ، لامتناهية العرض ، تقطب الظهر واقسم . الأكبر من الذنب || توربا الى الزرقوة الخضراء بعليلها في جانبها جفة مستطيلة للألوان البنية وعلو الشرج بقعجة نحاسية || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه .

Ammodytidae (S).

Ammodytidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من السمكيات شاككات الزعانف . اجناسها وانواعها المحروقة قليلة العدد . اصطناعها منظم شطوط بحر العالم || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، تطول من ١٥ إلى ٣٠ سم . اعطتها دقة تتميز باستطاعة الفك السفلي والزعانف الظهرية والشرجية وعليلها من الزعانف المحروقة . حراشفها شديدة الصغر تكن في المسك || تعيش منظم حياتها متنمة في الرمال والأشواك ولا تقترب من الشطوط الا في فصل الصيف وأغريب أي في زين التسرقة حيث تلتقي ببرمها في الرمال فيلتصق ببعضها || أشهر اجناسها البرالة والشمون .

## ١١٩٢٣ - رَمَامُ الرِمال : البقل حين يثقل .

## ١١٩٢٤ - رَمَامُ \*

Punica granatum (S).

Grenadier cultivé (F). Pomegranate-tree Carthaginian apple (E). Echter granatbaum (D). Granato, Melagrano, Pomo punico (I)

شجرة مثمرة من الرمانيات . غروبها عديدة معظمها مأكول الثمار وبعضها سائل اللعوم شديد الحسوة يستعمل استعمال الحامض . يقال ان مهدها كان بلاد فارس وقد عمت زراعتها حوض البحر المتوسط وهي منتشرة في أمريكا من البريتن الى التشلي والمكسيك وأريزوله وكليفورنيا . وقد عرفها قدماء المصريين في عهد الفرعون رمسيس وارهاني ومن اشق الاسم القبطي « بن » والاسم العربي « رومن » ثم الاسم العربي « رمان » . تطول من ٣ الى ٥ أمتار . ساقها مساه . اوراقها بيضاوية الفسائل . فروعها منتصبة . خنثيا اسفر اللون لب الزرقه صلب المود . اوراقها متقابلة عابئة ، فصلها ريشي الشكل مالى البشرة . ازهارها غشوية ، كلها صلب القلفة خامي التخصيص . ثوبها خلسي البتلات الازهارية . اسديها عديدة . بعضها متعدد البريقات . ثمارها كروية خضرة مكللة باسنان الكاس ، تقودها صلبة متينة تبدو خضراء اللون ثم تتحول الى الحمرة مع اقترابها من الاذراك ، تلتف بزود صغيرة تسمى الفرند يحيط بها لب مائل شفاف لونه غشوة رقيقة ملونة . ينمو الرمان في منظم العالم حوض البحر المتوسط . يرغب في الاراضي المتوسطة الانتاج السميكة الثنود المسكن رجا عند الانتقاء لانه يفضل الرطوبة على الجفاف || يتكاثر بالبذر والتغصن والقرية والتطعيم || ازهار جميلة الشكل ولون تتركب باسم جلتار ، وهي طيبة ، قابضة ، طاردة للديدان انحصا البودو الوحيدة || ثماره للأكله لليلة

رمالة المتوسط



رمان



رمان بري



رمالة



رموسه

اللعوم ويستخلص من ثماره الحامضة عصر بعض شراب الرمان || ثمرجات ازهار صياغية خضها احر . تقود ثماره ولها مائه وقوف جلوده قابضة وتستعمل في البذابة .

Androsæma (F).

Androsænum (E).

نبات زهره مراكب الصفرة والحرة . حبه يشبه حبه الباق يتدلى به يتنع داء المفاسل ، اطلب هيفاريقون .

## ١١٩٢٨ - رَمَامُ السَّعَالِي

هو الخشخاش الابيض ، اطلبه .

Balaustion (S).

Balaustier, Granadrier sauvage (F). Wild pomegranate tree (E). Balausto, Melagrano salvatico (I).

شجرة بريه مثمرة من فصيلة الرمانيات ، ساقها شاككة . اوراقها كثيرة الفسائل ، فروعها منتصبة ، لدنة ، شاككة . اوراقها كاملة ، متقابلة ، سنانية الفصل ، عابئة . ازهارها مزدوجة التركيب مفرجة لدى الرث . ثمارها كروية صغيرة طعرا نحو ٤ سم . فروعها حازمة مرة لا تكلل || ازهارها وثمارها صناعية تستعمل في الصباغة واللبانة .

Grenada (F). Pomegranate (E).

ثمرة الرمان تختلط باختلاف الظروف . منها فزرة الصارة ، طرية الفرك ومنها صلبة الفركه ، متوصلة او قليلة الصارة . وبعضها لللب الطعم والذكاة او سامس او حازم او مز || عصارة الرمان تروي غليل النمل وتفيد الناقين ، تحليلها الكباري

% ١٦,١٤	مؤاد سكرية
% ١٧,٥٢	مؤاد استخلاصية
% ٠,٠٣	مؤاد دهنية
% ٠,٥٢	بروتايين
% ٠,١٧	حواض
% ٠,٧٣	ويساد

وقد جاء عن الامام علي قوله : « اذا اكثرت الرماله ذكراها بشمسها فانه دباغ للحمه وما من حبة منها تقوم في جوف رجل الا انارت قلبه واخرست شيطان الروسية » .

Punicaceae (S).

Punicaceae (E).

فصيلة نباتية قليلة الاجناس والانواع كانوا يعتبرونها في الماضي سبطا من الاسباط || أشهر اجناسها الرمان .

Rhombus maximus, ١١٩٢٢ - رَمُوسَة \*

Scophthalmus maximus (S). Turbot (F). Breet (E).

نوع من سمك الترس . سمكة يبيض من فصيلة الغروسيات وربية المسافات . اصطناعها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي وبحر الشمال . تعيش من اسماك اساطير التناف || جسمها شبه مستدير الشكل ، مبط الجرم ، يطول من ٨٠ الى ١٢٠ سم . ويعرض من ٦٠ الى ٩٠ سم . تتميز بالاستلقاء على الجانب الايمن بما يحيل منها الى الصفحة اليسرى من الرأس أي عكس ما تستل منه اسماك فصيلة المغلطح . جلدها غش القشار مبهر النطق . صفحتها اليمنى بيضاء اللون تعلوها رقيقة سمراء . صفحتها اليسرى الى الصبغة يطوها توشح اسود ورقيقة سمراء وصفراء . زعانفها الى الصفرة تعلوها رقيقة سمراء . رأسها مبط الجرم ، واسع الشق . فكها الاسفل يتقدم الاعل



Ophtalmie (F). Ophthalmia (E). رَمَحَة ١١٩٥٢  
الهاب في عين الإنسان تسبب عوارض مختلفة يمد تشخيصها  
وتقرر معالجتها إلى الطبيب البيطري .

١١٩٥٣ - رَمَد الكَرَم هو ابتداء الكرمة ، اطلبه .

١١٩٥٤ - رَمَد مُعْكَوِد  
Fluxion périodique, Ophthalmie périodique (F).  
Periodic fluxion, Periodical ophthalmia (E).  
عوارض معاكسة يصيب الخيل في حينها فيضيتها . يبالغ  
بالاستراحة واستعمال بعض الأدوية الخاصة التي يقررها  
الطبيب البيطري .



رعيه

١١٩٥٥ - رَمَرَام \* ، وَهَرَم  
Chenopodium murale (S). Asadrine des murs, Pette  
d'ole vraie (F). Wall goose-foot, Nettle leaved  
goose-foot (E). Gänsefüßel, Mauergänsefuß  
(D). Chenopodio dei muri, Zampa d'oca (I).

نوع من الأئينة وهو نبات عشبي بري طهي مسمر من  
فصيلة السرمقيات. أكله واجوده غواصاً ما نبت في الأرض  
الكسبية . وهو مضاد للتشنج . يدر البلغم ويوسع الشفحة  
ويذهب بالديدان الموية .

١١٩٥٦ - رَمَر \*  
Symbole (F). Symbol (E).  
رَنْز ج رموز. الرموز هي العلامات المختصرة المألوفة على أسماء  
العناصر والمركبات الكيميائية || ويرمز بذلك على اسم العنصر  
وعلى وزن القلعة الواحدة منه أي الأتوم || وقد ذكرنا  
في الجداول التالية رموز أشهر العناصر مع أوزانها الأتومية .  
اسم العنصر رموزه

Elément (F). Element (E).  
أزوت (نيتروجين) ن ١٤,٠١ N  
Nitrogène (E).

أوكسجين ا ١٦,٠٠ O  
Oxygène (F). Oxygen (E).  
ألومنيوم لو ٢٦,٩٧ Al  
Antimoine (F). Antimony (E).  
كبت ١٢١,٧٦ Sb

هيدروجين هـ ١,٠٠٨ H  
Hydrogène (F). Hydrogen (E).  
باريوم يا ١٣٧,٢٦ Ba  
Baryum (F).

بروم بر ٧٩,٩٢ Br  
Brome (F). Bromine (E).

بزموت بت ٢٠٩,٠٠ Bl  
Bismuth (F).

بلاتين بلا ١٩٥,٢٢ Pt  
Platine (F). Platinum (E).

بوتاسيوم بو ٣٩,١٠ K  
Potassium (F).

بور بور ١٠,٨٢ B  
Bore (F). Boron (E).

حديد حـ ٥٥,٨٤ Fe  
Fer (F). Iron (E).

خارصين (زنك) خـ ٦٥,٣٨ Zn  
Zinc (F).

ذهب ذ ١٩٧,٢٠ Au  
Or (F). Gold (E).

راديوم رـ ٢٦٦,٠٥ Ra  
Radium (F).

رصاص رـ ٢٠٧,٢١ Pb  
Plomb (F). Lead (E).

زئبق زـ ٧٤,٩١ As  
Arsenic (F).

٢٠٠,٦١ Hg هـ  
Mercure (F). Mercury (E).

اسنانها صغيرة ، ذرية ، وراعية الصفوف . صناعها  
مخبرتان ، نازحتان . زعنفتها الظهرية تمتد من قاعدة  
الذيل . زعنفتها الذيلية مستديرة الشكل || لها فاجر  
الصنف ، مرفوف فيه .

١١٩٤٣ - رَمَبُوتَان  
نبات يعرف باسم ليتشي اصفر ، اطلبه .

١١٩٤٤ - رَمَه  
Fourmi ailée (F). Winged ant (E).  
البرية : لفنة ذات الجناحين .

١١٩٤٥ - رَمَت  
Floitage du bois (F).  
Floating of wood (E).

الربث : خشب يضم بطيه إلى بعض ويركب في البحر  
وهو الطوف . وفي إحدى الطرق المتصلة لنقل الإخشاب  
في الأبحار .

١١٩٤٦ - رَمَث  
Caroxylon articulatum (S).  
Caroxyle, Caroxylon (F). Saltwort (E). Salz-  
kraut (D). Carosion, Call (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات ، ساقه وفروعه عقدية  
مدادة . أوراقه زهاء التصل كانوا يستخرجون منه الصيدا .

١١٩٤٧ - رَمَث نَتْن  
Caroxylon fastidum, Salsola fastida (S). Caroxyle  
fétide, Salsola fétide (F). Stinking saltwort (E). Stin-  
kende salzkraut (D). Erba kali pudente (I).

نبات عشبي بري من السرمقيات ، ساقه وفروعه مدادة ،  
أوراقه لملمة التصل الامرط النتن الرائحة . كانوا يستخرجون  
منه الصيدا .

١١٩٤٨ - رَمَحِي  
Hasté (F). Hastata (E).  
نمت وصفي يطلق على اتصال الاوراق الشبيهة بالرحم .

١١٩٤٩ - رَمَحِيَّة \*  
Doryanthos (S).  
Doryanthe (F). Queensland spear lily (E). Spear-  
blume (D). Dorianto (I).

جلى نبات زُرْبِي من فصيلة السوسنيات . أوراقه قرصية  
الجميع يوزكية الشكل تمد نحو الملة . شراخه الزهري  
ظليخ القاعدية منتصب يصل من متر إلى ستة أمتار . ازهاره  
كبيرة لونه شبيه الزئبق وتمادل جرمه || له لوان الزمعية  
السامية وريحية بلسم .

١١٩٥٠ - رَمَحِيَّة بَلْمِي  
Doryanthos palmeri (S).  
Doryanthe de Palmer (F).

نوع من الزمعية . أوراقها تطول من ١٧٥ إلى ٢٥٠ سم .  
وتعرض نحو ١٥ سم . تصلها جيل الخضر الملقح ينثي  
بمقتضى ذلقة حادة أسطوانية الحجم السوداء ، طليخ نحو  
١٥ سم . || شراخه الزهري يصل من ٢٠٠ إلى ٢٤٠ سم .  
انزهارها متفردي هربي ناجي . انزهارها قمية الشكل  
مستطيلة لونها إلى الحمرة .

١١٩٥١ - رَمَحِيَّة سَكَمِيَّة  
Doryanthos exotica (S).  
Doryanthe élevée (F).

نوع من الزمعية اوراقها تطول من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم .  
وتعرض نحو ١٠ سم . تصلها جيل الخضر ينثي بمقتضى  
سواء طليخ من ٥ إلى ٨ سم . || شراخه الزهري يصل  
من ٦ إلى ٦ أمتار ينثي بفصية كثيفة من الانزهار الزرقانية  
الشكل الاسطوانية اللون .



درام

11962 - رَمَكَة Jument poulinière (F).  
Brood-mare (E).  
هي الفرس تمتد للسل وليست من عتاق الحمل كالخمر.

11963 - رَمَل الرمل: التليل من المطر. والرمل: خطوط في قوائم البقرة الرشيطة مخالفة لسائر ألوانها.

11964 - رَمَلْ Sable (F). Sand (E).  
مادة صخرية دقيقة الجرم تنبت عن تفتت الصخور الكلسية والصوانية ويصوت بعض المرو || والرمال أنواع، أشهرها رمل البحر والبر والرمل ثم التليق والخنث والصواني والآخر ثم الرمل التسفلي.

11965 - رَمَلْ المَقَالَة، حَصَى المَقَالَة Gravelle, Cystite calculosa (F). Gravel, Calculous cystitis (E).  
شائبة صدرها تكون بلورات من بولاء الصودي في المثانة. تصيب خاصة الفجوان لمريضة السمنة.

11966 - رَمَلْ المتالع هو العذاب، اطلبه.

11967 - رَمَلْ تحلوي هو الركام، اطلبه.

11968 - رَمَلَاء البراء من التناج السوداء القوائم وسائرها أبيض. وأما التناج البيضاء فهي الزراء.

11969 - رَمَلِيَّ Sablonneux (F). Sandy (E).  
كثير الرمل.

11970 - رَمَلِيَّة هي الانباريا، اطلبها.

11971 - رَمَلِيَّ \* Ramalina (S).  
Ramalina (F). Ramalina (E).

جنس حزاز ينتمي الى فصيلة الرمالينيات. أنواعه المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم اصقاع العالم. مشاهير غمرقية، متشعبة، مشرشرة. كونها الى الحفار البحري الباهت. اما الانواع الثلاثة فهي:

11972 - رَمَلِيَّ الأَشْنَة

Ramalina orseille (F).  
ينمو ويتكاثر على الصخور في المواقع الظليلة. ويستخدم كاد صبغية حمراء.

11973 - رَمَلِيَّ الصُّخُور

Ramalina des rochers (F).  
ينمو ويتكاثر على صخور التيم والحضاب البحرية المرص.

11974 - رَمَلِيَّ المُرَّان Rameline du frêne (F).  
ينمو ويتكاثر على لحاء المران وسطم الاشجار الحرجية والتزيينية والزراعية.

11975 - رَمَلِيَّات Ramalinaceae (S).  
Ramalinaceae (F). Ramalinaceae (E).

فصيلة من الحزاز الذي يعيش ويتكاثر على لحاء الاشجار او على الصخور وليس في التربة. مشاهير غمرقية، شبه جلدية، لينة، متدلة الناعكة || اجناسها المروعة قليلة العدد أشهرها الرملين الذي يعتبر قيس الفصيلة.

Silicium	٢٨,٠٦	Si	س	سيليسيوم
Sodium	٢٣,٠٠	Na	ص	صوديوم
	٣١,٠٢	P	فر	فسفور
Phosphore (F). Phosphorus (E).				
Argent (F)	١٠٧,٨٨	Ag	ف	فضة
Silver (E).				
Fluor	١٩,٠٠	F	فل	فلور
Quartz (F).	١١٨,٧٠	Si	ق	تصدير
Tin (E).				
Soufre (F).	٣٢,٠٦	S	ك	كبريت
Sulphur (E).				
Cadmium	١١٢,٤١	Cd	ك	كاديوم
	١٢,٠١	Ci	ك	كريون
Carbone (F). Carbon (E).				
Chrom (F).	٥٢,٠١	Cr	ك	كروم
Chromium (E).				
Calcium	٤٠,٠٨	Ca	كا	كلسيوم
Chlore (F).	٣٥,٤٦	Cl	كل	كلور
Chlorine (E).				
Cobalt	٥٨,٩٤	Co	كو	كوبلت
Magnesium	٢٤,٣٢	Mg	م	منيزيوم
	٥٤,٩٣	Mn	م	منغنيز
Manganèse (F). Manganese (E).				
Cuivre (F).	٦٣,٥٧	Cu	نح	نحاس
Copper (E).				
Nickel	٥٨,٩٩	Ni	ني	نيكل
Iode (F).	١٢٦,٩٢	I	ي	يود
Iodine (E).				

11957 - رَشَش Bouquet de fleurs (F).  
Bunch of flowers (E).  
للانثاء، أي الباقة من الزهر.

11958 - رَمَص Mize bas des carniassiers (F).  
Cub (E).  
وضع السباح.

11959 - رَمَصِيَّة الرصية: آخر المير وذلك حين تحترق الأرض لان اول المير الرصية ثم الصفيقة ثم الكدنية ثم الرصية (السان).

11960 - رَمَصِيَّ \*، تيجيه

Rhamphocèle, Tife (F).  
جنس طير من فصيلة التترييات. أنواعه المعروفة ستة. موطنها المناطق الحارة من البرازيل والبلاد المجاورة. تألفت الادغال والحراج المبرشة الاشجار. نظامها العالي جماعي. اسرارها متوافقة المجد تكثر فيها القطة || اجناسها صغيرة القد. مثالبها غمرقية الشكل صغيرة. اجنسها متدلة الحجم. اذنانها متوسطة القد، مقطوعة الاطراف. اصباغها دقيقة. ألوانها جميلة الاوان يكثر فيها الاحمر القرمزي || جميع أنواعها تعيش على البنود وبعض الثمار السنية || تدان اشغالها في الادغال على ارتفاع ٤ او ٥ اقدام من سطح التربة. اناثها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بتناوبة للذكور نحو ١٤ يوما.

11961 - رَمَكَة

الرَمَكَة هي لون الرماد في الجبال. يقال في لونه رَمَكَة. والارمك من الجبال ما كان لونه الرَمَكَة، قال أبو حنيفة هو الذي اشتهت كتبه حتى دخلها سواد والاني رَمَكَة. ج رَمَك.



رمفويل



رملين



زنوس ثنائي اللون

خللي القشار يطول من ٤ الى ٨ سم. ثوبا متضارب الالوان، اسود الرأس والكتل، اصفر الظهران، اسمر السكة الشريية والجرايز. رأسها مستد الجرم، غروطي الخلف. فكها قويان. حينها مشيرة. زباناها عجيلان مقيسان. ظهرها سنان الشكل لا يلبس كامل البطن || لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمش في سكب. تسرح في التبار. تسلف في تموز. تمتع الككن لطناً مربية الشكل تحت حله الاشجار اليابسة وبعت الجلالة || البرقة عت بلونها لكال الجسودي طولها نحو ٨ سم. جسمها شبه مربي الشكل، مبط الجرم سداسي الراجب، حطلي اللون، اسمر الحاج، يمتد في الرأس والشرج || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوماً ينقضي طلياً من كل فلاف تحت السماء او تحت الجلالة.

#### Racmrie (F).

١١٩٨٢ - زميركا

جنس نباتات عشية برية حولة من فصيلة المشغاشيات مشهورة باسم سلبج، اطبا.

#### Agithalus (S). Réntz (F).

١١٩٨٣ - زميركا

جنس طير من فصيلة القرقنيات. انواعه المرفقة ستة اطبا المناطق الممتدة الحارة من العالم القديم || اجسامها صغيرة القد. منقدها غززية الشكل. اجنتها قصيرة، مستطلة الانفرج. اقلها مشيرة مطوية. ارفها قوية حشوية || قنسا الحشرات ويرقاتها ومكها وما اصطاعت اليه ميلاً من البزور البرية خاصة في فصل الشتاء || اعراف انواعها وظهرها الريز الكمل.



ريه مصفدة

#### Agithalus pendulius (S). Réntz pendulius (F).

طائر من الريز. صغير القد، طولها نحو ١٣ سم. رأسه وصفت وصوله الى الصبهة الرادية. بطة يبطله الى انباض الاخير. ظهره الى الصبهة الريد. قولمه وياهره سيد الصفة، ييش الحاشية الصبائية الحاج. كسلة حيه سيواه تمتد من قاعدة المتقاد الى الازن || اطناها تمتد من الشرق الاوسط الى اربية. يأنف المتاع وضفاف مجاري الماء || قوته الحشرات واليدان ويزور النباتات البرية || ييش عشه في الانفاق والمائل والمغاص. الاثن تقع نحو ٦ بيضات متحفها بمناوة الذكر نحو ١٣ يوماً.



وزير مكمل

١١٩٨٥ - زميركا

#### Prionurus (S). Prionurus (F).

١١٩٨٦ - زميركا  
جنس اسماك بحرية عاشية من شاكات الزعانف. انواعها المرفقة قليلة العدد. اطباها تمتد من مجار اليابان الى امريكا الجنوبية || اجسامها المظلمة الشكل، مبطلة، طولها من ١٥ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستطلة القد، مخصوة الانضمام الصغيرة للتشرة. حينها صغيرة ريدة الاكثران. زماثها الظهريه مستطيلة، قليلة المرض. زماثها الخلفية تتألف من منحس حصاد رضة شمع. الشريية تقابل الظهرية والذيلية مقرة. القليلات تزوج من السمرة الحطية الى السمرة السيواه يطوي في جواثها لطع قاطبة صفراء اللون او شقراء او سمراء || قوتها الاضباب البحرية. لوجها متوسطة الصف، مأكولة.



ريه

#### Macroscopic (F).

١١٩٨٧ - زميركا

هو ما يرى بالعين المجردة.

#### ١١٩٧٦ - زمينوس

Rhamnusium (S). Rhamnusium (F). Rhamnusium (E).

جنس حشرات من حمديات الاجنحة وصيلة القرقنيات. انواعه المرفقة قليلة العدد. اطباها تمتد من اليابان الى اربية || اجسامها متوسطة القد، طولها من ١٥ الى ٢٢ سم. اقلاها ثنائية اللون. تسرح في التبار. تظهر في ابرار ايار ويثبي سق اوساط ايلول || عرقها الاثرار الحربية. يرقاتها غاشية تركب الحور والودار والزيرون والقنقل. تنشر السماء وتسردب الشكير.

#### ١١٩٧٧ - زمينوس ثنائي اللون

Rhamnusium bicolor (S). Rhamnusium bicolor (F). Rhamnusium bicolor (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة القرقنيات ودية صفات الاجنحة. تألف الحقائق والياثان والسياسات الحية وضفاف مجاري الماء. غناضها غاشية تغطي من جميع اجزاء النبات. يرقاتها غاشية تركب الجلود والافصان تغلفها حتى الشكير وقد تغفل الحور والصفصان والذب على غيرها || جسمها متوسط القد ابيض الشكل يطول من ١٦ الى ٢٢ سم. ثوبا ثنائي اللون، رأسها وكسلاها وبطنها ويرامزا الى الاحمر القريدي، ظهرها الى الزرة يعلوا موج ينحسي عند الذكر. رأسها مستد الجرم. حينها كيرتان جاسطنان. زباناها كيرتان مقوسان. فكها ضليمان. ظهرها مشير الحور للاشع، متتابع التميزر القمدي القاطب. ارسافها رباعية القمل القاطرة || الاثن اكبر قدماً من الذكر واقصر زبانا منه وابتد ثوبا || جيلها ثلاثي الحلق. تظهر الحشرة الجملة في ايار وتمش في سكب. تسرح في التبار. تسلف بعد ظهورها باسبين. ترو الككن تحت قشور الجلود والافصان || البرقة عت الادراك تمام طولها نحو ٢٢ سم. جسمها اسطواني الشكل، مادم الفرج، اسمر اللون، اسود الرأس، ميشر الحلق الدقيق || طول الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٥ يوماً ينقضي في آخر نفق استخرته البرقة ضمن صليبة خاوية من المواد النباتية المحيطة بالريال.

#### ١١٩٧٨ - زمية، هين القطة

Bonduc (Frute)  
هو ثمج البندق الحدي، حيه حيم البندق المعروف اما يقل عه استدارة. يتغلل في لباب جامد حاجي اللون يحمي بيضه الاعدان الثالثة. وهو يتغير من المقويات ويستعمل في المنة كدليل الحشيات وقد تيش الانامي.

#### ١١٩٧٩ - زميركا

Saprophyte  
جهاز نباتي اولي نظري او جزئي ييش على الفضويات البالية.

#### ١١٩٨٠ - زميركا

Saprophyzism (F). Saprophyzism (E):  
حالة الاجسام الضاحية التي تعيش على المواد الضوية المتحللة.

#### ١١٩٨١ - زميركا مصفدة

Stenalia costacea (S). Stenalia costacea (F). Stenalia costacea (E).

حشرة وائمة غاشية دامت من فصيلة الرديليات ودية صفات الاجنحة. تألف البراري والاحراج القطة. غناضها تعيش على اثار واوراق الصيوليات. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة || جسمها صغير القد،

• ۱۱۹۸۸- رکتو

Oryzivore (F). ۱۱۹۸۸ - رکتلر •  
Oryzivorous (E).  
نمعت تمريفي يطلاق على كل حيوان او طير. قوته الارز.

Araponga à trois coroncules (F). رگگان - ۱۱۹۸۹  
 طائر ینھی آرہنفا ثلاثی المخاض ، اطلہ .

६१-११९९

**Rangifer (S). رَنْكِيْفَر - ۱۱۹۹۰**  
**Renne (F). Reindeer (E).**  
 جنس حيوانات، لينة بجرة من فصيلة الإيليات. اصطفاها  
 البلاد الباردة. قتها الاعشاب والأوراق وزينات الاشجار  
 وفولها والشحالب والفقوس || تعيش جماعات، اجلها  
 يمد من ٢٠ الى ٥٠٠ نفر. تجوز معظم الاصقاع الثلثية  
 في طلب القوت || انها تنقص من يافور الى يافورين.  
 لها نعان: البرية الثامنة واليرة الاسريكة.

۱۱۹۹۱ - رقة امریکه

أنواع من الرنة ، موطنها أمريكا الشمالية ، ضروبها أربعة : Caribou (F)، American reindeer، Caribou (E)، Rangifer tarandus caribou (S)، Renne américain، أجسامها كبيرة القند تملو من ١٢٥ إلى ١٤٠ سم. وزنها يراوح بين ١٧٥ و ٢٠٠ كيلو. أنوثتها إلى السرة يملؤها مواج أصهب || تلجس بصعوبة. لا يمكن استئصالها كالرنة الشائعة.

\* ۱۱۹۹۷ - رکتہ حکایت \*

**Rangifer tarandus (F). - رنة شائعة - ١١٩٩١**  
**Renna reinus (F). Common reindeer (E).**  
 نوع من الرنة ، موطنها البلاد الباردة الممتدة من الترويع  
 إل أقصى سيبيريا. جسمها كبير القدر يبلو نحو ١٢٠  
 سم. لها غليظ مستطيل. قربها كبيرة ممتدة تطيل  
 نحو ١١٥ سم. عنها قصير. أطرافها صلبة نازقة تحكها  
 كبركان. فرائها خمر. أخذها صلبة نازقة تحكها  
 السير على الثلج. ذنبا قصير طوله نحو ١٤ سم. فويها  
 إل البصرة يقيم مع اقترابه من لوج القطر ، يطلح ويبيض  
 مع البئر ويحت داخل القوام || تنبت بسهولة وتستعمل  
 استعمال البئر والحليب.

۱۱۹۹۲ - رکن

Rangia (S). ۱۱۹۹۲ - رنجه ۵  
Rangia (F). Rangia (E).

جلس حيوانات بحرية من الرنويات صفيفات انجاس  
 ريشية الرنويات. انوعها المحرقة قليلة العدد اعطتها  
 انوار وصيانت انهر امركة الوسطى والجنوبية ااصداها  
 ن يقيم الشون، متوسلة القذ والاصيداب متساوية  
 الصارع، لامساوية الاصلع. فنها من الخارج الى  
 البياض النمش والاضط بالكنتي والجروي، فنها من  
 الداخل الى البياض القلبي اللامع ااصوها امركة  
 جيدة الصف.

۱۱۹۹ - رُجُوسِیَات ۵

Protorthoptera (F). ١١٩٩ - رتجوسيات  
 Protorthoptera (E).  
 رتبة حشرات مقترنة من طيقة مستقيمات الجناح . اساقيرها  
 تمود الى الخلفين . الكروبيونية والبردية من الاباج الاول ||  
 الاسم العلمي يريز ان انها من اسلاف مستقيمات الجناح .  
 ترتيبها الرتجوسيات يلد حل ذلك .

۱۱۹۹- رنجیات ۱۵

11995 - رنجيات ٥.  
Ranglidae (F), Ranglidae (E).  
فضيلة حيوانات بحرية من الرضويات صفوحيات الخياشيم.

## رنة شائعة

## رغبة الكشمش

## رُغْبَةُ الْوَرْدِ

۱۱۹۹۶ - رنٹھوس ۵

١٩٩٦ - رينخوسا  
Rhynchosia (S).  
Rhynchosia (F).

۱۱۹۹۷ - رنجیہ ۵

**11٩٩٧ - رغبة** **Botyrosphæria**  
 جنس فطور مجهرية من الرورشيات يتميز بوظيفته الفائرة  
 تحت البشرة في نسيج اللحم. أعضائه خيطية مختلفة الأشكال.  
 بؤنه بسيط التركيب والتجميع، يضيىء أو أهليلجى الشكل.  
 أشهر أنواعه الخذوية رغبة الكشمش ورغبة الرد.

۱۱۹۹۸ - رنجیہ کشمیش<sup>۵۰</sup>، ہلاکوت

Botryosphaeria ribis, الكشمش  
Macrophoma, Dothiorella mali (S). Black-rot du  
grosellier (F).

فطر جهري يصيب الكفش وبفس الباتات الاخرى  
كالبوز والبطخ والجامس والكرية والجزر والبقال  
والفطر واليوسى || فطره الخارجي في الكفش وفي  
صغيرة مميزة تسبب القشرة بذيول يحمل بالفنوس  
|| ثم يت زولا الى الفتة فالنصن فالجلع || وهو في  
الاضطرابات وهم الفطرية صرم الفرم والبال بد أن  
يصطب الحليب ومنه الفطرية التي تبدو صها اللين ثم صراء  
وهو على الفطع بقم قرينة اللون في السرة تركب الاذن  
ويكتاف بقلم ورمي الاضواء المسابة نور ظهور الوصم  
والذيون ثم تطهير الجرحا بمطوب سلفات الحديد او  
سلفات النحاس

١١٩٩٩ - رَنْحِيَّةُ الْوَرْدِ \*

**Botryosphaeria dothidea** (S).  
 فطر مجهرى يسبب الورع فروعها || مظهره  
 الخارجى قروح جنية جامدة بارزة مبرقعة تملأ سطح  
 القشرة وتنشعب وتورق في الداخل فتلصق الشكير والالاف  
 الخشبية || يكافح بالقطع والحرق ثم التطهير بمحلول  
 سلفات الغندس .  
 ١٢٠٠٠ - ولقد هو الفار ، واحسنه زبدة .

١٢٠٠٠ - وكد هو الفار، واحده وكد.

۱۲۰۰۱- رندیر

Renne (F). Reindeer (E). رَنْدِيْو - ١٢٠٠١  
حيوان لبون مجتر من فصيلة الايليات يدعى رنة ، اطلها .

٧٠٠١٢ - ركنين °

١٢٠٢ - رنزين ٥ Rendzina

Calla(S). Calla, Choucalie, Callie(F). ركنس ١٢٠٠٣  
Calla, Trumpet lily (E). Schweinswurz(D). Calla (I).  
نبات عشبي بري جمهوري معمر من سبط الزنبات

Ranglidae (S). ١١٩٩٥ - رَنْجِيَّاتٌ ١٥  
Ranglidae (F). Ranglidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرنجيليات صفحيات ألتياشيم .



رئس النّاتع



رئشيت ازرق



رئشيت الكركرة



رئشيت خري



رئشيت مذهب



رئف للملك



رئفوت

صنّاعا كيرتان ناشرتان . زبانا دقيقان ، صقيان .  
ظهورها مثل الاحديان مطوّر الطرف المنقش نحو  
الاسفل . خداهما منتهات تنحيز ، كهيئة الجمل ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملة في اوائل  
الربيع وتبقى حتى اواسط الصيف . تتاهد بعد ظهورها  
باسيوس وتنش ولكن ميحادي في سوق الجار القليلة في  
قريب تخليجها تنمكها || البقرة عند الادراك تلام طول  
نحو ١٢ سم . جسمها دقيق الجرم مقوس الشكل ، تني  
اللون ، وردي المويج ، اسود الرأس والرجل ، حاد  
الرواجب ، تلبو ثلاثة خطوط من القدر فوق || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتغني ضمن  
جراب من التراب والمواد الغضوية المحيية بالرمال .

١٢٠١١ - رنّكف  
Poinciana (S).  
Poinciana, Poincilliana, Poinciana, Poinciana (F).  
Poinciana (E). Poinciana (D). Poinciana (I).

جلس شجيرات يرة ورئيتين من فصيلة الرئيتيات ، انواعه  
قليلة بعضها شاكك . اوراقها مركبة ريشية . ازهارها  
معتدلة التجميع جميلة للشكل كالأقلام اللون موزعة بالاحمر .  
اشهر انواعه الرئيتية الرئف الجليل ورئف الملك .

١٢٠١٢ - رنّكف الملك ، ورنّكف الجفنة  
Poinciana regia, Delonix regia (S). Poinciana superba, Flamboyant, Fleur de paon (F). Royal poinciana, Peacock flower (E). Poinciana (D). Poinciana regia (I).

شجرة ريشية من الرئف تملو من ٣٠٠ الى ٤٠٠ سم .  
ساقها رفيعة شاككة . اوراقها عابدة ، ازهارها هري  
الشكل . ازهارها كبيرة القدر ، صيرها فلاح مستحب ،  
لونها احمر برتقالي . اسديتها نارية اللون طول نحو ٢٠ سم .

١٢٠١٣ - رنّكف جميل  
Poinciana elaeis (S). Poinciana elaeis (F). Poinciana elaeis (E).

شجرة ريشية من الرئف تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم .  
ازهارها جميلة للشكل كبيرة القدر نارية اللون موزعة بالاحمر .  
ترقب في الاربة المخلطة والخصبة الانساج . تخش الرطوبة  
المستحكة .

١٢٠١٤ - رنّكف  
Poule couvresse (F). Brooding-hen (E).

هي الدجاجة الحاضنة للمروقة عند العلة بالقرقة .

١٢٠١٥ - رنّكفوت  
Rhynchotus (S).

طائر من فصيلة الرنّكفوت طوله نحو ٤٢ سم . رأسه  
صغير القدر . منقاره مستطيل . منقعه دقيق وطويل . ريش  
ظهوره وجانبه الى الصبغة تلوها خطوط سود معتدلة .  
انفكته متوسط القدر تنبلس الارض . يلبه اشهل الرئش .  
يلهو بصرة فائقة . يألف الاصراج والنباتات والمروج .  
قوته الجار والحبوب والخضراوات والامشاب || الانثى تنبلس  
من ٧ الى ٩ بيضات تحضنها وسعها نحو ٤ اسابيع . يقال  
انها تحفن ثلاث مرات في السنة .

١٢٠١٦ - رنّكفوتيات  
Crypturidae, Tinamidae (S). Crypturidae, Tinamidae (F). Crypturidae, Tinamidae (E).

فصيلة طير من الرنّكفوت ، اجناسه وانواعه عديدة .  
مهدا امريكة الجنوبية ، بعضها صغيرة القدر مستطيلة  
قصيرة القوائم || قوتها الحبوب والباز والاشباب والخضراوات .

وفصيلة الفلقاسيات . انواعه قليلة . اوراقه قرصية الانتشار  
زناذية متعصبة . رجعته الزهري خضراوي النضامة . جناح  
عينية الشكل متراكبة لينة .

١٢٠١٧ - رنّكف النّاتع  
Calla palustris (S).  
Calle des marais, Choual des marais (F). Bog-  
saur, Water dragons (E). Aronstab, Echthe schweine-  
wurz (D). Dragonet, Pleda di vitallo palustre (I).

لوع من الرئس يعيش في النّاتع وعلى ضفاف البحيرات .  
جسمه مراد . اوراقه قليلة الشكل طويلة الزناد المنصب .  
شراعه يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . شراعه ابيض الزهر  
يطول نحو ٧ سم . شمارة عينية متراكبة متراصة مرجانية  
اللون .

١٢٠١٥ - رنّكفيات  
Callies (F). Calla (E).

سبط من فصيلة الفلقاسيات .

١٢٠١٦ - رنّكفيت  
Rhynchites (S). Rhynchito (F).  
جلس حشرات من فصيلة السويات . انواعه عديدة تعيش  
على الاشجار المثمرة والحرجية . انواها زاهية الالوان .  
اجسامها صغيرة القدر ، ريقها غارة تلهم الارواق وتمتنع  
الصارة . اشهرها ما يتبع .

١٢٠١٧ - رنّكفيت ازرق  
Rhynchites caruleus (S). Rhynchite bleu, R. coupe-  
bourgeois (F). Apple twig beetle (E). Zweig-  
techer (D).

حشرة صغيرة القدر من السويات ، طولها نحو ٣ سم . لونها  
ازرق لامع . غطسها ريقها سيد . تركب الاشجار المثمرة  
اغصانها الاجاص والفتح . تقتصم مع ريقها الجرام  
الزهرية تنفسي عليها .

١٢٠١٨ - رنّكفيت الكركرة  
Byctiscus betulae (S). Rhynchite de la vigne, Cig-  
rier, Urber (F). Pear leaf roller (E). Rabensteher,  
Zigarrenmacher, Zigarrenwickler (D).

حشرة من السويات صغيرة القدر طولها من ٦ الى ٨ سم .  
لونها اسامع يملو مويج زرجدي . تنجح الانثى مكها على  
ورق الكركرة فيفتق من ريقات صغيرة دقيقة مستطيلة  
تقلل الارواق وتعيش في داخلها .

١٢٠١٩ - رنّكفيت تحفري  
Rhynchites bacchus (S). Rhynchite bacchus (F).  
Rhynchites bacchus (E). Purpurroter Apfelfrucht-  
stecher (D).

حشرة من السويات طولها راوح من ٥ الى ٦ سم . قوتها  
قربزي الون يملو مويج بنفسجي . تركب جميع الاشجار  
المثمرة . تغلب الجرام الزهرية لاصص صارتها تم تنجح  
مكها الذي يتغني من ريقات تملل الجار وتصلها .

١٢٠٢٠ - رنّكفيت مذهب  
Rhynchites suratus (S). Rhynchite doré (F).

Rhynchites suratus (E).

حشرة خاضلة ثائرة من فصيلة السويات ورئية مسلمات  
الاجنسة . تألف الجبان . غناضها تلهم برام الخوخ  
والفلفل ويتلاد الزناد والرواق القليلة . ريقها تنبلس  
في الثار وداخل مبياتها || جسمها صغير القدر يملو من  
٧ الى ٩ سم . قوتها ال اغصان النضامي يملو مويج ابيضاني  
ورئف اشقر . رأسها كهيئة الحمل ينهي بترك مستطيل .

**Melanospora (S).**

جنس فطور مجهرية من السناحيات وفصيلة السناحيات .  
أصابتها زئيفة ، بديئة ، بسيطة ، منفردة ، مستديرة ،  
عابقة اللون || تكاثرتا بديوية الشكل لا تكاذا لها ،  
سرية الانصلاص || يربطها ويسجد الخلية اسمر اللون .  
أنواعها الملوقة ثلاثة وهي ما يبع .

**١٢٠٢٦ - زؤففة الزؤففة \***

**Melanospora styranophora, Styranus stomontis, Dematophora glomerata (S).**

فطر مجهرى تركيب جلور الكثرة والباطما ويبرها من  
النباتات الثانوية || يعيش ويتكاثر في بيئة مشبعة  
الرطوبة || مظهره الحاربي يبع سطحية خلية مهددة لزينة  
المكس تركب الجلولر فتصلها || يكافح بتحفيض الرتبة .

**١٢٠٢٧ - زؤففة الزؤففة \***

**Melanospora damnosus, Sphaeroderma damnosus (S).**

فطر مجهرى يصيب القمح والشعير والشتوان || تركيب  
سلاسل القصب وأحمد الصفب نيزها يبع فصبة  
خلية سطحية تيق التمو وكذا الاسبال || أفرار زئيفة  
عمودة الأ اذا وأفها الموالل الطهوية وأصها بنجاف  
الربة والجر .

**١٢٠٢٨ - زؤففة المليون \***

**Melanospora asparagi (S).**

فطر مجهرى يصيب المليون فؤفؤه وقد يصيب يماس .  
تركيب السرق في أي وقت كان فيضل إمامها الحورية  
ويصيب أنفقات رؤوسها وأخرها نحر الأرض ثم جفافها  
قبل اكآال دورتها الحياتية || يكالسم منه بدء ظهوره  
بأصمكال اسد أنفواطير النعالة غير المركزة على التماس .

**١٢٠٢٩ - زؤفباب** هو قردوح شوت ، اطليه .

**١٢٠٣٠ - زؤفهام** ما لا يصيد من الطير .

**Impondérable (F).**

الرءبل ما كان غير قابل الوزن .

**Impondérabilité (F).**

الرجلة عدم قابلية الوزن .

**Tilletia**

هو أنخرية جنس فطور مجهرية .

**Tilletiaceos (F).**

هي الشخريات فصيلة فطور مجهرية .

**Seratus**

هو السدم نوع من القيرم ، اطليه .

**Rohdea (S).**

**Rohdea (F).**

تبات حشبي ، جلومري ، سبروتي ، عصر ، وسيد  
الجفس والنوع من فصيلة الزئيفيات . مهدد بنفس مناطق  
اليابان || أوزانها جلورية الانتشاب ، اعليجية الأشكال ،  
تعطون من ٧ الى ٩ سم . تصالما عادمة الزؤب ، مستعلة  
المرق . أنزراعها سنبل التجميع ، يبرق نحر ٣ سم .

**١٢٠٣٦ - زؤففة \***

تند في أنفوس تحضره بين الإدغال الكثيفة الشائكة .  
أنهر أجنتها الرزفوت .

**Rhynchichthys (S).**

**Rhynchichthys (F).**

سمكة مجرية يربض من شائكات الزعانف وفصيلة المتفديات .  
أصابتها المحيط الهندي والبحر الاحمر || جسمها متوسط  
القد ، بطول نحر ٢٤ سم . رأسها كبير الجرم . عظمها  
مدب الطرف . فكها الأمل يتقدم الأسفل . شفتها رصب  
الانقرع . ميناها كبيرتان ، جاسطتان . زعنفتها الألفية  
فارقة . أسفانها سفنة اخار شائكة . ثوبها الى الرمكة  
القضية للمواج يمين في الظهر ويژهو في الجانبين ويغير  
في البطن || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

**Clupea (S).**

**Hareng (F).**

جنس اسمك مجرية من فصيلة السابوقيات وأنواعه نحر  
٩٠ ، موطنها بجمار العالم أخصها بجمار المناطق الحارة .  
نظامها الحياتي جاسي . سرها يد نحر مليون سمكة . تجرب  
البحار في المياه الألفية حيث تكثر القشريات التي تركز  
عليها قتها . وقد تدغل مصبات الأنهر || اعرف أنواعه  
الرؤكة الشائعة وزؤكة البحر الاسود .

**١٢٠١٩ - رؤكة البحر الأسود**

**Clupea pontica (S).**

**Pontica herring (F).**

نوع من الرؤكة ، موطنها البحر الاسود ، ظهرها الى  
الرؤكة الرسامسية . جانبها الى الرؤكة البحرية القضية  
المواج تصلها خطوط دقيقة مستطيلة عابقة . بطنا فهي  
اللون والمواج . سرها نحر نصف مليون . تصاد وتؤكل .

**Clupea harengus (S).**

**Hareng commun (F).**

نوع من الرؤكة ، ظهرها الى الرؤكة ، جانبها وسطها  
فضية المواج . تكثر في المحيط الاطلسي . نادرة في المتوسط .  
سرهما من المليون الى المليونين . تصاد وتؤكل .

**١٢٠٢١ - رؤكة** نبات دقيق (اللسان) .

**Renanthera (S).**

**Renanthera (F).**

جنس نباتات أسية من فصيلة السطليات . أنواعها  
الحمرقة حنة . أصابتها تمتد من الهند الى ماليزية . يكثر  
ويجها في الغابات والاراج الظليلة الريلة وقد أنتشرت  
زراعتها القريبية المركبة منه معظم الشعوب التي تمتد  
بالانتماد || أوزانها مزدوجة التصفيف ، جلدية التماس  
المستطيلة الضيقة . ازهارها كبيرة ، خالصة البتلات  
المستطيلة ، شفوية التجميع الذي يبدو كالنظر . ألوانها  
الى الحمرقة منها القرمزي والاربعواني والاحمر الزاهي والاديس  
والوردي .

**Echoudage (F).**

لفح الحر يصيب لزوع من حنطة وشعير يد أنزراعها  
فيقصر حيه .

**Altitude**

**١٢٠٢٤ - زؤفهام \***

رداء كل شيء : ارتفاعه عن سطح البحر وسنوله . ومنها  
خطوط الرداء (Courbes de niveau) .



زئيفيق



رؤكة



زئيفة



رداء الزؤباب



رداء الزؤف



رداء المليون



رؤفة

Rhyscophila (S).

الرَّهْكَوِيلَا

Glossosoma (S).

الْفَلُوسُومَة

Agapezus (S).

الْأَغِيْطُوس

ويقوم على شراخ غليظ يرتفع نحو ٤ سم. أزعاجها صغيرة ،  
لبدة ، حمراء اللون || تنورنها يستمر من أيار إلى حزيران.  
تزدج القزتين ضمن البيوت وفي المصاري وفي الحدائق  
الداخلية .

Brouillard épais (F). Dens fog (E). رُهْل

١٢٠٤٥ - سحب رقيق جرار رذاذ كائى يغطي المناطق الجبلية .

Rhodens amarus (S). رُهْدَنْس \* ١٢٠٣٧

Bouvière (F).

سمكة نهريّة من فصيلة الحماة وفصيلة الشبليات .  
أصلها بعض أنهر الشرق الأدنى وادوية || جسمها صغير  
القد يصل من ١٢ إلى ١٥ سم. رأسها صغير الحجم ،  
قصير الخطم . لكنها الأمل يتقدم الأسفل . زعنفتها الظهرية  
صغيرة شبه هرمية الشكل . زعنفتها الذيلية عريضة ، مقعرة .  
ثوبها إلى الشهية السمراء اللقضية المولج ، تميز في الظهر  
ويبيض في البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٢٠٤٦ - رُهْمَانِيَّة (F). Rehmannia (S).

جنس نبات مغربي التبريد على اسم العلامة الرومي جوزيف  
رهمان (١٧٧٩-١٨٤١) . أنواع عديدة راسيوسية  
معمرة من فصيلة الخنازريات . سيقانها خضراء زاهية .  
أوراقها متعاقبة ، نصلها أطول من العرض ، مسنن الحافة .  
أزهارها كبيرة اللقد ، فردية التجميع ، أبطية الأبتكار .  
أشهر أنواعها الزينية ما يليج .



رهنس

١٢٠٤٧ - رُهْمَانِيَّة سَكَمِيَّة (S). Rehmannia alata

Rehmannia elevata (F).

عشبة معمرة منها الثرق الأصغر تمل من ١٠٠ إلى  
١٥٠ سم. أوراقها أطول من العرض ، مسنن الحافة .  
سيقانها خضراء زاهية . أزهارها كبيرة اللقد  
شعبي التجميع ، أسنانه مدنية حادة . أزهارها كبيرة اللقد  
تطول نحو ٨ سم. وردية اللون يصلها مزاج أبيضاني  
يتميز مع أقرانه من قاعدة الزهرة || أنزهرها صيفي .

Macronyx (S).

١٢٠٣٨ - رُهْدَنْك  
جنس طير من فصيلة القربيات . أنواعه قليلة أصلها  
البلاد الإفريقية . تتميز باستقامة ذواربها ، أجسامها  
صغيرة اللقد ، ألوانها إلى الوردية ، ظهورها مائلة ، ريشها  
أبيض الأفرات . يطير إلى الصبية . أنزورها مطوية بالأسود  
حواجب بعضها برتقالية اللون || أناتها تنش في الأذغال  
تبيض من ٣ إلى ٤ بيضات ، لونها إلى الزرقه يملوا يتبعج  
جلوي || قوتها الحشرات والبرور البرية .

١٢٠٤٨ - رُهْمَانِيَّة لَزَجَة

Rehmannia glutinosa (S). Rehmannia visquosa (F).

عشبة معمرة منها الصين ربابان تمل من ٣٠ إلى ٦٠ سم.  
ساقها غنية لزجة . أوراقها خالية النصل ، جزوية الصفة  
السفل ، غضراء البيا . أزهارها سفراء اللون موشمة بالآحمر ،  
أطرافها وردية ، حادها أبيض || أنزهرها يستمر من  
نيسان إلى حزيران .

١٢٠٣٩ - رُهْدَنْك \* رُهْدَنْك (F). Pyrrhuloxia

Pyrrhuloxia (F).

جنس طير يهدن في مشته من فصيلة القربيات . ألوانه  
قليلة تميز معظم حياتها على الأرض . أصلها البلاد  
الإفريقية . جسمها صغيرة اللقد . أجسامها تطول من ١٤  
إلى ١٥ سم . مناقيرها مخروطية قصيرة . وريشها سود ،  
عاسرها أبيض ، ظهورها إلى البصرة القرمزية ، بطونها سود ،  
غواظها إلى البصرة ، أجسامها إلى البصرة الربداء . أناتها  
مبلقة || أناتها تحضن من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة .  
تلد في الثرة بين الأذغال . حطنتها ثلاث بيضات ، لونها  
إلى الخضراء ، تملها رقيقة سمراء . ج رهمان .

١٢٠٤٩ - رُهْمَانِيَّة مُصَلَّعة البُرُور

Rehmannia angusta (S). Rehmannia à grains angustius (F).

عشبة معمرة منها الصين . تمل من ٦٠ إلى ٩٠ سم .  
أوراقها السفلى متعاقبة . نصلها لا يقاسي التفانيق ، حلي  
للبرية . أزهارها تطول من ٦ إلى ٧ سم . لونها إلى الخضراء ،  
قاعها بتسجسية ، أطرافها أبيضانية موشمة بالأبيض .  
برورها حادة الأزوايا مشعلة .

١٢٠٤٠ - رُهْمَنْكَة (F). Rhenanthe

Rhenanthe (F).

١٢٠٤١ - رُهْنَس (F). Foundation, Basis (E). Assise (F).

المرق الأسفل من الحائط .

١٢٠٤٢ - رُهْنَس (F). Pressure (E).

Hypothèque (F). Mortgage (E).

سحق حبي على عتار تأسية للدين .

١٢٠٤٣ - رُهْنَس (F). Pressure (E). شدة البصر لاستئصال المسطاح من المادة المقصورة .

١٢٠٥١ - رُهْنَس إِنْكَنْيَا

Hypothèque conventionnelle (F). Conventional mortgage (E).

هو الرهن العقاري الذي ينطق بتراضي الدائن والدائن .

١٢٠٤٤ - رُهْمَنْكِيَّات \* Rhyscophiliidae (S).

Rhyscophiliidae (F). Rhyscophiliidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة . أجسامها  
وأنواعها المعروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض جبال البلاد  
المتحدة الحرارة || أجسامها متوسطة اللقد حمراء اللون .  
أجنحتها الأمامية مقبضة أو موزعة . أما الخلفية لشعاعه  
مهدبة المختار الخلفي . قوتها الأمامية مجوذة بمنحس  
ظنبري الأبتكار || أسرارها توش في المياه للراكدة أما  
طليقة أو ملصقة بجلايب شبه البوية الشكل .  
أشهر أجناسها :

١٢٠٥٢ - رُهْنَس الْحِيَاكَة

Nantissement (F). Cover mortgage (E).

هو عقد ضمان حبي ينع بقتضه المدين أو غيره من إلى  
الدائن ضماناً لدية سواة مال ثابت أو متحول ويحول حقاً  
معيلاً على هذا المال .

١٢٠٥٣ - رُهْنَس حِيَاكَة الْعِقَار

Antichrèse (F). Mortgage of revenues (E).

عقد بيع وضع اليد على عقار المدين استيفاء لقوائد المال  
المطلوب .



رهنك

١٢٠٦٦ - رُوكَايْن مي النواجر .

١٢٠٦٧ - رُودَاد \* ، رَهْوُ الْجَنَّةِ

Tetractaryx paradisae (S).

Tétractéryx, Grue de paradis (F).

طائر من طول الساق ونسيلة الكركيات . اصطناعه تشمل البلاد الأفريقية وبعض المناطق الآسيوية يجربها في طلب الفرج والصيف والمشتى . يذلل حقه ويضرب ببشه في افريقية الجنوبية || جسمه كبير القند اجف القوائم مسطبل الذنب غرزي المنقاد . ثوبه الى الوردية الصنابية المواج باستثناء خط ابيض يمتد من قاعدة الفك الاسفل عبر الزور والمنتق ، الى اعالي الجرشن || وبشه مهذل مرغوب فيه .

Pis de la brabls (F).

Dug of swa (E).

١٢٠٦٨ - رُوكَايْن

في ثمل الشاة خاصة .

١٢٠٦٩ - رُوكَايْن اششاب السقت وسوامد البحر .

Coueurs, Ratites (F). هُودَاد

Ratites (E).

احد قسم الطير يشمل اربع فصائل التناميات والنبنيات والرتقيات والكوريات . اما القسم الثاني فيشمل الجرشيات .

Beve des bestiaux (F).

Slaver of cattle (E).

١٢٠٧١ - رُوكَال

لذاب اللواب ، وقيل لذاب الخيل خاصة .

Blennius pholis (S).

Pholis lisse (F). Shanny (E).

سمكة بحرية من فصيلة الجرشيات . اصطناعها بعض بحار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة || جسمها متوسط القند يطول نحو ٢٧ سم . رأسها مستقيم المكشك ، قصير الخطم ، صغير الشفق . صينها صغيرات ماصحات . زعنفتها الظهرية مستطيلة تمتد من الرأس الى الكليل . الشرجية ضيقة مستطيلة . الصغيرات مرويتان . الحوشيتان صغيراتان دقيقتان . الذيلية مقنطرة || ثوبها العلوي الى البطحلة السراء يعلوها مواج يراوح من الاخضر الى الفضي . يعلها الى البياض الاخير || لحمها مأكلي ، جيد الصنف .

Oiseaux nocturnes (F).

Nightly birds (E).

١٢٠٧٣ - رُوكَايْن

في الطيور التي تسرح في الليل .

Argentine vulgaire (F).

١٢٠٧٤ - رُوكَايْن

سمكة بحرية تقص فيس نفسي ، اطبا .

Caillé (F). Curd (E).

١٢٠٧٥ - رُوكَايْن

خيرة تلقى في الحليب ليروب .

١٢٠٧٦ - رُوكَايْن في تلك ، اطبا .

١٢٠٧٧ - رُوكَايْن هو الاربيان ، اطبا .

Ruppie (S).

Ruppie, Rupelle (F).

١٢٠٧٨ - رُوكَايْن

جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . انزعاجها المعروفة قليلة العدد مهاد الماء الاجاج في مناطق البلاد الحارة والمتحدة الحرارة . اوراقها غنية الرباط كأوراق النجيليات .

Hypothèque judiciaire (F). رَهْنُ قَصَّافِي

Judiciary mortgage (E).

هو الرهن القائم على حكم المحكمة أو المحكمين مديلا بالصيغة القضائية .

١٢٠٥٥ - رَهْوُ هو الكركي ، اطبا .

Grue (F). the Crane, Grus (E). رَهْوُ

المرح كوكبية نجوم جنوبية الميخ . نجوبها متوسطة المدد ، كاشمة الحربة .

Grue de paradis (F). رَهْوُ الْجَنَّةِ

طائر من طول الساق يسمى روكاد ، اطبا .

Phacocaea (S).

Phacocaea (F). Phacocaea (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبقيات .

Mouton maigre (F). Lean sheep (E). رَهْمُوم

تريف صني يطلق على اللحم الملهوالة .

Ambia

١٢٠٦٠ - رَهْمُوكَة

في المصلحة ، ضرب من سير اللواب .

Ahtacé (F).

١٢٠٦١ - رَهْمِيدَة

هو التحييب اذيق الحيك في كليل الحشرة ومعدا .

Merendère (S).

Mérendère (F).

لرات طبي دويص من فصيلة السورتيانيات ، جميل المذاق قريب الشبه السورتيان . فريصتها شبه غروبية الشكل . اوراقها من ٥ الى ٥ ، ناصها ثنائية تطول من ١٠ الى ١٥ سم . تكون مستقيمة في اول مهادا ثم تلف القرية . زهرتها كبيرة وحيدة بتفصية اللون مدمية اليللات تقوم على شمرخ متصب يرتفع من ٧ الى ١٢ سم . تنويرها يمتد نحو ثلاثة اسابيع ابتداء من اواخر آب || خواصها الطبية ومنافعها لا تختلف من خواص السورتيان ومنافعها .

١٢٠٧٣ - رَهْمِيلَة \* ، دَهْمِيرَا ، رَهْمُوم

Labao rohita (S). Rohita (F). Rohita (E).

ديبرا وروبو من اصنافها الحديثة . نوع من اللبيس سمكة نورية يمرض تنتمي الى فصيلة الشبقيات . اصطناعها اكثر انهر المحدث اصحابها انهار السنه وبرمانيه || جسمها كبير القند يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم . رأسها مستطيل الجرم ، مقطوم الخطم . فكها الاعل يتقدم الاسفل . صينها كوربان ، مستديراتان ، نازارتان . زعنفتها الظهرية واحدة شراعية الشكل . الصدرية سفلية الارتفاع . الذيلية نازقة . قوبها الى الخضار الاسمر تشته سموت مع الاقتراب من شبح الطهر وتشت عند البطن || لحمها متوسط الصنف ، مأكلي .

١٢٠٦٤ - رَهْمِيلِيَّات \* Calicicées (F).

Calicicées (E).

عمارة ظفور بحيرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجتناسها وانزعاجها قليلة تنضلل على الطحالب والحزاز . ومنها جنس واحد ينضلل على النباتات العليا يدعى قضاة .

١٢٠٦٥ - رَهْيَق هو الفرح .



رَهْمِيدَة



رَهْمِيلَة



رُودَاد



رُوكَايْن



نماها حول مسطبة متتابعة تتركز على اصلاح جمعة .  
تتمثل في المسالك والاحواض كوتج للاهلاك انماية .



روئية مسطبة

### ١٧٠٨٦ - روت الخريق °، كونيوليوم الخريق °

*Coniothyrium hellebori*

ضر مجهري يصيب اوراق الخريق فيفيها . مظهره الخارجي يقع مسطبة او يضيعة تركب ساقلة الفصل .  
تبدو مستقيمة ثم تنحرف الى السرة تنسحب يراس واتحات  
النجع المنارة || يكلف عند ظهوره ، باستمال اسد  
السوائل النسائية الخففة .



روت ابيس

### ١٧٠٨٧ - روت الزنبق °، كونيوليوم الزنبق °

*Coniothyrium cancrum*

ضر مجهري يصيب بعض الزنايق انصها الجريس فايوكا  
والهاجرة || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحم  
تركب نصل الارواق الجالنة . تبدو مطلا اللين جزوية  
الخمار ان تلقى على النجع المنارة تنسحب يباسها  
وانتفصلا || يكلف عند ظهوره باستمال السوائل النسائية  
الخففة .



روت الخريق

### ١٧٠٨٨ - روت الوردة °، كونيوليوم الوردة °

*Coniothyrium wernsdorffiae*

ضر مجهري يضر فروع واثاد الوردة فيسجلها . مظهره  
الخارجي يقع قسية مسطبة تبدو مستقيمة اللين ، مربعة  
الخمار الاجر ثم ترغ وتصلب كاللاكة || يركب  
الانواع الحساسة التي لا تتمثل في البرد || يكلف بانتصاح  
الافضاء الموصية ويظهر الجروع .



روت الزنبق

### ١٧٠٨٩ - روتون °، Rotone (F)

مادة فائلة تستخرج من بطور يمش النباتات البترية  
انصها اللويس والجراد والبرية || وهي مادة شديدة  
السمية فيذابتها يفضي حل جميع الحشرات وكل معظم الامعاك  
الصغيرة . اما لا يؤثر في الاناثا والحيوان الناجس .  
عاجل استعمالها في مكافحة الحشرات ينتشر بسرعة نمشة .

### ١٧٠٩٠ - روت °، Crotzin (F)

Dung of horses, mules, etc. (E).

سرجين الخيل وكل ذي سافر . امامة تسميه وفكة °  
وهو من الاسامة المضوية الثالثة الاستعمال . يهذه بنوع  
خاص الاتربة المنسجة لانه يخفف من تملك ذراتها  
ومعده بالحارة الثمانية من تخميره وبالمناسر انذائية  
التي يحولها || راجع حبوب ما يحول الفروت من عناصر  
في مادة سداد .



روت الوردة

### ١٧٠٩١ - روتة °، Bac des rapaces (F)

Bill of rapacious birds (E).

الروتة : منقار كوايس الطير . روتة الخنايب : منقارها .

### ١٧٠٩٢ - روتة °، Casio (F)

Casio (F), Casio (E).

جلس اسماك بحرية من شائكات الزمانف وفضلة الفرغيات .  
انواعه المعروفة نحو عشرة . اصحابها بحار البلاد الحارة ||  
اجسامها صغيرة لثة ، اطيانية الشكل ، متدلة التبط ،  
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . زانفتها الظهيرة مسطبة  
رنية المقدم ، شائكة القسم الامامي . زانفتها الدالية  
فاقة . الزوايا تختلف مع الانواع ، تكثر فيها الزفة  
وشفتاتها والركبة النفسية والقطعة الرصاصية || جميعها  
جيدة الصنف ، مأكولة .



روت

### ١٧٠٩٩ - روتية °، Robinia (S), Robinier (F)

جنس اشجار وجعيرات حربية وزينية من فصيلة القرنيات  
الفراسية . انواعها عديدة سيقانها متضبة شائكة ، اوراقها  
مركبة ريشية ورية التجعج . انزهارها عقودية الشكل ،  
ابلي الاكناز || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

### ١٧٠٨٠ - روتية مسطبة °، شجرة الجبراد °

*Robinia pseudoacacia (S)*

*Robinia faux-acacia, Faux-acacia (F), False acacia, Locust tree, Locust acacia (E), Gaminele schelinskazie, Gewöhnlichekaskazie (D), Robinia, Falsa acacia, Falsa gaggia (I).*

اعرف وأشهر انواع الروئية غروبية حربية عديدة متضبة  
الحجم والشكل وراكان الاشجار . اشجارها تمل من ١٥ الى  
٢٥ م . وريقات اوراقها لا تقل عن ٧ ولا تتفرق ١٩ .  
انزهارها عناقيد كبيرة تطل نحو ٢٠ سم . انزهارها عريفة  
الرائحة عديدة الازران يكثر فيها الالبش .

### ١٧٠٨١ - روتية لرجة °، Robinia vitacea (S)

*Robinier vitaceux (F)*

شجرة من الروئية تمل من ١٥ الى ١٥ م . ساقها  
وربها قليلة الشوك . نوابها غنية اللحاء الزينة اعدادها  
حر . اوراقها كبيرة اللد . وريقاتها من ١٣ الى ٢١  
نصلها انضاب الصلعة السفل . عقودها الزري متضبة  
الشكل يعمل من ١٥ الى ١٥ زهرة ودية اللين يطولها  
مواج ينشجي .

### ١٧٠٨٢ - روتية مهدبة °، Robinia kelsey (S)

*Robinier de Kelsey (F)*

شجرة من الروئية تمل من اللتين الى الثلاثة اعمار .  
ساقها وربها سرسة . نوابها مهدبة اللحاء اللينة الزينة .  
اوراقها مركبة من ٩ او ١١ ودية مسطبة النصل المائل  
البشرة . عقودها الزري يعمل من ٥ الى ٨ انزهار ، لونها  
ال الوردي المشج بالاحر . قوتها مبطلة مهدبة الشفور .

### ١٧٠٨٣ - روتية ودية °، Robinia hispida (S)

*Robinier rose, Acacia rose (F)*

شجرة تمل من اللتين الى الثلاثة اعمار . ساقها قليلة  
الشوك . فروعها كثيفة الغلب للشوك الاحمر اللين .  
وريقات اوراقها نمد من ٧ الى ١١ نصلها مائل  
البشرة . انزهارها ودية اللين . عقودها الزري يعمل من  
٧ الى ٩ انزهار عريفة الرائحة .

### ١٧٠٨٤ - روت °، كونيوليوم °، Coniothyrium

جلس فطور مجهريه من فصيلة الفصليات . بكتديتها  
كروية او مغلطة ، مخدنة للثأ ، سطحية الانتشار .  
جولها لحمي او متصلب الانسجة . شفيراته متشاككة .  
بوفانته يضيعة او اطيانية ، صغيرة ، وحيطة الخلية ،  
سمراء اللين || انواعها عديدة منها حيودة لا تكفي ومنها  
ضارة تركب الانصاف والارواق || اعرف انواعها المؤذية  
ما يتبع .

### ١٧٠٨٥ - روت ابيس °، كونيوليوم الكرم °

*Coniothyrium dipodiale (S), Coltre, Maledie de la grêle (F), White rot, Livid rot (E).*

ضر مجهري يركب حبوب العنب التي اصحابها البرد .

## ١٢٠٩٣ - رَوْتَل

Russula (S). Russule (F).

جنس تطور كاملة التركيب من فصيلة الفانيريتيات .  
أنواعه المعروفة كثيرة العدد اصطلحنا معظم اقاليم المناطق  
المعتدلة الحرارة . يعيش حسل المواد النباتية النضجة  
في الغابات والحراج . اطرافه قرحة ، متضاربة ، يضاء  
اللون او صفراء . يريه ابيض اللون او اصفر . بعض  
أنواعه لتليق العلم مأكول والبعض الآخر كامن الصف  
غير مرهوب فيه .



رَوْتَل اخضر اصغر

## ١٢٠٩٤ - رَوْتَل اخضر اصغر

Russula cyanocantha (S).  
Russule verta et jaune (F).

نوع من الروتل المأكول ، يكثر وجوده في الحراج الكثيفة  
الاجنار . اروسه شبه مقعرة الشكل ، ردية اطراف ،  
لونها الى الخضار الاصفر البهيجي المالح .



رَوْتَل شديد الخضرة

## ١٢٠٩٥ - رَوْتَل احمر

Russula foetida (S).  
Russule fétide (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات . ساقه  
خليفة ، معتدلة الانقطاع . اروسه شبه قلسوية الشكل ،  
مضلعة الحافة ، لزجة للمس ، كريمة الرائحة ، لونها  
الى السرة الصفراء المالح ، قطرها نحو ١٥ سم .



رَوْتَل مأكول

## ١٢٠٩٦ - رَوْتَل اصغر فاتح

Russula clavigera (S). Russule jaune clair (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يكثر في المواتع الرطبة  
قرب صفات بجاري الماء . اروسه لزجة للمس ، صفراء  
اللون ، قطرها نحو ٨ سم . ساقه يضاء . طعمه حلاط  
البيدق .



رَوْتَل مثقب

## ١٢٠٩٧ - رَوْتَل المتابع

Russula paludosa (S). Russule des marais (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يكثر في المناطق . اروسه  
لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ١٣ سم . لونها الى القوية  
البهيجية المالح .



رَوْتَل مثقب

## ١٢٠٩٨ - رَوْتَل زاهد

Russula conobrynia (S). Russule sobre (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .  
اروسه لزجة ، فارشة ، قطرها نحو ٨ سم . لونها الى  
الرمادي الاسمر . رائحتها كريمة . ملحتها حامز .



رَوْتَل

## ١٢٠٩٩ - رَوْتَل سمخجوني

Russula azurea (S). Russule azurée (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .  
اروسه مقعرة الوسط ، قطرها نحو ٤ سم . لونها الى الزرق  
السمنجونية . اطرافها يضاء اللون . ساقه الى الطلحة  
البحرية .

## ١٢١٠٠ - رَوْتَل شديد الخضرة

Russula nigricans (S). Russule noirissante (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في المناطق الحرجية  
الظليلة . اروسه كبيرة فارشة ، قطرها نحو ١٢ سم . لونها  
الى السرة اللثامة . ساقه مقعرة .

## ١٢١٠١ - رَوْتَل عكبي

Russula eardonia (S). Russule ardoinne (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .  
ساقه معتدلة الانقطاع . اروسه كبيرة ، قطرها نحو ١٠ سم .  
لونها يتغير مع العمر ، يبدو اصفر ثم ينحرف الى الرمادي  
ويتهيئ بالبنفسجي المتقي المالح .

## ١٢١٠٢ - رَوْتَل مأكول

Russula vesca (S).  
Russule comestible (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في الغابات الظليلة .  
ساقه قصيرة . اروسه قلسوية الشكل ، قطرها نحو ٨ سم .  
لونها الى الحمرة الغنية المالح .

## ١٢١٠٣ - رَوْتَل مدققي

Russula sanguinea (S). Russule sanguine (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج الصنوبر .  
ساقه معتدلة الانقطاع ، وردية اللون . اروسه الى الحمرة  
الشموية ، قطرها نحو ٧ سم .

## ١٢١٠٤ - رَوْتَل مذهّب

Russula aurata (S). Russule dorée (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان  
والملول . ساقه معتدلة الانقطاع . اروسه فارشة ، مقعرة  
الوسط ، صفراء اللون ، خضية المالح .

## ١٢١٠٥ - رَوْتَل مقيي

Russula emetica (S). Russule émétique (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .  
ساقه يضاء اللون . اروسه فارشة ، برتقالية اللون ،  
قطرها نحو ٨ سم . طعمه حريف المذاق مقيي .

## ١٢١٠٦ - رَوْتَل مكلوخ

Russula adusta (S).  
Russule brulée (F).

نوع من الروتل المأكول . يكثر وجوده في حراج السديان .  
ساقه قصيرة . اروسه فارشة مقعرة الوسط ، سمراء اللون  
كلها مغفرة ، قطرها يراوح من ١٠ الى ١٢ سم .

## ١٢١٠٧ - رَوْتَل لزيه

Russula integra (S).  
Russule intégrè (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في حراج  
الصنوبريات . ساقه قصيرة ، يضاء اللون . اروسه  
مقعرة الوسط قطرها من ٥ الى ٧ سم . لونها الى الكسفي  
الاصفر المالح .

## ١٢١٠٨ - رَوْتَل هش

Russula fragilis (S).  
Russule fragile (F).

نوع من الروتل الكامن الصف . يوجد في الغابات .  
اروسه مقعرة ، هشة ، سريمة الطبع ، قطرها من ٣  
الى ٤ سم . لونها الى الودي الاجبر المالح . طعمها حامز  
المالح .

## ١٢١٠٩ - رَوَحَا ، روية ، تشدو ، تعامة امريكية

Rhen (S). Nandou (F). Nanou (I.).

جنس طير من فصيلة التماميات . انواعه ثلاثة ، موطنها  
امريكة الجنوبية . تتميز بنم قدمها حل الطيران . يبلغ  
متوسط ارتفاعها نحو ١٦٥ سم . الذكر اصغر رافع من  
الانثى || ريشها مودل نام . عنقها مستطيل القذ شال

١٧١١٨ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ\* ، سَخِ السُّفَّاحِ\*  
*Rosellinia radiparda* (S). Pourridé du pommier (F).  
 فطر مجهري يصيب جلود التفاح فيفينا. مظهره الخارجي  
 عفن أبيض ثم اسفر ركب جلود التفاح فيصطب جرادتها  
 ويسيب انحلالها || اما اوزك الاجزاء المسماة خبث  
 متكتفة التصل ، قامة اللون ، قليلة الحيوية || يكالغ  
 باستعمال التنقيط والتطهير.



رود

١٧١١٩ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ\* ، سَخِ الثُّوتِ\*  
*Rosellinia aquila*, R. byssidea, *Sphaeria aquila*,  
*Trichosporium fuscum*, *Spororchium fuscum* (S).  
 Pourridé du mûrier (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ البُن

فطر مجهري شديد الاذى يصيب جلود التوت فيصطب  
 وقد ركب جلوح بعض الاجزاء الحرجية اليابسة اعصابها  
 السديان واليترو والصنصنات والعرور || مظهره الخارجي  
 عفن ابيض يشاء وطش اسمر ، ركب جلود التوت  
 فيصطب حل جرادتها ويسيب انحلالها ويوت الشجرة . يكثر  
 في الآرية للندجة الرطبة ويفط في زن الاوراق .  
 يكالغ بتصفيف القرية واستعمال الاجزاء الحية وتطهير  
 مولاتها بالكلس الحراق وسلفات الحديد .



رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّفَّاحِ

١٧١٢٠ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ\* ، سَخِ  
 السُّدِيَّانِ\*  
*Rosellinia quercus* (S).  
 Pourridé du chêne (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الثُّوتِ

فطر مجهري يخمد الانتشار يصيب جلود السديان  
 ويقره من الاجزاء الحرجية كالقايوب والاسعدان والزنان  
 والصنوبر والتوت || مظهره الخارجي عفن شفاف ثم  
 اسحل قاسر يقتسم مشائل الاجزاء الحرجية المذكورة اعلاه  
 فيركب جلورها ويصطب ويصق ما د الاذى . اما  
 السديان فانه يذبه حتى حر عشر سنوات .



رُوزَلِيَّةِيَّةُ السُّدِيَّانِ

١٧١٢١ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَاكُو\* ، سَخِ الكَاكُو\*  
*Rosellinia pepo*, *Dematophora* (S). Pourridé du  
 cacaoyer (F).

فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة يصيب  
 الكاكو ويركب جلود الحشبات واصفرار  
 الاوراق وسقوطها ويؤخر نمو الثمار ويصطب || مظهره  
 الخارجي كتلة من العفن الاسود المذهب بالاصهب والاسفر  
 ركب الجلود فيصطب || يكالغ بالاستعمال والتنقيط  
 وتطهير.



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَاكُو

١٧١٢٢ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَرْمَةِ\* ، سَخِ الكَرْمَةِ\*  
 رُوزَلِيَّةِيَّةُ الشَّجَرِ المَصْرَةِ\* ، سَخِ  
 الشَّجَرِ المَصْرَةِ\*  
*Rosellinia necatrix*, *Graphium necatrix*, *Dematophora*  
*necatrix* (S). Pourridé de la vigne, P. des  
 arbres fruitiers, Blaquez (F).



رُوزَلِيَّةِيَّةُ الكَرْمَةِ

فطر مجهري ركب بعض التباينات الزراعية فيفينا ،  
 منها الكمية والاساس والموخ والذنان والوزر والحشبات  
 واشندرو والبطاطا والبقول والورد والارض شوكي || مظهره  
 الخارجي فطرية يشاء تسمى الجلود فيصطب جرادتها ويتسبب  
 انحلالها وموتها || يكثر في الآرية الطينية الرطبة || يكالغ  
 بتصفيف القرية نصرف المياه الزائدة ويثر الكلس وطهر  
 في المياقل والقرامات المرمية . ويصطب مفلور الكرم  
 سحتا في القرية بمعدل ٢٥٠ غ لتر المربع الواحد .



رُوزِيَّةُ مُجَمَّع

١٧١٢٣ - رُوزِيَّةُ مُجَمَّع\*  
*Rozites caperata* (S). *Rozites ridé* (F).  
 فطر مأكول من فصيلة الفارغيتيات . يوجد في غابات

من الریش . رأسها صغير مبسط ، متقاربا مغلطح . تألف  
 البراري الشاسعة الاطراف والحشبات القليلة الاجزاء .  
 قوتا الاغصان والحشرات . تعيش جهامات قليلة العدد ،  
 تتألف من ٦ او ٧ ذات بقودها ذكر واحد || الاثني  
 تعيش نحو ٢٠ يضة . النسوما صاحي الشكل تنلفه  
 بالحشيش الناعم . الاكازر وحده يحسن البيض من الترويب  
 الى الترويق .

*Spiritualismo* (S).

*Spiritualism* (E).

الروسانية مذهب القائلين بان النفس غير حيوية .

١٧١١١ - رُوزِيَّةِيَّةُ\*  
*Melogrammatodes* (F).

عارة فطور مجهرية من فصيلة الحشريات وربية اقيات  
 تتميز بويضة وسادية تبدو غائرة في التمسج ثم بارزة .  
 اصحابها سحلية . يعلها مختلف التمسج || لها جنسان  
 مؤنثان هما الانثوسية والزئقية .

١٧١١٢ - رُوزِيَّةِيَّةُ\*  
*Rodge* (F). *Grinding* (E).

الرودية القيام بعملية الردج .

١٧١١٣ - رُوزِيَّةِيَّةُ\*  
*Ontogénese*, *Ontogénie* (F).

*Ontogenesis*, *Ontogeny* (E).

الرودية علم نشوء الافراد وتطويعه .

١٧١١٤ - رُوزِيَّةِيَّةُ\*  
*Fusus* (S).

*Fusum*, *Fusus* (F). *Fusus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منليات الابليل  
 وفصيلة البصليات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٦٠  
 منتشرة في جميع بجان البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اما  
 انواعها المنقرضة وبعدها نحو ٥٠٠ فطها من مصبرات  
 الحنفية الجيرية || اصداها شبه يشمية الشكل ، بحلة  
 الاالوان والزئقية ، حلزونة ، مسطلة القوقعة التي تبدو  
 كالزئراب . اطولها ذراع من ٥ الى ١٦ سم . || جميعها  
 منقرضة وقد كتشبت اصداها غيرها من الرخويات .

١٧١١٥ - رُوزِيَّةُ\*  
 هو السديان المزلة ، اطلبه .

١٧١١٦ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ\* ، سَخِ  
*Rosellinia*

جنس فطور مجهرية من البصليات وفصيلة البصليات  
 تتميز باصاها القسمة السود التي تنشأ في وسط ليفة  
 الفطر . ويوها سيد الخلية اسر اللون تحبث كاتمسطيلة  
 تعصب التكاثر الدقيقة . معها يرتكز في اهل التعليل  
 الحرفي الشكل || اشهر انواعه ستة تلي .

١٧١١٧ - رُوزَلِيَّةِيَّةُ البُن\* ، سَخِ البُن\*  
*Rosellinia bunodes* (S). Pourridé du caistei (F).

فطر مجهري يعيش ويتكاثر في البلاد الحارة . يصيب  
 البُن والاشجار والكافور والحشبات || مظهره الخارجي  
 كتلة من العفن الاسود المذهب بالاحمر . وهو ركب الجلود  
 المنقرضة في الثآرب فيصطب اللحاء والفشكر وقد يدخل  
 حتى التلب فيصطب بلون زيتي يحل الى السود . اما في  
 الجلود فانه مبسط الجردة ويصطب عليها || يكالغ  
 باستعمال الاجزاء المروية وتطهير القرية بالكلس  
 الحراق وسلفات الحديد .

الادراك التام طويل من ١٨ الى ٢٢ سم. فوجها الى البياض الاخير تملو ماجة طحلاء. رأسها الى الزبدية السوداء. فكاها ذريان غليمان، رواجها قصيرة سمراء اللون. شربها ثنائي السرك.

١٢١٣٠ - رُوشَشَن \* (F). *Alle d'Insecta*

Wing of Insect (E). هو جنح الحشرة وقد استند بالتصميم الى حشرات رتيبة حشرنيات الانجسة. اشكاله مدنية تختلط باختلاف الفصائل والجناس والانواع.

١٢١٣١ - رُوشَشَن غِيَمِي \* (F). *Elytre*

Elytron, Wing-shard (E). هو الظهران الثلاث الغندمي الذي يلحف الجناح في بعض الحشرات.

١٢١٣٢ - رُوشَشَنَة ، هَمَكَن \* (F). *Parastigma*

Parastigma (E). ساحة الكائن الحي الذي يعيش طفلياً على غيره من الكائنات الحية.

١٢١٣٣ - رُوشَشَة \* (F). *Parc (F). Park (E).*

حديقة واسعة فيها الشب والام. فاذا كانت في احوالي البراق والغلاف فهي سلق وان كانت في الرطالات فهي روضة وروية. ج. روض.

١٢١٣٤ - رُوشَب \* (F). *Anciltharia (S).*

Ancilthaire (F). الواحدة وروية. جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدييات الاربل وفضيلة الطسرييات. انواعه المعروفة قليلة الممد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش على رمال الشطوط العميقة || اصداها ماسية ، تعيش على اعطيجية ، ذلقة الاعتقاب الملهمة ، فصحاتها قليلة التميز الطولي التميل الخطوط. الوانها زاهية ، احاطها انبوية دقيقة مستطيلة.

١٢١٣٥ - رُوش \* (F). *Corne (F). Horn (E).*

الروق : القرن. « كالقور يسمي انفه برقه ». والاروق ذو الروق اي القرن.

١٢١٣٦ - رُوشَش \* ، عَصْفُور مَاسِي \* (F). *Pardalotes punctatus (S).*

Pardalote punctué, Oiseau-diamant (F). طائر من الجوليم سنيات المناخير ينتمي الى فصيلة الصرديات. موطنه بعض مناطق استرالية. يألف الغابات واحراج الاراكاليثوس. ملجته الحياتي جماعي. جماعته متوسطة العدد. قوته الحشرات والبيزور || جسمه صغير القد ، مكردم الشكل ، يطول نحو ٩ سم. قصير المقد والجناح والقدنب. ثوبه الملوي الى الخضار الالامس تملو رقة ييشاه فضية الموالج تتلاو كانها قطع من القلس. حاجباه وذوره وصدره وبعط الى البياض الجمالي. متقادة شديد السمرة. وفساه واصابعه الى السمرة الحظية || يذن اقصومه في الجانف الشديدية الاتحاد. اقصومه نفق يطول نحو ٦٠ سم. ينتهي بمجرة قطرها نحو ١٥ سم. يبعطها باليات الاراكاليثوس وبعض اشغاث التامعة. الانثى تحفن بمنابرة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات. الترخيم يستمر نحو اسبوعين.

الصنوبر ، يعيش على المواد النباتية المنطحة. ساقه مستدلة كشخانة والارتفاع ، غيرا اللون يملوها موالج تبي ، طلعها مجعد التفرق. نكته صيرانية الشكل ، صفراء اللون ، ذعية الموالج ، مجعدة الحافة ، قطرها نحو ١٥ سم. احراسها الى الصفار الباهت || لحية جيدة الصنت ، مأكولة.

١٢١٣٤ - رُوشَم \* (F). *Cachet (F). Seal (E).*

١٢١٣٥ - رُوشَمَة \* (F). *Rocheas (S).*

Rocheas (F). Rocheas (E). جنس نباتات بحلية مصمرة من فصيلة الخلدات. معقودة التعريف على اسم اليوناني « لاروش » || انواعها المعروفة خمسة مهدا افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريينية في معظم البلاد المعتدلة الحرارة || سقاها منصبة تنتهي بنسمة من الازهار المستطيلة الخماسية البتلات. اوراقها متطابقة لحية النصال الخروطية الشكل. ثمارها جرابية ، خلية الفلق ، عديدة البزور || أشهر انواعها التريينية القروية والباسمية.

١٢١٣٦ - رُوشَمَة قُرْمِيَّة \* (F). *Rocheas coccinea (S). Rocheas scarlata (F).*

نوع من الروشة التريينية الشائعة الزراعة. يملها تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. فسنتها ازهرية كبيرة القد ، متكوية التجميع. انهارها قرمزية اللون ، فواصة العرف الطري المنصب || تنويرها يستمر من اواسط حزيران الى اواخر تموز.

١٢١٣٧ - رُوشَمَة ياسمينيَّة \* (F). *Rocheas*

Jasminae (S). Rocheas à fleurs de jasmin (F). نوع من الروشة التريينية المبهولة عند معظم الزوارين. يملها تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. فسنتها ازهرية متكوية التجميع ، متصلة الجهم. انهارها الى الصفار الاخضر الموالج ، شكلها قروي شبه بالياسمين. عرفها طري منصب || تنويرها يستمر من اواسط نيسان الى اواخر ايار.

١٢١٣٨ - رُوشَم \* (F). *Levee des semis (F).*

Sprouted sowing (E). اول ما يظهر من الزرع.

١٢١٣٩ - رُوشَك أَزْهَب \* (F). *Cylindronotus lanipes (S). Cylindronota*

lanineux (F). Cylindronotus lanipes (E). حشرة خاضعة دامت من فصيلة النيشيات ورتبة منمذات الانجسة. تألف المواق المشجرة. خنافسها تمش على اوراق النبات وعلى المواد النباتية المنطحة. رقاتها غاشية تمش تحت لحاء الاشجار اليابسة || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٥ سم. فوجها الى الخضار الالامس الاسف الموالج. رأسها معتدل الحجم. اصفا صيرتان بارتتان. زباناها مستطيلان دقيقتان. ظهرها ذات الفلق ، بالغ التحزير الغندمي. ارسافها خاسية القفل في الترويين الامامي والوسطي ، ورياحتها في الزوج الخلفي. وهي مهدبة ، مستطيلة الحدي في الزوج الامامي ما دما الى تسيتها بالروشك الازغب || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتمش حتى اواسط ايار. تسرح في التبار. تلتشد في حزيران وتترقح المسكن تحت لحاء الاشجار وقشورها || البرقة عند بلوغها



روشة قرمزية



روشك أزغب



روش



روشن غندمي



روشب



روش

والزئتان لا تشبهان تشابهاً كاملاً لأن الزئ البني صغيرة ورمية تتكون من ثلاثة فصوص بينما تتكون البني من فصوص أو أكثر. وهي ملونة بالبشم والبشرين والأزودة والألوان السفوانية والأصباغ.



زئة

١٧١٤٦ - زئة البحر\* Charrybdaea (F.) Jelly fish (E).  
نوع من اللبوس ينمو في البحر الأحمر والوسط، يألف جرف السفلى. قال في وصفه المشي: «هناك كمورة القنفصة شائعة كمشقوف الزنجار شيبة البياض بيني الحذوة وما أربعة اجرام في وسطها ترى في الليل ضيئة كالقمر اذا حجبها السحاب الرقيق. وما ضوء يشرق على ما حوطا في البحر ولونها أزرق سموي. وإذا احست بالانسان يهجم سوطا او اراد مسكها خرج لها رشاش لاذع يحرق الجسد مثل شرار النار من سميت. وهو يلقب البحر بساحله كثيراً».



زوية دنة

١٧١٤٧ - زئد هو الركوب والمكيس، اطلبها.

١٧١٤٨ - زئم\* Guzalia marica (F.).  
Guzalia blanche (F.). White guzalia (E).  
ظبي ابيض الغرب اغبر للمخرج عايق الظاهر في حجم الظبي المرسوم. وهو جميل الشكل، ابيض اللد، ورقيق الاقدام، غليظ الحركة، ملحق السرعة في عديم. اصابته فسيحة الارباء تشمل جزيرة العرب وسورية واغريقية الشمالية حتى ليبيا. الاثني زئمة.



زؤس

١٧١٤٩ - زؤيات\* Pulmona (F.).  
Pulmona, Pulmonobranchia (E).  
طائفة من الزؤيات مدهيات الاربيل يعمدو افرادها استئناق الهواء الطلق ذلك لانها مجهزة بمخار تنفس حوالى قوامه شبكة وتالية نافذة الى الخارج || ضالها واجناسها وانواعها كثيرة المد، جميعها غشيرة الثقل تحمل الاضواء الذرية واللاتية في آن واحد || لراك نازك ذكراً وتقل ضله في كوم الاثني وثارة اثني وتقل ضلها فيخس || تقسم هذه الطائفة الى زئتين، زئة الزؤيات البرية وزئة الزؤيات البحرية. القارب المميز بين الازئتين هو ان حيوانات الزئة البرية مجهزة بأرجع لواس جامة في حين ان حيوانات الزئة البحرية مجهزة بلاسطن فقط ولواسها جامدة لا تتنفس || جميع افراد هذه الطائفة تعيش على الافراد الثابتة ونها الاعصاب البرية والبحرية.



زئة البحر

١٧١٥٠ - زؤيات بحرية، زؤيات مائية

Besommatophores, Pulmona aquatiques (F).  
زئة من طائفة الزؤيات. افرادها ثنائية الواس الجامدة اللاسنتية. حيثما ترتكز على قواعد الواس || اصنافها متباينة الحجم والشكل وبعضها عرياء خال من القصد || جميع افرادها تقترب من سطح الماء وتعلمو التنفس || اشهر اجناسها القصة والدوب والزنجير وكلام والانصبل.



زئ

١٧١٥١ - زؤيات برية\* Stylomastophores (F).  
زئة من طائفة الزؤيات. افرادها رباعية الواس المتعفة الجامة || اصنافها متباينة الحجم والشكل. بعضها كامل الهيكل السفدي كالخارون والبعض الآخر يميل دوح صغير يلف مقدم الظاهر كالزئق || اشهر اجناسها الخارون والبزاق والصرب والمريون.

Laitance, Laito (F).

Milt, Soft roe (E).

هي المادة الحيوية التي تفرزها الاضواء التناسلية الذرية في السمك فتلي بها الذكور على سره الاناث لاصحابه.

١٧١٤٨ - زؤلة\* Roëlle (F).

جنس نباتات جنينة معمرة برية وتروثنية من فصيلة الجربسيات. انواعها المعروفة ١١ مدها افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعة بعض انواعها في البلاد الحارة وفي الماركن والصداري || سوطها فراء. اوراقها عطيفة النصال، متعابلة، متناوبة. ازهارها كبيرة الجرم، خاسية البتلات. جملة الالوان الزاهية المختلفة مع الالوان.

١٧١٣٩ - زؤم\* Lobe de l'oreille (F). Lobe de ear (E).

هي شمسة الاذن.

١٧١٤٠ - زؤم Rhum (F). Rum (E).

شراب كحولى يستخرج من حصاره قصب السكر بعد تقطيرها وتقطيرها وتقطيرها.

١٧١٤١ - زؤمية دكة\* Rumia maculata, Opisthographis maculata (S).

Rumia maculé (F). Rumia maculata (E).

حشرة من فصيلة الايغيات ورتبة حشرقيات الاجنسة. حوطها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط. قراحتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها غاصلة قوتها اوراق الزهور والبرقوق والذرياء والسبتان || جسمها صلب القند بطول نحو ١٢ م. بطنها نحو ٣٤ م. رأسها مستقيم الجرم. ميتاها كيرتان. زباناتها مشطيان عند الذكر، غطيلان عند الاثني. جوشنها وبطنها كثيف الخمل اثناء || رواشها، عند التلقين، الى الصفار الكبريتي يملو دس اشعث وذركفة حشنة || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب. تفسح في اليل. تماثل بند ظهورها بسة اساميج وتمتص الحنك على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرعة تقبل من ٢٥ الى ٣٠ م. جسمها اسطواني الشكل، مالى القفار تعلو ثلاثة ارجاع من التيل الصغيرة. ثوبها الى الطيلة السراء تعلو اسطوط متقطعة كسنتية. رأسها واسطوي سيد || طول الامكال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي ضمن صلجة تحيكها السرعة بين الازواق التي تجسمها وتجرها بخبوط حمرية.

١٧١٤٢ - زؤمده هو الزؤد، اطلبه.

١٧١٤٣ - زؤوه Roëlle (F).

هي الزؤلة، سمكة نهرية، اطلبها. والروبو من اسمائها المحتبة الثالثة.

١٧١٤٤ - زؤيس\* Capiteule (F). Capiculum (E).

شكل من نظام التنوير الخليلي المستجيب عند فيه رأس الحور الاصلي سائلاً زيجرات لاسنة.

١٧١٤٥ - زؤة Poumon (F). Lung (E).

المعو الرئسي في جهاز التنفس. وما زئان مويضان في تجويف الصدر يفصل بينهما القلب. وازفة غروية الشكل قاضتها مقعرة ترتكز على عضلة الحجاب الحاجز.

## ١٧١٦١ - رِبَائِيَّات

هو الزرافة الرياسي نبات طبي مشهور ، اطبله .

## ١٧١٦٢ - رِبَائِيَّة \* ، شَجَر الصَّابُون (S) Sapindus

Savonnier, Arbre à savon, Rixa (F). Soap-nut tree, Soap-berry tree (E). Seifenbaum, Seifenbeere (D). Saponaria, Sapotiglia, Noce saponaria (I).

جنس شجر من فصيلة الصابونيات . أنواره المروية ١١ منبها البلاد الحارة . أوراقها متعاقبة ، مركبة ، مائلة . أزهارها عتقودي . أزهارها رباعية أو خماسية البتلات ، ثمانية الأضلاع ، ثمارها عتقودية ثلاثية التخصيص مأكولة في بعض الأنواع || أوراقها وأوراقها وثمارها غنية بمادة الصابونين (Saponine) التي ترغو في الماء وتظلف كالصابون .

## Vent (F). Wind (E).

## ١٧١٦٣ - رِبَاح

الرياح نسيم الهواء . ج. رياح وأرياح . وقد أطلق عليها أسماء مختلفة تعود إلى مصدر مهبها . لذلك فالرياح أربع منها الجنوب وهي القبيلة . والشمال وهي الشمالية والجنوب . والسايب وهي الشرقية . والجنوب وهي الغربية . وبين الرياح الأربع أربع أخرى وهي الأرباب بين السايب والجنوب والسايب بين الجنوب والجنوب ، وأزادوا ثامنة يقال لها الكنداء وهي التي تدمر بالكانن فلا يتبين لها مهب . اطبله شصق الرياح || وتقسم الرياح بالنسبة إلى سرعتها وضغطها وتأثيرها إلى تسع كما هو موضح في الجدول المقابل .

## ١٧١٦٤ - رِبَائِيَّات \* هو الأس المسكي ، اطبله .

## ١٧١٦٥ - رِبَائِيَّات \* أبيض هو ذقن الشيخ ، راجمه .

## ١٧١٦٦ - رِبَائِيَّات \* الأرض

هو التقيصوم وهو بقلة الغزال أيضاً ، اطبلها .

## ١٧١٦٧ - رِبَائِيَّات \* الكافور \* Camphorosma (S).

Camphorosme, Camphrée (F). Stinking ground-pine (E). Kamferkraut (D). Canforata (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة السريقيات مهددة الشرق الاوسط وأروبة الجنوبية . خواصه وثماره الطبية عديدة . رائحته تشبه الكافور . يستخرج منه مادة زيتية فعالة مقوية لتلطف الباه وقد تستعمل كمقوة وسطمة ومدررة البول .

## ١٧١٦٨ - رِبَائِيَّات \* بري \* رِبَائِيَّات \* قرطبي ، قرطبي شصق ، أصابع القنات

Calamintha acinos (S). Calament acinos, Achnos, Basilic sauvage (F). Acinos, Basil thyme, Wild basil (E). Feldwürze, Wilde basilic (D). Timo campestre, T. salvatico (I).

نبات عشبي بري طبي ممر من فصيلة الشفويات . يطو من ٢٠ إلى ٣٥ سم . ساقه قصيرة فراء . ثمره عتقودية مهدلة . أوراقها متعاقبة ممتقة بيضبة الشكل . نصلها أزغب البشرة من فصفتيه . أزهاره بيض يطولها موج ورددي . أوراقها وأزهارها عطرية العرف المسحب || يدخل في تركيب بعض العقاقير الصحية وهو مضاد للتشنج .

## ١٧١٦٩ - رِبَائِيَّات \* دكوة هو المردقوش ، اطبله .

## ١٧١٧٠ - رِبَائِيَّات \* سكتيكان هو سيق الربان ، راجمه

## ١٧١٧١ - رِبَائِيَّات \* Phragmosporas (F).

Phragmosporas (E).

عقار فطور مجهرية من فصيلة الطحنيات ، تتميز ببوغاتها

## ١٧١٥٢ - رِبَائِيَّات ، مَقْدَمَات Primates

رَبَّة من الثدييات تشمل ثلاث مراتب : البشرات والقردوات والليموريات .

## ١٧١٥٣ - رِبَائِيَّة Irrigation

الري من الجربة العلمية هو السيلالة المائية التي تهدف إلى الانتفاع من المياه على أكل وبه يمكن . وهو من ناحية العملية وضع ودوس الاصول والوسائل اللازمة لتسقية الارض وأحياء بورها .

اسم الريح	يقابلها بالفرنسي	تأثيرها	سرعتها في الثانية	ضغطها بالكيلو
نسيم ، ريدة	Vent très faible	تيز الريح	٢	٠,٠٠٠
رياح	Vent frais	تثني الصالح	٤	١,٩٦٠
زفافة	Vent vif	تثني القوي	٦	٤,٤٠٠
سامكة	Vent fort	تحرك الشجر	٨	٧,٨٤٠
موجم	Très fort	تسقط الريح	١٣	٢٠,٧٠٠
عاصفة	Tempête	تضيق الانصاف والرياح	٢١	٥٤,٠٠٠
زعر	Fort tempête	تكسر أو تنقل الشجر	٢٨	١٠٣,٠٠٠
زبعة	Ouagan	تهدم بعض الابنية	٣٤	١٤١,٠٠٠
إحصار	Cyclone	تخرّب كل شيء	٤٠	١٩٦,٠٠٠

## ١٧١٥٤ - رِبَائِيَّات Ecluse (F). Lock, Sluice (E).

جسور حكمة البناء يفترض مجرى المياه للانسيابة السطح ، له قداسان مدققي ومسيحي . رفع القداس المدققي يسمح بدخول المركب إلى الخوض وربع المسيحي يسمح بخروجه من الخوض .

## ١٧١٥٥ - رِبَائِيَّات \* Plantes aromatiques (F).

Aromatic plants (E).

النباتات العطرية الفواحة العرف . الرائحة ريحانة .

## ١٧١٥٦ - رِبَائِيَّات \* Mathématiques (F).

Mathematics (E).

اصطلاح يطلق على مجموعة من العلوم الحسابية والهندسية تشمل فنة الرياضة البحتة التي تنس بالحساب والجبر والهندسة وحساب التكمال والتفاضل ... وفنة الرياضة التطبيقية التي تنس بالآليات وعلوم الفلك والبصريات الخ ...

## ١٧١٥٧ - رِبَائِيَّات Abondance de récoltes (F).

Abundance of harvest (E).

هو حسب المحاصيل الزراعية .

## ١٧١٥٨ - رِبَائِيَّات Salive des insectes (F).

Saliva of insects (E).

الريال والريالة هو لعاب الحشرات .

## ١٧١٥٩ - رِبَائِيَّة Euchiiana mexicana (S).

Reana, Téointe (F). Teosinte (E). Teosinte (I).

نبات عشبي كلابي من فصيلة النجيليات مهدد المكسيك وقد تمت زراعته جميع مرابي البلاد المطلة المخرارة .

## ١٧١٦٠ - رِبَائِيَّة Protobe (F). Protobe (E).

الريب اسم يطلق على كل كائن حي متناهي الصغر والذقة لا يشاهد تحت حسة المجهر المادي .





رَبْرِيس



رَبَّة لَاحَةِ الْأَصَابِع



رَشْبَانَج



رَيْس



رَيْبَةُ

الموترة المديدة الحلايا . اجناسها المشهورة : النمسفة ، الزغبارة ، الزحاح ، الزنة ، الزنينة ، السرتفة ، السنجة ، الشيفة ، الصرب ، الزرير ، الناسورة .

Vent très faible (F).

Very weak wind (E).

هو التسم يتبر هو اوراق لثبات بشفة .

Penné (F). Pinnace (E).

١٢١٨١ - رَيْبُيْ

نعت تعريفي يطلق على الاضواء الحيوانية والنباتية الشبيهة بالريش .

١٢١٨٢ - رَيْبُيَاتِ الْأَحْتَاكْ ، هَيْكِيَاتِ

Mystiques (F).

الْأَحْتَاكْ

مرقية حيوانات بحرية ولوده لينة من رتبة الحقيقات ، تشمل الحيتان الباعثة الانسان ، القرية الصفايح الحكية ، انواعها المعروفة لا تتجاوز العشرين جميعها ثلاث فصائل : الباليات والقاليات والمركليات .

Randement, Revenu (F).

رَيْع

Produce, Revenue (E).

الريع هو ما تملكه شيئاً او نقداً ماسة سليمة من الارض .

١٢١٨٤ - رَيْع

هو برج الحام ، ج رباح وأرباع .

Rhyphus (S).

١٢١٨٥ - رَيْفَسْ

Rhyphé (F). Rhyphé (E).

جنس حشرات من ذوات الجناحين غمليات القرون وقصيلة القصصيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار الشرق الاوسط واروپة . تألف البراري والحدائق والمنازل ، اجسامها صفراء اسطوانية الشكل . رؤوسها مكورة . عينها باردة . قرونها والاستقامارية غليظة . مرقية التركيب . قوائمها مسطيلة . راسها مسطيلة شفافة . اثنائها تختلف مع الانواع تكثر فيها السورة والشبهة والكهبة .

Rural, Agreste (F).

١٢١٨٦ - رَيْفِيْ

Rural, Rustic (E).

نعت وصفي يطلق على معظم الاشياء المختصة بالريف ، كقروك الاعمال والصناعات والمساكن الريفية .

Rivina (S). Rivina, Rivinie (F). \* رَيْفِيْسْتَا \*  
Rought plant, Carpenter's herb, Blood-berry (E). Rivinie (D). Rivina, Erba da legnaioli (I).

جنس حشرات ونباتات برية وريزية من فصيلة الكليات . انواعها ثمانية ، اوراقها متعقبة متعاقبة ، تصلها مالى البشرة ، متواج الصلصة ، حايك الخضار . اثمارها متعقبة التجميع ، ابطي الاكثر . اثمارها صفيرة لينة . خمسة البتلات البيض . ثمارها نوية ، وصيدة السجة ، قرمزية اللون .

Ricotta (S). Ricotta (F).

١٢١٨٨ - رَيْكُونَا

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بعض المناطق اغارة متعاقبة ، ثنائية او ثلاثية التفصيل الريفي . اثمارها صفراء ، مفرسة البتلات ، ودية اللون او يضاء دنة . اشهر انواعها :

R. lunaria (S)

وَيْكُونَا قَرْيَة

R. linata (S)

وَيْكُونَا عِجَاة

١٢١٧٣ - رَيْزُورْلُكْ هو الجبل الصيني ، اعليه .

١٢١٧٤ - رَيْزُورْكَسُونْ ، رَيْزُورْكَسُونْ

Rhizoctonia (S). Rhizoctone (F).

جنس فطور مجهرية من الفسيات . وياتها ثلولية جميعها شحيح كيف يتكاثر على الاضواء النباتية الديماسية . منه قليل للتغصيص عديد الفاسل والفواسل الاسطوانية . انواعه قليلة العدد والادخ .

١٢١٧٥ - رَيْزُورْمْ هو الجلمور ، اعليه .

١٢١٧٦ - رَيْزُورْمِسْ

Rhizomys (S). Rhizomys, Rat des bambous (F).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الخلدات . انواعها ستة اجسامها اسطوانية . طولها يراوح من ١٨ الى ٥٥ سم . اذنانها دقيقة متصلة القيد تطول من ٧ الى ١٢ سم . رؤوسها غليظة ، شبه مستديرة . عينها خريزية الشكل . اذنانها جذعة ملساء المقرقة . اثنائها تراوح من الابهام الى الكتفين . الجازري . اثنائها تقع في الصف في جرون الى اربعة . قوائمها الجلوب والجلد تسرح في الليل لا لتفتلها . تألف الاقفاق التي تتخلها في التربة على امحاء غطيفة تراوح بين ٢٥ و ٥٥ سم .

١٢١٧٧ - رَيْسَة ثَلِيْبَة الْأَصَابِعْ

Rissa tridactyla (S). Rissa tridactyla (F).

طائر من كتياف القند وقصيلة القروسيات . يعتبر من القواطع لانه يعضي فصل الشتاء والبرد على سطوح البحر الابيض المتوسط ويعضي فصل الصيف في المناطق القطبية . جسمه معتدل القيد يطول نحو ٢٧ سم . جناحاه كبيران ، ذلفان ، لاصاف . ذنبه معتدل الحجم ، مغموم الطرف . قدمه ثلاثية الاصابع . منظاره لا يكتشف كامل الاصابع . لويه متراكب البيض والشبهة الزرقاء اللولج . جناحاه موشحان بالابيض والاسود .

١٢١٧٨ - رَيْشْ

Plumes (F). Feathers (E).

انابيب ظفورية للمادة يملؤها الزغب والغبب والشعاع تنبت في معظم مناطق جلد الطائر . فائدتها انها موصلة رديئة الحرارة توقي الطائر شر التقلبات الجوية وانها تخفف الثقل النحوي فتساعد على الانتقال في الجو . الواسعة دوشة والجمع ريش وريش واريش .

١٢١٧٩ - رَيْسُورْ

Sinécure (F). Sinécure (E). \*  
مركز اجتماعي او لقب يدر على صاحبه لئال الخير ولا يوجب المبادلة بأي عمل او وظيفة .

١٢١٨٠ - رَيْشْبَانَجْ

Reichenbachia (S). Reichenbachia (F).

جنس حشرات من فصيلة البسليات ودية عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٢٥ منتشرة في معظم مروج البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها صغيرة تطول من ٢ الى

١٢١٩٢ - رِيَهْدَوَمَكَة

Rhinoderma (S). Rhinoderma (E).

جنس ضفادع من فصيلة الرنانيات. أنواعها المعروفة قليلة العدد مهددة أمريكة الاستوائية والوسطى || أجسامها صغيرة القد، طول من ٤ الى ٥ سم. عند الذكور، ومن ٥ الى ٧ سم. عند الاناث. رؤوسها محرمة تنتهي بقذبة لحمية في مقدم الخطم. فكوكها السفلى عديمة الاسنان. اصابع قوائمها الخلفية مقيدة بمخاطب ضعيف لا يتجاوز قرام الأول. جلودها ماعة مبعثرة الكثول. انثويها الى الخضار الاسمر يملو موج اصفر ورقشة جلدية لاقامية الشكل والقد || ذكورها مجهزة بجيوب قبة تحمل مركز البقلة الصربية وتمتد حتى مستوى البطن، تؤدي مهمة التلقيح وحسن الدليل الذي لا يتجاوز مدده ١٥ دةلة يأخذها الذكر بطرف لسانه عند الترسدة ويدخلها في الجيب فتبقى الى ما بعد النفق حتى يتم التطوير البلطي، تخرج الصفار من افواه ابائها كاملة المدة تروح حيث تلاء || تعيش من ١٥ الى ١٢ سنة. تروح في الليل وتبيت في النهار. قوتها الحشرات والديدان.

١٢١٩٣ - رِيَه

هي الروعاء، طائر من النعاميات، اطلقها.

١٢١٩٤ - رِيَهَان

هو الزعفران المزروع، اطلبه.

Gazelle blanche (F).

White gazelle (E).

رابع ريم. ج آرام. قال الاسمي: الأرام الظباء الأبيض الخالصة الأبيض وهي تسكن الزبل. وهذا النوع من الظباء يقال انه ضالها لانه أكثر شمسا وحشا || اما البيري فيقول: الرم ولد الظبي والجميع آرام ويستشهد بقول الشاعر بها البير والأرام يحين خلفه واطلاؤها ينحش من كل مجثم والريم ايضا هو الجبل الصغير.

١٢١٩٥ - رِيَنَكْسُورِيَوْم

جنس فطور مجهرية من فصيلة الريحليات. مشبه آدمي الانتشار. وليته سطحية قارضة، كنانته صغيرة مركبة، لا قياسية الشكل والحجم || انواعه قليلة، اعرسها رينكسوريوم الشيلم.

١٢١٩٦ - رِيَنَكْسُورِيَوْم الشيلم

Rhynchosporium secalis  
فطر مجهري يصيب حصف بعض النجيليات اعصها الشيلم || مظهره الفاربي يقع مستطيلة ميمرة او كتيقة التجميع، ليد صغيرة ثم تنتشر فيبلغ طولها نحو ٢٥ م. تركب نصال واتحاد الحصف، لوها آل الزرة يملوها موج اقير ثم ينحرف الى الاخير الرصاصي وينتهي بالنتي تحفه حالات واطارات شاحبة وضعية || يصيب يباس الحصف وضعف الاسبال وتحلل الحب.



رينكسوريوم الشيلم (١)



رينكسوريوم الشيلم (٢)





## ١٢١٩٥ - زاج

Affermer (F). To farm (E).

زارع للزنا : حامله على الارض يعض انتاجها . اطلب مزارعة .

١٢٢٠٥ - زكروك ، زروك ، هزكروك .

Agriculturist (E).

هو الذي يستغل ارضه مستخدماً عمالا او فلاحين . تحديد الامير مصطلق الشهابي .

Sulfate, Vitriol (F).

Sulphate, Vitriol (E).

اسم شامل يستعمل للدلالة على بعض الاملاح اخصها سلفات الحديد والنحاس والرصاص الخ ...

Vitriol blanc (F).

White vitriol (E).

هو سلفات الزنك من الاملاح المزدوجة التابعة الى سلسلة الاملاح المنفردة .

Vitriol vert (F).

Green vitriol (E).

هو سلفات الحديد من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة او سلسلة الاملاح الشبيهة .

Vitriol bleu (F).

Blue vitriol (E).

هو سلفات النحاس من الاملاح المزدوجة التابعة لسلسلة الاملاح المنفردة .

Austricherie (F).

Ostrich-farm (E).

الكان الخصاص لتربية الترح اي النعام .

Procombant (F). Procombent (E).

نمت ثمرتي يطلق على النبات الذي يزحف على الارض .

Gaster (F). Gizzard (E).

هي الحوصلة وقد صار تخصيصها بغير الماء والمانع .

Hippobosque (F). Hippobosca (E).

هي الشوا ذباب يقع على الابل والدواب والكلاب .

Corvus corone (S).

Corneille, Corbeau-corneille (F). Carrion crow (E).

Rabenkrähe (D).

طائر من الغربان متوسط الجثة طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السواد الاسفع البنفسجي المالح . موطنه الشرق الاوسط واروبه وافريقية الشمالية . يعتبر من الطيور الفسارة لانه كثير الاذى . قوته الديدان والحشرات والحرب واليدار الناقص والناار الخ . || ينش في الانجار الريفية . الانثى تحضن صغارها من ٤ الى ٦ بيضات لزنها الى الزقعة الخضراء يملونها ترشهم اسمر .

١٢٢٠٧ - زكاف

يقال زاف عليها فزافت له اي مكته من سفادها وهذا في الطيور الجوارح (الجالسط) || زواف الذئب : نشر جناحيه وذنبه وجها على الارض .

١٢٢٠٨ - زليقي

هو ذكر الصبي ومنهم من قال الذئب : ج زواقي . قال ثوبه بن الحبيب صاحب ليل الاغنية :

« ولو ان ليل الاغنية سلت

على يدوني صتلك وصفائح

لست تسلم البشارة او زفا

لها صدى من جانب القبر صائح



زاج

من ٣٠ الى ٤٠ م. اوراقها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم. طرفها غلظية او خاسية الا زوايا. اغلفة زائفتها مستطيلة لاحقة || ترطب في جبال البلاد المعتدلة الحرارة. تكثر في المناطق الواقعة بين ارتفاع ١٢٠٠ و ١٨٠٠ م.

١٢٢١٧ - زان ياباني *Fagus japonica* (S).  
Hêtre japonais (F). Japanese beech (E).

نوع من الزان يملو من ١٥ الى ٢٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٨ م. نصلها عند القصعة، مسن الحافة، كثير المروق التي قصيرة القذس ستانية الشكل، حشوية التركيب || يرغب في المواقع الجبلية الرطبة.

١٢٢١٨ - زان \* *Faine, Fêne* (F).  
Beechnut, Beechmast (E). ثمرة الزان ج زانات.

١٢٢١٩ - زانفيل، زانفيل *Xanthophylla* (F).  
Xanthophyll, Xanthophyll (E).

شعاع اصفر يبريد في اوراق التبان.

١٢٢٢٠ - زاوية *Angle*  
هي الانفرج الحاصل من تلاقي خطين مستقيمين يبرزان بقلي الزاوية. اما نقطة التلاقي تدعى رأس الزاوية. وتنقسم الزاوية الى ثلاثة انواع. كل زاوية قائمة يبلغ مقدارها ٩٠ تدعى حادة وكل زاوية اصغر من الحادة تدعى حادة وكل زاوية اكبر من الحادة تدعى منفرجة.

### ١٢٢٢١ - زاوية الاحتكاك

*Angle de frottement, A. de friction* (F). Rubbing angle, Friction angle (E).

١٢٢٢٢ - زاوية الإثشباب *Angle d'insertion* (F).  
Insertion angle (E).

١٢٢٢٣ - زاوية الإثشراك *Angle d'inclinaison* (F).  
Inclination or slope or dip angle (E).

١٢٢٢٤ - زاوية الانخفاض *Angle de dépression* (F).  
Depression angle (E).

١٢٢٢٥ - زاوية الإنكسار، زاوية السقوط *Angle d'incidence* (F).  
Incidence angle (E).

١٢٢٢٦ - زاوية الإسكاف *Angle de projection* (F).  
Projection angle (E).

١٢٢٢٧ - زاوية جالسعة، زاوية قائمة *Angle droit* (F).  
Right angle (E).

١٢٢٢٨ - زاوية حادة *Angle aigu* (F).  
Acute angle (E).

١٢٢٢٩ - زاوية حرجة *Angle limite* (F).  
Limit angle (E).

١٢٢٣٠ - زاوية زوئجية *Angle dièdre* (F).  
Dihedral angle (E).

١٢٢٣١ - زاوية قنبرية *Angle apsisal* (F).  
Apsidal angle (E).

١٢٢٠٩ - زائفة *في الاطوم، اطليه.*

١٢٢١٠ - زام *Quart* (F). *Quarter* (E).  
الزام: الزوج من كل شيء.

١٢٢١١ - زاميس \* *Schizophyllum commune*  
فطر من الفاريفوريات مركب احصان ويطلع بعض النباتات الحرجية والمثيرة بها الكركز والشمش والخرف وقد شوهد على سوق الثوت وعلى ثمار الفطخ الناضجة الساقطة. مركب القشور الخشوية او المسطوية من لينة الشمس فيتركز عليها ويرتد بمشبه حتى التفكيك فيفسد التبادل النسبي بعد ان يفتي حل الاوعية || منظره الخاربي، ما يميز في هذا الرسم، وهو كثيف التجميع، تحيل البكتة الدقيقة السريعة القلب || يكالغ باستصاكه ويتغير المرح وظليه بالاستيلاك.

١٢٢١٢ - زامور *Naucrotus ductor* (S).  
*Naucrote* (F). Pilot fish (E). سمكة بحرية من السميات طوطا نحو ٦٠ سم. ثوبا الى الزرقه انفساء يملو موج نقي ومث غطوط سود قاطبة مستعرة.

١٢٢١٣ - زاميس \* *Zamia* (S).  
*Zamia, Zamier* (F). *Jamaica sago tree* (E). *Zapfenpalmaria* (D). *Zamia* (I). جنس نباتات غلظية الجذع والاوراق من فصيلة السيكاسيات يملو البلاد الامريكية الاستوائية || انواعها المعروفة ٣٠. جلودها غلظية وقصيرة. سطها كثيف التجميع، مسطيل الجريد، صحن الزمان الاخير || بعضها ربي وبها زراعي يستخرج من ثماره مادة نشوية مأكولة تفر بالسافر (Sagou).

١٢٢١٤ - زان *Fagus* (S). *Hêtre* (F). *Beech tree* (E).  
*Buche, Buchbaum* (D). *Faggio* (I). جنس اشجار وغييرات برية حرجية من فصيلة القدييات انواعه نحو ١٥ صنفا متصبية جالسة. اوراقها معتقة متعاقبة. نصلها يضي الشكل، مذهب القصعة، بارز المروق، عند القصعة، مسن الحافة. اثماره الذكورية درلية التجميع. ثماره زور هريبة الشكل حادة الزوايا تدعى زانة. اغشابه صلبة قوية مرنة صناعية شائعة الاستعمال. ثماره اشجاره دالية || بزور غلظية. اغلفة بزور تحوي بعض المواد الجمالية الفسارة كقوى الحيل والحبر وتسن الثمن والمجاز والحناظر.

١٢٢١٥ - زان امريكي *Fagus ferruginea* (S).  
*Hêtre américain* (F). *American beech* (E). نوع من الزان يملو من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها تطول من ٦ الى ١٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ م. نصلها عند القصعة، مشاري الحافة، كثير المروق التي يراوح عند انزواها من ١١ الى ١٧ || وهو من الاشجار السريعة النمو النسبي. يرغب في المواقع المعتدلة الرطاب.

١٢٢١٦ - زان معزوف، زان شامك *Fagus sylvatica* (S). *Hêtre commun, Fau, Fauco, Fayed, Foyard, Fouteau* (F). *European beech, Common beech* (E). *Echte buche, Buche boom, Roebuche* (D). *Faggio comune* (I). اشر انواع الزان واعما انتشارا. فروه عذبة بها الابواهي والكثير اللورق والمناج والمسنبي والسنباني العربي ... جميعها من الاشجار الكبيرة الحجم تطو



زام



زامية



زان معروف



زانة



زائفة الجلود



زائفة اللثة



زائفة حنظل



زائفة حدادة



زب البحر



زبابة شائعة



زبابة قزقة



زبابة مقدسة

## \* ١٢٢٤٨ - زَاوِيَةٌ هَدَّامَةٌ \*

Pseudomonas destructans (S).

طول البكتيرية نحو ٨ مي. تركب بعض النباتات أخضها  
القت فتسبب اصفرار الأوراق ويذبلها. يعيقها ارتفاع  
الجلود ثم اسمرها وكرومية زائفة.

١٢٢٤٩ - زَاوِيَةٌ هُوَ السَّوِيُّ ، اطليه .

Penia

١٢٢٥٠ - زَبٌّ ، عَوَفٌ ، قَفِيبٌ

ذكر الحيوان .

١٢٢٥١ - زَبُّ الْأَرْضِ هُوَ الطَّرْنُوثُ ، اطليه .

Aktinos (S).

١٢٢٥٢ - زَبُّ الْبَحْرِ \*

Actinia, Anémone de mer, Ortie de mer (F).  
Actinia, Sea-anemone (E).

جنس حيوانات حليا من البنيات السيات السرية .  
انواعه عديدة غطلة الاشكال والاحجام يذبل فيها الساق  
الانوية والفرق الكلف للذباب اثمار . جميعها  
لحسية نايضة سريعة الانقياض والانتشار ، مشربة  
للسم ، زائفة الاثوان اللاصقة من الوردي الى القرمزي  
والاصفر والازرق البشجي . يوجد منها في المياه  
الابنية . تعيش حل المسكون للفقرة بلذ . قوتها ما وصل  
اليها من هيام وحشرات مائية . وهي مأكولة يقال انها  
مستحبة الطعم .

١٢٢٥٣ - زَبُّ الْكُرْمِ هُوَ الْفُلُوسُ ، اطليه .

Sorex, Crocidura (S).

١٢٢٥٤ - زَبَابَةٌ

Musaraigne (F). Shrew (E). Woldepitzmaus (D).

جمع زباب . جنس حيوانات صغيرة القند من الزبابات  
الاحفريات . انواعها نحو ٤٠ صولها العالم . اجسامها  
رقيقة مستطيلة خلية الور . وروثها واسطها لذقة .  
اذنانا مستدرة . قوائمها قصيرة . اطرافها حادة . اذنانها  
حقيقية ، مستطيلة ، حلية الشعر || من ميزاتها انها تحصل  
في عوصها بمسوى قوائمها الخلفية عند مسكة فواصة  
القائمة || انثاتها تضع من ٤ الى ٦ ادواس ترسمها  
من شهرين الى ٣ اشهر || اشهر انواعها ما يلي .

\* ١٢٢٥٥ - زَبَابَةٌ شَائِعَةٌ \*

Sorex araneus, S. vulgaris (S). Musaraigne commune, Musette (F). Common shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى الرمادي الاشقر يقيم مع  
القراري من ثوب الظهور ويبيض عند البطن . طولها الكليل  
من ١٢ الى ١٣ سم . علوها نحو ٢ سم . تألف الجبال  
والسهول والادية والحقول . قوتها الحشرات والديدان  
والبراغ والحلزون وفار الخروع .

\* ١٢٢٥٦ - زَبَابَةٌ قَزَقَةٌ \*

Sorex pygmaeus, S. minutus (S). Musaraigne pygmée, M. nana (F). Pygmy shrew (E).

نوع من الزباب ثوبها الى السرة الصهباء . بطنها اغمر  
البن . طولها من ٨ الى ٩ سم . || تألف الاحراج  
والنبات الكثيفة . قوتها الوزغ والحشرات على اختلافها .

\* ١٢٢٥٧ - زَبَابَةٌ مُعَدَّسَةٌ \*

Sorex religiosus, Crocidura religiosa, Suncus sacer (S). Musaraigne sacrée (F). Sacred shrew (E).

نوع من الزباب ، ثوبها الى السرة الصبانية يقيم مع  
الظهور ويبيض عند البطن . طولها يراوح من ١٥ الى

Equerre (F).

## \* ١٢٢٢٢ - زَاوِيَةٌ مُثَلَّثَةٌ

Square, Knee-piece (E).

الزاوية المثثة وشكل المساح واحد .

Angle plan (F).

## \* ١٢٢٢٣ - زَاوِيَةٌ مُسْتَوِيَةٌ

Plane angle (E).

## \* ١٢٢٢٤ - زَاوِيَةٌ مُنْحَنِيَّةٌ انْحَطِيَّةٌ

Angle curviline (F). Curvilinear angle (E).

Angle obtus (F).

## \* ١٢٢٢٥ - زَاوِيَةٌ مُنْفَرِجَةٌ

Obtuse angle (E).

Radian

## \* ١٢٢٢٦ - زَاوِيَةٌ نَصْفُ الْبَطَرِ

Angles alternes (F). Correspondent angles (E).

Alternate angles (E).

## \* ١٢٢٢٨ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَامَتَانِ

Angles complémentaires (F). Complementary angles (E).

Angles opposés (F). Opposite angles (E).

## \* ١٢٢٢٠ - زَاوِيَتَانِ مُتَقَابِلَتَانِ

Angles correspondants (F). Correspondent angles (E).

Angles adjacents (F). Adjacent angles (E).

## \* ١٢٢٢٢ - زَاوِيَةٌ قَائِيَةٌ

Excédant (F).

Exceeding (E).

Appendice (F). Appendix (E).

كل عضو زائد في الجسم الحيواني والنباتي .

Pseudomonas (S).

## \* ١٢٢٤٤ - زَاوِيَةٌ \*

زائفة ج زائفة . جنس بكتيريا من فصيلة القضيبات .  
انواعه عديدة تتميز بارتكازها الاسطوانية ، بقطبيها للمهدين  
وباعداها المتحركة || انواعها الخفيفة قليلة تخص منها .

## \* ١٢٢٤٥ - زَاوِيَةٌ الْجَذَرُ \*

Pseudomonas radialis (S).

طول البكتيرية نحو ٤ مي . اذنانها حلية سوية .  
تركب جلود النباتات تسطها . مظهرها الخارجي  
درينات صغيرة سمره اللون مبشرة على الجلود والقرقرى  
تكاثف يظهر البذار والرتة .

## \* ١٢٢٤٦ - زَاوِيَةٌ الدَّرَكَةُ \*

Pseudomonas stewarti (S).

طول البكتيرية ٢ مي . اذنانها خفيفة . تصيب القرو في  
زين ازهارها تركب الأوراق ويذبلها وتقضي على النبات .  
تكاثف يظهر البذار والرتة .

## \* ١٢٢٢٧ - زَاوِيَةٌ حَقَلِيَّةٌ \*

Pseudomonas campestris (S).

طول البكتيرية نحو ٥ مي . تصيب اللؤلؤ واللفت  
والخردل وفيها من السليبيات . تركب . احصاب  
الأوراق تسبب اصفرارها ثم اسودادها وتسبب الجلود  
تفقس مكاكها ثم تموتها || يحسن اجتناب تقويض  
النبات لانه السبب الوحيد في انتفاخ وبطشه . يكاثف  
يظهر الرتبة .

١٢٢٦٤ - **زَيْبَاةٌ سَوْدَاةٌ** \*  
Arctelis (S).  
Arctélide, Binturong (F). Arctelis, Binturong (E).  
جنس حيوانات لبونة من الزيبديات. موطنها الهند  
اجسامها مستطيلة. قوائمها قصيرة. رؤوسها مسترسفة  
أذنها سوية اللون الاسود. يراوح طول اجسامها من  
٧٠ الى ٨٥ سم. وذيلها من ٩٥ الى ١٧٠ سم. || تألف  
الاجراج الكثيفة. تتسلق الاشجار. تسرح في الليل.  
قوتها الحيوان والطيور والسلم والحشرات والثمار.

١٢٢٦٥ - **زَيْبَاةٌ مَلَكَّةٌ** \* ، **وَسْ**  
Viverricula malaccensis (S). Civette de Malacca.  
Petite civette de l'Inde, Rasse (F). Rasse civet cat (E).  
نوع من الزيبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٩٠ سم. وذنبها  
٤٠. ثوبها الى الصبغة الورداء يملو تخطيط متعرض  
اسود. ثيج ظهرها اسود يكتنفه غطاء عاجيان. رأسها  
اسمر. صفوها مطوق بالابيض || موطنها يمتد من  
ملقه الى الهند. تألف الاجراج والادغال وتتسلق  
الاشجار بسرعة || قوتها الحيوان والطيور والثمار وبعض  
الجلود. تأكل الموز بشهية.

١٢٢٦٦ - **زَيْبَاتِيَّات**  
Viverridae (S).  
Viverridés (F). Viverridae (E).  
فصيلة حيوانات لاجمة مفترسة اجنتها ١٦ اشهورا  
الزيبادة والرياح والتيس. اما انواعها فكثيرة العدد.  
موطنها المناطق الحارة من العالم القديم. اجسامها مستطيلة  
دقيقة، قوائمها قصيرة، اذناها طويلة، جلده، رائحة،  
امتاحتها غليظة، ورؤوسها زائفة، اعظامها ذققة، ميونها  
صغيرة، اذناها مخططة الحبيب || تتميز بفندجها البيضاء  
التي تفرز دهن الزباد المسكي اللزج في اجرة خاصة  
مركزها بين السرم وملقن الفلجيين || مسرحها في  
الليل. قوتها ما استطاعت اليه سبيلا من الحيوان والطيور  
والانعام والورع والاسماك.

١٢٢٦٧ - **زَيْبَاةٌ، فُلْكَاةٌ**  
Cotyledon (F).  
Cotyledon (E).  
هي الخوصة حين تخرج من النواة.

١٢٢٦٨ - **زَيْبَاةٌ**  
Taille de la vigne (F).  
Pruning of vine (E).  
هي تسريع الكريمة اي تسهيلها. يقال زبر او يهرز  
الكريمة.

١٢٢٦٩ - **زَيْبَاةٌ**  
Cane (F). Female duck (E).  
هي البطية وتسمى زيباة لانها تكثر الزبط اي الصياح.

١٢٢٧٠ - **زَيْبَالٌ** ما تحمله البنته عليها.

١٢٢٧١ - **زَيْبَانِيٌّ** \* ، **زَيْبَانِيٌّ**  
Antenne (F).  
Antenna (E).  
ما تزين به الحشرة وما زيبانيان. اطلب قرن استفساري.  
اشكاله كثيرة البند اعماها ما جاد به الرسم.

١٢٢٧٢ - **زَيْبَاةٌ، زَيْبَاتِيَّاتُ الْعُسْرَبِ**  
الزيبانا او زيبانيا المقرب منزل من منازل القمر البانئة.  
وما كوكبان نيران مقترقان في قرني " برج المقرب "،  
معرضان بين الشمال والجنوب بينهما قيد روح ينزلما القمر  
في الجلة السابعة عشرة || يقب الزيبانا يدعى البيلون.

١٦ سم. موطنها البلاد الحارة. تألف السهول والحقول  
المزدرة قوتها النويبات والحشرات.

١٢٢٥٨ - **زَيْبَاتِيَّات**  
Soricidae (S). Soricidés (F).  
Soricidae, Shrews (E).  
فصيلة حيوانية من رتبة الحشرات. انواعها نحو ١٧٠  
موطنها العالم القديم. اجسامها صغيرة القند تشبه القار  
والجرذان. اذنها رمادية. اعظامها ذلقة. اذناها  
مستديرة. قوائمها قصيرة. انظرها حادة. اذناها دقيقة.  
تألف الجبال والمساب والسهول والقياني. قوتها الحشرات  
على اعلاها والمصابير والاسماك.

١٢٢٥٩ - **زَيْبَادٌ، زَيْبَادِيٌّ، مَسْحَاةٌ**  
Pallenis spinosa (S). Pallénis, Pastic mugus (F). Star-  
wort (E). Dorniges goldauge (D). Pallenis (I).  
لبات حوض بري طي شاك من فصيلة المركبات.  
منته حوض البحر المتوسط. ازهاره حلوية اللون مثرية  
يحمرها التحل. فولاده الغليظة مبهمة يقال انه يشع الصدر  
ويغوي للعدو.

١٢٢٦٠ - **زَيْبَاةٌ، سَيَّوَرُ الزَيْبَادِ**  
Viverra (S).  
Civette (F). Civet cat (E).  
جنس حيوانات من فصيلة الزيبادات. انواعها خمسة  
تتميز باجسامها المستطيلة. اذنها مخططة الالوان  
يكثر لها التميز والتخطيط || اذناها تقع من ثلاثة الى  
اربعة جوار ترصعها نحو ٨ اسابيع.

١٢٢٦١ - **زَيْبَادُ افْرِيقِيَّةٌ** \*  
Viverra civetta (S).  
Civetta d'Afrique (F). African civet cat (E).  
نوع من الزيبادة تملو نحو ٣٠ سم. طولها ٧٥ سم.  
وذنبها ٤٠ رأسها مكور الشكل، ذلقوها مدب.  
اذناها قصيرتان قوائمها متوسطة القند قوية. ثوبها الى  
الصبغة الاسراء يملوها تخطيط وتبيج اسود وشك نصي  
يقتب النجج من القطن الى طرف الذنب || موطنها افريقية  
الشرقية والشالية. تألف الجبال والادغال والقياني.  
تسرح في الليل. قوتها ما تستطيع اقتناصه من الحيوان والطيور.

١٢٢٦٢ - **زَيْبَاةُ التَّحَلُّ** \*  
Paradoxurus (S).  
Paradoxure, Musang, Harle des palmiers (F).  
Palm civet cat (E).

جنس حيوانات لبونة من الزيبادات. موطنها البنغال  
وسريليب والهند الصينية. انواعها عديدة. اجسامها  
مستطيلة. طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٥ سم. اذناها  
من ٤٠ الى ٥٥ سم. وطولها من ٢٥ الى ٣٥ سم. اذوها  
مرفقة || تألف الاجراج وتتسلق الاشجار. قوتها الحيوان  
والطيور والثمار على اختلاف اجنتها وانواعها || اذناها  
تضع اربعة جوار ترصعها نحو ٨ اسابيع || زيبادها  
مهيمن الرائحة الكريهة.

١٢٢٦٣ - **زَيْبَاةُ الْهِنْدِ** \*  
Viverra zibetha (S).  
Civette de l'Inde, Zibeth (F). Indian civet cat,  
Zibeth (E).

نوع من الزيبادة تملو نحو ٤٠ سم. طولها ٨٠ وذنبها  
٤٥ سم. موطنها الهند والصين وبنورما. ثوبها الى  
الصبغة الصفراء يملو تميز بجوي. ثيج ظهرها اسود  
اللون. سواد يمتد من القطن الى طرف الذنب || تألف  
الاجراج والادغال والسهول والحقول. تسرح في الليل.  
قوتها الحيوان والطيور والانعام والقضاد والحشرات والبيض  
والثمار.



زيبادة افريقية



زيبادة التحل



زيبادة الهند



زيبادة سوداء



زيبادة ملقة



زيبان



Colombophille (F).  
Pigeon-faucyng (E).

١٣٣٠٩ - زَجَالَة •

الزجالة فن تربية الحمام الزاجل وترويضه على العمل المنوط به .

١٣٣١٠ - زَجَر • ، زَجَر (F). Latius (S). Latie (F).  
جنس اسماك بحرية من شقائق المنارة وفضيلة البهاريات . انواعه المعروفة خمسة : اسطفاها بحار المناطق الحارة من العالم القديم جميعها كبيرة القد طويلا براوح من ٧٠ الى ١٢٠ سم . ورواسها غليظة مضطربة الخشن . هيونا كبيرة مستديرة جاسطة . زانفها الظهرية مسطيلة . حراشها صغيرة . اثوابها بخلفة الابلوان غشية المراج .  
ج زجور .

١٣٣١١ - زَجَل Retournement des œufs (F).  
Returnement of eggs (E).

هو تقليب البيض . زاجلت الدجاجة : قلبت البيض في ايام الحضان لانها ان لم تجال مدر البيض . وهو ما يجب الالتباه له في الحاضنات الآلية ليسم البيض من اللدر .

١٣٣١٢ - زُجَم ، صُوْنُو الماء (S). Hydrochelidon (S).  
Mirodelle d'eau, Guifette (F). Sea-swallow (E).

جنس طير من كليات القدم . انواعه قليلة ثقبه الخرش لا انها اطول جناحا ورصا . تألف بحيرات ومنابع المناطق المعتدلة . تكثر في شواطئ البحر المتوسط . قوتها الحشرات والحوام والاسماك الصغيرة . تدثر في الاجنار والنباتات المائية . اناثها تبنيش وعضن ثلاث بيضات نحو اسبوعين || اشهر انواعه الزجم الاسود .

١٣٣١٣ - زُجَم اسود (S). Hydrochelidon nigra (S).  
Guifette noire (F). Black sea-swallow, Black tern (E).

لوع من الزجم . رأسه وصقعه وصدرة الى السواد الغامس . ظهره احمر الكين . جناحا وذنبه الى الريد القزاق المراج . بطنه وباطن جناحيه واظفكه الى البياض الناصع . منقاره وساقاه حر .

١٣٣١٤ - زُجَحار Enterotoxemies  
مرض معد خفيف يصيب الحيوان في امعائه فيؤذي .

١٣٣١٥ - زَحَافَات Reptiles (F). Reptilia (E).  
الزحافات توكلف الصف الثالث من قسم الفقاريات . مركزها المرتبي يأتي بين الطير والصفدييات . علمها يدعى زحفنة . اجسامها مسطحة اما بهفت متباينة الاشكال والياكة والمادة ، واما مسطحات قرنية ، مغشاة الشفافة شديدة الصلابة . تنفسها رئوي . اجهزتها التنورية والمصبية والمغصية والتناسلية كاملة . فحفها يتصل بالعمود الفقري بواسطة لقمة قذالية ، اوسطة ، بسيطة . بعضها مجهز بأربع قوائم يستعين بها للاتفاف ولعضها مرقال مدع القوائم . كانت فصائلها واجناسها في الازمنة النافرة كثيرة العدد وقد بلغت اربعها في الاباج الثاني حيث وصل عدد رتبها الى ١٩ . اما الآن ، فالانواع الممارسة تقدر بنحو ٩٧٥ تنقسم في اربع رتب فقط . وهي مخطويات الرؤوس والسلاحف والسحاسيات والشفديات .

١٥ مخطويات الرؤوس Rhynchocéphales (F).  
رتبة من الزحافات يمد ظهرها الى الاباج الثاني . وقد

١٣٣١٦ - زَبِيلين • ، سَمُور سَمِيرِيَة Mustela zibellina (S). Zibelline, Marte zibelline (F).  
Sable (E).

حيوان مفترس من السموريات . موطنه الاساقع الباردة بكثري في سبيرة . طولهُ نحو ٤٥ سم . وذنبه ٢٢ ثوبه جل الور الثام الطويل . ظهره الى السرة السوداء منته ويلتد الى الصببة الصناوية . خداه الى الرتبة . غطه اسود . انذاه الى السرة ، حشاها اريد . زوره وصدرة وطلته الى الصببة الصفراء المراج . فرتة فاعرة . يأنث الاحراج الكثيفة وجاري الماء . يسرح في الليل . قوته الحيلان والطيور والسك والبار .

١٣٣١٧ - زَبِيد • ، مَرِيُون Zapus, Meriones (S). Zapode, Mérieon (F).

جنس حيوانات ليونة قاضمة من فصيلة البيربوسيات . انواعه عديدة جميعها شديدة اللقد تطول من ٧ الى ١٠ سم . واذاها من ١٢ الى ١٥ سم . جرازها الخلفية مسطيلة تمكها من التفر الطويل . اثوابها الى الصببة السوداء . اذاها سود . اياظها اصفر . يملوا توشج اسود . بطونها ليش || تألف الانذكال واطراف الغابات والنباتي والجبال والادوية والحقول والمراعي . تسرح في الليل . اجسامها انفاق ودعايز تنفخها على عن ٥٠ سم . ثرتها المولد النباتية حل اختلافا من الجدار الى الحب ومن الارواق والبرام الى القار ومن الشب والجحور الى حلا الاجار .

١٣٣١٨ - زَبِيد ، حَمَجَمَة Reisin sec (F). Reisin (E).  
هو السب الزئب له طريقة تجفيف خاصة تمكنه من الاحتفاظ ببعض اللدانة .

١٣٣١٩ - زَبِيد بَرِي هو المائق الجيلي ، اطلبه .

١٣٣٢٠ - زَبِيدَة Fourmillière (F).  
Ant-hill, Ant's nest (E).

هي المنسة اى قرية التل || هي الزابية لا يملوا ماء .

١٣٣٢١ - زَبِيدَك هي الاذريين وهي القوشحان الخزني ، اطلبها .

١٣٣٢٢ - زَبِيدَكَة هي السمر الارط ، اطلبه .

١٣٣٢٣ - زَبِيل Cuellotr (F). Fruit-baker (E).  
قوة اى وعا ما توشع فيه الثار عند قصفها .

١٣٣٢٤ - زُج Ausruhe (F). Ostrich (E).  
الزج هو النعام . الواحدة زجاء وأزج للذكر .

١٣٣٢٥ - زُجَاج Verre (F). Glass (E).  
مادة صلبة شفافة سهلة الانكسار تصنع من الرمل والقل .

١٣٣٢٦ - زُجَاج هو حب القرزفل .

١٣٣٢٧ - زُجَاجِي ، شَقَاف Hystolde (F).  
Hystold (E).  
صفة ما هو شفاف كالزجاج .

١٣٣٢٨ - زُجَاف Colombophile.  
Périscronique (F). Pigeon faucyng (E).

الزجاف من تعامل تربية الحمام الزاجل وترويضه .



زبيلين



زبید



زجر



زجم اسود

Solénoglyphes	أَبُوِيَّات الإِخَادِيد	انقرضت ولم يبق منها سوى النوع المعروف بالخيرية أو السفنود الذي يعتبر أقدم الزحافات الماصرة لأنه مثال الخنثى الأول.	
Opisthoglyphes	خلفيات الإِخَادِيد		
Aglyphes	خديئات الإِخَادِيد		
Opotérodontes	سُرَاصِلَات الإِنْسَان	٢٥ السلاحف	
		Chéloniens	
	أما فصائلها فهي :	رتبة من الزحافات . أنواعها الماصرة المعروفة ٢٣٥ تجمع إلى ١٢ فصيلة . أجسامها مبطنة ملحمة . رؤوسها مكروحة صغيرة . أعناقها متوسطة الطول . فكوكها عديمة الإِسنان لكنها مجهزة بتصلال قرنية حادة الأطراف . قوتها غليظة . ظهورها مدورة بذبال . بطونها قرنية الكتف المعروف بالزيف . وزنها هذا سداسي الثقل يخرج منها الرأس والذنب والقوائم الأربع    أما فصائلها فهي : بالنسبة إلى التصنيف الحديث ، ما يلي :	
Typhlopidae	تفلوبيات	Trionychidae	ترسبات
Leptotyphlopidae	دسليبات	Kinosternidae	كينسترات
Boidae	بواكيات	Dermatemydidae	حسبات
Ilysiidae	حسبات	Palomédutidae	حفاسبات
Uroplattidae	خفريبات	Emydidae	حميات
Xenopeltidae	خدانيات	Platysternidae	غشاحيات
Colubridae	حنثبات	Chelydridae	دلهيات
Amblycephalidae	مسلحات	Carettochelyidae	دوريات
Viperidae	أفيبات	Chilidae	زقيات
		Tesudinidae	سلحيات
		Dermochelyidae	قديبات
		Chelonidae	بلديات
		Crocodylidae	٢٥ الجساحيات
			رتبة من الزحافات تشمل فصيلة واحدة تضم ٢١ نوعاً تجمع إلى ٦ أجناس . أكثريتها الباسقة من المناطق الاستوائية والحرارة . معظمها يعيش في مياه الأهر والبحيرات وبعضها يغترس مياه البحر كالتسلح البحري والتسلح الذي الخلف . تتميز التاسيح بأجسامها المستطيلة الخشنة ، مجلودها الخشنة الصلبة القاسية ، بقوة ذكورها الكبيرة المجهزة بإسنان ذرية ، يصغر حيوانها الجاشقة ، بارتفاع مناسرها الطرفية الانكسار ، وبإذناها الضخمة المستطيلة . أما أجناسها الستة فهي :
Iguanidae	عيدوبيات	Crocodylus du Nil	تسلح النيل
Agamidae	حرذوبيات	Crocodylus marin	تسلح بحري
Chamaeleontidae	حرابيات	Crocodylus à museau effilé	تسلح ذلق الخلف
Gekkonidae	زفريات	Gavial	تسلح الهند ، أذوم
Pygopodidae	سليليات	Alligator	تسلح امريكي ، ألباتور
Xantidae	تنطوبيات	Caiman	تسلح كيان ، كيان
Lacertidae	مقبات ، غشبات	Squamates	٥٠ السهلقات
Tetidae	تيديات		رتبة من الزحافات وقد قسموها إلى مرتبتين أو ثلاثين : مرتبة الحيات ومرتبة السطاليات .
Scincidae	مستقوريات		أ - مرتبة الحيات - الحيات حيوانات زسلفة مرقالة متوافقة الاخلاق والحيوم والأطواب . أنواعها المعروفة نحو ٢٧٠٠ تنتمي إلى ٢٥٠ جنساً تجمعها تسع فصائل تضم إلى خمس فئات .
Anguillidae	حنجربيات		الفئات الخمس هي :
Annelidae	فتاحيات		أمنيات الإخاديد
Heterodermatidae	فاغرات		
Varanidae	رويات		
Amphibénidae	تهقريات		
Gerrhosauridae	جسرويات		
Lepidae	سدييات		
Zonuridae	غنكيات		
Xenosauridae	دولسات		
Andrytropidae	عكيات		
Dibemidae	نقشيات		
Chilopodes	١٣٣١٦ - زحالف		
	رتبة دويبات تعرف بلقوة الأرجل .		
Diczyoporidae (F).	١٣٣١٧ - زحاميات		
Diczyoporidae (E).			
	عارة تطور بجمهورية من فصيلة الطحبات . تتميز ببوياتها القراصدية الشكل . أجناسها خمسة : الباريغة ، الرديفة ، الزوبوره ، الكونيزيوم والمكروسيورديم .		
		Protoglyphes	

خليلة ، محبة الأطراف || لها كاعنة الصنف قل من يرغب فيها .

1٢٣٢٦ - زُحْمُوك \*  
Loranthé sauvage (F).  
Wild loranthé (E).

نوع من الحشائش وصيلة الثعالب . وهو نبات طفيف يركب اغصان الاشجار الحرجية فينبغ فيها ويقنات من عصارتها . ج . زحاميكا .

1٢٣٢٧ - زُحْمِيَنَكَة \*

Zoonomie (F). Zoonomy (E).  
مجموعة من الشرائع الطبيعية التي ترمي حياة الحيوان .

1٢٣٢٨ - زُحْمِيَنِي \* \*

Zoonomique (F). Zoonomic (E).  
نعت ترميضي يطلق على كل شريعة طبيعية تتحكم بحياة الحيوان .

1٢٣٢٩ - زُحْمُك \*  
Agneau (F). Lamb (E).  
الزينة : اولاد الذئب لانها ترعى اي تلاق وتضع من رائها .

1٢٣٣٠ - زُحْمُوط \*  
Glaire (F). Glair (E).  
الغاط السائل عند الدواجن من الايل والخليل والشاء والبطر .

1٢٣٣١ - زُحْمُوط \* ، زُحْمِيَنَان \*  
Gagea (S).  
Gagée (F). Gagea (E). Goldstern (D). Gagea (I).  
جنس نباتات بصلية من فصيلة الزنبقيات . انواعها المعروفة ٢٠ منجها بري وبعضها زراعي تربي ، لورالها غنية مستطيلة . ازهارها صفراء اللون طويلة المتق متعددة يجسمها شراخ اجوف مستطيل .

1٢٣٣٢ - زُحْمُوط \*  
رجاء ابنة يوم .

1٢٣٣٣ - زُحْمُوطِيَات \*  
Ephemeridae (S).  
Ephéméridés (F). Ephemeridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة المرجسيات وطبقة البويات . اجناسها وانواعها عديدة جميعها تحية الاجسام المستطيلة ، دقيقة الاطراف والارباعي .

1٢٣٣٤ - زُحْمُوطِيَات النَّمْص \*

Incurvaria musculetta (S). Mineuse des feuilles du chêne (F). Incurvaria musculetta (E).  
حشرة من فصيلة الزغوليات حشرات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاذن الى بعض مناطق اوروبا وافريقية الشمالية . فرائشها حبيطة تعيش على غزونها الاسمانى . ريشها لائحة ثم غاصلة ، تلم اوراق الفص والسديان ثم تنهيرا الى الاغصان البنية || جسمها صغير قصيف بطول من ٤ الى ٥ م . بطنها فراخ من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستطيل الجرم حطلي اللون . حينها كيرتان . زيانها غطيان . ملاسها صفرة . مرشها جعدة . جوشها الى الحطلي وبطنها كلك || وراشها كبيرة . ورشها الاماميان الى اثني المايق تملو بقعتهما ثلثيا اللون . ورشها الخلفيان الى الحطلي القاتم . اهدالها الى الحطلي الاصفر || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة السرة ثقب بشرة النصل وتلفه وتعيش على غذائها الزون السرة ثقب بشرة النصل وتلفه وتعيش على غذائها الزون

1٢٣٣٥ - زُحْمُوك \*  
Reptation (F). Creeping (E).  
الزحف الانتقال على الارض ديبيا كما تقبل الزحافات من ثابين وطاء وغيرها .

1٢٣٣٦ - زُحْمُوك \*  
Erpétologiste (F).  
Herpetologist (E).  
الزحفن موليدي اختصاصه درس الزواحف .

1٢٣٣٧ - زُحْمُوكَة \*  
Erpétologie.  
Herpétologie (F). Herpetology (E).  
الزحفنة او علم الزواحف جزء من علم التاريخ الطبيعي .

1٢٣٣٨ - زُحْمُوكِي \*  
Erpétologique (F).  
Herpetologic (E).  
نعت ترميضي يطلق على كل ما له صلة بالزحفنة .

1٢٣٣٩ - زُحْمُوك \*  
Saturne (F). Saturn (E).  
كوكب من مجموعة النظام الشمسي ، وهو من الخس . سرته دورته الانتاقية في الفضاء نحو ٣٤٧٠٤ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق ٢٩ سنة و١٦٧ يوما || ولانجسن يدعونه شيخ النجوم ويسمونه النمس الاكبر لانه في النصوص فوق المريع واصافوا اليه الخراب والحلاك والم والم .

1٢٣٣٩ - زُحْمُوك \*  
الزحف : دابة تدخل في حرجها من قبل اسفها (السان) .

1٢٣٣٤ - زُحْمُوكِيَة مَبْكِيَة \*  
Tomoxia biguttata (S). Tomoxie à 2 taches (F).  
Tomoxia biguttata (E).  
حشرة وائمة غاصلة دامت من فصيلة المزدليات ورتبة مفصلات الاجنحة . تألف البراري التي تكثر فيها نباتات الفصيلة السبيلية . غناصها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقنها تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الاخلال || جسمها صغير القد بطول من ٥ الى ٧ م .

توحيها الى الكسفي التاتم تملو في اواسط الظهور بقعة بيضاء وزرقاء . رأسها مستعرض الجرم . زيانها غطيان . حينها صغيرتان ماصتان . ظهرها غيب الخضر لا يلحف كامل البطن . بطنها بردي الشكل ينحني بسم ذلق || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتعيش حتى آب . تسرح في النهار . تساف في تموز . تنجح للمكن تحت غطاء الاشجار اليابسة والاعشاب المقطوعة || البرقة منه يولفها الإدراك التام بطول نحو ١٢ م . جسمها شبه رشي الشكل ، سداسي القرواجب ، مستطيل الرأس ، ضلع التثدي ، احمل اللون ، اسمر الموج يسود ويمر في الرأس والشرج || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينحني طليقا في التربة .

1٢٣٣٥ - زُحْمُوكِي \* \*

Rhypticus (S). Savonnier (F).  
زحلوكة وزحلوكة جنس اسماك بحرية من شائكات الزعانف وفصيلة الفريشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد . اصلاها بحر البلاد الحارة والامراتية || اجسامها الحليجية الشكل . مسكها داعم السهف ، تمام للشمس . حينها كبيرة ، نائمة ، جاسقة ، ربيعة الاركان . زعانفها الظهرية مستطيلة ، شائكة المنحصر الامامية . زعانفها الذيلية



زحلوكة مبقية



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة



زحلوكة النمس



## ١٣٤٢ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Mécépimère (F).

Metepimerium (E).

هو في الحشرات البضو التحيل البقيق الذي يصل البرجد بالبرجد.

## ١٣٤٣ - زُرْعَةُ الْخَوْسَنِ

Epimère (F).

Epimerium (E).

هو في الحشرات عضو صغير يمدل كسلة وصل بين غشيش الميوشن وسائر اقسامه.

## ١٣٤٤ - زُرْعَةُ الْوَرْدِ

هو الحقيق ، راجحه .

## ١٣٤٥ - زُرْعَةُ حَيْثِي

هو الحظفة ، اطبا .

## ١٣٤٦ - زُرْعَةُ دَهْيِي

هو الحيزان الحريف ، راجحه .

## ١٣٤٧ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Elansons (F).

Elans (E).

جنس طير من عمارة الحدأة فضيلة الصقريات ، أنواعه سبعة جميعها من كواسر المناطق الحارة . منسارها غليظة شديدة الانحناف . سرقلها طرية . أفتانها قصيرة . غالبها قوية . أظفارها حادة . أريولها رقة متندبة . الأليان ينط في ظهرها الأزرق الاسمر وفي بطنها الأبيض الاخير . جميعها يابسة المزاج ، شديدة الجناح ، سريعة الطيران لا تهاب شيئاً . انهزها الزرق والكنجي .

## ١٣٤٨ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Plantour (F).

Planter (E).

هو الذي يمارس زرع الأرض .

## ١٣٤٩ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Agricultura

هي فن زراعة الأرض وبترفيها الشامل هي فن استئثار النباتات الزراعية والحيوانات والجماعة على أكل وبه الاقتصادي .

## ١٣٥٠ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ ، زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Culture (F).

Culture, Cultivation, Husbandry, Tillage (E).

هي العمل الزراعي المخصص .

## ١٣٥١ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Fructiculture (F).

Orcharding, Fruit-growing (E).

هي التي تسمى بانتاج ثمار الفواكه .

## ١٣٥٢ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Culture de porte-graines (F).

وسمى من قلة زراعة التقاري والهيئات والبزرات . وبهم من كل زراعة تهتف الى انتاج البذار راجح حمزة .

## ١٣٥٣ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Horticulture

تخصيص زراعي غاية استئثار النباتات البستانية دون سواها .

## ١٣٥٤ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Mosaiculture

تخصيص زراعي يركز على ترويب الحدائق وفقاً لاشكال هضمية يلمب فيها لين النبات الورق لقرنسي .

## ١٣٥٥ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Sylviculture (F).

Forestry (E).

هي علم التصريج يبحث في استنبات وقرس واستئثار الأشجار الحرجية .

## ١٣٥٦ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ الْبَرْجَادِ

Culture maraichère, C. potagère (F).

Pot-herbe cultivation (E).

تخصيص زراعي غاية انتاج البقول .

نحو ثلاثة أسابيع ثم تخرج من التلق وتعدل بخيط حريري المائدة حتى سطح التربة حيث تنويه نحو الاضباب البرية . والسرقة عند بلوغها الادراك تمام تعلق نحو ٨ م . جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم ، اسمر اللون ، ميمتر الحلب ، اسيد الرأس والفرج . طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً ينتهي طلياً ضمن جراب السرعة في الجلالة او بين الارواق التي تلتاس التربة .

## ١٣٣٥ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Incurvarilidæ (S).

Incurvarilidæ (F).

فصيلة حشرات فراشية من رتبة حرشنيات الاجنحة . انواعها المرفقة نحو ٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تسرح في التباد وتبيت في الليل . طياتها متدل البرقصة والحرم . اجسامها صغيرة ، مغزلية الشكل . رؤوسها مسطعطة . عيونها كبيرة ، نائرة . قرونها الاستشعارية غليظة . شديدة الطول . ملابسها صغيرة ، قصيرة ، جالسة . مرافقها جناح . طياتها كيفية التمدل القصير . حذاتها لا يوجد لها . رؤوسها ذلقة الاطراف الخارجية . فلتايب قوائمها الخلفية رباعية المتناسخ . اساريها مبطعة ، زباء الفشار . لاهة في اول عهدها ثم خاضعة تيش داخل جراب مبط طوى اليه ويغير عند الاطلاق . خادتها طليقة تصعر ، في طور الاكمال ، ضمن جراب السرعة . أشهر اجناسها الزعلوب والاديلة والمنفوده .

## ١٣٣٦ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Turnera (S).

Turnère (F).

جنس نباتات طليعية عشبية من فصيلة الزوايات . انواعه نحو ٦٠ متبها المناطق الحارة والامتوائية . جميعها سرية التنو . اوراقها متعاقبة ، متعقة ، احليجية ، ذلقة . ازهارها ابيلة الارتكاز فروية التصبيج . اوراقها طليعية تنفد القلب وتنشط الباه . أشهر انواعه الزادع السابق .

## ١٣٣٧ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ ، دَمِيَاة

Turnera aphrodisiaca (S).

Daminara (F).

جنية زراعية طليعية مهدا البلاد الحارة . ساقها فرفرا زغبية الاحام ميمرة المسام للندية الشكل النعنية للمادة . اوراقها متعقة ، متعاقبة ، احليجية الشكل . نصلها جامد اللون . كثير التمروق ؟ صفحه العليا كيفية المسام الندية . يستخرج من اوراقه زيرويه زيوت طليعية ويولد دمية وراثية صاعرجا الفعالة شديدة البقع على الاضضاء التناسلية . تليها شايق منظر . كثيرها مؤذ .

## ١٣٣٨ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Turneraceae (S).

Turneraceae (F).

فصيلة نباتية من ذرات الفلقين . اجناسها وانواعها مهددة جميعها عشبية او شجيرة . ازهارها شتوية خماسية التركيب . ثمارها حقية ثلاثية المصارع . بذورها دقيقة سرء اللون . اعرف اقلها وظهرها الزادع .

## ١٣٣٩ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Pars, Portion

هو التصيب والحصة . ج ازداب .

## ١٣٣١٠ - زُرْعَةُ الْبَرْجَادِ

Bouton floral (F).

Floral bud (E).

هو الكم الزهرة قبل انبلاجه .



زادع شايق

وتوب القمح || موطنها فياني افريقية وإدغالها. قربها الشب وورق بعض أنواع الميموزا والسنت والاكوية . تعيش جماعات صغيرة العدد أجملها يتألف من فصل وثلاث أو أربع أنثى وثلاثة أو أربعة مدبار .

### ١٣٣٠ - زَرَاقَة Camilopard, Girafe (F). Camelopardus (E).

الزراعة كوكبة نجوم شمالية المقيع مركزها بين كوكبة هسك الاعنة وكوكبة الدب الاصفر || عدد نجومها ١٩ جميعها من المرتبة الخامسة .

### ١٣٣١ - زَرَاقِيَّات Giraffidae, Camelopardalidae (S). Giraffidae, Camelopardalidae (F). Giraffae, Camelopardalidae (E).

فصيلة حيوانات مجترمة من ذوات الظلف تقبل في الزمن الحاضر جنس الزرافة الوحيد النوع .

### ١٣٣٢ - زَرَاقَة \* Fistularia (S). Fistularia (F). Fistularia (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الزرقانيات. أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها ببحار البلاد الحارة من البحر الاحمر الى بحر الصين || اجسامها غليظة ، مستطيلة ، لزجة ، صاعدة الحراشف . رؤوسها صغيرة ، انبوية الاعظام الطويلة . زعانفها الذيلية غائرة تلتصق في وسط كل منها عذبة مستطيلة دقيقة تشبه سوط الخويذ || لحومها كاعنة الصنف وبهشها جعالي المادة مؤخر .

### ١٣٣٣ - زَرَاقِيَّات \* Fistulariidae (S). Fistulariidae, Fistulariidae (F). Fistulariidae (E).

فصيلة اسماك بحرية يربطها من شاكلات الزعانف ، اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد موطنها معظم ببحار البلاد الحارة || تتميز باجسامها الضيقة المستطيلة وباعظامها الانبوية . عينها صغيرة ناشزة . زعانفها الظهرية غليظة الاركانز قريبة من الذيل || اعرف اجناسها واشهرها الزرافة والصيصة .

### ١٣٣٤ - زَرَاقُود \* , أوستولوزية , هسَمَتُون , Aristolochia (S).

أristolochie (F). Worm-killer, Birthwort (E). Osterluzel, Hohlwurz (D). Aristolochia (I).

جنس نباتات عشبية ليلية عارضة معمرة من فصيلة الزراندنيات . انباضها عديدة منها البرية والبرية والعلوية . اوراقها متناقبة قليلة الشكل ومنها ثنائية أو ثلاثية التخصيص انباضها كبيرة القد ، غريبة الشكل ، مختلفة الاوان . جذور الانواع الطيبة كافورية الرائحة تشتمل كمرة وفي مدرة القطن ، تسهل الولادة ، تزيد من الربو ، تنفي القروح وتجلو الاستان . ويستخرج منها جوهر جعالي فداي يدعى زرافتين قليلة مقو جزيل النفع ، كثير سم زعاف .

### ١٣٣٥ - زَرَاقُود أرغَب , سَمَمَقَار , سَمَمَقَارَان Aristolochia tomentosa (S). Aristolochia cotonneuse (F).

نوع من الزراندنيات ساقه مادة عارضة زبدية تطول من ٥ الى ١٠ امتار اوراقها قليلة ذلقة الزام الاخير . نعلها خلي البثرة . انباضها كبيرة القد ، قليلة التحسين . صفحتها الخارجية صفراء اللون اما الداخلية فبنفسجية .

### ١٣٣٦ - زَرَاقَة الزُهور Floriculture

تخصيص يتناول زراعة وتعد النباتات الزهرية والزهرية .

### ١٣٣٧ - زَرَاقَة الشجر Arboriculture

تخصيص في الزراعة يتناول استئثار الاشجار دون سواها .

### ١٣٣٨ - زَرَاقَة الكرْم Viticulture (F).

تخصيص في الزراعة يتناول الكرمة .

### ١٣٣٩ - زَرَاقَة الكرْم Trufficulture (F).

تخصيص في الزراعة يبحث في استنبات واستئثار الكرْم .

### ١٣٤٠ - زَرَاقَة المُستَدَات Culture en espalier (F). Espalier-culture (E).

تخصيص في الاساليب الزراعية التشكيلية المتبعة في قيادة وتمهد الانجرار للثمة المرتكزة على المستلآت .

### ١٣٤١ - زَرَاقَة بَا كُورِيَة Culture forcée (F).

كُل زراعة تستعمل اوانها المألوف ان باليسية او بالبريقية .

### ١٣٤٢ - زَرَاقَة بَعْلِيَة Dry farming

كُل زراعة لا يتبعها راي بل تقوم على اسقاء المطر .

### ١٣٤٣ - زَرَاقَة حَدِيْقَة Néo-culture (F).

كُل زراعة ترتكز على الاساليب التقنية الحديثة .

### ١٣٤٤ - زَرَاقَة كَهْرَبِيَة Electroculture

هي الزراعة القائمة على الاستدانة من الكهرباء في سبل الانتاج الباكر وربما تحمين الانتاج .

### ١٣٤٥ - زَرَاقَة لَاحِيَة Culture intensive (F). Intensive cultivation (E).

زراعة تقدمية تهدف الى الحصول على اكبر انتاج ممكن في بقعة معينة من الارض .

### ١٣٤٦ - زَرَاقَة مِيكَانِيْكِيَة Culture mécanique (F). Mechanical cultivation (E).

هي الزراعة القائمة على استعمال الآليات .

### ١٣٤٧ - زَرَاقِيَة Agricole, Agronomie (F).

صفة كل ما يتنسب الى الزراعة او يتصل بها .

### ١٣٤٨ - زَرَاقَة \* Girafa camelopardalis (S).

Girafe (F). Giraffe (E).

الزرافة حيوان لبون مجتر من ذوات الظلف وفصيلة الزرافيات الخالية من الجهاز القسوي || والزرافة سبعة الجنس والنوع جميعها سيم البير ، ارتفاعها الكامل من ظلفها حتى نقرة رأسها يقو ستة امتار وارتفاعها المألوف من الظلف الى الحاروك لا يقل عن ٢٢٥ سم . وهي قصيرة اليرجلين طويلة اليدين والعتق منحدرة الظهر ، لها قرنان عظميان منفلدان صغيران يتوسلها تنوء بارز . ثوبها الى الصفرة يطولها تقيع قروي متتابع التبيين لا تقياس الشكل والحجم . وقد قبل في وصفها لها رأس القرس وبهشها ، وعنق الجمل وراسلته ، آذان الثور ، ذنب الحمار ، قوائم الهامة



زرافة



زَرَاقَة



زَرَاقُود

leuse, Noctuelle colorée (F). *Brotilomia metacolorata* (E).

حشرة بجلة الألوان المتداخلة من فصيلة النسيات رتبة حشرغيات الاجنحة. موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط والمناطق الساحلية المتاخمة. فرشتها واضحة قوتها رقيق الاذياع. سرقها غاشلة تركب الكثير من النباتات البرية والزراعية اغصانها الوردة والبنفسج || جسمها مستطيل الجرم بطول من ١٣ الى ١٥ سم. يسطها قزوح من ٢٨ الى ٤٢ سم. رأسها مستطيل الخصر، كبير الخطر، حطلي اللون، اسمر الموانج. عينها كبيرتان، نافذتان. زباناها غطيان، مستطيلان. ملامسا صغيرة. مرشها مستطيل. بيوتها حطلي اللون وقلها ايضا || رواشها مزودة ببيضة وبغرضه الخنار الحارضي || الاثني اكبر قدام من الذكر واغلف بطناً منه || لها ثلاثة ابيال في الجيل. تظهر فراشة الجيل الاول في آذار وفراشة الجيل الثاني في حزيران وفراشة الجيل الثالث في ايلول. تسر من القزوب الى فصحة الليل ومن الفجر التبع الى الشروق || تباشر الاثني وضع المكن بعد التكون بيويون وتلقو لها سطيلة الشكل تغلفها مادة غروية لاصقة تلتصق بها على الصفحات السفلى من تصال الارواق || السرعة عند بلوغها الاذراك بطول نحو ٤٠ سم. ثوبها يتأرجح بين الاخضر والاسمر يملو خط ثوبي زاهر متوسطه ليل سود ويلموا ايضا خطان جانبيان قاطبان. ورأسها الى الحطلي يملو موانج اخضر. منها ورواجها الى الحطلي الاسمر || طول الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في القربة ضمن جراب من الطين.



زربة ذبقة

### ١٣٣٦ - زُرُونْد \* ، شاي المكسيك

*Chenopodium ambrosioides* (S). *Chénopode fausse-ambrosie*, Ambrosia, Thé du Mexique, Thé de Sibitsa, Thé des Jéuntes (F). Mexican tea, Wormseed, Mexican goose-foot (E). Mexikanisches tee-kraut, Teagesselfuss (D). Ambrosia, Thé del Mexico (I).

نوع من الاثنية وهو نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة السرمقيات. يملو من ٣٠ الى ٨٠ سم. اوراقه مستطيلة الشكل، نصلها ازغب البشرة تنسج الصفحة المنددة. ازغاره صغيرة اللد تاجية الاذكار || اوراقه حطرية صمية تستعمل لاصحاب الشاي.

*Sarment* (F). Vine-shoot (E). **زُرُونْدَة** \* ، السرح ، قصب الكرمه.

١٣٣٨ - زُرْد \* هو حار الزرد ، اطبخه .

١٣٣٩ - زُرْدَان *Vestibule* الجزء الداخلي من القرح يمتد به حاجر الكبة ويتنهي عند عتق الرس.

١٣٣٩ - زُرْدَا \* هي فلك زرده ، اطبخه .

١٣٣٩ - زُرْدِي \* ، مَجْرَجَ *Zébré* (F). *Striped* (E). ثمت وصني يبر عن الخطوط المعترسة الانعكاسية الطول والعرض التي تملو اوتاب الحيوان كما هو الحال في حمار الزرد .

١٣٣٩ - زُرُونْد ، زُرُونْد ، بَلَسَان *Sturnus* (S). *Etourneau* (F). *Starling* (E).

جنس طير من فصيلة الزروريات. انواعه ستة منها



زريع

### ١٣٣٦ - زُرُونْد مُتَبَانِي ، اُوسْتُولُوحيّة مُتَبَانِيّة ، لُوف عَطْرِي

*Aristolochia serpentaria* (S). *Aristolochie serpentinaire* (F). *Virginia snake-root* (E).

نوع من الزراند الطبي. ساقه متعصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقه قليلة القاعدة ، احليلجية اقزام الثاني والثالث، ستائية الاخير ، ثنائية التقويس ، صغيرة اللد. جلوده طيبة عطرية غنية بالزراندين.

١٣٣٧ - زُرُونْد دَالِمِ الخَصْرَة ، سُرُونِيَات *Aristolochia sempervirens* (S). *Aristolochie toujours verte* (F)

نوع من الزراند ساقه مدادة قليلة التحريش تطول نحو ١٥٠ سم. اوراقه عروية قليلة الشكل مستطيلة مدبة اقزام الاخير. نصلها مائل للبشرة ، لامع الغضار الزاهي. ازغاره الى الصفرة المصلمة بالاحمر.

### ١٣٣٨ - زُرُونْد سِيْفُو ، مَسْهُورَة

*Aristolochia macrophylla* (S). *Aristolochia siphon* (F). نوع من الزراند ساقه مدادة عارضة تطول من ١٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه قليلة الشكل يملوا بعض الازغب. ازغاره كبيرة مقوسة لنها الى الغضار الحطلي يملو تحطيط ابيض.

### ١٣٣٩ - زُرُونْد صِيْنِي

*Aristolochia moupinensis* (S). *Aristolochie de Moupin*, A. de Chine (F).

نوع من الزراند هذه الصين. ساقه مدادة عارضة تطول من ٨ الى ٨٠ سم. اوراقه متعصبة النصل اعناقها مدبة الازغب. ازغاره صفر يملوا من الداخل تقيج احمر.

### ١٣٣٩ - زُرُونْد مَهْدَب

*Aristolochia fimbriata* (S). *Aristolochie frangée* (F). نوع من الزراند ساقه متعصبة تملو نحو مترين. اوراقه مستديرة شبه مقطوعة. ازغاره مهدبة الخنار صفحتها الخارجية قشقية اللون اما الداخلية لمخططة.

### ١٣٣٩ - زُرُونْدِي اَبِيصِي

هو المبنابة الثنائية النصل. اطبخه .

١٣٣٩ - زُرُونْد بَات *Aristolochiaceae* (S). *Aristolochiacées* (F).

فصيلة نباتات مدادة عارضة او متعصبة. اجنتها وانواعها كثيرة اللد مهدبة البلاد الحارة. اوراقها متعاقبة مستقيمة. ازغارها ابليّة الاذكار ، فردية التجميع ، كبيرة اللد. غمارها كاسبر سداسية اللق. منها انواع طيبة حميدة النتج.

### ١٣٣٩ - زُرُونْدِيْن ، اُوسْتُولُوحيْن

*Aristolochina* (F). *Aristolochin* (E). جهور جمالي فساد مر الطم يستخرج من جلور بعض انواع الزراند اغصانها :

*Aristolochia serpentaria*

*Aristolochia clematidis*

١٣٣٩ - زُرْب \* ، زُرْب *Parage* (F). *Folding* (E). قليلة اللد والملمز .

### ١٣٣٩ - زُرْبَة ذَكِيكَة \* ، عَسْمِيَة مُلُونَة

*Brotilomia reticulosa* (S). *Brotilomia reticulosa*

**Bernage (F).** ١٧٤٠٢ - زُرْزُكَة الرَّعَايَة  
هو الزرور المكنن من خليط من البذار يستعمل كمكاف  
اخضر .

**Drogall** ١٧٤٠٣ - زُرْزُكَة الْعَصْفَر  
هو زرع الحبوب قبل المطر . والعصر أول سقاية يسقاها  
الزرور من المطر .

**Semences (F). Seeds (E).** ١٧٤٠٤ - زُرْزُكَة  
هو الحب الممد الزرع . راجع بذار . يقال اصلي زرعة  
ازرع بها ارضي || والزراعة : فرخ القيقبة .

**Glabé, Sol (F).** ١٧٤٠٥ - زُرْزُكَة ، مَسَاوَكَة  
**Glebe, Sol (E).** الارض التي تزرع .

**Sole (F). Break, Field (E).** ١٧٤٠٦ - زُرْزُكَة ، عَمْرَكَة  
كل زرعة من الزراعات التي تتعاقب في ذات المكان .

**Céréaline (F). Cerealin (E).** ١٧٤٠٧ - زُرْزُكَة  
هو عنصر الخبز الموجد في النخالة ويقال له سبورين .

**Fritolée, Bouques (F).** ١٧٤٠٨ - زُرْزُكَة \*  
**Leaf drop streak (E).** ممان المهندس عادل ابو النصر ومرض يجهد اوراق البطاطاء

وبنهم من قال « مرض يجهد اوراق البطاطاء » || وهو  
ضرب من سرج البطاطاء يولد الى يوروس لا يصيب القرنة  
فيحور شكلها الطبيعي من الاستدارة الى الاستطالة  
وين البقيع الى المردني بعد ان يزيد حتى غور المويينات .  
اما النباتات المصابة فيجدو تحيلة الفروع المزدعة ،  
صفرة الاوراق المنكشة المنحنية بالاخضر المانيق والباهت  
والاصفر ثم يتجدد نصلها وتلتوي اطرافه وصله نحو  
الارض || اضراره متفاوتة التندير لانها تعيد الى طاعة  
اليوروس وعلى انتشاره || يكافح بالانتخاب البذار  
السليم وباختيار الاربة الفقيرة لان فقر التربة مع شدة  
الحرارة تشتتاه كثيرا .

**Scornita** ١٧٤٠٩ - زُرْزُكَة \*  
حلقة من حلقات بطن الحشرة الذي يتركب من عدة  
زرايين .

١٧٤١٠ - زُرْزُكَة \* ، زُرْزُكَة الشَّرَق  
**Elanus melanopterus (S). Elanion mélanoptère (F).**  
**Black-winged kite (E).**

طائر من الزراوين ينتمي الى عمارة الحدا وفصيلة  
الصقريات . موطن الشرق الاوسط وافريقية ، يكثر في  
مصر وسورية . رأسه وسنقه سود . ظهره وذنبه  
الرمادي الازرق . بطنه ابيض . منمره اسود . عيانه  
قزوينان . يحالبه الى الصغار المرتقالي || يلدن عشه  
في الاجار الرقيقة . قوته القواصم والجراد ويخلف  
الحشرات .

**Colombine (F).** ١٧٤١١ - زُرْزُكَة الْحَمَام  
**Columbine (E).**

محدد عشوي في بالازوت ويسائر العناصر الغذائية .  
يعتبر من الامنة المعارية .

١٧٤١٢ - زُرْزُكَة الطَّيْر هو البيتية ، الحلبا .

١٧٤١٣ - زُرْزُكَة هي الزبور الصغير ، الحلبا .

القواطع والارابه . تعيش جماعات . قوتها الحشرات  
ويبيض البذار . تتميز بريشها الاسود اللامع المرط ،  
بامتلاحة اجنتها ويقصر اخذها || عثن في الاجمار .  
انثاها تحضن سمها من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في  
السنة || اشهر انواعها ما يتبع .

١٧٣٩٣ - زُرْزُور أُرْجَوَانِي  
**Sturnus purpuraceus (S). Ectourneau pourpre (F).**  
طائر من الزرور موطن ايران والافغان ، ريشه ارجواني  
متنشر بالابيض . طوله نحو ٢٠ سم . سره قليل العدد .  
يألف للناطح والمقاصب ويجاري الماء .

١٧٣٩٤ - زُرْزُور أَسْوَد  
**Sturnus unicolor (S). Ectourneau unicolore (F). Spotted starling (E).**  
طائر من الزرور طوله نحو ٢٠ سم . قويه سوي اللون  
الاسود اللامع . يعيش اسراب كبيرة العدد يجوب البلاد  
من الهند الى جنوب اروبة .

١٧٣٩٥ - زُرْزُور الْبَادِيَة ، سَوَادِيَّة  
**Onychognatus (S). Onychognata, Ectourneau noir (F). Grackle (E).**

طائر من الزرايزر يألف البادية يكثر في شبه جزيرة  
سينا فوه الى السواد اللامع يملو موج ازرق . قوامه  
حر منقلبه اسود . يألف الادغال واجمار اللس .

١٧٣٩٦ - زُرْزُور الْهَشْد  
**Sturnus splendens (S). Ectourneau splendide (F). Splendiferous starling (E).**  
طائر من الزرور قويه متراكب الالوان الزاهية الجميلة  
المرطبة فيها الاسود والاخر والجزوي والاصفر والابيض  
والخضلي . طوله نحو ٢٢ سم . يألف المراهي ويجاري الماء .

١٧٣٩٧ - زُرْزُور مَالُوف \*  
**Sturnus vulgaris (S). Ectourneau vulgaire, E. commun, Saisonnet (F). Common starling (E). Star (D).**

طائر من الزرايزر القواطع يجوب الشرق الاوسط واروبه  
وافريقية الشمالية . طوله نحو ٢٢ سم . قويه الى السواد  
اللامع يملو موج ازرق واخضر ورقشة يبيضه يخلت  
سجم فضفا بين الظهر والصدر والبطن . منقلبه خضلي .  
عيانه كستينان || قوته الحشرات والديدان والحلزونات  
والحرب والآخر العنينة .

١٧٣٩٨ - زُرْزُورِيَّات  
**Sturnidae (S). Sturnidae (F). Sturnidae (E).**

فصيلة طير من رتبة الجواثم اجنتهاها وانواعها عديدة .  
اجنتهاها ريشة متوسطة القد . اجنتهاها مستطيلة .  
اذنانها قصيرة . اسرارها قوية . منقلبهها مخروطية الشكل  
مدقة الطرف . اقواها عديدة الالوان المختلفة || اشهر  
اجنتها الزرور والسمسر واللينات والبنفاف .

١٧٣٩٩ - زُرْزُكَة هو البرابرس ، الحلبا .

١٧٤٠٠ - زُرْزُكَة  
**Emblaver (F). To sow with wheat etc. (E).**  
حرث الارض وسدحا ويغروا .

١٧٤٠١ - زُرْزُكَة ، زُرْزُكَة  
**Céréales (F). Cereal, Corn crops, Grain (E).**

كلمة شاملة تطلق على النباتات الزراعية الموصية من  
فصيلة التجيليات التي تزرع لاستثمار حبوبها كمنشوية  
الذئانية .



زرزور الهند



زرزور مالوف



زرن



زور

١٢٤١٤ - زُرْف \*  
Pariseus (S).

Mésangeal (F). Siberian Jay (E).

جنس طير من فصيلة الزرقائيات ورتبة الجوارح سنيات الخاتير. له نوعان واحد أسودى والآخر كندي. يألف الاقلام الباردة والقيات وأسراج الصنوبر انحصار صنوبر سمير || جسمه معتدل القد طوله نحو ٣٠ سم. قوته الى القفص الصنابية بامتلاكه الرأس قفاه أسود. عقاده غروفي الشكل ، شديد الصلابة ، جناحه معتدل الطول. ذئبه وتاجي الرقاع ميسر الطوف. حلقة حبه ذئبية اللون. وصفاء الى السمة المظلمة || قوته الحشرات والبذر ويعجن بلور صنوبر سمير في تجاويف الاشجار لتفتر كزخمية لفصل الشتاء || يائن حشه في الاشجار القريبة من سطح التربة. الاثني تضع من ه الى ٧ بيضات تحضنها وسطها نحو ١٧ بيضا بينا الذكر يئين لما للفناء.

السهم. رؤوسها غروفيّة ، كبيرة الاشداق ، كثيرة الاسنان للفكية والحنكية .

## ١٢٤١٨ - زُرْفُون

Zircon حجر بلوري مركب من سيليكات الزرقيوم. ثقته النقي براوح من ١٥ الى ١٧، وصلاته نحو ٧,٥ لونه حاد المستقر براوح من الاصفر البرتقالي الى الاحمر، لمعاته بلوري المراج. هو شائع الاستعمال في الصياغة يعتبر من الاحجار الكريمة البالية الى المزية الزاينة او الخاسة .

## ١٢٤١٩ - زُرْفُونِيوم

Zirconium معدن باهي الاتوم مركزة بين الاوليبيوم والسيلايوم. رمزه (Zr) وزنه الاتومي ٨٩,٩٦ .

## ١٢٤٢٠ - زُرْفِيكِيَّة

Murine (F). Moray (E). هي الشقي ، من الاسماك البحرية المفترسة ، اطبا .

## ١٢٤٢١ - زُرْفَب

هو القلقوس ، اطبا .

## ١٢٤٢٢ - زُرْفَكَة

Penil (F). Penile, Penial (E). الجزء الخلارجي العلوي من القفرج .

## ١٢٤٢٣ - زُرْفَكَاة ، زُرْفَكَة

Zingiber zerumbet, Anomum zerumbet (S). Zérumbet, Anomum savagae (F). Wild ginger, Broad leaved ginger (E). Zerumbet, Wilder ingwer (D). Zenzaro blanco, Z. salvatico (I). نبات بري جلموري طيب من فصيلة الزنجبيلات منته البلاد الحارة. مسفه يحرق اللحم ويزيل روائح الخمر والصلب وماشبه. وهو منه معوي يغسل الرياح ويقيرو القلب. سافه منتصبه حولية تملو من ١٠٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها متعاقبة ، تفصلها سناني الشكل جامد الصفعة . ازهارها هامة كبيرة القند ، كبريتية اللون .

## ١٢٤٢٤ - زُرْفَكُولَة ، زَهَر التلج

Chionanthus (S). Chionanthe, Arbre de neige, A. à franges (F). Fringe tree, Snow-drop (E). Schneeflockenbaum (D). Chionanto, Fior di neve (I). جنس اشجار وشجيرات وشجيرات برية وزينة من فصيلة البزونيوات . جلدوها اسطوانية غروفيها ولتقدم سطحة . اوراقها عابطة متعاقبة بسيطة لتصل الجلد . ازهارها متكونية التنجبع ، ثلاثية التركيب ، بيضاء اللون || اشهر انواعها الزينية مايل .

## ١٢٤٢٥ - زُرْفَكُولَة الشَّرْقِيَّة ، زُرْفَكُولَة صِيَتِي

Chionanthus retusa (S). Chionanthe de Chine (F). شجرة سبروتية تملو من ه الى ٨ اثمار . اوراقها املجية مضطحة القاعسة ، مدببة القصة. تفصلها يطول من ه الى ٧ سم. ويبرس من ٣ الى ٤ . عروقه باردة خالية البشرة . شكلها الزهري منتصب الاوتكاز ، ازهارها عطرية العرف صبرية القند تطول نحو ٢ سم. || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٤٢٦ - زُرْفَكُولَة فِيرَجِينِيَّة

Chionanthus virginica (S). Chionanthe de Virginie (F). شجيرة سبروتية تملو من ٣ الى ١٠ اثمار . اوراقها سنانية لتصل الجلمة تطول من ٨ الى ٢٥ سم. وتعرض من ٣ الى ٩ سم. || شكلها الزهري مثالي الاوتكاز .



زرف



زرفوة مبلولة



زرباد



زربوك الشرقي

١٢٤١٥ - زُرْفُوم ، جَرِيثُ البَحْرِ  
Conger (S). Congra (F). Conger (E).

جنس اسماك بحرية يبرضة من مفتوحات اللسان عاصات الاصيل وفصيلة الزرقونيات . انواعها المعروفة اربعة جميعها من اسماك بحار المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها مسطيلة ، حرياطة ، عادمة السهم . تطول من مترين الى اربعة امتار . اطواها تختلف مع الانواع ، رؤوسها شبه غروفيّة . اطواها كبيرة الاشداق . شاربقة الفم الى العليا . اسنانها فكية وحشكية ، جميعها ذرية . مناسها انابيب صعيقة تحمل مقدم الحظ . حينها كبيرة مستديرة معتدلة التفوز . زمامها الظهري فردية مسطلة ، قليلة الرمس تمتد من اواخر الزمام الاول الى طرف اللؤل . تقاطعها الترجية التي تمتد ايضا من اواخر الزمام الثاني الى طرف اللؤل . زمامها الخلفية والذيلية منعدلة || اشهر انواعها الزرقونية المبلولة .

## ١٢٤١٦ - زُرْفُومَة مَبْدُولَة \* ، جَرِيثُ البَحْرِ المَبْدُولُ ، ثُونُ بَحْرِيّ ، حَرْمُوط

Conger conger, Conger vulgaris (S). Congra commun, Anguille de mer (F). Conger-eel (E). نوع من الزرقوم . سمكة بحرية مفترسة يبرض . اسطها فسيحة تقبل سطع اضواء شمارة المناطق الحارة والمعتدلة الحارة . لتفصل مرتج المسفور حيث تكثر الاسماك الصغيرة ولا تمتد من ايلب ايتا كانت إن حل الشطوط الرملية أو بين الصخور || جسمها مستطيل الشكل ، يطول من ٣ الى ٤ اثمار . تقشارها عادم السهم ، غروي السطع المائس || فوجها الى الزبدية الزرقاء يبق من القدر ويظهر من البطن || تحلبها الجسدوية لا تختلف من تحلبة الجلس اي الزرقوم || تسرح غالباً في الليل . صيدها يستلزم عدة خاصة اسحبها شخص مثل الحراب وضبط متين لا يفلت فيه الاحتكاك بالصخور || لحمها متوسط الصفت ماكوك .

## ١٢٤١٧ - زُرْفُومَة

Congridae (S). Congridés (F). Congridae (E).

فصيلة اسماك بحرية مفترسة يبرضة من مفتوحات اللسانات . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة ، معظمها من احاطير الخلفية الباسيد من الاباح الثاني . اما الماصر منها فتقليل البعد يمتد الى جنس واحد يعني زرقوم || اسطها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . اجسامها مسطيلة ، عادمة

## ١٧٤٣٦ - زُوَيْجَة \* ، اُرُوَا كَوَكِي

*Agrostis verticillata* (S). *Agrostide verticillée* (F). Switch grass (E). *Haargras* (D). *Pennacchlin* (I).

نبات حشوي بري سولي من النجيليات يطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. أوراقه سائبة ضيقة التجميع. يكثر في الاربة المتصلة الاندماج والرطوبة ، ترما الماشية وتستحب .

## ١٧٤٣٧ - زُوَيْجَة \* ، زَعْفَرَان الْجَبَلِ ، زَهْرَان

*Bulbocodium vernum* (S). **المرج**  
*Bulbocode printanier*, *Campanetta* (F). *Meadow saffron* (E). *Lichtblume* (D). *Colchico di Spagna*, *Croco rosso* (I).

نبات يصل بري من فصيلة السورتيانيات يكثر في البلاد الجبلية والبرج الرطبة. شكله بين السورتيان والزعفران. يصله سمراء اللون. اوراقه ثلاثية العدد ضيقة التصل المستطيل المحين. شراخه قرمي الانتشاب يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. زهرته وردية أو بنفسجية اللون، كمية التفتل من ازهاره ينساق من نسيان الى حزينان يقال ان ازهاره صبغتها الجبال لا تخلو من الفوائد الطبية غير المقررة .

## ١٧٤٣٨ - زُوَيْجَة

*Emblavure* (F). *Land sown with wheat etc.* (E).

هو الحقل وكل مزروع سمه وكرب وبلر وأثير .

## ١٧٤٣٩ - زُوَيْجَة

هي رباح الفايين ، اطلبه .

## ١٧٤٤٠ - زُوَيْجَة

هي الدخلة السوفلية طائر من الدسل .

## ١٧٤٤١ - زُوَيْجَة ، شَلْبَة هَرِيَّيَة ، أم ذَنْقِيس

*Eutropius niloticus* (S). سمكة نهرية مأكولة من فصيلة السلوبيات يكثر وجودها في النيل والنجرب .

## ١٧٤٤٢ - زُوَيْجَة \*

*Zosterops* (S). *Zosterops* (E).

طائر من فصيلة الزطروبيات. موطنه بعض الاقاليم الحارة من الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية || جسمه صغير القد اعين القوام بطول نحو ١٢ سم. لونه الى الخضار الزهري. راسه وبنجاحه وذنبه الى الخضار الالسي . عيناه مظلقتان بالابيض . شفة عينه الى الخضار الزهري . ذقنه مقلقة وبجمل . ريشه ابيضان اسمران || قوته الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحمام || يدفن في الاشجار الرطبة . الاث تنفع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمدة ١٣ يوما .

## ١٧٤٤٣ - زُوَيْجَات \*

*Zosteropidae* (S). *Zosteropidae* (F). *Zosteropidae* (E).

فصيلة طير من الجوارم رقيقات المتناثر . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٨٠ موطنها معظم المناطق الحارة من العالم القديم . تألف الثنايات والاسراج والحدائق وتقترب من المساكن الريفية || اجسامها صغيرة القد ، ريشة القوام . اقلها متباينة التفضيب يكثر فيها الاخضر || قوتها الحشرات الصغيرة والفراش والذباب والحمام وبعض البذور البرية .

## ١٧٤٤٤ - زَصِج ، زَصِج

هو للقيم الابيض الرقيق الخفيف البعيد .

ازهاره عطرية البرق تطلق من ٢ الى ٣ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ١٧٤٤٧ - زُرُوف

*Ruisseau* (F). *Rivuleux* (E). هو الجبل الثاني الذي يسحب في النهر . ج زرايف .

## ١٧٤٤٨ - زُرُوف

عنصر شبه معدني متجانس اللون عديم الرائحة والطعم يوجد في الطبيعة متزججا بغيره من العناصر بكميات غشيلة متفرقة القدر كما انه يوجد في ماء البحر وفي جسم الانسان || دوز (As) وزنه الذري ٧٤.٩١ . ثقله النوعي اذا كان متيلورا ٧.٥ وان كان لا متيلورا ٧.٥ || يستمد باستخلاصه من مركباته الطبيعية وهو مع مركباته الصناعية من العناصر السامة الفتالة . مركباته الصناعية عديدة تستخدم في شتى الحقل اخصها مقايمة وبادة الحشرات الزراعية كما انها تستعمل في الطب لتقوية البلية وفي علاج بعض الامراض الجلدية .

## ١٧٤٤٩ - زُرُوف احمر

*Réalgar* (F). *Realgar* (E). هو كبريتور الزرنيخ الطبيعي .

## ١٧٤٥٠ - زُرُوف خضراء

*Arséniate* (F). *Arseniate* (E). مركبات صناعية ترتكز على الزرنيخ تستعمل في مكافحة الحشرات النباتية . اهمها استمالا :

*Arséniate de plomb* (F). *Lead arseniate* (E).

*Arséniate de cuivre* (F). *Copper arseniate* (E).

*Arséniate de soude* (F). *Salt-wort arseniate* (E).

زُرُوفات الرصاص

زُرُوفات النحاس

زُرُوفات الصودا

## ١٧٤٥١ - زُرُوفين \* ، زَهْر العَرَبِز

*Crossandra* (S). *Crossandre* (F). *Crossander tree* (E). *Franzenbeutel* (D). *Crossandra* (I).

جس جنات زربينية مسرة من فصيلة الاثنيات . انواعه خمسة منها الهند وافريقية الشرقية . اوراقها اهليجية متعاقبة . ازهارها نوري التجميع ، عمودي الارتكاز . ازهارها عطرية مستندة لنباتات القنطرة الجبلية الشكل . اقلها تختلف مع انواعها منها الابيض والاسفر والاحمر والمخض .

## ١٧٤٥٢ - زُرُوف

*Garrulus* (S). *Geal* (F). *Jay* (E).

جس طير من فصيلة الغرايات وربة الجوارم . انواعه ١٢ جميعها بقدر الهامة . رؤوسها كبيرة ، متناظرة جالسة قوية . اقلها ملونة بجلة الزرنيق || وهو يقبض الاصوات كالبيده . قوته جميع انواع الحشرات الكبيرة والقار والظاء والصابير الصغيرة والبلوط والحبوب والفاث || اشهر انواعه ابو زريق والقيق .

## ١٧٤٥٣ - زُرُوفَة

*Enclos* (F). *Enclosure*, *Paddock* (E). هي الحظيرة من خشب تحجز فيها المواشي .

## ١٧٤٥٤ - زُرُوفَة الخنزير

*Porcherie* (F). *Pigsty*, *Piggery* (E). هي الخنزارة مألوى الخنازير .

## ١٧٤٥٥ - زُرُوفَة الطيور

هي الحديقة ، اطلبها .



زُرُوف



زُرُوب



زُرُوفَة



زُرُوفَة



زُرُوب

اوراقه مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله  
اخضر اللون على صفحته ، أنزب الصفحة السفلى .  
نورته الزهرية كثيفة تد من ١٥ الى ٢٠ زهرة ، زياه  
الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره حواء اللون ، صغيرة  
لقد ، قطرها يراوح من ٤ الى ٧ م .

#### ١٧٤٥٤ - زُحُرور أَزْبَع

*Crataegus tomentosa* (S). *Aubépine tomenteuse*, *Epine tomenteuse* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٥ الى ٦ أمتار . شوكه  
معتدل اللد قليل الكثافة شديد الصلابة . اوراقه بيضية  
معيقة الشكل ، زياه النصل على صفحته . نورته تد من  
٢ الى ٧ أمتار . زهرته عشريئة الاسدية الحراء اللون .  
ثماره بيضية أو اجاسية الشكل ، برقالية اللون .

#### ١٧٤٥٥ - زُحُرور أسود ، بَوت

*Crataegus nigra* (S). *Aubépine noire*, *Epine noire* (F).

نوع من الزحورور يملو نحو ٣ أمتار . اوراقه مدببة  
التخصيص . تصلها خلى البشرة على صفحته . نورته  
متوسطة القد تد من ٥ الى ١٢ زهرة . زهرته مدينة  
الاسدية ، خاسية الملقات والبريقات . ثماره كروية  
الشكل ، لونها كى السوداء ، قطرها نحو ٢ م .



زهرية

#### ١٧٤٥٦ - زُحُرور أصفر

*Crataegus flava* (S).

*Aubépine jaune*, *Epine jaune* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه  
مدينة القاذبة ، تصلها عادم التخصيص أو قليله ،  
لونه كى الحصار البحرى تملو لحد مستطعة حراء اللون ،  
نورته تد من ٢ الى ٥ أمتار . زهرته كبيرة اللد عشريئة  
الاسدية الوردية اللون . ثماره صفراء اللون ، برقالية المراج ،  
قطرها يراوح بين ١٢ و ٢٠ م .

#### ١٧٤٥٧ - زُحُرور الأودية ، زُحُرور أحادي

*Crataegus monogyna* (S).

*Aubépine monogyna*, *Noble épine* (F). *Hawthorn* (E). *Spitsdorn* (D). *Bianco spino* (I).

نوع من الزحورور ، هري الشكل ، رطب في الاودية .  
يملو من ٤ الى ٥ أمتار . اوراقه بالقة التخصيص .  
تصلها مسن الحافة أنزب الفلج والبرق على الصفحة  
السفلى . نورته تد من ٧ الى ١٢ زهرة . زهرته احادية  
الملقة والبريقية . ثماره فردية العجبة ، مخططة الاوران ،  
قيا ليا اسفر والبرق واللاحر جميعها صغيرة اللد قطرها  
نحو ٥ م .

#### ١٧٤٥٨ - زُحُرور لمرىكة

هو الاعراس الامريكى ، امطيه .

#### ١٧٤٥٩ - زُحُرور جروماني

هو اللسة ، امطيه .

#### ١٧٤٦٠ - زُحُرور غوصي الورق

*Crataegus prunifolia* (S). *Aubépine à feuilles de prunier*, *Epine à feuilles de prunier* (F).

نوع من الزحورور يملو من ٣ الى حرة أمتار شوكه  
قصير اللد . اوراقه غصينة الشكل تصلها خلى السلع  
والبرق على صفته السفلى . نورته تد نحو ١٢ زهرة .  
زهرته خلية الجسم ، عشريئة الاسدية . ثماره صفية اللد  
بيضية الشكل حراء اللون ناشفة البيق .

#### ١٧٤٦١ - زُحُرور سِينَا ، زُحُرور مرسى

منهم من قال حليق مرسى . يعرف بشوك النار ، امطيه .



زحورور الاودية

١٧٤٤٥ - زُحُوبَل  
Cottonier (F). Cotton-tree (E).  
هو جنة القطن في زن حلها .

١٧٤٤٦ - زُحُوبَل  
Seau (F). Pail, Bucket (E).  
دلو يمتلئ بها .

١٧٤٤٧ - زُحُوبَل  
Microrrhiza (F).  
نمت ترميقي ، يملك على كل نبات صغير الجذور دقيقها .

١٧٤٤٨ - زُحُوبَل \*  
Nepetula (S).  
Nepetula (F). Nepetula (E).

حشرة من فصيلة الزبوليات ودية حرشيات الاجنحة .  
اصطفاها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تألف المراج  
التي تكثر فيها السوليات || جسمها صغير اللد ، كيف  
الخمل . بطنها نحو ٧ م . رأسها معتدل الحجم . خطها  
صغير . ملساها قصيران . عيناها صيرتان ، بارزتان .  
زبانها عيطيان . جناحهاا الخلفيان مستعرضا الاهداب .  
ظنايب قانجهاا الخلفيين رباعية المناس الحادة . ثوبا  
الى البنى . اجنحتهاا جملة بالآخر || الاثنى امين قدأ من  
الذكر واجت ثوباا منه || السرعة لاهة ، تمش على وزن  
التصال . تركيب جميع نباتات الفصيلة السولية .

#### ١٧٤٤٩ - زُحُوبَلات

*Nepetulidae*,  
*Stigmellidae* (S). *Nepetulidae*, *Stigmellidae* (F).  
*Nepetulidae*, *Stigmellidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المحررة نحو ٣٣٠ منشرة في جميع اقطار العالم ||  
اجناسها صغيرة ، كيفية الخمل . رؤوسها معتدلة الحجم .  
اعطاشها وملابسها صغيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قرنيها  
الاستشعارية عيطية ، مسطيلة . اجنحتهاا عيطية ،  
مسطيلة . اهداب اجنحتهاا الخلفية ودية . ظنايب قواؤهاا  
الخلفية رباعية المناس . بطنها مستطع . الواجاا جبانة  
الالوان || اساريهاا لاهة . اكمال عاداتهاا يتم على  
نصال الاوران الملتوية ضمن فهاج متحدة الخمل ||  
اشهر اجناسها الزبولية .

#### ١٧٤٥٠ - زُحُوبَل هو ستر البر ، امطيه .

#### ١٧٤٥١ - زُحُرور

*Crataegus* (S). *Aubépine*,  
*Epine* (F). *Hawthorn*, *White thorn*, *May* (E).

جنس الشجار وشجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات  
انواعه مدينة بعضهاا كثير الوجود في جبال حريش البحر  
المختص . تتميز بشوكها وصلابة اعشاشها . اوراقها  
جمادة النصل . ازهارها نورية التجميع صغيرة اللد .  
ثمارها عنية الشكل مخففة الاوران قل منها المأكول .  
اعرف واشهر انواعها ما يتبع .

#### ١٧٤٥٢ - زُحُرور أحمر

*Aubépine rouge sang*, *Epine rouge sang* (F).

نوع من الزحورور يربق في الاقاليم الباردة يملو من  
٣ الى ٧ أمتار . الشواكه قليلة . فروعها حراء اللد .  
اوراقه بيضية مقصصة . نورته قليلة الزهر . زهرته  
عشارية الاسدية . ثماره صغيرة اللد قطرها نحو ١١ م .  
لونها كى الحرة النورية .

#### ١٧٤٥٣ - زُحُرور أخضر

*Crataegus viridis* (S).  
*Aubépine verta*, *Epine verta* (F).

نوع من الزحورور يملو من مترين الى حرة أمتار .

## ١٢٤٦٨ - زُغُرُور شَالِك \* شَوْكَة حَادَة

Plastron

الحاف الجزء الامامي من كؤل الحشرة وحاف الجزء السفلي من السلخانة .

## ١٢٤٦٩ - زُغُرُور شَالِك ، جَادِي ، جَسَاد ،

جِيَهْمَان ، دَكْهَمَان ، رَادَن ،

رَبَهَمَان ، صَفَرَان ، كُوكِيَا ، زَمْبِيل

Crocus (S). Safran, Crocus (F). Saffron, Crocus (E).

جنس نباتات بصلية من فصيلة السوسنيات . انواعه

وصوره واهاله عديدة منها البرية والزراعية معظمها

صباغي وبعضها طبي || شجارتها قصيرة القد . ازهارها

مستطيلة انابيبا دقيقة الجسم بقية الطرف . اوراقها

ضيقة النصل الخند || اعرف انواعه واشهرها ما يليق .

## ١٢٤٧٠ - زُغُرُور شَالِك ، أَيْض

Crocus candidus (S). Safran blanc, Crocus blanc (F). White saffron (E).

نوع من الزعفران شراعه يملو من ٨ الى ١٠ سم .

زهرة بيضاء البتلات ، صفراء المتق الداخل . ساحتها

كاملة مهدبة ، شرعافها عادي || اوراقها غبيطة مستطيلة ،

مالة النصل . ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

## ١٢٤٧١ - زُغُرُور شَالِك ، زُغُرُور الشَّجَر

هو الزريرة نبات يصل من السورجانيات . اطله .

## ١٢٤٧٢ - زُغُرُور الشَّجَر

Crocus vernus (S). Safran printanier, Crocus printanier (F).

نوع من الزعفران ، صوره كثيرة المد . شراعه يملو

من ٦ الى ٢٠ سم . زهرته بنفسجية اللون خلية المتق

صفراء الانبوب . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي || اوراقها

مستعرجة ، عرض نصلها يراوح بين ٥ و ٨ سم .

ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

## ١٢٤٧٣ - زُغُرُور شَالِك ، الزَّهَر

Crocus biflorus (S). Safran biflore, Crocus biflore (F).

نوع من الزعفران صوره كثيرة العدد والالوان ، شراعه

يملو من ٨ الى ١٦ سم . زهرته صفراء الصلحة الخارجية

بيضاء او زرقاء الداخلة . ساحتها كاملة ، شرعافها

عادي || اوراقها ضيقة النصل المتق المائل البصرة || ازهاره

يستمر من كانون الى شباط .

## ١٢٤٧٤ - زُغُرُور شَالِك ، دَهَبِي

Crocus chrysanthus (S). Safran jaune d'or, Crocus jaune d'or (F).

نوع من الزعفران مهدب الشرق الاوسط والبلقان ، شراعه

يملو من ٥ الى ٨ سم . زهرته خضية اللون ، برفالية المتق ،

صفراء الانبوب . ساحتها جزئية مهدبة . شرعافها عادي .

اوراقها غبيطة ، معتدلة الطول ، غشنة المتق . ازهاره

يستمر طوال شهر اذار .

## ١٢٤٧٥ - زُغُرُور سُورِي

Crocus syriacus (S). Safran de Syrie, Crocus de Syrie (F).

نوع من الزعفران يكثر في البلاد السورية .

شراعه يملو من ٨ الى ١٢ سم . زهرته صفراء اللون

يملوها تزيح عايق . ساحتها كاملة ، شرعافها عادي .

اوراقها ضيقة معتدلة الطول || ازهاره يستمر من كانون

الى اذار .

## ١٢٤٦٧ - زُغُرُور شَالِك \* شَوْكَة حَادَة

Crataegus oxyacantha (S). Aubépine commune, Epine blanche, Senefle (F). White thorn, May-bush, Quick (E). Gemeiner dorn, Hagedorn (D). Marruca blanca, Blancospino, Ceresella (I).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ٥ أمتار . شوكه معتدل

القد ، كثيف التجميع . اوراقه مقصصة . نصلها سن

الحافة خلى الصلحة السفلى . ثورته تمد من ٧ الى ١٢

زهره . زهرته ثنائية اللقطة والبرقة . ثماره ثنائية الصبة ،

خضلة الالوان لها الاصفر والاحمر . جبهها متوسطة

القد ، قطرها نحو ١٥ سم .

## ١٢٤٦٨ - زُغُرُور شَالِك

Crataegus orientalis (S). Aubépine d'Orient, Epine d'Orient (F). Eastern thorn (E). Weissdorn (D). Lazzaruolo d'Orient (I).

نوع من الزرور يملو من ٥ الى ٦ أمتار . اوراقه قليلة

التجميع ، نصلها كائنه اللون خلى البصرة حل صفحتي .

ثورته كثيفة التجميع تمد من ٧ الى ١٥ زهره . زهرته

رباعية او خلية اللقطة والفرقات . ثماره صغيرة

القد جميعها حجم الكرز العادي .

## ١٢٤٦٩ - زُغُرُور شَالِك ، الدَيْك

Crataegus crus-galli (S). Aubépine ergot de coq, Epine ergot de coq (F).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ١٠ أمتار . شوكه

مستطيل نعيم . اوراقه اهلالية الشكل ، صفة الحافة ،

عامة التجميع او قلابته . نصلها لامع البصرة حل

صفحتي العليا . ثورته الزهرية تمد من ١٥ الى ٢٠ .

زهرة عشارية الاسدية الوردية اللون . ثماره الى الحشرة ،

صغيرة القد ، ناعمة السوط .

## ١٢٤٦٥ - زُغُرُور شَالِك ، نَلَك

Crataegus azarolus (S). Aubépine azaroller, Azaroller, Argéroller (F). Azarole tree, Neapolitan medlar (E). Azaroldorn, Azarolbaum (D). Azarolo, Azaruolo (I).

نوع من الزرور يملو من ٣ الى ١٢ م . شوكه قليل

الكثافة معتدل القد . اوراقه قليلة التجميع نصلها

لامع الصلحة العليا ، خلى السفلى . ثورته تمد من ٥

الى ٧ ازهار . زهرته ثنائية او ثلاثية اللقطة والفرقات .

ثماره لليلة العلم ، كبيرة القد ، قطرها نحو ٢ سم .

## ١٢٤٦٦ - زُغُرُور شَالِك ، دَهَبِي

Crataegus coccinea (S). Aubépine écarlate, Epine écarlate (F).

نوع من الزرور يملو من ٢ الى ٧ أمتار . اوراقه

قلية او مقنونة القامة . نصلها دائم التجميع لينة

الى الخضار الباهت ، ثورته الزهرية متوسطة الكثافة .

زهرة خلية الجسم ، عشارية الاسدية . ثماره قمرية اللون

قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ سم .

## ١٢٤٦٧ - زُغُرُور شَالِك ، اللُّوْق

Crataegus cordata, C. phaeopyrum (S). Aubépine à feuilles en cœur (F).

نوع من الزرور يملو من ٥ الى ٩ أمتار . اوراقه

قلية الشكل ثلاثية التجميع . ثورته صغيرة القد تمد من

٣ الى ٥ ازهار . زهرته عشارية الاسدية . ثماره حراء

اللون ، صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ الى ١٥ سم .



زرور شالك



زرور عادي





زعفران طويل الزهرة

١٢٤٨١ - زُفْطَان \*  
Hesperophanes (S).

*Hesperophanes (F).*  
جنس حشرات غاشية من فصيلة القرنيقيات. أنواعه عديدة، جميعها متصلة الله، مستطيلة الشكل، طولها ١٢-٢٠ م. أجسامها زاهية، قرنها الاشمادية مستطيلة منقطة. ألوان ألوانها تراوح بين الخشن والبي. تسرح من الغروب الى الفجر || يرقاتها ترتك وتنتشر جميع أنواع الخشب اليابس بما فيها الاشباب المشغلة الخشبية.



زعفران لُبْنَانِي



زعفران غُرْزِي



زُفْطَان



زُفْطَان اِرْبَك



زُفْطَان اِتِين

١٢٤٨٢ - زُفْطَان اِرْبَك \*  
Hesperophanes cinereus (S). Hesperophanes

*cinereus (F). Hesperophanes cinereus (E).*  
حشرة غاشية غاشية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف ارجل السنتان واهليات الحور والساكن الارضية، غناصها غاشية تمشي على اوراق النبات. يرقاتها غاشية تركيب السنتان والحور والاشباب الخشبية المشغلة || جسمها متوسط الله بطول من ١٦ الى ٢٢ م. ثوبها الى الشقة السمرار يطولها مزاج اربك يمد الى الحبل الكثيف الاطلس اللين. رأسها مثل الجرم. عيناها صغيرتان. زباناها مستطيلان مهدبان. ظهرها خشن للزهر القارح اللاتح. غداها متجانس التحزيز الخفيف القاطب، كثيفات الحبل. ارسافها رباحية المثلث الظاهرة || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واكثر ثوباً منه واتصر زبانا || جيلها ثلاثي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في مطلع حزيران وتبقى حتى اواسط آب. تسرح من الغروب الى الفجر || القربة بطيئة التنشيد تترك الكلال الجسموري بعد التلق بنسب ٣٢ شهراً. جسمها شبه مردني الشكل بطول نحو ٣٢ م. ثوبها الى الخشن الاصفر المالح. رأسها يمر || طول الاكبر الذي يستوجب نحو ٤٠ يوماً يتفشي ضمن صلجة مركبة من مواد نباتية مجبونة بالريال.

١٢٤٨٣ - زُفْطَان اَكْب \*  
Hesperophanes gris (F).

حشرة مؤذية من القرنيقيات تدعى زُفْطَان اِتِين، اكلها.

١٢٤٨٤ - زُفْطَان اِتِين \*  
Hesperophanes gris (S).

*Hesperophanes gris (S). Hesperophanes gris (F). Hesperophanes gris (E).*  
حشرة غاشية مؤذية من فصيلة القرنيقيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف ارجل ايتين دون سواها. غناصها تمشي على الاوراق والحاء. يرقاتها تسرح الانداد والاضواء والجفوع || جسمها متوسط الله بطول من ١٢ الى ٢٠ م. ثوبها الى الكلبة يطولها حل اربك ورتبة شهية. رأسها مثل الجرم. عيناها كبيرتان نافذتان. زباناها مستطيلان دقيقان. ظهرها مذهب القوط اللاتح. غداها كثيفات الحبل واغارب || الاثنى اكبر قدماً من الذكر واجت ثوباً منه واتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواخر حزيران. تسرح في الليل. تلفد بعد ظهورها باسرع واسد. تمتع المكن رؤيا تطفها مادة غروية تشبه في مكنها || القربة منذ ادراكها الكلال الجسموري تطول من ٢٢ الى ٢٥ م. ثوبها الى البياض اللتي. جسمها مستطيل الرأس والصدر والقسم الاوسط من البطن وينتهي بطرف

١٢٤٧٦ - زُفْطَان طويل الزهرة \*  
Crocus longiflorus (S). Safran à longue fleur, Crocus

*à longue fleur (F).*  
نوع من الزعفران مهده جزر البحر المتوسط. شراعه يملو من ١٠ الى ٢٥ سم. زهرته صفراء الانبوب. يرتقالية المتي، ليلكية البلات، يملوها تزيح بنفسجي. اسديتها صفر. سمانها مقطوعة، يرتقالية اللون. شرعائها شجج || اوراقه ضيقة التصل للمثلث الاول، الخالاس البشرة || ازهاره يثمر من تشرين الاول الى الثاني.

١٢٤٧٧ - زُفْطَان عُرْبَان الزهر \*  
Crocus nudiflorus (S). Safran à fleurs nues, Crocus

*à fleurs nues (F).*  
نوع من الزعفران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات. سمانها منقسمة، قدية الشكل يرتقالية اللون. شرعائها اري || اوراقه ضيقة مستطيلة. يملو يمل بعد ذبول الارض ثوباً وكوبية مستطيلة || ازهاره يثمر من ايلول الى تشرين الثاني.

١٢٤٧٨ - زُفْطَان لُبْنَانِي \*  
Crocus zonatus (S). Safran zoné, S. du Liban, Crocus zoné (F).

نوع من الزعفران مهده جبال لبنان شراعه يملو من ٦ الى ١٠ سم. زهرته ليلكية اللون يتلاتها مقطوعة، منها خلي البشرة، حايق الصفار. انبوبها خشن اللون. سمانها كاملة صقية الشكل. شرعائها حادي || اوراقه خيطية غشية مستطيلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين.

١٢٤٧٩ - زُفْطَان مَحْزُونِي \*  
Crocus officinalis, C. sativus (S). Safran officinal, S.

*autumnis, C. cultivé, Crocus officinal (F). Safran, Crocus (E). Echter safran (D). Zafferano, Croco fiorito, Croco domestico (I).*  
اعرف انواع الزعفران واسمها منذ اقدم المهد || غروبها كثيرة المهد. شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. زهرته بنفسجية البلات، ليلكية المتي، صفراء الانبوب. اسديتها بيض. سمانها حطرية الرائحة مستطيلة. شرعائها ثنائي القلعة || اوراقه خيطية ضمية. ازهاره يثمر من ايلول الى تشرين الثاني || يستخرج من زهره وصبر يملو زيت طيار كثير اللثع || يحرق زهره حطري العرف من اللثع يستعمل في القلب وفي الروائح العطرية وفي الصباغ. والجزر الواحد من مسحه يصنع من ألف جزء من الماء. اي ان غراماً واحداً من مسحوق الزعفران يصنع ١٠٠ لير من الماء || ومن الرينة البلية فازعفران يملو البحر ويقوي الاصاب وينشط القلب ويرسه ويحب ابياء ويدبر البول والطمث ويسهل الولادة اذا تسمرت. وهو مفاد للتشنج ويظهر في الاذن ليسكن آلامها.

١٢٤٨٠ - زُفْطَان مَوْشَع \*  
Crocus versicolor (S). Safran versicolore, Crocus versicolore (F).

نوع من الزعفران شراعه يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. يملو عند قاعدته شراعه قصير || زهرته حطرية الرائحة، يضاء اللون، موشعة بالبنفسجي. سمانها كاملة. شرعائها مزدوج التركيب || اوراقه خيطية، مستطيلة، خلية التصل || ازهاره يثمر من شباط الى آذار.

رقباتها غبراء اللون، قصيرة القد، تركيب جلود الكرة فقرتها وتغيرها .

١٢٤٩٠ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ \* ، مَكْرُومُ النَخْلِ \*  
Macrotoma palmata (S). Macrotome du palmier (F).  
حشرة خاشبة من القزنييات طويلة نحو ٤ سم. لونها الى  
السرّة الخضرة . زباناها طويلة متعقبة . تسرح في الليل .  
تجتمع مكثا على جلود النخل فيقتف من رقات فراء  
اللون ، زباناها الجسم ، سوداء اللبب تنشر الجلود  
وتعطها .

١٢٤٩١ - زَعْفَرَانِيَّات \*  
هي القزنييات فصيلة حشرات من طيريات الاجنحة ،  
اطلها .

١٢٤٩٢ - زَعْفَرَانِيَّات \*  
Nageoire (F). Fin (E).  
الزعنفة هي عضو الحركة الانقباضية في الحيوانات المائية .  
ج زعنائف . ولزنايف تقسم حسب موطئها في الجسم الى :  
سديدة وبطنية وظهريّة وشرجية وذنيّة .

١٢٤٩٣ - زَعْفَرَانِيَّاتُ الْأَدْنَامِ \*  
Pinnipèdes (F). Pinnipedia (E).  
رَبِيّة حيوانات لبونة ألفن حياء البحر والبر . انواعها  
المعاصرة للمرونة ٣٦ تنضم الى ١٢ جنس ينجمها ثلاث  
فصائل كما هو مبين في الجدول التالي || اجسامها شبه  
وضعية الشكل ، متفارقة الطول والحجم . اطولها تراوح  
من ١٢٥ الى ٢٥٠ سم. رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة  
جاسقة . اذانها ومنافقها ملحومة . اسنانها متباعدة الاشكال  
والحجوم لكنها وحيدة الصيغة عند كل فصيلة . اعناقها  
قصيرة واذانها كلكت . قلوبها خاصة الاصابع الكاملة  
الخطاب والمملوطة ما يسجلها كازناتاف || قوتها الاسماك  
والقترنات والرخويات . ملجئها الحيالي يختلف مع اختلاف  
الانواع . معظمها قسري جماعي وبعضها زويبي .

١٢٤٩٤ - زَعْبِج \*  
Crossemant (F). Croak, Croaking (E).  
الزعب هو صوت الغراب كالنبيب والنتيق .

١٢٤٩٥ - زَعْفَرَانِيَّات \*  
هو الزغرط ، اطلها .

١٢٤٩٦ - شَرْشُورُ جَيْسَل \*  
Fringilla montifringilla (S). Pinson de montagne, P.  
d'Ardennes (F). Mountain finch, Brambling (E).  
Bergfink (D).

نوع من الشرشور طوله من ١٨ الى ١٩ سم. رأسه  
وظهره ذهبي الى السواد الازرق . جناحه منقط بالابيض .  
عقله وسوره الى الصبغة البرتقالية . بطنه وزنكاه بيض .  
اطلها مرقشان بالاسود || يعيش اسراب كبيرة تجوب  
البلاد في طلب الحبوب والاشج . قوته الحشرات اعرضها  
الذباب ثم يزور النباتات القزنية اعرضها البرية || ينش  
في الاجمار . انثاء تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها  
بتأدية الذكر نحو اسبوعين .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَان \*  
Cycloconium  
جنس فطور مجهرية من عمارة الزناخيات والفطريات  
جربه الكتيديّة مهمة الشكل والرتيب . هيفه محبوب  
للمناطق الخلفية داخل المسافات الامدية الى ان يتحرك

مدب || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى  
ثلاثة اسابيع ينغفي في النفق الذي احفرته البرقة .

١٢٤٩٨ - زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ \* ، زَعْفَرَانُ  
مَسْتَم \*  
Hesperophanes fascicu-

latus (S). Hespérophanes fasciculé, Longicorne du  
caroubier (F). Hesperophanes fasciculatus (E).  
حشرة خاشبة غاشبة مؤذية من فصيلة القزنييات ورتبة  
معدنات الاجنحة . تألف الاشجار الزراعية والبرية اعرضها  
الخرنوب واللين والتوت والبلوط والسنق والبلق ... خنافسها  
تبش على الارواق . رقاتها تسردب الافئاد والاغصان  
والجلود الاخضر منها واليابس تصطبها وتكويها || جسمها  
متوسط القد يطول من ٢ الى ٢٠ سم. ثوبها الى الكلفة  
يطولها زغب اطول ومثقة وبذاء . رأسها مستطيل الجرم .  
عينهاا كبيرتان . زباناها دقيقتان مستطيلتان . ظهرها  
مستطيل المسطح ، مستدير المؤخر الاسف . غدهاا كتيفا  
اللون والنتيق || الاثا اكر قدّم من الذكر واكد ثوبا  
منه ولتصر زبانا || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة الجملقة في اواسط حزيران . تسرح في الليل . تساله  
بعد ظهورها يسير واحد . تجمع المكن تحت الحياء وبين  
الفتور || البرقة ، عند بلوغها الادراك تمام ، تطول من  
٢٠ الى ٢٥ سم. جسمها مردي الشكل ، حطلي اللون ،  
اظهر الموج ، ابرر الرأس والفكين والشرج ، مبرر الهلب  
التمصير النقيق .

١٢٤٩٩ - زَعْفَرَانِيَّات \*  
Vireux (F). Vireux, Noxious (E).

لتم تعريفي يطلق على النباتات او المواد النباتية التي  
رائحتها الكريهة وطعمها القس ينان عن وجيد عنصر ضال  
قد يكون جسميا للمادة .

١٢٤٩٧ - زَعْفَرَانُ الْأَعْمَدَةِ \* ، هَيْلُورُوبِ \*  
Hyloterpus bajulus, Callidum bajulus (S). Hylotrupe,  
Longicorne des charpentiers, Capricorne domestique (F). House longhorned beetle (E).  
Hausbock, Balkenbock (D).

حشرة خاشبة من فصيلة القزنييات طويلة نحو ١٦ سم.  
لونها الى السرّة الخضرة طولها زغبية غبراء || تركيب  
الصنوبر حيث تجمّع مكثا فيقتف من رقات تنشر  
الخشب وتطليه . تمرّ في بنوع خاص اعمدة التلفون  
وبا ابيه .

١٢٤٩٨ - زَعْفَرَانُ الْخَنْطَةِ \*  
Calamobius filum (S). Alguillonier, Saperde

grille (F). Grain borer (E). Getraidebohorer (D).  
حشرة غاشبة من القزنييات صغيرة القد طولها نحو ١٢ سم.  
لونها الى السرّة تمليها زغبية ملطولة . قوتها الاستشمارية  
دقيقة وطويلة || تظهر في اواخر ايار ، تجمع مكثا  
على قصب الخنطة تحت السابل فيقتف من رقات  
سفيرة تنشر القصب وتقرضها تقصب كسرها وصقوا  
السنبلة على الارض .

١٢٤٩٩ - زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ \*  
Vesperus xatarti (S). Vespère des vignes (F).  
Grape vesperus (E). Vesperus xatarti (D).

حشرة من القزنييات طويلة نحو ٢٠ سم. لونها الى الصفار  
الحطلي . زباناها مستطيلة . انثاء نصفية القند المنرج .



زَعْفَرَانُ الْخَرْثُوبِ



زَعْفَرَانُ الْأَعْمَدَةِ



زَعْفَرَانُ الْخَنْطَةِ



زَعْفَرَانُ الْكَرْمَةِ (ذكر وانثى)



زَعْفَرَانُ النَخْلِ



زَعْفَرَانُ

## نمطيات الأقسام

النمطية	عدد الأجناس والأقسام	أشهر الأنواع
أُتَارِيَات	جنس واحد ١١ نوعا	أُتَارِيَة عَرَبِيَّة. أُتَارِيَة جَبَر Otarie à Crinière Otarie de Steffer Otarie de Californie Otarie Ourson
فُكَّيَات	عشرة أجناس ٢٣ نوعا	فُكَّة بَنَدَلَة Phoque commun Phoque de Groenland Phoque annelé Phoque moine Cystophore Macrorhinie Ogmorhine
فُكَّيَات	جنس واحد ونوعان	فُكَّة Morse

الأدوية ليكن جرابه الكندي الذي تملوه سبعة من الكائنات المؤثرة الكروية الشكل، السمراء اللون. أنواعه قليلة أعرفها زُغَاغ الزيتون.

١٧٤٩٨ - زُغَاغ الزَيْتُون \*  
Cycloconium oleagineum(S).Gel de pason des feuilles d'olivier (F).

نظر مجهرى ركب زويتين حوض البحر المتوسط. مظهره الخارجي يقع قلبية تشبه عين الطاووس، حجمها براوح من ١٠ إلى ١٠٠ م. ركب نصال الأوراق البالية على صفتها. تظهر في أواسط الصيف وتقوم حتى أواخر الشتاء حيث تغلص رويدا رويدا. تبدو سمراء اللون سوداء المحور واختار. تكثر على الصفة العليا وتقل على السفلى وقد تصعب المالحق والتواقي || يكالغ باستعمال سائل بوردر على ثلاث مرات. الأولى غلاك شهر آب والثانية في تشرين الأول والثالثة في شباط.

١٧٤٩٩ - زُغَاغ \*  
هو الالتصاق السفلى، العليا.

١٧٥٠٠ - زُغْب \*  
Figue-fleur (F). Fig-flower (E).  
ضرب من التين كبير لقد سبك التشور حلو العلم.

١٧٥٠١ - زُغْب \*  
Duvert (F). Down (E).  
أول ما يبدو من الرئش والشعر وتقل صفائفا ولها. وهو في بعض الأوراق ولها غل (Bloom).

١٧٥٠٢ - زُغْبَارَة \*  
Stigma  
جنس فطور مجهرية من عارة الريدانيات وفضيلة الطحيات || جربه الكندية قصيرة ديوية، قهبرية التجميع. كائنه فردية، موانوة، بيضية أو مردية الشكل || أنواره قليلة العدد والذى أعرفها زُغْبَارَة الدلب وزُغْبَارَة الشمس.

١٧٥٠٣ - زُغْبَارَة الدُّب \*  
Stigma platani (S).  
نظر مجهرى يمتري الدلب بالورقة. مظهره الخارجي يقع صندرية مستديرة قطرها نحو ٢ م. ركب النصل على

١٧٥٠٤ - زُغْبَارَة الْيُسْف \*  
Stigma briosiana (S).

نظر مجهرى ركب ثمار الشمس في طور نمو الأخير. مظهره الخارجي يقع مستديرة مطحاة اللون، حراء الحار ركب بشرة الثمرة فطرها وتقودها إلى الانحلال بعد أن تثير طسها الذي يكتبس بعض المرات.

١٧٥٠٥ - زُغْبَة \*  
Muscardine (S).

Muscardin (F). Smil dormouse (E).  
جنس حيوانات قاضية من فصيلة قترقنيات. أنواعه قليلة، موطنها الشرق الأدنى وأروبة || جسمها صغير القد طوله ٨ سم. وذئبا ٧. رأسها اسطبي الشكل. صيغها مستديرة. أذناها بارزتان كبيرتان. ويرعا ليد الزغب الناعم القصير. ذئبا اسطواني. رأسها ظهرها وذئبا إلى الصفة السفلية يطرد موج أريد. صفها ويطنا ال البيضاء الإبر || تألف الثباتات والأدغال القوية من الحقل المزروعة. تتسلق الأشجار بشفة. قترها اليتق والجزر والحنطة وتختلف آثار النية أعصها الصرعة. الأثى تضع ٤ أداوس تبصر وتكسي بعد وضعها بأسويين. بيائها الشثري يدوم نحو ستة شهور. جبرها وكن تدبر في صدع شجرة تكثره بالخشيش تمام بالصوف.

١٧٥٠٦ - زُغْبَج \*  
هو الزنجبج، العليا.١٧٥٠٧ - زُغْبَر \*  
هو ابن أوى، راجحه.١٧٥٠٨ - زُغْبِير \*  
Amarac (F).

Amaracus (E).  
ضرب من اللرو وريق اللوق خلي النصل مستحب العرف.

١٧٥٠٩ - زُغْبُورَة \*  
Stigmella

جنس فطور مجهرية من عارة الزغاميات وفضيلة الطحيات. كائنه بيضية قشايها نحو ١٤١٤ ميكرون.



زغاف الزيتون



زغافرة الشمس



زغبة

الى الصفار الباهت || ازهرها يستمر من نيسان الى ايار .

**Primula sinensis (S). - زُعْدَةُ الصَّيْنِ**  
**Primèvere de Chine (F).**

عشبة معمرة رفيعة تنبت في المزارع . اوراقها مقصصة رطلة ، نصلها خلي البشرة جهر المسام القرية || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره ثلاثية الابراس المتراكبة . زهرته خضراء البوق ، مستنقعة القاعدة المستعرضة . لونها يختلف مع الشروب منها الياض والوردي والازرق والاحمر والبنفسجي || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

**Primula glutinosa (S). - زُعْدَةُ دَبَقَةٍ**  
**Primèvere glutineuse (F).**

عشبة معمرة سربوتية اوراقها مستطيلة مخروطية ، نصلها غدي البشرة النعقة ، حتاره مغشاري التسنين || شرانها يملو نحو ١٥ سم . ازهاره تده من ٣ الى ٧ لونها الى البنفسجي الزاهي ، عرضها فواح المسطر . ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

**Primula elatior (S). - زُعْدَةُ شامِخَةٍ**  
**Primèvere élevée, Coucou élevé (F).**

عشبة معمرة . اوراقها اهليجية ذلقة ، نصلها اخضر الصفحة العليا ، بحري البطل || شرانها يملو نحو ٣٥ سم . ازهاره كثيرة العدد لونها الى الصفرة ، انصافها الى الخضرة الباهتة بترتيب ابيض || ازهرها يستمر من اذار الى ايار .

**Primula verticillata (S). - زُعْدَةُ ضَمِيصَةٍ**  
**Primèvere à fleurs verticillées (F).**

عشبة معمرة ترطب في الشواطئ البحرية . اوراقها اهليجية الشكل تطبل من ٢٠ الى ٢٥ سم . نصلها وسيد الفلج ، خلي البشرة ، قليل التسنين || شرانها يملو من ٣ الى ٤٥ سم . ازهاره ثنائية الفصمة . كثيرة القند ، فواصة الحرف ، ذخبية اللون || ازهرها يستمر من ايلول الى ايار .

**Primula spectabilis (S). - زُعْدَةُ قاصِرَةٍ**  
**Primèvere remarquable (F).**

عشبة معمرة ترطب في الاربة الكنسية . اوراقها سنانية ، نصلها خلي البشرة النعقة ، مسن الحافة الضرفوية المختار || شرانها يملو من ١٦ الى ٣٥ سم . ازهارها سداسية او خمالية التجميع لونها الى الابيضاني يملو ملوج وردي || ازهرها يستمر من حزيران الى تموز .

**Primula luteola (S). - زُعْدَةُ كَبْرِيْفِيَّةٍ**  
**Primèvere soufrée (F).**

عشبة معمرة سربوتية . اوراقها اهليجية تطبل من ١٥ الى ٣٥ سم . شرانها يملو نحو ٢٥ سم . ازهاره صغيرة القند كثيفة التجميع كبريتية اللون || ازهرها يملو طوال شهر ايار .

**١٧٥٢٢ - زُعْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ**

**Primula floribunda (S). Primèvere floribonde (F).**

عشبة معمرة ترطب في الشواطئ البحرية . اوراقها بيضيه ، مستطيلة ، مقنطرة الطرف . نصلها ازغب البشرة مبهر للمسام القدية ، حتاره لاقياسي التسنين || شرانها يملو من ١٥ الى ٣٥ سم . ازهاره مستعرضة الشكل ، كثيرة العدد ، كبريتية اللون || ازهرها يستمر طوال الشتاء .

وربغاته كروية ، جوية التجميع ، عابقة اللون || ازهاره قليلة العدد والاذا تفتل على اوراق بعض الاشجار الحرجية دون ان تفتلها . ظهرها الخارجي بقع صغيرة مستديرة خضراء ، شقراء اللون جوية المختار ، تركب التصل على صفحته السفلى .

**١٧٥١٠ - زُفْيِي**  
**Tomenteux (F). Tomenteus (E).**

نمت وسمي يطلق على اجزاء النبات المغطاة بزغب ليد نام يشبه نفث الثعلب .

**١٧٥١١ - زُفْيِيَات**

**Bombaceae (S). Bombacées (F). Bombaceae (E).**

قسم من فصيلة الخبازيات يشمل بعض الاجناس والعديد من الانواع منظرها اشجار كثيرة دائمة سننها البلاد الاستوائية . ازهارها خشوية ، خاسية البتلات ، كثيرة الاسدية . ثمارها خضبة الشكل تلتف بزورا فريدة او عديدة ينشأها زغب نام التلثة صعيها .

**١٧٥١٢ - زُفْيِيَّة**

**Bombax (S). Bombax, Bombace, Quindier, Fromager (F). Silk cotton tree (E). Sindendbaumwoilbaum (D). Bombace, Bambiag (I).**

جنس اشجار كبيرة دائمة من الزفليات . انواعه عديدة مهبطا المناطق الاستوائية .. جميعها سريرة التنو غليظة الجذع تعلو من ٢٥ الى ٢٥ م . اوراقها زنادية مركبة خاسية الورديات البيضية الشكل . ثمارها حقائق مستطيلة تلتف عدة بزور ينشأها زغب نام جدا قصير التلثة لا يصلح لفزل || بزورها مأكولة بعد التخميص ويستخرج من اوراقها مادة دنيئة لها استعمالها في البلاد الحارة .

**١٧٥١٣ - زُعْدَةُ كَاب**  
**Chiromèle (F). Chiromel (E).**

جنس مغناطيس من حارة الجبال . موطنه ملقة والملايو . انواعه قليلة العدد تتميز بفرطها الاسطوانية المقنطرة ، بأذائها المنسبة العالية وبانصافها السلبية البارزة . يعيش جماعات متوسطة العدد . يسرح في اوائل واواخر اليل ، قوته الحشرات . يألف تجاوبف الاشجار الحرجية والمفلور والكهوف .

**١٧٥١٤ - زُعْدَةُ ، زَهْرَةُ الرَّيْبِ**

**Primula (S). Primula (E). Primel (D). Primavera (I).**

جنس نباتات عشبية من فصيلة الربيديات . انواعه كثيرة العدد منها الحولية والوهوية والمعمرة . منظرها بري وبضها ترابي . جميعها تنجيب ، اوراقها قرصية الانتصاب . ازهارها سيزاني التجميع يرتكز على شارين دقيقة . ازهارها جميلة الشكل عديدة الالوان كوسها خاسية للتسنين ، توعايتها خاسية للتخميص ، انانيتها اسطوانية الشكل ، لمديتها مغشاة لا متدقة . حقائقها خاسية المضارب || اعرف ولشهر انواعه ما يتبع .

**١٧٥١٥ - زُعْدَةُ أَذْيَنِيَّة ، أَكْأَن الدُّبِّ الوَحْشِي ، أَكْأَن الضَّعْب**

**Primula auricula (S).**

**Primèvere auriculée, Orelle d'ours sauvage (F). Auricula, Bear's ear (E). Aurikel primel, Aurikeln (D). Primavera auricula, Orecchio d'orso (I).**

عشبة معمرة . اوراقها بيضية مسطوية الشكل . نصلها بحري اللون ، خلي البشرة ، مسن الحافة الضرفوية المختار || شرانها يملو من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها



زفْيِيَّة



زفْدَةُ شامِخَةٍ



زفْدَةُ ضَمِيصَةٍ



زفْدَةُ كَثِيرَةِ الزَّهْرِ

٢٠ سم. ازهاره لا تلبية التجميع. مدعها يراوح من ٢ الى ٢٠ لونها ال الوردي يملو ملج بنفسجي. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٠ - زُغْدَة وَرْدِيَّة  
*Primula roses* (S). *Primavère carminée* (F).

حشة معمرة سبروتية. اوراتها اطيحية تطول نحو ١٥ سم. نصلها جيل الحصار القواحي سنن الحافة. شرانها يملو من ١٠ الى ٢٠ سم. ازهاره قليلة العدد كبيرة لثقة لونها ال الحمر الوردية الزاهية || ازهاره يستمر من ايار الى نيسان.

١٢٥٣١ - زُغْدَة يَابَانِيَّة  
*Primula japonica* (S). *Primavère du Japon* (F).

حشة معمرة سبروتية. جلورها عائدة لفرقة. اوراتها اطيحية مسطحة. نصلها مثلثي الحافة يطول نحو ١٥ سم || شرانها يملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي تمد من ٣ الى ٦. زهره مستعرة الشكل لونها ال البنفسجي الموشح بالخطي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٢ - زُغْرُغْ  
*Aquifère* (F). *Aquiferous, Water-bearing* (E).

نمت تعريفية يطلق عل الطبقات الارضية التي تحوي بعض الماء او الكثير منه.

١٢٥٣٣ - زُغْرُغْ  
*Aquiculture, Culture hydroponique* (F). *Aquiculture, Fish-breeding* (E).

الزهرية او الزرعة المغرقة هي الزرعة في الماء بدون تربة. يصار اليها بتلوب العناصر الغذائية المعدنية في الماء فيمتصها النبات وينمو ويشمر كما لو كان مزروعا في التربة.

١٢٥٣٤ - زُغْرُغْ  
*Aquigène* (F). *Aquigenous* (E).

نمت تعريفية يطلق عل كل كائن يحيا في الماء او يعيش فيه.

١٢٥٣٥ - زُغْرُغْ عَجَبَالِيَّة و جَمِيل  
*Cursorius* (S). *Courvite* (F). *Cursor* (E).

جنس طير من طوال الساق وعضلة الزنزنات. انواعه المعروفة حشرة اصطناع الصمغ الاسود والافرنية || اسمها صغيرة لثقة. اطولها تراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم. مناقبها مسطحة. دقيقة. اجنتها ذلقة. الخناصير قصيرة. مستعرة. مقبضة الاطراف. سيقها زارواغا محملة. اوتابها مختلفة الالوان يكثر فيها الالبيس والخطي || امرف انواعه واشهرها الزغزغ الالبيس.

١٢٥٣٦ - زُغْرُغْ أَغْبَسْ \* جَمِيل أَغْبَسْ  
عَجَبَالِيَّة الِأَغْبَسْ  
*Cursorius isabellinus*. *C. cursor* (S). *Courvite isabelle, Courvite gaulois* (F). *Cream-coloured cursor* (E).

طائر من الزغزغ. اسنانه يمد من صمغ الرق الاربط ال افريقية الشرقية والنبالية لانه من الصمغ التي تجوب القناري في طلب الفرقة || جسمه متوسط القند يطول نحو

١٢٥٣٧ - زُغْدَة لَرَجَة \*  
*Primula viscosa* (S). *Primavère visqueuse* (F).

حشة معمرة ترطب في الاربطة الرملية. اوراتها بيضة مسطحة السطح. نصلها كثيف. المسام اللينة القوية الزائجة، لونه ال الحصار الاصفر || شرانها يملو من ٦ الى ١٥ سم. ازهاره لبسة التجميع المصنولي، فواحة الصف، بنفسجية اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٣٨ - زُغْدَة مَكْرَدَة  
*Primula grandis* (S). *Primavère géante* (F).

حشة عمولة سبروتية. اوراتها مسطحة كبيرة القند قليلة الشكل. نصلها كثير المروق، قليل الزغب، لاجابي التسنين || شرانها يملو من ٥٠ الى ٧٠ سم. ازهاره مسطحة متدلية، لونها ال الحصار الباحت || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٣٩ - زُغْدَة مَحْزُونِيَّة \*

*Primula officinalis* (S). *Primavère officinale, Coucou officinal* (F). *Cowslip, Paigle* (E). *Gartenprimel, Schlüsselprimel* (D). *Primavère, Primula odorosa* (I).

حشة معمرة سبروتية يقال انها طرية تنفع الصدر والامعاء. اوراتها مسطحة ذلقة. نصلها اخضر الصفرة العليا، يحمر السفلى || شرانها يملو من ١٠ الى ٣٠ سم. ازهاره جرسية احمرها ابيض، ابوالها ملحية، اعناتها خاسية الزقفة البرتقالية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

١٢٥٤٠ - زُغْدَة مَحْطَلَّة  
*Primula vitacea* (S). *Primavère rayée* (F).

حشة معمرة. اوراتها خفيفة مسطحة. نصلها مائل البشرة، دقيق التسنين || شرانها يملو نحو ١٥ سم. ازهاره كثيفة التجميع. حراء اللون، كلوسها جرسية الشكل تملوها حشة خطوط بيش || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٢٥٤١ - زُغْدَة مَرْبَرَكَة  
*Primula hirsuta* (S). *Primavère hérissée* (F).

حشة معمرة ترطب في الاربطة الرملية. اوراتها بيضة الشكل. نصلها يمتد المسام اللينة الحمراء التي تملو عل مسطحته || شرانها الزهري يملو من ٣ الى ١٠ سم. ازهاره مستعرة الشكل و قليلة، تمد من ١ الى ٣. عنقاتها ابيض، سارها وردي او ليكي اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٢٥٤٢ - زُغْدَة مَبْقَعِيَّة  
*Primula helodoxa* (S). *Primavère gloire des marais* (F).

حشة معمرة ترطب في الاراضي الرطبة. اوراتها سنائية النصل الملتص الاطراف || شرانها يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ازهاره متراكبة الاراس التي يراوح مدعها من ٦ الى ٨. زهره مقمرة القناعة، صفراء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

١٢٥٤٣ - زُغْدَة مَهْدَبَة  
*Primula marginata* (S). *Primavère bordée* (F).

حشة معمرة ترطب في الاربطة الكليكية. اوراتها اطيحية الشكل. نصلها لحمي التجميع، حطرها متقارب التسنين، مهدب الحافة || شرانها يملو من ٥ الى



زغدة لرجة



زغدة مخزنية



زغزغ ابيض

شفاغان، قوائمها مستقيمة، قصبية. ثوبها الى الصبغة الناعية الملوحة || تنص الاثني المكن في لحاء الاشجار فيقتف من يقات صغيرة، غطيلة الشكل، بقية اللون تردب السواء وتميش عليه حتى الاكمال.

Zaghouana

\* زَغُون \* ١٢٥١٧

نظر مجري من فصيلة السحاميات ورتبة الدمايات يركب بعض نباتات الفصيلة الزرقية واعضاها الحشيش. مظهر الخارجي يقع صغيرة مستديرة لاقبسية التصنيع تصيب الاوراق الجديدة الناعية تقسبب لها تقسّم التسج الحلوية وتتمج من يمتجها رفعة في البشرة تبدو كالبثور الى ان تتشجر عن بويغات كالحباب لونها الى الجفوة || يكافح عند ظهوره باستهلاك سائل يورده لاهلوا ١ %.

Amanida (S), Amadine (F).

\* زَغِيم \* ١٢٥٤٨

جنس صافير صغيرة القد من الجوامث الخروطيات المتناظر. انواعه عديدة موطنها البلاد الحارة. جميعها بحجم الدوري. الثوبيا متراكبة الالوان الجميلة. تألف الاهدال والنباتات المبردة الاشجار. قوتها يزور وحويب التبيليات وبعض الحوام والديدان والحشرات الصغيرة || تدن في الاشجار. اناتها تضع من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكور نحو اسبوعين. وذلك على ثلاث مرات في السنة || اشهر انواعه الزعيم الطروق.

\* زَغِيم مُطْرَق \* ١٢٥٤٩

Amanida fasciata (S), Amadine à collier, A. bandé, Cou coupé (F), Cut-throat (E).

نوع من الزعيم حجمه حجم الدوري الصغير. ثوبه الى الكمية الصنائية يملوها زعيم ابيض واسود. عسراه ويصقه يبيض. زوره مطروق بخط ارجواني يتنه من مؤخر العين اليسى الى مؤخر اليسرى. جناحاه ذهبيه سود. موطنه افريقية الشرقية والثنائية. سره يد من ٢٠ الى ٤٠ || يالف حياة الدهن ويتكاثر بسهولة لكنه لا ينذر.

Amanidinidae (S).

\* زَغِيمِيَّات \* ١٢٥٥٠

Amanidinidae (F), Amadinidae (E).

فصيلة طير من الجوامث خروطيات المتناظر. اجناسها وانواعها عديدة منظفها من صافير المناطق الحارة || تتميز باجناسها الصغيرة وبمناقذها الخروطية القصيرة وباذنابها المقنطية التي يلفب فيها تقصر. اجنسها مستدة الطول. انوبها جملة الالوان الزاهية. ارشاعها دقيقة || جميعها تألف القفص، بعضها مستحب الزققة. قوتها يزور التبيليات || احرف اجنسها واشهرها الزعيم والطرور والبداس ...

Satinée (F), Satiny (E).

\* زَق \* ١٢٥٥١

صغير الريش ونص بفسهم به ريش لتمام. قال المتني : وكان المرو من زق الرئال .

\* زَقَالَة صُغِيرَة العُند \* ١٢٥٥٢

Rhiphophorus subdipertus (S), Rhiphophorus à élytres réduits (F), Rhiphophorus subdipertus (E). حشرة وائمة ناعمة خاشرة من فصيلة الزقاليات ورتبة عذبات الاجنحة. تألف الاماكن التي تكثر فيها التفويغات

٢٥ م. ثوبه اخيس اللون. رأسه ازرق الملوحة. عيناه مكملتان بالاسود الذي يمتد كالخط حتى القفن. قوامه واباهره حطية الزققة. كلاء صفر الاطراف و حر المابية. زغال جنبه مرقونة بالاسود والايض. حقله منه حطية اللون. سقاء الى الزققة البسرية. رصاف واصابه بلون البرل || يدن انصومه بين الحمايرة التي تكتنفها الاشباب المتراكبة الكثيفة. انشاء تضع من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها فصيلتها نحو ١٥ يوم بينا الذكر يولن لما انشاء.

\* زَغُطَة \* ١٢٥٥٧

Zygote

\* زَغُف \* ١٢٥٣٨

Brindilles (F), Sprigs (E). الزغف : دقاق الحطب : اطراف الشجر الصغيرة واعمال الثوث والفرع.

Pontederia (S), Pontederia (F).

جنس نباتات شبيهة برية ورتبة من فصيلة الزغفلات. انواعها ثمانية جميعها جلمورية متقية وبائية سقها شراعية متصبة تكتفي بالسائل الزهرية. ازلها جملة الشكل، سداسية الانقسام، زرقاء اللون || اوراقها متتقة كبيرة لقد طيلة النسل، عنقها ملاق مستطيل يطوق بها حل سطح الله || تزور القزوين لكها تحض الصغ.

\* زَغُفِيَّات \* ١٢٥٤٠

Pontederiacae (S), Pontederiacae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة ستورات الزور. نباتاتها اعشاب جلمورية الجلموع. اوراقها قرصية الانتشاب، مستطيلة الزناد، قليلة النسل. ازلها متطيلة التصنيع تقدم على شراخ يعل الاوراق || منها المناطق الحارة تعيش في المنافع والمياه العذبة الرائدة.

\* زَغُون \* ١٢٥٤١

Pigeonneau (F).

Young pigeon, Squab (E). فرخ الحمام ما دام زق. يقال ازفل المائر فرعه اذ زقه.

\* زَغِيل \* ١٢٥٤٢

هو الادينيس الصغير، اطلبه.

\* زَغِيل القس \* ١٢٥٤٣

هو الحيزان الثريير، اطلبه.

\* زَغِيلِكَة \* ١٢٥٤٤

هي لبن المروج، اطلبه.

\* زَغُتَج \* ١٢٥٤٥

Olives sauvages (F), Zéng (E).

ثمر العتم (الزيتون البري) وهو مثل البق الصنار يكون اخضر ثم يسود فيسول في مرارة وصمته مثل صبة البق. يتركول ويطبخ ويصلى ملؤه حتى يكون وبها كرب المتب.

\* زَغُثُورَة طَالِكَة \* ١٢٥٤٦

Zygoneura frivola (S), Zygoneura frivola (F).

حشرة مؤذية من فصيلة الشياريات. تألف جميع المواقع القنالية والحافات والمساكن || جسمها صغير القد يطول من ٤ الى ٥ م. راسها مكور. عينها متلاصقتان مع الصدر الذكر مفترقان عن الاثني. زباناها خيطيان. صدراها شبيهة بالشكل. ورشاعها كبريا لقد، عددا الخضاب،



زغل



زغوان



زغيم مطروق



زقالة صغيرة العند

Alaternbaum, Alaternkrenzborn (D). Alaterno, Ilatro, Putine (I).

نوع من الأبنى مهدد شرق البحر المتوسط. يوجد في بعض المناطق الجبلية اللبنانية والسورية. ينمو من متر إلى خمسة أمتار. أنصافه وأغصانه مرصعة، وأوراقه عروية، كملحة، متعاقبة. نصلها سنن الحافة يميل من ٤ إلى ٦ أزواج من العروق المماثلة. أزهاره عذبة الثيلت، خالصة الاسدية وتصلصق الذلقة، ثنائية أو ثلاثية البهات. ثماره كروية، حمضية اللد، نالفة البسوق تيمو حمره اللون ثم تسمر ويتبدع مع التفسج. يقال أن تقع ثماره وأغصانه ونشبه يسهل المدة ويقوي الكبد والعظام ويذهب باليرقان.



زفرين اللبد

١٢٥٦٠ - زُفَافِ لُبْنَانِي \* ، عُوْدُ الْخَيْرِ

Rhamnus libanensis (S). Nerprun du Liban (F).

نوع من البق ينمو في جرد لبنان. وهو جنبه صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها متعصبة خشبها حطلي اللون. أنصافها وأغصانها خالية اللد. لورافها متعاقبة ينيصة. نصلها جابند النسيج، كثير العروق قوي يبلغ مددها من ١١ إلى ١٥ زوجاً. أزهارها عشوية خماسية التركيب. ثمارها كروية نورية حمضية اللد نالفة البسوق تيمو حمره اللون ثم تسمر مع التفسج. يقال أن تقع ثماره يفي الكبد والعظام ويلعب باليرقان.



زفرين لبناني

١٢٥٦١ - زُفَافِ \* Vane fort et soutenu (F).

High and sustained wind (E).

الزفواف والزفواف: الريح الشديدة المهبية في دمام.

١٢٥٦٢ - زُفَافِ Tonnelle (F). Arbour (E).

نحسة من حديد أو عشب تملوها نباتات عارضة.

١٢٥٦٣ - زُفَافِ Expiration

خروج الهواء من الرئتين وهي حركة طيعة تتبع الاستنشاق أي دخول الهواء الجري إلى الرئتين.

١٢٥٦٤ - زُفَافِ \* ، قَرْجِيسِ لَسِيصِي

Zephyranthes (S). Zephyranthe (F). Zephyr lily, Swamp lily (E). Zephyrblume, Flammenlilie (D). Zeffr (I).

جنس نباتات بصلية من فصيلة القرجيسيات. الأنواع نحو ٢٠ مملوها زراعي جليل الزهر المخطط الألوان. شمراخها جوفاء. أزهارها فردية. لورافها غيقة النصل، قليلة اللد، تنمو متناثرة قرب ابتلاج الزهر. أشهر أنواعه الآفريقية ما يتبع.



زفر

١٢٥٦٥ - زُفَافِ الْبَيْضِ Zephyranthes candida (S).

Zephyranthes blanc (F). نوع من الزفير شمراخه يملو نحو ٢٠ سم. أوراقه اسطوانية مغلدة تملو نحو ٣٠ سم. زهرته يضاء اللون لا عرف لها. أزهاره في أيلول.

١٢٥٦٦ - زُفَافِ أَصْفَرِ Zephyranthes citrina (S).

Zephyranthes citrin (F). نوع من الزفير شمراخه يملو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه ضيقة النصل البالىع المتخذ تملو نحو ٣٠ سم. زهرته صفراء اللون طويلاً نحو ٥ سم. ساقها مغلقة مغمصة. أزهاره في آب.

والصيرليات. غصانها تمش على رسيق الإزهار ويتلها. يرقاتها تلتهم ذبي الزناير واسارع اللدان ويترها من الحشرات. جسمها صغير اللد يملو من ٥ إلى ٨ م. ثوبها إلى السرة المخططة الصنائية الملوخ. وأصبا صغير الجرم. زبانا مشطبان. عيناها صغيرتان ماصحتان. ظفرها جعتان صغيرتان. رؤشها شافان كيران. يطنها مستعرض الشكل. أوصافها رباعية المقل في الزوج الخلفي، خالصة في الزوجين الامامي والوسطي. لها جبل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملانة في اوالل سزيران وتمشي على اوسط ايلول. تسرح في التهار. تسافد في اواسط آب. تمتع المكان قرب غشوات الزناير وفي المواقع القريبة من مجتمعات الاساربع. البقرة عند بلوغها الاذوك اتمام تطول نحو ١٣ م. جسمها مبط الشكل، مستطيل القدم والرأس، مستطيل القعر، سداسي الروابح، ضلع التأكير، الحبر اللون، ودي الملوخ، عتاي الرأس، اسمر الروابح والشرج. طود الاكمال الذي يستمر نحو ٣٥ يوماً يتفشي في التربة تحت الجملانة.

١٢٥٥٣ - زُفَافِيَّات \* Rhaphiphorides (S).

Rhaphiphorides (F). Rhaphiphorides (E).

فصيلة حشرات وأشعة شافرة من رتبة غمديات الاجنحة. اجناسها وأزواها المعروفة قليلة العدد مملوها من حشرات البلاد المعتدلة الحرارة وبعضها من حشرات حوض البحر الابيض المتوسط. تألف نباتات الغمديات والشفويات. يرقاتها شافرة تمش على ذبي الزناير. أجسامها صغيرة اللد أو معتدلة. رؤوسها مستديرة. زباناتها متجانسة الاشكال منها انخيلية والمروحية والمخططة، تركب من ١٥ أو ١١ فصلة. كولاسها وأغصانها لاجمسية الشكل والقد. أوصافها الخلفية رباعية المقل اما الوسطي والامامية فخالصتها. المهر اجناسها الزنائلة والميمس.

١٢٥٥٤ - زُفَافِ Asphaltis (F). Asphaltis (E).

نوع من الحمر كيف المادة السوداء اللامعة يستعمل جويلاً مع كسر الحصاة في تغطية رصف الطرقات لتثبيت نكديها ووقايتها.

١٢٥٥٥ - زُفَافِ، قَبِيرَ Empoissor (F). To pitch (E). قَبِيرَ.

طل أو لاط التي بالزق.

١٢٥٥٦ - زُفَافِ Ciris, Lorum (F). Cere (E).

الزفد خشاء يظف قاعدة المتقاد عند بعض فصائل الطير انصها الجوارح والحيات والنباتات. ومن الكاترة من استعمل كلمة قير و دلالة على الزفد في حين أن القير هو القوران.

١٢٥٥٧ - زُفَافِ Tuteur (F). Prop (E).

هو المسند الذي تدعم به الشجرة الفتية.

١٢٥٥٨ - زُفَافِيَّات Cistées (F).

سبط من فصيلة الكبريات.

١٢٥٥٩ - زُفَافِ الْجُرْدِ \* ، تَبَيَّ مَشْرَاكُف ،

أَلْبَسِيس ، أَلْبَسِيس ، عُوْدُ الْقَيْسِ

Rhamnus alaternus (S). Nerprun alaternus, Alaterno, Bourgue-épine (F). Alaternus, Barren privet (E).

في اواسط الربيع وتعيش حتى اواخر الصيف . تسرح في القهار . تساقد بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع المكنة رزماً تلتقيها في الجلالة وتحت الاشجار والحجاة || البرقة عند بلوغها الادراك تمام طول نحو ١٥ سم . جسمه رمدي الشكل ، كثيف الحلب ، حنطي اللون ، اسمر الرأس والرواجب والشرج || طود الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع يتقضي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية .

#### ١٢٥٧٢ - زُفِيرِيَّات \* Zuphiidae (S). Zuphiidae (F).

فضيلة حشرات لاجحة وقائمة من رتبة جمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المواقع الرطبة وفضفاة التبر والبيجرات || جميعها صئيرة القند فلما يتجاوز طول الواحد منها ٢٠ سم . اجسامها خالية للتقار ، متباينة الالوان الزاهية . رؤوسها كروية ، عضوية الاصداغ ، تركتزر على اعناق دقيقة اسطوانية الشكل . عيونها قليلة التتو . كواشها قليلة الغرض ، شبه قليلة الشكل . احمادها مستطيلة ، مستديرة الأطراف || تسرح في القهار وتبيت في الليل . تسمى بسمرة وتعتبر نطفة . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر ولا تتغ من الضيوف من الحشرات الدنيا || اظهر اجناسها الزفير .

#### ١٢٥٧٤ - زُفِي Abecquer, Embecquer (F). To feed (E).

زق الطائر فرشه : اطمه بمقاره : راجع انزل .

#### ١٢٥٧٥ - زُفِي ، تَسْمِين Gavage (F). Cramming (E).

اطعام الطيور الداجنة قسراً طاماً خاصاً بنية تسميتها .

#### ١٢٥٧٦ - زُفِي Asque (F). Ascus (E).

خلية نباتية تتصلو الى كيس صغير يفتأ فيه بوغ الفطور الزقية . ج. انفاق .

#### ١٢٥٧٧ - زُقَاء ، هَبَج Cri du hibou (F). Cry of the owl (E).

صوت البرم حل اختلاف اجناس .

#### ١٢٥٧٨ - زُقَاح ، زُقَج Cri du singe (F). Cry of the ape (E).

انزاع والزقج : اسم صوت القرد خاصة والفصلك كلاك .

#### ١٢٥٧٩ - زُقَار Fusicoccum

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات يتميز بويضة البكنيدية التي تنشق عضوية ثم ترق تصعد الادمه والبشرة . وهي شافئة ، لينة التركيب ، حنطية الجول . تصطبها رديدة المياه ، مستطيلة الخنق . بويضاتها بيضية شافئة . انواعها قليلة لا ينتم منها اعمار تمشق السباتية .

#### ١٢٥٨٠ - زُقَار السِدْرَاك Fusicoccum cedrelae

فطر مجهرى يصيب سرق وافضان السدراك . مظهره الخارجى بلخ مستطيلة طولاً من ٣٠ الى ٤٠ سم . تركيب له السق والانسوان فتؤذيها وقد تسبب جفافها || يكافح بالكشط والتطهير والمالي بالستوك .

#### ١٢٥٨١ - زُقَار اللوز Fusicoccum amygdali

فطر مجهرى يصيب اغصان اللوز واقلاده فيمرق سير التسع

#### ١٢٥٧٧ - زُفِير حَافِن Zephyranthes sessilis (S). Zéphyranthe sessile (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٢٠ سم . اوراقه نحيلة اسطوانية طولاً من ٢٠ الى ٣٥ سم . زهرته عطرية حساسة طولاً من ٤ الى ٥ سم . لونها الى الكيفاش المويج بالاجر . ساحتها ثلاثية || ازهاره في نيسان .

#### ١٢٥٦٨ - زُفِير فِيرَجِيَّة Zephyranthes stamesco (S). Zéphyranthe de Virginie (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ٣٠ سم . اوراقه ضيقة مجددة زاهية الخضار طولاً من ٢٥ الى ٣٠ سم . زهرته عطرية تركتزر حل زباد يملو الشرفاف المزودج الفلقة . طولاً نحو ٨ سم . لونها يستقر حل الكيفاش الثلثي بعد ان تكون بياضاً مويجة بالوردي || ازهاره يستمر من ايار الى سيزران .

#### ١٢٥٦٩ - زُفِير مَوْشَح Zephyranthes versicolor (S). Zéphyranthe versicolore (F).

نوع من الزفير شرخه يملو من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقه ضيقة مدنية الزام الاخير طولاً نحو ٣٠ سم . زهرته حلوة تركتزر حل زباد قصير يملو الشرفاف . طولاً نحو ٥ سم . لونها يستقر حل الكيفاش المفلط بالوردي يملو مويج اخضر . ازهاره يدم طولاً فصل الشتاء .

#### ١٢٥٧٠ - زُفِير وَدِّي Zephyranthes rosea (S). Zéphyranthe rose (F).

نوع من الزفير شرخه يملو نحو ١٥ سم . اوراقه ضيقة التصل المسطح طولاً من ١٥ الى ٢٠ سم . زهرته عطرية صغيرة القند تركتزر حل زباد مسطح يملو الشرفاف . طولاً نحو ٣ سم . لونها ودي يملو مويج ليكي || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

#### ١٢٥٧١ - زُفِيرِيَّس \* Ziphium (S). Ziphium (F). Ziphium (E).

جنس حيوانات بحرية لينة عظيمة الهامة من المحريات متاثلات الانسان فضيلة التبريات . انواعها المعروفة قليلة العدد اسطانيا ، مسطح بحار العالم || اجسامها كبيرة ، شبه وضية الشكل ، مدممة الاضلاع ، مخروطية الرؤوس الضخمة ، صغيرة الاطعام . انواها الى الخضار اللانس الازرق المويج ، بطنها الى الكيفاش المسابي || سطنها الحياطي جامي . انواها متوسطة العدد الذي يراوح من ٥٠ الى ٢٥٠ زيبا .

#### ١٢٥٧٢ - زُفِيرِيَّس عَطِر \* Zuphium olens (S). Zuphium olens (F). Zuphium olens (E).

حشرة قائمة من فصيلة الزفيريات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وضفاة مجاري الماء . قوتها المواد العضوية المختلفة المصادر وما تسطيع اقتناصه من الحشرات الدنيا . تتميز برائحتها العطرية المائنة التي تم من وبيضا الى بعد متر || اجسامها صغيرة القند طولاً من ٧ الى ٩ سم . ثوبها الى الثلثمة السرايا تعلوها تزاريق سواء اللون . رأسها صغير الجرم ، اسود اللون . عيونها صغيراتان . زباناتها عظيمات مستطيلة . ظهرها مستعرض الخضر لا يلتصق كامل البطن . جرابها نفضية . ارجافها خاسية المعق || لها جيل واحد في الجول . تظهر الحشرة الجلالة



زفير



زفير من



زقار اللوز



١٢٥٨٧ - زَقَقَهُ شَالِمَةٌ \*  
*Plotus anHINGA* (S).  
*AnHINGA vulgaire* (F). Common darter (E).  
 نوع من الزقة. طولها نحو ٩٠ سم. قوتها قريب من ثوب جندبا تكثر فيه الزقعة البيضاء. موطنها مناطق وشفاف أنهار وبحيرات الفريضة الوسطى وأمريكا الجنوبية والوسطى. وهي لا تفارق المياه العذبة إلا عند الاستراحة في ظاهرة أنهار.



زَقَقَ أَشْفَقِ الْبَطْنِ

١٢٥٨٨ - زَقَاقُ ، زَقُوقُ ، دَمَشَقُ  
*Charadrius* (S). *Pluvier* (F). *Plover* (E).  
 جنس طير من فصيلة الزرقائيات. أنواعه عديدة صغيرة ومتوسطة الحجم. جميعها من القواطع تجوب المناطق والقبائل والمراعي وكثبان الرمل في أجزائها رقيقة. مناقيرها أقصر من رؤوسها. أجسامها ذلقة. أراغها رقيقة ونحيلة. أوتابها مراكبة الألوان. أذناها موجهة بخطوط مستعرضة في قوتها الحشرات والديدان على اختلاف أنواعها. تنش في الفصوص كدبر في منظر ما معرضه الجنوب وتكلمه بقى الحشائش الناعمة. أناثها تبيض من ٢ إلى ٥ بيضات تحضنها وحدها نحو أسبوعين.



زَقَقَ شَالِمَةٌ

١٢٥٨٩ - زَقَاقُ النَحْسِ  
*Yanaseu* à caroncule (F).  
 هو الكتاب ، طائر من الزرقائيات ، أعليه .

١٢٥٩٠ - زَقَاقُ الرَّمْلِ الْمَطْرُوقِ

*Charadrius hiaticula* (S). *Grand pluvier à collier*, *Gravelot hiaticule* (F). *Ringed plover* (E).  
 نوع من الزرقاق كبير الجث يتبع طيقه المستعرض الأسدي ويقاطعه الجلوبين في سره كبير اللبد. يألف للكتبان الرملية ويصاحب الأجر .



زَقَاقُ نَفِي

١٢٥٩١ - زَقَاقُ شَامِي  
*Yanaseu* (F).  
*Peewit*, *Lapwing* (E).  
 طائر يعرف باسم شهره وهو أبو طيط ، أعليه .

١٢٥٩٢ - زَقَاقُ فَيْفِي \*

*Squatarola squatarola* (S). *Pluvier argenté* (F). *Grey plover*, *Swiss plover* (E).  
 نوع من الزرقاق كبير الحجم، البطن القوي، يلق في البرادي القضي المواجه في سره متوسط اللبد. يألف للروج والمراعي وشفاف الأعوار .

١٢٥٩٣ - زَقَاقُ مَدَهَبِ \*

*Charadrius suratus* (S). *Pluvier doré* (F). *Golden plover* (E).  
 نوع من الزرقاق يحوب بلاد حوض البحر المتوسط . ثوبه الشوي يتخلل عن ثوبه الريسي . ظهور أسود نسبي تعلوه نمشة سرخسية الشكل ملحية . زوده وصدره إلى السواد اللامع يملو توشع أصفر ويحده أطار أبيض . بطنه وخطابه ونمكة يبيض . عيانه يمتقله وقائمه أسود في أراغها متوسط اللبد . يألف للروج والمراعي . قوته الحشرات والديدان .



زَقَاقُ مَدَهَبِ

١٢٥٩٤ - زَقَاقُ مُسْلَحٍ  
*Hoploptère* (F).  
 طائر من الزرقائيات يدعى تهبوج ، أعليه .

ويشتهر أنمو || مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل تركب الحاد منه أبعد البرام . تدور قواء القوم ثم حنطة ، كدوم من نيسان حتى أيلول حيث ينشئ أثرها || أضراره زعيدة لا تستوجب المكافئة .

١٢٥٨٢ - زَقَقَ أَشْفَقِ الْبَطْنِ \*

*Oxynotus rufiventer* (S).  
*Oxynota* à ventre roux (F).  
 طائر من الجوارح مشربيات المناخير وفضيلة الثعريبات . أعطانه مدغسقر وبعض جزر المحيط الهادي . يألف المنايات والحدائق والجنائن . قوته الحشرات والذباب والحمام || جسمه صغير الله ، جسمه سمح الدوري . ثوب الذكر متداخل الأسود والأزرق والأشهب الأفي . بطنه إلى الشقعة . ذنبه زجاجي الريش ، مزرق الأسود . ثوب الانثى إلى الشقعة الموجهة بالأسمر اللتام || يملش حده في الانجرار الريفية . الانثى تحضن بمناوبة الذكر من ٤ إلى ٦ بيضات . القرض يستمر نحو ١٣ يوماً .

١٢٥٨٣ - زَقَقَ  
*Eurytostomus* (S). *Eurytostome* (F).  
 جنس طير من الجوارح وأهانت المناخير وفضيلة الثعريبات . أنواعه المعروفة ستة أعطانه بعض المناطق الاستوائية والحارة من المال القديم || أجسامها قريبة الشبه بالثعراق . مناقيرها قصيرة مستعرضة الاشدان . أجسامها كبيرة ، ذنوب الاطراف . أذناها مستقيمة الطول و شقعة الطول . المستدير . أوتابها إلى الزقعة السعداء المواجه ومنها إلى الزقعة الخضراء أو الجلوبية للمواجه || قوتها الحشرات والديدان .

١٢٥٨٤ - زَقَقَ  
*Crier* (oiseau) (F).  
*To cry* (bird) (E).  
 زَقَقَ الطائر : صوت .

١٢٥٨٥ - زَقَقَ  
*Plotus* (S).  
*AnHINGA* (F). *AnHINGA*, *Darter*, *Snakebird* (E).  
 الزقعة ج زَقَقَ ، جنس طيور مائية من كليات. أقدم طوليات الريش . أنواعه قليلة موطنها بعض أنهار وبحيرات المناطق الحارة . من طيورها أنثى تنكث في مكانها حتى يكاد يقبض عليها ففصوص في الماء وتخرج بعيداً || أجسامها رقيقة مستقيمة ، طيلها يراوح من ٨٥ إلى ٩٥ سم. أعطانه استوائية. بالغة الطول . رؤوسها صغيرة مستقيمة . مناقيرها اسطوانية الشكل مفرقة للمناخ . أذناها طويلة . قوائمها قصيرة مستعرضة الارتكاز الميكلي . أراغها قوية . أقدامها مستعرضة . أوتابها إلى السواد اللؤلؤ يملو مراح أخضر . رؤوسها إلى الكهبة السوداء . ظهورها وبسوانها منشقة . أياها ومناكبها وكلاهما مخططة بالأبيض . أعطانه وسناتيرها جلوبية || قوتها الأسماك والقشريات والشفاد . تنش في الانجرار . أناثها تبيض من ٤ إلى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة ذكرها نحو ٤ أسابيع || أشهر أنواعها الثامنة والبالغة .

١٢٥٨٦ - زَقَقَ بِاسِلَةٍ  
*Plotus vallanti* (S).  
*AnHINGA vallant* (F).  
 نوع من الزقة موطنها بعض المناطق الاسيوية والأفريقية . تكثر على ضفاف النيل وبحيرات ودي العراق وتركيا . وهي لا تفارق المياه العذبة إلا لتتقم على الانجرار أو حضور الجرف . طيلها نحو ٩٥ سم. قوتها ثوب جندبا يكثر فيه المواجه الأخضر والأزرق وتقتل فيه نسمة التنبش بالأبيض .

## ١٢٦٠٢ - زَقَبُوتُ الْأَثَلِ \*

*Stenaspis squamosa* (S). Sténaspis des tamaris (F).  
حشرة من الناصعات طولها نحو ٣٠ م. ثوبها إلى الخضار  
الزبردي، حمار ظهرها إلى السمرة يعاودها مروج آخر.  
يرقاتها تركب فروع وأغصان الأثل فتفسد الخشب  
وتعطب.

## ١٢٦٠٣ - زَقَبُوتُ الْخَوْخِ

*Bupreste du prunier* (F).  
حشرة مشهورة باسم ناصعة الخوخ، أظلمها.

## ١٢٦٠٤ - زَقَبُوتُ الدَّرَّالِيْنِ

*Bupreste noir du pêcher* (F).  
حشرة تدعى ناصعة الدراق السوداء، أظلمها.

١٢٦٠٥ - زَقَبُوتُ السَّنْدِيَّانِ \*، نَاصِعَةُ الْبَسْبَطِ  
*Coræbe bifasciatus* (S). *Bupreste du chêne*,  
*Coræbe bifasciatus* (F). *Oak burncow* (E). *Zwei-*  
*bindiger Prachtkäfer* (D).

حشرة من الناصعات طولها نحو ١٥ م. ثوبها إلى الخضار  
المذهب || يرقاتها تعيش على فروع وأغصان السنديان  
فتفسدها وتؤذيها.

١٢٦٠٦ - زَقَبُوتُ الصَّنُوبَرِ \*، نَاصِعَةُ الصَّنُوبَرِ  
*Chalcophora mariana* (S). *Bupreste des pins* (F).

حشرة من فصيلة الناصعات طولها نحو ٢٨ م. ثوبها  
إلى الخشن الأسع المولج ينحرف إلى الاسود في آخر  
مهيحا. طيراتها سريع زرق || يرقاتها تركب قلف  
الصنوبر فتفسده وتعطب الشجر.

## ١٢٦٠٧ - زَقَبُوتُ الْوَرْدِ

*Bupreste du rosier* (F).  
حشرة تدعى ناصعة الوردة، أظلمها.

## ١٢٦٠٨ - زَقَبُوتُ نَسَاعِيَّةِ الْبَحْجِ \*

*Buprestis novemmaculata* (S). *Bupreste à*  
*9 points* (F). *Buprestis novemmaculata* (E).

حشرة غاشقة عاشبة من فصيلة الزقبقوتيات ورتبة غديات  
الاجنسة. موطنها يرم معظم أسواق حوض البحر الأبيض  
المتوسط. تألف الموائع التي يكثر عليها الصنوبر والبروز  
والشربين والسرو. خنافسها تعيش على ما تقتضيه من نصل  
الأوراق. يرقاتها تعيش تحت القلف والحاء دون أن تتعدى  
على الشجر || جسمها متوسط القد بطول من ١٥ إلى  
٢٠ م. ثوبها إلى السواد الأسع المولج. غمداهما وكوسلهما  
مبقحة بالأسفر. رأسها صغير أجرم ينفرد تحت الكوسل.

عيناها كبيرتان بارزتان. زباناها غشيان، منفردان.  
فكاهما ضليمان. كوسلهما قبلي الشكل. ظهرها مستدل  
الاحاديذاب. غمداهما بليغتا التميزر المتوازي المخطوط

القطبية. أرباعها خاسية البقل || الانثى اكبر قدما من  
الذكر وأضخم بطنها منه واكد ثوبا || جيلها ثنائي الحول.  
تظهر الحشرة الجملانة في أوائل ايار وتبقى حتى اواخر  
الربيع. تسرح في الجبال وقيوت في الليل || اليرقة بطيئة  
التنود لتدرك الكمال الجسموري بعد التفت بنحو ١٢  
شهرا. جسمها مستطيل المقدم، مستقيم المؤخر، بطول  
نحو ٤٠ م. ثوبها إلى البياض الاغبر. رأسها اسمر اللون

## ١٢٥٩٥ - زَقَرَقَاتٌ مُطَوَّقَاتٌ \*

*Charadrius dubius curonicus* (S). *Plover à collier*,  
*P. de rivage*, *Gravière*, *Alouette de mer*, *Gravelot*  
*naie* (F). *Lesser ringed plover* (E).

نوع من الزقراق صغير القد، اسود المنقار البسيط،  
مستدير العين الكسلا، مطوق الصدر، احمر القوائم  
والقدم || سره متوسط العدد. يألف المنابع وصفات  
الانهار والشلوط.



زَقَرَقَاتٌ مُطَوَّقَاتٌ

## ١٢٥٩٦ - زَقَرَقَاتٌ نَاصِيحِي

*Hoploptère épineux* (F).  
طائر يدعى نهيوخ ناصح، أظلمه.

١٢٥٩٧ - زَقَرَقَاتِيَّاتٌ \*  
*Charadriidae*, *Charadriidae* (S). *Charadriidae*, *Charadriidae* (F).  
*Charadriidae*, *Charadriidae* (E).

فصيلة طير من رتبة طول الساق. اجناسها واتواعها  
عديدة متماثلة الاشكال والاخلاق والامادات. تتميز  
بسرة دمها على الارض وبمناقيرها المركبة من جزين جز.  
غشروني يمتد من القاعدة حتى ثلثي المنقار ويبزر قرني  
يكون الثلث الاخير حيث الطرف والمقلط.

١٢٥٩٨ - زَقَرَقَاتٌ، شَرْدٌ  
*Gezoullier* (F).  
*To chirp*, *To warble* (E).

زقراق ورد الحاتر : رابع صوته وطرب به. والزقزقة شاملة  
لجميع الناصيين اما التفريد فنحاصر ببعضها.



زَقَرَقَاتِيَّاتٌ



زَقَبُوتُ الْأَثَلِ



زَقَبُوتُ السَّنْدِيَّانِ



زَقَبُوتُ الصَّنُوبَرِ



زَقَبُوتُ نَسَاعِيَّةِ الْبَحْجِ

## ١٢٦٠٠ - زَقَعٌ

*Chant du coq* (F).  
*Crowing of the cock* (E).  
هو صياح الديك. وقع الديك : صاَحَ.

١٢٦٠١ - زَقَبُوتٌ \*، نَاصِعَةُ  
*Bupreste* (F). *Buprestis*, *Golden beetle* (E).

جنس حشرات من فصيلة الناصعات انواعه عديدة جميعها  
حيلة الشكل والالوان الزاكية النحاسية المولج. تعيش  
في المنافع الممتدة الحارة. وهي ضوئية للسرح سريعة  
الطيران والحركة || يرقاتها غاشقة تعيش على مختلف  
الاشعاب وعلى جذور وسوق النباتات العشبية.

قليلة منها المناطق الاستوائية. جلبوها بحديقة تنود في الماء. سيقانها ذات سحنة. أوراقها قرمية الانتساب، خضرة التجميع، بتلية الشكل، فضلة النصل المخنث الشارب الأطراف. أزهارها فردية محورية لائقة. يقال إن أوراقها تنفخ بالزحار وتنقل بول الدم.



زيتون فكام

#### ١٧٦١٨ - زَيْلَة \* Helicobesidium

نظر مجهرى من الكثرات يتطفل على العديد من النباتات انصها الثقل والزفزان والجوز والشونيز والحليون والحم واللوفوف والحماض والقطن والقرنفل... || مركب الجذور عند انتشارها ينمطها بنماتة وبماتة القرية الحلية الحمراء اللون الى ان يتبقى عليها || يكلف يستمال مركبات القينول وينهم من استمال الملح بمعدل ٣ كيلو في المتر المربع وذلك عند غلو التربة من النباتات.

١٧٦١٩ - زَيْلَة \* هو فرخ القاطنة.

١٧٦٢٠ - زَيْلَة

الزكاء : ما انخرجه ارض من الترس (التاج).

١٧٦٢١ - زَيْلَة \* هو الخنازير، اطلبه.

#### ١٧٦٢٢ - زَيْلَة \* Cytologie (F), Cytology (E).

هي السيولوجية أي علم الخلايا. وهي علم يبحث في ماهية الخلايا وتطوراتها الحياتية من جميع النواحي أن جسمودية أو كيميائية أو خلاصها.

#### ١٧٦٢٣ - زَيْلَة \* Cytomologie (F), Cytazology (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الحبيرات الحبيرية.

#### ١٧٦٢٤ - زَيْلَة \* Cytobotanique (F), Cytobotany (E).

فرع من الزكالة يبحث في ماهية الخلايا النباتية.

#### ١٧٦٢٥ - زَيْلَة \* Sperme des insectes (F), Spem of insects (E).

هو افراز اللقد التناسلية الذكورية عند الحشرات.

#### ١٧٦٢٦ - زَيْلَة \* Cytoblaste (F), Cytoblaste (E).

الزكنة جبلة الخلية النباتية.

#### ١٧٦٢٧ - زَيْلَة \* Cytologique (F), Cytologic (E).

كل ما هو يخص بالزكالة أو ماله إليها.

#### ١٧٦٢٨ - زَيْلَة \* Zaccen, Zacon

هو الحليج من السلايات، اطلبه.

#### ١٧٦٢٩ - زَيْلَة \* هي الافاتوسه، اطلها.

#### ١٧٦٣٠ - زَيْلَة \* Sore (F), Sorus (E).

مجموعة الاعضاء التناسلية في بعض الفطور.

#### ١٧٦٣١ - زَيْلَة \* هي مرة السمر، اطلها.

#### ١٧٦٣٢ - زَيْلَة \* Zilla (S).

Zille (F), Zilla (E), Stachelkohl (D), Zilla (I).

جنس نباتات شبيهة برية محولة من فصيلة الصليبيات.

كالنكين واللامس والشرج || طور الاكمال الذي يتم في آخر سرداب تحفره البرقة يستمر نحو ٣٠ يوما ويتبقى ضمن صلجة غاوية مركبة من نشارة الخشب المصبو بالرياح.

#### ١٧٦٣٩ - زَيْلَة \* Capnodis carbonaria (S), Capnode charbon-

nier (F), Capnodis carbonaria (E).

حشرة خاضعة لائحة مذبذبة من الزيتونيات ورتبة مفصليات الاجنحة. تألف الموائل التي تكثر فيها اشجار الورد والخروج. خنافسها تعيش على الاوراق والبراعم. يرقاتها تتجمل الشكير والخشب وتغيب الجلود تحت سطح التربة || جسمها كبير القدر يطول من ٣٥ الى ٤٠ سم. ثوبها الى السوداء القطنية تملو حلة مملو. رأسها مستعرض الجرم، عينها كبريتان، زباناها خيطيان، ظهرها ذات الحوض، مستند الطرف القاروة الاخضر. غمداهما شديقتا الصلابة. ارساها خامة العقول || جعلها ثنائي الحول. الاثنى اكبر قدما وانصر زبانا. تظهر من نوسان الى حزينان وتعيش نحو ٢٠ اسبوعا || البرقة دقيقة مرقاة بلطية الترس. تطول نحو ١٠٠ سم. ثوبها الى البياض الاخير. رأسها اسود. فكاهما ضليمان.

#### ١٧٦١٠ - زَيْلَة \* Buprestidae (S).

Buprestidae (F), Buprestidae (E).

وتعرف بالناصعات وناصعات البقر. فصيلة حشرات من غليديات الاجنحة. اطلب ناصعات.

#### ١٧٦١١ - زَيْلَة \* Elégne, Chalef (F).

Zakkoum-oil plant (E).

هو الخلاط، اطلبه. ورته يلحم الجراح سريعا ويحلو الكلف. وسائر اجزائه تنفع من رجع المفاسل والسا والتقرس. ويدهن افضل منه.

#### ١٧٦١٢ - زَيْلَة \* هو الخلاط الفسيق الورق، اطلبه.

#### ١٧٦١٣ - زَيْلَة \* هو الخلاط الفسي، اطلبه.

#### ١٧٦١٤ - زَيْلَة \* هو لزيون الاكادين، اطلبه.

#### ١٧٦١٥ - زَيْلَة \* Ascomycètes, Eumycètes (F).

Ascomycetes, Eumycetes (E).

رتبة الفطور الزقية من شعبة الفطريات. تتميز بانحياز شربتها وانفصال شيجها وتشبهه وانسيقه اللوني. تكاثرها رتي. ارقاها البرقية ورتبة التجميع || وهي تقسم الى مرتبتين : الفطريات واللغفيات. أما فصائلها فست. الحثريات والمحبذات والقيقيات والقيقيات والمطويات والخشريات.

#### ١٧٦١٦ - زَيْلَة \* Ascozozoa

مرتبة من الرغويات المائية.

#### ١٧٦١٧ - زَيْلَة \* Pistia (S).

Pistia, Codapell floatant (F), Water lettuce, Tropical duck-wood (E), Wasserzalat (D), Pistia (I).

جنس نباتات نجمية مائية من فصيلة اللغفيات. انماه



زَيْلَة



زَيْلَة

1٢٦٤٣ - زُحَابَة ٥ Zelocova, Abelica (S).

Zelcova, Késki, Orme de Sibérie (F).  
جنس اشجار حرجية من البقيعات وفصيلة الانجريات .  
انواعه قليلة . اشجارها كبيرة القد تصل من ١٥ م ٣٠ م .  
انتاعها ثنائية الانتساب . اوراقها ثنائية الصنف ظاهرة  
البرق ، بيضية الشكل ، مسننة الحافة ، قصيرة  
العتق . ثمارها باسمة بحجم الحمص .

1٢٦٤٤ - زُكَم ٥ حوب القزم ، اطلبه .

1٢٦٤٥ - زُكَم ٥ ، وَيَر Dendrohyrax

جنس حيوانات لبونة قاسمة من فصيلة الدماينات .  
انواعه ٦ موطنها الشرق الاوسط وافريقية الشرقية والشمالية .  
انواعها سوية اللون الابيض الاسكل . موطنها الى الصغار  
التي . راجعها العليا غليظة ، مبرها جاحشة . قوائمها  
قصيرة . اذانها ثنائية الاطراف . تألف الاجراع والفايات  
وتتسلق الاشجار بخلاف الانسان الذي لا يقوى على ذلك .  
قوتها اثنان ونواحي الاشجار وبعض الاعشاب . اثنان تسع  
من ٣ الى ٤ اداس رصعها من ٦ الى ٧ اسابيع .

1٢٦٤٦ - زُكَمَاء ، صُكْرَة Faucon femelle (F).

الزنا والصقرة : أنثى الصقر . Female hawk (E).

1٢٦٤٧ - زُكَمَة Caroncule (F). Caruncle (E).

قال الخليل : الزلة تكون للحم في لحمها معلقة كالزمر  
ولها زلتان .

1٢٦٤٨ - زُكَمَة ، شُؤْرَة Gabarit, Gabari

أصمغ او رصم أو تخبط شيء ما بشكله الخفي وكامل  
قياسه القسبية الزاوية .

1٢٦٤٩ - زُكَمَة Fleurs de myrte (F).

الزك : نور الريحان . Flowers of myrtle (E).

1٢٦٥٠ - زُكُل ، إِنْزَلَق Glissement (F).

Sliding, Slipping (E).  
حالة الشيء المنزلق او حركة انزلاق الشيء .

1٢٦٥١ - زُكَيْفَة ٥ Oncidella (S).

Oncidella (F). Oncidella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل  
الرئوية . فصيلة الزنجيات . انواعها المتصورة المعرفة  
عديدة منتشرة في معظم بحار البلاد المحتلة الحارة ||  
اصداؤها معتلة اللحم ، ثنائية المصارع الانتساوية ،  
شبه اهليبية الشكل ، قليلة الاحدياب الصاصي الاتحاد  
يلوها من القمة الى الطرف الخلفي اخميد نافر غروي  
الشكل يضيق مع اقترابه من القمة .

1٢٦٥٢ - زُكَيْفِيَّات ٥ Oncidellidae (S).

Oncidellidae (F). Oncidellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات ممليات الارجل  
الرئوية . اجناسها وانواعها المعرفة عديدة منتشرة في جميع  
بحار العالم || اصداؤها ثنائية المصارع الانتساوية .  
تمش على المسفوف والنبوت البحرية القريبة من الشطوط .  
مسرحها دجوي || اشهر اجناسها الزكيفية .

1٢٦٥٣ - زُكَيْفَة

اسم سمكة بحرية يطلق على الكبدية المشفراء (Vicille)  
ويطلق على الزسوق (Savonnier) .

انواعها المعروفة اربعة منبها الشرق . اوراقها حرجية .  
ازهارها ليلية . يقال انها لا تنقل من بعض المنافع  
الطبية .

1٢٦٥٣ - زُحَاب ٥ Cronartium

جنس فطور مجهرية من فصيلة الزحابات يتصل بالخصص  
الميرة التالية :

- ١ - مفاكه تيش جرابية المسائل وجيوب عاقلها .
  - ٢ - صفاته الانثوية جرابية المسائل وجيوب عاقلها .
  - ٣ - تنقل من بونيات ثملوية السطح .
  - ٤ - مفاكه وسادية متصبة رباحية الاخيرة .
- انواعها عديدة تنقل على اوراق واغصان النبات اشهرها  
واعرضها ما يلي .

1٢٦٥٤ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium ribicola, Peridermium strobili (S).

Rouille des pins à 5 feuilles (F).

فطر مجهرى يتصل على اعداب الصنوبر فيطبا ويصيب  
ذويها وسقطها . ويصيب الحاء فيقرحها ويتغشاها  
ويصلب الاشجار وقد ينفذها الى اليابس .

1٢٦٥٥ - زُحَاب الصُّوَر ٥ Cronartium flaccidum, Peridermium coruni (S).

Rouille de la pivoine (F).

فطر يعيش طوره الاثدي على لحاء الصنوبر وطوره  
الحامى على الفواكه . مظهره الخارجي على الصنوبر  
صفت لا قياسي الشكل والحجم لونه يتأرجح بين الاحمر  
والاصفر مركب الاغصان والافان من اوسط ايار الى  
اوائل تموز فيقرح الحاء ويصلب الاغصان المصاة .  
وهو على الفواكه يقع لقياسه الشكل والحجم والتجميع  
تركب نصل الاوراق من صفاتها السفلى تسلب انقراض  
البشرة وانفجارها ثم صلب السيج وذيله .

1٢٦٥٦ - زُحَابِيَّات ٥ Cronartiacae (S).

Cronartiaceae (F). Cronartiacae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة الدماينات قليلة الاجناس  
والانواع . تتميز بعلاماتها الانثوية الشكل والتجميع .  
اثنائها جرابية تملر سطح الانسية المنصورة . ذماقها  
وسادية او هدية لشكل . بونياتها صنفرة كروية .  
اعرف واشهر اجناسها الزحلاب والكروبيكس .

1٢٦٥٧ - زُكُلِي ٥ Sismique (F). Seismic (E).

نعت تعريفى يطلق على كل ما له علاقة بالزلازل وبالزلازل  
الانسية .

1٢٦٥٨ - زُكُلُخَتْ ٥ هو الاندخت ، اطلبه .

1٢٦٥٩ - زُكَم Garçure (F). Chap (E).

شروق سطحية في اطلاب شروق البقر والمزى .

1٢٦٦٠ - زُكَب ٥

زلب وزلب رائ التام : وبر اي نبت عليه الور .

1٢٦٦١ - زُكَم Parc (F). Park (E).

الروضة البفرة الريانة جادت مياهها وكثر طيرها .

1٢٦٦٢ - زُكُوم ٥ Muscu des canides (F).

Muzzle of canidae (E). هو غم الكليات والشملا .



زحلاب الصنوبر



زحلاب الفواكه



زلم



زليجة

ظهره مشع بالابيض والابيض الاكثر والاسود. قوامه ومناكه لطراف زيكلا سيد. بطنه وباطن مقعده وكعته بيض. وصداه الى الرمة الزرقاء. الذكر اصفر جنة من الاثنى واثنى لونا واسلب شكية. عيوب البلاد في طلب القوت والمصيف والمشي. يات الجبال والقباب والارواح. يثن منه بين فروع الاشجار الباسقة. انشاء تحسن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته عنه الصالح الباكر. يرغب في الجيت اللثة ينشرها مها كانت جلويها قاسية.



زيلة

١٢٦٦٠ - زُمَاحِيَّات  
Sarcophages  
فضيلة من القصور تقضي الى ربة الجوارح. اجناسها الحالية تلية تشمل الزباج والكنكور.

١٢٦٦١ - زُمَاح  
Cry de l'astruche (F).  
Cry of the ostrich (E).  
صوت القملة وفي الصالح صوت النعام.



زاج

١٢٦٦٢ - زُمَاحُ \*  
Berita (S).  
Fîsteur (F). Morning-clock (E).  
طائر من فصيلة القرايات. انواؤه المروعة ثلاثة موشيا استرالية ونيابية. يات الير والارواح البصرة الاجهار ويقترب من الاساكن الاطاة ولتالز الرقية. جسمه كبير القد بطول نحو ٤٢ سم. قوه اسود اسم. لثاله وظهوه الى البياض الاخير. لواحي جناحه وذنبه الى البياض الناصع. مقفاده غرغري الشكل اذق العين. حلقة عينه ككتيبة. جناحه كبير القد بلفظ اللب. ذنبه فيه مقطوم الطرف. وصداه الى السمرة السوداء. اخلاقه هنية. من مزاياه انه يقاتر فريده الحانه منذ الصباح الباكر. يقات صوته قريية لثبه بختات الزمار ما دعي الى تسميته بالزمار. قوته الاشرار على اغلاط اجناسها وانواعها وانصها الكبيرة ينشأ الجراد. يثن منه في الاجبار البورية لظل المستدة الانقاع. الاثن تحسن من موتين الى ثلاث موات في الحول. حصفها تراوح من يعضتين الى ثلاث يعضات تقوم بترغيبها دين الذكر الذي يئن لما النداء.



زاج ملكي

١٢٦٦٣ - زُمَاحُ الرَّمَل  
طائر من القنقع. اطلبه.

١٢٦٦٤ - زُمَاحَاتُ البَحْرِ  
Synagchidae (S).  
Synagchidae (F). Synagchidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية من رتبة عسليات الجراح اجناسها وانواعها عديدة اشهرها زمارة البحر وسمان البحر.

١٢٦٦٥ - زُمَارَة البَحْرِ  
Synagchus (S).  
Synagchus (F). Synagchus, Pipe fish (E).  
جنس اسماك صغيرة سعليلة. اجسامها غرغرية الشكل دقيقة المؤنر المتسلف كالصين. وروسيها مستطيلة كالقنار الانطس الطرف. تحمل زعنفة ظهرية واسعة تقابلها فيه زعنفة بطنية متناحية في الصغر. انواؤه عديدة موشيا. جمع بحار العالم. اسمها واشهرها زمارة البحر الابرية.

١٢٦٦٦ - زُمَارَة البَحْرِ الابرية \*  
ابو زُمَارَة  
Synagchus acus (S). Synagchus algutia, S. trompetta, S. serpens de mar (F). Needle pipefish (E).  
نوع من زمارة البحر بطول نحو ٥٥ سم. تكثر في البحر الابيض المتوسط وقرب شواطئ المحيط الاطلسي.

زمارة البحر الابرية

١٢٦٥٤ - زُمَيْلِقَة \*  
Brugnon (F). Nectarine (E).  
هي الياض ثمرة اللوزان مها كان شكلها وقد صار اسنادها الى التار المرطاة البشرية. ج زليق.

١٢٦٥٥ - زُمَيْتُو  
مادة سامة ترتكز على مشقات التالوم. عرضها التجاري المعروف ياتي على شكلين: الشكل الاول حبوب مسبوكة تستعمل القضاء على الفيران والكمبار والمانجس. والشكل الثاني مجوهر وضع خصيصا للاستعمال في مختلف انواع العلوم وهو يقضي على الجرذان والارباب والكمبار واشباهها. انما يجب على كل من يستعمل مستحضرات الزليو ان يكون ملما فيبعضها من متناول الطيور والحيوانات الداجنة لانها مؤذية وقد تكون مية.

١٢٦٥٦ - زُمَاج \* ، زُمَج  
Herpethocherus (S).  
Macagus (F).

جنس طير من حارة البزاة وفصيلة الصقريات. انواؤه قليلة جميعا من الجوارح الصغيرة القد طولها يراوح من ٣٥ الى ٤٥ سم. انواؤها موشية بيوشة قلب فيها الجوزة. ارياضها شاسعة. وروسيها غليظة. مناسرها قوية عمودية. سواقطها مستطيلة. اذناها مستعدة. ارسافها ثخينة. غالبها سادة. الواحدة زجبة. ارسافها قليلة العدد. تجويع البلاد في طلب المصيف والمشي. تألف عماري الماء ولطراف العبابات. قربها الاناوي والعظاء والهرويات واغرات وبعض الاسماك. يقال انه لم ياكل احد من لحمها الا مات. قال الشاعر:

«أهل الهدي أصبحت لم عرو  
ليت شمري أم ظلفا الزباج»

١٢٦٥٧ - زُمَاج  
Sarcophaga  
جنس طير من كواسر القصور وفصيلة الزباجيات. انواؤه قليلة جميعا كبيرة اذقة بلقاء الثوب. وروسيها وانعافها غفيرة. سواقطها العبابات. ارسافها سرسة غالبها قوية. قربها الجيت اللثة ومنهم من قال ان الزباج يخالط القمل من مهله. اعرف انواؤه واشهرها الزباج الملكي وزباج امريكة.

١٢٦٥٨ - زُمَاجُ كَلِيغُونِيَه  
Pseudogryphus californianus (S). Sarcophaga de California (F).

طائر من الزباج طول نحو ١٢٠ سم. وبسطة مقطبه ٢٥٠ سم. ثوبه اسود. مقطبه ابيض. رأسه اغفر الرشي. كبير المرفوف. اجسد الاذن والزلف. غليظ المنسر. الاصف البيرة. يثن منه على الحفصين وبين غمائلت المنصور في الجبال الربية. انشاء تحسن من رقتين الى ثلاث رقات نحو الشهر. يئلس قوته طول النهار. يرغب في الجيت اللثة موته امريكة الشالية انصها كليغونية.

١٢٦٥٩ - زُمَاجُ مَلِكِي \*  
Sarcophagus gyparcus papa (S). Sarcophaga royal, S. papa (F).

طائر من الزباج يعرف باسم ملك القصور طول نحو ٩٠ سم. وبسطة سطحه ١٩٠. رأسه اغفر الرشي خري اللون. منسره غليظ الشكل اسود الانتشاب اخر الهيكل اسمر البيرة المقطبة الصفاء. عره يرتقالي اللون. عنقه اغفر اصفر. جويق مطوق بالازرق.

Plumes sus-caudales (F). **زَمَجِي**  
Sus-caudals feathers (E)  
من ريش ذنب الطائر مركزة بين الانفيك والزنكي .  
منهم من قال اصل ذنب الطائر (Croupion) .

١٦٦٧٧ - **زَمَجِيل** ، **لَحْشَنَالِيَه** ، **زَمَجِيلُ الْبَرِّ**  
Lachenalia (S). Lachenalia (F). Tiger lily (E).  
Lachenalia (D). Lachenalia, Giglio leopardo (I).  
جنس نباتات صليبية من فصيلة الزنقيات . انواعه كثيرة  
البلد . اوراقها صفيحة الشكل . ازهارها سنبلية او  
عقودية التجميع يحسبها شراخ اجوف رفيع . اشهر  
انواعه البزينة مايلي .

١٦٦٧٨ - **زَمَجِيل سَحْبِي**  
Lachenalia orchoides (S). Lachenalia-orchis (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج  
حرفية الخطار المنحزب . غمرانه يعلو من ١٠ الى  
٢٥ سم . ازهارها سنبلية التجميع ، جرسية الشكل ،  
عاطفة البتلات ، عطرية الرائحة ، يبيضه اللون يطوها  
مواج ازرقة او صفراء اللون يطوها مواج اخر . ازهاره  
يدوم طولا شهر ايار .

١٦٦٧٩ - **زَمَجِيل مُعَدَّتِي**  
Lachenalia pendula (S). Lachenalia pendula (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه صفيحة الشكل لحية التسج  
تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . وتعرض من ٤ الى ٥  
يعلو من ١٠ الى ٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل ،  
عقودية التجميع . متدلية الاوتكار . تحمل صفان من  
البتلات الخارجية اقصر من الداخلية لونها الى الحمرة .  
اما الداخلية فتصلها بتسجي اللون ومقصبتا لبقية .  
ضروبه عديدة تتميز بالوانها . ازهاره يستمر طولا  
كانون الاول والثاني .

١٦٦٨٠ - **زَمَجِيل يَاقُوتِي**  
Lachenalia rubida (S). Lachenalia rubis (F).  
نوع من الزمجيل . اوراقه سنبلية الشكل تطول من ١٢  
الى ١٦ سم . وتعرض نحو ٣ . غمرانه يعلو من ١٥ الى  
٢٥ سم . ازهاره جرسية الشكل عقودية التجميع تعد  
من ٥ الى ١٥ زهرة لونها ياقوتي تلبثها الخارجية اقصر من  
الداخلية . ازهاره يدوم طولا شهر ايلول .

١٦٦٨١ - **زَمْعَاط**  
Clasterosporium  
جنس ظفور مجهرية من عماره الريدانيات وخصاصة  
الحماضيات ، كئالة يضيئة ، مستطيلة ، مدورة ،  
جانبية التقسيم ، تذكر حل حيث غليظ يقوم مقام  
الجرب . انواعه قليلة ، اعرفها زعاط ابن وزعاط  
الشوكر .

١٦٦٨٢ - **زَمْعَاط الْيُنِّي**  
Clasterosporium coffeanum  
نظر مجهرية يركب اوراق البن فيزفيا . مظهره  
الحماضي يقع صغيرة مبيضة تملو النصل حل صفحته  
الغليا . ثيلو صفراء اللون ، سمره الخطار تسع وتضرب  
على السرة يطوها حل قليل الكئالة اشهر اللون يقدوما  
الى الذوبان واليباس .

١٦٦٨٣ - **زَمْعَاط الشَّوْكَر**  
Clasterosporium putrefadens  
نظر مجهرية يركب اوراق الشوكر فيسبها . مظهره

Hétérogénéité (F). **زَمَاع** ، **زَمَع**  
Heterogeneity (E).  
هو علم الانجسام الجسوري والشكل الذي يعلو بين  
عختلف افراد الضرب الواحد في الموقع الواحد .

١٦٦٨٨ - **زَمْعَاة**  
Pleurotoma (S).  
Pleurotoma (F). Pleurotoma (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الاربيل  
وخصلة الكريزيات . انواعها المصاهرة المروقة عديدة  
منتشرة في مغار بحار البلاد الحارة . اصنافها غروطة  
محلولة ، دقيقة الاطباق ، مستطيلة الفتحات الميزابية  
الاطراف ، حيلة الاوان والترايق والزفره . اسفاتها  
قوية للمادة .

١٦٦٩٩ - **زَمَالَة**  
Bécillière (F).  
Livestock trailer (E).  
الزالة شاحنة معدة خصيصا لنقل البهائم .

١٦٦٧٠ - **زَمَام**  
Herbes hautes (F).  
High herbs (E).  
هو العشب المرتفع .

١٦٦٧١ - **زَمَالَة**  
Invalidité, Incapacité de  
travail (F). Disability, Incapacity for work (E).  
صفة ما هو لاشري او غير مستوفي الشروط ، والصبر  
والقدور وعلم الاحلية .

١٦٦٧٢ - **زَمَت** ، **أَبُو قَلَسُون**  
Pyrrhocorax (S).  
Chocard, Corbin chocard (F). Chough (E).  
طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو ٤٠ سم . ثوبه  
اسود اللون اخضر المروج . منقاره اصفر ، عيناه صليتان ،  
رساه وغالبه حر . موطنه حوض البحر المتوسط . يعيش  
اسرابا كثيرة العدد . قوته الديدان والحشرات والحبوب  
والثآليل اصصها البنية . يذش حشه في صووع للصخور  
والخفاور . الانى تحضن وسدا من ٤ الى ٥ بيضات  
لونها الى الياض الاخير يعلو ثيلو اصفر .

١٦٦٧٣ - **زَمَت الْجُرْدَة** ، **عَبِيَّة**  
Pyrrhocorax alpinus (S). Chocard des Alpes (F).  
نوع من الزمت وهو طائر من الغربان ريع الجفة طول نحو  
٤٢ سم . ثوبه الى السواد الاخضر المروج . منقاره الى  
الصغار الحظي . عيناه غروبيتان . رساه وغالبه الى  
الحمرة الجردية . موطنه جبال سويس البحر الابيض المتوسط  
يجبرها الى الحماض والريدان في فصل الشتاء ثم يعود اليها  
في اواسط الربيع . يأنف الحياة الجماعية ، سره لا يقل  
من ثلاثة ازواج ولا يفوق العشرة . قوته الحشرات والديدان  
والقشريات والحبوب والثآليل ولا يصف من جيفة ايها  
شامدا . يذش في صووع الصخور وفي المغاور والاطلال .  
انتاء تحضن وسدا من ٤ الى ٥ بيضات تبنيها حيلة  
الرقعة اللامسوية التوزع .

١٦٦٧٤ - **زَمَج** هو الزجاج ، اطليه .

١٦٦٧٥ - **زَمَجِ الْمَاء** ، **لُورَس** ، **لُورَس**  
Larus (S). Mouette, Golland (F). Gull (E).  
جنس طير من رتبة كليات القدم طوليات الريش  
الابيض . يطرن اسرابا فوق الماء فينتظن من السلك .  
انواعه عديدة منها الجركة والحوري والدغبة والدنكة  
والرورس والزردية والسكني والسويدي والجمعة والوروس .



زَمَاع



زَمَت



زَمَت الْجُرْدَة



زَمَجِ الْمَاء



زَمْعَاط يَاقُوتِي



زَمْعَاط الشَّوْكَر

١٦٦٩٣ - زُمْكَه في الزراع ، راجع .

١٦٦٩٤ - زُمْكَه ، زُمْكِي ، قُظْن ، Croupion (F).  
Parson's nose (E).  
منبت ذنب الباطر .

١٦٦٩٥ - زُمْكِيَّات Haloragae, Cercodiales (S).  
Haloragées, Cercodiales (F). Haloragae, Cercodiales (E).  
فصيلة نباتية من بدايات الباقع ، ذوات القلتين ، مستقلة القامات ، ملتصحات الجص : اجتماع ثمانية



زهر ، زيمير

اما انواعها فنحو ١٠٠ نباتاتها اشباب وينيات بعضها مثقبي وصال . ازهارها غشوية صغيرة القذ غطسلة الالوان .

١٦٦٩٦ - زُمْكَه Dessalage, Dessalage (F).  
Removal of salt (E).  
الزلمة ازالة الملوحة من الماء .

١٦٦٩٧ - زُمْكُلُوم Exobasidium  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الزولويات يتطفل على بعض النباتات الزينية فيؤذيها بعد ان يجهد اوراقها ويلوي غشيبها || اشهر انواعها واغرضها الزوليل الياباني .



زهر مجري

١٦٦٩٨ - زُمْكُلُوم ياباني Exobasidium japonicum, E. azaleae (S). Fausse-croque de l'azalée, Gallie foliaires de l'azalée (F).  
Azalea galls (E). Ohrtappchenkrankheit der azaleen (D).  
فطر مجري يتطفل على الجلسان (ازالية) فيؤذي ويجهت .



زوليل ياباني (١)

مظهره الخارجي يجهت في الاوراق وتشويه في البرام والنواهي التي يملونها القطر حيث تبدو كأنها منطقة باروسة خالية بيضاء اللون تكتنف بعض الورقيات تسحب تقلص الخشب وتحول فيها المواد النشوية الى سكرية . يتكاثر بقطع الانصاف المصابة وينضج النبات بسائل يورده المركز ١٪ او بلسه القواطير الحجرية .

١٦٦٩٩ - زُمْكُلُومِيَّات Exobasidiaceae (S).  
Exobasidiaceae (F). Exobasidiaceae (E).  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة العذبات . اجناسها

وانواعها نحو ٦٠ منها فطور مرضية العمامات تتكون بين الخلايا النباتية هييفا قصيف البنية رنوي الصميم ينشأ تحت الطبقة الادمية . ومنها فطور دويصة العمامات التشمية البسيطة المراثت الخيطية المتفصلة || اشهر اجناسها واغرضها زراعي الزوليل .

١٧٧٠٠ - زُمْسَ Period (F).  
Période (F).  
اسم شامل يقد على الوقت وهو عليه المقام . فالزمن المطلق وهو من اجبات القسمة ، حالة استمرارية لا نهاية لها ولا علاقة لها بالمادة او الحركة || والزمن في العلوم الطبيعية كالفلك مقاس لا تعداد وجبدي لا علاقة له بالمكان || والزمن النسبي الذي يقاس بظاهرة طبيعية معينة كدوران الارض حول الشمس يدعى الزمن الشمسي || والزمن الحسلي هو الحقبة التي مروت بها الارض في تكونها .



زوليل ياباني (٢)

١٧٧٠١ - زُمْسَكة Fonte de neige (F).  
Melting (E).  
الزهملة سيلان الثلج بعد ذوبانه .

الخارجي بقع صغيرة مستديرة حطية اللون مراد الحمار يملونها خل لفي تركيب الاوراق تفسدها وقد تصيب المشائل تفسدها .

١٧٨٤ - زُمْر ، زُمْرِي ، زُمْرِيَّات Gasterosteus aculeatus (S). Epinoche commune (F).  
Stickleback (E).  
سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . صغيرة القذ طولها

من ٣ الى ٥ سم . جسمها عديم القلوس . وعانها ثلاثية . تشبه بالاشكالها الناقلة للثغارة القذ ، ثلاث منها ظهريه وواحدة بطنية .

١٦٦٨٥ - زُمْرِيَّات Spinachia spinachia (S). Epinoche de mer (F).  
Pride-back (E).  
سمكة بحرية من فصيلة الزيريات . اصالتها بعض مناطق

الحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . تألفت معاشب المهاج والشتاف . الاثني عند التراب زين القشرة ، من نوسان الى حزيان ، تسجل مع الذكر عشاً من اثث تحبكه بين النباتات البحرية وتلتصق بمادة غروية قفريزا الكلي . الذكر يحرس على السر ولا يغادر الش إلا بعد التلح || جسمها صغير القذ ، نحيل الجرم ، بطول من ١٣ الى ٢٠ سم . غطها مثل الاسطاة . فها سنن للكلين . جسمها عديم السيف باستثناء الجانبين المجهزين بنسور ، ٤ صفوف . زعنفتها الظهرية خلفية الاوتكار يستيقها صف من المناس يد من ١٣ الى ١٥ . زعانها المحورية صغيرة متضخمة الشكل || غطها متوط الصف غير مرطوب فيه .

١٦٦٨٦ - زُمْرُوكَة ، فِسْكة Groupe (F).  
Group, Clump (E).  
مجموعة نباتية تنصف بذات الاشكال الخارجية او تتحل ببعض الصفات الجنبية المقررة .

١٦٦٨٧ - زُمْرُود Emeraude (F). Emerald (E).  
نوع من الزيريد وهو حبير بلوري كريم لونه يراوح من الاغصير الى الازرق . غرو به عديدة الصغرا اقلها ازرقة واشدها لمعة .

١٦٦٨٨ - زُمْرُومُوكَة في المروسة ، اطليا .

١٦٦٨٩ - زُمْرِيَّات ، زُمْرِيَّات Gasterosteidae (S). Gasterostéidés (F). Gasterosteidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية وهرية من السمطيات الشائكات الزعانف . اجناسها وانواعها ثلثة العدد جميعها دقيقة الاجسام الصغيرة . البحرية منها اكبر قدماً من البحرية .

١٦٦٩٠ - زُمْرُومُوكَة هو الارسيون ، اطليا .  
١٦٦٩١ - زُمْع Guêpe mâle (F). Male wasp (E).  
الزيرور لا ابرة له . وهو الذكر من الزناير .

١٦٦٩٢ - زُمْعة في البرعة بوجه عام . وهي الابنة التي تخرج منها النورة او المنقود الزمري . وهي حنة زائدة وراء القلف ، في كل قائمة زمستان . يقال فرس ولفاء الزرع . وهي ايضا الشجرة اللدانة في مؤخر رجل الشاة .

١٧٧٠٨ - زَيْمَر هو الزر، اطليه .

١٧٧٠٩ - زَيْمَر هو خرطال نوا، اطليه .

١٧٧١٠ - زَيْمَر تَبَوِي هو الخرطال الريان، اطليه .

١٧٧١١ - زَيْمَكَة Fabraea

جنس فلور مجهرية من السقديات وفضيلة الخشاريات يتميز ببدلته الصغيرة الحجم التي تتكون داخل الساق الأديم ثم تنجس نحو الخارج حيث تنقل. بورها ثنائي الخلية. بورقاتها متصالبة شفعية رباعية أشهر أنواعها اللؤبية الثلاثة التالية .

١٧٧١٢ - زَيْمَكَة السَكْرَجَل \* Fabraea maculata, Diplocarpon soraneri, Entomopeziza mespilii, Stigmates mespilii, Entomosporium maculatum (S).

نظر مجهرى يركب أوراق السرفيل ويصيب الثآليل وقد يترى أوراق الاجناس والاكيليا || مظهره الخارجى على أوراق السرفيل، بقع صغيرة شبه مستديرة تطرأ من ٢ الى ٣ سم. تبدو مبرقة على صفة التصلب العليا || تتكاثر نسم كامل النصل. لبها وردي ثم مرجاني ويعتني الى الجفوة المابقة || وهو حصل الاجناس بقع بقات اللون صفرة اللثة مستديرة مبرقة على كامل النصل || اما في الاكيليا فظهر بقعه براوح من ٣ الى ٤ سم. وهي مبرقة الزوايا مبرقة على كامل النصل، تكثر قرب أطرافه || اضراره منوطة برطوبة التربة المرتفعة بالموايل الجوية المواتية || يكافح باستعمال سائل بورودو المخلوط ٨٠٪ على مرتين، المرة الاولى بعد تمام الاوراق واثنائية بعد الاول بثلاثة او اربعة اسابيع .

١٧٧١٣ - زَيْمَكَة التَسْرِين \* Fabraea earliana, Mollisia earliana, Diplocarpon earliana, Marssonina potentillae (S).

نظر مجهرى يركب أوراق التسرين والشيلك فيطلبها . مظهره الخارجى بقع قوزية لا قياسية الشكل ولحمي تظفرها براوح من ٢ الى ٦ سم. تركيب الاوراق كما تنتشر نسم كامل النصل حيث تشل الحركة النسبية . وقد يركب اذن الثآليل فيصيب مقوطلها || يكافح مكاملة للنفطة باستعمال سائل بورودو المخلوط من ٨٠ الى ١٠٪

١٧٧١٤ - زَيْمَكَة الرُودَة \* Fabraea rosae, Diplocarpon rosae, Marssonina rosae, Actinonema rosae (S).

نظر مجهرى يصيب أوراق الرود فيطلبها ويسبب تقوطلها . مظهره الخارجى بقع لا قياسية الشكل ولحمي تقوطل فيها الاستدارة لبها الى الجفوة المابقة تركب النصل على صفحه العليا تضط النسيج بعد الاخلايا وتسبب الاجناس الباك ما يؤول الى رقت النبو وعدم انتظام الدورة الحياتية الحولية || يكافح باستعمال سائل بورودو المخلوط من ٨٠ الى ١٠٪ يضاف اليه الصابون المخلوط ١٠٪ او باستعمال الكبريت الميكروني الممزوج ١٠٪ زروينخا الرصاص بمعدل ٩٠٪ كبريت ١٠٪ زروينخا تسفير على الكبات من السبع الى الثمان مرات .

١٧٧١٥ - زَيْمَكَة ستاكيليدوم \* Stachydidium

جنس فلور مجهرية من السقديات وفضيلة الطحيات . هيفه الكنديه منتصب، منتصب، عايق اللون، يحمل في اطرافه كتلة بسيطة، شائعة، بيضية جشوية التجميع.

١٧٧٠٢ - زَيْمِج \* Cenangium

جنس فلور مجهرية من الزيجيات وفضيلة الخشاريات . سداته ملونة حافتة الجوانب تتكون وتنمو داخل الامة فتسبب انقلاتها . كتاته غصنة، بورها ثنائي التجميع، اعليها الشكل، بسيط التركيب، وسيد الخلية، شفاف اللون او حنطى || له نمطان مؤذيان زيج المحور وزيج الصنوبر .

١٧٧٠٣ - زَيْمِج الحَوْرَة \* Cenangium populeum, Dothichiza populea (S).

نظر مجهرى يصيب المحور في حالة نيطه وقد يمتد مظهره الخارجى بثور حنطية اللون تنشئ اللحاء تلخسه يوشاح الى الصفرة فالبياض . يركب الاوراق في باطن الامر ثم ينتقل منها بمشيج الى الاثان والاضغان والسوق || يكافح بقتل الاضغان المبروة ويتطهر الجروح وينفخ للمثلل يسائل بورودو .

١٧٧٠٤ - زَيْمِج الصَّنَوْبَر \* Cenangium ferruginosum, C. abietis, Dothichiza ferruginosa (S).

نظر مجهرى يركب الصنوبر فيؤذيه وقد يصيب مويه . مظهره الخارجى اجزاع يصيب هدب الصنوبر، حل سد زامه الاول، فيطوح به وينقل بمشيج الى الاثان والاضغان فملها ويذيلها ثم يمت الشجرة به اذ يغضب غصنها بالسورة وبد ان يكسبه بعض الصلابة القاسية العالية .

١٧٧٠٥ - زَيْمِجِيَّات \* Cenangiaceae (F), Cenangiaceae (E).

عزارة فلور مجهرية من فصيلة الخشاريات ورتبة الزقيات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بسداتها القرصية، المبرقة، الخدية، او الصلبة الجسم، القائمة على رتبة لبنة . تكتاها متشابهة مع تكتاها اللشعية . بورها مديد الاشكال غطفت التركيب وبها هو وسيد الخلية في الزيج اذ به شفعي اخلايا مديد في النطر || له جلسان شويران ها الزيج والفر .

١٧٧٠٦ - زَيْمِكَة Epicoccum

جنس فلور مجهرية من عزارة الطحيات وفضيلة الكتيبات . وظيفته شارة . جربه الكنديه كرودية، قسيرة، قاذية اللون. كتاته طرية كروية مابقة السرة . اضراره قليلة الحد والاذى جميعا ربة تيش على حاء الاضغان اليابسة وعلى المواد النباتية للتملة .

١٧٧٠٧ - زَيْمَر، مَرْوَسُ الدَنْشِ Erythrozepiza glitinea (S), Erythrozepiza glitinea, Trombettsiere, Moros (F), Trumpeter bullfinch (E).

طائر من فصيلة الشرشوريات . وهو من الصائير القواطع التي تجرب البلاد في طلب الرزق . سريره براوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ عصفور . اصنافه ثمة من الجزيرة الى افريقية الشرقية والبالية جميعها في اواخر الربيع ويؤيد اليها في اواسط الخريف || طولها نحو ١٣ سم . منقاره غروبي الشكل قصير اللثة . جناحه مستطيل ذلق . ذنبه نازق . ثوبه الى الصبغة الرمادية يطولها مزاج وردي . يتميز بصياحه الحاد الذي يشبه التزير . يألف البحر والجبال ولا يبتعد عن الماء . ينشئ في تجاويف الصنوبر . اثناء تخف من ٤ الى ٥ بيغات . قوته الحشرات والحوام والزور البرية .



زيج المحور



زيفة السرفيل



زيفة التسرين



زيفة الرود



1٧٧٢ - **زَنْكاري، حِرْكَمِي**  
Zoniiforme (F).  
Belt-shaped (E).  
نمت وصفي يملئ كل ما كان شكله كالزئزر أو الخزام.

1٧٧٢٦ - **زَنْكَاط الصَّيْف**  
Byturus aestivus (S).  
Byturus d'été (F). Byturus aestivus (E).  
حشرة وأشعة ثائرة من فصيلة الزنكيات وربة معدلات الاجنحة. موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة من الشرق الأدنى وأروبة. تألف البراري والاحراج البقلة والأودية الغظلية والمناطق الرطبة. خنافسها تعيش على مثل الزئزر وطلعها. يرقاتها تعيش على التراب البرية وأخصها معص المصع || جسمها صغير اللد يظل من ٣ الى ٤ م. ثوربا الى السرة الصهباء يملؤها خل سحلي. رأسها مستد الجرم. عينها صغيرتان بارزتان. زباناها صولجانية حقيقان. ظهورها قليل الإحدايدب مستدير المخضر اللامع. غلافها كثيفتا الخمل والزيب. أرواغها خماسية الخمل، حجة الخال || لها جيل واحد في الخيل. تظهر الحشرة الجملدة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز. تسرح في التراب وتبيت في الليل || البرية بطيئة النمو تطول مدة الادراك التام نحو ٦ م. جسمها مبط الجرم، مستطال المدم والرأس، مستطال المخضر، صفائي الارباب، سحلي اللون، امر الرأس || طول الكمال الذي يسير من ١٢ الى ١٥ يما نم في التربة ويتفشي ضمن صلجة سمكة لشفاء المركب من مواد عضوية ورايب.



نُصَمَة الموز

1٧٧٢٧ - **زَنْكَاطِيَات**  
Byturidae, Tricixidae (S).  
Byturidae, Tricixidae (F). Byturidae, Tricixidae (E).  
فصيلة حشرات وأشعة وثائرة من ربة غمبات الاجنحة || اجنحتها وأزواها قليلة العدد. مهدا يشغل معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة والتمسرة نحو البادية. خنافسها تعيش على مثل الزئزر. يرقاتها تنخر التراب وتطور داهلها || اجنحتها صغيرة اللد، مستطيلة الشكل، خلية التفشار، مستمرة الرؤوس، صولجانية الزبانا المركبة من ١١ فصلة. احادها مستطيلة لاسعة. جرابها مستطلة. أرواغها خماسية الخمل تتميز بصغر البقلة الايل والربابة || اشهر اجناتها الزنكاط.

1٧٧٢٨ - **زَنْكَا، مِحْرَاف**  
Biseca (F).  
Chamfered edge (E).  
اداة تستعمل لسفر في الخشب وليريه.

1٧٧٢٩ - **زَنْكَاة**  
Koeberia (S). Koeberia (F).  
جنس نباتات خشية، برية، مرموعة، حولية او معمرة من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة مدونة منها يتعد من الشرق الاوسط الى بعض اسقاع اروبة || جميعها خشية متوسطة الارتفاع. صفها شيل، مستطيل. ازهارها عتودي منتصب.



زَنْكَاط صَيف

1٧٧٣٠ - **زَنْكَاة**  
Cercospora (S).  
جنس طيور مجهرية من فصيلة الطليحات. تنجز بحرية الكتيبة الدغلية القليلة الفروع. كنانة اسطوانية أو مخروطية الشكل، مدونة الطائر للمرضة || ازواها كثيرة تركب اوراق كنانة. امرضا باقم.

1٧٧٣١ - **زَنْكَاة الدَّرَاقِين**  
Cercospora persica (S).  
طفر مجهرية يركب اوراق الدراق. ظهورها أخايري

انواعه قليلة تركب المواد الخشبية السائرة الى الاغصان ومنها نوع يصيب الموز فيؤذيه.

1٧٧٣٦ - **زَنْجَمَة المَوْز**  
Stachylidium musae, S. theobromae (S). Bout de cigare de la banane, Maladie du bout de cigare (F).  
طفر مجهرية يركب ثمار الموز في اعناقها وتثورها فيحطبا ويثوجها ويؤذيه لبانها بعد ان يقوده الى الاغصان. وقد يمتري ثمار الكاكاو فيحطبا || يكتمل ظهورها الخزان وينشع الموز المحفوظ بسائل شيرلان المحلول ٢٪. 1٧٧٣٧ - **زَنْ**  
Dessèchement (F). Drying up (E).  
هو تجفيف المواد العضوية.

1٧٧٣٨ - **زَنْ**  
Nervule (F). Nervule (E).  
الزئز المنصب اللين الذي يجمع بين الاعصاب الرئيسية في وشن الحشرة. ويؤذيه ايضا زئز ج. زئز وزئلات وزئنان.

1٧٧٣٩ - **زَنْكَاة**  
Algulion caudal (F).  
Zabab al-qarab: اربتها التي تلدج بها.

1٧٧٤٠ - **زَنْكَاطِيك البَشَر**  
Crinoides (F).  
Crinoides (E).  
صف حيوانات بحرية من قسم الشوكيات. ربة وصالته واجنانه واظواه كثيرة العدد. معظمها من متحيرات الاحباب الغابرة. للماصر منها منتشر في جميع بحار العالم اخصها بحار الاتاميل الحارة والمعتدلة الحرارة || اجناتها مركبة من قاعدة وساق وتوزيع وطباب. طليها مستدير الشكل يحمل في نغم الصفعة اقلها الفتر والسر. ثورباها خماسية القواس المستطيلة ومنها خماسية جزء || جميعها في ابلر مهدا، مستقرة || تتحول بعد ذلك الى حيوانات ثابتة في موطنها او منتقلة تسرح حيث نشاء || اشهر فصائلها الماصرة القنطوطيات والمارسات.

1٧٧٤١ - **زَنْكَاة مَكْرَدَة**  
Empicoris vagabunda (S). Empicoris vagabond (F).  
حشرة قاتصة من فصيلة الدرويات وربة مختلفات الاجنحة. جسمها صغير اللد، يظل نحو ٨ م. رأسها صغير الجرم. قصير الخمل، أصفر اللون. خطها مثل الطول. عينها بارزتان. زباناها مستطيلان || ميلقان. كويلها اصفر اللون يملو خططيل طولي ومتفرق امر. يجنبها صغيرة مزوانة سمراء. يلقها وتلورها الى الصغار النش. قائمتها الاماميان مجوزتان تقطن الا ان اللور عادم المتش || تسرح في التراب. تألف الغابات والساكن الريفية. يكثر وجوها قرب المياه القذرة لانها تقطن الحشرات التي تعيش في هذه البيئة.

1٧٧٤٢ - **زَنْكَاةِيَات**  
Didymospora (S).  
Didymosporites (F). Didymosporites (E).  
عارة ظهور مجهرية من فصيلة الطليحات. تتميز ببيوتها النائية الخلية. اجناتها سمكة: الباقوق، البلسولة، البوليتريسيوم، الخمل، الزفانغ، الكردانة والمبارة.

1٧٧٤٣ - **زَنْكَا**  
Tige florale (F). Stem (E).  
عضو نباتي خشبي أو لني أو عشي منصب الاكناز مستطيل يحمل الزئزر.

1٧٧٤٤ - **زَنْكَاة**  
ذباب صغيرة تكون في الحشوش. ج. زئانير (السان).

## ١٧٣٩ - زَيْتَقِ أَحْمَر \* زَيْتَقِ مَرْتَقُون

*Lilium martagon* (S). *lis martagon*, *Martagon* (F). *Martagon-lily*, *Turkish-cap lily* (E). *Martagonlilie*, *Turkenbündel* (D). *Giglio martagone*, *Martagone*, *Turbante* (I).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٣٠ سم. ساقه اسطوانية قوية مغطاة بالاجر. اوراقه اسطوانية النصل ضمية التجميع، كثيرة العروق || ازهاره كروية الرائحة كثيرة العدد تطول من ٣ الى ٨ سم، لونها الى الحمرة البغضوية المابقة يملوها تنميش جزوي. متاكها تبلغ ١٥ م. مظهرها اجر || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

١٧٤٠ - زَيْتَقِ اِفْرِيقِيَّة هو القصر، اسطبل.

## ١٧٤١ - زَيْتَقِ الْاَبْرَاج

هو البرجبة، من الزنابق، اسطبل.

## ١٧٤٢ - زَيْتَقِ الْاَسْتَاَنَةِ زَيْتَقِ خَلْفَقُوْتِه

*Lilium chalcedonicum* (S). *Lis de Constantinople* (F). نوع من الزئبق يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ساقه زهاب. اوراقه كثيرة العدد صنية القند ثلاثية وخامسة العروق. ازهاره عادية الريف قليلة العدد، من ٢ الى ٦، لونها ارجواني تطول من الناحل وقطة حمراء || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

## ١٧٤٣ - زَيْتَقِ الْاَنْد

*Lilium andinum* (S). *Lis des Andes* (F). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ساقه اسطوانية دقيقة. اوراقه خلية تطول من ٣ الى ٦ سم. وتعرض شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره قليلة الريف وألعد تطول من ٨ الى ١٠ سم. لونها الى الصفار المشرب الحمرة. متاكها تبلغ ١٢ م. مظهرها جزوي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

١٧٤٤ - زَيْتَقِ الْبَيْر هو الزبير من الزنابق، اسطبل.

## ١٧٤٥ - زَيْتَقِ الْفَيْرُوْج \* ذَكْن الْحِيْمَة

*Ophiopogon japonicus* (S). *Ophiopogon japonicus*, *Muguet du Japon*, *Herbe aux turquoises* (F). *Japanese snake's beard* (E). *japanische schlangensbart* (D). *Erbe della turchine* (I). نوع من ذقن الحية الزئبقية. اوراقه تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. نصلها جميل الخضر تقطعه خطوط بيض وسفر. شراعه الزري يملو من ٥ الى ١٠ سم. ازهاره صنية القند ليلكية اللون تطول نحو ٧ م. || ازهاره يستمر طوال شهر حزيران. تمامه صنية الشكل فيروزية اللون يتوم من تموز الى كانون.

## ١٧٤٦ - زَيْتَقِ الْهَنَار

اسطبل لشكة.

## ١٧٤٧ - زَيْتَقِ الْوَادِي

هي اللقمة من الزنابق، اسطبل.

## ١٧٤٨ - زَيْتَقِ الْبَانَان

*Lilium japonicum* (S). *Lis du Japon* (F). *Japanese lily* (E). نوع من الزئبق يملو من ٣٠ الى ٩٠ سم. ساقه خلية اسطوانية. اوراقه متعاقبة تطول من ٧ الى ١٥ سم. وتعرض نحو ٢ عروق ثلاثة او خمسة || ازهاره صنية

يقع سر تلو النصل على سفحه العليا يقابلها حل الصنعة السفلى يقع خلية ربادية اللون || ازهاره زهيدة قليلة الاذى لا تتسبب للكثافة.

## ١٧٣٧ - زينة القطن \*

*Cercospora gossypii* (S).

فطر مجهرى يركب اوراق القطن، مظهره الخارجي يقع لاقياسه الشكل والحجم توهم النصل على سفحه العليا || ازهاره زهيدة لا تتسبب العتاية.

## ١٧٣٨ - زينة شالكة \*

*Cercospora herpotrichoides* (S). *Champignon X* (F).

فطر مجهرى يقال ان اتحاده مع الصمغ يوقع اشد الاذى في بعض الزروع منها الحنطة والشبر || مظهره الخارجي يقع لاقياسه تكثر فيها الاسطحات تركب اتحاد الصمغ ثم مقده السلاحيات فتؤدي الازراق والسوق وقد تظلم الزروع وتلاوي || يكافح مكافئة الصمغ.

## ١٧٣٤ - زَيْتَان

هو الصيد من الذباب الساع، اسطبل.

## ١٧٣٥ - زَيْتَان

*Minioptaris* (S). *Minioptaris* (F). جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات. انواعه قليلة العدد. رؤوسها مخروطية، فرائسها مقلوبة. آذانها متعقبة القند منفصلة. السنتها واجنبها مستطيلة. اجسامها ريشية طويلا يراوح من ١٠٠ الى ١٢٠ م. يستطاع من ٣٢٠ الى ٤٠٠ م. ولذاتها من ٥٠ الى ٦٠ م. انواها بين الكهبة والسمة || موطنها الشرق الاوسط واروبة الجنوبية واوربية الشرقية والشمالية || طيراتها خفيفت سرع وشبه طيران الخفاف. تعيش ازواجا او جماعات قليلة العدد. تألف المخارير والكهوف واوقاب الصغور والبيوت الخفية. قوتها الحشرات والحوم.

## ١٧٣٦ - زَيْتَان

الزنابق: بقلة حارة حريفة مصممة. من ابي حنيفة.

## ١٧٣٧ - زَيْتَقِ

*Lilium* (S). *Lis* (F). *Lily* (E). *Lilie* (D). *Giglio* (I).

جنس نباتات عشبية بصلية من فصيلة الزئبقيات. سوقها صنية مستقيمة موقرة. اوراقها القرصية والسوقية رمية النصل مستطيلة. ازهارها هامي الازنكار حقيقي التجميع. ازهارها كثيرة الحجم، جميلة الشكل، فواصة العرق، متعددة الالوان || اصرف انواعه واشهرها ما يتبع.

## ١٧٣٨ - زَيْتَقِ اَبْيَض \* اَزَاذ

*Lilium candidum* (S). *Lis candida*, *Lis blanc*, *Béton de St Joseph* (F). *White lily*, *Bourbon-lily*, *Madonna-lily* (E). *Weisse lillie*, *Marienlilie* (D). *Giglio bianco*, *G. della madona* (I).

ويعرف باسم زئبق مار يوسف. نوع من الزئبق يملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. ساقه قوية جامدة. اوراقه عديدة متعاقبة تطول من ١٠ الى ١٩ سم. || ازهاره عديدة، فواصة العرق، تطول من ٥ الى ٨ سم. لونها الى الالبيض يملو تيش احمر وورقة قرمزية. متاكها تبلغ ١٢ م. مظهرها اصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.



زينة شالكة



زئبق ابيض



زئبق احمر



زئبق الفيروزج

الشكل كثيرة طول من ٦ إلى ١٢ سم. وتقرض من ١٢ إلى ٢٥ سم. || أنهارها طرية ، قليلة البدن ، مختلفة الألوان يكثر فيها الأصفر والبرتقالي والوردي والاريجاني || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٢٧٥٧ - زَيْتُونِي زَنْجَبِيلِي

هو الفتحولي نبات جميل الزهر ، اطله .



زيتون امر

١٢٧٥٨ - زَيْتُونِي صِينِي \*  
Lilium sinicum (S).  
Lis de Chine (F). Chinese lily (E).

نوع من الزئبق يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساقه اسطوانية الشكل ، حراء اللون ، زباد . أوراقه كثيرة البدن طول من ٥ إلى ١٠ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٢ سم. || أنهارها حادة البرق قليلة البدن لونها الى الصفار الكبريتي يملو تنديش لمود . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها عايق الصفار || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٩ - زَيْتُونِي طَرْكَلِيْسِي هو الزئبق ، اطله .



زيتون بيري

١٢٧٦٠ - زَيْتُونِي طَوِيل الزَّهَر \*  
Lilium longiflorum (S). Lis à longues fleurs (F).  
White trumpet-lily (E). Königsllie (D). Giglio lungo (I).

نوع من الزئبق يملو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه اسطوانية قوية . أوراقه متعاقبة طول من ٧ إلى ١٤ سم. وتقرض من ٨ إلى ١٥ سم. أنهارها طرية البرق طويل من ١٢ إلى ١٨ سم. لونها الى البياض اللطيف . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها أصفر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٢٧٦١ - زَيْتُونِي عَشَكِيَّي

هي الخلزة من الزنجبيلات ، اطله .



زيتون صيني

١٢٧٦٢ - زَيْتُونِي خَمِي  
Lilium speciosum (S).  
Lis brilliant (F).

نوع من الزئبق يملو من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه حادة متعاقبة طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. وتقرض من ٤ إلى ١٢ سم. || أنهارها طرية كثيرة البدن طول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض المشع بالاحمر الخمر . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى ايلول .

### ١٢٧٦٣ - زَيْتُونِي قَلْبِيَّي الزُّوْقِي

Lilium cordifolium (S). Lis cordé, L. cordiforme (F).  
نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلسية . يملو من ٩٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه مدعنة مستعرضة قليلة الشكل نصلها جميل الخضار الزاوي تملو ماجة قرمزية || أنهارها بقية الشكل ، عقوبية التجميع طول من ١٠ إلى ١٦ سم. لونها الى البياض الاخير تملو نمشة قرمزية من القاعل ونضراء من الخارج . متاكها تبلغ ٢ سم. طلها آخر . أنهارها يديم طول شهر تموز .



زيتون طويل الزهر

١٢٧٦٤ - زَيْتُونِي كَرُولِيَّة  
Lilium carolinianum (S). Lis de la Caroline (F).

نوع من الزئبق يربط في الازرية الرطبة . يملو من ٦٠ إلى ٩٠ سم. أوراقه اسطوانية الشكل نصلها مالمس البشرة عايق الخضار || حدد أنهارها يراوح من ١ إلى ٢٣ ، لونها الى الصفار البرتقالي || أنهارها صيفي .

العرف ، اقية الازنكار طول من ١٠ إلى ١٨ سم. ياطلها ابيض ، ظاهرا ودي . متاكها طول نحو ٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

### ١٢٧٤٩ - زَيْتُونِي أَنْمَر \* ، زَيْتُونِي هَرْطَقْ

Lilium pardalinum (S). Lis panthère (F). Leopard-lily (E). Tigerlily (D). Giglio pardo (I).

نوع من الزئبق يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . أوراقه عديدة طول من ١٠ إلى ١٨ سم. وتقرض من ٢٥ إلى ٥٠ سم. || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق طول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الزاوي تملو رقطة قرمزية كركشة الثمر . اسديتها مستطيلة . متاكها تبلغ ٢٠ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥٠ - زَيْتُونِي بَنْيَرِي \*  
Lilium tigrinum (S).  
Lis tigré (F). Striped-lily (E).

نوع من الزئبق يملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. ساقه جهورية اقون زباد الحاء . أوراقه متعاقبة متباعدة ، خاسية او سباحية البرق . طول من ٧ إلى ١٥ سم. وتقرض من ٦ إلى ١٥ سم. || أنهارها حادة الرائحة كثيرة البدن طول من ٥ إلى ١٠ سم. لونها الى البرتقالي الباهي يملو تخطيط جهوري اسفح المراج || أنهارها يستمر من تموز إلى آب .

١٢٧٥١ - زَيْتُونِي بَرَوْنِي  
Lilium browni (S).  
Lis de Brown (F).

نوع من الزئبق يملو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه قوية جامدة . أوراقه متعاقبة طول من ١٢ إلى ١٧ سم. نصلها عايق الخضار يملو موج آخر || أنهارها عديدة متدلية طول من ٨ إلى ١٢ سم. لونها الى البياض اللطيف تملو رقطة خطية الاطار بنفسية المحور . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها جهوري || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٢ - زَيْتُونِي بَرْتُقَلِيَّي  
Lilium croceum (S).  
Lis orangé, Lis safrané (F).

نوع من الزئبق ينشئ الازرية الكلسية . يملو من ٥٠ إلى ١٢٥ سم. ساقه ضعدة زباد . أوراقه متعاقبة مستطيلة . أنهارها حادة البرق كثيرة البدن طول من ٧ إلى ١٢ سم. لونها الى الصفار البرتقالي . متاكها تبلغ ١٢ سم. طلها آخر || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٢٧٥٣ - زَيْتُونِي بَرْوَنِي

هو البرجية من الزئبقيات ، اطله .

١٢٧٥٤ - زَيْتُونِي بَهْمِيَّي  
Lilium superbum (S).  
Lis superbe (F).

نوع من الزئبق يربط في المايق الرطبة . يملو من ٩٠ إلى ١٨٠ سم. ساقه قوية جامدة . أوراقه سنائية التصل ، مدنية || أنهارها كثيرة البدن حادة البرق لونها الى البرتقالي تملو نمشة جهورية || أنهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٢٧٥٥ - زَيْتُونِي خَلْعَدُوْهُ هو زئبق الاسنانة ، اطله .

١٢٧٥٦ - زَيْتُونِي رَشِيْقِي  
Lilium elegans (S).  
Lis élégant, L. de Thunberg (F).

نوع من الزئبق ضرابه كثيرة البدن تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها مستدلة الشانة نمدة . أوراقها اسطوانية

Liliaceae (S).

١٧٧٧٣ - زَيْبُونِيَّات

Liliacées (F). Liliaceae (E).

نفسيلة نباتية من وحدات الشفلة اجناسها وانواعها كثيرة  
المند منها الزنبق والبصل والثوم والجلينج الخ .

١٧٧٧٤ - زَيْبُونِيَّة هي السحاح ، اطبله .

١٧٧٧٥ - زَيْبُول ، زَيْبُول

Pénis des insectes (F). Penis of insects (E).

الزنبيل قضيب ذكر الحشرات على اختلاف فصائلها .

١٧٧٧٦ - زَيْبُول هو الزنبق ، اطبله .

١٧٧٧٧ - زَيْبُور

الزيبور : شجرة عطرية في طول الدالية ولا عرض لها .  
وطيها مثل ورق الجوز في منظره وريحه . وطا نور  
مثل نور المشر ابيض مشرب وطا حل مثل الزيتون سواء .  
فاذا نضج اشتد سواده وسلا جدا يأكله الناس كالزبيب  
وطا عصمة كعصمة البنداب وهي تصبغ اللحم كا يصبه  
الفرصاد . تدرس غرسا . واحداها زنبورة وزنبارة  
وزنبورة (السان) .

١٧٧٧٨ - زَيْبُور Vespas (S). Guêpe (F). Wasp (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيبوريات . انواعها عديدة  
جميعها جارية ، باذلة ومفترسة . اعرافها واشهرها  
ما يتبع .

١٧٧٧٩ - زَيْبُور جرمانِي Vespas germanica (S). \*

Guêpe germanique (F). German wasp (E). Deutsche waspe (D).

نوع من الزيبور الواسع الانتشار . ذكره يطول من ١٣  
الى ١٥ سم . انتاه من ١٦ الى ٢٠ وعاملته من ٩ الى  
١٤ سم . يقيم عشاه في التربة ، يبنيه بالواد الخشبية  
المتحللة التي تبو كالورق ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون  
الى ١٠٠٠٠٠ زيبور . قوته البار والقوم وما يقتنصه  
من حشرات .

١٧٧٨٠ - زَيْبُور شائع \* ، زَيْبُور عادي

Vaspas vulgaris (S). Guêpe commune (F). Common wasp (E). Gemeine waspe (D).

نوع من الزيبور البائد ، الجارس ، الصغير القد ، الصم  
الانتشار ذكره يطول من ١٤ الى ١٥ سم . انتاه من  
١٦ الى ٢٠ وعاملته من ١٥ الى ١٥ سم . يقيم عشاه  
في التربة ويمل الاشجار والحيطان ويبنيه بالواد الخشبية  
المتحللة . ثوله يد اقل من مئة . لسته مظلة .

١٧٧٨١ - زَيْبُور شرقي Vaspas orientalis (S).

Guêpe orientale (F).

ويعد الزيبور الاجر . نوع من الزيبور الشائع في  
الشرق الاوسط . ذكره يطول من ٢٠ الى ٢٤ سم . انتاه  
من ٢٥ الى ٢٢ وعاملته من ١٦ الى ٢٠ . ثوله الى  
الحشرة الصفراء . رأسه وبشرته اشد سمة من بطة . اجسته  
نارية . يقيم عشاه في اي مكان كان . وهو مفترس ،  
بادن وجارس ، يقتنص النحل ويقرض البار السكرية  
عند ادراكها اخنها المنب والتين والبسر .

١٧٧٨٢ - زَيْبُور صغير \* ، دَبَر ، زَرْقَطَة ،

نَسْجَة

Pollistes gallicus (S).

Polliste, Guêpe française (F).

نوع من الزيبور الصغير القد . ذكره يطول من ١٢ الى

١٧٧٨٥ - زَيْبُونِيَّات Liliun canadense (S).

Lis du Canada (F). Canadian lily (E).

نوع من الزنبق يربف في الاربة المتوسطة الانسلاج  
والرطوبة . يطو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . ساقه قوية .  
اوراقه قليلة المند نصلها جامد التسنج ، خلي الصفحة  
السفل ، خامي او سباعي المروق . يطول من ٧ الى  
١٠ سم . ويبرض من ١٥ الى ٢٠ سم . انتاه  
متدلية قليلة المروق . لونها الى الوردي تملو مشة  
قمرية . متناكها تطول نحو ١٥ سم . ظلمها اجر .  
انزهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٧٧٨٦ - زَيْبُونِيَّات Liliun auratum (S).

Lis doré du Japon (F).

نوع من الزنبق يطو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية  
اوراقه متدلية متجاذبة تطول من ١٥ الى  
٢٢ سم . وتبرض من ٢ الى ٣ سم . انتاه حطرية  
المروق كثيرة المند تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . لونها ابيض  
البياض اللامعي يملو من الداخل تنسج ارجواني  
ويطو شارط ذهبي اللون يقيم البتلة الى تسين . متناكها  
تبلغ ٢ سم . ظلمها اجر ١١ شروبه وماله عديده  
تختلف بالوانها التي يكثر فيها او يقل الاصفر اللامعي .  
انزهاره يستمر طوال الصيف .

١٧٧٨٧ - زَيْبُونِيَّات مرْتَعُون

ويكتب مرتاعون . هو الزنبق الاجر ، اطبله .

١٧٧٨٨ - زَيْبُونِيَّات مرْتَعُون هو الزنبق الاجر ، اطبله .

١٧٧٨٩ - زَيْبُونِيَّات ملكِي Liliun regale (S).

Lis royal (F).

نوع من الزنبق يملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقه حليية  
الماء عادمة الاوراق حتى اقزام الثاني ١١ انزهار حطرية  
كثيرة المند تطول نحو ١٥ سم . ظاهرها ابيض اللون  
يملو توشج وردي . باطنها الى الصفار الذهبي يملو  
مواج اسفل . متناكها تبلغ ١٥ سم . ظلمها ذهبي اللون .  
انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٩٠ - زَيْبُونِيَّات هنْري Liliun henryi (S).

Lis de Henry (F).

نوع من الزنبق يملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقه قوية  
زياه . اوراقه متددة تطول نحو ١٥ سم . وتبرض نحو ٣  
مرقوا عديده نصلها خلي الصفحة السفل ١١ انزهار  
عديده تطول من ٦ الى ٩ سم . لونها الى البرتقالي تملو  
نخسة سواده . متناكها تبلغ ٨ سم . ظلمها اصفر . انزهاره  
يستمر من آب الى ايلول .

١٧٧٩١ - زَيْبُونِيَّات واشْتَنْز Liliun washingtonianum (S).

Lis de Washington (F).

نوع من الزنبق يملو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . ساقه قوية  
جامدة . اوراقه السفل خسية التسنج . سداسية المند  
او اكثر . اما البتلة فتتدلية ١١ انزهار حطرية كثيرة  
المند تطول من ٤ الى ٨ سم . لونها الى البياض الموشج  
بالقرمزي . متناكها تبلغ ١٢ سم . ظلمها اصفر .  
شروبه عديده منها الوردي والابيض والقرمزي اللاميق .  
انزهاره يستمر من تموز الى آب .

١٧٧٩٢ - زَيْبُونِيَّات Liliun (F). Liliid (E).

نمت وصفي يطلق على ما هو شبيه بالزنبق كفوك يياش  
زيتي .



زيبور جرمانِي



زيبور شائع



زيبور صغير



زيبور كبير



زينة البطاطا



زُنة النِّل



زُنة الزُّرَيْتُون



زُنة الشَّوْطَر



زُنة الصُّرْبَا



زُنة القَرْنَل

مظهره الخارجي يقع بيضية الشكل مبشرة أو كثيفة التجميع ، قطرها يراوح من ٦ الى ١٠ م. لونها زيتوني ، عموماً أبيض ، اطرافها اسمر ، تركب النصل فتؤويه وتغيب الآثار وتضيقها ٥ يتكافح باستمال سائل يورود او بعض الفواطير المرتكزة على المركبات السبائية .

#### ١٢٧٩١ - زُنة الجُنْجُل ٥

*Cercospora cantuariensis* (S).

نظر مجهرى يتطفل على لوراك الجنبل ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة بمادة اللون ، جوية الاطراف تركب النصل على صفحتي العليا يقابلها على السفلى يقع خلية، حنطية، زائجة الموضع ٥ انحرافه زائجة لا تستوجب المكافحة .

#### ١٢٧٩٢ - زُنة الزُّرَيْتُون ٥

*Cercospora didasporioides* (S).

نظر مجهرى يتطفل على لوراك الزرّتون ٥ مظهره الخارجي يقع فسيحة مهمة الحديد مظهره اللون ، يسهل بالمحاج تسبب ذيل الاوراق واجعلها .

#### ١٢٧٩٣ - زُنة الشَّوْطَر ٥

*Cercospora beticola* (S). *Cercosporiose de la betterave* (F). *Leaf spot of beet* (E).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق الشوْطَر في المناطق الرطبة . مظهره الخارجي يقع كثيرة البعد ، لا يقاسية الشكل والحجم ، مبشرة على صفحة النصل ، لونها الى البصرة يطوقها حصار اخر . تقضي على البصرة فتطرحها ثم تمتطعها ويشتاق خيل التركيب فني اللون يسير بها الى البطل . انحرافه قد تكون باهقة لانه يؤثر على نسبة المواد السكرية . يتكافح باستمال اكيلكودور للنحاس عيار ٥٠٪ على الشكل الآتي :

١٣ جزوا اكيلكودور للنحاس .

١٢ جزوا دقيل .

٧٥ جزوا تلك .

يستعمل تغنياً على النبات بمعدل ٤ كلو لغم الواحد .

١٢٧٩٤ - زُنة الصُّوْبَا ٥ ٥ زُنة دِيَاو ٥

*Cercospora ditau* (S).

نظر مجهرى يركب اوراق الصرْبَا فيطبعها ويؤذي النبات . مظهره الخارجي يقع صغرية كثيرة البعد. لونها الى الجورة تركب النصل فتؤويه نحو ربع مساحت ٥ يتكافح بظهير اليادر ويستمال احد الفواطير الحديثة المرتكزة على المركبات السبائية .

#### ١٢٧٩٥ - زُنة القَرْنَل ٥

*Cercospora fabae, C. personata* (S).

نظر مجهرى يتطفل على سوق واوراق القَرْنَل ٥ مظهره الخارجي يقع لا يقاسية الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ٧ م. تركب الاوراق والسوق. لونها الى البصرة تقضي على الاوراق وتبديل النبات ٥ يتكافح بظهير اليادر بمحلول القودولين وينفض نباتات الموصية بسائل يورود المخلو من ١- الى ١٠٪ .

١٢٧٩٦ - زُنة القَرْنِيَّات ٥

نظر مجهرى يتطفل على لوراك سوق بعض القرنيّات اغصانها الفضة واللؤلؤ والحشوقة ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل ، لونها الى البصرة لموجها حالات متناوبة صفر الحمار تطرح بالنجح الحشوقة وتضي الى النبات وتؤذي .

١٦ م. انتاه من ١٥ الى ١٧ وحاملته من ١٠ الى ١٤ . ثوبه اسود اللون يطوق تبيج اصفر . حشاه صغر القند ، قمرى الشكل ، يقبسه على الجنيات والاشجار البقلة يركزه على دهامة رسيدة قصيرة . قوله لا يمد اكثر من ٥٠ م. قوة الال السكرية والديندان وبعض الحشرات والسلم .

#### ١٢٧٩٣ - زُنيُور كَبِير ٥ دِيُور

*Vespa crabro* (S). *Frelon, Guêpe frelon* (F). *Hornet* (E).

نوع من الزُّيُور ، كبير القند واسع الانتشار . ذكره يطول من ٢١ الى ٢٧ م. انتاه من ٢٦ الى ٥٥ وحاملته من ٢٥ م. رأسه اصهب اللون . جوشته الى السواد الموضع بالسرعة . زبانه واربعه حر . حشاه لاصق قمرى يقبسه في اي مكان كان . ثوبه لا يقاسي البعد لكنه لا يقل عن ٥٠ م. ولا يفوق ١٠٠ م. وهو من الزناوير البقعة الغمرسة البائدة الجارسة يسلح الانسان ان حشايه ولسانه مؤلمة مؤذية .

#### ١٢٧٩٤ - زُنيُورِيَّات ٥

*Vespidæ* (S). *Vespidæ* (F). *Vespen, Faltenwespen, Papierwespen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحسرة . اجناسها وانواعها عديدة مظهرها من الحشرات الاشرائية النظام الجامعي البعشي . فيها الذكر والانيث وبالمادة الخشبي . تبي اعشاشها من الاوراق والالياف الخشبية المصروفة فتقبسها في التربة وعلى الحيطان وبين ثخايل الصنوبر وفي تجاريف الاشجار وطبها ٥ جميعها مفترسة بائدة وجارية .

#### ١٢٧٩٥ - زُنيُورِيَّات ٥

هو ليسون اضاليا ، اطليه .

#### ١٢٧٩٦ - زُنيُورِيَّات ٥

جلس نباتات طيبة ممرمة من فصيلة الساجيات انواعه عديدة منها الاشجار والشجيرات والشتلات منهاها المناطق الحارة والاشترائية ، اوراقها منفقة متقابلة طيبة او رحيمة للنصل . انحرافها علفية التجميع ناجية . جنودها طيبة مقوية .

#### ١٢٧٩٧ - زُنة ٥

صفة اثرهارة المروية قليلا .

#### ١٢٧٩٨ - زُنة ٥

جلس فطور مجهرية من الريذانيات وفصيلة الفطريات . جريبه الكنديية مستطيلة الشكل ، سمراء اللون ، فسيحة الانتشار ، قوسية الارتكاز . كذلكه مستطيلة قاعدية او جانبية الانتشار ، مفرقة كثيرة الاقسام التجميعية البعد ٥ انواعه عديدة ، اعرفها واشهرها ما يتبع .

#### ١٢٧٩٩ - زُنة البطاطا ٥

*Cercospora concors* (S). *Cercosporiose de la pomme de terre* (F). *Leaf spot of potato* (E).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البطاطا ٥ مظهره الخارجي يقع مستديرة قطرها نحو ٤ م. لونها الى البصرة تملوها نقط سود تركب الاوراق على صفحتيها فتؤذيها وتؤيق بالانتاج حشاش يراوح قدرها من ٢ الى ٢٥ ٪ . يتكافح باستمال الفواطير المؤتلفة على الكابريت والنحاس .

#### ١٢٧٩٠ - زُنة البُن ٥

*Malade des yeux bruns du caféier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على اوراق البُن فيؤذيها ويشوه الثمار .

تراكيب بعض التوابل والمستحضرات الصحية الشرقية . ويستخرج منها شرابات شائعة الاستعمال .

١٧٨٠٧ - زَنْجَبِيل مِيْوْهَا \*  
Zingiber mioga (S).  
Gingembre mioga (F).

نوع من الزنجبيل يُزرع في تايوان . يملو نحو ١٠٠ سم . أزهاره سنائية كبيرة القد . سبلته الزهرية كثيفة التجميع . أزهاره بيضاء شريطها صفر || مهدد الإلحاح وهو من النباتات البرية التي تعيش وتجدد في كل تربة وموقع ومكان .

١٧٨٠٨ - زَنْجَبِيلِيَّات \*  
Zingiberaceae (S).  
Zingibéracées (F). Zingiberaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقة الواحدة || اجناسها وأنواعها عديدة جميعها جدمورية مهددة المناطق الاسيوية الحارة || أشهرها الزنجبيل والخلنجان والكرشم والحال والقرنباذ .

١٧٨٠٩ - زَنْجُفَر \* هو الزريقون ، اطليه .

١٧٨١٠ - زَنْجُجُور \* ، سَمَك الكَرَاكِي  
Esoc (S). Esocae, Brochet (F). Pike (E).

جنس اسماك نهري من فصيلة الزنجوريات . أنواعه هـ جميعها نهمة . مسطيلة الشكل ، واسعة الفخذ ، دقيقة الخطم المفطح ، حادة الاسنان القوية . طولها يراوح من ٥٥ الى ١٠٠ سم . وزنها من ٥ الى ٢٥ كيلو . اكلها الى الريدة الرصاصية تنطبق مع اقاربها من تيج الطهر . جوارثها مجزأة بالايض . يطولها الى الصحة . لحها حادي او دون الوسط .

١٧٨١١ - زَنْجُجُورِيَّات \*  
Esocidae (S).  
Esocidae (F). Esocidae (E).

فصيلة اسماك نهري من مفتوحات الفمات . اجناسها وأنواعها عديدة معظمها من اسماك المناطق الباردة . جميعها نهمة مسطيلة الاجسام ، مفلطحة الرؤوس والاسنم ، قوية الاسنان الحادة || أشهر اجناسها الزنجبور .

١٧٨١٢ - زَنْدَل

زندت البقرة والثانة زندا : اخبرجت رحها عند الولادة .

١٧٨١٣ - زَنْدَكَة ، زَنْدَكَة \*  
Rachis (F). Stalk (E).

محور السبله والحزيرة والساق والارواق المركبة وغيرها .

١٧٨١٤ - زَنْدَل الْعَبْد \* هو الكارلين الشائع ، اطليه .

١٧٨١٥ - زَنْدَل بَيْسَل \* ، زَنْدَل لَيْل \*  
Elephant (grand) (F). Elephant (great) (E).

الفيل الكبير الجنت .

١٧٨١٦ - زَنْدَلَد \*  
Cistudo (S). Cistude (F).

جنس حيوانات زحافة مفترسة من السلاحيه وبفصيلة الحشرات . تعيش في المياه العذبة . تألف البعيريات والانهير والمناقم || تتميز بان حافة ذيلها لا تحكم أطواق حل الجسم . قوتها الحشرات والرخويات والاسماك الصغيرة والصغار || لها ثومان فقط الزندل الاودع وزندل المرم .

١٧٨١٧ - زَنْدَل أَرْدَع \*  
Cistudo lutaria (S).  
Cistude boussea (F).

نوع من الزندل . موطنها بيند من الشرق الاقصى الى اوروبا . تألف المناقم وزحافات الانهير والبعيريات || جسمها يطول

١٧٧٩٧ - زَنْدَل الكَرْمَة \*  
Cercospora vitis (S).

فطر مجهري عيم الانتشار يتطفل على اوراق الكرمة . مظهره الخارجي يقع مستديرة حنطية اللون ظاهرا يراوح من ٢ الى ١٠ م . تركيب التصل على صفحته || اغصانه لا تصلى الاوراق ولا تتسحب المكافئة الخاصة .

١٧٧٩٨ - زَنْدَل الْكِشْفِش \*  
Cercospora marginalis (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الكشفش . مظهره الخارجي يقع مستديرة او مقرنة الزوايا ، سمراء اللون ثم رمادية تركب التصل دون ان تؤذي .

١٧٧٩٩ - زَنْدَل الْوَرْد \*  
Cercospora circumscissa (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد والخوخ والذوقن . مظهره الخارجي يقع مستديرة سمراء اللون فتوح بالتسج المتخارة فتسحب يهاها وانحلتها || اغصانه قليلة . ينشط في المناطق الساحلية التي يشهها الضباب .

١٧٨٠٠ - زَنْدَل الْوَرْد \*  
Cercospora rosicola (S).

فطر مجهري يتطفل على اوراق الورد . مظهره الخارجي يقع مستديرة مملحة اللون تركب التصل على احدى صفحته اغصانه لا تصلى التشويه .

١٧٨٠١ - زَنْشُكْرِي \*  
Dysentaria (F). Dysentery (E).

مرض معد يحدث عوارضه فرط الانطلاق البطن . سببه فضيات او تفاحات .

١٧٨٠٢ - زَنْشُكْر ، زَنْشُكْر \*  
Verdet (F).  
Verdigris (E).

اسم شامل يطلق على مختلف اسيتات النحاس الخضراء اللون . محاليله تستعمل في مداواة وسكافنة بعض الامراض الجلدية .

١٧٨٠٣ - زَنْجَبِيل \*  
Zingiber (S).  
Gingembre (F). Ginger (E).

جنس نباتات عشبية جدمورية ممرسة من فصيلة الزنجبيلات . انواعها عديدة منها البرية والعلبية والزراعية . جذاميرها قرنية الشكل مقعده . سوقها مرققة تشبه سوق الكتان . اوراقها حاصصة متناحية سنائية التصل . اذغورها سبلية التجميع حامية الاوتكان يعلوها شراخ لبي التركيب سرقي الاوراق || أشهر أنواعها ما يلي .

١٧٨٠٤ - زَنْجَبِيل الْكَلَاب \* هو لفلل الماء ، اطليه .

١٧٨٠٥ - زَنْجَبِيل شَمِي \* هو الراسن ، اطليه .

١٧٨٠٦ - زَنْجَبِيل مَقْرُونِي \*  
Zingiber officinale, Amomum zingiber (S).  
Gingembre officinal, Amome des Indes (F). Indian ginger, Common ginger (E).  
Gingiber, Ingwer (D).  
Zenzero, Zenzvero, Pepe zenzero (I).

نوع من الزنجبيل يُزرع لاستهلاك الطبي والعصامي . يملو نحو ١٥٠ سم . أزهاره سنائية متاجبة التصل . سبلته الزهرية لينة . اذغاره صغرى يتلائها برتقالية منشفة بالايض || جذاميره صارية العرف ، لاذعة الطعم ، تحوي زيوت طيارة وواد نشوية وغروية مخلفة . وطري مقرية القلب ، مرققة ، تنشط الباه وتقويه . تنبع من الارياح وصر المصم وتمنع للنصر كما أنها تدخل



زَنَّة الكَرْمَة



زَنْجَبِيل عُرْزِي



زَنْجُور



زَنْدَل أَرْدَع

الاشجار الحرجية واعصها السنوبريات || اشهر انواعه  
زَنْيَخَةُ اللاريس .

### ١٧٨٢٨ - زَنْيَخَةُ اللاريس \*

*Dasyscypha wilkomiil. Trichoscypha wil. (S).  
Chancra du noûze, C. du pin sylvestre (F). Cancer  
of larch (E). Lärchenkrebs (D).*

فطر مجهرى يركب افئاد واضبان اللاريس فيعطها  
ويولجها . مظهره الخارجى لطفة ترشية مردية الشكل  
طويلا يراوح من ١ الى ٤٠ سم . تركب القشرة فتصلها  
وتشققها وتؤدي القسم الذي يعلوها فتخلل اوراقه وتفسد .  
وهو يميل ذات الشيء في السنوبر البري || يكافح  
بتفريده الاشجار الكثيفة لان المنفعة ترتكز على النمو  
الذي يحول دون انتشار هذا الفرم .

١٧٨٢٩ - زَنْيَكُهُ هو الرجلة او السويق .

### ١٧٨٣٠ - زَنْيَكُهُ \*

*Puccinistrum*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتميز  
بدهاماته الجولية الوثيرة ، السطيلة ، المغشية القشاة ،  
الشفعية الانقسام ، الثنائية او الرباعية الاشعبة .  
انواعه قليلة وانسارها كذلك ، تنطفل على اهداب التنوب  
ويركب التصل على صفحته السفلى فيسي الى سير النمو  
الطبيعي دون ان يفتقر الى الطب .

### ١٧٨٣١ - زَنْيَكُهُ \*

*Cercosporina*

جنس فطور مجهرية من الربدانيات وفصيلة الطلعيات .  
حرجه الكثيدية سمراء اللون ، اسطوانية الشكل ، قرصية  
الانتساب قوية الانتكاز ، كنانته مستطيلة ، طرفية  
او جانبية الانتساب ، مقوورة ، شفعية الانقسام .  
انواعها عديدة قليلة الاذى معظمها امريكية او صينية  
الهد .

### ١٧٨٣٢ - زَهَادُ \*

*Pernébia (F). Permeable (E).*

ارض زعاد : لا تسيل الا من مطر كثير .

### ١٧٨٣٣ - زَهَارُ \*

*Flauriste (F). Floriz (E).*

من تتامل بسنة الازهار او يهبها .

### ١٧٨٣٤ - زَهْدَمُ \*

*Falco eleonora (S).  
Faucon éléonora (F).*

طائر من الكولج وفصيلة الصقريات . صغير الجثة طوله  
نحو ٣٧ سم . ابر الصدر والرجلين اسمر الطاهر والسفلى  
غنيش الجناح والظل قوته الجناح والرجلين اسمر الطاهر والسفلى  
انواعها . وهو من القواطع محبوب كمال بلاد حوض البحر  
المحيط . يألف مجاري الماء والشلوط البحرية .

### ١٧٨٣٥ - زَهْرُ التَنْجِ \*

شجرة تزيينية تسمى زَرْبُوكُ ، اطلبه .

### ١٧٨٣٦ - زَهْرُ التَرْزِيذِ \*

هو الزرهون ، اطلبه .

### ١٧٨٣٧ - زَهْرُ الْعِصْفَاءِ \*

هو اليبسة ، اطلبه .

### ١٧٨٣٨ - زَهْرُ الْكَبِيرِ

*Flour de soufre (F).  
Flowers of sulphur (E).*

مسوق الكبريت لتمام يستعمل في الزراعة لمكافحة  
بعض الامراض الفطرية اعصها الامداد .

نحو ٣٠ سم . ذبلها يضيي الشكل ، مستطيل الاسطيداب .  
نوعها الى السورة المنقطة والسجبة بالاصفر . رأسها مستطيل  
الجرم . ذبلها قليل الشفاعة ، دقيق الطرف ، يطول نحو  
٥ سم . || لحماها كامن الصف مأكول في بعض بلاد  
اروية .

### ١٧٨١٨ - زَنْدُكٌ مُكْرَمُ \*

*Cistudo dentata (S).  
Cistude dentale (F).*

نوع من الزندل . موطنها بعض مناطق الهند والبلاد المجاورة .  
تألف المنافع والاولاد واليسيرات || جسمها يطول نحو  
٢٧ سم . ذبلها يضيي الشكل ، مستطيل الاسطيداب مخرم  
الحافة . ثوبها الى الخضار الاسمر يطول تنظيط اثير واصفر .  
رأسها مستطيل الجرم . ذبلها منطوط الشفاعة ، مستعرض  
الطرف يضيي نحو ٤ سم . || لحماها كامن الصف ،  
مأكول من بعض القبائل .

### ١٧٨١٩ - زَنْدِيَاَتُ الْعِيُونِ \*

*Podophthalmos (F).  
Podophthalmos (E).*

رئة من الفشريات ليات الصدف تشمل عدة فصائل  
تجسمها ثلاث مراتب : مشقوقات الارجل وبزويجات  
الارجل وعشاريات الارجل .

### ١٧٨٢٠ - زَنْزَرُ لَعْنَتِ \*

هي الاندروخت ، اطلبها .

### ١٧٨٢١ - زَنْزِيلُ \*

*Zannichellia (S).  
Zannichellia (F).*

جنس نباتات عشبية مائية معمرة من فصيلة عرائس الماء .  
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اصلها بعض مناطق البلاد  
المعتدلة الحرارة . تنبت في المنافع وفي اغصان مجاري الماء ||  
اوراقها شفعية ، ثلاثية ، نصلها غرومية الشكل . ازهارها  
محورية الانتساب ، وحيدة الشق || اعرف انواعه الزنزيل  
المشمعي (Z. palustris) .

### ١٧٨٢٢ - زَنْطِينُ وَ زَنْطَرْجِينُ \*

*Xanthéine, Xanthogène (F).*

مادة واثنية مبلولة في سطر الازهار ، لونها الى الصفار  
الاصفر ، لا تبلور ولا تزال مجهولة التركيب .

### ١٧٨٢٣ - زَنْزَلُ \*

هو الخاصمين ، اطلبه .

### ١٧٨٢٤ - زَنْكَمُ \*

هي الافة ، اطلبها .

### ١٧٨٢٥ - زَنْكَمُ \*

الشجرة لا ورق لها كائنها رنة الشاة (البان) .

### ١٧٨٢٦ - زَنْكُوبَا وَ زَنْوِيَا \*

*Zanobia (S).  
Zénobie (F).*

بينة وحيدة الجنس والذعر من فصيلة الحنجيات تسلو  
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقها عروية متتالية يضيي  
الشكل نصلها بلدي السج عايق الخضار || ازهارها  
جلجية الشكل ، بيضاء اللون ، مقربة للآبر الرباعية  
التركيب || ازهارها يثمر من سزيران الى ايلول .

### ١٧٨٢٧ - زَنْكِيَكُهُ \*

*Dasyscypha*

جنس فطور مجهرية من الفصليات وفصيلة الحشاريات  
يتميز بدهامته الصغيرة القرصية المحلية . تكاثره غروية .  
يضع ثنائي التركيب ، مدني الشكل ، شفاه ، يتري



زَنْيَخَةُ اللاريس



زَهْدَمُ

١٢٨٥٩ - زَهْرَةُ السَّمَاءِ الْجَمِيعَةِ راجع جوليانه .

١٢٨٦٠ - زَهْرَةُ الشَّعَاءِ اطلب كيمنيس .

١٢٨٦١ - زَهْرَةُ الشَّمْسِ في اللدائن ، اطلبه .

١٢٨٦٢ - زَهْرَةُ الْعَصَلِ في السلية ، اطلبها .

١٢٨٦٣ - زَهْرَةُ الْعُطَّاسِ في الأرنكة ، اطلبها .

١٢٨٦٤ - زَهْرَةُ الْعِنَقِ في الترانسيلوم .

١٢٨٦٥ - زَهْرَةُ الْعَتَكَبُوتِ في القم ، اطلبه .

١٢٨٦٦ - زَهْرَةُ الْفَيْحِدِ في النجد ، اطلبه .

١٢٨٦٧ - زَهْرَةُ اللَّيْلِ

في النسيكة من الرجبسات ، اطلبها .

١٢٨٦٨ - زَهْرَةُ الرُّجْجَانِ في الكنتية ، اطلبها .

١٢٨٦٩ - زَهْرَةُ الْمُشْتَرَى

في لخيس المشتري ، اطلبه .

١٢٨٧٠ - زَهْرَةُ شَعْرِيَّةِ في القشاة الثعبانية .

١٢٨٧١ - زَهْرَةُ مَكَايُورِ في الابيجة ، اطلبها .

١٢٨٧٢ - زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ في القمر اطلبه .

١٢٨٧٣ - زَهْرِيَّ (F). Floriforme (F).

تمت وصفي يعلق عل ما هو شكله كالزهر .

١٢٨٧٤ - زَهْرِيَّاتُ (S). Helotiscase

(F). Hélotiscase (E).

عمارة فطور مجهرية من فصيلة الحشرات ورتبة

الرقبات . أجناسها وأزواجها عديدة تتميز بسدائها الحسية

القصية أو القرصية الشكل القائمة على رليمة جلدية الرقبت .

بونها تختلف الأشكال والترتيب يكثر فيه الانتظام

الشعبي من الثنائي الى الثلاثي || لها جفان ملوَّبان

الزئبقية واللخن .

١٢٨٧٥ - زُهْمٌ ، زُهْمَةٌ ، مَنَحٌ ، قَتَمٌ ، قَتْمَةٌ ،

نَمَسٌ Rance, Rancissement (F).

Rancid, Rancidity (E).

فساد المواد اللدنية على احتلالها . سببه التأكسد وما يليه

من فعل المرأثم . تتأخذ رائحة قوية مسهجة وطعم

حريف كرهه .

١٢٨٧٦ - زُهْمٌ (F). Animaux non ruminants

(E). No ruminant animals (E).

الزهم ما لا يجتر من الحيوان .

١٢٨٧٧ - زُهَيْرٌ (F). Polyanthe (F).

كثير الأزهار .

١٢٨٧٨ - زُهَيْرَةٌ (F). Fleuron (F).

زهرة صغيرة ابتدائية يتألف منها قرص الرئيس في أزهار

فصيلة المركبات .

١٢٨٧٩ - زُهَيْرَةٌ (F). Florule, Floscule (F).

هي الزهرة الصغيرة . وكل زهرة من الأزهار السبلية تدعى

زغيرة .

١٢٨٣٩ - زَهْرُ الْكَسَائِينِ

هو التيجال نبات عشبي زخيفي ، اطلبه .

١٢٨٤٠ - زَهْرُ الْقَوْلُوثِ هو البليس ، اطلبه .

١٢٨٤١ - زَهْرُ الْمَسِيحِ هو السبع ، اطلبه .

١٢٨٤٢ - زَهْرُ النَّسِيمِ ، زَهْرُ الْحَوَاكِ

هو الأبرتس ، اطلبه .

١٢٨٤٣ - زَهْرُ صَرِيمٍ هو القطرم البنفسجي ، اطلبه .

١٢٨٤٤ - زَهْرَاكُ

الزهراء : البقرة الوحشية . والثور الوحشي : أذهر .

١٢٨٤٥ - زُهْرَكَةٌ ، زَهْرَاكُ (E). Vénus (F).

كوكب سيار ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي . يعتبر

ألم الكواكب المروية . يبعد عن الشمس نحو ١٠٨

ملايين كيلومتر ، وهو بذلك يكون اقرب اليها من الارض .

ظهور من الشرق عند الفجر يعطيه لقب نجمة الصبح .

وظهوره عند الغروب يعطيه لقب نجمة الليل ونجمة الراعي .

سرعة دورته الانتقالية في الفضاء نحو ١٢٤٩٢٠ كيلومتر

بالساعة . دورته المحورية الفلكية حول الشمس تستغرق

٢٢٥ يوماً || للمتحمسون يدعون الزهرة السعد الاصفر لانها

في السعادة دون المشتري وانما فوا اليها الطرب والسرور

والهجر والالفة والشفق .

١٢٨٤٦ - زُهْرَكَةٌ (E). Fleur (F). Flower (E).

الزهرة هي البصير النباتي المختص بالتناسل لحفظ الكيان .

تتشأ الزهرة من برعمة وتتألف من تحت يحوي به سوار

خارجي يعرف بالكأس وسوار داخلي يعرف بالتويج

ينتهي بالبتلة ويصل عند انقلاب قاعدته الداخلية مجموعة

الاسدية التي تتألف الاضواء الذكرية || اما تحت الذي

يضمن الاضواء الانثوية فيشكل المخر حيث المحيط

تتلوه اللقطة المكونة من قلم وبسم .

١٢٨٤٧ - زَهْرَةُ الْأَلَامِ في الآلامية ، اطلبها .

١٢٨٤٨ - زَهْرَةُ الْفَرَسِ في الاندرواس . اطلبه .

١٢٨٤٩ - زَهْرَةُ الْفَالَاوُثِ في ينفج الثالوث ، اطلبه .

١٢٨٥٠ - زَهْرَةُ الْفَلَجِ

في النسيكة من الرجبسات ، اطلبها .

١٢٨٥١ - زَهْرَةُ الْجُرُوبِ في السكايبوزا ، اطلبها .

١٢٨٥٢ - زَهْرَةُ الْجَمَّةِ

اطلب زلف الملوك شجرة زينة جميلة الزهار .

١٢٨٥٣ - زَهْرَةُ الْحَجَّزِ في جوز جتهم ، راجعه .

١٢٨٥٤ - زَهْرَةُ الدَّمِ في انقلاب اللص ، اطلبه .

١٢٨٥٥ - زَهْرَةُ الرَّيِّجِ في الزففة ، اطلبها .

١٢٨٥٦ - زَهْرَةُ الرِّمَالِ في الارناويه ، اطلبها .

١٢٨٥٧ - زَهْرَةُ السَّاعَةِ اطلب الآلية زرقاء .

١٢٨٥٨ - زَهْرَةُ السَّلْحَفَةِ في الحليين نبات زخيفي .





زوان ايطالي

12880 - زُهَيْرِيَّة *Flosculeuse (F).*  
*Floscular, Floscious (E).*  
 هي الزهرة المركبة من عدة زهورات .

12881 - زَوَائِين *Oliveraie, Olivette (F).*  
*Olive-plantation (E).*  
 هي بستان الزيتون او كرم الزيتون .

12882 - زَوَائِف *Reptiles*  
 هي الزحافات ، واسماك .

12883 - زَوَارِ الحَشْد *Asoles (F). Basis (E).*  
 حجارة كساف الاتي الاول من البناء .

12884 - زَوَال *Extinction*  
 هو انقضاء المدة القانونية .

12885 - زَوَال الإلتِزامَات *Extinction des obligations (F). Extinction of obligations (E).*  
 هو انقضاء المدة القانونية بين الدائن والمدين بمقتضى احد الاسباب المخصوص عليها قانوناً وهي : التخلي والبراءة والقسامة والتقدم والفسخ والابدال واتحاد اللثة .

12886 - زَوَال اليَد ، زَوَال الحِيَكَاة *Dépossession (F). Dispossession (E).*  
 هو عدم التصرف باليمن الذي كان وضع اليه بميزه .

12887 - زَوَان ، زَوَان *Lolium (S).*  
*livra (F). Darnel (E).*  
 جنس نباتات عشبية حولية وحمولة وبمررة من فصيلة النجيليات . انواعه عديدة . اوراقها عصبية النصل . ازهارها مشبكية . منها البرية التي تلتب في المروج والحديث ومنها الزراعية المروعة والبخسورية || أشهر انواعه ما يلي .

12888 - زَوَان إِيْطَالِي \* *Lolium italicum (S).*  
*Ray-grass d'Italie (F). Italian darnel, l. ray-grass (E).*  
 نبات عشبي حولي قابل الاستنشاق يزدح في المروج والمراعي والحامير .

12889 - زَوَان حَكَلِي *Lolium arvense (S).*  
*livraie des champs (F).*  
 نوع من الزوان البري ينبت في الحقول والحديث . كثرته مؤذية لانه تقصر بالزروع .

12890 - زَوَان مُسَكِر *12891 - زَوَان مُعَمَّر \* 12892 - زَوَان إِنْكِلِيزِي، نَسِيلَك*  
*Lolium perenne (S). Livraie vivace, Ray-grass anglais, Gazon anglais (F). Ray-grass, Ryegrass, Red darnel, Lawn-grass (E). Raygrass, Dauerholch, Engliches ryegrass (D). Lolio perenne, Lolio vivace, Lajessa (I).*  
 نبات عشبي معمر يمتصوري معمر قابل الاستنشاق زراعت منتشرة في معظم البلاد .

12893 - زَوْبَاع *12894 - زَوْبَاع*  
 هو الخبث ، اطليه .



زوان معمر



نوح



نوع زاهر

12894 - زَوْجَعَة *Zoogléa (F). Zooglosa (E).*  
 وكمان من البكتريات تنجسها مادة غروية في اشكال مختلفة قبيو كالحطاط المتكاثف في السوائل وكجمجمة من النقط والفتيل في الجلود .

12895 - زَوْجَعَم *Piezomètre (F).*  
*Piesometer (E).*  
 جهاز يستعمل في قياس انضغاط السوائل .

12896 - زَوْجَعَة *Piezométrie (F).*  
*Piezometry (E).*  
 علم يبحث في انضغاط السوائل .

12897 - زَوْجَعِي *Piezométrique (F).*  
*Piezometric (E).*  
 نمت تعريفي يطلق على كل ما هو مختص بالزراعة .

12898 - زَوْجَحَن \* *Clarus (S).*  
*Clérade (F). Clarus (E).*  
 جنس حشرات غشبية من فصيلة الزوسنيات . انواعه المروعة نحو 45 منتشرة في جميع مناطق العالم باستثناء الباردة . اجسامها صغيرة اللثة ، مسطحة الشكل . اولها غشقة الالوان المجلعة والمبضعة || مسرعا نهاري . قربتها رقيق ازهار الفصيلة الحبيبية || يرقاتها مقترنة تعيش تحت لحاء الاشجار المقطوعة اليابسة || أشهر انواعه زوسن النحل المعروف ايضاً بربق النحل .

12899 - زَوْجَحَن النَحْل *Clérade des abeilles (F).*  
 حشرة تدعى بربق النحل ، اطليه .

12900 - زَوْجَحِيَّات *Claridae (S). Clérades (F).*  
*Claridas, Checkered beetles (E). Buntkäfer (D).*  
 فصيلة حشرات من لبيات اللند ورتبة عديمات الاجنحة . انواعها المروعة نحو 700 جسمها 32 جنباً || اجسامها مسطحة ، نحيلة . اولها زائغة جيلة . كواسلها صغيرة . قربتها الاستشمارية صولجانية الشكل ، مركبة من 11 فصلة || اطاحتها تشعل سطح اصقاع الامام واخصها المتناقص الخامة والمضلة الحرارة || يولائها مقترنة تدقعي في معظم يرقات الحشرات الخالصة || أشهر اجناسها الزوسن والرتوف والفتيس والمشرق والسكروبة .

12901 - زَوْجَع زَاهِر \* *Anthicus floralis (S).*  
*Anthicus floralis (E).*  
 حشرة وائمة غشابة دامت من فصيلة الزودعيات ورتبة عديمات الاجنحة . مسطحة بعض اصقاع الجلود الممتدة الحرارة من الشرق الاقصى واربية . تألف البراري والمواقع الغلة . غناصها تعيش على رقيق الاطوار وبتلاتها . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة || جسمها صغير اللثة يطول من 3 الى 4 سم . ثوبها الى السرة القلابة باستثناء الكويل ويتمد الظهران ظاهرا الى المعصية يطولها سوط صناعي في الذكر . وأنها شبه مستعبر الجرم . زبانتها غشيطان . صينها صغيرتان . ظهراتها مستعبر الطرف الاصح . غلها قليلا الصغيز . ارسافها الانامية والوعلى خاصة البغل . رسعا الخليلان رباعيا المقل || لها جيل واحد في الحقول . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط نيسان وتبقى حتى اواسط تشرين الاول . تسرح في التبار

بيضاء اللون ، قطرها نحو ٤ سم. || تودورها يستمر من حزيران الى تموز .

١٢٩٠٦ - زودعيات \* Scaphopoda (F).

Scaphopoda (F).

الزودقيات فئة من الرغويات وحيدة الفصيلة والجنس . انواعها نحو ٣٥٠ اشهرها الناتكة .

١٢٩٠٧ - زودق الياسمين \* ، زودق كسميه \*

Limenitis camilla (S). Sylvain azure, Petit Sylvain (F). White admiral Butterfly (E).

حشرة متراكبة الالوان الجسيمة من فصيلة الزودقيات ورتبة حشرغيات الاجنحة . موطنها المناطق المعتدلة الحارة ورتبة الشرق الاذن واروية . رافشتها جارية قوتها رشيح الاغبار . سرقتها تعيش على الحمايات والياسمينات || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٨ سم . يسلطها تراوح من ٤٨ الى ٥٢ سم . رأسها مستد الجرم . عيناها كيرتان . زبابانا موطيظان . جوشنها وبطنها الى النبي الاسود الموالج || رافشتها متراكبة الاسوان والزخارف والتزييق فيها الاسود والازرق والاطحل والاكلس والاشقع والابيض || لها جيل واحد في الحيل . تظهر القراشة في ايار . تسرح في النهار . تتماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتفتح الممكن لطعاً مستطيلة على نصال اوراق النبات المائل || السرعة تطول نحو ٣٥ سم . ثوبا الى الخضار البصري يطوي غشائ جانبيين وريدين . قشائها يمشر الحلب الدقيق . رأسها اسود . رواجيسها الصدرية صفراء اللون اما البطنية خضراء || طور الاكامل زودع يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلبة متاسكة النسيج .

١٢٩٠٨ - زودم

خيشة عريضة يمر بها تراب الارض المرتفعة الى الارض المنخفضة .

١٢٩٠٩ - زودعيات \* Zoximia (S).

Zoximia (F). Zoximia (E).

جنس اشعاب برية بحولة او معمرة من فصيلة الخبيبات . انواعها المعروفة قليلة العدد متنبها بعض المناطق الحارة من الشرق الاذن || سفها مستضفة فراء . منها الزبسية الماء . ومنها المغالية . جلودها خليطة ، مغزلية الشكل . اوراقها متعاقبة ، ريشية ، لاقامية التضريس . انفرارها صيرلي التجميع . انزعارها بيضاء اللون . اشهر انواعها : زوزبعية افسنتية الورق (Z. abcinthifolia) .

١٢٩١٠ - زودعة

هي التسلط من البليخ ونحوه . يقال زمت له زودعة من البليخ . ج زوع .

١٢٩١١ - زودعيات \* Adélomycètes.

Fungi Imperfecti (F). Adelomycetes (E).

رتبة فطور مجهرية عديدة المراتب والفصائل والاجناس والانواع . معظمها من الفطور اللاقمية التي تكاثرها عديد الاشكال ، نواتجها الفرونية التي كانت من صفاتها المميزة ، تسير الآن ركاب العلم الحديث الذي قضى على ما كان يكتنفها من رهوس || مراتبها اربع وهي الزفانثيات والصنباثيات والميفانثيات والميسفانثيات . اما فصائلها فتقسم وهي الدلايات والفرديات وصديبات والكثنات والكحيبات والطحليات والمثانثيات واهد كيات والوطحيات .

وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل اذار حيث تتغلغل في طور الاكامل فتصل الى حورية وينها الى خنفساء . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ م . ثوبا الى البياض الاخير . رأسها الى السرة السوداء . وهي سداسية الرواسب ، مستطبة الطرف الدقيق .

١٢٩٠٢ - زودع مژتر \*

Anthicus quisquilius (S). Anthicus insignifant (F). Anthicus quisquilius (E).

حشرة مبدولة واثمة خاضعة دامت من فصيلة الزودقيات ورتبة مفدمات الاجنحة . موطنها معظم اصقاع العالم . تألف البراري والمواقع الدفلة وضفاف البحاري الماء . خنفسائها تعيش على بتلات الازهار واوراق النبات . يرقاتها تعيش على المواد النباتية المتحللة والصائرة نحو الانحلال || جسمها صغير القد ، خلي القشار ، يطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبا الى السرة الكستنية يطولها في ظهورها زناران صنباثيان . رأسها برصي الشكل يطول قرن قلاب يمتد حتى طرف الحبل . عيناها صغيرتان . زبابانا خيطيان . غمداه متماصصة التحزيز ، كفيثا الحبل . ارسافها الامامية والوسطى خاسية القمل . رسداه الخلفيان رباعيا القمل . غالبا صغيرة || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجليظة في اوائل نيسان وتعيش حتى اواخر ايلول . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة التي تترك الكال الجسوري بعمر اربعة اشهر تبقى حتى اوائل شهر اذار حيث تتصلب الى حورية . جسمها عند تمام نموها يطول نحو ٧ م . وهو اسطواني الشكل ، مستطبل المقدم ، مستطبل الخؤصر ، سداسي الرواسب . ثوبا الى الصدرية القدسة . رأسها كستني اللون || طور الاكامل الذي يتم عادة تحت الجلالة والذي يستمر نحو ٢٥ يوما ينقضي طلياً من كل غلاف .



زودع مژتر

١٢٩٠٢ - زودعيات \* Anthicidae (S).

Anthicidae (F). Anthicidae (E).

فصيلة حشرات واثمة خاضعة دامت من رتبة غدييات الاجنحة || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف الاشعاب والنباتات الجنية والمواقع الرملية وضفاف البحاري المائية والمناقع والالوار || اجسامها صغيرة القد ، خضرة الشكل ، مستعرضة للرؤوس ، مستطيلة الزوايا الخيطية المركبة من ١١ فصلة . ابراج جبرامها خاسية القمل باستثناء الزوج الخلفي فانه رباعي القمل || يرقاتها دامت تعيش على المواد النباتية الصائرة نحو الانحلال || اشهر اجناسها الزودع والنطقسوس .

١٢٩٠٤ - زودر

Poitrail, Thorax (F).

Breast, Chest, Thorax (E).

هو وسط الصدر بقل ما ارتفع منه الى الكتفين او ملتقى اطراف عظام الصدر حيث اجتمعت .

١٢٩٠٥ - زودر \* Plagianthus (S).

Plagianthus (F). Plagianthus (E).

مجيرة برية وتزيبينية من فصيلة الخبيبات . سلها فراء نبل من ٣ الى ٦ ايتار . اثنادها واثانها متعصب . اوراقها عابلة متعاقبة ، معتقة ، تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مرطاب سنة اذار . حيلة الخضار الزاهي . انزعارها غمية التجميع ، محورية الانكازة ، مستطيلة المالحق ، متدلية ،



زودع الياسمين

## ١٢٩١٢ - زَوْغُونِيَّة

Zoogonia (F).

Zoogony (E).

الزوغونية علم يبحث في تطور الحيوان. راجع شاة.

## ١٢٩١٣ - زَوْغِيَّات

Pédipalpes (F). Pedipalp (E).

رَبَّة من المَكَبِيَّات تتميز بامتطالة الزوج الأول من أرجلها فيبدو كزبان الحشرات.

## ١٢٩١٤ - زَوْق \*، حَسَمِي، حَسَل، أَشْتَن دَاوِد

Hysopus officinalis (S). Hysop officinale (F). Common hyssop (E). Echter ysaop (D). Isopo sacro (I).

نبات عشبي بري طبي من فصيلة الشفويات. ساقه ليفية

منتصبة فروعها تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه لائقة

سائقة، متغابلة. نصلها سناني الشكل بحري الخضار

يطول من ١ إلى ٣ سم. ويمرض نحو ٤ سم. صفته

منسقة كثيفة اللند الطرية || أثماره ضئيلة بحورية

زرقاء اللون. أوراقه وإزهاره طرية الرائحة || أثماره

يتمس من حزن إلى أيلول || وين اسمها إيسوف

وهي لذة عيرانية أما كلمة زوقا فاصلاها الميرغوثي زيت.

منافهه اللبية عديدة. تلغ أثماره منه وعاصم. أوراقه

وأناقته تنف من السعال وتقوي المعدة. زينة الطري

المسحرج بالتقطير يستعمل في عدة مستحضرات طبية.

## ١٢٩١٥ - زَوَّلَم

Palpimanes (S).

Palpimane (F)j Palpimanes (E).

جنس حناكب مفترسة من فصيلة الزووليات. أنواعها

المعروفة متوسطة العدد أطلها جميع أصناف البلاد الحارة

من العالم القديم || أجسامها صغيرة اللد أسطوانية الشكل

مغصورة لتطول من ١٢ إلى ١٥ م. أثوابها إلى الحرة

الجزوية أو القنزوية. تتميز بامتطالة الزوج الأمامي

من الجرازم الذي يستعمل لالتقاط الفصص ولا يستعمل

لقبيب.

## ١٢٩١٦ - زَوَّلَكِيَّات

Palpimanidae (S).

Palpimanidae (F). Palpimanidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الزووليات. أجناسها وأنواعها

المعروفة نحو ٧٠ موطنها البلاد الحارة من العالم القديم ||

جميعها مفترسة، متوسطة القد أو صغيرة. تتميز بخلف

يطربها من الصفائح البنية التي تفصل اللسان من بعضها

البفسر، وبغلافه جوامزا الأمامية التي ترفعها دوماً ولا

تستعملها السير || غائبها أجناس حورية اللون تحملها

تحت الحجارة والحزاز والطالبط || أشهر أجناسها الزوول.

## ١٢٩١٧ - زَوَّلَك

Démarche du Corbeau (F).

الزَوَّلَك: مشية القراب. وهو الخطر المتخارب في تحركه

جسد المائي.

## ١٢٩١٨ - زَوَّلَكِيَّت

Zéolithe (F). Zéolithes (E).

مادة صخرية.

## ١٢٩١٩ - زَوَّلَكِيَّت

Zonite immaculé (F).

حشرة من فصيلة اللبوديات تدعى صفورة، أطلها.

## ١٢٩٢٠ - زَوْقَر \*

Venus (S).

Vénus (F). Venus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشم

معديات الأبريل وفصيلة الزوغريات || أنواعها المعروفة

متوسطة العدد، منتشرة في سطر بحار العالم || أصدافها  
شبه صيوانية الشكل، متساوية المصارع، ثلاثية  
الاستان الرقيقة. أصدافها مائلة أو متماثلة التحيز  
اللتيق. أطرافها مسنة الحار. مشاهها ثنائية، طليقة،  
مهذبة الأطراف || تعيش منتشرة في القوال المغمورة بالماء  
قرب الشواطئ وصيحات الأبر || لحوبها مأكولة، جيدة  
الصنف.

## ١٢٩٢١ - زَوْهَرِيَّات \*

Veneridae (S).

Vénérídes (F). Veneridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشم

معديات الأبريل || أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة

منتشرة في سطر بحار البلاد الحارة والمتحدة الحارة ||

أصدافها شبه قلصونية الشكل، متساوية المصارع،

ثلاثية الاستان الرقيقة. مشاهها ثنائية، أنبوبية،

طليقة، معتدلة الطول، مهذبة الأطراف || أعرف أجناسها

وأشهرها الزيرير والشويف وبالقرة.

## ١٢٩٢٢ - زَوْهَمِيَّات \*

Protohémiptères (F).

رَبَّة حشرات منقرضة من طبقة الصفاكات. أحافرها

تعود إلى الحقبة الخامسة والأخيرة من الأياج الأول،

للمعولة أيضاً بالحقبة البرية || الاسم العلمي يرمز إلى

أنها من أسلاف صفيحات الإجنسة وقد تبين فيما بعد أن

الاتاء المقدّر ينقصه الكثير من الأدلة الأرجحة.

## ١٢٩٢٣ - زَوُولُوجِي

Zoologiste, Zoologue (F).

Zoologist (E).

مخصص بعلم الحيوانات.

## ١٢٩٢٤ - زَوُولُوجِيَّة

Zoologie (F). Zoology (E).

علم الحيوان وهو فرع من التاريخ الطبيعي يبحث في

الحيوان.

## ١٢٩٢٥ - زَوُولُوجِيَّة زَرْاعِيَّة

Zoologie agricole (F). Agricultural zoology (E).

علم الحيوانات التابعة أي الزراعية.

## ١٢٩٢٦ - زَوُولِيَّت

Zoolite (F). Zoolite (E).

الزووليت البقايا المغمورة المتصجرة من كل حيوان.

راجع صيفة.

## ١٢٩٢٧ - زَوَّلَكِيَّت، زَوَّلَكِيَّت

Mercure, Hydrargyre (F). Mercury (E).

الزئبق عنصر معدني سائل. وهو المعدن الوحيد السائل

يوجد في الطبيعة منفرداً أو متحداً بمناصر أخرى مختلفة

التركيب || رمزه (Hg - هـ) وزنه الذري ٢٠٠.٦١

ثقله النوعي ١٣.٦١ لونه فضي. يجمد في ٤٠° مع تحت

الصفر ويؤين في ٣٥٠° مع || مركباته عديدة تستخدم

في مختلف الأغراض أهمها الصناعية والبلية.

## ١٢٩٢٨ - زَوَّلَكِيَّت مَصْعَد

Sublimé de mercure

١٢٩٢٩ - زَوَّلَكِيَّت، زَوَّلَكِيَّت، زَوَّلَكِيَّت

Rugissement (F). Roaring, Roar (E).

صوت إلأسد.

## ١٢٩٣٠ - زَوَّلَكِيَّت

Ocellé (F). Ocellus (E).

زَوَّلَكِيَّت: عين الحشرة أو بسيطة أو مركبة.



زوقا



زير

## ١٩٩٣٩ - زيت زراعي، زيت أبيض

Huile minérale, H. blanche (F). Mineral oil (E).  
يستعمل من تقطير القطران والكشط وهو ما كون فمال  
يستعمل في الكافية الشتوية .

## ١٩٩٤٠ - زيت هـ خنازيرية الصحراء ، اطليا .

Olea europaea (S). Olivier (F). \* زيتون  
Olive tree (E). Echter Ölbaum (D). Olivo, Ulivo (I).  
شجرة مثمرة من فصيلة الزيتونيات . أطبقها إقليم حوض  
البحر المتوسط يمتد من فلسطين الى اسبانية ومن مراکش  
الى تونس . شروبا عديدة جميعها دائمة ، بطيئة النمو ،  
طويلة العمر ، سطوحها خشنة عجرا ، قشورها سنجابية  
مقلعة كاشية ، انصافها غليظة ، افنانها مستدقة . اوراقها  
عرو ، صغيرة اللد ، معنقة ، متقابلة ، سنانية النصل  
الكامل البسيط الجامد || انزعارها سليل التسجيع ، ابلي  
الارتكاز سليلته تدعى سيلة . انزعارها خشوية ، صغيرة  
جلجلية الشكل || ثمارها لحية السوق ، خضراء اللون ،  
بيضة او مستطيلة . صمغها خشية صلبة . برورها  
لوزية || تتكاثر بالبذر والمقل والسائل والشتل .  
جميع شروبا سريرية تمشي وتشر في مختلف الارب  
لا تحصى سوى المنافع وكثرة الطرية . وهي متناوبة الحمل  
زاعمة غير انه يحسن تسليها لان التسميد يحول دون بده  
التناوب بين الحمل والشيخ .

## ١٩٩٤١ - زيتون البئر هو الفتنة الزيتية ، اطليا .

## ١٩٩٤٢ - زيتون بيري هو السّم ، اطلي .

Oliver \* زيتون  
ثمرة الزيتون تتركب ويستخرج منها الزيت بالصر .

Olivacé, Olivâtre (F). زيتوني اللون  
Olivaceous (E).  
نمت وصي يطلق عل ما كان لونه كازيتوني .

Oleaceae (S). زيتونيات  
Oléacées (F). Oleaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات القلقين . اجناسها وانواعها كثيرة  
العدد تنتمي الى ثلاثة اسباط : الزيتونيه والمرانيسه  
والياسمينيه .

Oléifère (F). Oleiferous (E). زيتي  
نمت تمرني يمر من وجود المادة الزيتية كدوكك الخروع  
نبات زيتي .

Huileux (F). Oily (E). زيتي  
ما كان شكله كازيت .

Oléine (F). Oleine (E). زيتين  
احد مركبات الزيوت الدهنيه والشعوم الجامدة .

Table astronomique (F). زيت  
Astronomical table (E).  
قاعده حسابية فلكية تركز عل تابع دوران بعض  
الاجرام السماوية بموجب ترتيب سماوي خاص يدعى  
القنورة . اما الاجرام التي تتألف منها القنورة فهي بترتيبها  
المرجع والشمس والزهرة وعطارد والقيمر وزحل والمشتري .

Accroissement (F). Increase (E). زياده  
هو حق زياده حصة الارث فيما او تقل احد او بعض  
الورثة من حصتهم .

Tord-nez, Mouchette (F). زيكر  
Twitch, Barnacles (E).  
لاقط غشي تضغط به جيفلة الفرس فيدل .

١٩٩٣٣ - زيتان  
هو المستورد قد من فصيلة البسيويات .

Décorateur (F). Decorator (E). زيان  
من تماثيل مهنة الزئين .

Chlamydera (S). Chlamydère (F).  
جنس طير من فصيلة الخريشيات . انواعه المعروفة سبعة  
موطنها بلاد اسبانية . ملينها الحيالي زيتوني في الربيع  
والصيف ثم جلي . تألف الغابات والادغال . قريبا الكبار  
اغصها الدراق والشمش والئين والموز والبرتقال وبعض  
الزهور وجميع انواع الحشرات || اجسامها معتدلة اللد ،  
تعطلى من ٢٤ الى ٣٠ سم . اوتها خفلة الالوان جميعها  
مبفحة وبشوية يقتنازع قفنية الالتشاب . اناثها عادمة  
للقنازع ، بلغة الالوان || من ميراثها انها تقم بالقرب  
من امشاشها سارعا مسقية بالخش ترزها بمختلف  
الاشيا ، الملحة تبسطها سد من القضايا المحبوكه تلتها  
الاناث كلما اشتهت السفاد || احرف انواعه واشهرها  
الزيران الميرش .

١٩٩٣٦ - زيتان صبرش  
Chlamydera maculata (S). Chlamydère tacheté (F).  
نوع من الزيران . موطنه بعض مناطق اسبانية . يألف  
الغابات القريبة من الحدائق والسران . قوته الثار والبزور  
والحشرات || جسمه معتدل اللد ، يطول نحو ٢٧ سم .  
ثوبه اسود الصفصه العليا المبرقشة بالاخير والاصفر  
والبرتقالي . صدره وبلته واثنيكه الى الفرة يطولها مزلج  
اصفر قفنته برتقالية اللون . ثوب الاثي ابيض من ثوب  
الذكر واقل ريشة منه || يدخن حشه في الاجمار الرقيقة  
ويشم سريره حيث يستطيع . الاثي تحضن مرتان في  
الحول وتضع في كل مرة من بيضتي الى ثلاث بيضات  
ترخها بمثابة الذكر .

١٩٩٣٧ - زيتان ، عشبة هنديّة  
Hamidesmus indicus (S). Hémidesme indien,  
Salsaparilla de l'Inde (F). Indian sarsaparilla (E).  
Halbaden, Indische sarsaparilla (D). Salsaparilla  
d'India (I).  
جنية عارضة معمرة من فصيلة الصلصليات . اوراقها  
معنقة قلبية ، نصلها اخضر الصفصه العليا ، عايق  
السفل . انزعارها مثلكية التسجيع ، عوبورية الارتكاز  
سلوانة || يقال انها لا تخلف من المنافع الطبية . تستعمل  
لقزين .

١٩٩٣٨ - زيت  
Huile (F). Oil (E).  
سائل دعي نباتي او حيواني يستخرج من ثمار وبزور  
النباتات الزيتية ومن ضخوم الحيات وغيرها || والزيتون  
تقسم الى طيارة وثابتة وجامدة وبنافه . جميعها أقل كثافة  
من الماء ولا تقرب فيه . تستعمل في اغراض مختلفة  
اغصها الطعام والاضادة وصناعات الصابون والشمع .



زيان ميرش



زيتون



زيتونة

## ١٢٩٥١ - زيتون

هو اكسيد الرصاص السليم. له لون حرة القنبر. قتله النبي ٤٦. صلاته من ٢ الى ٣ يستعمل في دعاء الحدي لانه يمنع عنه السمك.



زيتون

## ١٢٩٥٧ - زيتون صرصور

*Cicadatra quadra* (S). *Cigale criarde* (F). *Psosish cicadatra* (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات. جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٧ سم. بسطة تراوح من ٥٥ الى ٦٤ سم. || ثوبها الى الكسني الاسمر تملو زخارف بريقالية في الرأس والكتول. وفي جانبي البطن الصلصة السفل من بطنها سوداء. رأسها مستعرض ضخم. عظمها مثلث الطويل. صيها كيرتان. زبانا صغيران. كولها شبه مربع. اجنتها فضائية، شفافة مدبجة بالاسود. قوائمها نشطة مهيبة || تسرح في النهار. تتميز بكثرة مرصرتها. تألف الحراج والمدايق القديمة الانجار.



زيتون البحر

## ١٢٩٥٨ - زيتون صرصور

*Lyrissus plebejus* (S). *Cigale commune* (F). *Common cicada* (E).

حشرة صرارة مهيولة من فصيلة الزيتونيات. جسمها مستطيل يطول من ٣١ الى ٣٧ سم. بسطة تراوح من ٨٥ الى ١٠٥ سم. || ثوبها كسني اللون اسف الحراج. الصلصة فضائية، شفافة مدبجة بالاسود. قوائمها نشطة مهيبة || تسرح في النهار. تتميز بكثرة مرصرتها. تألف الحراج والمدايق القديمة الانجار.



زيتون



زيتون الغاب

## ١٢٩٥٩ - زيتون

*Barbus*. في اطراف الرش.

## ١٢٩٦٠ - زيتون

*Zizania* (S). *Zizania, Riz d'eau* (F). *Water oats* (E). *Wasser reis* (D). *Zizania* (I).

جنس نباتات عشية مائية من فصيلة النجيليات. انواعه عديدة اورانها صفية النسل. زنادها متكونة النجيل. ثمارها حبوب دقيقة مستطيلة مأكولة سكرية الطعم وأوراقها المدايق النشوية || الشجر انزلها: الزيتونية العريضة الورق (*Zizania latifolia*) وهي عشية مسرة مأكولة الجلع منها نباتات منافع الصين. والزيتونية الكندية (*Zizania canadensis*) وهي حولية تزرع لبها المأكول.



زيتون صرصور



زيتونية

## ١٢٩٦١ - زيتون

*Perameles* (S). *Péraméle, Bandicoot* (F). *Bandicoots* (E).

جنس حيوانات جلمة لاجه من فصيلة الزيتونيات ورتبة الجرابيات || انواعه المروقة حبة موطاة بلاد استراليا || اجسامها ريمية تطول من ٤٥ الى ٦٥ سم. بما فيه الذنب. رؤوسها اسفينة الشكل، مستطيلة المقاطع اللدلة. اذانها كاسية تطول من ١٥ الى ١٦ سم. || قوائمها الديدان والحشرات المختلفة والسائل.



زيتون

## ١٢٩٦٢ - زيتونيات

*Peramelidae* (S). *Peramelidae* (F). *Peramelidae* (E).

فصيلة حيوانات جلمة لاجه من رتبة الجرابيات. اجسامها المروقة اربعة موطاة بلاد استراليا. رمتها الاجراع || اجسامها صغيرة اللد، مستطيلة الشكل، جسمها لا يتجاوز حجم الارنب. رؤوسها اسفينة مستطيلة المقاطع. قوائمها الخلفية اطول من الامامية. نظام تركيب اسامها

## ١٢٩٥٢ - زيتون

*Cigale* (F). *Seventeen year locust* (E).

جنس حشرات من فصيلة الزيتونيات انواعه عديدة طولها يراوح من ١٦ الى ٤٥ سم. وبسطة من ٤٥ الى ١٠٥ سم. ثوبها خضلة الالوان يكثر فيها الاسود والاسمر والابروي. تمش على بعض الاجراع الحربية والزراعية اعصها الصنوبر تتميز بصورتها الحادة للاستقطعة المزبنة كاتها تقول فيها زيتون.

## ١٢٩٥٣ - زيتون

*Cigale rouge* (F). *Red cicada* (E).

الاسم العلمي يعني ه نبار ه. حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات ورتبة حشرات الاجنحة. جسمها كبير اللد، يطول من ٢٨ الى ٣٨ سم. بسطة تراوح من ٧٦ الى ٨٦ سم. || ثوبها الى الصنابي الاحمر اللامع. رأسها مستطيل مستعرض يطول تجتمع اغير واجر واسفر. عظمها مثلث الطول. صيها كيرتان جاسطتان. زبانا قديتان. صغيران. كولها مربع الشكل، يجمع بالاخر والاجر والاسفر. حيد بطنها احر. اجنتها فضائية، ملطها مبروقها رصاصها عتابة اللون. قوائمها صغيرة مهيبة || تسرح في النهار. تألف الحراج والقدابات.

## ١٢٩٥٤ - زيتون البحر

*Scyllarus latius* (S). *Scyllarus, Cigale de mer* (F). *Shrimp* (E).

حيوان من القشريات عشاريات الارجل. مهيولة في مياه السواحل البنانية.

## ١٢٩٥٥ - زيتون

*Cicada orni, Scutiger orni* (S). *Cigale panschée* (F). *Orni cicada* (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات. جسمها مستطيل الجرم يطول من ٢٣ الى ٢٨ سم. بسطة تراوح من ٦٨ الى ٧٨ سم. || ثوبها الى البني الاشعث يبق في الرأس والكتول والبطن. رأسها مستطيل تملو زخارف وزاويين. عظمها غرزي الشكل. صيها كيرتان جاسطتان. زبانا رشي الشكل عت الذكر، عظمي عت الانثى. كولها يجمع بالاخر. بطنها اصفر الحيد. اجنتها فضائية تملو، في الزوج الامامي، بعض التكت لاسر || تسرح في النهار. رمتها الحراج اعصها حراج الصنوبر.

## ١٢٩٥٦ - زيتون الغاب

*Cicadetta sylvestris* (S). *Cigale sylvestre* (F). *Wood cicadetta* (E).

حشرة صرارة من فصيلة الزيتونيات. جسمها شبه وشي الشكل، يطول من ١٨ الى ٢٢ سم. بسطة تراوح من ٤٦ الى ٥٤ سم. || ثوبها الى البني الاسمر يطول تجتمع عتاني في الرأس والكتول. رأسها عريض. عظمها مستطيل الطول. صيها كيرتان. زبانا صغيران. كولها شبه مربع. بطنها غرزي الشكل، عتاني الحيد. اجنتها فضائية، عتابة المبروق والاصعب. قوائمها صغيرة مهيبة || تسرح في النهار. تألف القابات وانجار ضفاف مجاري الماء.

## ١٢٩٦٨ - زَيْتُون صَغِير الْوَرَق

*Tilia cordata*, *T. parvifolia* (S). *Tilleul à petites feuilles* (F).

نوع من الزيتون الزيتي. مهددة أوروبية. ثمرته تملو من ٥ إلى ٢٥ م. أوراقها قليلة الشكل، صغيرة القد. نصلها حافى الصفحة العليا، أزرق السفلى. ثماره صغيرة الحجم غالية من الأنسل || ازهاره يستمر من حزيران إلى عوز.

## ١٢٩٦٩ - زَيْتُون فَهِي - جَيْسُون

*Tilia argentea* (S). *Tilleul argenté* (F).

نوع من الزيتون الزيتي مهددة الشرق الاوسط. ثمرته هريمية الشكل. لثانها خلية الحاء. أوراقها متوسطة القد، نصلها غلى البشرة نفس اللون والملمع. ثماره بيضية الشكل بيضة الفصول || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

*Tilia mongolica* (S). *١٢٩٧٠ - زَيْتُون مَنُغُولِي*

*Tilleul de Mongolie*, *T. à feuilles de vigne* (F).  
نوع من الزيتون الزيتي مهددة الصين. ثمرته تملو من ٢ إلى ٨ م. أوراقها صغيرة القد ثلاثية الفصوص نصلها مسن الحافة، مائل البشرة. ثماره غالية من الاصلع. ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

## ١٢٩٧١ - زَيْتُون مِيَشُكُوسِي

*Tilia michauxi*, *T. neglecta* (S). *Tilleul négligé* (F).  
نوع من الزيتون الزيتي. مهددة أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢ إلى ٢٥ م. لثانها حر السماء. أوراقها تملو من ١٠ إلى ١٧ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى يصفر عند دخيل أغريف || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

## ١٢٩٧٢ - زَيْتُون هُولَنْدِي

*Tilia platyphyllos*, *T. europaea* (S). *Tilleul de Hollande* (F).  
نوع من الزيتون الزيتي مهددة أوروبية. ثمرته تملو من ٢٠ إلى ٤٠ م. لثانها زهاب الحاء. أوراقها تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. نصلها اخضر الصفحة العليا، غلى السفلى الموشة بالأزرق. ثماره اجاسية الشكل، خاسية الفصول البارزة || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

## ١٢٩٧٣ - زَيْتُونِيَّات

*Tiliaceae* (S). *Tiliacées* (F). *Tiliaceae* (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مهددة القامالات. اجناسها وانواعها عديدة منها الاجبار والشجيرات والجنابات والاشباح. أوراقها متعاقبة. ازهارها فردى أو متقوى التجميع، عمودي أو تاجي الارتكاز. ازهارها غشوية، صغيرة القد، عطرية الرائحة.

## ١٢٩٧٤ - زَيْتُون الْحَقْل

*Lycopsis arvensis* (S). *Lycopsida des champs* (F).  
نبات عشبي بري معروف من فصيلة الحسنيات. شكله قريب الشبه بالاشوة. يختلف عنها باظهاره المرقطة الانابيب || ساقه متعقبة، قليلة الفروع، تملو من ٤٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة، لسنة، مزينة النصال. ازهاره طرفي الارتكاز. انقاره بنفسجية اللون في اولى هملها ثم زرقاء. تنويره يستمر من حزيران إلى آب || يعتبر من النباتات المروية المسنة والمدرية.

لا يختلف عن النقر. اجرة انثاء متعقدة الرسابة تلتف ثمانية اطراف وتتفتح من الوراء || اشهر اجناسها الزيتون والكريبوب.

## ١٢٩٦٣ - زَيْتُون عَنَكَبُونِي

*شكيري* \*  
*Styphus schaefferi* (S). *Styphus araeformis* (E).  
حشرة نائلة دامت من فصيلة الجمليات وثيقة مميزات الاجنسة. تألف الموامق التي يكثر فيها البراز. تعيش على يصر الماهز ولقنم وطل السلق والمواد النباتية المنسلة || جسمها صغير القد بطول من ٦ إلى ١٠ م. قوسها الى السواد الكامد. رأسها مستعرض الشكل. زباناها دقيقتان. صينها صغيرتان. ظهورها ضيق الطرف المقطوع الذي لا يلمع كامل البطن. ارسافها خاسية الفصول || الذكر اكبر قدماً من الانثى واصلق قوساً منها وقاصر سريراً || لها جبل واحد في الحلق. تقطر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع ويبقى حتى اواخر الصيف. تسرح في التبار. تساقط في شهر آب. تنجح الحكن في البر وتطمره في اقرباب || البقرة عند بلوغها الكمال الجسموري تطلو من ١٤ إلى ٢٢ م. جسمها مستطيل الجسم، ضلع الكثير، قصير الرواجب، شطلي السنين، جتري الرأس || طوره الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة.



زَيْتُون عَنَكَبُونِي

## ١٢٩٦٤ - زَيْتُون

*Tilia* (S). *Tilleul*, *Tilio* (F). *Linden*, *Lime tree*, *Lime-blossom tree* (E). *Lindenbaum*, *Linde* (D). *Tiglio* (I).  
جلس اشجار حرجية وزيتونية من فصيلة الزيتونيات. انثاءها عديدة أوراقها متعقبة، متعاقبة، عابطة. ازهارها عطرية، نورية، عمودية، خاسية الفصول واليائتات مهددة الاسدية. احشائها صناعية. تقشورها ليفية تستعمل استعمال القطن. ازهارها وأوراقها طيبة مرققة ويطادة القطن. تسكن السمك وتفيد الصدر. تهلى الاصاب كالابرير وتفيد الالتم. ويستخرج من زبواها مادة هندية شائعة الاستعمال الطبي || اشهر الوله ما يتبع.



زَيْتُون شائع

## ١٢٩٦٥ - زَيْتُون الشَّرَقِي

هو الخلاف الضيق الورق، اطلبه.

## ١٢٩٦٦ - زَيْتُون اَمْرِيكِي

*Tilia americana*, *T. glabra*, *T. nigra* (S). *Tilleul d'Amérique* (F). *American lime-tree* (E).  
نوع من الزيتون الزيتي. مهددة أمريكا الشمالية. ثمرته تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. أوراقها تملو من ٩ إلى ٢٠ م. وتعرض من ٦ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة حافى الخضار، مسن الحافة، مستطيل المتق. ثماره كروية غالية من الأنسل || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.



زَيْتُون الْحَقْل

## ١٢٩٦٧ - زَيْتُون شائع

*Tilia vulgaris* (S). *Tilleul commun* (F). *Common lime-tree*, *C. lindae* (E).  
نوع من الزيتون الزيتي. مهددة أوروبية. ثمرته تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. أوراقها متوسطة الحجم. نصلها مسن الحافة، مدبب القعصة، ياهت الخضار. ثماره مستطيلة، خاسية الفصول البارزة || ازهاره يدوم طوال شهر تموز.

## ١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ أَصْفَر

*Ixia viridiflora* (S).  
*Ixia verto* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته قصيرة. ازهارها كبيرة اللد لونها الى الاخضر تتوسطها بقعة سوداء. ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٣ - زَيْطُولُ أَصْفَر

*Ixia lutea* (S).  
*Ixia jaune* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو نحو ٣٠ سم. سبلته بيضاء. ازهارها كبيرة اللد ، فليسة البرف المستحب ، صفراء اللون || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٢٩٨٤ - زَيْطُولُ بَهِي

*Ixia speciosa* (S).  
*Ixia superbe* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. سبلته طويلة نحو ١٥ سم. تحمل من ٦ الى ٧ ازهار كبيرة اللد حراء اللون || ازهاره من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٥ - زَيْطُولُ عَدَاقِي

*Ixia paniculata* (S).  
*Ixia en panicule* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهاره ملطحة التجميع ، كبيرة اللد ، مستطيلة الاطراف ، لونها الى الالبيض المشع بالاحمر . بقعها الوسطى سود . ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

## ١٢٩٨٦ - زَيْطُولُ مِسْبَال

*Ixia polystachya* (S).  
*Ixia à plusieurs épis* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو نحو ٣٠ سم. يحمل ٣ سبلات ازهارها بكثيفة التجميع قطرها نحو ٢ سم. لونها الى الالبياض الناصع . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٧ - زَيْطُولُ مَلْطُخ

*Ixia maculata* (S).  
*Ixia à macule* (F).

نوع من الزيطول شراعه يعلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. سبلته قصيرة . ازهاره بكثيفة التجميع لونها الى البرتقالي المشع بالالبيض والملطخ بالاحمر . بقعها الوسطى زرقاء اللون . ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٢٩٨٨ - زَيْفَان

*Déviation* (F). *Deviation* (E).

الزيفان والزيف هو التغير الطرقي على الاتجاه الطبيعي مما كان سببه .

## ١٢٩٨٩ - زَيْفَم

*Eau salée, saumâtre* (F).  
*Salt water, Briny water* (E).

يقال للين المالحه عين زيفم ويقال للين المذبة عين ميم .

## ١٢٩٩٠ - زَيْفَاء

*Daphniphyllum* (S).  
*Daphniphyllum* (E).

شجرة كبيرة دائمة من فصيلة القربونيات . مهدا بعض اصقاع الشرق الاقصى . ساقها تنمو نحو ١٥ م. اوراقها سنائية الشكل طولها من ١٢ الى ١٨ سم. وتقرض من ٥ الى ٧ سم. نعلها جلدية ، غضر الصفحات العليا ، طسل السفل . ازهارها ثنائية المسكن ، حذيفة الجرم ، عتقودية التجميع ، محورية الارتكاز . الذكرية منها عديدة القصل والاسدية . اما الانثوية فتلاية المياسم . ثمارها لحية زيتونية الشكل والحلم تحوي عصمة واحدة صغيرة .

## ١٢٩٩٥ - زَيْفَوِي \*.

*Embertiza cyrlus* (S). *Ziti* (F).

طائر من الجوارم وفصيلة الثشوريات . موته معظم مناطق اروية مجموعا في طلب المصيف والمشت . قوته الحشرات والبروز || جسمه صغير اللد يطول نحو ١٦ سم. ثوبه جميل الالوان المتناقلة تكثر فيه الشبهة الزقاء يعلوها تمشيع اصفر واخضر ، وتمشيع اسود في الرأس والجنح ، وايض واثنع في الصدر والبطن . زوره اسود . محمره الى الشقة. عنياء مكلحات بالاسود. منقاره صغير الجرم . ذنبه غارق الطرف .

## ١٢٩٩٦ - زَيْفَوِيَات

*Cicadidae* (S).  
*Cicadidae* (F). *Cicadidae* (E).

فصيلة حشرات من صفيات الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها كثيرة اللد تتميز باجنحتها الشفافة . بذوائجها الثلاثية الزئام وباصوات ذكورها الصرصرية . جميعها من حشرات المناطق الحارة والمستقلة . حشرات الكاملة تعيش من ٦ الى ١٠ اسابيع قوتها للفس الذي تحسه من افنان مختلف الانهار || انثاها تفتح نحو ٤٠ مكتة في عام الانصاف والافناد الباهية تفتتح من ربات تعيش في التربة نحو اربعة اعوام حل جلور مختلف الالماشب والنبات .

## ١٢٩٩٧ - زَيْفَوِيَات \*

*Sisyridae* (S).  
*Sisyridae* (F). *Sisyridae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذافات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة اللد ، نحو ٣٠ ، منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمعتدلة نحو الباردة . تألف صفاف مجاري الماء . انثاها تجمع الحكن على النباتات المائية || اجسامها صغيرة . بسطة اجنحتها تراوح من ١٠ الى ١٦ سم. رؤوسها شبه مكورة . عينها حياضلة . قرونها الاستعمارية عينية مستطيلة . اجنحتها شبه متساوية بين الزوجين . كواسلها قصيرة . بطنها اهلجية الشكل . انثاها قصيرة المزوات || يرقاتها مائية ، مفرمة || لشهر اجناسها الزيزيرة .

## ١٢٩٩٨ - زَيْفَوْرَا

*Ziziphora* (S). *Ziziphora* (F). *Zizifora* (I).

جنس نباتات طرية ، برية وسولية من فصيلة الثشويات التريجات . انواعها ٨ جميعا برية منها الشبية للعادة والتبسية والجنبية . اوراقها مقابلة ، كلمة ، سنائية زغية . ازهارها محورية وتاجية .

## ١٢٩٩٩ - زَيْفَلَة

هي الارضاس الصباحي ، اطله .

## ١٢٩٨٠ - زَيْفَلَة

هي لالعة الريداء ، اطلها .

## ١٢٩٨١ - زَيْطُول \*

*Ixia* (S). *Ixia* (F).  
*Corn tily* (E). *Klebschwerzel* (D). *Istia* (I).

جنس نباتات يسلم من فصيلة المسمليات انواعه المعروفة ٣٥ جنبا تزيينية وصناعية . اوراقها قرصية الالتفاف مستطيلة ، نعلها ضيق الصفة الجلمدة المتصبة . شملزها الزيزية طولها من ٣٠ الى ١٠٠ سم. ازهارها سليل او علفي التجميع . ازهارها جملة الشكل والالوان الزمائية . يستخرج من نعلها عصارة لزبة صناعية || لشهر انواعه الزيزية ما يتبع .



زيفي



زيفول

## ١٢٩٩٨ - زيتانة فضية \* Ablette (F).

Small bleak (E).

سمكة بحرية صغيرة القد فضية اللون تطول من ١٢ إلى ١٥ سم. حراشفها لؤلؤية المادة، صناعية، تدعى على الشرق وروج الشرق. تستعمل في صناعة اللؤلؤ الكاذبة.

## ١٢٩٩٩ - زيتب \* Zkibel, مسك رصي ,

Polistes tuberosa (S). زيتق طرابلسي

Tubéreuse, T. des jardins (F). Garden tuberosa (E).  
Echte tuberosa (D). Tuberosa (I).

الواحدة زينة. نبات عشبي يصل صسمي مسمر من فصيلة الوردية. أوراقه خضراء مستطيلة مخددة النصل. ثمراته الأزهرية سائي الشكل ، موزق ، يطول من ٧٠ إلى ١٥٠ سم. ازهاره سائي التجميع. ازهاره مستطيلة، جميلة، بيضاء اللون، فواحة العرف الذي يستخرج من ازهاره بالتقطير حطر فاخر عيّن. ازهاره يستمر من حزيران إلى تشرين.

١٣٠٠٠ - زيتكة هي انصاليا كسموس ، اطلها .

## ١٣٠٠١ - زيتكية \* Zinnia (S).

Zinnia (F). Youth and oldage (E). Zinnia, Schmuckzinnia (D). Zinnia, Fiori stellini (I).

جنس نباتات من فصيلة المركبات معقودة التبريد على اسم الطبيب البوتاني «زين» انواعها وفروها كثيرة المند جميعها عشبية حولية زينة مهدا للمكسيك. سوطها فراء تعلو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. اوراقها حاشنة متقابلة جميلة الخضار. ازهارها رؤسية، فردية، تاجية الارتكاز، عديدة الالوان السوية أو الموشحة. وهي من النباتات السروية المبلولة في جميع الحدائق، ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف.

## ١٢٩٩٩ - زيتونات Chromosporites

مارة تطور بجمهرة من فصيلة الطليحات. اجناسها ثلاثة : الأفيوكلاديم ، الميسايوتوز واليكروسترويه .

## ١٢٩٩٢ - زيتع القيلع : ضرب من البوع صغار .

## ١٢٩٩٣ - زيتلوز، كسيلوز، عخبوز Xylose

مادة سكرية تستخرج من قصب اللوز الصغراء وقش الخنطة وعشب الزان ونبات الطويل الخ .

## ١٢٩٩٤ - زيتمكل Zymase

خيرة كيميائية تحول سروب السكر الى كحول وغاز كربوني .

## ١٢٩٩٥ - زيتولوجية \* Zymologie (F).

Zymology (E).

الزيمولوجية علم التخمير أو الاغيار .

## ١٢٩٩٦ - زيتاب Zinebe

فاطور زراعي شديد اللعج لا يلقي النبات يرتكر على مادة كربمات الزنك يستعمل في مكافحة الامراض الفطرية اعصها الملبدير .

## ١٢٩٩٧ - زيتانة ، سمكة يضاء Salmo (S). Able, Poisson blanc (F). Bleak (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشبوطيات. انواعه عديدة موطنها بحيرات وأنهر الشرق الاذل وأروية. جميعها صغيرة القد دقيقة | اعرف انواعه واشهرها الزيتانة الفضية .



زيتانة فضية



زيتب



زيتنة





س



ساج

١٣٠٠٨ - سكاركة ، وليكمة Lamelle (F).

رأية صغيرة من الزجاجة متاحة في الفكة تستعمل لتغطية القنطرة المطلوب فحمها تحت الجهر .

١٣٠٠٩ - ساج \* ، دلب هندي Tectona (S). Tack, Tek' (F). Teak-tree, East Indian oak (E). Teakbaum, Indische eiche (D). Tek (I).

جنس اشجار حرجية من فصيلة الساجيات . انواعها ثلاثة جميعها اشجار ضخمة دائمة وظلمة . اوراقها متعككة ، متقابلة ، رقيقة الشكل . نصلها خالي البشرة ، بارز العروق والشرايين . اغصانها عتقودي التجميع ، متصب الجلس ، ناهي الاوتكاز . اغصانها عتقوية صطرة ، بتلاتها ليس . ثمارها نوبية كروية مأكولة . اغصانها شديدة الصلابة . وقصها كثيفة الاذرات المتراصة التي تحول دون الانفعال بالمواد الخارجية . تستعمل خاصة في صناعة السفن .

١٣٠١٠ - ساجو Sajou

هو السوس قود من فصيلة السوسيات .

١٣٠١١ - ساجول ، سوجل ، سوجلك Clisse (F). Wicker (E).

غلاف القارورة يحبك عادة بالقضبان الخفيفة او بقند القصب .

١٣٠١٢ - ساجوم Moullant (F). Wetzling (E).

كل سائل شديد اللبونة واللزوجة يضاف الى الادوية الزراعية ليزيد انتشارا واصفاً .

١٣٠١٣ - ساجيات Verbenaceae (S).

Verbenacées (F). Verbenaceae (E). وتعرف أيضاً برعي الحام . فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وحيدات التعملة . اجناسها وانواعها كثيرة

١٣٠٠٢ - ساجي Septennal (F). Septennial (E). هو ما يدوم سبع سنوات او ما يمارد كل سبع سنوات .

١٣٠١٢ - ساجي Gagnant (F). Winner (E).

الذي خيل الحلية وهي عشرة عند العرب اولاً السابق المعروف بالهلي ثم المسلي ثم المسلي ثم التالي ثم المراتح ثم الماطف ثم الحظي ثم الخويل ثم الطيم ثم السكت .

١٣٠١٤ - سابينيات ، سبتد يات ، سبتد ياتيات Sepindaceae (S). Sapindacées (F). Sapindaceae (E).

فصيلة نباتية من مزدوجات الفلقة مستقلة التعلالات . اجناسها ١١٨ تشمل زهاء ١٠٠٠ نوع . منها الاشجار والشجيرات والجنات والفسلفات والاشواب . اغصانها رباحية او لحسية التركيب . ثمارها كعبورية او نوبية .

١٣٠١٥ - سابينوت ، سابينوط Carpe (F). Carp (E).

هو الشبوط ، اطبل .

١٣٠١٦ - سابينيا Sabia (S).

Sabie (F). Sabia (E). جنس نباتات جنسية معمرة من فصيلة السابينيات . انواعها سبعة معظمها زراعي قزويني || اغصانها كبيرة ، حملة ، حراء اللون ، كثيرة الاسدية الصفراء الملهبة || تزود في المراكن لانها تنقى البرد .

١٣٠١٧ - سابينيات Sabiaceae (S).

Sabiaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة التعلالات مرتفعات اليبس . اجناسها اربعة وانواعها نحو ٢٠ جميعها جنات صغيرة واعشاب معمرة منها بعض مناطق افريقية الاستوائية والحارة || اشهر اجناسها السابيا .

تنبى اللون || بوفاته اعليجية شفافة قياها نحو  
٣×٥ ميكرون || يكلف باقتلاع النباتات الموصية  
ويستمال النورة الزراعية لاجتناب استمرار زراعة  
النبوت او القطن ستة بعد ستة في نفس الموضع .

١٣٠٢٢ - ساجيد \*  
Décurrent (F). Decurrent (E).  
نمت وصفي تعريفي لكل ورقة او جزء منها كالنق  
والضلع تنمو لاصقة بالفتد او البليقة او الفتن .

١٣٠٢٣ - ساجد  
Tapir  
هو السناد ، اطليه .

١٣٠٢٤ - ساجج  
هو قرقعة ملابار ، اطليا .

١٣٠٢٥ - ساجحه  
Averse (F). Downpour (E).  
السجاجة للشجدة الانهار التي تصرع النبات .

١٣٠٢٦ - ساجدوكان  
هو اشة الصباغين نوع من الحرازان .

١٣٠٢٧ - ساجديسي  
Sexennal (F). Sexennial (E).  
هو ما يلوم ست سنوات او ما يعادى كل ست سنوات .

١٣٠٢٨ - ساجلات الاجنحه  
Megalopectera (S).  
Megalopectera (F). Megalopectera (E).  
رنية حشرات نافعة من طبقة عصيات الجناح تشمل  
فصيلتين والعديد من الاجناس والاناوع . جميعها كبيرة  
القد او متوسط . رقاتها مائية لاحة .

١٣٠٢٩ - ساجون  
Nictitant (F). Nictitating (E).  
نمت تعريفي يطلق حل كل غشاء متحرك من قطب الى  
قطب كما في غشاء العين الثالث عند الطير .

١٣٠٣٠ - ساجقات الاجنحه  
Mecoptera (S).  
Mécoptères (F). Mecoptera (E).  
رنية حشرات من طبقة سفليات الجناح . كانت كثيرة  
الانتشار في الاسحاب النافرة . تتمثل الان بفصيلتين .  
اعظامها لاهقة . زباناها عديدة الفواصل .

١٣٠٣١ - ساجج هندي  
هو المستويه ، اطليا .

١٣٠٣٢ - ساجقي  
Sarcocarpe (F).  
Sarcocarpus (E).  
من الفيا ما هي لحية اللدق .

١٣٠٣٣ - ساجية \*  
Makaira, Voilier (F).  
Isiophorus nigricans (S).  
سمكة بحرية بيوض مفترسة من فصيلة السبيليات ورنية  
ثلاثيات الزعانف . اعطائها المناطق الاستوائية من المحيط  
الاطلسي . تتميز اسرع سمكة معروفة . سرعة عصبها تقارب  
١٢٠ كيلومتر بالساعة || جسمها كبير القد ، وهي  
الشكل ، يطول نحو ستة امتار . ثوباها الى الزرة البحرية  
يمضي في الظهور ويختفي في البطن . تتميز اولاً بكبر  
زعنفها الظهرية المستعرضة الزرقية التي تبدو ، عند نشرها ،  
كالشراع . ثم باستطالة زعنفتها الخشوية القليلة المرض .  
وتتميز ايضاً باستطالة عظم فكها العلوي الذي يبدو كالبرع  
المستقيم النصل المذهب الطرف || يقال انها تعيش نحو ٤٠  
سنة وتكون يافعة بمر ٣٨ سنوات || لحمها كامن  
الصفن ، كثير المادة الزيتية .

١٣٠٣٤ - ساسلي  
هو البيرموب الحزني ، اطليه .

العدد فيها الاشجار والشجيرات والجنات الماداة . وفيها  
النباتات الطبية والمقوية والمضادة السموم || اشهر  
اجناسها الساج وربي الحام والارثه .

١٣٠١٤ - ساجينة \*  
Sagina (S). Sagina (F). Pearl-  
wort (E). Lagerkebel, Sternmoos (D). Sagina (I).  
جنس نباتات عشية من فصيلة القرنفليات . انواعه  
قليلة جميعها معمرة صغيرة القد ، سيقانها حزنية ، اوراقها  
خززية متقابلة متحدة القاعدة . ازهارها بيضاء اللون ،  
صغيرة القد ، عادية القاذة والطلاوة || اشهر انواعها  
النبات التالية .

١٣٠١٥ - ساجينة ذرية  
Sagina subulata (S).  
Sagina subulée (F).  
نوع من الساجينة تملح من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها خززية  
ذرية . ازهارها خماسية التركيب . ازهارها يستمر من  
ايار الى تموز . ترطب في الارثية الرملية .

١٣٠١٦ - ساجينة زبانه  
Sagina pilifera (S).  
Sagina pilifère (F).  
نوع من الساجينة تملح من ٣ الى ٨ سم . اوراقها قصيرة  
زباء النصل . ازهارها خماسية التركيب كبيرة البتلات .  
ازهارها يستمر من حزيران الى آب . ترطب في الارثية  
القليلة الانساج .

١٣٠١٧ - ساجينة مضططكة  
Sagina procumbens (S). Sagina couchée (F).  
نوع من الساجينة تملح من ٢ الى ١٠ سم . ازهارها  
رباعية التركيب . ازهارها يلوم من ايار الى تشرين  
الاول || ترطب في الارثية الرملية .

١٣٠١٨ - ساجير  
Circé (F).  
Circe, Circinus (E).  
الساحر كوكب . سيار من الخفس يحمل رقم ٣٤ . يوجد  
اكتشافه للفلكي هـ شكونزك عام ١٨٥٥ .

١٣٠١٩ - ساجيل ، ساجداح  
Littoral  
الارض القريبة من الشواطئ البحرية .

١٣٠٢٠ - ساجوج التنبؤ  
Phaeolus schwainitzii (S).  
فطر ربي من فصيلة السميات يركب معطر الراتنجيات  
اعصها التنبؤ . اروسه زرية الشكل خفيفة . صفحتها  
الداية مغطاة بمحبة كثيفة الخرافات الخفيفة اللون الصفراء  
المليح . لهاها اسفنجي التركيب لونه الى الصفرة المايقة .  
يشبه ايضاً الحيف الكثيف يمتري النبات في مستوى  
الجذور وينفذ الى قلب الجذع بعد ان يسطب الحشب  
الذي يتسحل شيئاً فشيئاً من سمكيات كبيرة قياها نحو  
السنن الى سمكيات صغيرة فاصفر حتى تنتهي بنجم  
ذرة التنبؤ .

١٣٠٢١ - ساجوج التنبؤ \*  
Phaeolus manihotis (S).  
فطر من فصيلة السميات يركب جذور التنبؤ والقتن .  
يشبه كثيف الحيف يمتري الجذور من مركز انتشارها  
فيلفها يوشاح ابرد اللون اسفنجي التركيب يقضي على  
الجرادة وعل التبادول النافس || اما الفطر فانوسه  
خالية السطح الاحل ، كبيرة ، مستديرة ، مغطاة ، قطرها  
نحو ٢٠ سم . لونها اصفر مخلي . لهاها غليظ للتركيب



ساجية



ساجية



سافراس

١٣٠٤٧ - سائل أرضية \*  
Tige souterraine (F).  
Underground stem (E).  
هي الساق التي تنمو في التراب كالجنود .

١٣٠٤٨ - سائل حو  
Ramier (mâle) (F).  
Ring-dove (male) (E).  
هو ذكر الورشان .

١٣٠٤٩ - سائل سوداء  
Jambe noire (F).  
Black leg (E).  
وصم بكيري يركب البطاطا في سوقها ودرناها فيلخيا  
الشد الاذي . مبيه الكروية البكنورية اطلها .

١٣٠٥٠ - سائل عاركة ، سائل عكة

Tige grimpante (F). Climbing plant (E).  
هي التي ليس لها من لقوة ما يكفيها للانتصاب فتسلك  
غيرها وترتكز عليه .



سافرية

١٣٠٥١ - سائل عكولة  
Tige tuberculeuse (F).  
Tuberous stem (E).  
هي الساق المكونة من الدرن والساقل .

١٣٠٥٢ - سائل متكفية ، زاحفة

Tige rampante (F). Prostrate, Runner (E).  
هي التي لا تستطيع الانتصاب في الهواء فتزحف على  
الأرض .

١٣٠٥٣ - سائل ملتفة ، عصبية ، عطفة

Tige volubile (F). Twining plant (E).  
ساق تلتف على دعامتها .



سافرة

١٣٠٥٤ - سائل متعصبية ، صعدكة

Tige dressée (F). Dress stem (E).  
كل ساق تستطيع الانتصاب بذاتها .

١٣٠٥٥ - ساكن  
Stator  
نمت تمرني يعلق على القسم الثابت من الحركات  
الآلية .

١٣٠٥٦ - ساكي \* ، سلكي  
Pithecia (S).  
Saki (F).  
جنس قرد امريكية من فصيلة البشريات . انوله ٦  
مولها شال ابركة الجنوبية || جميعا كسلانة قليلة  
الحركة . اجسامها ربة . ورونها مستديرة شارفة الوجة .  
قوامها متوسطة الطول . اذنانها طويلة جللة لا اخاذة  
اوتاجا سوية الااليان يكثر فيها الاسر وشحاته . شموها  
قليلة الكثافة متصلة الطول . تألف الثنايات العظيمة .  
تسرح في الليل . مرتها الاشجار . جماعها قليلة العدد .  
قوتها الفار والاسل .



ساكي

١٣٠٥٧ - سالك ، سلك  
Serpent noir (F).  
Black snake (E).  
الاسم السوداء الثوب .



سائل أسفغ

١٣٠٥٨ - سائل العروس هو القطيفة اطلها .

١٣٠٥٩ - سائل أسفغ \*  
Selatosomus latus (S).  
Taupin bronzé (F).  
حشرة من السالويات طولها نحو ١٦ مـ . ثوبا الى السرة  
السماء يملوها بواج اخضر || تركب ازودع والبقول .  
رقبتها اسطوانية مسطحة كقوي جلود حلة نباتات .

١٣٠٥٥ - ساسفرا \* ، ساسفرا  
Sassafras (S). Sassafras, Bois odorant (F). Sassafras  
tree, Ague tree (E). Sassafrasbaum, Fenchelholz  
(D). Sassafraso, Sassafrasso (I).

شجرة وسيدة الجنس والوع من فصيلة الفاريات . منبها  
كثا وقطوريه . شخبها صناعي اصفر اللون ، خفيف  
الوزن عطري العرف . اوراقها تشمل اشمال القليلات  
والثوابل وذلك بمد تجفيفها وتحما .

١٣٠٦٦ - ساسم هو الايتوس ، اطله .

١٣٠٦٧ - ساسمة \*  
Ebénisterie (F).  
Cabinet-making (E).

الاسمة نجارة الساسم اي الايتوس وغيره من الاشباب  
الفاخرة المائلة .

١٣٠٦٨ - ساطور  
Fendoir (F). Cleaver (E).  
آلة حادة يقطع بها اللحم والعظم .

١٣٠٦٩ - ساعه  
l'Horloge (F). Horologium (E).  
الساعة كوكبة نجوم مقيمتها الجنوب . مركزها فوق كوكبة  
النهر . عدد نجومها ٢٤ لها من المرتبة الخامسة .

١٣٠٦٠ - ساجو  
Sagou (F). Sago (E).  
دقيق نشوي مدق يستخرج من لب جلود بعض  
التخلبات والسيكاسيات التي تنبت في البلاد الحارة .

١٣٠٦١ - ساجو \* ، شجرة الساجو ، نخل  
النشأ  
Sagus rumphi, Metroxylon

sagu (S). Sagoutier (F). Sago-palm, Sago tree (E).  
Sagopalme (D). Sago, Sagou, Palma de stoffe (I).  
جنس اشجار معمرة من فصيلة النخلات . مبدعا البلاد  
الحارة يستخرج من لب جلودها مادة نشوية مغلقة تسمى  
سافر لها فاتها عند قوم تلك البلاد .

١٣٠٦٢ - ساف  
Crin (F). Coarse hair (E).  
شر الذنب والهلج .

١٣٠٦٣ - سافرة \*  
Sparganion (S).  
Sparganier (F). Reed-grass, Bur-reed (E). Igelkol-  
ben (D). Sparganio (I).

جنس نباتات جذمورية مائية معمرة من فصيلة البولييات  
انواعها المبررة ثمانية . اوراقها متعاقبة لافحة مسطحة .  
نصلها مرياني الصلصة الضيقة . ازهارها ابطة الانكاز  
وعذبة ، فية التجميع ، متباينة ، كروية الشكل .  
اشهر انواعها شريط الماء .

١٣٠٦٤ - ساق  
Jambe (F). Leg (E).  
من اعضاء الحيوان وهي بين الفخذ والوركوب .

١٣٠٦٥ - ساق  
Tibia  
هي في الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ  
والرُبع .

١٣٠٦٦ - ساق ، جذع  
Tige, Tronc (F).  
Trunk (E).

هي المحور الاصل في النباتات الوصلية . تقوم على  
الجلد وتقلو صعدا في سطر النبات وتصل الاعضاء  
والورق والبر .

## \* ١٣٠٦٥ - سالكول حتملي

*Agriotes niger*, *Elatér niger* (S). *Taupin velu*, *Agriote velu* (F).

نوع من السالكول طوله نحو ١٢ م. قويه الى السواد القسبي تملو خلة غبراء. يكثر وجوده في اوائل الربيع. يركب مع رقاته الجوزية اللون زروع الحطة والشعير وسائر التصيليات الزراعية والبرية والشوئدر وشاقل التبغ في الخقل.

١٣٠٦٦ - سالكول مشير  
*Taupin rayé* (F). هو سالكول الحصيد، اطليه.

١٣٠٦٧ - سالكول منقط \* ، لاقون منقط \*  
*Lacon punctatus* (S). *Lacon ponctué*, *Taupin ponctué*, *Lacon punctatus* (F).

حشرة غاصلة مفترسة من فصيلة السالكولات وربة معدقات الاجنحة. تألف غابات الصنوبر وأحراجة. غناها تمشل على بعض اوراق النباتات البرية وعلى ابر الصنوبر. يرقاتها تعيش على المواد الخشبية المتحللة وعلى ما تقتنصه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد، يطول من ١٦ الى ٢٠ م. ثوبا اسود اللون تملو حرافش فضية شديدة الصغر تبدو كالتقط. رأسها كبير الحجم. فكاهها ضليمان. عيناها صغيرتان. زباناها عظيمتان. اطرافها مستديرة الطرف للاحسف. ارسافها خلمية المقل || الاثن اكبر لدا من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا || جيلها رباعي الخيط. تظهر الحشرة في اوائل حزيران وتعيش حتى اواخر آب. تسرح في النهار. تسالط بعد ظهورها باسبوعين وترز للمكن في التربة تحت الجفلة || البرقة سلكية الشكل، قنية اللون ثم تصفر مع تقدم العمر || طول الكمال الذي يستمر نحو سبعة اسابيع ينقضي في التربة على حد يراوح من ١٠ الى ٢٠ م.

١٣٠٦٨ - سالكولات \*  
*Elatéridae* (S). *Elatéridés* (F). *Elatéridés*, *Snapping beetles*, *Click beetles*, *Wireworms* (E). *Feldschnellkäfer*, *Schnellkäfer*, *Drathwürmer* (D).

فصيلة حشرات من ربة مهديات الاجنحة اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القد. زباناها مركبة من ١١ فاصلة وهي غشبية الشكل او مشابرة او مشطية. ارسافها خلمية المقل. من ميزانها انها اذا رقت على ظهورها او وضعت كذلك تسقط لاصطدامها بالظبي ونطها ترافها بضع سلتيمرات ترافها قرقة خاصة. رقاتها اسطوانية مستطيلة، اجسامها قوية جلدية، لونها الى الصفرة العنابية || تركيب جلود وبيلود وصاقل عدة نباتات.

١٣٠٦٩ - سالكولوم \* ، بكتدولس جبكي  
*Selinus* (S). *Sélin* (F). *Milk parsley* (E). *Kummel-silge* (D). *Appio di montagna* (I).

نبات عشبي بري معمر من فصيلة الحميميات. منه البلاد المعتدة المناخ. يكثر في بعض اقاليم سورس البحر المتوسط. يقال انه لا ينمو من المناطق الطبية المجبة السخدية.

١٣٠٧٠ - ساءم  
*Patre* (F). *To graze* (E). ساءم الماشية تادها الى المرعى ورعاه.

## \* ١٣٠٦٠ - سالكول اطحسل

*Lacon murinus*, *Brachylacon murinus* (S). *Taupin gris* (F).

حشرة من السالكولات طولا نحو ١٦ م. ثوبا حتملي تملو رقة للخلاد. تركيب بيلات الورد واوراق بعض النباتات فتقرضها || البرقة صفراء اللون سلكية الشكل كثيرة الفقدور تركيب جلود الزروع والشوئدر والبطاطا وشاقل الانجار المشرة.

١٣٠٦١ - سالكول التبع \*  
*Agriotes ustulatus* (S). *Taupin noir*, *Agriote noir* (F).

حشرة من السالكولات طولا نحو ١٥ م. لونها اسود لامع. يكثر وجودها في اواسط الربيع، تعيش على مختلف النباتات البرية وتقتضم سوق شتول التبغ، عند جملها، يمتص على سطح التربة. يكافئ باستعمال اسد الحواشير الفعالة تقديرا على البرقة عند آخر حرارة بقايا التشتيل.

## \* ١٣٠٦٢ - سالكول الحصيد

*Agriotes obscurus*, *A. lineatus*, *Elatér segetis* (S). *Taupin des moissons*, *T. rayé*, *T. obscur*, *Agriotes des moissons*, *A. rayé*, *A. obscur* (F). *Striped elaterid beetle*, *Click beetle*, *Dark elaterid beetle* (E). *Saatschnellkäfer*, *Feld-Humusschnellkäfer*, *Düsterer-Humusschnellkäfer* (D).

اسم يطلق على عدة حشرات من السالكولات اجسامها متشابهة يصعب منها تمييزها. طولا يراوح من ٧ الى ١٠ م. الارباعا بقية اللون تملوها مشقة خلية. اتحادها جملة. رقاتها اسطوانية الشكل، مستطيلة القد، جلدية البرقة، صلبة التركيب، بقية اللون. ذنبية المسنوج تركيب مع رقاتها تخلف الزروع والبقول والتبرغ.

## \* ١٣٠٦٣ - سالكول الرياض

*Selatosomus cruciatus* (S). *Taupin des fuites* (F).

حشرة من السالكولات طولا نحو ١٢ م. لونها حتملي. فهداما الى الصفرة النبراء تملوها خطوط سود || تركيب الانجار الحرجية والاربية اعصها السنديان والرزنيون.

## \* ١٣٠٦٤ - سالكول بصادق

*Agriotes sputator* (S). *Agriote cracheur*, *Taupin cracheur* (F). *Agriotes sputator* (E).

حشرة مؤذية غاصلة لاهمة من السالكولات معدقات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وافرقة الشمالية. تألف المروج والمراعي والحقول والمنازل. غناها تعيش على اوراق النباتات الحرجية والبقولية وعلى بيلات الانجار اعصها اذمار القصبية الصنوبرية. يرقاتها تعيش على جلود التصيليات والجزر والشوئدر || جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ م. ثوبا الى الصفرة السوداء الكستنية المالح. رأسها معقودب الشكل يطول في مقدم الجنبية شبه ازار يمتد بين الزبائين. زباناها عظيمتان طويلتان. عيناها صغيرتان. اكسلها معقل الايدياد، كثيف التشطيل والخل.

ارسافها خلمية المقل || الاثن اميز قددا من الذكر واكد ثوبا منه واقتصر زبانا وانضم بندا || جيلها رباعي الخيط. تظهر الحشرة في اوائل الربيع وتبقى حتى اوائل الصيف. تسرح في النهار. يرقاتها بطيئة النمو لا تترك الكلال المسموري الا بمر ثلث سنوات فيصبح طولا اذ ذاك نحو ١٨ م. ويستمر ثوبا في الصفرة النبراء السقاء المالح || طول الكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما وينتهي بظهور الحشرة الجملانة.



سالكول اطحسل



سالكول التبع



سالكول الحصيد



سالكول الرياض



سالكول بصادق



سالكول غفط



سالكول خلي



سالكولوم

Dominant

١٣٠٨٥ - سَائِد مُتَوَكِّل

صفة العامل البيولوجي للطلب .

Palefrenier (F).

١٣٠٨٦ - سَائِس

Groom, Ostler (E).

حامل يمسح الخيل فيقدم لها الطعام ويحميها ويسرجها .

Assimilable

١٣٠٨٧ - سَائِغ

هو من المواد الغذائية ما كان قابلاً لتفصيل .

١٣٠٨٨ - سَائِلِي المِيزَان

سائق الميزان نجم يسير وراء نجوم برج الميزان فيبدو كأنه يسوقها .

Fluide (F). Flaid (E).

١٣٠٨٩ - سَائِلِي

صفة الأجسام اللامسكة الأثاث، والسوائل تقسم الى قسمين السوائل اللينة والسوائل القارية .

Bouillie (F). Wash (E). مَحْلُول

١٣٠٩٠ - سَائِلِي مَحْلُول  
السائل حسب الأساطير الزراعي غليظ مائع مركب من مواد مختلفة مذابة أو معلقة في الماء، والسوائل الزراعية عديدة تستعمل في مكافحة الحشرات والأمراض الفطرية .

١٣٠٩١ - سَائِلِي بُوْرُو ، مَحْلُول بُوْرُو

Bouillie bordelaise (F). Bordelaise wash (E).

سائل مركب من كبريتات النحاس مع الكلس في الماء بمعدل ١٪ سلفات النحاس وقدره كلس حرار يقاوم القينا ١ ٪ كالزين. وهو أقدم الفواشير وأهمها انتشاراً. خصائصه ميزان عطيفة سبياً أنه يفيد النبات دون أن يذوي الأوراق ويسهلها. يلتصق جيداً بجميع الأجزاء التي يلتصقها . لا خطر عليه من الوجبة السمية وحتى ثمة الذي يجعله بمثابة الجميع || وهو يضر بجزج عليل الكلس الحراق (الحي) مع مخلول سلفات النحاس بنية واحد الى واحد أو ٢ الى ٣ أو ٤ أو ٤ الى ٤ . واختلف هذه النسب يمد الى اختلاف النبات والوسم الفطري للتصديق وزين الاستعمال . ويجب ألا يغرب من بال أحد ؛

١ - أن النحاس هو المنتشر الفعال في هذا السائل .  
٢ - وجوب تخفيف هذا السائل في اوعية خشبية أو فخارية .

٣ - مراعاة تماثل نسبة الكلس من سلفات النحاس لان زيادة الكلس تلعب بفاعلة السائل كفاطور كما وان زيادة النحاس تذي فاعليته الفاضلة بالسالم والبقرة .

٤ - أن غليظ بُوْرُو الجاهز المورق في الاسواق لا يوازي السائل المنكسر تخفيفه في الزمرة .  
٥ - أن افضل ما حفر واستعمل يربياً .

١٣٠٩٢ - سَائِلِي بُورَغُونِي

Bouillie bourguignonne (F).

سائل مركب من سلفات النحاس وكبريتات الصودا مع الماء بمعدل ٢٪ سلفات النحاس مع ١٪ كبريتات الصودا . ولا يجوز استعمال هذا المخلول قبل التأكس من زوال سميته ويتم ذلك باستعمال ورق الفينول الاخضر فان ازرقق الورقة عند تطبيقها بالحبل كان السائل قلوياً وصح استعماله والا اضيف اليه ملوحي الكبريتات حتى زوال اللون الاحمر .

١٣٠٧١ - سَامٌ

نعت تعريفي يطلق على كل حيوان حوى بعض السم ؛ او باستطاعته القلق سمه لسا أو نهش الخ ....

١٣٠٧٢ - سَامٌ اَبْرَهِي هو الورقة ، اطلبها .

١٣٠٧٣ - سَامِيك

Ichtyophage, Placivore (F).  
Ichtyophagous, Piscivorous (E).

مفتر بالسلك من مختلف الحيوان والبر .

١٣٠٧٤ - سَامِيل

Limivore (F). Limivorous (E).  
الذي يعيش في الاسماك والاولاد ويقف من محتوياتها المضرة .

١٣٠٧٥ - سَامُور

Diamant brut (F).  
Rough diamond (E).

هو اللسان الخام كما يوجد في الطبيعة (رابع ماس) .

١٣٠٧٦ - سَامْدُورِي

Citharoxylum (S).  
Citharoxylum, Côtelet, Bois fidèle (F). Fiddle-

wood, Savannah wattle (E). Gaigenholzbaum (D).

Legno fidèle (I).

جلس شجيرات برية من فصيلة الساجيات مهددا لبلاد الاسعولية . اشجارها عذبة ، حمئة ، تستعمل في صناعة آلات الطرب .

١٣٠٧٧ - سَائِف

Caprophage (F).  
Caprophagous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على سفل القنطاريات .

١٣٠٧٨ - سَائِد

Produire alternativement (F).  
To produce alternately (E).

ساعة الشجر : حل سنة وتناوب اخرى . والشجرة السنية تدعى سنباه .

١٣٠٧٩ - سَائِلِي

هي كناعورة . ج سوان .

١٣٠٨٠ - سَاهِج

Fumifuge (F).  
Smoke-preventing (E).نعت تعريفي يطلق على كل شيء او مادة تهدد الدخان .  
١٣٠٨١ - سَاهِجVent violenc (F).  
Strong wind (E).

الريح الشديدة الريح .

١٣٠٨٢ - سَاهِر ، ذَيْلِ الكَلْب

Cynosurus cristatus (S). Cynosurus, Crételle des

prés (F). Dog's tail-grass (E). Echtes kammgras (D).

Ventolans dei prati, Lenticulus cristatus (I).

نبات عشبي طلي يري من فصيلة النجيليات وسيط المكشريات . مهدد حوض البحر المتوسط . يملو نحو ٦٠ سم . يتكرر في الحشاي والجبال وفي المراعي الطبيعية . ثمة جيد الصف مرقوب فيه .

١٣٠٨٣ - سَاهِكَة

Vent fort (F). High wind (E).

هي الريح القوية الهبوب تحرك الشجر .

١٣٠٨٤ - سَاهُور

الساوور كالمات والطفولة ينفذ القصر بدارة .



ساهر

## ١٣٩٢ - سائل حاشوري

Bouillie insecticide (F). Insecticide wash (E).

هو ما صنع خاصة للقضاء على الحشرات التي تترى النباتات الزراعية وقد يختلف باختلاف المادة النشطة التي يتركز عليها ونسبة عنصرها الجاهلي .

## ١٣٩٤ - سائل زرنيخي

Bouillie arsenicale (F). Arsenical wash (E).

كل سائل حاشوري يدخل في تركيبة الزرنيخ . ولما كان الزرنيخ من السموم الفتالة لذلك يجب استعماله بروتية على أن لا يتصل استخدامه أبداً زمن الاضرار والمعد .

## ١٣٩٥ - سائل صابوني

Bouillie au savon (F).

Soap-wash (E).

يتركب من كبريتات الصابون والمصابين في الماء وذلك بمعدل ٢٪ كبريتات الصابون مع ٢٪ من الصابون . وقد يضاف مذوب الصابون حتى أزرقاق ورقة الطرشول .

## ١٣٩٦ - سائل فاشوري

Bouillie fongicide (F).

Fungicide wash (E).

هو من السوائل ما جعل خاصة لمكافحة التطور والقضاء عليها .

## ١٣٩٧ - سائل نحاسي

Bouillie cuprique (F).

Cupric wash (E).

هو كل سائل كانت إحدى مواد النحاس من مركباته المتصيرية الرئيسية .

## ١٣٩٨ - سائل نووي

Enchylème, Suc nucléaire (F). Enchylème, Nuclear

succus (E).

هو السائل اللطوي الذي يحيط بالجملة .

## ١٣٩٩ - سائل هضم

Suc digestif (F). Digestive succus (E).

عصارة حامضة طبيعية تفرزها المعدة تسهياً لحضم الطعام وتخليه .

## ١٣١٠ - سائلة ، سائلة

Liste en tête (F).

من شيات الخيل يعي الفترة التي تسيل على قصبه الانث .

## ١٣١١ - سائلة

Quadrupède herbivore (F).

Herbivorous quadruped (E).

السائمة كل راعية من الدواب . ج سوائم .

## ١٣١٢ - سبائك

Alchiba

السبا نعيم من كوكبة الغراب ويصغ أيضاً غباء ويتقار الغراب .

## ١٣١٣ - سبائك

Alchiba

السبا : البدو يحمله الليل من بلد الى بلد . ج سبايا .

## ١٣١٤ - سبائك ، سبيكة

Vin (F). Wine (E).

هو الخمر الجيدة . والسبائك : بياح الخمر .

## ١٣١٥ - سبائك

Index (F). Fore finger (E).

السبابة والسبة والسبابة والسبابة هي الاصبع التي تلي الإبهام .



سبائك

## ١٣١٦ - سبائكيات

Pterophoridae (S).

Pterophoridae (F). Pterophoridae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٦٠٠ منتشرة في معظم اسواق العالم || تسرح من الدروب الى قصبه الليل . طوائها خفيف الحركة ، محتدل القرصه والجرم || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، قضيفة . رؤوسها معتدلة الجرم . عيونها صغيرة ، ناشرة . قرونها الاستشعارية نحيلة . ملابسها نحيلة . مراهقها مستطيلة . حلماتها مقفولة . بطونها سهيفة الحمل . عادمة الزغب . روافشها صغيرة ، مستطيلة الشكل . الامامية منها ثنائية الاصابع المنثقة الاطراف ، الخلفية ثلاثية الاصابع المستقيمة . جرامها تامة النور . ظنايبها الخلفية مستطيلة ، ثنائية المناسخ الطويلة || اساريها مستغلطة الاجسام ، زباء . تميش داخل الثمار او داخل الافناد التي تنقبها وتغذها || خادراتها تحمي طور الاكمال مؤرصة مغلقة بالحصيفة او مؤزرة بحيط حريري المادة .

## ١٣١٧ - سبائك

هو البستان المهد لزراعة البقول ، راجع بستان خضر .

## ١٣١٨ - سبائك

هو الزيل ، راجعه .

## ١٣١٩ - سبائك

Linnimétrie (F).

Linnimetry (E).

علم يبحث في التغيرات الدورية التي تطرأ على مستوى سطح المياه في مكان معين .

## ١٣١٠ - سبائك

Sargus annularis (S). Sargus spirallion, Sargus,

Spartin (F). Sar, Sargo sparus (E).

سمكة بحرية من السرغوس وفصيلة الفرغيات . تكثر في المتوسط . جسمها صغير القد ، بيضي الشكل . نوبا الى الكهبة الفضية يملؤو تجذيع باغت . وفي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

## ١٣١١ - سبائك

Bouldre (F).

الموضع المخصص لجمع النفايات من تراب وواض .

## ١٣١٢ - سبائك الطير

Oiseaux de proie, Rapaces (F). Rapacious birds,

Birds of prey (E).

وتة من الطير تدعى الجوارح .

## ١٣١٣ - سبائك الاسدية

Heptandre (F).

لعت وصني تعريفي يطلق على الازهار المسببة الاعضاء الذكورية .

## ١٣١٤ - سبائك الاضلاع

Heptagone (F).

كل شكل هتسي مسج الاضلاع .

## ١٣١٥ - سبائك الاقدام

Heptagyne (F).

لعت وصني تعريفي يطلق على الازهار التي يحمل وزجها سبعة اقلام .

## ١٣١٦ - سبائك

Bague (F). Ring (E).

السبائك خاتم في رجل الطائر من جارح وغيره .

### ١٣١١٧ - سَبَّاقُ الْخَيْلِ (F). Course de chevaux (F). Horse-race (E).

ركض الخيل لمعرفة أكثرها صلابة وقوة وصلاية ومجاعة . وسباق الخيل من أنواع الرياضة التي اشتهر بها العرب . وكانت خيل السباق تعرف بالحلبة ( راجع سابق ) . وسباق الخيل يجري الآن في ميادين خاصة وفقاً لنظم مرمية الاجراء يتتبع بها كل صاحب جواد .

### ١٣١١٨ - سَبَّاقُ \* (F). Moustaches des animaux (F). Whiskers (E).

السبال عند الحيوان كالسودل او الشارب عند الانسان . وهي مجموعة من الحلب تملو الشفة العليا .

### ١٣١١٩ - سَبَّالٌ

جنس نباتات برية و زيربينة من فصيلة النخلات . انواعه عديدة . معظمها جلبي وبعضها سني . اوراقها زنادية ، مروحية . ازهارها كالفوري سحرها كثير القزوع . جانبها نصفية . ازهارها عشوية ، لائحة الزركاز . ترتيبها ثلاثة البلات . ثمرها كروية الشكل ، صغيرة القد ، سوداء اللون ، ثلاثية البذور ، غير مأكولة . اشهر انواعه ما يلي .

### ١٣١٢٠ - سَبَّالٌ اَدَمْسُونٌ \* ، سَبَّالٌ اَمْرَطٌ

*Sabal adamsii* (S). *Sabal d'Adanson*, *S. glabra* (F). سباله سنخية . اوراقه مروحية ، هيئة التشرم ، قشرها نحو النسر ، لونها الى اخضر البحري ، زلادها متصبب الزركاز يملو نحو ٩٠ سم . || يشكو من مقفوره الاشطاني الذي يقوده الى كثة الفسائل .

### ١٣١٢١ - سَبَّالٌ اُمَيْرِي

*Sabal blackburniana* (S). *Sabal prince* (F). بطي النمو ساقه تملو نحو عشرة امتار . قشرها يراوح من ٣٠ الى ٣٥ سم . اوراقه حيلة الخضر . الباقي . قشرها نحو ١٥٠ سم . زلادها باحت اللون ، جانبي الزركاز يطول نحو ٨٠ سم . || يرغب في المواقع الرطبة ويحب في الحدائق المحصنة .

### ١٣١٢٢ - سَبَّالٌ مَكْسِيكِي

*Sabal mexicana* (S). *Sabal du Mexique*, *S. serrulata* (F). بطي النمو . جذعه يملو نحو ٦ امتار . اوراقه مضفرة قشرها لا يقل عن ١٣٠ سم . زلادها منشاري الحافة يطول من ٧٠ الى ٩٠ سم . || اقليمه الشولفي البحرية . يرغب في الاراضي الرطبة والمواقع الدافئة .

### ١٣١٢٣ - سَبَّالٌ مُؤْتَفٍ ، سَبَّالٌ مُقَلَّتِي

*Sabal umbraculifera* (S). *Sabal paraol* (F). نوع من السبال . موطنه جزر الانتيل وبني وكوبا . جذعه متصبب ابيض يرتفع من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقه كبيرة ، مروحية ، قشرها نحو ٢٠٠ سم . لونها الى اخضر البحري . زلادها مؤتف شائك يطول نحو ١٠٠ سم . || يرغب في الاربة المصنعة الانساج والرطوبة .

### ١٣١٢٤ - سَبَّالٌ لَجْجِي

*Sabal minima* (S). *Sabal aculea* (F). نوع من السبال العادم الجذع . اوراقه مستطيلة الزناد . نصلها كثير التشرم ، جميل الخضر الزاني || يرغب في الاربة الخفيفة المعتدلة الرطبة ، بمعنى المواقع الباردة . تكثر زراعتها في المراكب .

### ١٣١٢٥ - سَبَّالٌ نَخْلِي \* *Sabal palmetto* (S).

*Sabal glaucescent* (F). ساقه قصيرة . اوراقه طويلة الزناد ، مستطيلة الخوص المنتعجة . مستطعة الزرع . كثيرة التفريش . نصلها الى الخضر البحري وتحسين عند انصاف زلده الثالث . يرغب في الاربة النضجة الانساج والرطوبة . يزرع في المراكب والحدائق . يتكاثر بالبذر .

### ١٣١٢٦ - سَبَّالٌ نَخْلِي \* هو الاسبانج ، الحلب .

### ١٣١٢٧ - سَبَّابٌ ، اَعْبِثَارٌ *Considerant* (F).

*Preamble* (E). هو في القرب المحقوقي احد الانساب التي ينسب عليها الحكم سواء اكان قضائياً ام ادالياً .

### ١٣١٢٨ - سَبَّابٌ *Cause*

هو القصد الذي يلزم في سبيله شخص نحو شخص آخر . وقد يكون ناقلاً وعاطلاً ورافعاً وعطوفاً وصورياً الخ .

### ١٣١٢٩ - سَبَّابٌ الْاِبْطَالُ *Rescisoire* (F).

*Rescisory* (E). هو السبب الاصل الذي بني عليه الابطال .

### ١٣١٣٠ - سَبَّابٌ \* *Alcea ficifolia* (S).

*Alcea rose*, *Passe-rose*, *Rose de mer* (F). *Andwerp hollyhock* (E). *Stockrose* (D). *Altea rosea* (I). نوع من الخيلاني وهو نبات زراعي زينة ممر يملو من ٥٥ الى ١٠٠ سم . ساقه خروقة . اوراقه عشوائية . نصلها خامسي التفريش سنن الحافة . ازهاره كبيرة مكسبة قشرها نحو ٥ سم . لونها الى الحمرة الوردية . ازهاره يستمر من حزيران الى الجليل .

### ١٣١٣١ - سَبَّابٌ *Peau tannée* (F).

*Tanned leather* (E). جلد البقر وكل جلد مدبوخ لا شعر عليه . وان كان عليه شعر ووبر وصوف فهو مصحب .

### ١٣١٣٢ - سَبَّابٌ مُقَلَّتُومٌ \* *Septoglossum*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات . انواعه ثلثة اللد والاذي تفيض على الافئدة والاوراق . || كئانه فسية التجميع ، ثنية اللون ، ثلثاً في الادة . بوياته مستطيلة الشكل ، مؤنورة ، ورة الانقسام الثنائي او الخاسي || اشهر انواعه سبتلوم الشيليك .

### ١٣١٣٣ - سَبَّابٌ مُقَلَّتُومٌ الشَيْكُوكُ \* *Septoglossum fragariae* (S).

فطر مجهرية يركب اوراق الشيك البحري والزراعي . مظهره الخارجي يقع سماء اللون ، تزيده الاطار ، مرقرة الزرايا ، قشرها يراوح من ٣ الى ٨ سم . تركيب نصل الاوراق ثنائي || يتكاثر بتغير الحليل من ١٥ الى ١٧ ٪ بواسطة الحامض الكبير الحليل من ١٥ الى ١٧ ٪ .

### ١٣١٣٤ - سَبَّابٌ مُقَلَّتُومٌ \* *Septomyxa*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات . انواعه عديدة معظمها رمية تركيب الاعشاب المقطوعة والمواد العضوية . تتميز بوياتها المصنوعة الناشئة في الطبقة الادية . كئاندها مستطيلة ، مؤنورة ، شائعة ، قياسها نحو ٣×١٥ ميكرون .



سبال اذنسون



سبال نخلي



سبت



سبتلوم الشيليك

الرطبة وتتغذى على نشاطات اشم الشمس || يعلو على الأساط والأغاد يقع صغيرة عديدة مبرحة أو كيفية التجميع نقل الحركة التنسفة وتكونت لنمو || في سبيل الوقاية يمسح حطب البصل في أماكن موهبة ثم تمرضه بعض الوقت لأشعة الشمس المباشرة .

#### ١٣١٤٢ - سبجة الشهبان

*Colletotrichum claviae*  
نظر مجهري يركب أوراق الشهبان فوفجيا || مظهره الخارجي نقط سود مبرحة تملأ صفحة التصل تضيق سير النسخ وتكون النمو وتسي الى الاضرار والالزاح || يكافح باستعمال اللسائل النحاسية الحيدة بمعدل ١ %

#### ١٣١٤٣ - سبجة الكتان

*Colletotrichum lini*  
نظر مجهري يركب الكتان في مختلف ادوار وتكوين من حين انتشار البزرة في التربة حتى الاضرار وتكوين البزور الجديدة || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة فضاء اللون سمراء المائلة تركب السوي والاوراق وتلتاح الزهرة وانحاءها || يكافح بتطهير البذار بواسطة الاملاح الفلزيقية .

#### ١٣١٤٤ - سبجيل

*Spigelia (S). Spigelia (F).*  
جس نباتات شتية سولية أو حمرة من فصيلة الورديات .  
الوانه ٣٠ بعضها زينة ومنها البري الطبي . سيقانها زرقاء .  
اوراقها متعاقبة لائحة لائحية الشكل . ازهارها انبوية .  
ثمارها جرداء كروية الشكل صغيرة القد . بزورها دقيقة .  
اشهر انواعها مالبي .

#### ١٣١٤٥ - سبجيل طبي \* ، عشبة الهند

*Spigelia anthelmia (S). Spigelia anthelmintica (F).*  
Indian pink, Worm grass (E). Indisches wurmkraut (D). Spigelia, Erba de bachi (I).

نبات عشبي طبي بري حولي يعلو من ٢٥ الى ٤٠ سم .  
اوراقه متعاقبة سنائية التصل . ازهاره دقيقة لونها الوردية .  
باطنها اصفر ، ثمارها جرداء كروية صغيرة القد || اوراقه وازهاره وسوقه طيبة موعودة وطاردة للديدان .

#### ١٣١٤٦ - سبجيل ماريلاندا

*Spigelia marylandica (S). Spigelia de Maryland (F).*  
عشبة سبوتية حمرة تملو من ٢ الى ٩٠ سم .  
كاملة . نصلها يضيي الشكل ، ذات اقسام الاخير ، خلي المروق . ازهارها مستطيلة خمسة التخصيص . صفراء اللون كمارها كروية مزودة || ازهارها يمش من ايار الى تموز .

#### ١٣١٤٧ - سبجيليات

هي الورديات نصيلة نباتية ، اطباء .

#### ١٣١٤٨ - سبجي ، قلايدي

*Moniliforme (F). Moniliform (E).*  
لمت تمريري يدل على شكل خاص من اشكال الزباني ونحوها قوامه فواصل سبية متتابعة ثقبه السبعة أو الثمانية .

#### ١٣١٤٩ - سبجي ، عديقية

*Screptococcus (F). Screptococcus (E).*

ويقال لها مكورة سبية ومكورة عقدية . يكثر به مستطيرة الشكل ثالثة توجد في كل مكان . تكثر بنوع خاص في المواد المغانة .

#### ١٣١٤٥ - سبج

*Ochropsora*  
نظر مجهري من نصيلة الورديات وحيد الجنس النوع يتميز بالبيات المبردة وبدماماته الاسطوانية الشكل القصيرة القد والتلطيظ القامدة || يتفعل على الثيرة فيركب الارزاق حل صفحتها السفلى . مظهره الخارجي يقع نصيلة لائحية الشكل والحجم لونها الى الصفرة ثم تتحول الى الخنثي حيث يرفع البشرة وتقرسها || اضراره زديدة لا تتسبب للكافة .

#### ١٣١٤٦ - سبجة

*Colletotrichum*  
جنس تطور مجهري من نصيلة الورديات . يتميز بحله اللون القاتم على التسميات الكثيرة || انواعه عديدة وفوفية ، اعرافها ما يتج .

#### ١٣١٤٧ - سبجة الاسبانج

*Colletotrichum spinaciae (S). Anthracnose de l'épinard (F). Spinach anthracnose (E).*  
نظر مجهري يركب اسفل الاسبانج فيصيب يباس الارزاق مظهره الخارجي يقع يضي كلها من ١ الى ٢ سم . تركب نصل الارزاق حل صفحته . قصاته سفولية ، كتابه وشية مستوية او قليلة التجميع ، قيلمها ٣×١٧ ميكرون || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية .

#### ١٣١٤٨ - سبجة البطاطا

*Colletotrichum stramentarium, C. solanicoles (S). Darcose de la pomme de terre, Enroulement flasque (F).*  
نظر مجهري يصيب البطاطا فيسطب للشع ويقرح الودن . مظهره على السوي قبل الاضرار وبهده سقم ويحل واستاطلة ثم قليل وانفحات في الارزاق يقع يباس التصل . وهو من الدمرات والجلود والسوي ، حتى ارتفاع ٢٠ سم . يقع صغيرة مبردة الزوايا ، فضاء او سمراء اللون باضة اللون . ومنه قطع البزرة المصابة يسلط ، حل مقطعا ، ويوجد حلقه صفراء او سمراء اللون تملو المنطقة القشرية . يقال انه لا يعيش في المناطق التي تملو ٦٥٠ مترًا وأنه يرغب في المناطق الظليلة || يكافح بتطهير البذار وباحتجاب الاربة الموردة .

#### ١٣١٤٩ - سبجة البندورة

*Colletotrichum phomoides*  
نظر مجهري يركب ثمار البندورة قرب ادراكها نضجها . مظهره الخارجي يقع مستديرة غالية اللون مبرحة ثم مراكية تشبه البشرة ثم الب || يكافح باستعمال الاملاح النحاسية ويحم من يضي الكبريت .

#### ١٣١٥٠ - سبجة الحمضيات

*Colletotrichum gloeosporioides (S). Anthracnose des citrus, A. des limes (F). Anthracnose of limes, A. spot, A. tear-stain (E).*

نظر مجهري يصيب بعض انواع الليمون منها الاراج والليمون الهندي والخامض والمحو والتانج والبرتقال . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سمراء اللون تركب نصل الارزاق يقابلها جفاف في نواحي الاثنان فيصيب يباسها . يكافح باستعمال سائل بوردر الحليل ١٪ او غيره من الفولباير الحديثة .

#### ١٣١٥١ - سبجة الزيتون

*Colletotrichum circinans (S). Anthracnose des lilacées (F). Anthracnose of lilacosa (E).*  
نظر مجهري يركب بصل الزيتون وسوقه . يسلط في الوقت



سبجة البندورة



سبجة الحمضيات



سبجة الزيتون



سبجيل طبي



## ١٣١٦٢ - سَبْرودَة الْمُتَوَسَّطَة

نوع من السبر يعرف بأبي اليسر، الحليه .



سب شائع

## ١٣١٦٣ - سَبْرودَة، سَبْرودَة، سَبْرودَة

Spergula (S). Spargule, Spargula, Spargoule (F). Spurry (E). Spark, Spargel (D). Spergola (I).

جنس نباتات عشبية حولية برية وزراعية من القترنليات .  
سوقها خضراء غبراء . أوراقها لائقة متعاقبة خطية الشكل .  
أزهارها فردية ، زنادية ، صغيرة القد ، ريمية || أشهر  
أنواعه السبرغولة الحولية .



سبراله

## ١٣١٦٤ - سَبْرودَة حَكَلِيَّة \*

Spergula campestris (S). Spargoule des champs, Spargoule (F). Sylvan spurry (E).

نوع من السبرغولة الزراعية الحولية تنمو من ٢٥ إلى ٥٠ سم .  
تُزرع في الأراضي الاستيعابية لأنها تعتبر من  
الاعشاب المفضلة للعلية التي تقيد الإيقار الحلوب وتحميها  
على الدبر .



سبرغولة حقلية

## ١٣١٦٥ - سَبْرودَة، سَبْرودَة، سَبْرودَة

Rustique (F). Rustic (E).

لمت تعرفي يطلق على كل نبات لا يتطلب تربة صينة  
ومناخ خاصة ويقتضيه نمطه .

## ١٣١٦٦ - سَبْرودَة

Saperda (F). Saperda (E).  
جنس حشرات غشائية من فصيلة القترنليات || أنواعه  
عديدة . أجسامها مستطيلة القد وسطرية . زواياها شوكية ،  
مستطيلة ومقوّمة . رجليها تعيش على المواد الخشبية الحية  
واليابسة || أشهر أنواعه وأضرها ما يلي .



سبرود امير

## ١٣١٦٧ - سَبْرودَة أَشْهَر \*

Saperda carcharias (S). Saperda chagrinata, Grande saperda (F). Gross popular borer (E). Grosser Pappelbock (D).

نوع من السبرود طوله يراوح من ٢٢ إلى ٢٨ سم .  
نوبه إلى الخيطي الاغبر تملأ ثغرة سوداء . عليه غصنات لكتفاله  
اصعب اللون || يرقته غشائية تقرض جلود الحور  
كثيرة لفضليها .



سبرود البندق

## ١٣١٦٨ - سَبْرودَة السُّنْدُوق \*

Oberon linearis (S). Saperda du noisetier (F). Oberon linearis (E). Haselbock (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٣ سم . نوبه إلى السوداء  
الاسفج . زواياها وأرجلها صفراء || يرقته تركيب افئدة  
البندق تقرضها وتسبب يباسها .



سبرود الحور

## ١٣١٦٩ - سَبْرودَة الْحَوْر \*

Saperda populea (S). Saperdu du papulier (F). Popular borer (E). Kleiner Pappelbock (D).

نوع من السبرود طوله نحو ١٢ سم . نوبه حتى اللون ملو  
مواج بني . عليه كثيف التجميع اسفج اللون || يرقته  
تركيب الحصان واثنان الحور تقرضها وتعلبها .



سبرود سلمي

## ١٣١٧٠ - سَبْرودَة سَلْمِي \*

Saperda scalaris (S). Saperde echelle (F).

نوع من السبرود طوله نحو ١٦ سم . نوبه إلى الخيطي  
الاسفج المواج ملو يتجزع وزواكن سود تشبه السلم .  
عليه قليل التجميع اسفج اللون || يرقته غشائية غالبة  
تركيب مختلف الأشجار والاعشاب اصعبا السجبان  
والجوز والحور وتتفاح والكرز تقرض غله وتشكبه الاجبار  
الحية والاعشاب اليابسة .

## ١٣١٥٠ - سَبَّحَة هي للنقع ، الحليه .

## ١٣١٥١ - سَبَّحَة مَالِيَّة

Marais salant, Salin (F). Salt marsh (E).

كل ارض تركبها المياه البحرية وترسب فيها الملح .

## ١٣١٥٢ - سَبَّحِيَّات

Bryindes (F).

رتبة من الحالبات اجناسها وانواعها كثيرة العدد تنجم  
الى فصليتين الجوكيات والصربغيات .

## ١٣١٥٣ - سَبَّحَة

سبد الفرخ بدا ريشه يشبه .

## ١٣١٥٤ - سَبَّحَة

Bourra (F). Kind of down (E).

ما يطلع في رؤوس النبات وراعه قبل ان ينشجر . ج اسباب .  
والسبد ما تلبه من الشعر أو الور .

## ١٣١٥٥ - سَبَّحَة

Plumule (F).

الجزء النابت من البزرة أو الحبة .

## ١٣١٥٦ - سَبَّحَة

Caprimulgus (S). Engoulevent (F). Goatsucker, Nightjar (E).

جنس طير من فصيلة السبديات . النوع ٧٥ مقترن  
في جميع الاقطار . اجسامها مستطيلة . رؤوسها حلقة  
مقلطحة . مناليتها صغيرة . اشداها . واسعة . انماها  
قصيرة . اجسامها غشقة مستطيلة . ارجلها قصيرة  
سمرلة || تقترن في الارض بين الاضباب والادفك .  
انماها يتدح من ٤ إلى ٦ يشات تحسها من ١٦ إلى  
١٨ يوما || جميعها من الرواس القواطع . قترنا  
الغدرات حل اختطافها || أشهر أنواعه السبد الشائع  
والغصية .

## ١٣١٥٧ - سَبَّحَة شَائِعَة \*، أَسْرُوسِيَّة

Caprimulgus vulgaris (S). Engoulevent commun (F). Common nightjar (E).

نوع من السبد طوله ٢٨ سم . وريسته ٥٨ سم . ريشه  
شديد النعومة متوسط اللون لونه إلى القمرة والسواد يملو  
تديج وتديج وتؤشج || وهو من القواطع يحوي البلاد  
في طلب المصيف والشتي يقترن في لبنان بغير النش .

## ١٣١٥٨ - سَبَّحِيَّات

Caprimulgidae (S). Caprimulgidae (F). Caprimulgidae (E).

فصيلة السبديات من رتبة الجوارح المتفرقات المناير .

## ١٣١٥٩ - سَبَّحَة ، سَبَّحَة ، سَبَّحَة

Soudage (F). Soudage (F). Soudage (F).

نحري حتى الطبقات الارضية وتناموها .

## ١٣١٦٠ - سَبَّحَة

Glaréoles (F). Glareoles (E).

جنس طير من السبديات القترنليات . انواعه المعروفة  
١٥ جميعها من القواطع . ارجلها قليلة العدد . تألف  
الشعيرد الزيلية والمناير السبقة . انواعها رصاصية اللون .  
اعنتها وبطنها بيض . قوائمها وأطراف ادنائها ، الغافة ،  
سود || أشهر أنواعه سبرة المتوسط .

## ١٣١٦١ - سَبْرودَة \*

Sobralia (S). Sobralia (F).

جنس نباتات تربينية من السبليات . منها اريكة  
البصل . ازارها خلية البصرة ، حبة الشكل ، مزركشة  
الالوان القلعة الزاوية للمواج || تُزرع في الماكن  
والصاري .

**Sepsis (S).** ١٣١٨٢ - **سَبْسِيْدِيَّة**  
**Sepsis (F).** **Sepsis (E).**  
 جنس حشرات من فصيلة السبسيديات ورتبة ذوات الجناحين. أنواعه المعروفة عديدة أصلها مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٦ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها غامرة. أظفارها صغيرة. كولسها شبه اسطوانية، محزورة. بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة الخضاب. قوائمها مستطيلة. أطوارها كبيرة ، جميعها وحيدة اللون || الجملانة تعيش على رقيق الأزهار اغصانها الخشبية. البرقة نائلة او دامتة .

**Sepsidae (S).** ١٣١٨٣ - **سَبْسِيْدِيَّات**  
**Sepsidae (F).** **Sepsidae (E).**  
 فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأطوارها المعروفة عديدة منتشرة في جميع أقطار العالم || أجسامها صغيرة تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة ، حولها فارقة عند الشقين. قرونها الاستشعارية قصيرة ، ثلاثية الفصل. ملاسها صغيرة او غامرة. بطونها خفيفة القاعدة والمؤخر. وراشها قليلة الخضاب. افخاذ وفنابيب قوائمها الامامية والخلفية مزودة بمخاض حادة || ذكور بعض أنواعها مجهز بلدد تنضح افرازات عرفها كعرق الخنثوق || الحشرة الجملانة تعيش على رقيق الازهار او على المواد النباتية او الحيوانية الجزئية المتحلل. البرقة قد تكون غاضلة او دامتة او لائلة او للابسة || أشهر اجناسها السبسيدي .

**Tribu (F).** ١٣١٨٤ - **سَبْسِيَّة ، قَبْسِيَّة ، وِدْف**  
**Tribe (E).**  
 مركزه في تصنيف الاحياء بين الفصيلة والجنس. لذلك فالفصيلة تشمل بعض الاسباط والسبط يشمل عدة اجناس .

١٣١٨٥ - **سَبْسِيَّة** نبات كاللبن مرعى جيد (السان) .

**Septupler (F).** ١٣١٨٦ - **سَبْعِيْن**  
**To increase sevenfold (E).** ضاحك الشيء سبع مرات .

**Bête féroce (F).** ١٣١٨٧ - **سَبْعِيْن ، سَبْعِيْن ، سَبْعِيْن**  
**Carnivorous animal (E).**  
 هو الحيوان المفترس . ج. سبع وسباع . م. دببة . ومن الطيور ما أكل اللحم غلباً . وأرض سببة اي كثيرة السباع .

١٣١٨٨ - **سَبْعِيْن** هو الجبيل ، اطلبه .

**la Bête (F).** ١٣١٨٩ - **سَبْعِيْن**  
**the Beast (E).** كوكبة نجوم مشهورة باسم القلب ، اطلها .

**Baguer (F).** ١٣١٩٠ - **سَبْقِيْن**  
**To ring (E).** سبق الطائر اذا جعل السباق في رجله .

**Epi (F).** ١٣١٩١ - **سَبْكِيَّة**  
**Ear of corn (E).** السبله والسبولة : السنبلة من الحنطة وقمحها . وهي أيضاً شكل من اشكال الازهار قوله محور تجتمع حوله الازهار وتتصاقب || يقال اسبل الزرع : اذا غرست سبلته .

**Glaucolidae (S).** ١٣١٧١ - **سَبْرِيَّات**  
**Glaucolidae (F).** **Glaucolidae (E).**  
 فصيلة السم من الزرقائيات تنتمي الى رتبة طواك السك .

**Cypris (S).** ١٣١٧٢ - **سَبْرِيَّيْس**  
**Cypris (F).** **Cypris (E).**  
 جنس حيوانات مائية من القشريات الدنيا الصفيات وفصيلة السبريبيات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم انهر وبحيرات وبتاقع العالم القديم || اجسامها عديدة الصغر ، حادة التكسك ، مستطيلة الزباني . أظفارها ملونة ، ملسة ، رقيقة ، ثنائية المصارع الصغية الملسة .

**Cypridinidae (S).** ١٣١٧٣ - **سَبْرِيَّيَّات**  
**Cypridinidae (F).** **Cypridinidae (E).**  
 فصيلة حيوانات مائية ، بحرية ونهرية ، من القشريات الدنيا الصفيات || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد بعضها بحري والبعض الآخر نهري || تتميز بأظفارها الثنائية المصارع الصغية || أشهر اجناسها وأكثرها انتشاراً السبريبي .

١٣١٧٤ - **سَبْرِيَّيْك** هو انتاف المعروف ، اطله .

١٣١٧٥ - **سَبْسِيْس**  
**Seps**  
 من سمم الحيوان لفرق الذكور امين الملوث . هو اللعانة ، واجبها .

**Gongyle ocalé (F).** ١٣١٧٦ - **سَبْسِيْس اَنْصَر**  
 هو اللعانة النمرة ، اطلها .

**Seps chalcidé (F).** ١٣١٧٧ - **سَبْسِيْس مَحْفُظ**  
 هو اللعانة المحظية ، اطلها .

**Savane (F).** ١٣١٧٨ - **سَبْسِيْب**  
**Savanna (E).** هو المفازة الشاسعة المترامية الاطراف كثرت مروجها واشجارها الطويلة المرمية .

**Felis ruppelli (S).** ١٣١٧٩ - **سَبْسِيْب**  
**Chat de Ruppell (F).** **Cat of Ruppell (E).**  
 نوع من السنائير البرية قريب الشبه بكتاف . موطنه الحيشة والندوة ويصر . جسمه يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. وزنه من ١٦ الى ١٨ سم. ثوبه الى الصبغة الرمادية يمتزج مع اقترابه من شمس الظهور ويقلو ويمزج معتمض أسود يكتنفه من قاعدة الفتق الى طرف الذنب .

١٣١٨٠ - **سَبْسِيْسْتَان** هو الدقيق ، اطله .

**Cybister (S).** ١٣١٨١ - **سَبْسِيْسْتَر**  
**Cybister (F).** **Cybister (E).**

جنس حشرات مائية مفترسة من عمديات الاجنحة وفصيلة الكيزويات . أنواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم اغصانها المناطق الحارة . اكثر انواعه يألف المياه العذبة وبعضها بحري . قوتها كل ما تيسر من حشرات وقشريات وبلابيط واسماك صغيرة || اجسامها كبيرة اقتره ، املحبيبة الشكل ، مبطلة . تتميز بكبر قوائمها الخلفية ايجافية الشكل والاستمال . أطوارها سريعة الانوار للمابة يكثر فيها الجروي والكسني واليني والاشهر اللامس .



سبريس



سبسيب



سبينيلس

Cabus (S). **سَبُون** \*، **سَجُون** \*  
Sajou (F). Sajou, Sapajou (E).  
جلس قرد امريكية من فصيلة السجونات. أنولاه ١٩  
موطها يمتد من البرازيل الى نيكاراغوا || اجسامها  
رشقة. رؤوسها صغيرة. قوائمها متوسطة الطول. اذانها  
كاسية معلقة لا اعادة. اذنها قصيرة الشعر اليه  
التيان الاولان || تألف القنات. مرتها الاجرام  
تسريح في قمها || جماعها قليلة العدد تتألف من  
ذكر وثلاث اناث ويضئ الجراء || قوتها الجار والبرام  
والشحات ويضئ الطير.

Cabidae (S). **سَبُونِيَات** \*  
Cébidés (F). Cébidés (E).

فصيلة قردة من المكاربات موطها البلاد الامريكية.  
انواعها المروفة ٦٦ تنجسها ١٥ اجناس. تتميز بجلودها من  
الاضواء والكتائب. بالمطالة اجسامها الرشقة وباذنابها  
الأعذة || تألف النباتات والاحراج الكثيفة الرطبة.  
تعيش على الاشجار تنقل حليها بقعة مدحمة. جماعها  
تد من ٢٠ الى ١٥٠ || قوتها الجار والبرام والحشرات.  
الانثا تقسم من جرد الى جردون || اما اجناسها  
فهي التالية بالترتيب الابجدي: آكل، اواكرى،  
راكيتل، دروكول، ساي، سيوس، ستور،  
كرزورتيكس، كليترش، لقوقيش.

١٣٢٠٣ - **سَبُون دَهَنِي** هو الدرع، اطله.

١٣٢٠٥ - **سَبُونَه** هي البيلسان الاسود، اطله.

١٣٢٠٦ - **سَبُون**، **ثُوم قَسِي**  
Allium fistulosum (S). Ciboules (F). Welsh onion (E).  
نبات يصل عمره من فصيلة البقوليات. اذناه قرصية  
الانتصاب متصببة تطول نحو ٢٠ سم. يتصلها شراخ  
اجوف يصل نحو ٥٠ سم. تكلمه قسمة كثيفة، سيوانية  
الفكل، اذناها يبيض اللون غسر المراج || ضرره  
الرعاية عديدة جميعها ترطب في الارابة البالية الخفيفة.  
وي تكتمل كسولة وليس كسرة.

Crin (F). Coarse hair (E). **سَبُونِي**  
السبي من الفرس: شعر النامية والرف والذنب.  
فروس غثيف السبي. الرواسدة سبية.

١٣٢٠٨ - **سَبُونَج** هو الجيار، اطله.

١٣٢٠٩ - **سَبُون**، **كُحُول**

Alcool, Esprit-de-vin (F). Alcohol (E).  
سائل يستخرج من تقطير التينة او صير العنب المختصر  
او غيرها من الثمار والحبوب وغضف المسواد النباتية  
المختصرة || وهو سائل شفاف. سويج التبخير،  
حاد الحليم يكرى الحلق. يغلي في ٧٨ + سغ. ويجمد  
عند ١٣٠ - سغ.

١٣٢١٠ - **سَبُونَك** هي اللون الابيض، اطله.

١٣٢١١ - **سَبُونَقَر**  
نوع من مالك الحزين يضي بلشون جبار. كتيه ايويلزاد



سبون

١٣٢١٢ - **سَبُونَكَة** هي ذنب الصلب، اطله.

١٣٢١٣ - **سَبُونَكَة** هي الابل، راجه.

Jaguarondi (F). **سَبُونِي امريكي**  
حيوان لاح مفترس يضي جنفوندي، اطله.

١٣١٩٣ - **سَبُونِيَات**  
هي السبنيات لفصيلة نباتية، اطله.

Spondylus (S). **سَبُونِيْلَس** \*  
Spondyle (F).  
بحار متوسط القند حديد النواي السلفية يكثر في بحار  
البلاد الحارة.

١٣١٩٥ - **سَبُونَك** هي الاغراس الامريكي، اطله.

Sapotaceae (S). **سَبُونِيَات**  
Sapotacées (F). Sapotaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين، وحيوات القتالة،  
مرتقات الحبش. اجناسها ٣١ مهدا المناطق الاستوائية  
والحارة. فيها الاشجار والشجيرات والجنات. اوراقها  
متعاقبة، كملدة، جلدية النصل. ازهارها ابطية الارتفاع.  
ثمراها حشوية الشكل. يستخرج من مطم اجناسها صارة  
صلبة صناعية تدعى طبرخي || اشهر اجناسها الاغراس  
والبرام والاباجان والكنيت.

Salenteu (S). **سَبُونَج** \*  
Sébaste (F). Norway haddock, Rosefish (E).

جلس اسماك بحرية من شالكات الزمانف وفصيلة الجلائنيات.  
انواعها المروفة نحو ٣٥. جميعها من اسماك بحار المناطق  
الباردة والمعتدلة الحارة || اجسامها متوسطة القند وشيرة.  
سهلها مبرافي الشكل، شالك المقصدة. زعانفها الظهرية  
متعاقبة تتميز بشدها الشالك الاطراف. اذناها زاهرة  
الالوان الزائفة || اعرف انواعها واشهرها سبينة المتوسط.

١٣١٩٨ - **سَبُونَكَة المَشُونَكَة** \*  
Sebastes dactylopterus (S). Sébaste de la Méditerranée (F). Méditerranéan Rosefish (E).

سمكة من السجون اسطالها البحر الابيض المتوسط. طولها  
نحو ٢٢ سم. ثوبها الى الرودة الفضية الموهجة بالاعضر  
الوردي. زعانفها جلدة وبزركفة بالاعضر القراسي  
المراج. زعانفها الشرجية مملحة بمنخس حاد || لحمها  
كامن الصنف مأكول.

Ardoise (F). Slate (E). **سَبُونَر**  
حجر طوي التركيب سهل التصفيح ورصاصي اللون  
ازرق المراج او اسود. يتصل استعمال القرميد في تغطية  
سقف البيوت.

Sporonema **سَبُونَرِيَمَكَة** \*  
جلس فطور مجهرية من فصيلة الاولانيات. انواعها قليلة  
عمودة الاذن. بكتينياتها تدور مظلة ثم تنزلق عند  
الطراف جيلا. بكتينياتها يضيئة او اسطوانية الشكل،  
سبية شفاقة.

Ardoisé (F). **سَبُونَرِي** \*  
Saka-colour, Bluish-grey (E).  
نمت وصفي يطلق على ما كان لونه لون السبور.

S. nux vomica سترينكوس النقي\* ، جوز النقي

S. ignatii إينياس ، فول إينياس

S. icaia إيكاجيا

S. dewevrei دويلري

S. colubrina كولوبرينا

S. ligustrina ليفسترينا

من فئة النباتات الجعالية التي تسمم الدم والتي كان استعمالها على الحرايب شائعاً فيما مضى عند زواج أفريقية وأمريكية نخص بالذكر :

S. toxifera سترينكوس توكسيفرا

S. rouhamon روهامون

S. curara كراور

S. castelnaei كستلي

لحاء الجاهرا طيبة وبهشها يبيد الكلب والجملاد .

١٣٢٢٢ - سترينكوس القترع ، لكند ، لكند

Strychnos potatorum (S). Strychnos des buveurs (F). Clearing nut tree (E). Bergkrähenaugenbaum (D). Noce potatora (I).

شجرة من السترينكوز حديثة الخشب كبيرة دائمة . ثمارها مأكولة اللب ، بذورها حادة العناصر السامة ، روث الماء المكر وتنقيه .

١٣٢٢٣ - سترينكوس النقي\* ، جوز النقي

Strychnos nux-vomica (S). Strychnos vomiquier, Vomiquier (F). Nux vomica tree (E). Brachnussbaum (D). Noce vomica, Fungo di levant (I).

شجرة دائمة متوسطة القد ، ساقها كهيء اللحاء ، اغصانها مرسة . افتادها شائكة . اوراقها بيضية النصل ، خاسية البروق . ازهارها حامى الايتكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها كروية بحجم التفاح لونها الى الصفار البرتقالي . سيقانها لباني التركيب ، لبيض اللون مأكول . بذورها نحو ١٥ وهي لاقياسة الشكل ولقد . لونها الى الكهية البدرام يملها زغب هلي الشكل اسمر اللون .

وطه البزور نحوي :

١ من الى ١.١٩٪ سترينكين

٧ الى ١.٥٪ بروسين

ويستدل من الهيدروليز ان تركيبها النضوي يشمل ١.٥٪ من المنوز و٨.٥٪ من الفلكنكوز .

١٣٢٢٤ - سترينكوس النوبة

Strychnos innocua (S). Strychnos inoffensis (F).

شجرة من السترينكوس مهددة النوبة ثمارها مأكولة اللب اللذيذ الحام . بذورها حادة العناصر السامة تستعمل في بعض المستحضرات الطبية الموية .

١٣٢٢٥ - سترينكوس إينياس\* ، فول إينياس

Strychnos ignatii (S). Strychnos ignatier, Fèves de St Ignace, Vomiquier, amer (F). St Ignatus bean (E). Bittere Ignatie, Ignatienbaum (D). Fava di Sant' Ignazio (I).

جنية عارضة سريعة من السترينكوز . مهدا جزر الفيليين وزرع في الكوشئين والحد الشرقية . اوراقها بيضية الشكل ذائقة . ازهارها بيض . ثمارها كروية بحجم البرتقال الصغير . قشورها ملس ، لونها الى الصفار

١٣٢١٤ - صيت الحشن في البلادين ، اطلبه .

١٣٢١٥ - صيت حنديجكة في وزال الشرق ، اطلبه .

١٣٢١٦ - سقالة

Reiddu (F). Residue (E). هي الرذالة من المواد النباتية للمصونة كتفل ، لسان والشوندر والزيثون .

١٣٢١٧ - سترانج

Stratège, Stratégiste (F). Stratagus, Stratégic (E). من كان اختصاصه السرية .

١٣٢١٨ - سترانجي

Stratégique (F). Strategic (E). ما هو نخص بالسترية على اختلاف اهدافها .

١٣٢١٩ - سترانج

Stratège (F). Strategy (E). السرية فن تنظيم القوى الحربية والسياسية والاقتصادية والمعنوية عندما تدعو الحاجة إن في حالة الهجوم أم في حالة الدفاع . وبالتالي تعتبر السرية السياسية فن ترتيب وتجهيز وتوجيه جميع الاعمال المتروية في إطار مصلحة معينة .

١٣٢٢٠ - سترونيوم

معدن اصفر اللون يبيد في الطبيعة مزوياً ببعض المعادن والعناصر اغصانها الرصاص ويها البحر (ست-ست) وزنه الاتوني ٨٧.٥ ونقله النضي ٢٥٤٥ || نالته الكهرنالية ضعيفة . ينفكك الماء بالحرارة الطبيعية ويترج مع الكور واليود والكريت . اما اطلاقه الصناعية المختلفة فهي ما يتجم من مزيج مختلف الحامض .

١٣٢٢١ - سترينكوس ، سترينكوز

Strychnos جنس نباتات برية وزراعية . من فصيلة اللوفانيات . انواعه ٦٥ تقسم الى ثلاث فئات . فئة النباتات الصحية ، الطبية ، غير المؤذية . فئة النباتات السامة . وفئة النباتات الجسالية (الكرارية) . معظمها اثمار وجبهيرات ونباتات عارضة وبهشها عشي || مهدا البلاد الاستوائية . اوراقها منقطة متعاقبة كاملة . ازهارها حلقة التجميع ، ابطية او قاجية الايتكاز . ثمارها كروية الشكل ، برتقالية اللحم ، لحمية اللب ، ليفية القشرة . بذورها تحوي بعض الجواهر السامة والمواد الطبية النافعة ، والقلوية السامة كالسترينكين والبروسين والكرار . لحاء الجاهرا يستعمل في علاجات الاراضى الجلفلة . اغصانها تنفع الاراضى الصلبة || من فئة النباتات غير المؤذية والطبية نخص بالذكر :

S. iboga سترينكوز ايبوغا

S. innocua إينوكوا

S. potatorum بوتاتوروم

S. spinosa سبينوزا

S. vacuosa فاكاكوا

S. coeculoides كوكولويد

S. melanocarpa ميلانوكاربا

من فئة النباتات السامة التي تقضي على الجهاز الحيوى نخص بالذكر :



سترينكوس النقي



سترينكوس إينياس

١٣٢٣٣ - سكارين (F. Searine) (E). مادة دهنية قوامها الكلبيرين وأحد الحامض الدننية. تستخرج خاصة من لحم الحيات لا ساء فم الاسم.



مثل ناسك

### سكيبينج

السكيبية طائر يشبه اليام (هبط المحيط).

١٣٢٣٥ - سكيور هو الفاس، اطيه.

١٣٢٣٦ - سكيوركا (F. Schre) (E). ورقة قديمة مؤلفة من جهاز خاص يتوسط متراً مكماً واحداً من الحطب.



سنتور، زهاط

١٣٢٣٧ - ستيروس سايور (F. Steyro) (E). هو الحان لاسر، اطيه.

١٣٢٣٨ - ستروانوس (F. Styrenus). جنس فطور مجهرية من عائلة الحياتيات فضيلة الكميبيات. يتميز بكرياته البارزة الطرف الغزبي الشكل. كنانته طرية الاثناكاز سمية الصبغ مرهء اللون. انواحه قليلة جميعها رية تنوش حل المواد البتالية والفضوية المنسلة.

١٣٢٣٩ - ستيلاسيور (F. Scilaspore). جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريجات. انواحه قليلة العدد والاذن تركب طاء بعض الفريجات الحربية. يتميز بخصته الكينية المعلقة التي تقلب برفها من فتحة شقيقة تصدها بعد القذف. يوفها اسطوانية - مخروطية، موطرة، وباعية الانقسام، مرهء اللون.



ستيلاسيور

١٣٢٤٠ - سيثروب جيتور (F. Scythrops) (E). جنس طير من فصيلة القيقويات ودية المنسلطات، موته

ينت من ماليزيا الى استراليا. جسمه كبير القذف يطول نحو ٦٠ سم. يسطه نحو ٩٠ سم. قويه الى الكهبة المرقطة بالابيض والاسود. رداؤه الى انخضار الزني المالح. متفاده كبير وضلع. حنة حنه فانية اللون. حنه مطوة بجناح اسود. اخلاعه حنية كنه كثير الجبل والحذر. يعيش جماعات قليلة البند الذي يراوح من ٦ الى ١٢. قوته الزرعيات يحل اصدلها متفاده الصبغ ثم الزور والحشرات اصحاب الحيات الاجنسة والجراذ. طيراه طويل الشوط قليل التصيد والتبني. الاثني لا تنفش بل تنفع البيض في اصفاش فريده من البليز ولا تنفع في النش الواحد اكثر من بيضة.



سثروب جبار

١٣٢٤١ - صج (F. Endouire) (E). صج الحائط: سمه بالطين الرقيق. والسمية هي المشية التي يطل بها البليز وفي المائلة والملاق وللط واللطاط.

١٣٢٤٢ - صجج (F. Enduc) (E). صججج (F. Coeling) (E). الحلال الرقيق مها كان مصدره وبها كانت غايته.

١٣٢٤٣ - صججج (F. Pleuronectes) (E). جنس اسماك بحرية بيضة من فصيلة جانبيات العمود ودية للمساوات. انواحه المرفقة عشرة. اصنامها شطوط البسر

الترتقال. سوتها لابي مر الطم. يزودها من ١٠ الى ١٢ لونها الى الكهبة الزرقاء المالح يملوا زغب طلي الشكل.

وهذه البزور تحوي: ٥٠٪ من السريكينون ١٠٪ من البروسين.

٥٣٪ من اليونانين ونوعها ... ويستدل من الميلاوي ان تركيا الضوي يشمل ٤٤٪ من المنور و٦٠٪ من البكتوز.

١٣٢٢٦ - سريكينوس الغابون (F. Strychnos) (S). نبات صهي جزيل النفع يدهى ليدوها، اطيه.

١٣٢٢٧ - سريكينوس شاليك (F. Strychnos spinosa) (S). نوع من السريكينوز مدهم مفسكر. وهو شجرة صغيرة اللقد شالكة. ثمارها برتقالية الشكل والحجم. لهاها مأكلي زهر الصان الكرية للصحة الطم. يزودها قليلة العدد عادمة العناصر الجمالية.

١٣٢٢٨ - سريكينوس فاكاكوا، سريكينوس (F. Strychnos vacuosa) (S). مدهم فسكر.

نوع من السريكينوز يكثر في مفسكر. ثمره حنطة اللقد سرسه. ثماره كروية طرها نحو ٥ سم. لهاها برتقالي اللون مأكلي، صبارته فزرة، لليلة، صمينة وذكية العرف. يزور ثمار قليلة العدد، غالية من العناصر الجمالية غنية بمادة البكتونوزين القلوية لكنها لا تقوي الجسم البشري.

١٣٢٢٩ - سيكروركا (F. Neophron) (E). جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات.

١٣٢٣٠ - سكل (F. Néophron) (E). جنس طير من الكواسر ينتمي الى فصيلة النسريرات. انواحه قليلة جميعها كبيرة الجفة تتميز برأس اصليع وحتى اخضر يسقط طويل وذنب قصير ويشر احسن البيرة الشدية الانعاق. اشهر انواحه السدل اتانك.

١٣٢٣١ - سكل ناسك (F. Néophron pileatus) (S). نوع من السدل طوله نحو ٧٢ سم. يسطه نحو ١٦٠ سم. قويه الى السرة الكنتية. عته اخضر الريش اخضر اللون.

١٣٢٣٢ - سكتتور (F. Mcoates) (S). مدهم اخر. مدهم اذرق. رصاه وضاهه وصامية. موته البلاد الحارة والمعتدة. يعيش جماعات. سره لاقياس البند. ياتل ضواحي لندن والاسكار. قوته الخيف وقامة للندن. انشاء نبيض ثلاث يضاها تحضها بمنارة الذكر نحو ٤ اسابيع.

١٣٢٢٣ - سكتتور (F. Mcoates) (S). سكتتور (F. Stancor, Hurleur, Singe hurleur) (F). Howler, Howling monkey (E).

جنس قرود امريكية من فصيلة السبوسيات. انواحه ستة موطنها غابات البرازيل والباراغواي والبناتالا. اجسامها ربة، ورويسها غليظة. اصنامها بارزة. طلي ذكوريا كثيفة الشعر الطويل. اذناها مسطحة اسنائة. الياها سوية اللونان يكثر فيها الاسمر. قوتها البرام والازمار والاوراق والثمار. اناتها تنفع جروا واحدا.





سحابة

Lima (S).

Lima (F). Lima (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم عادات المصايد وفضيلة السحابة. انبعاثها المعروفة نحو ٤٠٠ بعضها من متحجرات الاراضي الثانوية والبعض الآخر، المعاصر، منتشر في جميع انحاء العالم || اصدافها شبه غروبية الشكل، متساوية المصاريح، شامخة التخذيد، ملونة بكثرة في الالوان الفاتحة والاحمر. بعض انواعها يطول نحو ٢ سم. || تعيش في الرمال وتنتقل بسرعة مدحقة تجديداً بمجرعها.

Varanidae (S).

Varanidae (F). Varanidae (E).

اسم شامل يطلق على بعض اجناس القورل. تتميز باستقامة اجسامها وبالسحب الملتصقة الزقية. اوتابها زائفة الاوتان تانك الويل الذي تعيش فيه.



سحابة الزيتون

Limidae (S).

Limidae (F). Limidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم، عادات المصايد وانواعها المعروفة متوسطة البند. معظمها من متحجرات الاباح الثاني. الانواع الثقيلة المعاصرة منتشرة في جميع انحاء العالم || تتميز باصدافها الشامخة التخذيد، بكثرة في الشكل القروبي || اعراف اجسامها واشهرها السحابة.



سحابة

Cerbera (S).

Cerbera. Mangrove latex (F). Indian mango tree (E). Ostindischer mangosbaum (D). Cerbera (I).

جنس اشجار دائمة خضرة كبيرة اللد من فصيلة الفليث. انواعها قليلة اورثاقها مثقبة متناوبة الحلجوية اصليها جلدي للنج عايق الخضر. انجازها يفر أو وردية شامخة بضيئة الشكل ولقد، وحيدة المصبة الكبيرة الصلبة. وهذه الاشجار بجميع اجزائها من الساق الى الورقة والثمرة غزيرة العصارة الجعالية المميته.



سحابة

Puccinia

١٣٢٧٨ - سحابة، صرق جنس فطور مجهرية من فصيلة الساميات تتميز بعلاماته الانزاسية الشكل التي تغلب فيها الانتعاش والصفحة. مشبه الفطري يعيش ويتكاثر على خلايا النسيج النباتية. فاعله شاملة مبيته او متناوبة مرصقة التجميع. انواعها الكثيرة المعروفة عديدة عليها اسمها ما يتبع.

١٣٢٧٩ - سحابة اسفحة، سحابة الحبيطة

Puccinia triticea (S).

Rouille brune du blé. R. b. du froment (F). Orange leaf rust (E). Braunrost des weizens (D).

فطر مجهرى شديد الاقوى يصوب الزروع في جميع اعضاءه فينفذ الانتاج ويأتي الصف اذ يلقاه بعض المواد الغذائية. مظهره الحليبي يهود قرصية مبيته، لانزاسية، مستورة الشكل قطرها يراوح من ٢ الى ١٥ سم. تركيب النصل على صفحته ولا تصف من القمم والساق وصفيحات السنبال. ثيو صلبة اللون، برتقالية الاطراف، ثم تنحرف الى الخروقة فالسفرة. تنضج من خيرات بيضة شديدة التصبغ لونها الى السفة تتطير ككباب || يكافح بمشاكل الكبريت الميكروبي او احد الفطريات الزراعية المؤثرة على الكبريت واملح النحاس.



سحابة اسفحة

Aérobiose (F).

١٣٢٦٤ - سحابة

حياة الكائنات السحابة (الهوائية).

١٣٢٦٥ - سحابة، هوائية، هوائية

Aérobique (F). Aerobic (E).

نمت ترميني يطلق على جميع الاحياء المجهرية التي لا تستطيع الحياة وتتكاثر بعيداً عن الهواء.

١٣٢٦٦ - سحابة، هوائية، هوائية

Aérobic (F). Aerobe (E).

صفة الكائنات المجهرية الحية التي لا تستطيع البش منطلقة عن الهواء.

Libanotis (S).

Libanotis (F). Mountain spigul (E). Echte hallwurz (D). Libanotis (I).

جنس نباتات عشية برية من السحابات وفضيلة الخياميات. انواعها ١٠ اقليمها المناطق الجبلية جميعها معروفة تنسب للملحة. اورثاقها مركبة مفرقة. سيقانها ليفية غزيرة العصارة.

Poumon (F). Lung (E).

١٣٢٦٨ - سحابة

السحابة والسحر والسحر: الرقة.

Sedilindes (F).

١٣٢٦٩ - سحابة

سبط من فصيلة الخياميات يشمل عدة اجناس اصحاب السحابة والقمرة والفيل والسحابة والبادجان.

١٣٢٧٠ - سحابة الزيتون

Bacterium savastoni, Phytomonas savastoni (S). Bactériose de l'olivier, Tuberculose de l'olivier, Tumeur bactérienne de l'olivier (F).

وسم بكتيري يصري الزيتون فورك بعض الانواع الفتية الضعيفة ثم ينتشر ويصم معظم الانواع والاضمان. مظهره الخارجي ذليل عشية التركيب لاقابسية الشكل والحجم والانشقاق، تغلب فيها الانتعاش تقفي على البثرة والفكر لانها تركب على اللادة الخشبية وتسفرها في نفسها فتصل دين تبادل النسخ او وصوله || يكافح بطنخ الاجار المصابة بطول فليوسيكيات البصوديوم المركز ٠.٥٪ وذلك بعد قطع جميع الاجزاء المصابة وسحقها. وقد يحسن تسميد الزيتون بالمواد المضوية مع اجتناب كثرة الازوت.

١٣٢٧١ - سحابة

السحابة عمل اقتصادي تمارسه بعض البلاد على حمل صادراتها او على انواع مينة منها فتعرضها في الاسواق التجارية بسعر ادنى من السعر المحلي حتى وادق من ثم التكلفة.

Pécule (F). Peculium (E).

١٣٢٧٢ - سحابة

المقر من السحل. وما اكتسبه وقته لنفسه المرووس. وما قتر لنفسه السجين او الاسير طيل مدة عقوبته او امره.

Ecalle (F). Shell (E).

١٣٢٧٣ - سحابة

هي قشر ابر والشعر ونحوه.

## ١٣٧٨ - سُحَامُ الزَّرْعِ \*، مَرَقَ الزَّرْعِ \*

*Puccinia graminis* (S). Rouille noire, Rouille linéaire des céréales (F). Stem rust of grain (E). Schwarzrost (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر النباتات النجيلية وأخصها الزرع فيطبع الصف والسائل ويلصق القصر بالمصقول. مظهره الخارجي بثور قرعية تملأ نصال الصف فتبدو صفيرة مستديرة ثم تكبر وتتصلب حتى تبلغ ١٢ م. لوها يكون إلى الشقرة المائقة ثم ينحرف نحو السرة عند ارتفاع بشرة النسيج التي يعقبها التفتير ويملوح النبات البويي || وقد يركب الزينات والسيليات فينتجها ببؤره وقروحه الخيطية التي تنتهي نهاية بثور الصف. انحراراً قد تكون حبيبة فياً لو مكنته الغوامل الجوية من سرعة الانتشار || مكافحته صعبة تستوجب الكثير من العناية. يكافح :

أولاً - باستعمال الفطروب المروقة بقوة مانعها والتي صار اختيارها اقليمياً في هذا السيل أو الفطروب الباكورية كالفلوريس أورور (Florence aurore) الذي صار اختياراً في لبنان وهو يقاوم هذا الورم لانه يدرك باكراً قبل انتشار السحام.

ثانياً - بالاجتناب الاكثار من عنصر الزرود لانه ينشط المواد البينية والخضرية ويؤخر الإدراك فيمرض الزرع إلى الإصابة.

ثالثاً - باستعمال الكبريت الميكروني تفتيراً على الزرع عند ظهور الورم. وهناك فواظير أخرى عديدة يمكن استعمالها لكنها باهظة الثمن.

رابعاً - بالقضاء على جميع نباتات البربريس (الأثرارة) القريبية والبينية من الحقل لأنها الزوج الثابت والبؤرة الحقيقية التي يعيش فيها عليها السحام.

## ١٣٧٩ - سُحَامُ الزَّرْعِ الْأَصْفَرِ \*، مَرَقُ الْأَصْفَرِ \*

*Puccinia glumarum*, P. rubro-vers (S). Rouille jaune des céréales (F). Yellow rust of wheat (E). Gelbrost (D).

نظر مجهرى شديد الاذى يصيب الزرع في جميع أصنافه وعلى اختلاف أنواعه وضروبه || مظهره الخارجي يتتابع على ثلاث مراحل. في الاول بثور صفر صغيرة اللقد متصلة متتابعة على شكل الخيطي تركب النصل في زامة الاخير بمزارة عرويه. وقد يبلغ امتدادها ٢ إلى ٣ سم. ويعد محيطها المتوازية من الثلاثة إلى الستة. وفي المرحلة الثانية اصفرار على ينصل الصف ينتج في الزرع الاخير على شكل قند متقطعة متوازية تحمل في جوفها بؤر السحام الاصفر الزاهي. وفي المرحلة الثالثة بثور حبيبة الشكل رائحة تركب الصف بدون انتظام وتصيب السوق والاغصان والسائل. صفرتها غامقة ذخية اللون || يكافح بالكبريت الميكروني تفتيراً على الزرع منذ المرحلة الاولى. كما يحسن تلف جميع النباتات الخضرية وذلك باستعمال المبيدات الخاصة. ومن المستحسن أيضاً سرق الحقل أو أثر الحصاد.

## ١٣٧٧ - سُحَامُ السَّيْسَمِ \*

*Puccinia anthrini* (S). Rouille du moflier (F). نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على السيم فيطبع الأوراق ويضعف النبات وقد يصيب موته || مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة حبيبة اللون غبراء الاطوار خضية التجميع تملأ نصال الأوراق على صفحاتها السفلى

## ١٣٧٠ - سُحَامُ التَّرْتَشُولِ \*

*Puccinia helianthi* (S). Rouille du tournesol (F). Sunflower rust (E).

نظر مجهرى واسع الانتشار يتطفل على مختلف أنواع وضروب الترتشول. يركب الأوراق فيؤذيها وقد يصيب جفاتها وسوقها باكراً. مظهره الخارجي بثور صفيرة مستديرة لاقيمية التجميع والارتكاز لوها إلى الصهبة المائقة تركب النصل على صفحة السفلى تغطى النسيج وترتدق القسغ وتصب الصفقة قلقة انتاج اللبر || يكافح باستعمال الادوية الفطورية اخصها المركزة على عنصرى الكبريت والنحاس.

## ١٣٧١ - سُحَامُ التَّرْتَشُولِ \*، مَرَقَ التَّرْتَشُولِ \*

*Puccinia bromina* (S). Rouille des bromes (F). Bromus rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على جميع أنواع وضروب الترتشول وهو كثير الانتشار في اوروبا وافريقية الشمالية || مظهره الخارجي بثور قرعية مبرمة او متاخفة طول النصل على صفحة العليا تبدو صهبة اللون وردية الاطوار الضيق ثم تنحرف إلى الجؤرة ويبقى عليها حتى تنجبرها || يكافح عند الاقتضاء مكافضة غير من السحام.

## ١٣٧٢ - سُحَامُ الثُّومِ \*، مَرَقَ الثُّومِ \*

*Puccinia alli* (S). Rouille de l'ail (F). Garlic rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على بعض نباتات الفصيلة الزنبقية وانحصار الثوم والكراث فتركب الأوراق دون ان يقع بها الاضرار. مظهره الخارجي بثور لوها إلى الصهبة، مصغرة ذائغ الفطر تملأ نصل الأوراق بدون انتظام ولا قياس ثم تنحرف تدريجياً نحو الجؤرة البنيصية وينتشر عليها حتى تنجبرها || انحراره زغبية لا تستوجب المكافضة.

## ١٣٧٣ - سُحَامُ الْخَازِيَاَتِ \*

*Puccinia malvacarum* (S). Rouille des malvacées (F). Hollyhock rust (E). Malvenrust (D).

نظر مجهرى يصيب أكثر الخازيات في اورتها وسوقها وزادها فيطبعها ويلهبها || مظهره الخارجي بثور صفيرة تركب الأوراق على صفحاتها السفلى وتركب السوق وكثير الزهر. تبدو برتقالية اللون يحيطها اطوار بتفسي ثم تنحرف إلى الجؤرة السمراء حيث ترغف كالتماليد دون ان تغير البشرة. وبعد ذلك بارية او خسة اسابيع تظهر ذائغ الفطر على التنايل فتبدو حبيبة اللون ثم تتحول إلى حبيبة خضية يعلوها سراج ايض. يكافح باستعمال اوكسيكلورير النحاس المفلول ١٪ عند ظهور الفطر وينتخ مرة ثانية موصداً بعد الاول باسيوين || ومنهم من استعمل رينثانات ليرتاق وهي ملقية اذا امتلعت في هذه الامر ولكنها تصعب عدية النفع عند ظهور الملائع.

## ١٣٧٤ - سُحَامُ الدُّوْمِ \*، مَرَقَ الدُّوْمِ \*

*Puccinia maydis*, *Aecidium oxalidis* (S). Rouille du maïs (F). Maize rust (E).

نظر مجهرى يتطفل على الذرة في جميع البلاد والاتالم. أثيراته تعيش على الخاض منها تنقل إلى الذرة. وهو من صنف الذرة ذائغ مبرمة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحة بمزارة الفقل فيبدو النسيج النحار قليل الخضيب اشقر البثور المتحبة بالاصفر ثم ينحرف لوها إلى الاصعب فالخضلي المايق || انحراره غالباً محدودة لا تستوجب العناية.



سحام الترتشول



سحام الترتشول



سحام الثوم



سحام الخازيات



سحام الذرة



سحام الزرع



سحام الزرع الاصفر



سحام الميسم



## سُحَام الشَّعِير - سُحَام قَصَب السُّكَّر



سحام الشعير



سحام الشيفان



سحام الكرز



سحام الكرز النائم



سحام الخيلون



سحام النعنع



سحام قصب السكر



سحام الهندباء

السفل قصب جفاف النسيج والنصل || وهو على السوق يبور مبشرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الباهية الحليئة للون || يكافح يظلم الأوراق المصابة ويضعف النبات بساق يورده الخيلون  $\frac{1}{2}$ .

### ١٣٢٩٣ - سُحَام الكَشْمِي

*Puccinia ribis* (S). Rouille du groseillier (F).  
فطر مجهرى يتطفل على الكشمش فيؤذي به وقد يمتد ظهوره الخارجي بقع نسيجة تركب نصل الأوراق النامية فتلوها . تبدو شذراء الين ثم تنصرف إلى السرة الزخمية وتتفتت يبيض النسيج المتناثر التي يتبعها يابس النصل وضعت الشجرة || يكافح باستعمال امد السوائل الفلوكسيلية الحليئة  $\frac{1}{1}$  نفساً على الكشمش قبل ازهاره .

### ١٣٢٩٤ - سُحَام النَعْنَع

*Puccinia menthas* (S). Rouille des menthes (F).  
فطر مجهرى يتطفل على بنس النعنعوات اصغها النعنع . مظهره الخارجي يور مبشرة صهباء الين تركب الأوراق على صفحتها السفلى وتتلو الجليلير وتلوي تصرفل سير النصل ونصل بذيل الأوراق وصفتها بعد أن تبين التلوي وحمل حين سيال نشاطها || يكافح بالتتابع وحرق النباتات المصابة قبل تقضي الوم . بين المستحسن من النعنع بالازوت النيتريكي الذي يخلصه على مقاومة هذا الفطر .

### ١٣٢٩٥ - سُحَام الحَلِيَّة

*Puccinia asperagi* (S). Rouille de l'asperge (F).  
*Asparagus rust* (E). Spargelrost (D).  
فطر مجهرى يتطفل على سوق الحليون فيطها ويؤذيها . مظهره الخارجي يور لمبة الشكل وردية اللون تلو السور مبشرة بدون انظام تصرفل سير النصل وتضرر النبات . يكافح باستعمال مئة وسائل اولها سائل يورده نفساً على النبات . ثانياً الكبريت تميراً على التربة والنبات . ثالثاً ديتيركرازيلات الصودا . رابعها زود الصروب للنبات التي تقاوم هذا الفطر .

### ١٣٢٩٦ - سُحَام الحَشْدَبَاء

*Puccinia elchorti* (S). Rouille des chichorées (F).  
فطر مجهرى يتطفل على اختلاف أنواع وفروبو اغنياء فيصيب الأوراق ويصطبها || مظهره الخارجي يور وافضة مستديرة لأنها إلى الصبغة تلو النصل على صفحتها السفلى تضطه وتمزقل نحو النبات || يكافح باستعمال سائل يورده الحلي من  $\frac{1}{10}$  إلى  $\frac{1}{1}$  حين ظهور الموراض .

### ١٣٢٩٧ - سُحَام قُرْمُزِي

*Puccinia purpurea* (S). Rouille du sorgho (F).  
فطر مجهرى يتطفل على قلة البضاء فيؤذيها ويضعف انتاجها || مظهره الخارجي بقع نسيجة قزمية الين تلو النصف واغصانه تضطه ويصحى الى نحو النبات بعد ان تمرقل سير نشه || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

### ١٣٢٩٨ - سُحَام قَصَب السُّكَّر

*Puccinia kuehni*, *Uromyces kuehni* (S). Rouille de la canne à sucre (F).  
فطر مجهرى يصيب قصب السكر حين ان يؤذيها فيصيب له حلياً يذكر || مظهره الخارجي بقع مستطيلة او مربعة الشكل مبشرة بدون انظام قليلة العدد تركب

تتسبب تغيير بشره النسيج ونصل الأوراق الذي يهبط مع النبات ويؤذي به || يكافح باستعمال الكبريت الميكروني تميراً على النبات مثل ظهور الفطر على ان تعاد العملية من المرات إلى الثلاث مرات . ومنهم من ينصح باستعمال سلقور البيليسوم الحلي  $\frac{1}{10}$  .

### ١٣٢٩٨ - سُحَام الشَّعِير \* ، مَرَق الشَّعِير \*

*Puccinia hordei*, *P. anomala* (S). Rouille naine de Forge (F). Barley rust (E).  
فطر مجهرى يتطفل على الشعير فيؤذي ويضعف من مقدوره الانتاجي ومن صفاته المشفوفة في صناعة البيرة . مظهره الخارجي برة صيرة تلو نصل المصبغة بعد غيب الزرع وتكون برة واحدة على النصل الواحد . تبدو يضاء الين ثم تنصرف نحو البرقنقل وتتفتت عند الفجانبها بالون الاصهب الامر || يكافح بمكافحة غيره من السحام .

### ١٣٢٩٩ - سُحَام الشُّوْثَان \* ، مَرَق الشُّوْثَان \*

*Puccinia coronata*, *P. coronifera*, *P. heli* (S). Rouille couronnée de l'avoine (F). Crown rust of oats (E). Kronen rost des hafers (D).  
فطر مجهرى يتطفل على الشوثان وعلى بعض التصيليات البرية . أثباته تمض عمل التصيليات والخلانيات . تظهر خلال شهر حزيران فيسود بقع مرساة صفر او حر مستديرة صيرة على صفحة النصل السفلى يقابلها على الصفحة العليا انتضاعات في النسيج والبرقنقل لأنها إلى الجروة || وهو على عصف الشوثان ضائع مبشرة بدون انظام تركب النصل ورطه على صفحتها قدير بقع مستديرة ومستطيلة مبشرة ومترامية كالخلاء لأنها إلى الصبغة الزخمية ثم تنصرف إلى الجروة وتتفتت بالون البنفسجي المائل || يكافح بمكافحة غيره من السحام بعد القضاء على ودجه الطبيعي للين أو الخلف .

### ١٣٢٩٠ - سُحَام الصَّبَا \* ، مَرَق الصَّبَا \*

*Puccinia vineae* (S). Rouille de la pervanche (F).  
فطر مجهرى يركب مختلف أنواع القصب فيؤذيها وقد يقتضي حلياً || مظهره الخارجي يور مستديرة كيفية انتجيم تركب الأوراق على صفحتها السفلى وتصبب السور والفروع . تبدو صهباء الين ثم تنصرف نحو الحلي حيث تتغير من بور حبابي لمر || اما الاراق الحلي المصابة فتب صيرة فقد رافضة النصل الحش مجهم الحلية || يكافح عند ظهور الوم يستعمل سائل يورده الحلي  $\frac{1}{1}$ .

### ١٣٢٩١ - سُحَام الكَرَز \* ، سُحَام لَدَرَّاك \* ، مَرَق لَدَرَّاك \*

*Puccinia cerastii*, *P. pruni-spinosae* (S). Rouille du cerastier, R. du pêcher (F). Rust (E). Zweischenrost (D).  
فطر مجهرى يصيب الكرز والدرراكي والوجع فيؤذي بعض اوراقه دون ان يقع بها اضراراً تذكر || مظهره الخارجي بقع صفر تركب النصل على صفحتها السفلى يقابلها على الصفحة العليا مواج احمر او بنفسي يدم بعض الوقت ان تنحصر البرة من بور حبابي اصهب الين .

### ١٣٢٩٢ - سُحَام الكَرَزِيَّات \* ، مَرَق الكَرَزِيَّات \*

*Puccinia chrysanthemi* (S). Rouille du chrysanthème (F).  
فطر مجهرى يصيب الكرزانيات في اوراقها ويؤذيها فيؤذيها . مظهره الخارجي يور مبشرة مستديرة مبشرة قليلة العدد لأنها إلى الصبغة الزخمية تركب الأوراق على صفحتها

تتركب من ١١ فصلة . احادها لاسفة . جرامها نشطة .  
ارسانها ثلاثة المقل || اشهر اجناسها السحليل والسهبية .

Traffic Illicita (F). ١٣٣٠٤ - سَحْتٌ

Illicit traffic (E).  
السحت والسحت الرقاعة المحظورة أو ما سقطت من  
مكاسب عرمة .

Bourgeon à fleurs (F). ١٣٣٠٥ - مَسَحْنَةٌ  
Blossoms bud (E).  
الاية القليظة في اللمن .

Abrasion (F). ١٣٣٠٦ - مَسْحٌ  
Abrasion, Attrition (E).

المسح الاستهلاك بالاحتكاك المستمر كسح الأسنان  
في القم وكسح مياه البحر لصخور الجواهر .

Traumatisme (F). ١٣٣٠٧ - مَسْحَةٌ  
Traumatism (E).  
الآثر الذي يحدث من غشش أو جرح . ج مسح ومسوح .

Broyage (F). Crushing (E). ١٣٣٠٨ - مَسْحٌ  
دق الشيء اشد الدق .

Pécune (F). ١٣٣٠٩ - مَسْحَلٌ ٥ ، نَقْدٌ  
المسحل النقد من الدراهم .

Chaetodon (S). ١٣٣١٠ - مَسْحَلٌ  
Chétodon, Poisson papillon, Demoiselle, Bando-  
lière (F). Butterfly fish (E).

جس سمك بحرية من فصيلة السحليات . انواعه عديدة  
جميعها صغيرة القد ، قصيرة ، مبطلة ، عرضها يوازي  
ثلاثة ارباع طولها . ألوانها جميلة زاهية متراكبة عليها  
تجميع مفرس متقابل وزركشة بيضاء لامة || موطنها  
بحار البلاد الحارة . انواعها المبرودة في المتوسط  
ثلاثة :

Chaetodon saxatilis (S). محل الصخور ، تنقرت  
Chétodon saxatilis (F).

Chaetodon argenteus (S). محل نضي  
Chétodon argente (F).

Chaetodon maculosus (S). عرصة البحر .  
Chétodon maculé (F).

Salap ١٣٣١١ - مَسْحَلَبٌ  
مادة نقوية تستخرج من بعض انواع السحلب الزراعي .

١٣٣١٢ - مَسْحَلَبٌ ٥ ، عَصَى الْقَحْلَبِ ، عَصَى  
الكَتَبِ ، قَائِلُ أُخْبِهِ ، سَطْفُورِيُونُ

Orchis (S). Orchis, Barbène, Sazyron, Salap (F).  
Orchis, Lizard orchis (E). Bockerslenszunge (D).  
Orchide, Satirione, Testicolo di cane (I).  
جس اشعاب عشقوية ممرمة من فصيلة السحليات .  
انواعه للمبردة نحو ٨٠ معظمها بري وبهشها زراعي  
وتربسي . يستخرج من ساقها بعض انواعه مادة نقوية  
يصفها يبيض كالجليب ويؤكل || اعرف انواعه  
واشهرها :

Orchis maculée مَسْحَلَبٌ أبيض  
Orchis d'Anstolie مَسْحَلَبٌ أناسولي

نصل المسح . فهو سحلية الين عمالة جملة ضيقة  
تنبية ثم تنحرف نحو السرة وتبين على سحرها حتى انفجارها .

١٣٣١٩ - سُحَامٌ مَشَاتٌ ٥ ، مَرَقٌ الشَّيْطَانِ ٥  
Puccinia dispersa (S). Rouille brune du seigle (F).  
فطر مجهرى يتطفل على التيلم فيؤذيه . مظهره الخارجي  
يبدو قرحية ميمرة بدون انتظام تركب النصل على  
صفحته وتصيب الاحاد والوق وسيفقات السنايل .  
يتلو مستدرة صغيرة لونها الى الصبغة ثم تكبر وتفتش  
فينحرف لونها الى الجلوة وتفتشر من يوغ جيلي لونه  
الى الجلوة السراء || يكاثف كثيره من السمام .

Pucciniasae (S). ١٣٣٠٠ - سُحَامِيَّاتٌ ٥  
Pucciniasae (F). Pucciniasae (E).

فصيلة فطور مجهرية من رتبة السحليات تتميز بظلالها  
الدائرية التركيب والانتظام || دعاماتها فردية أو  
عديدة الانسية . بويضاتها فردية أو شعبة الانقسام عمولة  
على احيات (زكاثر) شاذلة فروية أو ملوطة جامدة  
وسرعة السط . خديتها خاضعة لجميع الامينات كيشا  
كانت || اجناسها عديدة . اشهرها زوايا واقتصاديا  
الثانية التالية : السمام ، الفشول ، الصدنية ، الصنعة ،  
الضبهة ، الظفرة ، الكشنة والمسيلية .

Retrait d'agrément (F). ١٣٣١١ - مَسْحَبٌ الْمُوَافَقَةِ  
Right of consent (E).

عمل يميزه القانون يقضي بالماله الموافقة المتفق عليها .

١٣٣١٢ - مَسْحَبِيلٌ لِمَرْيَ ٥  
Endomychus coccineus (S). Coccinella écarlate (F).  
Endomychus coccineus (E).

حشرة دامت من فصيلة السحليات ورتبة مدميات الاجنحة.  
قالت القبايات والاسراج : حنافسها ويزلقها تموش على  
الفطور وامشاجها وعلى المواد النباتية المنسقة || جسمها  
صغير القد وطول من ٥ الى ٦ م . ثوبها الى الحمرة  
القرنزية يملؤها في وسط كوشها بقية سوداء ويملونها في  
ظهورها اربع بقع سود ، يشعنان في كل ثمد . رأسها  
معتدل الجرم . عيناها صغيرتان . زباناها مستطيلتان ،  
صفا الاطراف . ظهرها ضيق الخضر المستدير اللاتس  
قدها محززان ، كفيها الخسل . ارسانها ثلاثة المقل ||  
جا مل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجلادة في اوائل  
ايار وتعيش حتى اواخر تموز . تسرح في النهار وتستن  
في الليل || البرقة عنه يملؤها الكيال الجسوري تطول نحو  
٨ م . جسمها سكي التركيب ، قليل التقويس ، سداسي  
الرواسب ، اسر القين ، جزوي الرأس ، كيف الزنب ، سداسي  
ميتز الخبل || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة  
اسابيع يتقشر تحت قشور الانجبار المائلة ضمن صلبة  
متساكة الفشاء المركب من مواد نباتية مسجوة بالريال .

Endomychidae (S). ١٣٣١٣ - مَسْحَبِيلِيَّاتٌ ٥  
Endomychidae (F). Endomychidae (E).

فصيلة حشرات دامت من رتبة مدميات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المبردة قليلة العدد مدها البلاد المعتدلة الحارة .  
تألف الموطن المسوية الرطوية حيث تنكاثر الفطور التي  
تموش عليها || جميعها صغيرة القد ، اهلجية الشكل  
تحتل المركز الوسطي بين القرنيات والدمسقيات . رؤوسها  
مستدرة . زباناها معتدلة الطول ، صفة الاطراف ،



سحام مشات



سحليل قرني



مَسْحَلٌ



مسحلب



سحلية

حينما صغرتان تلصقها احيان شفاة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الاخير الثلاث . عنقها متوصلة الطول والشفاة . جلدها متجاع التماثيل الدقيقة . ذنبها سريع الطول والانقسام . قريبا الى الصهبة الجوزية المنشة يملوا موج الحمل اغبر ينسجم مع الحيطان واخفاية التي تكثر من المكوث عليا || يباتها الشجري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . تحسر قشلاها يند غروبها من يباتها ياسبورع وتساقد به ذلك يسبورع || الاثني تقبض من ٦ الى ١٢ شلفة تطورها في الربل او في المواقس الخنجرية المعرض النافذة || تسرح في التهار وتتسلق السطوح السموية . قتبها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافذة .

### ١٣٣١٩ - سحلية عصفراء \* ، سحلية عصفراء ،

عقلاية عصفراء (S). *Lacerta viridis* (S).  
Lézard vert (F). Green lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ٢٢ الى ٢٦ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عرياني الثورن . حينما لوزيتان تلصقها احيان شفاة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني الثني الثلاث . عنقها متوصلة الطول والشفاة . اسامها دقيقة مجهزة بالظاير حادة . جلدها متجاع التماثيل الدقيقة . ذنبها سريع الطول . قريبا اخضر اللون ، اسف المروج ، تملوه قشلا بمراء زيبية تنتهي عند قاعدة الذنب . الذكر يمتيز بزماء اللون ويلزق النسر || يباتها الشجري يستمر من ١٢ الى ١٥ اسبوعا . والاثني تقبض من ٨ الى ١٦ شلفة تطورها في الجحاة والنداب || تأثني المروج والاماكن الرطبة . تسرح في التهار الاثني برفقة الذكر وتقبض منه في حمر واحد || قتبها الحشرات والديدان والباب والحوم . تستبر من الزحافات النافذة .



سحلية الحيطان



سحلية عصفراء

### ١٣٣٢٠ - سحلية رشيقة \* ، سحلية رشيقة ،

عقلاية رشيقة (S). *Lacerta agilis* (S).  
Lézard agile, Lézard des souches (F). Agile lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطن البلاد المعتدلة الحارة . الاثني اكبر قدما من الذكر . جسمها يطول من ١٨ الى ٢١ سم . رأسها عرياني الثورن . حينما صغرتان ملصقتان يابسان شفاة متحركة . اذاثما غانتا الغشاء الصواني . عنقها متوصلة الطول والشفاة . جلدها متجاع التماثيل الدقيقة . ذنبها سريع الطول والانقسام || قريبا الى الصهبة السمراء المنشة بالاسود والابيض . يباتها الشجري يستمر نحو اربعة اشهر . الاثني تقبض من ٦ الى ١٢ شلفة تطورها في النبال . تأثني العمران والوبر عل السواء . تسرح في التهار . حبرها حيث تركب في الليل تفق سطيل تقفده تحت جلوح الانهار المنسطة على التربة || قتبها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والحوم || تستبر من الزحافات النافذة المنيعة .



سحلية رشيقة

### ١٣٣٢١ - سحلية وكود \* ، سحلية وكود ،

عقلاية وكود (S). *Lacerta vivipara* (S).  
Lézard vivipara (F). Viviparous lizard (E).

حيوان سريود من الظاء وفضيلة السقايات . موطنها البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ١٥ الى ١٨ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عرياني الثورن . حينما



سحلية وكود

Orchis de Gallée	سحلب جليلي
Orchis melle	سحلب ذكر
Orchis à larges feuilles	سحلب عريض الورق
Orchis papilionacée	سحلب فراشي
Orchis des marais	سحلب مئني

### ١٣٣١٢ - سحليات ، سحليات ،

Orchidaceae (S). Orchidacées, Orchidées (F).  
Orchidaceae (E).

فضيلة نباتية من وحيدات الفلقة . منتبها الاقاليم الحارة . انواعها المعروفة نحو ٢٥٠٠٠ تضم الى ٩٥٠ جلدا تنجمها خمسة اسباط : البايوبيات والجوثيريات والحاجبيات والسحاب والونيبيات || جميعها ثنائية الساقل ، قرصية السوق ، مستطيلة الارزاق الكاملة . ازهارها متباين الاشكال . ازهارها جميلة الالوان الفزائية ، بعضها صلي العرف الفواح وبعضها حديد لا عرف له او كرية الزجاجة .

### ١٣٣١٤ - سحلية \* ، سحلية \* ، سحلية \* ،

Acares (S). Acares, Homme pandu (F).

جنس نباتات مصفولة من فصيلة السطيات . انواعها المعروفة ٧ اصنافا تمتد من الهند الشرقية الى اوروبا الوسطى والجنوبية || اولها خلية ، مياضية ، صمكة النصال ، جميلة الخضار . شراعه الزهري قرصي الانتشاد . ازهارها سلبية التجميع ، مثلية || سطها يرطب في الارابة الرملية ويحبس بمجود في الجصية || يستخرج من صنفلها السحلب .

### ١٣٣١٥ - سحلية ، سحلية ،

Leporeau (F).

Young rabbit (E).

هي كل اذن صغير اقلع من الحرق وقار له .

### ١٣٣١٦ - سحليات ،

Cheatoodontidae (S).  
Cheatoodontidae (F).

فضيلة اسماك من المنظمات الاشكاليت الزمانت موطنها بحار المناطق الحارة الاستوائية . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صغيرة القد اجسامها مبطلة يضيئة او مستدرة الشكل . الارباب متراكبة الالوان المزخرفة ، الفزائية الجميلة || اشهر اجناسها :

Chelmo	التشع
Pomacanthus	البحر
Hemichromis	الندفون
Pterax	الرباني ، الرباني
Cheatoodon	السحل
Zanclus	الشوش
Holocentrus	الطويل ، الكنف

### ١٣٣١٧ - سحلية ، سحلية ،

هي البطاية ، اطبا .

### ١٣٣١٨ - سحلية الحيطان \* ، سحلية الحيطان ،

عقلاية الحيطان (S). *Lacerta muralis* (S).  
Lézard des murailles (F). Wall lizard (E).

حيوان يروض من الظاء وفضيلة السقايات . موطنها البلاد المعتدلة الحارة || جسمها يطول من ١٩ الى ٢٢ سم . الاثني اكبر قدما من الذكر . رأسها عرياني الثورن .

**Mellerax musicus (S).** **السحون الغريد \***  
**Mellerax chanteur, Autour chanteur (F).**  
**Mellerax polygonus (S).** **السحون المسنح**  
**Mellerax rayé (F).**

وهما من الجوارح الثلاثة لانهما يقضيان على جميع انواع الاناعي والمظاظ والوزغ والخشرات .

**Cryptostictis ١٣٣٢٨ - سَحْبَة \***  
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتميز ببكتيناته البيضاء المجهزة في قطبيها بأهداب منتظمة . انواعه قليلة العدد والاذى تركيب بعض النباتات الحرجية .

**١٣٣٢٩ - سَحْبَة مَقْمُومَة \***

**Bembidion ustulatum (S).** **Bembidion brulé (F).**  
 حشرة قاضية ناعمة من عذبات الاجنحة وضعية الرقائيات . موطنها يمتد من الشرق الاطلس الى اوروبا . تألف المواقع الرطبة اعصها ضفاف مجاري الماء ، حيث تكثر الديدان والخشرات الصغيرة || جسمها يطول من ٥ الى ٦ سم . رأسها وكشها الى الخصر الامس . يهداها الى السرة الكسيتية الخضراء المولج . فكها ضلجان . ذبائها دقيقة . جتاها صغيرتان ناشزتان . ظهورها قليل الاسدياب ، مستدير الطرف للألف ، ثنائي التبرزيز القدي القطاب . اراسها خاسية البقل || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجلائدة في الربيع وتبقى حتى الخريف . تسرح في النهار || البرقة عند تمام الادراك تطول نحو ١٠ م . جسمها اسطواني الجرم ، قائم السرة . رأسها وفرجها ودراجها الى السواد القصي || طورا الاكمال يستمر نحو ٥٠ يوما ويقتضي ضمن فلات وام في لفق قليل الاتحاد تحمله البرقة في الجلائدة او في النبال .

**١٣٣٣٠ - سَحْبَة \***  
**Leptoconchus (S).** **Leptoconque (F).**

جنس حيوانات بحرية من الرخويات عذبات الاريل وضعية الرخويات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جدار البلاد الحارة من العالم القديم ، اعصها البحر الاحمر والمحيط الهندي || اصداها صغيرة رقيقة ملونة جرابية الشكل فسيحة الجيوب دقيقة الاعقاب الطائية . تعيش لاصقة بمذلق الرجزان او بصخور الحشاف المعصورة .

**١٣٣٣١ - سَحْبَاتِيَّة \***  
**Septobasidiaceae (S).** **Septobasidiacées (F).**  
 فصيلة فطور مجهرية من رتبة التعاميات وسيدة الجنس . عذبة الانواع . ظهورها تتشكل بالاشتراك مع القرزيات التي تسير عليها على عدة نباتات منها الحشفيات والاجناس والاشجار والسليان ... || كان مهدا امريكة الجنوبية وقد انتشرت الآن في معظم اقطار العالم .

**١٣٣٣٢ - سَحْبَة \***  
**Huile de radis (F).** **Radish oil (E).**  
 مادة زيتية طيبة تستخرج بالعصر من بذور الفجل . متلفها وفوائدها عديدة تستعمل في علاج الاذرق والامراض المعوية وصعوبات المرارة .

**١٣٣٣٣ - سَحِيل \***  
**Phelloderme (F).** **Phelloderm (E).**

نسيج نباتي قليل السلق يفصل الطبقة اللبائية من الخشب .

لوزيتان صغيرتان تلتفها ايجان شفاة متحركة . اذنهما غمختا الغشاء الصلياني الاخير الغلاف . متفها قصيرة مستطلة . جلدها متناهي التماثيل الدقيقة . ذنبا مستطع الطرف سريع المسب || قويا متراكب الايلان ، اسفح المولج ، يكثر فيه الاخضر والجوزي والجوزي والخشبي وتلمو خطوط من النقط متضاربة الايلان من الابيض الى الاسمر والامود || نباتها القوي يستمر نحو اربعة اشهر . والاذى تقص من ٦ الى ١٢ بحليلة طول الواحدة منها لا يتجاوز ٢٥ م . || تألف المروج والمخادق وضفاف الانهار ومجاري الماء ويبيت السكن الرطبة . تسرح في النهار || قويا الخشرات الصغيرة والديدان والذباب والمولج || تعتبر من الزواجات الناعمة .

**١٣٣٣٢ - سَحَابَة \***  
**Sorosporium**  
 جنس فطور مجهرية من فصيلة الراخويات . طليها رسيمة الخلية تجمعها حواشد لائساية الجسم تتشكل منه بلوشها من بويئات فردية || انواعه قليلة اشهرها سماء المدن وسماء الترفليات .

**١٣٣٣٣ - سَحَابَة الدخن \***  
**Sorosporium panic-milicet, Sphaelotheca panic-milicet, Ustilago panic-milicet (S).**  
 فطر مجهرى يركب مبيض ذرة الدخن فيحول الى بورة بورغ فضيحات . وقد يصيب كامل الاذهار فيحول الى بورة متاكلها كائنا اعداب فم تملوها التاكل وتلفها الارواق الثلاثة || يكتنف قاعها ذلك بتطيس البذر اما بمحلول الفرمول المركز ٠,٥ ٪ او بمحلول سلفات النحاس المركز ٠,٥ ٪ .

**١٣٣٣٤ - سَحَابَة الترفليات \***

**Sorosporium saponariae (S).**  
 فطر مجهرى يصيب بعض الترفليات يتركب . قرص الزرة عند انتفاخ البلات حيث يكون سحابة البورية الخفيفة الابن الى ان تبلغ كامل دورها الحياتي فتطلق من بويئات حنطية السرة وريدة المولج || يكتنف بطن وسرر الاذهار الموصية .

**١٣٣٣٥ - سَحْبَة \***  
 وكلاء يشبه السحيرة ابيض ينبت في البراق والاكمام ، ولست بمشبه ولا تجر وي اقرب الى الحفرية والصليان . وقال ابو حنبل السمس ينبت تحت الصليان والكتكث الا انه يطول فقيها في السماء ، وربما كان طول السحبة طول الرجل والشمم (السان) .

**١٣٣٣٦ - سَحْبَة \*** **شيكار**  
**Schéma (F).** **Diagram, Drafte (E).**  
 غنط تبياني يوضع نسبة المصلات الدالة ومختلف علاقها في الموضع المقصود .

**١٣٣٣٧ - سَحُون \***  
**Mellefax**  
 جنس طير من البراة وضعية السقريات . حديد الذن ، قوي الشكبة ، ريع الجفة طوله نحو ٥٥ سم . بسطه تراوح من ١١٨ الى ١٢٢ سم . موطنه افرقية الشرقية والبيسلي . يألف مجازي المياه . قوته الاناعي والخشرات . يأن في الاشجار الرطبة اذانه تحفص في رنات نحو ٤ اسابيع || له نومان فقط :



سماء المدن



سحون غريد



سحيرة شعرة



سحبة

13344 - سحابة (F). *Estor fontalis* (F). *Fontal water* (E).  
ماء أصفر غليظ يخرج من المشية عند الوحم .  
13345 - سحابة هو السلف ، اطلبه .



سحابة

13346 - سحابة (F). *Agnes or Agnello* (F).  
*Lamb and Ewe lamb* (E).  
ولد للفنان أو لغير ذكر كان أو أنثى ج تلحج وتعال  
وسلان .

13347 - سحابة (F). *Berrage*  
حاجز يقام في وجه البحر إما لتخفيف سرعة الارتفاع  
المياه ولما تحزنها ويمكن تصريفها عند الطلب أو الاستعادة  
من طاقنها المولدة .

13348 - سحابة (F).  
في الحلة الكبيرة ، اطلبها .

13349 - سحابة (F). *Diplontemona* (F).  
نمت تفرقي يطلق على كل زهرة عدد أهديتها ضعف عدد  
البساتن أو القناعات .



سحابة

13350 - سحابة (F). *Cebrio gigas* (S).  
*Cebrio gigas* (F). *Cebrio gigas* (E).  
حشرة خاضعة عاشبة من فصيلة السدابيات وربة فضلات  
الاجنحة . تألف الاسراج والحدائق . غنايتها خاضعة  
قوتها ما تقضم من اوراق النبات . يرقاتها عاشبة تعيش  
على جلود الاشجار وسطحها || الذكر بطول من ٢٠ الى ٢٤ م .  
٢٤ م . ثوبه ثنائي اللون كسني الرأس والكتف والرجل  
البطن والارامل . رأسه كبير الجرم . عنده كبريتان .  
زبانه دقيقان . ظهره مستطيل الشكل ، مستطير العنق  
اللاصق . بطنه فاخر المرك الخشن القرون || الانثى  
تطول من ٢٤ الى ٢٨ م . جسمها عار عديم الاجنحة .  
غدها جعدان متفلتان . زباناتها قصيران مستطلان .  
طنها اعليجي الشكل ، مستطير الجرم ينهي بترك  
مدب الطرف || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة  
الاجلولة في اواسط آب وتعيش حتى اواسط تشرين الاول .  
تفرح في الليل ويبيت في النهار || ليربة مدونة الشكل  
تطول عند ادراكها التام من ٣٢ الى ٤٠ م . وهي مداسة  
الرواجب ، صفراء اللون ، فراء الملقح ، كسنية الرأس .



سحابة

13351 - سحابة (F). *Pincho* (F).  
*Lath, Slat, Strip of wood* (E).  
لوح صنبر من الخشب الرقيق .

13352 - سحابة (F). *Cabrionidae* (F).  
*Cabrionidae* (F). *Cabrionidae* (E).  
فصيلة حشرات عاشبة من ربة غديات الاجنح ||  
اجناسها وانواعها قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق  
المتعددة الحرارة . تألف الاسراج والحدائق والجنات . يرقاتها  
عاشبة تعيش على جلود الاشجار || اجسامها متوسطة  
لقد تميزت بالاختلاف الاصاعي بين الذكور والاناث .  
ذكورها مجنحة ، مستطيلة الاعمار والزباني المشاوية  
للسنين . الانثى ملو ، مامدة الاجنح ، قصيرة الاعمار  
المنفصلة ، صغيرة الزباني السمكية المختلفة . جواربها  
نشيطة . اصنافها خاضعة القمل || اشهر اجناسها السدابية .



سحابة

13353 - سحابة (F). *Examina* (F). *Stamen* (E).  
العضو الذكري في الزهرة . وهي مركبة من حامل يسمى

13344 - سحابة (S). *Melanopsis* (S).  
*Melanopsis* (F). *Melanopsis* (E).  
جنس حيوانات مائة من الرضويات سديات الارض وفصيلة  
الديديات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع  
البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش في المياه العذبة || اصنافها  
شبه اعليجية الشكل ، سوداء اللون ، يربية الاغصان ،  
مفرطة الفجوات المستطيلة || اجسامها مستطيلة . رؤوسها  
مقنونة ثنائية الجوارب القروية المستطيلة المعينة .

13345 - سحابة (F).  
بقلة . ج حماء (السان) .

13346 - سحابة (F). *Terre franche* (F).  
*Thorough soil* (E).  
السحاب والسحاب والسحاب . الارض البنية الحرة ،  
تصلح لحطب الزراعات .

13347 - سحابة (F). *Gryllomorpha* (F).  
*Gryllomorpha* (F). *Gryllomorpha* (E).  
حشرة دجاجة عديمة الاجنح من فصيلة الجديديات . ذكرها  
اصفر قدام انتائها بطول من ١٢ الى ١٤ م . والانتى  
تطول من ١٧ الى ١٩ م . ثوبا الى الصفار الخشن بطول  
رشفة سره . ارجلها سداسية . زباناتها عجيبة ، مستطعة ،  
فاخرة الحبل . مركبها كالير محاط بقوين ضرويين ||  
تعيش في الاماكن القليلة المظلمة وفي الحافز والظلم .  
سرحها دجاجة يتد من الدفش الى الفرس . قوتها جميع  
المواد الغذائية باستثناء الحوم وله تفضل المواد النباتية على  
غيرها .

13348 - سحابة (F). *Symphodol* (F). *Symphodol* (E).  
*Symphodol* (F). *Symphodol* (E).  
ما كان السحبد من ميزاته الجسدية او العنصرية . كقولك  
انتاش ضاحي او نحو ضاحي كما هي الحال في بعض  
الظهور الدفيا .

13349 - سحابة (F). *Pumula* (F). *Pumula* (E).  
*Pumula* (F). *Pumula* (E).  
السحاب الرشي الذين تمت اجنحة الطير .

13350 - سحابة (F). *Sphaeritaceae* (F).  
*Sphaeritaceae* (F). *Sphaeritaceae* (E).  
مارة ظور مجهرية من فصيلة السطويات وربة الزقيات  
اجناسها وانواعها المؤدية عديدة || تميزت باصنافها الصلبة  
الماينة الالوان التي تطلق من ساه مستمرة . اما  
ارتكاز اصنافها فقد يكون فرديا او نسبيا جمعه ربة  
واحدة || احرف اجناسها التي تهتم الاقتصاد الزراعي .  
الدامق ، الدافعة ، الرومانية ، القصصان ، السوط ،  
التيترية ، الكدوة ، المصاع ، الشبح ، والتعليق .

13351 - سحابة (F).  
هو الانذر ، اطلبه .

13352 - سحابة (F).  
هو ما يخرج من بطن ذوات الحفر او ذوات اكل  
فيل ان تأكل .

13353 - سحابة (F). *Bithed* (F). *Bithed* (E).  
*Bithed* (F). *Bithed* (E).  
التصاق عضوان نباتيان بينهما بعض كوريتين او  
صلصين .



Cardia (F). Cardia (E). ١٣٣٨٠ - صدك

السلك هي فتحة المريء مركزها بالقرب من القلب .

Stratifier (F). To stratify (E). ١٣٣٨١ - صدك

سدك التبر . لقد بسفها فوق بعض نبي سدك .

Inclination (F). Inclination (E). ١٣٣٨٢ - صدك

السلك والجلية والميل واحد .

Route-en-train (F). ١٣٣٨٣ - صدك

Station kept with mass (E).

الفصل الذي تعرض عليه الآلات للاستيثاق من ودقها فإذا ضمنت يذري عليها من السلك للشتب .

Scydmaenus (S). ١٣٣٨٤ - سيدفين

Scydmaena (F). Scydmaenus (E).

جنس حشرات من فصيلة السديميات ورتبة غديات الإجنسة . أنواله المرفوعة حادة منتشرة في بعض أقطار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، هياها ، طول نحو ٣ م . رؤوسها طليقة ، صغيرة ، شبه مكورة . حيزها بارزة . قاذيرها صغيرة . ملابسها الفكية مستطيلة . قرونها الاستشعارية صولطانية ، مهدبة الفصل . كواسها عمودية . أغانها لائحة ، عامة التشنيد . قوائمها نشطة ، مهدبة للأضلاع والفنائب والأراخ . أليها رسيمة اللون ، تكثر فيها الجورة فالشفقة قاصصة || جميعها دامة تعيش في التيرب والجلافة والبردي التلي وتحت القشور والحاء .

Scydmaenidae (S). ١٣٣٨٥ - سيدفيليات

Scydmaenidae (F). Scydmaenidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الإجنسة ، أجسامها وأندامها المرفوعة حادة منتشرة في مسط أقطار البلاد الحارة والمتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة ، طول من ٢ إلى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مكورة . حيزها بارزة ، قاذيرها وفكورها لانتظامية ، ملابسها مستطيلة . قرونها الاستشعارية صولطانية ، مركبة من ١١ فصلة . كواسها لاقائمة الشكل ، تكثر فيها الأسطالة . أغانها لائحة ، عامة التشنيد . قوائمها نشطة . أرباعها خاسية العقل || جميعها دامة تعيش بين القشور والحطاب والبردي التلي وفي التيرب || أشهر أجناسها السديموس والسفلي

Indute (F). Indutium (E). ١٣٣٨٦ - صدك

في عباتي يوجد في أوراق السرخس يحضن الأكاثم أو أكياس البرخ . وهو أيضاً إنشاء الرقيق الذي يلف السرد ويكن الحشرات .

Cydus (S). Cydus (F). ١٣٣٨٧ - سيدفوس

جنس حشرات صغيرة ومتوسطة القد من فصيلة القاسيات . أترها نحو ٦٠ مظهرها مركب الألوان الباقية كالاسود والاسمر يعيش على الأشجار البرية يعيش تسفها . أشهر أنواله المؤنثة السديموس والسفلي .

Cydus bicolor (S). ١٣٣٨٨ - سيدفوس ابلق

Cydus bicolor (F). نوع من السديموس صغير القد يضي بشكل مخطط الجسم طول نحو ٨ م . ويعرض قوه ابلق اللون . رائحته كرجية ركب القيثول والكرية فينص التلغ ويؤذي النبات .

الشكل ، متدلية ، يضاء اللون ، حرة الرائحة المتحة . ثمارها يزور بقلعة مجنة || عشها جبل اللون يشبه الاكاجور ويحتمل أصماله . رائحته رائحة تقرب من رائحة الارز .

Cádrón (F).

١٣٣٧٦ - سيدرون

شجرة تلي سيايا ، اطلبها .

١٣٣٧٧ - سيدريت التجيليات

Sideritis lithargyria (S). Sideritis des graminées (F). Sideritis lithargyria (E).

حشرة ملوكة من فصيلة السقيات ورتبة حرشيات الإجنسة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وأفريقية الشمالية . فراشها جارية قفها رقيق الأزار . مرتها توش على صف التجيليات || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م . بسفها نحو ٣٧ م . رأسها صغير الحجم . منها كيرتان . زباناها عيطان . مرتها متدل الطول . حبشها ويطنها الى الخطي الاصفر المولج || روشناها الاماميان الى الخطي الصنابي المولج تملو نقطة وعلى يضاء وتقرص حادري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصخرة تملوها مشعة سمراء || لها جبل واحد في الحبل . تظهر البرشة في حزيران ويقي حتى آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتضع للكل لسطا مستطيلة على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || البرقة طول نحو ٤٠ م . جسمها اسطوانة الشكل . ثوبا الى الصغار اللبس تملو سمة خطوط قاطبة سمراء اللون وتسمة خطوط متفرقة جزوية اللون . رأسها اسمر . منها الى السمرة للقباء . وارجاها شديدة السمرة || طور الاكاثم الذي يسمر نحو ١٥ يوم يتغني في التربة حيث تنفذ البرقة على عمق ٤ أو ٥ سم .

١٣٣٧٨ - سيدريت مكدوك

Sideritis vicellina (S). Sideritis vicellina (F). Sideritis vicellina (E).

حشرة من فصيلة السقيات ورتبة حرشيات الإجنسة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا وأفريقية الشمالية . فراشها جارية قفها رقيق الأزار . مرتها تمس على صف التجيليات وعلى أوراق النباتات المروية || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م . بسفها نحو ٣٧ م . رأسها متدل الحجم . منها كيرتان . زباناها عيطان . مرتها متدل الطول . حبشها ويطنها الى الخطي الاصفر المولج || روشناها الاماميان الى الصخرة تملوها مشعة صناعية وخطوط متفرقة سمراء اللون وتقرص حادري اسمر . روشناها الخلفيان الى الصخرة تملوها مشعة سمراء . أغانها الى البطلة النقصية || لها جبلان في الحبل . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وفراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو خمسة ايام وتضع للكل على الصفحات السفلى من نصال الأوراق التي تلبس التربة || البرقة طول نحو ٤٠ م . جسمها ماس القشور . ثوبا الى الصغار الرقي الاصفر المولج يملو سمة خطوط قاطبة سوداء اللون وتسمة خطوط متفرقة صفراء . رأسها الى السمرة الاربعونية . منها الى الركة . وارجاها الى السمرة القاقية || طور الاكاثم الذي يسمر نحو ١٥ يوم يتغني في التربة حيث تنفذ البرقة ضمن جلاب من التلغ .

١٣٣٧٩ - صدسي Sexcupler (F). To succuple (E). ١٣٣٧٩ - صدسي

جمل الشيء ستة اشغاف .



سدريت التجيليات



سدريت مؤنثة



سدمن



سدنوس ابلق

والبحيرات والمناقع || اصنافها متباينة الايكال والاحجام  
يكثر فيها الشكل المردلي المتساوي الخالقة حتى القبط ||  
اعرف اجناسها واشهرها السديفة والصحية .

١٣٣٩٩ - صدكيم ، رَهَج Stratus  
نوع من الغيوم وهو خطوط من السحب الشفافة الرقيقة  
المستطيلة تملأ الاقن وتنتد عوارثه .

١٣٤٠٠ - صدكيم Nébuleuse (F). Nebula (E).  
سديم سُدُم . متطورات شمالية تبدو كشدة نجوم عاتقة  
الضوء المجهل عل هيئة صباية يضاء || اختلاف اشكالها  
ومعالمها وماحياتها المقدرة دعى الى ترتيبها في عدة فئات .  
اشهرها السديم الحلزونية ثم المنتشرة فالخسفية فالغازية فالقائمة .

١٣٤٠١ - صدكيم Archégonie (F).  
Archegonium (E).  
السدن قصبة تحضن البضو التناسلي الانثوي من الطعالم  
والكبديات ومستورات الزهر الوفاية . وفي السدن تربية  
البويضة القابلة للاخصاب .

١٣٤٠٢ - صدكيم Apothéca, Apothécie (F).  
Apothecium, Shield of lichen (E).  
هي ثقت الحزاز واشباهه من النبات . قسم وتقسف الجراثيم  
التناسلية .

١٣٤٠٣ - صدكاب ، قَيْشَجَن Ruta (S). Rue (F). Rue (E).  
جس نباتات عشية رية طيبة معمرة من فصيلة السليديات.  
اوراقه متعاقبة مركبة ازهاره حركوني  
التجميع ، هامي الارتكاز . ازهاره خطوية رباعية  
البتلات ، شمالية الاسدية || اشهر انواعه ما يلي .

١٣٤٠٤ - صدكاب البَر Ruta montana (S). Rue sauvage, R. de montagne (F).  
Mountain rue, Wild rue (E). Bergrante (D). Ruta  
montana, R. flaccidula (L).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي طيب ري يملو من ٤٠  
الى ٨٠ سم. ساقه ليفية خالية العصا . اوراقه ثلاثية  
التشريح وتفرغض الضيق || ازهاره الى الصفرة .  
منافع الطبية دون منافع السذاب الحزني واقل فاعلية .

١٣٤٠٥ - صدكاب الماعِز Rue de chèvre (F).  
Goat's-rue (E).  
هو المكنانة الحزنية ، اطبا .

١٣٤٠٦ - صدكاب سُورِي ، قَيْشَجَن حَكِيي Ruta angustifolia (S). Rue d'Alep, R. à feuilles  
étroites (F). Syrian rue, Aleppo rue (E). Aleppo  
rue (S). Ruta frangula (L).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي بري طيب يكثر في  
بعض المناطق السورية . يملو من ٣٠ الى ٧٠ سم.  
اوراقه جالسة سنائية . تشريحها فسق التفريغ ، لانياسي  
الشكل . ازهاره الى الصفرة . بتلاتها قارئة مشرشرة .  
منافع الطبية تمتاز منافع سذاب البَر .

١٣٤٠٧ - صدكاب عَطِير Ruta suaveolens (S).  
Rue parfumée (F).  
نوع من السذاب وهو نبات عشبي زراعي تربى معم  
يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. اوراقه كاملة مستطيلة ملوكة  
الطرف تطول نحو ٢ سم. وتعرض من ٥ الى ٨ سم. ازهاره

١٣٣٨٩ - صِدْشُونَسْ مُدْهَب الرُّبَايِي Cydnus flavicornis (S).

Cydnus à antennes dorées (F).  
حشرة من المذفوس وفضيلة القبابيات . جسمها صغير  
القد ، مفلطح ، شبه بيضي اللون ، يطول نحو ٤ مم .  
قويها الى الجارية يملوها مروج يراوح من الخلف الى الاسود .  
رأسها شبه مكور ، اطرافها الداعلية مجهزة بطبق من الهلب  
القصرى الشائك . خطها مستدل اللون . عينها صغيرتان  
نازحتان . زباناها قضيما اللون . كويلها بيض الجانيين  
مالس الوسط . يطلها كثر الهلب المنسطح . قشراتها  
شفاف . قوائمها نشطة . فئانيها الامامية موكلة الاطراف  
الشائكة || مرتها اصحاب الشطوط . يكثر وجودها عل  
الزمل حيث تتغنى بصرمة مدققة || راجعها كريمة .

١٣٣٩٠ - صدكيات الجَسَاح Mecoptera, Patenoptera (S). Mécoptéroïdes, Péta-  
noptères (F). Mecopteroïdes, Pecanoptera (E).  
طيفة حشرات مجنحة تشعل اربع رتب وهي  
الاجنسة بحرفشيات الاجنحة وذات الجناحين ومادانات  
الاجنسة .

١٣٣٩١ - سُدُوم Nébuleuse (F). Patch of haze (E).  
هو الدخن ظل الغيم وعلى حبه انة الشمس .

١٣٣٩٢ - صدكي Rosée de la nuit (F).  
Night dew (E).  
السدى هو لى الليل . ويلى السدى ما كان في اول الليل  
والسدى ما كان في آخره .

١٣٣٩٣ - صدكي Datta varta (F). Sour datta (E).  
السدى هو البلع الاخضر قبل ان يلو .

١٣٣٩٤ - صدكيم Planché à dessin (F).  
Drawing-board (E).  
المعينة لوح من الخشب ملجوم الاطراف مربع الشكل  
او مستطيل .

١٣٣٩٥ - صدكي Schedir  
السدري نجم نير من كوكبة ذات الكوس . يميرون عنه  
في الجدل العام بالتميم الفا من الكوكبة المذكورة .

١٣٣٩٦ - صدكي عِرْكة Aréole (F). Aréole (E).  
تؤلل قلمسوي الشكل ازغب البشرة او شائكةا يكون  
في حاد بعض النباتات اسمها الصبار .

١٣٣٩٧ - صدكيفة Melanis (S).  
Mélanis (F). Melanis (E).  
جس حيوانات مائية من الرضويات منليات الاصيل  
وفضيلة السديديات . انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة  
في جميع اصقاع العالم . تعيش في المياه العذبة الراكة  
القليلة النور || اصنافها مدوية عذرة سوداء اللون .  
اجسامها مستطيلة . رؤوسها مقنطرة ثنائية القواس المعينة .

١٣٣٩٨ - صدك يَغِيْشَات Melanilides (S).  
Mélaniides (F). Melanilides (E).  
فضيلة من الرضويات منليات الاصيل . اجناسها وانواعها  
عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في الانهر



سدك



سذاب البَر



سذاب سوري



١٣٤١٨ - مُرَوِّعٌ (F). Fougères, Filicales.

صنف من شعبة مستورات الزهر الباطنية . يشتمل السرخس والخنشار وكزبرة البئر وبطيرها || مركزها في سلم الرقي النباتي يأتي بين الخوازيق وباديات الزهر . وهي من ذوات الجذور الحقيقية || ضلالها وابتعادها وأنها المشتركة لا تحصى لأنها كانت أكثر النباتات انتشاراً وابتعاداً حياً . أما ابتعادها المعاصرة فنحو ١٥٠ وأنواعها لا تقل عن ٦٠٠٠ || وما طبقات الفحم الجاهري سوى تفحم وتجميد ما تراكم وتكس من السرخس وبطيرها في الحقبة الكربونية التي دامت أكثر من ٣٠٠ مليون سنة .

١٣٤١٩ - مُرَادَةٌ (F). المرادة والمراد من كثر ما اضر به البشع ليس وسط قبل ينه .

١٣٤٢٠ - مُرَازَانٌ (F). مرزبان هو النظم ، الملبه .

١٣٤٢١ - مُرَكَّةٌ (F). Sénilité (F). Senility (E). المراسمة الوهن الجسدي الذي يميل بالرجل منه الشيخوخة .

١٣٤٢٢ - مُرَاوِيلُ الطُّفُولَةِ (F). مرارويل الطفولة هي التشويه ، الملبه .

١٣٤٢٣ - مُرَايَكَةٌ ، مُرَايَكَةٌ (F). Contagion, Infection هُدُوءٌ قابلية انتقال الأمراض الفيروسية من فرد مريض الى آخر سليم .

١٣٤٢٤ - مُرَبِّبٌ (F). Cave (F). Case, Celler (E). حفيز تحفظ فيه بعض المحاصيل الزراعية الصناعية او غيرها كالخمر والجبن الخ .

١٣٤٢٥ - مُرَبِّبٌ (F). Collecteur (F). Collector (E). مصرف كبير تكتفي اليه مياه المصارف فيسيلا الى المشربة .

١٣٤٢٦ - مُرَبِّبٌ (F). Troupe, Troupes, Banc de poissons (F). Troop, Flock, Herd, Drove, Shoal of fish (E). اسم شامل يطلق على القطيع الكبير من الطير والحيوان والسماك .

١٣٤٢٧ - مُرَبِّبٌ (F). Rangée de vigne (F). Rangée de vine-branch, Row of vine-branch (E). الصف من تصريف الكرمة .

١٣٤٢٨ - مُرَبِّبٌ (F). Serapis (F). Serapis (E). جنس نباتات برية ممررة من فصيلة السبليات . انواعها

الممررة خمسة منها حوض البحر الابيض المتوسط || سوفها شراعية منتصبة جيده . اوراقها متعاقبة حاشية ، مستطيلة ، متساكنة اتصال الضيقة . ازهارها هلي شبه متبلي التجميع . ازهارها كبيرة ارجوانية اللون او جوية || جميع انواعها تزيينية تزروع في المازن .

١٣٤٢٩ - مُرَبِّبٌ (F). Stromateus (F). Stromateus (E). جنس اسماك بحرية من شالكسات الزمائف وفضيلة الاسقمريات . اسطفاها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

مصرفا اللون ، حطرية العرف الزندي || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٣٤٣٠ - مُذَكَّبٌ مُخَوِّفٌ \* ، مُذَكَّبٌ مُخَوِّفٌ (F). Ruta graveolans, R. hortensis (F). Rue officinale, R. férida, R. des jardins (F). Common rue, Herb of grace (E). Rauter, Garten ruta (D). Ruta, Ruta dei giardini (I).

نبات عشبي طبي يري بطول من ٣٠ الى ٨٠ سم . ساقه ليلية متصلية . تصل اوراقه عميق التفريش . لونه الى اخضر الازرق . ازهاره منتصبة اللون يتلونها مقعرة الشكل متجمعة الصفحة ، مسنة الحافة || وهو نبات كريمة الرائحة مر الطعم ، للاع ، حريف . يستخرج منه بالتقطير دهن طيار له منافع البالية . يستعمل منتقلاً للجلد ويدراً لطحس وينها للعدة وخافضاً للحرارة ويصاداً للتشنج ولطارد البهتان .

١٣٤٣١ - مُذَكَّبٌ مُخَوِّفٌ (F). Rutaceae (F). Rutaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات اللبنتين ، مستقلة الفصائل ، مرتفعة المبيض . الواسع كثيرة العدد تبلغ ٧٠٠ اجناس ٨٠٠ نوعها ٩ اسباط . جميعها من نباتات الاقاليم الحارة والمعتدلة . فيها الاشجار والشجيرات والاحشاب || اوراقها لا قياسية الارتكاز منها المتضاربة منها المتناحية ازهارها خشوية . ثمارها يزود بنسبة او جراء مدينة الاغذية .

١٣٤٣٢ - مُرَبِّبٌ ، مُرَبِّبٌ (F). Fral (F). Spewn (E). مُرَبِّبٌ ، مُرَبِّبٌ (F). Fral (F). Spewn (E). بيضة السمكة ولحمي صمتر . ج . سره وسره .

١٣٤٣٣ - مُرَبِّبٌ (F). Frayer (F). To spawn (E). سراً السماك : باض .

١٣٤٣٤ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٣٥ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٣٦ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٣٧ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٣٨ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٣٩ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٠ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤١ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٢ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٣ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٤ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٥ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٦ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٧ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .

١٣٤٤٨ - مُرَبِّبٌ (F). الرارة : شجر تنخذ منه القسي الواحدة سرامة . (السنان) .



مذكَّبٌ مُخَوِّفٌ



سراجية

١٣٤٤٠ - سربوطة \* Ceratode (F).

هو ديب الحوت ، جنس اسماك كبيرة لقد تعيش في المياه الباردة.

١٣٤٤١ - سربوطة \* Ceratophorum

جنس ظهور بجمرية من الرديانيات وفصيلة السطحيات . يتميز بكتلاته المؤثرة للشفية الانقسام الباقية اللون التي تحمل في اطرافها بعض السطوح المحلية القريبة الشبه بالزبان || انواعه قليلة العدد والادى تركب الارواق دون ان تغطيا .

١٣٤٤٢ - سربوطة \* Ceratosoma (S).

Cératosome (F). Ceratosoma (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات معليات الاربل وفضيلة الخياشيم وفضيلة الدوريسات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصحابها بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها عريضة مستطيلة عديدة الظهور الثلاثية التحويات . رؤوسها ثنائية القياس . غياشها فسيحة التجميع تركيز على سطحيات انبوبية قواعدا تلاصق قواعد التحويات للظهورية الاخرية . ارجلها رويحة مستدلة الطول فسيحة .

١٣٤٤٣ - سربوطة \* Cerithinella (S).

Cérithinelle (F). جنس حيوانات بحرية من الرغويات معليات الاربل وفضيلة السريقات . انواعها المعروفة قليلة العدد معظمها من مستحزات الطليقة الجبورية والبيض الآخر منتشر في سطح بحار البلاد المعتدلة الحارة ومنها البحر الابيض المتوسط || اصحابها صغيرة ، ردينية الشكل ، متناوبة الخلوة حتى الانقلاب . فوئتها فسيحة ، ارفقتها مستقيمة . رأسها صغير ، لها مربع الشكل والخلف . لاستساها مستطيلتان .

١٣٤٤٤ - سربوطة \* Ceratites (S).

Cératite (F). Ceratites (E). جنس حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الاربل وديانيات الخياشيم وفضيلة السريقات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من المستحزات . اصحابها كثر من الحقة البرية الى التراسية || اصحابها اسطوانية الهيكل قرصية الشكل ، كثيرة المحجرات والفلورج النافرة المتفرعة .

١٣٤٤٥ - سربوطة \* Nucella (F).

Nucellus (E). السربية او النسيلة مجموعة النسخ الوثنية التي تتألف منها الكتلة المركزية في بويضة النباتات بديات الزهر .

١٣٤٤٦ - سربوطة \* Ceratitidae (S).

Cératitidae (F). Ceratitidae (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات رأسيات الاربل وديانيات الخياشيم || اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعا من مستحزات اواخر الاباج الاول واولى الاباج الثاني || اعرف اجناسها السريقات .

١٣٤٤٧ - سربوطة \* Séroline (F).

نوع من الخفايش الفسيحة يدعى عشاف الليل ، اطلبه .

انواعها المعروفة خسة تتميز باجسامها المحلية الشكل ، وزيادتها الظهريه والكثيرة المتجلية المقترنة || رؤوسها صغيرة ، غاطسها قصيرة مستديرة ، ملتحفا بقية تكاد تكون منقسمة || انواعها مختلفة الالوان تكثر فيها الرتبة القلبية الموج || اعرف انواعها واشهرها سربوطة الحنوط .

١٣٤٤٨ - سربوطة الحنوط \* Stromateus

Stromateus fiatola (S). Stromateus fiatola, S. de la Méditerranée (F). Stromateus fiatola (E).

نوع من السربوطة . سمكة بحرية يبيض . اصلها البحر الابيض المتوسط || جسمها صغير اللد ، مبط الجرم ، محني الشكل ، بطول نحو ٢٠ سم . ثوبا الى الرتبة المرجانية الفسيحة الموج تتبع عند الظهور وتتر وتزهر عند البطن وبعدها تسليج ذهبي في الشطر الاخر من الجانبين || رأسها صغير اللد . عضلها شديد القصر ، متناهي الطرف . زعانفها الظهرية والكثيرة مستطيلة ، مقعرة ، منجلية الشكل . زعنفتها لليلية غائبة مستطيلة الجناح || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٣٤٤٩ - سربوطة \* Stromateus

في السحام . اطلبه .

١٣٤٥٠ - سربوطة \* Stromateus

في الاشران نبات من الخلدات ، اطلبه .

١٣٤٥١ - سربوطة الأرض \* Stromateus

في الاشران السري ، اطلبه .

١٣٤٥٢ - سربوطة البحر \* Stromateus

في قسمة الماء ، اطلبه .

١٣٤٥٣ - سربوطة السحر \* Stromateus

في اشران السحر ، اطلبه .

١٣٤٥٤ - سربوطة الفرس \* Stromateus

سرة الفرس نجم نير من كوكبة الفرس الاظم مركزه على السرة .

١٣٤٥٥ - سربوطة التجف \* Stromateus

في اذن جودا من الفطور للأكل ، اطلبه .

١٣٤٥٦ - سربوطة \* Cyrtostoma (S).

Cyrtostome (F). Cyrtostoma (E). جنس طير من الجوام وثقات المتناير وفضيلة المغريات . انواعها المعروفة سبعة ، اصحابها القارية الاسترالية وجزر ماليزيا || اجسامها ريمية . متناهدا مستطيلة ، غرزية الشكل ، قليلة التفويص . اذنانها قصيرة . ارجلها دقيقة ، مستعدة الانقطاع . اوتها الى الحشرة الرقيقة الموج و بطونها الى الصغار الكبيرتي . اعتاق ذكورها زبرجدية تحاصي الموج || قوتا الحوام وديق الاتزار .

١٣٤٥٧ - سربوطة \* Carthilopsis (S).

Carthilopsis (F). جنس حيوانات بحرية من الرغويات معليات الاربل وفضيلة السريقات . انواعها المعروفة عديدة ، بعضها من مستحزات الطليقة الطباشيرية والبيض الآخر منتشر في بحار البلاد المعتدلة الحارة والباردة || اصحابها غروبية ، متناوبة الخلوة حتى الانقلاب . سطحيات قليلة القور ، فسيحة التضخيد والتعزيز المقترن || اعرف انواعها السربوطة المدرة (C. tubercularis) .



سربوطة الحنوط



سربوطة



سربوطة



سربوطة



سربوطة

\* سَرْخُودِي بَرْي \* ١٣٠١٧

*Anthriscus sylvestris* (S). Cerfeuil sauvage, Chérophylla (F). Wild chervil, Cow parsley (E). Wilder kälberkropf (D). Cerfoglio salvatico (I).

نبات عشبي بري محلي. منه المروج والمرابي الجبلية. جلده مستطيلة فائقة يقال إنها لا تخلو من بعض العناصر الجحالية الصارة بالحول.

\* سَرْخُودِي بَكِّي \* ١٣٠١٣

*Anthriscus cerefolium*, Scandix cerefolium (S). Cerfeuil cultivé (F). Chervil (E). Kerbel, Kälberkropf (D). Cerfoglio coltivato (I).

بقلة زراعية حولية تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها مأكولة مستعينة العلم، فواحة الحرف البطر || تجود في جميع الأتربة المحضلة الانسلاج.

\* سَرْخُودِي عَطِر \* ١٣٠١٤

*Myrrhis odorata* (S). Myrrhis, Cerfeuil musqué (F). Myrrh, Sweet fern, S. cleya (E). Spanische Süssholde (D). Mirrhe, Finocchiella odorata (I).

جلس نباتات شبيهة حجازية معمرة من فصيلة الشبقيات. أنوعها قليلة الممد منها البرية والزراعية. البرية صغيرة الجلود المستطعة. ساقها ترتفع نحو ٧٠ سم. أوراقها مركبة كبيرة اللد، خلية النصل الثلاثي التقليل. رائحتها ذكية الحرف تشبه الآيسون || أما الزراعية فجلودها حجازية الشكل، غليظة اللحم. كانت ولا تزال من النباتات المفيدة الانتشار لأنها ترطب في المناطق البحرية الكثيرة الضباب.

\* سَرْخُودِي لَفْشِي \* ١٣٠١٥

*Chaerophyllum bulbosum* (S). Cerfeuil bulbeux, C. tubéreux (F). Turnip rooted chervil, Parsnip chervil (E). Rubenkalberkropf (D). Cerfoglio bulboso (I).

نبات عشقولي بقلي محلي. جلده لفي الشكل كبير اللد. ساقه تملو نحو ٢٠٠ سم. أوراقه مركبة، خلية النصل ثنائية أو ثلاثية التقليل || جلده أبيض الحباب، سكري العلم، يحوي من المواد الغذائية ما قدره نحو :

٣٥ ٪ مواد ازوتية

١٥ ٪ مواد دهنية

٢٧,٨ ٪ مواد هيدروكربونية

وهو من النباتات التي ترطب في الأتربة الحارة الحصى للفسيوة العناصر الغذائية.

\* سَرْخُودِي أَسْوَد \* ١٣٠١٦

راجع مستند أسود.

\* سَرْخُودِي مَبْدُول \* ١٣٠١٧

*Salamandra terrestra* (F).

هو المستند المبدول، اطليه.

\* سَرْخُودِيَات \* ١٣٠١٨

رتبة حيوانات من صف الضفادعيات. اجناسها وأنوعها كثيرة الممد جميعها أربع فصائل || معظمها مائي وبعضها قريب. تتميز بمراء جلودها وما تنقسمه من مواد أكالة سامة || أشهر فصائلها المستندليات.

\* سَرْخُودَة \* ١٣٠١٩

السرخولة هي الكنية التي لا يمكن تمييز جيلها عن القصعة البرولية.

كلوراك المتبداء. أزهارها ووليمية مستطيلة، المالحق، لونها ال الوردي يتحولها توشيح حاقن || شوح أوراقها وأزهارها عند البرق، يقبه اليد || أزهارها يتسر طولك الصبغ والخريف.

\* سَرْخُودَة \* ١٣٠٢٠

هو ينور البربر، اطليه.

Sargus (S).

Sargus (F). Sargo, Sargus (E).

جلس اسماك بحرية من القرشيات الشائكات الزعانف. أنوعها عديدة جميعها يقبض الشكل مفطعة. رؤوسها غليظة وقصيرة. زمانها الثانية فائقة. سقمها حولي رقيق || ألوانها عديدة فيها القفي واللحي والمرجاني والاسمر الزيتوني || أشهر أنوعها الاربعة التالية : السرخوس المألوف والمستنير والسياس والحلارة.

\* سَرْخُودِي حَدَادِي \* ١٣٠٠٤

هو السرخوس المستنير، اطليه.

\* سَرْخُودِي مَأْلُوف \* ١٣٠٠٥

*Sargus vulgaris* (S). Sargus commun (F). Common Sargo (E).

نوع من السرخوس ينتمي الشكل، بقفي اللون، حاقن الظهر، يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

\* سَرْخُودِي مُسْتَدِير \* ١٣٠٠٦

*Sargus rondeletii* (S). Sargus mouchon, Sargon (F).

نوع من السرخوس مستدير الشكل، مستطيل الزعنفة الثانية الفائقة. ثوبه أحمر اللون يملو موانج قفي وتوشيح وردي. ظهره أحمر من جانبيه وبطنه. يكثر في البحر المتوسط || يتغير من الاسماك المادية المتوسطة الصنف.

\* سَرْخُودِي \* ١٣٠٠٧

نمت ترميمي يملو على من كان عديم الشعور ويتغير بالكسل والتغور.

\* سَرْخُودَة \* ١٣٠٠٨

اسم ترميمي يملو على رقات القراشات منذ لقلها حتى دخولها في طور الحادة.

\* سَرْخُودِي مُجْدَدَع \* ١٣٠٠٩

*Syrphus corollae* (S). Syrphie enguirlandé (F).

حشرة نائمة من السرخديات. شكلها كاللابة. طولها نحو ٨ م. رأسها أصفر اللون. يملها جندج بالأسود. تنح مكها على الاوراق التي يركها الارق فينشق من رقات دويدية، حلقية الشكل، فضاء اللون تلتقن الارق وتقتدره.

\* سَرْخُودِي مُوَكَّر \* ١٣٠١٠

*Syrphus boissae* (S). Syrphie à ceinture (F).

حشرة نائمة من السرخديات. شكلها كاللابة طولها نحو ٩ م. رأسها أصفر. يملها منظر ضبوط وزلاكن سيد || رقاتها مفترقة تقضي على الارق.

\* سَرْخُودِي \* ١٣٠١١

هو الاطريال، اطليه.



سرخوس مألوف



سرخوس مستدير



سرخوس مجلد



سرخوس منزر



سرخول بري



سرخول بقلي



سرخول عطر



سرخول لفي



**١٣٠٢٧ - سركوستوماتيدات (S). Sericostomatidae (F).**  
 فصيلة حشرات من رتبة جملويات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة، سمرار اللون. اجنحتها امتدلة الطول، كثيفة الخمل الذي يغطي الاصاب والقوق. اللباس الفلكية عند الذكور مستطيلة الخمل المرموص الذي يبدو كالتفاح امام الرصد. وتتميز ذكورها ايضا بقصير زنايلها المسنة الطرف || اساريمها تنيش في المياه الجارية ملحوة بجلابيب، نهاية الاشكال، ويكثر فيها الخروطي.

**شهر اجناسها :**  
**Sericostoma (S). الكركوب**  
**Goera (S). القوقرة**  
**Silo (S). السيلو**  
**Curnocia (S). الكوروسيا**  
**Lasiocephala (S). اللال يوسفالا**

**١٣٠٢٨ - سركوپ قناسية البعج (S). Cercopla quinqueangulata (F).**  
 حشرة من فصيلة السركويات. جسمها صغير القد يطول نحو ٩ م. ثوبها الى السواد الاسفع تملو خس بقع حر. رأسها مستعرض، قليل التنو. خطمها مستدل الطول. صناعها صغيرتان. زباناها قصيران، نحيلان. كوسلها محذوب. حقيقتها صغيرة، عرصة. ظهورها كامل الحنجة، لاصف. روثانها غشائيان، شفافان. بطنها اسود على صفحتيه. قوائمها شبيهة سواد اللون || مبدولة في كل مكان. قوتها النسخ تنصه من اوراق الاصحاب.

**١٣٠٢٩ - سركوپ عدسي (S). Cercopla sanguinea (F).**  
 حشرة من فصيلة السركويات. جسمها صغير القد يطول نحو ١٢ م. ثوبها الى السواد الاسفع الملتصق بالامر. رأسها مستعرض، قليل التنو. اسود. خطمها مستدل الطول. صناعها صغيرتان. زباناها قصيران، نحيلان. كوسلها محذوب. حقيقتها مزوانية. ظهورها كامل الحنجة، لاصف، شديد الحمرة الاريجوانية، مبيج بالاسود. روثانها غشائيان، شفافان. بطنها اسود على صفحتيه، احمر الحيد. قوائمها الى السواد || يكثر وجودها حيث تكثر الاصحاب والنباتات الدغلية. قوتها النسخ تنصه من الارواق.

**١٣٠٣٠ - سركوپيات (S). Cercopidae (F).**  
 فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة نصيرات الجناح. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، معظمها يألف البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة مبطة. رؤوسها مستديرة. نواحيها ثنائية الزناب. عوضا كبيرة. قرونها الاستعمارية صغيرة ونحيلة. تتميز بظنايبها الخلفية المادنة الاكفكار، لكنها مجهزة بمنانيس حادة. وتتميز ايضا بالقفز يساعد على ذلك استطالة قوائمها الخلفية.

**Fibranea (F). سرق**  
**Scapla fibre (E).**  
 نسيج اصطناعي اكثر لاذقة من الرود، سله قصير النيلة يجمع بالقتل.

**١٣٠٢٩ - سرق (F). Acroclini (S).**  
 جنس نباتات عشية حولية وبعمرة من فصيلة المركبات. انواعها عديدة تنبت بيرة في الاصحاح المعتدلة. منها نوع واحد زواحي ترابي يفي السرق الورد.

**١٣٠٣٠ - سرق ورد (F). Acroclini roseum (S).**  
**Acroclini rosea, Immortelle rosea (F).**  
**Schmalen sonnenfugel (D). Acroclini (I).**  
 نوع من السرق وهو نبات عشية حولي ترابي. يطول من ٢٠ الى ٦٠ سم. اوراقه متعاقبة لاذقة. نسلها سنائي الشكل، ضيق الصفحة. ازهاره رؤسية قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الورد، حصارها ابيض || ازهاره يستمر طوال الصيف.

**١٣٠٣١ - سرقاط زباني الاصابع (F). Suricata tetracycla (S).**  
 حيوان لبون لاص وحيد الجنس والنوع من فصيلة اقربادات موطنه بعض مناطق افريقية الجنوبية || جسمه صغير القد، قريب النحبة بالنسس. طوله نحو ٤٥ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٥ سم. قوائمها قصيرة رباعية الاصابع، خفيفة الجرائن، اصحابها الاسبية. جلده كثيف الوبر. وبزه احر القاعدة والقسم الاسفل، اطحل القسم الاعل الشوب بعض الصغار، لاذلة ريشه صغيرتان مطوختان بالاسود. ذنبه الى الطعلة الصفراء واستثناء الطرف الاسود. ظهوره مبيج بالاسود || ملجعه الحياتي جاني. يألف الحولية الرملية حيث تنفر له سهولة استغفار الاوتار. قوته القويوات اصحابها الجردان والثفان ثم يصل النباتات الدفصية.

**١٣٠٣٢ - سرقاط (F). Sharp wine (E).**  
 هو النبيذ الحار الطعم ولا يكون ذلك الا في الخمر الجديدة التي يتنصها بعض السكر.

**١٣٠٣٣ - سرقاط (F). Compose**  
 هو السباد الطوري المختبر الناعم من مختلف ارباخ وكثافة واقدار للزراعة يضاف اليه بعض الكلس بمعدل ١٠٪ تسهيل لتحويله واشتاره ورسمة تمليه نيا بعد.

**١٣٠٣٤ - سرقاط (F). Humigane (E).**  
 لمت ترابي يطلق على كل مادة تنتج الدبال.

**١٣٠٣٥ - سرقاط (F). Corque, Cornicula (F).**  
**Small horn-shaped cup (E).**  
 زائدة قرنية مزدوجة لاقسية الشكل تتحلل بما الحشرات المستقيمة الاجنحة مركزها تحت آخر رتبة فوق الحلقة الشربية مثل سرك الهيك الذي يشبه الجلم.

**١٣٠٣٦ - سرقاط (F). Perdrix (female) (F).**  
**Partridge (female) (E).**  
 انثى الجمل.



سرق ورد



سرقاط زباني الاصابع

الى السمرة الكستنية . فكادما غليمان . وهي سداسية  
الرواسب ، ثلاثية الاغالب الطرفية ، محيطة الملب الجانبي .

١٣٥٤٨ - سرموكود \* *Ovovivipare* (F).

*Ovoviviparus* (E).  
نمت تفرعي يطلق على الحشرات البويضة القوية كما في  
بعض القترزيات والذباب التي يتم حخن مكبها وتلقه  
داخل الجسم عند طرف الانطوية .

١٣٥٤٩ - سرموج \* *Anus*  
هو خرج التفل اي طرف المني المستقيم .

١٣٥٥٠ - سرموج \* *Ephippiger* (S).  
*Ephippigère*, *Porte-selle*, *Porte-hotte*, *Hottoux* (F).  
*Ephippiger* (E). *Setzelschracke* (D).

جندب من القترزيات ثوبه الى الصغار الخجلي . طوله  
٢٧ الى ٤٠ م . كسبه كبير القدر مسروج ،  
يعطو تجميع متصالب اسمر اللون . زبانا دقيقتان  
مستطيلتان . مرز كالكسيف شكله واستقامة . مجاديه  
شدنية القصير . اجنسته ريزية . انفاده كبيرة . سيقانه  
دقيقة لا تمكن من القفز المستمر . يتحرك ويديه في الزواحي  
وبين الاشعاب وحل الارض البور . قوته الزورق الاخضر .  
وقد يركب الكروية فيقضي على عليها ويلذنها .

١٣٥٥١ - سرموكيات \* *Mégascopéris* (F).

*Mégascopéris* (E).  
رنية حشرات متفرقة من طبقة الطباكات . اساطيرها  
تعود الى الحقبة الاخيرة من الابعاج الاول المعروفة ايضا  
بالحقبة البرمية || اساطيرها تقل عن ان حشرات  
كالت كبيرة القدر ، قضيفة الاجسام ، مفترسة كما هي  
الحال عند الياسيب المعاصرة .

١٣٥٥٢ - سرمجان \* *Aeschna* (S). *Aeschna* (F).

جنس حشرات مفترسة من السرمانيات . انواعه عديدة  
تعيش قرب الماء قربها الذباب والحوام وبعضها يقرض  
التحلل .

١٣٥٥٣ - سرمجان شائع \* *Gomphus vulgatissimus* (S). *Aeschna communis* (F).

نوع من السرمان طوله نحو ٥ م . جوشه اعضر اللون  
يعطو تسليج اسود . يملكه مستطيل الشكل بترتبه تجميع  
اصفر . أرجله سود || يقرض الذباب والحوام والتحلل .

١٣٥٥٤ - سرمانيات \* *Aeschnidae* (S).

*Aeschnidae* (F). *Aeschnidae* (E).  
فصيلة حشرات من رنية الرطافات . اجنستها وانواعها  
عديدة تتميز بقدر طراحتها وبامتداد اجنستها عند الراسة .  
انثاهما تسرع في الماء الرأكة فضلت بمكبها على سطحه .  
مسطها من الحشرات المفيدة لانها تقتدر الحوام .

١٣٥٥٥ - سرموج \* *Lysmachia* (S).

*Lysmachia* (F). *Loosestrife* (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الربيديات . انواعه  
نحو ٥٠ مظهرها بري وبسطها ترابي . اورلقها متعاقلة  
وسبا غصية ثلاثية ار ريمانية التجميع . ازهارها حامية  
الارتكاز . عشوية منتصبة او سلبية || منبها  
الجلد الحارة والمعتدلة . ترطب في المواقع الرطبة . اشهر  
انواعها ما يتبع .

١٣٥٤١ - سرموكود \* *Sarcodes* (F). *Sarcodes* (E).  
السرموكود مادة حيوانية عادمة الاغشية والشرابون .

١٣٥٤٢ - سرموكويل \* في ذبابة السم ، اطلبها .

١٣٥٤٣ - سرموكولا \* *Sarcococa* (S).

*Sarcococque* (F). *Sarcococca* (E).  
جنس جنات معمرة من فصيلة البقيسات . موطنها الشرق  
الاقصى . سيقها فروع منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م .  
ازهارها صغيرة لاجناسية الشكل . ازهارها وحيدة المسكن  
صفراء اللون . ثمارها نووية .  
انواعه المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

١٣٥٤٤ - سرموكولا مسكندري القوي \* *Sarcococca rusdolia* (S).

*Sarcococque à feuilles de fige* (F).  
نوع من السرموكولا . ساقه منتصبة تملو نحو ٢٠٠ م .  
اورلقها لامعة التصل تطلو من ٣ الى ٥ م . ازهارها صغيرة  
الحمى ، صفراء اللون الباهت . ثماره كروية الشكل  
حمر اللون ، متينة اللحم .

١٣٥٤٥ - سرموكولا صفصافي القوي \* *Sarcococca saligna* (S).

*Sarcococque à feuilles de saule* (F).  
نوع من السرموكولا . ساقه زيا العماء منتصبة تملو من  
١٢٠ الى ١٥٠ م . اورلقها خيشة بارواق الصفصاف ،  
تطلو من ١٠ الى ١٢ م . ازهارها الى الصغار الكنجني .  
ثماره بيضية الشكل ، ارجوانية اللون .

١٣٥٤٦ - سرموكولا هوكر \* *Sarcococca Houkeriana* (S).

*Sarcococque de Houker* (F).  
نوع من السرموكولا . ساقه تملو من ٩٠ الى ١٢٠ م .  
اورلقها احليجية الشكل تطلو من ٥ الى ١٢ م . ازهارها  
الى الصغار السابق . ثماره نصف كروية الشكل سيوا  
اللون .

١٣٥٤٧ - سرموكولا بنفسجية \* *Cerooma violacea* (S). *Cérocoma violet* (F).

*Cerooma violacea* (E).  
حشرة طيبة واثقة غاشلة واثمة من فصيلة المادويات ورنية  
معدنات الاجنحة . موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة  
الحارة من اقاليم القديم . تألف البراري . غشاشها تعيش  
على ازهار فصيلة المركبات . يقاتها والجمه تعيش على ما  
تستطيع اقتحامه من الدب والمكن || جسمها متوسط القدر  
يطول من ١٢ الى ١٤ م . ثوبها الى الزرقه البنفسجية  
يعطوها مزيج اعضر . رأسها مستدير الشكل . زباناها  
صنوبريات . عيناها صغيرتان . ظهورها مستدير الطرف  
اللاصق || من ميزاتها انها تنقرض عنه لسها مادة صفراء  
اللون كروية الرائحة . وإن جهازها التنفسي وطوارها يحسن  
مادة لائقة تنبع الجلد بتدر الجاء والايلاج . ويتر ما يجعلها  
من الحشرات الطليعية . اما نسبة البلايين الموجودة فيها  
فتتراوح من ٩٠ الى ١٠٠٪ || الاثاق ابرز قدام من الذكر  
واجهت ثوبا من رادسح يملو || لها جيل واحد في الخيط .  
تظهر الحشرة المجلدنة في اواسط ايار وتعيش حتى اواخر  
تموز . تحرق في النهار || البرقة تطلو نحو ٢٠ م .  
جسمها مبسط الشكل ، اسمر اللون ، اثبر المزيج . رأسها



سرموكولا بنفسجية



سرموج



سرمان شائع



سرموج

معتقة، متعاقبة، كبيرة اللق، شاربة، غليظة الشكل. نصلها حديد المروق، كثير التجميع، لونه إلى الخضار المائل || أوراتها تستعمل استعمال السبانخ. أما بزورها فطرية سهلة وقوية.

### ١٣٥٦٤ - سرمق بحري \* ، قطف بحري ،

*Atriplex halimus* (S). **حلم**  
Arroche marin, Pourpier de mer, Halime (F).  
Ses-orache, Ses purslane (E). Meerportulak, Ständmelde (D). Porcallana marina, Disciplina fratrurn, Malochia (I).

جنية برية غشوية تملو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ترطب في المواق الساحلية الشرقية على البحر. أوراتها مأكلة وقد تملأ. يكثر استعمالها في بعض المناطق الاسبانية والانكليزية.

### ١٣٥٦٥ - سرمق بري \* ، قطف بري

*Atriplex hastata* (S). Arroche des champs (F). Wild orache (E). Spiessmelde (D). Atriplice astata (I).  
عشيرة برية حولية تكثر في الحقول المزروعة. أوراتها مستطيلة سنائية. ترعاها الماشية ليحسن حالها ويجيد درها.

### ١٣٥٦٦ - سرمقيات

Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (S).  
Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (F). Chenopodiaceae, Salsolaceae, Atriplicaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها اولها عديدة. اصطلحوا البلاد للمتلفة الحارة. جميعها احشاش وبنبات بعضها يرطب في السبانخ المالح.

### ١٣٥٦٧ - سرمقيات

*Dictyoptera* (S). Dictyoptères (F). Dictyoptera (E).  
رؤية حشرات تقتني إلى طبقة الوردانيات، تشمل عدة فصائل اشهرها بنات وردان والسرمقيات. اجناسها وانواعها زهاء ٤,٠٠٠ اكثرها من حشرات البلاد الحارة وبعضها يعيش في البلاد المعتدلة.

### ١٣٥٦٨ - سرمقيات

*Serombus gallus* (S).  
لوع من اللداع يمكن منه اطعام الطيب.

### ١٣٥٦٩ - سرقة خشنة \* ، مكينة \* ، (سكان المشهور)

*Cerinte* (S). Cérinthe, Mélinet (F). Honeywort (E).  
جلس نباتات عشبية مثالية طرية برية حولية او معمرة من فصيلة الحشقيات. الوانها المعروفة نحو ١٢. جميعها احشاش فراء. أوراتها متعاقبة حافسة بحرية اللون. ازهارها سفلية التجميع، صغيرة اللق، صفراء اللون اورانية. تفرز رقيقاً صلي المادة يحمره التمل || أوراتها طرية تستعمل في علاجات العين. يزود تسكن للمصن لروايح الجنب والظهور. وفرقة منه مع الزعفران والبصل يد الطهر كمين على الحمل. وهو ينج الباء || اشهر انواعه ما يلي.

### ١٣٥٧٠ - سرقة خشنة \* ، مكينة خشنة \* ،

*Cerinte aspera* (S). Cérinthe rugueuse, Mélinet rugueux (F).  
نوع من السرقة المشتقة البرية الخولية. عشباتها تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراتها اطليعية الشكل. اذنياتها

### ١٣٥٦٩ - سرمق زراعي الورق

*Lysimachia quadrifolia* (S). *Lysimache à 4 feuilles* (F).  
نبات معمر منه امريكة الثبالية. يملو من ٣٠ إلى ٩٠ سم. ساق زينة. أوراتها متعاقبة، لالحة، ضمية، ربابية. نصلها اخضر اللون على صفحته. ازهاره كبيرة اللق، فريدة، ابطية الارتكاز، طويلة الزنادة متدلية. لونها إلى البياض اللثني || ازهاره يستمر من حزيران الى آب.

### ١٣٥٧١ - سرمق شامع

مشهور باسم سراجية. اطباء.

### ١٣٥٨ - سرمق حقيقي

*Lysimachia atropurpurea* (S). *Lysimache pourpre noir* (F).  
نبات حولي او عويل يملو نحو ٦٠ سم. ساقه سرقة. أوراتها متعاقبة اطليعية. نصلها مائل البشرة، اخضر الصفحة العليا، طاق السفل. ازهاره متوسط الكثافة متدلية. لونها إلى الحرة العنقية || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول.

### ١٣٥٩ - سرمق مزول

*Lysimachia ephemerum* (S). *Lysimache éphémère* (F).  
نبات معمر يملو نحو ١٥٠ سم. ساقه سرقة. أوراتها لالحة، متعاقبة، سنائية. نصلها بحري اللون. ازهاره حشوي ومنتصب، مستطيل. ازهاره صغيرة اللق، يضاء اللون || يزهر من تموز الى آب. يرطب في الارربة الكلسية.

### ١٣٥٩٠ - سرمق شميل ، سرمق عيني

*Lysimachia barystachys* (S). *Lysimache à gros épis* (F).  
نبات سروتي معمر هذه الصين. يملو نحو ٦٠ سم. ساقه زينة. أوراتها متعاقبة اطليعية. نصلها خيل البشرة اخضر الصفحة العليا بحري السفل. ازهاره سبل الشكل كثيف التجميع. ازهاره صغيرة اللق يضاء اللون || يزهر من حزيران الى تموز.

### ١٣٥٩١ - سرمق حوشم

*Lysimachia punctata* (S). *Lysimache ponctuée* (F).  
نبات معمر يملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه زينة. أوراتها متعاقبة ضمية ثلاثية او رباعية التجميع. نصلها سنائي الشكل، خيل البشرة على صفحته. ازهاره صفراء اللون يطولها تيجاج اخر ويتهيب وودي || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز.

### ١٣٥٩٢ - سرمق ، قطف

*Atriplex* (S). Arroche (F). Orache (E).  
جلس نباتات برية، عشبية حولية او غشوية معمرة من فصيلة السرمقيات. الوانها عديدة منها الاقاليم المعتدلة. ساقها غزيرة العصارة اللينة الزجة. أوراتها متعاقبة. ازهارها قياسية متباعدة الالوان || اشهر انواعه ما يلي.

### ١٣٥٩٣ - سرمق ابيض \* ، قطف ابيض

*Atriplex hortensis* (S). Arroche des jardins, A. épinard, Belle-dame, Bonne-dame, Chou d'amour, Follette (F). Orache, Butter leaves, Mountain spinach (E). Gartenmelde, Grünkraut (D). Atriplice, Spinacione, Bells dama, Bletons (I).  
بقلة زراعية حولية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراتها



سرمق ابيض



سرمق بحري



سرمق بري



سرقة

## سرنجة صغيرة - سرنجة صغيرة الورق

الاسجام قطرها من ١٠ إلى ٥٠ مليميكرون. اشهرها واعما انتشاراً يورس Y ويورس A ويورس X ويورس S ويورس Y ويورس M. كل منها يشكل غرباً منفرداً له ميزاته الخاصة. جميعها مؤذية لتعلب الاوراق والسيقان. وفي من الاصنام المتصعبة الي حيز البلم حتى الآن من مابلها ولقضاء حليها. نازلةا باجتناب البادر الملوث والآرة للويوة والزيارات المائلة القرية هي غير حاية مستطاعة الآن .



سرنج البطاطا

١٣٥٧٧ - سرنجة التبغ \* (F). Mosaic du tabac (F). Mosaic disease of tobacco (E).

نوع من السرنج تسميه يورس مركبة قصبية الشكل تطول من ٢٠ إلى ٧٠ مليميكرون تنتقل مع السنج ال مائل اعضاء النبات اغصها الاوراق والسيقان || مظهره الخاصي ، عل الاوراق اللينة ، بلع حلقية وبهاة لاجابية الشكل والارتوب تلو صفحة التصل يتقيد ال عطف الاشكال التشوية القرية اغصها الاستطالة والتفريص والتجسيد والاكشاش . ولذا اخرى الاوراق بعد اكثال نموا يتجها دون ان يشو شكلها .



سرنج التبغ

١٣٥٧٨ - سرنجة \* (F). Syringa Mock orange (F). Jasmingeranscauch, Falscher Jamin (D). Siringa, Fior d'angelo, Pissenza (I).

جنس شجيرات برية وتربيتية من فصيلة السرفيرات (الليليات). انواعها نحو ١٥ موقها فرعا . فروعها متعاقبة . اوراقها عابلة ، معققة ، متعاقبة ، يضيعة

التصل المسن الحلقه || ازهارها كيرة الله ، حيلة الشكل ، مختلفة التجميع ، لنية ليليات النسيج ، كثيرة الاسدية ، يضاء اللون . بعضها فواح المشنج المثل القصار || اشهر انواعها القرينية ما يليج .

١٣٥٧٩ - سرنجة زنباع \* (F). Syringa hirsuta (F). Syringa hirsuta (F).

شجرة سبروية مهداة امريكة الشالية . تلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها تطول من ٢ الى ٦ سم . نصلها منشاري الحلقه ، خلي الصفعة السفلى || ازهارها عادمة الكرف ، يضاء اللون قطرها نحو ٣ سم || تزهر في حزيران .

١٣٥٨٠ - سرنجة شالكة

Philadelphus coronarius (F). Syringa commun (F).

شجرة سبروية حديثة الشروب مهداة القوقاز واوربية . تلو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها تطول من ٧ الى ١٢ سم . نصلها ساني الشكل ، مائل الصفعة العليا ، خلي السفلى ، مهدب الحلقه || ازهارها فواحة الكرف ، يضاء اللون ، خاسية التجميع ، كيرة الله ، قطرها نحو ٤ سم . || ازهارها يستمر من ايار ال حزيران .

١٣٥٨١ - سرنجة صغيرة الورق

Philadelphus microphyllus (F). Syringa à petites feuilles (F).

جنية زينة مهداة امريكة الوسطى . تلو نحو ١٠٠ سم . اوراقها سنائية تطول نحو ٣ سم . نصلها ازغب الصفعة السفلى . عادم للتئين || ازهارها مشيرة الله ، مرفية الرائحة ، يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال الصيف .

مسطيلة . نصلها مهدب الحلقه المسنة ، مدون البشرة عل صفحته . ازهارها متدلية ، قوحتها ارجوانية اللون ، صفر الاطراف || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

١٣٥٧١ - سرنجة صغيرة \* (F). Sernja (F). Sernja (F). Sernja (F).

حشيشة البرسيم (لسان المصفر الصغير) Cerinthe minor (F). Cérinte petite, Málnet minor, Petit málnet (F). Small honey-wort, Waxflower (E). Gelbe wachablume (D). Erba valois (I).

نوع من السرنجة المشرية البرية وهي حشيشة تلو من ١٥ الى ٣٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنات ، يضيعة الشكل . نصلها مدون الصفعة العليا . ازهارها ال اصفار الكبريت يطلوها عند قواضها يتقيد خلي السند ابيش اللون او احمر . ازهارها يستمر من ايار ال تموز .

١٣٥٧٢ - سرنجة مالهية \* (F). Cerinthe glabra (F). Cérinte glabra, Málnet glabra (F).

نوع من السرنجة المشرية للمصرة . يجلها تلو نحو ٤٠ سم . اوراقها يضيعة الشكل ، دليقة الاذنات ، نصلها مائل البشرة عل صفحته . ازهارها ذهية اللون عجنة النصوص . ازهارها يستمر من ايار ال آب .

١٣٥٧٣ - سرنجة مكثوبة \* (F). Cerinthe retorta (F). Cérinte retournée, Málnet retourné, M. de montagne (F). Honey-wort (E). Wachablume (D). Cerinta (I).

نوع من السرنجة المشرية البرية وهي حشيشة تلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها مستديرة الاذنات ، اهليجية الشكل . نصلها مدون البشرة عل صفحته . ازهارها صفر التريجات ، ينضجية النصوص || ازهارها يستمر من تموز ال آب .

١٣٥٧٤ - سرنجة مخططة \* (F). Cerinthe maculata (F). Cérinte maculée, Málnet maculé (F).

نوع من السرنجة المشرية للمصرة . يجلها تلو من ٦٠ الى ٧٠ سم . اوراقها اهليجية مسطيلة ، اذناتها مستديرة . نصلها مدون الصفعة العليا . ازهارها نارية اللون يعلها عند قواضها نصوصها يتقيد ازرق || ازهارها يستمر طوال الصيف .

١٣٥٧٥ - سرنجة \* (F). Mosaic (F). Mosaic (F).

جنس اصنام يوربية فتاكة حيدة الانواع تصيب النبات لثوذيته وقد تقضي عليه . يوربها ذرية الله لا تخضع بالاجاهر العادية لان طولها يراوح من ١٠ الى ٦٠ مليميكرون . وفي تموز داخل السنج النباتية وتتلف اليها مع السنج يراصة الجروح والاناديش والحشرات القاذصة والماصة || اشهر انواعها واعرها سرنج البطاطا والتين والبنورة والشليك .

١٣٥٧٦ - سرنج البطاطا \* (F). Mosaic de la pomme de terre (F). Mosaic of potato (E).

نوع من السرنج تسميه يورس اسطوانية الشكل مختلفة



سرنجة



## ١٣٥٨٧ - سُرْتَجَة عَادِيَة السُرْف

*Philadelphus inodorus*, *Doutzia corymbosa* (S). *Seringa inodora* (F).

شجرة سبروتية مهددة أمريكية الثنائية . تطلو من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه مديدة المنقطة ، تطلو من ٦ الى ١١ سم . نصلها من الحافة ، خلى المروق || انزعارها عمادة السرف ، وريه التجميع ، فردية او ثلاثية ، قطرها نحو ٤ سم . لونها اليباض المالحى || انزعارها يستمر من ٤ الى ٥ أسابيع ابتداء من لوائل ايار .

## ١٣٥٨٢ - سُرْتَجَة كَبِيْرَة الزَهْر

*Philadelphus grandiflorus* (S). *Seringa à grandes fleurs* (F).

شجرة روفية مهددة أمريكية الثنائية . تطلو من ٤ الى ٦ امتار . اوراقها بيضيه تطلو من ٨ الى ١٤ سم . نصلها مالى الثيرة ، مشاري الحافة || انزعارها قليلة الثرف ، يضاء اللون ، كبرية اللد ، قطرها نحو ٦ سم . نتائجها الزهرية مستطيلة قليلة الكثافة || انزعارها يستمر من نيسان الى ايار .



سُرُوْف صِيَاد

## ١٣٥٨٤ - سُرْتَجَة مَكْسِيْكَة

*Philadelphus mexicanus* (S). *Seringa mexican* (F).

شجرة سبروتية مهددة المكسيك تطلو نحو ٢٠٠ سم . اوراقها حرة صغيرة اللد تطلو نحو ٥ سم . نصلها جلدي الصفرة من الحافة || انزعارها حرة الرائحة ، يضاء اللون يعلوها ، عند انكشاف بتلاتها ، من الداخل ، تنمش اربوينا || انزعارها يستمر من سربان الى تموز .

## ١٣٥٨٥ - سُرْتَجِيَّات

*Paleoptera* (S). *Paleoptères* (F).

شعبة سحرات من طائفة المهنجات أصلا . تشمل حاليا طليتين وارب رتب ترميها ما على :

١ طبقة البليات التي تشمل رتبة أليقنيات ورتبة الزنبريات .

٢ طبقة الرعوسيات التي تشمل رتبة الجحليات ورتبة الرماشات .

## ١٣٥٨٦ - سُرُوْف

*Bald buzzard* (F).

السُرُوْف ج سرائيف . جس طير من العقبان وفضيلة الصقريات . انواعه عديدة جميعها من القواطع : اجنسها مستطيلة ذلقة . منارها قوية ، شديدة الانحناف ، عصبة البرة الذرية || يالغ الانهر والبحيرات والظهور البحرية . قوة الاسماك . يلمن منه في الاشجار الزقية او حل الصغور الثالثة قرب مجاري الماء . اناته تحسن وصفا من ٢ الى ٤ رفقات نحو الشهر || اشهر انواعه واحدها السُرُوْف السباد .



سُرْمِيَتْ جَلَح

## ١٣٥٨٧ - سُرُوْف صِيَاد ، سُرُوْف يَحْمَرِي ، عَكَب نَسْرِيَة

*Pandion haliaetus* (S).

*Bald buzzard* (F). *B. fluviatilis* (F). *Asprey* (E).

نوع من السُرُوْف ريع الجبة طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٥ سم . ريشه من ١٣٠ الى ١٤٠ سم . رأسه وصغره ويطن يعض . صدره مديج وينش . ظهره الى السمرة ذبه مجاح يستطوط سُرْفَة متساوية . عيناه الى الصفرة الباقية . مناره وضالبه سود || يالغ الشطوط البحرية ومجاري الماء . قوة الاسماك .

## ١٣٥٨٨ - سُرْمِيَتْ

*Cirrhites* (S). *Cirrhites* (F). *Cirrhites* (E).

جس اسماك بحرية من فصيلة السرميات . انواعه المعروفة ستة ، اصطلحا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها اطيالية الشكل تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . جميعها فردية الزعانف الظهرية المستطيلة الكثيرة المناعس . زعانفها الشرسية ثلاثية المناعس الحادة . اقلها متباينة الالوان منها الاصفر والاشهب والاصفر البحري والاحمر والاريد الرصاصي ، جميعها مزودة الظهر والجوانب || اعرف انواعها واشهرها السرميت الجلع .

## ١٣٥٨٩ - سُرْمِيَتْ مَجْدَع

*Cirrhites maculatus* (S). *Cirrhites maculé* (F).

نوع من السرميت . اصطلحا البحر الاحمر . تعيش قرب الجبالح . لونها الخالي جامي . جاعاتها متوسطة العدد || جسها اطيالي الشكل ، متغل التسطيط ، يطلو نحو ٢٥ سم . رأسها خالفت الجبهة ، امير اللون يعلو تنقيط اصفر . عظمها قصير . شفتها دون الصط . صيها كيرتان ، مستديرتان ، نادرتان . زعنفتها الظهرية مستطيلة ، قلابة ، القمم الامامي منها تسامي المناعس الختالية الطوك ، المرقطة بالجلوي . زعانفها الصدرية والحوضية كبيرة . زعنفتها الشرسية ثلاثية المناعس المنقطة الحادة . زعنفتها الذيلية مقنطية الطرف || لونها الى الشبه ، يعلوها في ظهرها وجانبها تيجج وتجميع امير || لحمها متوسط الصفت ، مأكول .

## ١٣٥٩٠ - سُرْمِيَّات

*Cirrhitidae* (S). *Cirrhitidae* (F). *Cirrhitidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من شالكات الزعانف . اجسامها وانواعها المعروفة عديدة جميعها من اسماك مجار المناطق الحارة || اصماكها متحدة اللد ، اطيالية الشكل ، تطلو من ٢٠ الى ٢٥ سم . سفنها صغير الحجم مستدير الشكل . زعانفها الظهرية والشرسية تحمل مناعس حادة || اعرف اجناسها واشهرها السرميت .

## ١٣٥٩١ - سُرُو

*Cupressus* (F). *Cupressus tree* (E). *Echte cypresse* (D). *Cipresso* (I).

جس اشجار حربية وزينية من سبط السوروبات وفضيلة السوروبات . انواعه نحو ١٥ تنقيتها السوروبية العامة ترتكر من الميزات التالية : بتالغها موزقة ، راعمها مشاة بالاوراق . اوراقها حرة ، فلسية ، متعابله ، مقلقة ، مرصوسة على ازمة سفوف يبي ساعدة القاعدة ، والزام الاويل || انزعارها طرية وصيدة اللق المسكن ، والذكورية منها كثيرة الاسدية وتيبوب الروع || ثمارها اكرار كروية الشكل تتألف من جراحات صغرية ، ليقيه ، جلدية يراوح طولها من ٦ الى ١٤ || يزورها صغرة مجنعة لا قياسية الشكل والحمم || اشهر انواعه ما يتبع .

## ١٣٥٩٢ - سُرُو أُرِيْزُونَة

*Cupressus arizonica* (S). *Cuprés de l'Arizona* (F).

شجرة سبروتية سرية التو مهددة اريزون . من احوال امريكة . تطلو من ٢٠ الى ٢٥ م . بتالغها دقيقة ، لاقياسية الانتظام . اوراقها رائحة ، قلبية ، شديدة الصغر ، لونها الى الخضار الازرق . رعمها رائحي ايض اللون . انزعارها الذكورية كبريتية اللون الى الانتوية

## ١٣٥٩٨ - سُرُو مَكْنَاب

*Cupressus macrabiana* (S). *Cypress de Mac Nab* (F).  
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تنمو  
من ٢ الى ١٠ أمتار. بناتها قصيرة جامدة لاقياسية  
الارتكاز. اوراقها فلسية، مستعرضة، راحضة. صمغها  
رائحة ايضاً اللين. اكرانها عذائية الجرامات || تراب  
في الاقاليم الحارة والارضية السميكة الغور المتوسط  
الامتداد والرطوبة.



سرو شائع

## ١٣٥٩٩ - سُرُو تَحِيص، سُرُو الْخَابِر

*Cupressus funebris* (S). *Cypress pleureux*, *C. funebris* (F).  
شجرة سريرية سريعة النمو. مهدبا الصين. تنمو من  
٢٠ الى ٢٥ م. بناتها نظامية، مبططة، جيلة الخشار  
البات. اوراقها مديية، حديشة الخشار الزاهي. اكرانها  
صغيرة قطرها نحو ١٢ م. جراماتها من ٦ الى ٨ لونها  
ال زبدية البسود || تجيد وتنمو في جميع الاراضي.



سرو كليفورني

## ١٣٥٩٠ - سُرُو

*Ovipare* (F). *Oviparus* (E).  
هو كل حيوان يتكاثر بالسرور البسود او البسود، راجح يبيض.

## ١٣٥٩١ - سُرُوِيَّة

*Cupressinées* (F).  
سبط من فصيلة الصنوبريات يشمل السرو والرعرع والسنديك  
والسنديك والسنديكوس.

## ١٣٥٩٢ - سُرُوِيَّات

*Chitridinae* (S). *Chitridinées* (F). *Chitridinae* (E).  
مرتبة من رتبة القنطريون البنيوية تشمل على فصليتين  
الصنوبريات والمروليات.

## ١٣٥٩٣ - سُرُوِيَّة

*Oolithe* (F). *Oolithe* (E).  
آربة كلسية مسنوبة الى الجوزية ذاتها كسر البسود.  
اشهرها.

## ١٣٥٩٤ - سُرُوِيَّة

*Oolithe blanche* (F). *White oolithe* (E).  
سُرُوِيَّة بيضاء

## ١٣٥٩٥ - سُرُوِيَّة

*Oolithe ferrugineuse* (F).  
سُرُوِيَّة حديدية

## ١٣٥٩٦ - سُرُوِيَّة

*Oolithe miliare* (F). *Miliary oolithe* (E).  
سُرُوِيَّة دميعة

## ١٣٥٩٧ - سُرُوِيَّة

*Oolithe grande* (F). *Big oolithe* (E).  
سُرُوِيَّة كبيرة

## ١٣٥٩٨ - سُرُوِيَّة

*Lapex*, *Lapex* \*  
دبار طبيعي لاقياسي البسود والامداد عذبة سطح البسود  
الجسمي، ج. اسرة.

## ١٣٥٩٩ - سُرُوِيَّة

*Criquet* (F). *Locust* (E).  
هو الجراد من أي جنس او نوع كان.

## ١٣٥٩٠ - سُرُوِيَّة

*Certhium* (S). *Certhium* (E).  
جنس سويلات بحرية من الرغويات مدييات الاربع  
وفصيلة السريليات. انواعه للرغوة كثيرة البسود بعضها  
من متحجرات الانحساب الاول وبسوها محاسر منتشرة  
جميع جدار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداها متباينة  
الاشجام، جميعها غروبية عذبة وبسوها تشديد الرغوي.  
الوانها سوية تنطب فيها الخضابات القاتمة.

## ١٣٥٩١ - سُرُوِيَّة

*Rigole* (F). *Trench* (E).  
جري ماء الساقية او الري.

فالى الخشار البحري || اكرانها صغيرة اللد قطرها نحو  
٢٥ م. لونها الى الجوزية يلوها حل صمغاني. جراماتها من  
١ الى ٨ م. وهي جيلة الشكل شائعة الامتداد الزهني.  
تجيد في جميع الاراضي ولا تنحس الكلسية.

## ١٣٥٩٢ - سُرُو بَحْرِيّ الْكُون

*Cupressus glauca*, *C. lusitanica*, *C. coutantii* (S). *Cypress glauque*, *Cedre de Goa* (F).  
شجرة سريرية في الاقاليم الحارة، جادسة في المعتدلة.  
مهدبا المكسيك. تنمو من ٢٠ الى ٣٠ م. بناتها  
نظامية، رباحية الانداد، بحرية اللين. اوراقها  
مديية عذبة الرشح الرائحة بحرية الخشار. ازهارها  
الذكورية صفراء اللين يلوها موالج ارجواني اما الانثوية  
فال زبدية المزودة بالبسود || اكرانها صغيرة  
بنيوية الشكل لونها الى الجوزية القاتمة || تجيد في جميع  
مواقع ساحل البحر المتوسط وفي كل تربة.

## ١٣٥٩٣ - سُرُو تَحْلَايَا

*Cupressus torulosa* (S). *Cypress toruleux* (F).

شجرة سريرية في الاقاليم الباردة والمعتدلة، جادسة في  
الاقاليم الحارة. مهدبا حلايا. تنمو من ٢٥ الى ٤٠ م.  
بناتها نظامية، قياسية، دقيقة اللد، فسقية اللين.  
انثادها وصرامها مديية. اوراقها حديشة الصفر عذبة  
الخشار. ازهارها الذكور صفراء اللين اما الانثوية  
فال الزبدية البنيوية. عذبة اخر اللين ناعم الرقة.  
اكرانها صغيرة. جراماتها مقرنة || لها صربان مهوران.  
*Cupressus torulosa corneyana*, *C. tor. majestica* (S).

## ١٣٥٩٤ - سُرُو شَائِع

*Cupressus sempervirens* (S). *Cypress commun* (F).  
شجرة سريرية سريعة النمو مهدبا صوب البحر المتوسط  
فروها عذبة تنمو من ٢٠ الى ٣٠ م. بناتها دقيقة،  
غيراه اللين، لاقياسية الارتكاز. اوراقها فلسية،  
حديشة الصفر، عذبة الخشار، رائحة الرائحة. قطر  
كرزها يراوح من ٣ الى ٤ م. ويحد جراماتها من ٨  
الى ١٤ || اقلها المناطق الحارة والمعتدلة. لا تنمو  
كثرة الصقع وبسودها. تجيد في جميع الاراضي. تفضل  
الري. تنمو لحد الريح || فروها المهيورة  
حثة، اعمارها السمية ما يلي:

*Cupressus sempervirens contorta*, *C. s. fastigiata*,  
*C. s. horizontalis*, *C. s. thuyaeifolia*, *C. s. variegata* (S)

## ١٣٥٩٥ - سُرُو كَشْمِيرِيّ

*Cupressus* \*  
*cashmiriana* (S). *Cypress du Cachemire* (F).  
شجرة رابطة بطيئة النمو مهدبا اللد والكت. تنمو من  
١٠ الى ١٥ م. بناتها نظامية بحرية دقيقة. اوراقها  
بحرية الخشار. انثادها وصرامها متباينة الانداد.  
اكرانها كروية قطرها يبلغ ١٥ م. جراماتها من ٨  
الى ١٢ لونها الى الحلي الملبق || تنمو من اجل  
الانواع الزبدية كنها قليلة الانتشار نظراً لعلابها  
الترية والمروية.

## ١٣٥٩٦ - سُرُو كَلِفُورِيَّة

*Cupressus goveniana* (S). *Cypress de Californie* (F).  
شجرة جادسة بطيئة النمو مهدبا كليفورية. تنمو من  
١٠ الى ١٥ م. بناتها بحرية، قصيرة، جالسة الانتداب.  
اوراقها عذبة الخشار. اكرانها كروية قطرها نحو  
٢ م. جراماتها صفراء اللين يلوها موالج بفسقي لاصع.



سُرُوِيَّة



سريع



سركة



سرولة المرسط



سطاقس النائع



سطاقس جرمانى

## ١٣٦٠٨ - سُرِّيَّات \* Cerithiidae (S).

١٣٦٠٨ - سُرِّيَّات \* Cerithiidae (S).  
 فصيلة من الرغويات مغليات الارجل مشطيات الخياشيم .  
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من متحجرات  
 الاقحاف الاول والبعض الآخر منظر في جميع  
 بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اصنافها غروبية  
 حلزونية ، قريبة القوابل الثائرة ، مفرغة الاحاديد ، شبه  
 مستديرة القلوة المنحنية يلتصق بجسمي الرأس || اعرف اجناسها  
 واشهرها السريت والسروتونه والسروتونه والسبتونية والبيلس .  
 ١٣٦٠٩ - سُرِّيَّات \* Didelphus (S). Serigue (F).  
 جنس حيوانات راسمة من الجرابيات . انواعها المعروفة  
 ٤٠ موطيا امريكية الوسطى والجنوبية . اجسامها مستطيلة  
 الشكل طويلا يراوح من ١١ الى ٥٦ سم . واذا نجا من  
 ٧ الى ٣٨ سم . رؤوسها اسطوانية . اذنانها كبيرة مستديرة .  
 اعنتها غليظة . جرابها قصيرة . ظافرها سادة . اذا نجا  
 اخاذة ، مستطيلة ، كاسية الزام الاول حشوية الثاني والثالث  
 والرباع || اجرة اذنانها كبيرة لقد مطاة . املاؤها  
 ودية الترتيب يراوح مدها من ٧ الى ٢٥ . محبل الاثني  
 بدم ٢٥ يوما تنقص على اثره من ٤ الى ١٦ دوسا .  
 وهي من الحيوانات الشاذة تسرح في الليل . قوتها  
 الحشرات عمل اختلاف انواعها والرحلات مع الاقاصي  
 والصائغين . يربصها ويأكل السركية عند الحاجة .  
 ١٣٦١١ - سُرِّيَّات \* Serica (S).  
 جنس حشرات خافضة من غمديات الاجنحة صليبيات  
 لقرن وفضلة الجرابيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠  
 منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطسة ، شبه  
 اهليجية الشكل ، ممددة الرأس والكولس والقص ، تطول  
 من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستديرة . متاكها للفاضة .  
 عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صليبية  
 الالمفات . احمادها شديدة لاسفة . قوائمها نشيطة ،  
 متعطة الضفالة . اثنائها وحيدة اللون السوي يكثر فيها  
 الكسني ثم الاصفر والاسود والاسود والاسود والاسود ||  
 تعيش على المواد النباتية المختلفة .  
 ١٣٦١٢ - سُرِّيَّات \* Sérigue (F). Serica (E).  
 جنس حشرات خافضة من غمديات الاجنحة صليبيات  
 لقرن وفضلة الجرابيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠  
 منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها مغلطسة ، شبه  
 اهليجية الشكل ، ممددة الرأس والكولس والقص ، تطول  
 من ١٤ الى ١٨ سم . رؤوسها مستديرة . متاكها للفاضة .  
 عيونها بارزة . قرونها الاستشعارية مرققة ، صليبية  
 الالمفات . احمادها شديدة لاسفة . قوائمها نشيطة ،  
 متعطة الضفالة . اثنائها وحيدة اللون السوي يكثر فيها  
 الكسني ثم الاصفر والاسود والاسود والاسود والاسود ||  
 تعيش على المواد النباتية المختلفة .  
 ١٣٦١٣ - سُرِّيَّات \* Seriola (S).  
 Sérïole (F). Seriola (E).  
 جنس اسماك بحرية من الاسمديات شالكت الزمائف .  
 انواعها المعروفة نحو عشرة . اصلاتها بحار البلاد الحارة  
 والمعتدلة الحارة || اجسامها كبيرة للقد ، اهليجية  
 الشكل ، تطول من ٥٠ الى ٩٠ سم . القوابل الى الرتبة  
 الفضية المواج تبق وتقتد سمها مع الاتراب من تيج  
 الظفر وتزهر وتبيض عند البطن . زعنفتها الظهرية مستطيلة  
 منقسمة الى جزئين لامتداوين ، الجزء الخلفي نظامي  
 مستطيل ، الجزء الامامي صغير القذ ، ناشر المناسخ  
 اعنها المنخس الامامي المؤذي لطح الرأس . زعنفتها  
 الذيلية فارة || اشهر انواعها واهرها سرولة المرسط .  
 ١٣٦١٤ - سُرِّيَّات \* Seriola dumertii (S). Sérïole de la Méditerranée.  
 S. argentée (F). Silver seriola (E).  
 نوع من السرولة . سمكة بحرية يبيض . اصلاتها البحر

الايض المتوسط . مسرها يمي ولا تقترب من التقاف  
 والمجادح الا في الربيع والخريف || جسمها اهليجي  
 الشكل يطول من ٨٠ الى ٩٠ سم . قوابل الى الرتبة الفضية  
 تزرق وتقتد زعنفتها عند الظهر وتزهر وتبيض عند البطن .  
 رأسها محتل الجرم ، قصير الخطم . صيها كيركان .  
 فكها الاسفل يتقدم الاعل . اسنانها كثيرة العدد . زعنفتها  
 الظهرية مستطيلة منقسمة الى جزئين لامتداوين . الجزء  
 الامامي ونشي الشكل ناشر المناسخ الحادة اعنها الاول  
 المنطقتا نحو الرأس . الجزء الثاني نظامي الشكل ،  
 عادم المناسخ . زعنفتها الذيلية فارة || لحمها متوسط  
 الصنف ، مأكلي .

١٣٦١٥ - سُرِّيَّات \* Euvé (F). Hard-headed (E).  
 كل سمكة اثنى لا يزال جرابها الشلبي مليء بالسر تمت  
 بالسريرة .

١٣٦١٦ - سُرِّيَّات \* Sociologie (F).  
 Sociologie (E).  
 السوسيولوجية علم يبحث في الجماعات البشرية وفي الناشع  
 الاجتماعية .

١٣٦١٧ - سَطَائِسُ  
 وجمرة تنبت في التراب في اطلال المياه زرعها المشاة وينسل  
 بورتها الدروسى « (السان) .

١٣٦١٨ - سَطَائِسُ \* هو السطائس ، اطليه .

١٣٦١٩ - سَطَاع Pillar (F). Pillar (E).  
 كل عمود فالت ترتكز عليه السلطنة واثا به .

١٣٦٢٠ - سَطَائِسُ \* Stachys (S). Epilaira (F).  
 جنس نباتات برية ويزينية من فصيلة الشفويات .  
 انواعها زهاء ٢٠٠ معظمها عشبي وبشها جنبي . سوطها  
 فراء . اوراقها كاملة ، متعاقبة ، معتقة . ازهارها سبيلية  
 التجميع تاجية الازتكاز اكثرها صطوة || اشهر انواعها  
 يتبع .

١٣٦٢١ - سَطَائِسُ النائع \* Stachys palustris (S). Epilaira des marais, Ortie des marais, Ortie morte (F). Marsh betony, Clown's all-heal, Marsh wound-wort (E). Sumpflizest (D). Scabbiosa palustris, Spigo fiorito (I).  
 نوع من السطائس وهو عشبة برية معتقة تملأ نحو  
 ١٠٠ سم . ساقها فراء . اوراقها مقنطوة . ازهارها  
 ارجوانية اللون . تستعمل في تطيب بعض الملل الجملانية .

١٣٦٢٢ - سَطَائِسُ جرمانى \* Stachys germanica (S). Epilaira de Germanie, Sauge molle, Stachyde, Epi flauri (F). German stachys, Downy wound-wort (E). Deutscher ziest, Ziest (D). Stachide germanica, Spica fiorita, Madre salvia (I).  
 نوع من السطائس وهو عشبة برية ويزينية سمرة  
 تملأ من ٥٠ الى ١٥٠ سم . ساقها مغلطسة زياء اللحاء .  
 اوراقها قليلة الفاصمة . نصلها خلى البشرة ، مسن الحافة .  
 ازهارها وديرة اللون ، فضية السيلة ازراء || ازهارها  
 يستعمل من سزيران الى ايلول .

## ١٣٦٢٢ - سَطَائِسُ سَبْيَلِيَّةٍ \* ، إِرْوَالِيَّةٌ ،

## سَطَائِسُ سَبْيَلِيَّةٍ

Stachys recta, S. procumbens (S). Epiaire droite, Crapaudine (F). Upright hedge nettle (E). Bergzzest (D). Erba giudea (I).

نبات عشبي طليحي يري معمور من السطائس. يطول من ٤٠ الى ٨٠ سم. ساقه قليلة الفروع زينة بالسواد. اوراقه سنانية. نصلها خالي البشرة يبدو كأنه فضي. ازهاره مستطيلة الشكل كثيفة الخضر || كان شائع الاستعمال الطبي وقد اعمل لكراهية رائحته.

## ١٣٦٢٤ - سَطَامُ (E). Origine (F). Origin (E).

هو الاصل ج سلم.

## ١٣٦٢٥ - سَطَامُ \* ، أَمْرٌ مِلْطَقُ \*

Anastomus (S). Anastome (F). Anastomus (E).

جنس طير من طول السال وفصيلة المغالان. ازهاره المبرومة قليلة العدد اسطفا بعض مناطق افرقية الوسطى والشرقية والهند وجزر الزايح. ملجتها الحياني جامي. يتكرر ويوجدوا قرب الشطوط وبحاري المزار. قوتها الاسماك والفساد والتمارين والورث || تتميز بصفاته متناقلة المستطيلة للشطوط الحمود الناضجة كالمشاش. اعناقها وقوائمها مستطيلة. اذنانها قصيرة. اجنتها لاحقة. اقنوبها الى الياض الاغبر بالسقاء الاذنان وطراف الاجنحة السود.

## ١٣٦٢٦ - سَطَلَاةٌ

هي سطح سقف البيت من اي طابق كان.

## ١٣٦٢٧ - سَطَحٌ Surface

## ١٣٦٢٨ - سَطَحٌ ، مُسْتَوٍ Plan

## ١٣٦٢٩ - سطح مُتَنَاقِصٌ (E). Quadric (F). Quadrique (F).

## ١٣٦٣٠ - سطح مُسْتَوٍ (E). Surface plane (F). Level surface (E).

## ١٣٦٣١ - سَطَوَاكٌ هو الجدار القيد ، اطلبه .

## ١٣٦٣٢ - سَطَوْرٌ \* (S). Suthora Nipalensis (S).

طائر ويعد الجلس والنوع من الجوارم غروطيات المناظر وفصيلة الترفنيات. موطنه يتعد من الهند الى الصين ، يتكرر ويوجد في غابات التنبال. ملجته الحياني جامي. افواجه قليلة العدد. قوته الحشرات ومكثها ويرقاتها وثمار وايزور البرية || جسمه شبيه بالقرقف الكبير. طوله نحو ١٥ سم. يتميز ببقعته القصيرة وبذنبه المروحي الشكل حته الانقباض. ثوبه الى الخضار البنفسجي الماجة. يمتد الى البركة الصفراء اللواج.

## ١٣٦٣٣ - سَطَوْرِيُونٌ هو السطوب ، اطلبه .

## ١٣٦٣٤ - سَطَوْرٌ (E). Sun-stroke (F). Insolation (F).

هو الشمس ، اطلبه .

## ١٣٦٣٥ - سَطَاذِيٌّ (F). Carex, Lâche (F). Carex, Sedge (E). Segge (D). Carico, Lica (I).

جنس نباتات جلمورية معمرة من فصيلة السدييات. ازوارها المبرومة زينة ٥٠٠ سمها ثلاثية الاعلى . اوراقها

بامتلاحة سرقها وهي عصائية الشكل ثلاثية الحروف الحادة التقاضية . ازوارها وحيدة اللث منطية التجميع . جذاميرها طلية مبرقة || اشهر انواعها ما يليح .

## ١٣٦٣٦ - سَطَاذِيٌّ الرَّمَلُ \* Carex hirta (S).

Carex hirsuta, Lâche des sables (F). نوع من السادي يطول من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه مستطيلة البصل القيق القالب الحرف. ساقها فضية اللون. يعيش في الرمال القاحلة ويستعمل لثنيها كاتب .

## ١٣٦٣٧ - سَطَاذِيٌّ بَلْدَنَسِيٌّ \* Carex baldensis (S). Lâche du Mont Baldo (F).

نوع من السادي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم. اوراقه مستطيلة شيقة . سلبته الازهرية قصيرة مستعرضة لثنتها ثلاث اوراق صغيرة شائكة || يرفب في المواقع الجبلية والارابة الكلسية.

## ١٣٦٣٨ - سَطَاذِيٌّ عَمْرَاقِيٌّ \* Carex acrospes (S).

Lâche à hampe (F). نوع من السادي . قصبة ساقه عمرافية الشكل تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقه شيقة مستطيلة اقصر من قصبة الساق. حذوكه الازهرية يطول من ٨ الى ٢٠ سم. وهو عديد السنايل المنسية بالانهب والاخضر || يرفب في المواقع الظليلة والارابة الرطبة.

## ١٣٦٣٩ - سَطَاذِيٌّ عُنُقُوذِيٌّ \* Carex beccana (S). Lâche à grappes (F).

نوع من السادي يطول من ١٠ الى ٢٠ سم. اوراقه تطول من ٧٠ الى ١٨٠ سم. نصلها جلدي التجميع ، اريوطي الحطار . ازوارها حذوكه التجميع ، ساقها كبيرة اتقد لنبا الى الحسرة || يعيش في المراكن والنازل .

## ١٣٦٤٠ - سَطَاذِيٌّ عَدَاكٌ

نوع من السادي يعرف بالنب ، اطلبه .

## ١٣٦٤١ - سَعَارٌ هو الكلب مرض عيبت ، اطلبه .

## ١٣٦٤٢ - سَعَاظُ Fragrance

الريح الطيبة من كل شيء واذهر واثير واورا .

## ١٣٦٤٣ - سَعَبٌ (E). To stretch (F). Strer (F).

سحب الشيء مطه ونسحب الشيء نطط .

## ١٣٦٤٤ - سَعَكَةٌ Capacité, Contenance (F).

هي القصور الاستياقي . (E). Capacity, Excant, Area (E).

## ١٣٦٤٥ - سَعَقَرٌ ، سَعَقَرٌ Thymus (S).

Thym (F). Thyme (E).

جنس لبلات عشية خشبية معمرة من فصيلة المغفويات. ازوارها حذيلة جميعها من الاثارية . مهادها البلاد الممتدة . اوراقها صغيرة ، كاملة ، متعاقبة ؛ نصلها غدي الصلبة ، ازغب البشرة ، فده مصصاة الارتكاز ذرية الجسم خفية بطر التبريل || ازوارها صغيرة اتقد ، حطرية الحرف ، وديسة اللق الى اوليك . اشهر انواعها يتبع .



سطائس سبيل



سطام



سطر



سادي الرمل سادي بالنهسي



سادي غمرافي سادي غمادي



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ الْبَرِّ



سَعْتَرُ شَرْقِي

## ١٣٦٦ - سَعْتَرُ الْبَرِّ \* ، سَعْتَرُ بَرْي ، زَعْفَر

Thymus serpyllum (S). Thym serpolet. T. sauvage, Serpolet (F). Creeping thyme (E). Feldquendel, Thimian (D). Timo serpillio, T. salvatico, T. cedraeo, Serpillio (I).

نوع من السعتر يملو نحو ٢٥ سم. ساقه فراء، فروصها السفلى أغنية الانتصاب، ثم ترتفع. أوراقه أحليجية. نصلها مهبط الفصم، يبارز البروق، خلل البشرة. أزمان وريدية اللون. يستخرج من أوراقه وأزهاره التيسول.

## ١٣٦٧ - سَعْتَرُ الْبَرِّ \* ، سَعْتَرُ قَرْنِي ، حَكَاث

Thymus capitatus (S). Thym de Crète (F). Headed thyme (E). Kretischer thymian, Kopfthymian (D). Timo di Creta (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه لينة. أوراقه بيضية الشكل، العلوية منها أعرض نصلًا من السفلى وأقل زغبًا وصلًا. أزهاره وريدية اللون. أوراقه وأزهاره بلسمية العرف والمخ يستخرج منها حطر السعتر.

## ١٣٦٨ - سَعْتَرُ الْبَرِّ \* ، سَيْسْتَر ، نَعَام

Thymus glaber (S). Thym glabre (F). Wild thyme, Mother of thyme (E). Wilde thymian (D). Sermolino, Timo glabre (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقه خفيفة كثيفة الفروع المنتصب. أوراقه خفيفة، مستطيلة، نصلها حافر الفصم، مائل البصرة، خفيف الحصار. أزهاره وريدية اللون يملوها موجع أبيضاني || يرغب في المواق الرطبة.

## ١٣٦٩ - سَعْتَرُ شَاكِب ، سَعْتَرُ شَاكِب

Thymus vulgaris (S). Thym commun, Farigoule (F). Garden thyme, Pot-herb thyme (E). Thymianquendel, Gartenquendel (D). Timo comune, T. coltivato, Erbuocca, Popolina (I).

نوع من السعتر يملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. ساقه كثيفة الفروع الخشوية المنتصب. أوراقه سنائية خفيفة. أزهاره ليلية اللون. يعيش في جميع الأودية. يفضل التربة ويحب الرطوبة || يستخرج من أوراقه وأزهاره حطر السعتر ويدهن.

## ١٣٧٠ - سَعْد

Cyperus (S). Souchet (F). Sedge (E).

جنس نباتات صفولية، عشبية، معمرة من فصيلة السميديات. أنواعه عديدة، جميعها منتقية من نباتات المناطق الحارة. أوراقها سنائية مستطيلة. سيقانها شراخية يملوها أنوار سليل التجميع تكثفه قمة ورقة طويلة من ثلاث أو أربع وثلاث || أشهر أنواعها ما يلي.

## ١٣٧١ - سَعْدُ الْأَحْمَرِيَّة

ويسمى سعاد الحمايا، منزل من منازل القنر البانية يتزلفا القنر في الليلة الخامسة والعشرين. وهو أرملة كواكب متقاربة واحد منها، في وسطها، أنور الجميع. وقيل إنما هي سعاد الاحمريّة لأن عند طلوعه تخرج الحشرات المختبئة من الأرض || يقب سعاد الاحمريّة يدعى الزهرة.

## ١٣٧٢ - سَعْدُ الْبَرِّ

سعد البارع نجمان متقاربان من كوكبة القنر الاظم مركزها في السعد.

## ١٣٦٣ - سَعْدُ الْبَهَام

Baham, Biham سعد البهام نجمان من كوكبة القنر الاظم مركزها على رأس القنر.

## ١٣٦٤ - سَعْدُ الْخَصْرِ ، سَعَارُ حُلُو ، عَكُوب

Cyperus alopecuroides (S). كَرْشِي Souchet à nattes (F). Foxtail sedge, Mat sedge (E). Zypergras (D). Giunco cannellino, Testa di riccio (I). نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخية يملو نحو المتر. أوراقه قروية خفيفة تطول من ٧٥ إلى ٩٠ سم. وتعرض من ٨ إلى ٢٠ م. نوته الزهرية فارشة || يعيش في المناطق والأراضي الرطبة. أوراقه تستعمل في صناعة الحصر.

## ١٣٦٥ - سَعْدُ الْأَذَاكِب

منزل من منازل القنر البانية. وما كوكبان نيران بينهما قد ذراع، في نحر أحدهما نجم صغير كأنه يذبحه لقربه منه || قال بعض علماء الفلك أن السعد الذابح كوكبان متركان على التوالي منها كوكب صغير يكاد يلمس به يسرى الذابح ولذلك سمى العرب السعد الذابح لزمهم أن اللبني شاة وقد ذبحها.

## ١٣٦٦ - سَعْدُ السُّعُود

Sedalsuud منزل من منازل القنر البانية. وهو ثلاثة كواكب أحدها لير والأخران دله. والعرب تسميه به || يقب سعد السعود يدعى الجبهة.

## ١٣٦٧ - سَعْدُ الْمَطَر

سعد المطر نجمان من كوكبة القنر الاظم مركزها على الركنة البينية.

## ١٣٦٨ - سَعْدُ النَّكَال

Cyperus natalensis (S). Souchet du Natal (F). نوع من السعد الجلموري اللباد، شراخية يملو من ٦٥ إلى ١٠٥ سم. أوراقه مستطيلة خفيفة النصل، سنائله متوسطة الكثافة تكثفها قمة ثلاثية الأوراق القصيرة. يرغب في الأودية المتوسطة الاندماج والرطوبة. يعيش في المرائن.

## ١٣٦٩ - سَعْدُ الْهَامِ

Hemam, Homam سعد الهام نجمان من كوكبة القنر الاظم مركزها على النقت.

## ١٣٧٠ - سَعْدُ بَلْع

سعد بلع منزل من منازل القنر البانية. وما نجمان مستويان في الجهرى لمتساويان في القنر والفسو. وبني الأكبر بالما كأنه يلم الأخر واحد ضوؤه. وهو من كوكبة الدلو، طلوعه الليلة ثبتي من كائني الثاني وسقوطه ليلة ثبتي من آب || يقب سعد بلع يدعى الطرف.

## ١٣٧١ - سَعْدُ شَرْقِي \* ، سَعْدُ عُسْتَدِير

سَعْدُ الْحَمِير ، وَزْن ، صَبَاحُ الْخَيْر Cyperus rotundus (S). Souchet rond (F). Nut-grass (E). Runde zyperwurzel (D). Cipero orientale, Stancia rotunda (I). نوع من السعد المدام الجلمو. صفاته عديدة، بيضية الشكل، كالقروية الرائحة. أوراقه مستطيلة. شراخية

Cours de change (F).

سر القلع

تعلو من ١٠ الى ٣٠ سم. سنبله خازنة صويالية || يكثر في الارزة الرطبة. يتبر من النباتات الضارة.

Cours légal (F).

سر قانوني

Cours moyen (F).

سر متوسط

١٣٦٦٢ - سعد عطر \* Cyperus longus (S).

Souchet odorant, S. long (F), Gellingale, English galangale (E), Galgentwurzel, Langes zypergras (D), Ciparo lungo, C. odoroso, Cunzia (I).

نوع من السعد. جلموده مداد عطر لا صائل له. شراخه تعلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. لوراه خفيفة الطول || سنبله مروحية الازنكار تكتنفها قسمة ثلاثية الاوراق || يعمش في المالحات وعلى ضفاف الماء.

١٣٦٦٣ - سعد مأكولي هو سب الزلم ، اطبا .

١٣٦٦٤ - سعد مروحي Cyperus flabelliformis (S), Souchet en éventail (F).

نوع من السعد الجلمودي الزكوي. شراخه اسنخي الجوف ، غليظ القاعدة تعلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. اوراقه جامدة التصل تعلو من ١٥ الى ٤٠ سم. وتبرش من ٥ الى ١٥ م. سنبله ازهرية مروحية لتجميع جملة الشكل. يزرع في المراكب. يرغب في الرطوبة المستمرة.

١٣٦٦٥ - سعد سفلتي Cyperus alternifolius (S).

Souchet à feuilles alternes, Petit papyrus, Ombrelle (F).

نوع من السعد الجلمودي البامد السائل. لوراه القروية صيرة اللد ، قليلة العدد. شراخه يرتفع من ٣٠ الى ١٢٠ سم. تعلو سنبال زهرية مظلمة الشكل تكتنفها قسمة رفيعة يتراوح عدد اوراقها من ٦ الى ٢٥ || يكثر زراعته في المراكب لانه سبروي وجبل الخضار.

١٣٦٦٦ - سعدان

السدان ثبت من افضل مراعي الابل له فوك تشه به حلقة اللهي فيقال لها سعادة (السان).

١٣٦٦٧ - سعدان ، قرد (S), Singe (F), Ape (E).

اسم شامل يطلق على جميع انواع القرد ج سعادين.

١٣٦٦٨ - سعدانكة ، وكلمة Chêne (F).

زائدة قروية للمادة تلو قائمة القرس. Chestnut (E).

١٣٦٦٩ - سعدانكة

سعدانة اللهي : ما اطاف به كالللكة. وهي ايضاً مدخل الجردان من ثوبية القرس.

١٣٦٧٠ - سعدانيات Cyperaceae (S).

Cyperaceae (F), Cyperaceae (E).

فصيلة نباتية من وحيدات الفلقة تشمل السعد والسادي وسب الزلم.

١٣٦٧١ - سعدو هو الكلب مرض شبيث ، اطبا .

١٣٦٧٢ - سعدو ، هيتي (F), Taxe (F), Price, Rate (E).

تبرفة الفوائد السنوية التي ينتجها مبلغ قدره ٢٠.

١٣٦٧٣ - سعدو (F), Market, Price, Rate (E).

هو ما يتقدم عليه من البضاعة يماً وشراء على ان تكون الصفقات متتالية كالمتقدمة في المصنف ، وسر السوق... وهذا السر قد يكون :

Cours forcé (F).

سر الزامي

١٣٦٧٤ - سعد القابليل

Taux de capitalisation (F), Capitalization rate (E).

هو السعر الذي تكتناه شركات التابليل والتأمين لحساب فوائده الاموال والاحتياطيات.

١٣٦٧٥ - سعد الخصم ، سعد القلع

Taux de l'escompte (F), Rate of discount (E).

هو السعر الذي تحسب به كل عمليات الخصم والقصر في يوم معين وسوق معينة.

١٣٦٧٦ - سعد القالكدة Taux d'intérêt (F).

Rate of interest (E).

سر القالكدة يكون اما قانانياً وهو ما يقره القانون او اتفاقياً وهو ما يحدده الاتفاق.

١٣٦٧٧ - سعدون

هو الانباز جنة برية لتعمل في تنظيف الثياب.

١٣٦٧٨ - سعدونيات Anabaeae (F), Anabaes (E).

سبط من فصيلة السمقيات.

١٣٦٧٩ - سعدو ، حوريرة Calorie

هي الوحدة الحرارية او الوحدة في قياس الحرارة.

١٣٦٨٠ - سعدكة

Palm (F), Palm (E).

هي قصب النخل وهي مركبة من جريدة تحمل الحوص اي الوريقات.

١٣٦٨١ - سعدكة هي القروية ، اطبا .

١٣٦٨٢ - سعدكة الثياب

فراشة حلزونية تسمى قروية الثياب ، اطبا .

١٣٦٨٣ - سعدكة السجاد

فراشة حلزونية تسمى قروية الفراء ، اطبا .

١٣٦٨٤ - سعدكة تمررة

فراشة حلزونية تسمى قروية الشوارد ، اطبا .

١٣٦٨٥ - سعدكات

هي القرويات فصيلة حشرات من حشرليات الاجنحة.

١٣٦٨٦ - سعدا ، شهم

Simia scyrus, Pithecius scyrus (S), Orang-Outan, Orang, Homme des bois (F), Orang-utan, Pongo pygmaeus (E).

السعدا والسعدا ج سالي. وينهم من سماعا الانسان الوشي. حيوان قلمي من فصيلة اشباه الانسان ويرثه القرديات. ثلثه تجاوز ١٤٠ سم. يده تعلو نحو ١٠٥ سم. جسمه كثيف الشعر الغليظ المسطيل || يعيش ذكراً وانثى يتبعها من الصغرى الى الثلاثة. الانثى تضع ولداً واحداً رضعه من ٣ الى ٤ اشهر || موطنه جزر اراويج. قوته الكار على اختلاف انواعها يقصب السكر واكثره وبعض البقول. وهو يألف الثنايات للكيفة والنياض البعيدة عن كل عمران.



سعد عطر



سعدا

## ١٣٦٩٨ - سُمَّة \* Mycetophagus (S).

Mycetophage (F). Mycetophagus (E).

جنس حشرات من فصيلة السفاقيات ورتبة غمديات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في بعض غابات وسراخ البلاد المتحدة الحرارة والباردة || اجسامها صغيرة ، متدلة الاحدياب ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٥ الى ٧ م. رؤوسها مستديرة الجرم ، غروبية الشكل. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. كواسلها متدلة الجرم. احمادها لاحقة ويلوحا تحدي قاطب. قوائمها نشيطة. اوتوبها ثنائية البين || تألف الغابات والخارج تعيش على بعض انواع القفطور من الفاريقيات والسيمات .

## ١٣٦٩٩ - سُمَّة \* Mycetophagidae (S).

Mycetophagidae (F). Mycetophagidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة ، اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر غابات وسراخ البلاد المتحدة الحرارة | اجسامها صغيرة ، شبه بيضية الشكل ، تطول من ٣ الى ٧ م. رؤوسها متدلة الجرم. حيونها بارزة. تأشيرها وبلاسلها نظامية. قرونها الاستشعارية ثلاثية. مركبة من ١١ فصلة. كواسلها كبيرة. احمادها لاحقة. قوائمها نشيطة. ارساها رباعية البقل. اوتوبها ملونة || تألف الغابات والخارج. تعيش على بعض انواع القفطور اعصسا المتنية الى الفاريقيات والسيمات || اشهر اجناسها السفاجة .

## ١٣٧٠٠ - سُمَّة ، كَوَم Coputia, Sallia (F).

Coputia, Covering (E).  
نوع ذكر الحويان على الاشي. اذا غرِب الجود الحبر قيل قما وزا .

## ١٣٧٠١ - سُمَّة ، سَكَط Opercula (F).

Gill-cover (E).  
السطاط والسطاط ج اسقاط. هو القشاة القفروني المادة الذي يلبس التجويف الخيشوي عند الاسماك. وما سقاطان او سقاطان ايمن وابسر .

## ١٣٧٠٢ - سُمَّة طَائِفَة \* Callimorpha (S).

Callimorpha dominula (S). Callimorpha

tyran (F). Callimorpha dominula (E).

حشرة من فصيلة السفاقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اوروبا الجنوبية والقرية . فرائسها صلبة تعيش على ذخيرتها المعوية . سربتها خاضعة قوتها اوراق النبات واحصاها الحس والهنداب والقراس والوجع ولسان الحمل ... || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٦ م. بسطتها تراوح من ٤٥ الى ٥٠ م. وأنها متدلة الجرم. حيتاها كيرتان. زباناها ضيقان. مرشها جعفة. حيوئها كيثف الحمل. كسني البين. بطنها احمر يطو مراح وودي وسط لبني قاطب شديد الاسرة || روشناها الاناسيان الى الخضار الانلاس تملو بقمع مستديرة صفراء وبقتان برتقائيتان. روشناها الخلفيان الى الحمرة يطو مراح صناعي ويطوق حمار كسني اسود وبقتان وبقة طرية يحمل كامل الزام الاخير. تنضيب روشان الاشي لا يختلف الا بالبرتقالي الذي يتحول الى حطبي || لها جيل واحد في الحول. تظهر الفراشة في حزيران. تسرح في الليل. تماثل على ظهرها باسوب

## ١٣٦٩٧ - سُمَّة

ما تملك من اللغز الاصل من البير ونحوه .

## ١٣٦٩٨ - سُمَّة الشَّجُوم

سود النجوم عشرة وهي سد بلع وسد الاعية وسد اللانيم وسد السمود وسد الاربية من منازل القمر . ثم سد نائرة وسد الملك وسد الهام وسد البارح وسد سطر وهله الستة ليست من المنازل. كل منها كوكبان.

## ١٣٦٩٩ - سُمَّة هو الاغصيا ، اطلبا .

١٣٦٩٠ - سُمَّة ، عَطُوس Tabac à priser (F). Snuff (E).

مسحوق التبغ يستعمل شأ الكثيف ، يستحصل عليه من اوراق التبغ المسحوق بعد تنقيتها ومنزها ببعض المواد العطرية او الحريفة || وقد تحلفت قيمة السوط باختلاف صفته وبنواده الاولى اذا كان مسفوها اتصال الاوراق او خلوجها .

## ١٣٦٩١ - سُمَّة هو الماكاك المهيون ، اطلبا .

١٣٦٩٢ - سُمَّة Basoin d'eau (F). Want water (E).

صنن الزرع والنبات .

## ١٣٦٩٣ - سُمَّة \* Coluber lineatus, تشاباب

C. jaculus, C. asotus (S). Dard, "Serpent volant" (F). Coluber lineatus, C. jaculus (E).

حية يبروس من البرواحيات وفصيلة الحفشيات غلليات الاعاميد . جسمها قليل التضامة يطول نحو ١٠٠ م. ثوبها الى الكمية الريدا يطو خط اسود يمتد من الخلف الى طرف الذنب وضمان احمران عايقان ايمن وابسر يمتدان من الشفتين الى الذنب . رأسها لوزي الشكل . زاوية شفتها فسيحة الملاتي . حيتاها صغيرتان ، حادتان . عدد استناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاصل من اسفلها اربعة صفات ثابتة خلفية الارتكاز تهرين السم في كل عضو تصببه عندما يرق حتى مستواها الداعلي || تألف الاخراج والمضاب ، تملق الاشجار وتلقب كالسم من حيرة الى اخرى ومن كل مكان مرتفع الى آخر متفطش || بيتها الشتوي يمتد نحو خمسة اشهر . تسرح في النهار . قوتها الحشرات والوزغ والعظاء والفئران والجرب . تنقص في غريبتها الكبيرة الحجم بالتفليس ثم تبطلها بعد ذلك || اخلاطها شربة . فسيها صغير حاد . تبلي كامل نموا بمر ١٥ سنة وتعيش نحو ١٢٠ سنة || الاشي تسلكه بمر خمس سنوات ويقع من ١٢ الى ٢٤ بيضة مجعومة في سجين تطهرها في وقع دافئ جنوبي المشرق || تنحدر من التصابين الخفية .

## ١٣٦٩٤ - سُمَّة الإجماس هو حلة الاجاس ، اطلبا .

## ١٣٦٩٥ - سُمَّة الزَّوْع هو حلة الزرع ، اطلبا .

## ١٣٦٩٦ - سُمَّة Plante épineuse (F).

Thorny plant (E).

كل شجر له شوك .

## ١٣٦٩٧ - سُمَّة ، شَعَاك ، حُورُق Barbe de bée (F).

Beard of corn (E).

هي حسك شتية الحقة والشير .



سُمَّة



سُمَّة



سُمَّة طَائِفَة

وتفتح المكن لطخاً على فصائل الأزراق || السرة تطول نحو ٤٢ م. جسمها أسطواني الشكل ، مثلث السك ، أسود اللون تطول ثلاثة خطوط من النقط الصفراء وضمان الى الزرقاء الرصاصية . ثعلبها متوجة بالهلب الاسود || طور الاكمال الذي يستمر من ٢٤ الى ٣٧ يوماً يتفقي ضمن صلبة متينة الطبع تسحبها السرة تحت ثقلور الانجبار وفي صدوره الهواء .

### ١٣٧٠٣ - سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ \*

*Callimorpha dulcitra* (S). *Callimorpha agreeable* (F). *Callimorpha dulcitra* (E).

حشرة من فصيلة السفاطيات ورتبة حرشفيات الاجنحة . موطنها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . قراشها جارية قوتها رقيق الازهار ولذتها . سرتها خاضعة قوتها اوراق النباتات العشبية || جسمها مسطود اللد تطول نحو ١٧ م. ، بسطها تراوح من ٥٠ الى ٥٥ م. ، رأسها معتدل الجرم . ميائها كيرتان . زبالها خضيلان . برشفها مستطيل . جوشها بني اللون كثيف الخمل . بطنها احر اللون يملو غط ثجبي قلب اسمر || روشتها الانساب الى الكشحي الاسود الموج يملو تقيج ابيض . واصفر وزربان من النقط البهش والصفير : رواشن الاثني عادمة التفتيق . روشتها الخلفيان الى العشرة البرتقالية يملوها تجميع وتبيض كمن || غا جمل واحد في الحول . تظهر الفزقة في حزيان . تسرح في الليل . تعاطل بمد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتفتح المكن على الصفحات السفلى من فصائل الاوراق || السرة تطول نحو

### ١٣٧٠٧ - سَفَاثٌ \*

*Cephenium* (S).

*Cephenium* (F).

جنس حشرات من فصيلة المديريات ورتبة عذبات الاجنحة . انبساطها المعروفة نحو ٥٥ مثقثة في جميع اطوار العالم || اجسامها صغيرة ، تطول من ٢ الى ٣ م. رؤوسها صغيرة شبه مكورة . ميائها قليلة البروز . قرونها تأسيرها وتكوكها صغيرة . ملابسها كبيرة . قرونها الاستقامية صولطانية . كواسلها مخدبة : شبه اريسة الشكل ، الحامدا لاسعة ، عادمة التفتيق . قواشها نشيطة . انبساطها وسيدة اللون ، يكثر فيها المجزوي الاسلع فالاسود فالاصفر فالاصهب فالاسمر || تأت المخرج والفتحات حيث تكثر الحطاب التي تعيش عليها .

### ١٣٧٠٨ - سَفَاثَاتٌ \*

*Sphaginidae* (F).

*Sphaginidae* (E).

رتبة من الحطاب تشل نصليتي السفاثيات والقرنليات .

### ١٣٧٠٩ - سَفَاثَةٌ \*

*Hypophosphus seven* (S).

*Séphen* (F).

حيوان بحري من السفقيات الاطلاق وفصيلة الطرقينيات . اصطفاه محمد بن الخليل العربي الى العيين || جسمه بما فيه القالب يطول نحو ١٨٠ سم. ثوبه الطوي الى السرة الحطية الموج . ثوبه السفلى الى البيرة اثنية . منجسه اللابل نحو ١٥ سم. || لحمه متوسط الصنف ، مأكول . اما جلده فخاخر الصنف مغروب فيه .

### ١٣٧١٠ - سَفَاثِيَّاتٌ \*

*Sphagnum* (F).

*Sphagnum* (E).

فصيلة من الحطاب تنصلي الى رتبة السفاثيات اجناسها وانواعها عديدة اشهرها للطحب .

### ١٣٧١١ - سَفَقَجَةٌ هي الاصطراف ، اطليه .

*Direction du vent* (F).

*Direction of wind* (E).

وجبة هبوب الريح .

### ١٣٧١٢ - سَفَجُورُ الزَّرَقِ \*

*Dryops caerulea* (S). *Dryops bleue* (F).

*Dryops caerulea* (E).

حشرة قانصة وانجبة من فصيلة السفجوريات ورتبة عذبات الاجنحة . تأت المروج والمراعي وشفاط مجاري الماء . قوتها المواد الضوية وبأ قسطها اقتناصها من الحشرات القذرا || جسمها صغير لحد يطول من ٩ الى ١٠ م. نورجا الى الزرقاء خلد سفي وبيج اسف . رأسها مخروطي صغير . فكها ذربان . ميائها كيرتان جاسطتان . زبالها عجيلان دقيقان . ظهورها لا يلف السكة



سَفَاطَةُ مُسْتَحَبَّةٌ



سَفَاثٌ



سَفَاثٌ



سَفَاثَةٌ



سَفَجُورُ الزَّرَقِ

٣ م. جسمها أسطواني الشكل ، أسود اللون ، اصفر التفتيق ، لعل السك تملو في كل ثلثة فسة من الهلب الاثني . رأسها اسود . مياها الى الحطلة القائمة || طور الاكمال يستمر نحو ٢٤ يوماً ويتفقي ضمن صلبة تسحبها السرة بين فروع النبات ولقبها .

### ١٣٧٠٤ - سَفَاطِيَّاتٌ \*

*Hymenophyllidae* (F).

السفاطيات فئة من الرصاص مستورات الزهر الوالية .

### ١٣٧٠٥ - سَفَاطِيَّاتٌ \*

*Callimorphidae* (S). *Callimorphidae* (E).

فصيلة حشرات من حرشفيات الاجنحة عذبات القرن . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٢٠ معظمها من حشرات البلاد الحارة المنتشرة نحو الاستوائية || جسمها معتدل اللد . اجسامها فيه اسطواني الشكل . رؤوسها صغيرة . ميائها زائفة . قرونها الاستقامية خيطية ، بسيطة . ملابسها صغيرة ، جالسة . مراشها كبيرة ، مصطلة . رواشها الامامية اكبر من الخلفية واقل استدارة منها واكثر ثجبياً وزركشة . سفادها جانبية الاركاناز ، مصطلة الجرم . ارتجلها ثامة اللنو ورياعة المنطس || مكها مكرور الشكل . اسارها مثقلة النشار ، ضمية الهلب . عاداتها تلتصق بصلبة متينة محدة الجك || اشر اجناسها السفاطة .

### ١٣٧٠٦ - سَفَاثِيٌّ \*

*Cochlearius cochlearius* (S). *Savaco huppé, Bec-en-cuiller* (F).

طائر من طول الساق وفصيلة البشريات . اصائله المناطق الاستوائية الامريكية || تأت صفات البشري ولذاته مسرعة دجري يستمر طوال الليل . قوته الاساك والحقايق والزرغ والصفادح والرعويات ... || جسمه مكنل معور .



المهزلة الرياح المحوج . يرغب في الاربة العميقة الغور المتوسطة الانتاج والرطوبة الموزونة التركيب الحكسي . ثماره تحسن صفات في الاربة الجنية || يتكاثر بالبذر والتغصن والتفريد والتغصن || ينمو على ابعاد تراوح من ٤ الى ٦ امتار || وهو من الانجبار التي يفسدها التقليل لانه يجد من نشاطها بين مقدورها الانجابي . اشهر شروبه الزراعية ما يلي .

١٣٧١٨ - سكرجكل البرتغالي C. du Portugal  
ضرب سيروني ينمو نحو ٦ م . ثماره كبيرة اللد متوسطة الوسط . مزينة الرأس والغلب . لهايا خضر الصارة متوسط النضوة || ينمو في جميع الاربة المعتدلة التركيب العميقة الغور || ينشئ الجفاف وكثرة الكلس والربل .

١٣٧١٩ - سكرجكل الصين  
هو الشنط الصيني ، اطلبه .

١٣٧٢٠ - سكرجكل اليابان  
هو الشنط الياباني ، اطلبه .

١٣٧٢١ - سكرجكل النجدي C. d'Angers  
ضرب جاحد يتطلب مواقع خاصة لانه ينشئ الصقيع . ينمو نحو ٤ م . ثماره كبيرة اللد . فزيرة الصارة ، صطرية العرف ، ذكية العلم ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة العميقة الغور ما عدا الكلسية والرطوبة .

١٣٧٢٢ - سكرجكل شمبينيون C. champion  
ضرب امريكي واسع الشجرة . فطره شديدة النشط فاختة تنمو نحو ٧ م . ثمارها كبيرة اللد ، ذكية العلم والعرف ، فزيرة الصارة ، قليلة النضوة || ينمو في جميع الاربة المتوسطة الانتاج والرطوبة .

١٣٧٢٣ - سكرجكل عادي C. commun  
ضرب سيروني صنع الانتشار يعيش في معظم الاربة والمواقع . ينمو من ٢ الى ٤ م . ثماره كروية متوسطة اللد . لهايا متوسط الصارة ذكي العلم والعرف .

١٣٧٢٤ - سكرجكل هندي  
هو الدوسينية عجيبة شمرة ، اطلبه .

١٣٧٢٥ - سكرجكل \* Coing (F). Quince (E).  
ثمرة السفرجل . لهايا جامد للمكسر حامض العلم ، متوسط النضوة ، يستعمل في المربيات . يزودها لزجة شامة الاستعمال الطبي .

١٣٧٢٦ - سكرجكل Saxifraga (S). Saxifrage (F).  
Saxifraga, Rockfool (E). Steinbrech (D). Saxifrage (I).  
جس نباتات عشبية من فصيلة السفسريات . انواعه زهاء ٣٠٠ جميعها عشبية خشبية . اكثرها معمرة ومنها حولية وشجيرة . معظمها بري وبعضها زراعي كزينة . اورثاها متعلقة ، صغيرة اللد ، لحية النسيج ، لهايا البسطة والمفرشة والمستنة . تصالها خلي البشرة منتج الصفة . ازدهاها خلمية التركيب . يزودها صغيرة الحجم تكثر فيها الانتشار || اشهر انواعه التزيينية ما يلي .

الفريشة . هذاها تصاحبها التحيز المتساوي الخطوط . ارباها خلمية العقل || لها جبل واحد في الحق . تظهر الحشرة الجملانة في اواسط آب وتمشي حتى اواسط ايار . تسرح في التبار . تساق في اوائل الربيع وتضع المكن تحت الحشاة والقصور الصلبة وتعلم والحجارة وفي شقوق الاعشاب الناعمة || والبرقة منذ تمام اذكاها تطول نحو ١٥ م . جسمها فيه اسطواني الشكل اسمر القرب ، كثيف الغلب . اسد الرأس والرؤاسب والشرج المهزب بركين دقيقين || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اشابيع ينشئ في التربة .

١٣٧١٤ - سكرجوريات \* Drypidae (S). Drypidae (F). Drypidae (E).

فصيلة حشرات لاحة من رتبة خمليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المهزلة قليلة العدد ، معظمها من حشرات البلاد الحارة . تألف المرامي والنياس والمواقع الرملية || جميعها صغيرة اللد ، جملة الانواع الزراعية الباعة . رؤوسها مستديرة ، مستطيلة الاضلاع والاربالي . عيونها جاحطة . كواسلها متضخمة مستطيلة . اجناسها مقلوبة الاطراف ، تصاحب الخفوة المتوازية || تسرح في التبار وتعيش في الليل . تسمى بمرقة وتطير بشفة || قوتها المواد المضوية المختلفة المصادر . اشهر اجناسها السفسجور .

١٣٧١٥ - سيفدليل \* Cevadilla (S). Cevadilla, Cevadilla (F). Cevadilla, Cevadilla (E).

نبات عشبي دولسي طلي معمر من فصيلة السورجانيات . اورثاها قرصية الانتشار ، عصلية الشكل ، مستطيلة اللد ، ازدهاها سبلي التجميع يركتز بل شراج دقيق مسط . انجاس صغيرة اللد ، ارجوانية اللون سود المراج . ثمارها جرابية الشكل ، يزودها دقيقة ، مضغمة ، فسمية اللون || يستخرج من يزوده عدة مواد قلوية اقهرها السنفيلين والخربيثين والخلص الخريفي || مسحوق يزوده شديد الفاعلية كان ولا يزال يستعمل في القضاء على القمل .

١٣٧١٦ - سيفدليكين \* Cevadilline (F). Cevadilline (E).  
مادة فيه قلوية لا تتكبر تستخرج من يزود السنفيلين ويظهر .

١٣٧١٧ - سكرجبل \* Pyrus cydonia, Cydonia oblonga, C. vulgaris (S). Cognassier, Colgnassier (F). Quince tree (E). Echte quince, Bruquitta (D). Cotogno, Pomo cotogno (I).

السفرجل ج . مغارج صفاريل . ثمرة شمرة من فصيلة الورديات وصيدة الجنس والتروخ عديدة القسرب . ثمارها مأكولة وترهب . يزودها طيبة . ينشئ ثمار من مرتين الى ثمانية امتار . ساقها قصيرة سرسة حمراء اللون . اجناسها فارقة متضخمة . اورثاها عابدة ، بسطة ، كاملة ، متعاقبة ، ينشئ الشكل ، قليلة النضوة . تصالها بارز المروق ، خلي الصفحة السفلي . ازدهاها خلمية التركيب لنشأ الى البياض الوردية . ثمارها كروية الشكل او شبه كروية مستطيلة ، كبيرة اللد ، لحية البشرة ، مسحة العرف ، جامدة الياب . عيونها تألف من ٥ غريبات تحضن الكثير من البذور || يعيش السفرجل في الاقاليم الحارة والمعتدلة . ينشئ الموضع الطليقة



سندليل



سفرجل



سفرجلة

## ١٣٧٢٧ - سُقَرَسُ الحَصَى \*

*Saxifraga granulata* (S). *Saxifrage granulée*, Herbe à la gravelle (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها حرة ككلوية. نصلها مفصص الحثار. ازهارها كبيرة اللدة، بيضاء اللون، صطرية العرف || ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران || يقال انها طيبة، اورتها نافعة تريل البول والحصى.

## ١٣٧٢٨ - سُقَرَسُ الظِّل \*

*Saxifraga des ombrages*, Mignonnette, Désespoir du peintre (F).

بجلة جادة معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراتها احليجية رفيعة، عتقها كثيف الزئب. نصلها مقر الصفص. مشفاري. الحلة || ازهارها مستترفة بيضاء اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. ترطب في اللواتع الليلية التمشية العرولة.

## ١٣٧٢٩ - سُقَرَسُ حَشِين \*

*Saxifraga aspera* (S).

*Saxifraga rugueuse* (F).

بجلة سبروتية معمرة ترطب في الارربة الرملية. تملو نحو ٢٠ سم. اورتها غاذقة الرواكيب. نصلها مقر صفص، نحو ٣ || ازهارها بيضاء اللون وكسوبا مروج اصفر. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ١٣٧٣٠ - سُقَرَسُ سَرْمِي \*

*Saxifraga sarmentosa* (S). *Saxifrage sarmentueuse* (F).

بجلة جادة معمرة تملو من ٢٥ إلى ٤٠ سم. أوراتها مستحية بالايض والاخر. حثار نصلها ارواجي. ازهارها حري الشكل، ازهارها يمش تملوها مشية صفراء || زهر من ايار الى تموز.

## ١٣٧٣١ - سُقَرَسُ سَرْمِي \*

*Saxifraga crustata* (S). *Saxifrage incrustée* (F).

بجلة معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراتها كلوية الشكل نصلها محذب الصفص، سرجي التجميع، اصفر الحثار || ازهارها حشوكية التجميع غامية الارتكاز لونها الى البياض المشع بالابيض || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. ترطب في الارربة الكلسية.

## ١٣٧٣٢ - سُقَرَسُ سَرْمِي \*

*Saxifraga cymbalaria* (S). *Saxifrage cymbalaire* (F).

عشبة حولية جادة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها صفراء اللدة، مستترفة الشكل، خلية لو سباعية التجميع الكروي، نصلها مشج بالايض || ازهارها صفراء. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

## ١٣٧٣٣ - سُقَرَسُ طَحْلِي \*

*Saxifraga hypnoides* (S). *Saxifrage mousse*, Gazon d'Angleterre, G. turc, G. mousse (F).

عشبة سبروتية معمرة. اورتها مستطيلة الرواكيب اليفضورية. ساقها موقرة تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أوراتها قوية التجميع. مستطيلة الاثاق الزغصة الاسطوانية || ازهارها يمش. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران || ترطب في الارربة الرملية واللواتع الجلية.

## ١٣٧٣٤ - سُقَرَسُ كُسْطِي \*

*Saxifraga cuscuthaeformis* (S). *Saxifrage-cuscuta* (F).

بجلة زاهة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مستحية

مكوبة، نصلها خيل البشرة، سنن الحلة. ازهارها حري، قليل الكلفة. ازهارها يمش بطولها مروج اصفر. تيش في الراكن. زهر من حزيران الى تموز.

## ١٣٧٣٥ - سُقَرَسُ مَقْرُونِي \*

*Saxifraga cuneifolia* (S). *Saxifrage cunéiforme* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو نحو ١٥ سم. أوراتها قرصية التجميع. نصلها مخروطي الشكل، اخضر الصفص العليا، جزوي السفل. ساقها عادمة الورق. ازهارها صفراء اللدة بيضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى آب. تخشى الملوحة الحارة.

## ١٣٧٣٦ - سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق \*

*Saxifraga rotundifolia* (S). *Saxifrage à feuilles rondes* (F).

بجلة سبروتية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها موقرة. أوراتها كلوية الشكل. نصلها خدي التجميع خيل البشرة، سنن الحلة. ازهارها مشية بالاصفر والاخر || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٧٣٧ - سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق \*

*Saxifraga longifolia* (S). *Saxifrage à longues feuilles* (F).

بجلة معمرة تملو من ٢٠ إلى ٨٠ سم. أوراتها مستطيلة. نصلها مقر الصفص. ازهارها كثيرة العدد، بيضاء اللون، بطولها تجميع اصفر ومققة حراء || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ١٣٧٣٨ - سُقَرَسُ مَيْفِيكَار \*

*Saxifraga myota* (S). *Saxifrage myotique* (F).

عشبة جادة عولة تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراتها متعاقبة احليجية، نصلها جامد الصفص، مهدب الحثار سنن الزام الاخير || ازهارها حري الشكل. ازهارها مديدة البتلات لونها الى الصفرة بطولها مروج رقتالي. زهر من حزيران الى آب. ترطب في الارربة الكلسية.

## ١٣٧٣٩ - سُقَرَسُ مُشْتَبِه \*

*Saxifraga secundaria* (S). *Saxifrage dressée* (F).

عشبة سبروتية عولة تملو نحو ٢٠ سم. أوراتها مخروطية الشكل، ثلاثية التجميع. نصلها خدي تراج. ازهارها تير ودية وتلتي بالايض || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٧٤٠ - سُقَرَسِيَّات ، مَقْرُونِيَّات

*Saxifragaceae* (S). *Saxifragacées* (F). *Saxifragaceae* (E).

المقرونات او القليلات كما سماها بعضهم فصيلة نباتية من ذوات القلتين عطلة القنات. اسماها واجمعها وانواعها كثيرة العدد. معظمها نباتات مشية. جميعها خشوية الازهار، قليلة البزور.

## ١٣٧٤١ - سُقَرَكِيَّة ، سُقَرَكِيَّة

*Sphyraea apoc* (S). *Sphyraea*, Brochet de mer, Espec (F).

سمكة بحرية من شاكلات الزنائف وحيدة الجنس والوع مولها مياه البحر الخوط. تتميز بسلطانها. راسها ذلق الخمل. لونها الى الالفة يمتد من اقترابه من فمها الظهر الى وحي من اسماك الشولبي النباتية، جينة الصنف، مستحية العلم.



سُقَرَسُ الحَصَى



سُقَرَسُ سَرْمِي



سُقَرَسُ حَشِين



سُقَرَسُ سَرْمِي



سُقَرَسُ سَرْمِي



سُقَرَسُ طَحْلِي



سُقَرَسُ مُسْتَكْبِلِ الْوَرَق



سُقَرَكِيَّة

## Spongipellis

١٣٧٤٣ - سَفَنَاتِيَّة

فطر من السيات يركب اششاب يفس الراتنجيات اعصابا التنوب والاسفوفه فيصيب الشفن المكسبي الذي يشقق الخشب ويفصله ، بالطول والعرض ، الى مكعبات متراكبة متتابة مدعمة الصلابة تحيطها من جميع جوانبها اغشية للمشحج الحليمية الحطعية اللون || اما الفطر فقيقته كلوية الشكل قطرها نحو ٤ سم. اطرافها غائرة متخلية مركبة من طبقتين العليا اسفنجية الميكال سماكتها نحو ٣ م. والسفل ليفية حشوية سماكتها من ١ الى ٥ م . خضابه قليل الالوان يظلم فيها الحطبي والبي . لبابه ابيض . بويضاته اهليلية الشكل طولها من ٣ الى ٥ ميكرون .

Ruscus (S). Fragon (F).

١٣٧٤٤ - سَفَنَاتِيَّة

جس نباتات سرخسية عشية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انواعها عديدة . سوقها مضامة . رذاتها جلدية ، سنانية الشكل . ازهارها نصليبة الانثخاب . ثمارها عتية حمره اللون . يزورها سيد || اشهر انواعها ما يلي .

١٣٧٤٥ - سَفَنَاتِيَّة ذُلُي ، حَبَّ الثار

Ruscus hypophyllum (S). Fragon hypophylle, Laurier alexandrin (F). Alexandrian laurel (E). Alexandrinischer Lorbeer (D). Rusco a foglie nude, Lauro alexandrino (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤ الى ٨٠ سم. رذاتها تحمل من ٥ الى ٦ ازهار . ازهارها ثنية اللون . ثمارها الى الحرة المابقة .

١٣٧٤٦ - سَفَنَاتِيَّة كَبِيرٍ هو الرعد ، اطله .

١٣٧٤٧ - سَفَنَاتِيَّة لاسع

Ruscus aculeatus (S). Fragon piquant, Petit-houx, Houx-fraien, Buis piquant, Myrte épineux (F). Butcher's broom, Kneeholly, Box-holly (E). Echter müsedorn (D). Ruscopungente, Brusco (I).

جنية ذفلية برية وزينية ترهب في الاربة الكنسية . تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. رذاتها صلبة ذلقة مدنية لاسعة . ازهارها فردية او ثنائية التجميع ، خضراء اللون . جذابها طيبة لتدخل في بعض المستحضرات النباتية وفي مدقة القيق تلبه الحقم وتقتطع الدم .

١٣٧٤٨ - سَفَنَاتِيَّة لسن \* ، لسان الثرس

Ruscus hypoglossum (S). Fragon hypoglosse, Langue de cheval (F). Horse tongue, Double tongue (E). Zungenmäusedorn (D). Rusco lingua-pagans, Bislingus (I).

جنية برية وزينية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. رذاتها لسة سنانية طولها من ٦ الى ١٢ سم. ازهارها عتقية ثلاثية او خماسية التجميع .

١٣٧٤٩ - سَفَنَاتِيَّة لثيون هو الحرقلة لثانعة ، اطلها .

١٣٧٥٠ - سَفَنَاتِيَّة

Sphénodon (F). حيوان بيوض من غطيات الروس يفس ايضا ختيره ، اطلها .

١٣٧٥١ - سَفَنَاتِيَّة

Sphindidae (S). Sphindidae (E). فصيلة مشحات من غطيات الاجنحة . اجناسها وانواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة

Grain de poussière (F).

١٣٧٤٢ - سَفَنَاتِيَّة

Grain of dust (E).

اصغر ما يكون من ذرات البقيق والغراب وهي التي ترتفع كالتيار .

Sophisme (F). Sophism (E).

١٣٧٤٣ - سَفَنَاتِيَّة

الفسطة برنة استدلالية مغالطة .

Ecal'e d'oignon (F).

١٣٧٤٤ - سَفَنَاتِيَّة

Scale of onion (E).

سفن ج اسفاط . كل طبقة من طبقات البصلة لحمي سفناً .

Grain de colocynth (F).

١٣٧٤٥ - سَفَنَاتِيَّة

Seed of colocynth (E). سلع .

١٣٧٤٦ - سَفَنَاتِيَّة الْمُتَحَرِّين

Catarrhiniens (F).

Catarrhiniens (E).

في مجموعة قريود العالم القديم من آف خنزراء متقاربان ويقربها تحت الالف || انواعها واجناسها كثيرة العدد تنحصر ثلاث فصائل : اشباه الانسان والمجربيات والمجربيات .

Macrocyste (S).

١٣٧٤٧ - سَفَنَاتِيَّة

Macrocyste (F). Macrocyste (E).

نبات بحري من اشنيات البحر . اطالته مطع بحار الناطق المعتدلة الحرارة || كلالته نشطة قوية . صالة وصيلة السرعة المبط ، تقول من ١٠٠ الى ٥٠٠ م .

١٣٧٤٨ - سَفَنَاتِيَّة

Peau écailleuse (F). Scaly skin (E). سَفَنَاتِيَّة

هو كل جله اعشج كجلد التسلس .

Raja sephen (S).

١٣٧٤٩ - سَفَنَاتِيَّة

سمكة من السفين كبيرة القد تقول نحو ٨٠ سم. مرتها قاع البحر .

١٣٧٥٠ - سَفَنَاتِيَّة

Cacospoglia (S).

Cacospoglia (F). Cacospoglia (E).

ويسمى الاسفنج الجامة . جس حيوانات بحرية ركنية من الاشنيات وفضيلة الاسفنجيات . انواعها المرفقة قليلة العدد اطالته مطع مجاح البحر الابيض المتوسط || تتميز بألوانها القزمية التركيب الجامة التي لا تصلح للاتصال .

١٣٧٥١ - سَفَنَاتِيَّة

Siphneus (S). Siphné (F).

جس حيوانات لبونة قاضية جامة من المكبريات وفضيلة القاربات . انواعها خمسة جميعها صغيرة القد موطنها البلاد الاسيوية من الصين حتى بحر قزوين || اجسامها رمية تقول نحو ٢٥ سم. اذناها ٣ سم. روتوها شبه كروية . عينها صغيرة . اذناها لافقية . جرابها قصيرة خماسية الاصابع . اطرافها مستطيلة مقوسة جامة تمكها من سرعة الحفر في التربة || انبائها الى الكهبة كثيرا . تبقي عند الظهر . ويبيض عند البطن || قوتها الاحشاب والجذور ويسائر المواد النباتية .

١٣٧٥٢ - سَفَنَاتِيَّة ، سَفَنَاتِيَّة

طائر كثير الاستئان (الميري ) .



سفن ج



سفن ج



سفن ج لاسع



سفن ج لسن

**١٣٧٧٣ - سِقَائِيَات** *Buses, Buteontens (F).*  
عزارة طير من فصيلة السقريات تشمل خمسة اجناس :  
البقاعة ، الصرارة ، الخولم ، النعيل والفرناق . جميعها  
رودة الجفنة . وروصها خضرة . مناسرها قصيرة عذينة  
البهرة الدرية . سولطها وانثائها مستطيلة . ارسافها  
قصيرة . غالبها قوية . اظفارها شديدة الانحناء || مهددا  
العلماء . قوتها القواضم والعضات والحشرات لذلك فهي  
من الطيور النافعة || تكثر ابركانها في الاشجار الباسقة  
الرطبة . انثائها تقصع من رفته إلى اربع زفانت تحضنها  
بمنزلة الذكر نحو اربعة اسابيع .



سقارة البيضاء

**١٣٧٧٤ - سِقَائِيَات** *Buteo (S), Buss (F).*  
جنس طير من عزارة السقارات . انواعه زهاء ١٧٥ جميعها  
رودة الجفنة . وروصها خضرة . مناسرها حادة . ارسافها  
غلظية وقصيرة . غالبها عذبة . اظفارها حادة . سولطها  
متوسطة الطول || تلحف الذئاب || قوتها القواضم  
على اختلاف انواعها والحشرات والطياف والفتافد واشجرات .  
لذلك تعتبر من الطيور النافعة الواجب حمايتها || اشهر  
انواعها ما يتبع .

**١٣٧٧٥ - سِقَائِيَات** *Buteo desertorum (S), Buss des déserts (F).*

نوع من السقارة موطنها الصحاري والقبلي طولا نحو  
٦٠ سم . ثوبها يختلف مع فصل السنة ولكن تلبق فيه  
الكهبة الخضرة . ذنبها عريض التجزيع . صفاها الى  
الحمرة . مناسرها حطلي النافعة ، اسود البهرة . رسفاها  
ورغابها الى الصفرة النافعة .



سقارة شمالية

**١٣٧٧٦ - سِقَائِيَات** *Buteo borealis (S).*  
**Buss à queue rouge (F).  
نوع من السقارة موطنها الولايات المتحدة الأمريكية  
طولا نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الكهبة الصفراء . وأنها  
وطورها وسقطها أسود من صدرها ونبها وانثيها . ذنبها  
اخره اقل يعلو تجزيع اسمر .**

**١٣٧٧٧ - سِقَائِيَات** *Buteo vulgaris (S), Buss commune, B. vulgaire (F).*

**Common buzzard (E).  
نوع من السقارة موطنها لبحر الابرياء يمتد من اقاصي  
الشرق الى اطراف اوروبية وافريقية . طولا نحو ٧٠ سم .  
ثوبها عذبة الالوان يختلف مع فصل السنة وتقدم الاسمر .  
تلقب فيه البصرة . ذنبها مستعرض التجزيع . صفاها  
جذريتان صدرها ازرق النافعة اسود البهرة . رسفاها  
ورغابها صفر .**

**١٣٧٧٨ - سِقَائِيَات** *Buteo lineatus (S).*

**Buss à épaules rouges (F).  
نوع من السقارة موطنها شرق الولايات المتحدة الأمريكية  
طولا نحو ٧٠ سم . تتميز بتمكنها الشائمين الحمراء .  
مناسرها ازرق النافعة افسر البهرة . غالبها حر . اظفارها  
سود . تألف ارجاع البتولا والقيظ والمزارن .**



سقارة موشحة

**١٣٧٨٠ - سِقَائِيَات** *Lacerotides (F), Lacerotides (E).*

فصيلة حيوانات زيلقة من رتبة السقائيات المشققات  
الاسنة . اجناسها ١٨ وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها  
شقيقة مستطيلة . ثوبها زاهية الالوان صفراء اللونج .

والمنحرفة نحو الباردة || اجسامها شديدة الصغر ، شبه  
اسطوانية الشكل ، تطول من ٣ الى ٤ م . وروصها صغيرة .  
عينها بارزة . تأشيرها وبلاستها نظمية . قرونها  
الاستشمارية دبوسية الاطراف ، عشارية الفصل . كولسلها  
مستطيلة الشكل . امحادها لاسفة . ارسافها خاسية المنقل .  
الارباب ملونة || تعيش على المواد النباتية وخاصة الفطور  
التي تنمو على جلعج الاشجار || اشهر اجناسها  
السفندوس *Sphindus (S)* . طوله نحو ٣ م . ثوبه  
الى السوداء الفضي يملو غل تام . تألف ارجاع حيث  
تكثر الفطور التي يعيش عليها .

**١٣٧١٢ - سِقَائِيَات** *Réformé (F), Reformed (E).*  
السفند من الخيل التي قطع عنها السفاد .

**١٣٧١٣ - سِقَائِيَات** *Echinus esculentus (S), Oursin comestible (F).*  
**Edible sea-urchin (E).  
نوع من الاغصين المأكول وهو كروي الشكل ،  
مطلوم النافعة ، كثير الشوك . يكثر في البحر الاخر  
ويوجد في المتوسط .**

**١٣٧١٤ - سِقَائِيَات** *Saphir (F), Sapphires (E).*

هو الباليوت الازرق ويلى ايضا لازورد .

**١٣٧١٦ - سِقَائِيَات** *Fane (F), Haulm, Dead leaf (E).*  
هو الشجر يشعل ما سقط من اوراق الاشجار ويشعل  
ايضا سوق اوراق النباتات القليلة غير المأكولة من  
الانسان كسوق واوراق البطاطا .

**١٣٧١٧ - سِقَائِيَات** *Sphaeronomes (S).*  
جنس طور مجهرية من فصيلة السقريات . يمكنها  
عضونة او مسطحة الارتكاز . يهية او كروية الشكل ،  
صفراء او عناية الجول . قصباتها مستطيلة الشب لتتبي  
بكتالده يهية || انواعه عذينة مظهرها ربي مركب  
الحطب والجماد ديد ان يسلب النبات او يؤذي كثيرا .

**١٣٧١٨ - سِقَائِيَات** *Argo, Carène.*  
**Chariot de mer, Vaisseau des argonautes (F).  
**Argo, Argo novis, Vela argo, Pyxis (E).  
السفينة كوكبية نجوم جنوبية المظع مركها تحت الكلب  
الاكبر || مدد تجريها ٦٤ اميزدا واشهرها التير الذي  
على الهلجان الجنوبي وهو من القرية الاول وقسمه العرب  
و *سيهك* و *سهيول* اسطورة راجعها في القصرى الثانية  
ومن التجرم الباردة المائدة الى طله الكوكبية و *الترس* و  
و *مركب القوس* .****

**١٣٧١٩ - سِقَائِيَات** *Aéronel (F), Alérazit (E).*  
السفينة الجوية كل مركب تمكته طاقته الفاتية ، اي  
طاقه محركاته ، من الارتفاع على الارض والسير في الجو .

**١٣٧٢٠ - سِقَائِيَات** *Alérazit (F).*

هو الذي ينظر ماله البقاعة ويوزعها على مستطيتها .

**١٣٧٢١ - سِقَائِيَات** *Alérazit (F).*  
هو الذي ينظر ماله البقاعة ويوزعها على مستطيتها .



## ١٣٧٩٩ - سَقَطَر \* ، سَقَر \*

من الزعانف الشريفة ويكثر زعانفها الصدرية والصغيرة ويصغر زعانفها الظهرية الخلفية الارتكاز || تحسب أحماكها وأرجلها السفلية .

*Sparus striatus* (S). *Sparus strid*, *Scathare* (F). *Scather* (E).



سَقَطَر

١٣٨٠٤ - سَقَع  
لثاحية المنبسطة البريلة من الشط .

١٣٨٠٥ - سَقَعِيَّات الخوفوم  
رتبة حيوانات من الرخويات الطدية غشيات الخرافيم .

## ١٣٨٠٦ - سَقَعِيَّات الرؤوس \*

*Stegocéphalus* (F). *Stegocéphalous* (E).

رتبة من الصفصيات الصغيرة يمد عيها إلى الأراج الأبل بقية انقراض معظمها في أواخر الأراج الثاني . بعض حيواناتها كانت تشبه التماسيح وبعض الآخر يشبه السهام . جميعها كانت مصفحة الرؤوس المسطحة .



سَقَع

١٣٨٠٧ - سَقَلَّاط \*

جنس من فصيلة السقلاطيات . أنواعه المروفة قليلة العدد منتشرة في سطح بحار العالم ومنها البحر الأبيض المتوسط || أجسامها صغيرة ، بيضية الشكل . ظهورها مغطاة الإحدياد ، صلبة اللون الجامدة . أرجلها كبيرة ، مهيئة للأظفار بمسانده الزوج الخلفي الضيق الجرم والزعفر الارتكاز . ملاحظها قليلة ، مبطلة ، شديدة النقط . زنها غليظة مسطحة . أرجلها الأخرى الأمامية أو الجزوي مملوكة ريشة سفراء يختلف انتشارها بالنسبة إلى الأنواع .



سَقَلَّاط

١٣٨٠٨ - سَقَلَّاطِيَّات \*

فصيلة من القشريات عشاريات الأرجل فصريات الأبل تتميز بقية الزوج الخلفي من أرجلها الخلفية في المحيط الظهري بدلاً من المحيط البطني . أجسامها وأرجلها عديدة منتشرة في سطح بحار العالم .

## ١٣٨٠٩ - سَقَمُونِيَّات \* ، سَقَمُونَة

*Convolvulus scammonis*, *C. syriacus* (S). *Scammonide*, *S. d'Alep* (F). *Scammony plant* (E). *Purgier-winde*, *Syrische winde* (D). *Scammonia*, *Scammon d'Aleppe* (I).

نبات طبي حشبي لبني حارث من فصيلة اللبانيات أزراره متعاقبة رعيمة ملونة الأزوايا . أزهاره أبوية الارتكاز طويلة الزناد ، بيضة الشكل ، صفراء اللون مشربة اللباض . يستخرج من جلودها صابون وراتنجية صنية كثيرة الاستعمال الطبي .

١٣٨١٠ - سَقَمُونِيَّات في اللبانيات فصيلة نباتية .



سَقَمُونِيَّات

## ١٣٨١١ - سَقَطَر مُشِير \*

*Centropomus lineatus* (S). *Centropomus rayé* (F). *Centropomus lineatus* (E).

سمكة بحرية يابوس من فصيلة القرشيات شاكيات الزعانف . أظفارها منقوشة أقالم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي || جسمها الحلبي الشكل ، يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . ثوبها إلى للحمية القوية . ظهرها فضي اللون ويملوها في جانبيها تشقير تشقير قالب أسفر ذهبي . رأسها مخروطي الشكل ، ذلق الخلف ، كبير الشفق . لونها



سَقَطَر مُشِير

## ١٣٨٠٠ - سَقَطَم في القارة الآرية ، أطلميا .

١٣٨٠١ - سَقَطَرَم \*

*Cynopterus* (S). *Cynoptera*, *Mégère sans queue* (F).  
جنس سيوان من فصيلة الطوطيات . أنواعه المروفة قليلة يقال أنها ثلاثة . جميعها أسيرة شرقية ، صغيرة القد ، برءاء ، غليظة قراس ، تصبيرة القرفوصة . طولا يراوح من ١١ إلى ١٢ سم . ويطبقها من ٥٠ إلى ٥٥ سم . تعيش بجاعات قليلة العدد . تألف التمثل والاشجار الحرجية . قوتها آثار حل اختلاف أنواعها أعصها المنة والنفقة .

## ١٣٨٠٢ - سَقَطِين \* ، مَكَلَّاحِ البحر \*

*Squatina squatina* (S). *Squatina*, *Angé de mer* (F). *Angel-fish*, *Angel-shark*, *the Monk* (E).

سمكة بحرية ولون مقترنة من فصيلة السقطينيات . أظفارها البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الأطلسي . سرسجها في قلم تقرب من المهاد والسطوط . قوتها الاسماك البليطة والرخويات والقشريات || جسمها معتدل انتطيط ، شبه صفي الشوزن ، يطول من ١٥٠ إلى ٢٥٠ سم . رأسها غليظ عريض مبط الجرم ، مقنوم الخلف الألفي . لها طرفي الارتكاز واسع الشفق . استنابها صغيرة مهيئة الأطراف الحادة المنقطة . عينها كبيرة . منبهاها ونمبهاها صغيران . زعانفها الصدرية والخلفية كبيرة الحجم فائقة كالجناح . زعانفها الظهرية صغيرة القد ، غشيتا الارتكاز الذي يتنامى قاعدة الخلف ، الخلفية الشريفة طاسمة لا أثر لها أما الألفية فمعدلة الحجم فائقة || جسمها متوسط الصنف ، مسكها جيد يستعمل في صناعة الألبسة الثمينة .

## ١٣٨٠٣ - سَقَطِينِيَّات \*

*Squatinidae* (S). *Squatinidae* (F). *Squatinidae* (E).

فصيلة أسماك بحرية ولون من السقطينيات ورتبة الاشقوق . أجسامها وأرجلها المروفة قليلة العدد . أظفارها جميع مناطق المحيط المتوسط والناطق القرية من التناقل إلى المحيط الأطلسي || سرسجها في ولا تقرب من المهاد إلا نادراً جداً . قوتها الاسماك البليطة والرخويات والقشريات || جسمها معتدل انتطيط ، مخروطية الشوزن ، مملوكة نحو ١٥٠ سم . رؤوسها مبطلة مقنومة الأعظام . تشيز يتلججا

الشكل ، مشدود التشاد . ثوبها الى الخضار الاكهب تملو نشة سمراء وسط ثيابي اسود وغطان جانبها الى الجلوة . ويعطونها في كل سكة من سكهها البطينة اربع نقط سود متعينة بالحب . رأسها الى الجلوة القامة . منها الى الربة السوداء . وواجبها سود || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً ينقضي في التربة ضمن جلابها من الطين .

### ١٣٨١٩ - سَقَنُور ، عَفَشَة ، قَبُوت

Pressure (F). Pluck, Harslet (E).

هو كل ما له قيمة ثانوية في النضابة كالتربة والقلب والكروش والقوائم الخ .

### ١٣٨٢٠ - سَكَنِيَّة

Hangar (F). Outhouse, Shed (E). السكينة والصفة بناء زراعي مكشوف الجوانب او بعضها تحفظ فيه الآلات الزراعية ويستعمل أيضاً لايلاء المحاصيل .

### ١٣٨٢١ - سَكْ

Araneus (S). Epelre (F). جس حناكب كبيرة القد . انواعه نحو ٨٠٠ موئها العلم .

### ١٣٨٢٢ - سَكْ

Gîte du scorpion (F). Lodging of scorpion (E). هو جسر السقرب .

### ١٣٨٢٣ - سَكْ مَفْجُ \*

Araneus diadematus (S). Epelre à diadème (F). Garden spider (E). Kreuzspinne (D).

نوع من الحناكب المقترنة المجلولة ، ثنائيات الروايا سداسيات المشاقق ، من فصيلة الرميبيات || جسمه مشتمل القد يطول نحو ٩ م . عند التكاثر وكسر ١٥ م . عند التكاثر . صدراها يرمي الشكل ، صغير القد ، حنفي اللون . حينها زيمتاج . شيفاء صغيران ، ذريان . لكاه متدلى الطويل . بطه اهلبيبي الشكل ، حنفي اللون تملو نقط نظامية تدر كالدور المرفوف . جمراته مستطيلة ، كهيئة الملب القصير || يألف البراري والحدائق . شه كبير القد . يتسبه بين الاجار والادغال ، قوته الحشرات والذباب والهاوم || يعتبر من الحناكب النافعة اللاذعة .

### ١٣٨٢٤ - سَكَايُوزَة ، جَمْرِيَّة ، زَهْرَة الْحَرَب

Scabiosa (S). Scabieuse (F). Scabious (E). Skabiose (D). Scabiosa (I).

جس نباتات برية وتزييلية من فصيلة الدنسيات انواعه نحو ٥٠ منها الجنيات والاشباب الحولية والحرارة والمعرة . اوراقها متعينة مركبة ومفرقة . ازهارها وريسية طويلة الزناد . جملة الشكل والالوان . كانوا يوزون كليا في الماضي القريب مدة غلوص طيبة منها الشفاء من الجرب والفلس وغيرها من الامراض الجلدية . اشهر انواعها ما يلي .

### ١٣٨٢٥ - سَكَايُوزَة الْفُولْزَا

Scabiosa caucasica (S). Scabieuse du Caucase (F).

شبة معمرة تملو من ٥٠ الى ١٠٠ م . اوراقها مسنة الحافة ، جملة الخضار الزاهي || ازهارها كبيرة القد قطرها نحو ٦ م . لونها الى الزرق الساوية || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٣٨٢٦ - سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة \*

Scabiosa purpurea (S). Scabieuse des jardins, Fleur des vœux (F).

شبة حولية عديدة الشروب تملو من ٤٠ الى ٩٠ م .

الاسفل يتقدم الاحمل . اسنانها صغيرة ، ذرية ، متعينة . عيناها كيرتان ، ناشراتان ، رفيعة الازنكاز . زعانفها الفهرية اثنتان . زعنفتها الذيلية كبيرة ، فارقة || لحمها قلح الصفت ، مغرب فيه .

### ١٣٨١٧ - سَقَنُور

Scincus (S).

Scincus (F). Skink (E).

جس حيوانات من القفا القصيرات الالسة . انواعه ثمانية منها غشاق الانهار والصحارى الاسبوية والافريقية . جميعها اكبر من السحالي والخنث . قوائمها خفيفة الاصابع . اذنانها صغيرة . اكثافها بمنجزة ، ظهورها مدببة يسفرة وولد . يطونها الى البياض الاثير . كان ولا يزال يستعمل ، بعد تحضيره وتجفيفه بالمح ، لتبيح الباء والامناظ . وهو شائع الاستعمال في مصر والسودان ويغريها من البلاد الافريقية . ومنهم من قال انه يلهب بالتدريج القوة والقرص والبراع والمفاصل .

### ١٣٨١٨ - سَقَنُورِيَّات

Scincidae (S).

Scincidae (F). Scincidae (E).

فصيلة حيوانات زحافة من رتبة الظاء قصيرات الالسة منها السقنور واليدفة ورضامة البقر والحكاكة || انواعه نحو ٤٠٠ معظمها من زحافات المناطق الحارة .

### ١٣٨١٩ - سَقُونُور (F). سَقُونُور

ه سقط من اللين في الاجل الموزوت متعلقاً عندما لا يطم لسطاً مستحقاً بعد انذاره رسمياً بسقوط حقه في الاجال الباقية فيصبح اللين اذا ذلك واجب الاداء . هذا وقد يسقط الحق في الاجل الموزوت ، قانونياً ، في ساقتي : اشارة الفلاس لللين او اذا قام اللين باعمال تحط من قيمة الضمانات المرسدة .

### ١٣٨١٥ - سَقُونُورُ الدَّهْرِي

Péréemption d'instance (F).

هو اعاد اثار كل اجراء في الدعوى يتعذر به المدعى عليه بعد انقضاء مدة مملونة .

### ١٣٨١٦ - سَقُونُورِيَّاتُ هُو الشَّرْكَة الصَّفراء ، المظلمة .

### ١٣٨١٧ - سَكْنِي ، تَرْوِيَّة

Abruvage (F). Wacring (E). هو اسقاء او ارواء الحيوان والنبات .

### ١٣٨١٨ - سَكَنِيَّة اَنْثِيَّة \*

Scotogramma elegans (S). Scotogramma élégans (F). Scotogramma elegans (E).

حشرة من فصيلة النسيقات ورتبة حرشقيات الاجنحة . موئها يمتد من الشرق الاوسط الى اربوة . فراشها جارية قتيها رحيق الازهار . مرشها تمش على اوراق السرمقيات البرية والزراعية || جسمها صغير القد يطول نحو ١١ م . سبطها نحو ٣١ م . رأسها صغير الحجم . عيناها كيرتان . زباناها غشيان . مرشها مشتمل الطويل . جوشها وبطنها الى الربة || ورشها والامانيان الى الربة الحطية تملوها زوزة وزوزة متعينة يتخللها بعض البياض . ورشها الخلفيان الى الربة القنراء تدر مع اقترابها من الطرف الخاربي || لها جيلون في الحلي . تظهر فراشة الجبل الاول في ايار وتتغير فراشة الجبل الثاني في آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو سمة ايام وتحت الكن لطفاً مستطيلة حل الصفحات السفلى من تصال اوراق السرمقيات || السرعة تطول نحو ٣٠ م . جسمها اسطواني



سَقَنُور



سَقَنِيَّة اَنْثِيَّة



سَكْ مَفْجُ



سَكَايُوزَة بَسْتَانِيَّة

الزناد. خميرة التركيب ، خامسة الفصل || أشهر انواعه سكب الغرب .

#### ١٣٨٣٤ - سكب الغرب \*

*Sanicula europaea* (S). *Sanicle d'Europe*, *Sanicle mille* (F). *Common sanicle*, *Wood march* (c). *Echta heilknocke*, *Sanikel* (D). *Sanicola*, *S. maschia* (I).

نوع من السكب هو نبات عشبي، جلمووي، طيب، بري، يطلو من ٥٠ الى ٦٠ سم. ازهارا وردية اللون. يتصلب في القلب البيطري. اورثاته تقيد الاثمار عند الانزعاج وبعد الوضع لانه يستعمل الخلاص اي خروج المشية.

١٣٨٣٥ - سكبيية  
Scape هي في الحشرة اول قصلة من التزيان.

١٣٨٣٦ - سكبيية  
*Planche basse* (F).  
*Shallow bed* (E).  
سكبييل او مربع من التراب حشن وصل متدفقا عن سطح التربة لاقبال واستقبال ماء السقاية.

١٣٨٣٧ - سكبييت  
*Saniculoides* (F). *Sanicles* (E).  
سبط من الخبيات عديد الاجناس والانواع اشهرها السكب.

١٣٨٣٨ - سكبييتنج  
هو انجذاب البسم، اطلبه.

١٣٨٣٩ - سككة، حثيية، همدكة، حثريية  
*Apoplexie*, *Coup de sang* (F).  
*Apoplexis*, *Apoplexy* (E).  
استحسان شديد مع زف او رشع او السكب دموي في النجسة الملع او غيره.

١٣٨٤٠ - سكر  
*Batardeau*, *Vanne* (F).  
*Coffer-dam*, *Wazar-gaze* (E).

حاجز يتحرك من فوق الى تحت يعترض طريق الماء فيسمح بمروره او يمنعه. وهو ايضا قد يسمح بتحويل الماء من مجرى الى آخر.

١٣٨٤١ - سكر  
*Sucre* (F). *Sugar* (E).

مادة حلوة اللطاف متبلورة سهلة اللويان في الماء. كثيرة الانتشار في المملكة النباتية توجد في جلمور النبات وسوى واورثاته وتوافر || وهو من الوجبة الكياليية يشتم الى مادة بسيطة تدعى غلوكوز كا في السنب وسنط التار. ومادة ثنائية تدعى سكروز كا في عصير قصب السكر والشمشوق... اما السكر من الوجبة الحيائية فهو مصدر الحرارة الحيوانية التي يرتكز عليها كل نفاط.

١٣٨٤٢ - سكر  
*Saccharifier* (F). *To saccharify* (E).  
حول الى سكر.

١٣٨٤٣ - سكر العنب  
*Glucose*  
هو الغلوكوز، اطلبه.

١٣٨٤٤ - سكر متعكس  
*Sucre inverti* (F).  
*Inverted sugar* (E).

هو السكر الذي صار قابلا للاختصار اي السكروز الذي تحول الى غلوكوز وغليولوز.

١٣٨٤٥ - سكواوات  
*Saccharate*  
كل مركب من السكر مع اكسيد معنفي.



سكايوزة حثيية



سكايوزة ورد الحام



سكب الغرب

اورثاتها ملتصحة، رباعية. خلية التصل || ازهارها كبيرة اللثة لونها يختلف باختلاف الفرب فيها البنفسجي والازرق والبيجي والوردي والايض والاصفر والوشج. جميعها نلحة العرف المسكي || ثمارها خلية البشرة، ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

١٣٨٣٧ - سكايوزة حثيية \*  
*Scabiosa arvensis* (S). *Scabieuse des champs*, *Langue de vache* (F). *Scabious*, *Pin-cushion flower* (E). *Ackergrindkraut* (D). *Scabiosa del camp*, *Ambretta* (I).

عشبة طرية برية معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم. اورثاتها ملتصحة مشروعة مستطيلة القفص الوسطي. تصلها زغبية البشرة، الحسل اللون || ازهارها صغيرة اللثة قطرها رلوح من ٢ الى ٣ سم. لونها الى الزرقوة اليلكية. ميرها مسكي العرف || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٨٣٨ - سكايوزة عطرية

*Scabiosa canescens* (S). *Scabieuse odorante* (F).  
عشبة معمرة تملو نحو ٦٠ سم. اورثاتها كبيرة اللثة مشروعة، ثمرها قدي الشكل || ازهارها كبيرة الحليم، زرقاء اللون، عطرية العرف. ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول.

١٣٨٣٩ - سكايوزة كبريتية

*Scabiosa sulphurea* (S). *Scabieuse jaune soufre* (F).  
عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٥ سم. اورثاتها كاملة مستطيلة مدنية. تصلها ازغب بالصفحة، الحسل اللون. ازهارها خلية البشرة، كبيرة اللثة، كبريتية اللون || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

١٣٨٤٠ - سكايوزة نجمية

*Scabiosa scabellata* (S). *Scabieuse étoilée* (F).  
عشبة حولية تملو نحو ٥٠ سم. اورثاتها ملتصحة، رباعية، سلتة. تصلها خلي البشرة الحسل اللون || ازهارها مستطيلة الزناد، متوسطة الكبر، قطرها نحو ٤ سم. لونها الى اليباض اليلقي، حنارها اصفر || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٨٤١ - سكايوزة ورد الحسام \*

*Scabiosa columbaria* (S). *Scabieuse columbaria*, *Columbaria* (F). *Small scabious*, *Lilac flowered scabious* (E). *Taubenskabiose* (D). *Scabiosa columbaria* (I).  
عشبة معمرة عديدة القفروب تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اورثاتها مفصصة ومنسقة الحلقة. تصلها خلي البشرة بمرى اللون || ازهارها كبيرة اللثة لونها يختلف باختلاف الفرب. فيها الاخمر والازرق والايض والاصفر. ثمارها خلية البشرة ثمانية التضديد القلبي || ازهارها يستمر من سوزان الى تشرين.

١٣٨٤٢ - سكاكة

*Aérolologie* (F).  
*Aerologie* (E).  
السكاكة علم يبحث في احوال الجو الرقيق وفي مختلف مساحجه الصاعدة والمنخفضة.

١٣٨٤٣ - سكبيية

*Sanicula* (S). *Sanicle* (F).  
جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبيات. انواعه ثلاثة اورثاتها طويلة التزييلات كثيفة مفصصة. ازهارها عكولية التجميع، حامية الارتكاز، طويلة



## \* سَكْسِيد - سِيلِيكْسِيَس \* ١٣٨٥٨

Cinxya (S). Cinxyde (F). Cinxys (E).

جنس حيوانات زحافة برية وبائية من فصيلة السلحفاة .  
أنواعها المعروفة ثلاثة موطنها بعض مناطق افريقية اخصها  
غينية والبلاد المجاورة || اصنافها متوسطة القد . اذنانها  
لاخرة ، عذرة بالطول والعرض ، مفصلي الاطراف  
الخلفية ، تطفئ كامل الجسم || جميعها حاصلة قوتها  
الاحتساب البرية والمالية .

## \* سَكْسِيك \* ١٣٨٥٩

Saxicava (S).

Saxicava (F). Saxicava (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليحيات الخياشيم ،  
وفصيلة الصليحيات . أنواعها المعاصرة قليلة اصنافها بعض  
مناطق البحر الابيض المتوسط والحيط الاطلسي || اصنافها  
شبه هرية الشكل ، متسلسلة ، غمدية ، متوسطة القد . تعيش  
مشابها مستقلة . مصاريها عادية التستين . تعيش  
لاصقة بالصخور الكلسية . ليفتها غزير المادة كيميائية .

\* سَكَّ - بَعُورُ مَرْمَرٍ ، زَهْرُ الْمَسِيحِ ،  
عَرَنْتِيْفَا ، وَكَلَف ، حَبْرُ الْمَشَايِخ ،  
بَحْلَاصِيس ، رَكَّة ، يَرْبَع ، سِيكَلَمِنCyclamen (S). Cyclamen, Cyclame, Pain de pour-  
ceau, Arthanite, Artanite (F). Cyclamen, Bleeding-  
sun, Sow-bread (E). Cyclamenvelchen (D). Cicle-  
mino, Tubero florito, Pan porcino (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الربييات  
انواعه نحو ١٢ صنفها مستمرة مبطلة لونها الى الجفوة  
الكامحة . أوراقها زائغاة قرصية الانتساب مستطيلة الزائد .  
ازهارها خضابية التركيب ، فردية التجميع ، متسكة  
الارتكاز . ثمارها كعابر صغيرة ، كروية ، عديدة  
البذور . كان ولا يزال من النباتات المغايرة  
التي تشغل في تركيب عدة مستعمرات . وهو شائع  
الاستهلاك في الطب البيطري عصاره صنفها غنية بالسكسين  
وهي مادة قلبية غمدية ومنهم من استعمالها في صيد الاسماك .  
اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

## \* سَكَّ اُرُوبِي \* ١٣٨٦١

Cyclamen europaeum (S). Cyclamen d'Europe (F).  
حبيبتة متوسطة القد قطرها نحو ٤ سم . قلائطها الجذرية  
عشبية التركيب تتم كامل الصنفه السفلى . أوراقها  
قلبية . مستدرة الزوايا ، نصلها جامد النسيج ، اخضر  
الصنفه العليا المنسجة بالابيض ، احمر السفلى || اذنانها  
مرفقة الرائحة ، وديدة اللون ، يطولها مزاج قزمي . مبالغها  
تطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها يستمر من تموز  
الى تشرين .

## \* سَكَّ الْبَنْدَلِيَّةِ \* ١٣٨٦٢

Cyclamen  
neapolitanum (S). Cyclamen neapolitan (F).  
حبيبتة كبيرة القد قطرها يراوح من ٥ الى ٢٠ سم .  
قلائطها الجذرية حنارية حنيفة || أوراقها قلبية الشكل ،  
ميمة الزوايا ، نصلها جامد التركيب ، ابيض التليج  
والخامقة . اذعانها بضاء اللون او وديدة يطولها عند اعناقها  
توشيح احمر . مبالغها تطول نحو ٢٠ سم . || ازهارها  
يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

## \* سَكَّ الْفَصْ \* ١٣٨٦٣

Cyclamen coum (S).  
Cyclamen de Cos (F).  
حبيبتة صغيرة القد قطرها نحو ٢ سم . أوراقها بيضيه
Sucrase (F). Invert sugar (E). سَكَّرَان  
هي خيرة السكر التي تحول السكر الى غلوكوز وفركتوز  
قابليين للاختصار .

## \* سَكَّرَان - هو النج الاسود ، الحلبه . ١٣٨٦٧

Scopolia (S). Scopolite (F). سَكَّرَان \* ١٣٨٦٨

Scopolia (E). Tollkraut (D). Scopolia (I).  
جنس نباتات عشبية بطحورية معمرة من فصيلة  
الباذنجانيات . انواعها قليلة جميعها زراعية .  
سوقها قلائد . اوراقها مستطبة بسيطة متناحية . ازهارها  
فردية ، ابطية ، كوية ، مملحية ، متدلية || اعرف  
انواعها ما يتبع .

Scopolia lurida (S). سَكَّرَان اَصْفَر \* ١٣٨٦٩

Scopolia jaunditica (F).  
عشبة زرقانية مهددا الهند . تملو نحو ١٥٠ سم . ازهارها  
خضابية تفصيص صغيرة القد تبدو عطره اللون ثم  
تتحول الى الاصفر وتقتبي بالابيض || ازهارها  
يستمر ٥ اشهر ايام من اواخر آب .

Scopolia carnolica (S). سَكَّرَان الغروب \* ١٣٨٧٠

Scopolia de carniole (F).  
عشبة معمرة مهددا غربي اوروبية . تملو من ٣٠ الى  
٦٠ سم . ازهارها جلوية اللون متوسطة القد || ازهارها  
يستمر من نيسان الى ايار .

## \* سَكَّرَا - هي الزوان ، الحلبه . ١٣٨٨١

Soldanella (S). سَكَّرَجَا \* ١٣٨٨٢

Soldanella (F). Sea bind-weed (E). Straudwindes,  
Bärwinde (D). Soldanella (I).

جنس نباتات عشبية برية جبلية معمرة من فصيلة  
الربييات . انواعها خسة . سوقها غراخية تملو من ٥ الى  
٢٠ سم . اوراقها جلدية مغارة مستديرة . ازهارها فردية ،  
حامية ككلال الشراخ . لونها ورسمها يختلفان مع نوعها .  
لها الاحمر والبنفسجي والازرق والبيجي .

## \* سَكَّر تَبَت \* ١٣٨٨٣

هو الابولج والقديم ، الحلبه .

Saccharose (F). سَكَّرُوز \* ١٣٨٨٤

Saccharose, Cane-sugar (E).  
هو المادة الحلاوة الموجودة في صلب قصب السكر والشونيز  
والقندر والاصفندان . وهو مفكور في التبلور ثقله القوي  
١,٦٠٦ غلوه المائي متيسر .

Saccharoux (F). Saccharous (E). سَكَّرِي \* ١٣٨٨٥

يعتوي حل سكر .

Saccharine, سَكَّرَان \* ١٣٨٨٦

Sucre de houille (F). Saccharin, Glusidom (E).  
هو سكر القند المجري ، مسروق ابيض شديد الحلاوة  
كزبد حلاوته ٣٠٠ مرة من السكر المعروف . يستخرج  
من قطران القند المجري . يستخره مفرأ بالصمغ  
ولا يميزون استعماله الا في السيلة .

Talapoin (F). سَكْسَكُوز \* ١٣٨٨٧

هو هيرس سكار . الحلبه .

سَكَّرَان

سَكَّرِي

سَكِيد

سَكِيد

سَكَّ اُرُوبِي

سَكَّ الْبَنْدَلِيَّةِ

ضيقة المؤخر للذب. اتحادها لا تلتص كامل البطن. قوائمها نسيجة، متصلة الجرم. أثوابها حجابية التفضيب منها ريدة اللون ومنها مبيجة ومزركشة || جميعها دلتة تعيش تحت القشور والقماذ وفي الاخشاب النخرة.



سكع لباني

#### ١٣٨٧٠ - سُكَّع رَيْمِي (F). Scaphidiidae (F). Scaphidiidae (F).

فضيلة حشرات من فصيلة الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة العدد، منتشرة في معظم غابات المناطق المعتدلة الحارة والحارة || اجناسها صغيرة طولها من ٩ م. رؤوسها مسعرة، ملوطة. عينها صغيرة، بارزة. تكاثرها وفكوكها قياسية. قرونها الاستشعارية لانظامية، منها الصلحانية ومنها الخيطية، جميعها مركبة من ١١ فصلة. كواسلها محدبة، شارقة، تلتص القسم الاكبر من الرأس. اتحادها مائلة لا تلتص كامل البطن. بطونها مدببة المؤخر || جميعها دامة تعيش تحت القماذ وفي الاخشاب النخرة وفي تكاثر القشور القاذبة || اشهر اجناسها السكفيد.

#### ١٣٨٧١ - سَكَل - Synodonta (S). Schal (F).

الشكل ج أسكال. جنس ابيك نهرية من فصيلة السلوديات تكثر في مياه الانجر الافريقية. تتميز بفضامة شكلها واسوداد لونها وصفر رؤوسها وتذهب ملهاتها البت.



سكيد

#### ١٣٨٧٢ - سَكَل - Ascalaphus (S).

Ascalapho (F). جنس حشرات لافلية من فصيلة السكليات ورتبة شاربانات الابنية. انواعها المعروفة عديدة، مملها بألف الاقاليم المعتدلة واليبس الآخر يعيش في المناطق الحارة او المتوسطة الحرارة || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تراوح من ٣٥ الى ٨٠ م. رؤوسها شبه مخروطية الشكل، كهيئة الملب الخلق. اجنسها مسطحة، بعضها شفاف واليبس الآخر مغطى. جميعها ملوطة. خضابها الرئيسي اصفر او عاجي تلوينها ينج وزخارفها يراوح لونها من الاسمر الى الاسود. قرونها الاستشعارية مسطحة تنتهي بطور من الملب التام سفية الشكل او مطية. صغورها متصلة التذاتة، كهيئة الملب النقي. بطونها اسطوانية او مدونة الشكل، سواء اللون، ملوطة بالاسفر او الاخير او العاجي || يربطها شبه يفسية الثفرون، متصلة الخيطية، بارزة الحار السكسي الذي يلو كاستان المنشار. رؤوسها مربعة، ناعضة. ملاسها الفكية كلابية الشكل، مسنة من الداخل. جميعها مفترسة تعيش بين الاشجاب وتحت الحجارة.



سكال

#### ١٣٨٧٣ - سَكَلِيَّات - Ascalaphidae (S).

Ascalaphidae (F). Ascalaphidae (F). فضيلة حشرات من فصيلة الجتاج ورتبة شاربانات الابنية. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم || اجناسها متوسطة القدر وكبيرة. بطونها تراوح من ٣٢ الى ١١٥ م. رؤوسها شبه مخروطية، كهيئة القزب والملب النقي. عينها كبيرة، جاسطة. قرونها الاستشعارية خيطية، مسطحة، تنتهي بمجموعات من الملب والقزب يكثر فيها الشكل المثلث ثم الصفي. صغورها، من الكحول الى اليرباد، زلمة. بطونها شبه مدونة الشكل. اجنسها

الشكل تملها مناوج السج لونه الى الخضار الباهق. ازهارها عادية اللون، شديدة الحمرة، صغيرة القدر، مالحيتها طولها نحو ٨ م || ازهارها يستمر من شباط الى اذار.

#### ١٣٨٧٤ - سُكَّع رَيْمِي (F). Cyclamen vernum (S). Cyclamen printanier (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٢ م. قلائها الجارية بحورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اوراثها قلبية، ظاهرها ازرقا، تملها جامد السج اخضر الصفحة العليا، مالح السفل || ازهارها وردية اللون، قليلة اللون. متوسطة القدر. مالحيتها طولها من ١٠ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من اذار الى ايار.

#### ١٣٨٧٥ - سُكَّع فارسي (F). Cyclamen persicum (S). Cyclamen de Perse (F).

نبات رده يتطلب بعض العناية الخاصة. صغوبه عديدة تختل بالازن ازهارها وانتكالت بثلثها || حصيلته متوسطة القدر قطرها يراوح من ٤ الى ٦ م. اوراثها يفسية، تملها مراكب التسليخ والتدريج، مسن الحافة، شديدة الخضار العابق || ازهارها كبيرة القدر، عديدة الالوان فيها المكسبة والمناوية والمهدبة. مالحيتها طولها من ٢٥ الى ٣٠ م || ازهارها يستمر من تشرين الثاني الى اذار.

#### ١٣٨٧٦ - سُكَّع كلبية (F). Cyclamen cilicium (S). Cyclamen de Cilicie (F).

حصيلته صغيرة القدر قطرها نحو ٣ م. قلائها الجارية بحورية قرصية. جلودها ضمية الانتشاب || اوراثها قلبية مسطحة. تملها مناوج السج اخضر الصفحة العليا المل السفل || ازهارها وردية اللون تملها نغمة ارجوانية زرين فائدة البلات. مرها متوسط الارجح. مالحيتها طولها نحو ١٢ م || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين.

#### ١٣٨٧٧ - سُكَّع لبستاني (F).

Cyclamen libanoticum (S). Cyclamen libanais (F). حصيلته متوسطة القدر قطرها نحو ٥ م. لونها الى الجوزة. قلائها الجارية بحورية قرصية || اوراثها قليلة مسنة الحافة. تملها اخضر الصفحة العليا، جلوي السفل. ازهارها متوسطة الحجم، عريفة الرائحة، وردية اللون، بثلثها مسنة التامدة. مالحيتها طولها من ١٢ الى ٢٥ م. || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

#### ١٣٨٧٨ - سُكَّعِين ، سِكَلَامِين (F).

Cyclamine (F). Cyclamin (E). مادة قلوية سامة تستخرج من صغارة السك لتستعمل في مكافحة الحشرات وفي بعض المستحضرات الطبية الليطرية.

#### ١٣٨٧٩ - سَكَلِيد (F).

Scaphidium (S). Scaphidia (F). Scaphidium (F). جنس حشرات من فصيلة السكفديات ورتبة جمعات الابنية. انواعها المعروفة قليلة العدد اعطتها بعض غابات وحراج الاقاليم المعتدلة الحارة || اجناسها صغيرة القدر اطليمية الشكل، طولها نحو ٦ م. رؤوسها مستعرة، ملوطة. عينها صغيرة، بارزة. قرونها الاستشعارية صلحانية. تكاثرها وفكوكها وبلاسها نظامية. كواسلها كبيرة، محدبة، شارقة، تلتص معظم الرأس. بطونها



سِكَّة

لا تؤكل. يتكاثر بالبالر أما يفضل غرس الثمرة كما هي وذلك بعد انتاش بلوتها الذي يحصل منه وضعا في مكان رطب || وهو رطب في الأتربة الخفيفة العميقة القنور ويتطلب إلى سادة أو عوائل نباتية يستلحقها .

١٣٨٩٥ - سَلَّ ، حَوْش  
Châtrer (F).  
To castrate, To geld (E).  
انزعز الخصيتين في الاسمنة والبركاش والحيين ونفيرا .

١٣٨٩٦ - سَلَّ  
Manne (F). Hamper (E).  
جنية كبيرة من القصب تستعمل في نقل بعض الثيار والحصار .

١٣٨٩٧ - سَلَّ ، قَدْرُون ، سَحَاك  
Tuberculeux (F). Tuberculois (E).  
مرض معد خطر يمس البصل والصلال والتوتن في الحيوان ، والسحاب في النبات .



سَكِيم

١٣٨٩٨ - سَلَّ وَتَوِي ، قَدْرُون وَتَوِي  
Tuberculeux pulmonaire, Phthise pulmonaire (F).  
Phthisis, Consumption (E).  
مرض معد يصيب الرئة فيطها . كلفه العالم الألماني كوخ عام ١٨٨٢ وهو من الأمراض غير الوراثية أما يعيش في الهواء والمصاق وأفرات الجسم والملايس والطمس وفي حليه الماشية المصابة || تحصل عنده أسما باستنشاق الهواء الملوث من طريق الجهاز التنفسي إلى الرئتين أو من طريق الجهاز الهضمي بواسطة الأغذية الملوثة .

١٣٨٩٩ - سَلَّ  
Sarcophorus (S). Sarcophore (F).  
جلس طير من فصيلة الزرقانيات اقبل الثوب طويل الرجلين هذه ثقباني الافريقية .



سَلَّ

١٣٩٠٠ - سَلَّ ، دُودَة عَنَبِيَّة  
Trichocéphalus (S). Trichocéphale (F). Trichocéphalus, Thread worm (E).  
نوع من الديدان السلكية الدقيقة المسطحة . رؤوسها شعرة اطرافها مدبة . تعيش طفيلية في الاسماء اخصها للمي القليل .

١٣٩٠١ - سَلَاح  
Thecopora  
جنس طور مجهرية من فصيلة الثعصبيات ، يتميز بدهاماته الحظية اللعاب ، الجولية القوية المسطحة ، الشفعية الانقسام والثانية او الرباعية الاغنية || اليوم قليلة تعيش طويلا الاثدي على الصنوبريات ، الشجر وأمرها سَلَاح البرقوق .

١٣٩٠٢ - سَلَاح الْبَرْقُوقِ  
Thecopora palli, T. areolata (S). Routile des pruniers (F).  
ظفر من السلاج يلقى طوره الاثدي على الصنوبر . ويقتل في طوره النامي على البرقوق والخوخ والكزبر . مظهره الخاضع يقع حر فضلة الزوايا تركب الأوراق على صفحتها العليا يقابلها على الصفحات السفلى بنور قرحية لاقياسية للشكل ولحجم لها إلى المجودة فالسرة تسب التسج وتقب ذيل الأوراق وسقطها || يتكاثر بالانجاسد من الصنوبر المويود وباستعمال الفواطر الحديثة الخالية من المواد النسيجية .



سَلَاح الْبَرْقُوقِ

١٣٨٨٩ - سَكَّة ، سُرْعُوقِيَّة الْبَحْر  
Squilla (S). Squille, Mante de mer (F).  
جنس دوابات بحرية من القشريات فيات الاصيل . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في مجار البلاد الحارة || اجسامها مستطيلة . اخفها رقيقة متدبة بالسك المدرية الاربع الاصل . اما السك الاربع التالية طفيلية . يطها كبيرة مسطحة . الزوج الاسامي من قوتها بالغ التسخامة والكبر مجهز للخطف كما هي الحال عند السُرْعُوقِيَّة || غلوها مرغوب لها مأكلة .

١٣٨٩٠ - سَكِين  
Coutre (F).  
Ploughshare, Coulter (E).  
جزء من المحراث حاد الطرف يقطع كتل التراب عموديا .

١٣٨٩١ - سَكِينِي السِّن  
Caltridenté (F).  
Caltridentale (E).  
من الحيوان من كانت اسنانه حادة الاطراف ، سَكِينِي الشكل .

١٣٨٩٢ - سَكِينِي الْمِنْدَاد  
Caltricroste (F).  
Caltricrostral (E).  
من الطير من كان منقاده صلب الطرف ، حاد كالسكين نخس بالذكر القلق والبلشون .

١٣٨٩٣ - سَكِينِي الْفَرْق  
Cuterfolié (F).  
Cuterfoliate (E).  
من النبات ما كانت اوراقه سَكِينِي الشكل .

١٣٨٩٤ - سَكِينِي  
Sachium edule (S). Chayote, Chacho, Chuchu (F).  
لبات زراعي ممر ويحسد الجلس والنزع من فصيلة القرعيات . مهده بلاد المكسيك وسبا انتشر في سائر اقطار العالم . جلوره دنية كبيرة القند . ساهه لينة مسلسلة تطول بسمه امتار . حوافها ثلاثية او خماسية التركيب . اوراقه متتفة كفية خماسية القصوس والبروق ، تطول وتعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . اذله ابطية الانتساب صفراء اللون ، ذكرية وانثوية . الذرية متعددية التجميع والانثوية فردية . ثمار تؤكل مطبوخة وهي كبيرة القند بفضية الشكل ، مقنونة القلب ، مفسلة الثمرة المهدوبة ، المتصصة ، البثرة الفتوة . لبها جانبا الملاءة البيضاء اللون يحسن حبة كسنتية الشكل ، كبيرة القند ، حقة القشار ، الملة جزء من لباب الثمرة تحوي العناصر التالية

٩١,٠٠٪	ماء
٢,٢٪	مواد دهنية
٢,٢٨٪	مواد سكرية
٢,١٦٪	مواد ازوتية
٢,٣٤٪	مواد غير ازوتية

دزوات جلوره تستعمل استبدال البطاطا في تون من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ غرام . وتحوي ما قدره ١٥,٠٠٪ من النشا ٢٥,٠٪ من المواد الازوتية  
معد دزوات البتة يزارع من ٣ الى ٧ يتعلم منها الثلث أي من البتة الواحدة إلى الدزوتين ويجب أن تكون البتة حولية أو محولة لما اذا زاد عمرها عن السنتين تصبح لينة

Blépharite (F). Blépharitis (E). **سلاجي** ١٣٩١١  
هو رنة الجفن أو التهاب الجفن .

Anthropologie (F). **سلاجية** ١٣٩١٢  
Anthropology (E). السلاجية علم طبائع الانسان .

Lévrier (F). **سلاجي** ١٣٩١٣  
Greyhound (E). سلاجة كلاب عدامة تصيد الزئان والأرانب والثعالب  
وبنات آوى تتميز باستطاعة اجسامها وقوامها .

Monoblepharidae (S). **سلاجيات** ١٣٩١٤  
Monoblepharidées (S). Monoblepharidae (E).  
فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة التسنليات ورتبة  
البليضيئات .

Race (F). **سلاجة** ١٣٩١٥  
Race, Breed (E). جاع افراد متشابهة من نوع واحد تنقل صفاتها  
بالوراثة . ومن المستحسن استعمال سلاجة في النبات وورق  
في الحيوان .

Raciel **سلاجي** ١٣٩١٦  
ما هو منوط بالسلاجة أو العنصر .

Phalange (F). Phalanx (E). **سلاجي** ١٣٩١٧  
السلاجيات عظايا في الاصابع .

Phalangides, Pascheurs (F). Phalangide, Mowars,  
Harvestermen, Daddy longlegs (E). Weberk-  
nachte (D). **سلاجيات** ١٣٩١٨  
رنية من المتكويبات زبلاواتها طوال الارجل ذفاضا يعيش  
كالخسادين .

Entre-nœud, Mérihalles (F). **سلاجية** ١٣٩١٩  
Internode (E). جزء الساق بين عقدتين .

Age de la charrue (F). Plough-beam (E). **سلب** ١٣٩٢٠  
نصاب المزارع أو قيلمه . وهو الجزء الجامع لسائر اجزاء  
المزارع .

**سلب** ١٣٩٢١  
السلب من القصة : قفرا . والسلب : ماء حجر في  
البن يصل منه الخبال وهو اجفى من لبن المقل واصطب .

**سلاجي** ١٣٩٢٢  
السلاج والسلاجية ضرب من الذهب ج سلاج .

**سلاجيات** ١٣٩٢٣  
Tropaeolum (S). **سلاجية** ، **سلاجي** ، **سلاجي** ، **سلاجي** ،  
Capucine (F). Nasturtium (E).

جنس نباتات عشبية ليفية مدادة من فصيلة السليزيات .  
انواعها ٣٥ معظمها امريكي المنبت . سيقانها عديمة الخواثق .  
اوراقها متعاقبة مجنبة ، حاليها لولبية . ازهارها محورية  
الارتكاز ، كوروسها ثنائية التركيب ، مهبازية التناعد .  
تويجها خمسة البتلات الملقطة . اوراقها . وازهارها  
مأكولة قريبة الشبه من الرشاد || اعرف واشهر انواعها  
ما يلي .

Haemastopus (S). **سلاج** ١٣٩٠٣  
Hultrier (F). Oyster-catcher (E).

جنس طير من طوال الساق وفصيلة السلاجيات . انواعه  
المعروفة عشرة منتشرة في معظم انحاء العالم . ملجتها الحيائي  
جامي . اسراجها تمتد بعض المئات . جميعها من القواطع  
الجلجلة . قوتها الرغويات والقشريات والديدان ... ||  
اجسامها ربة متوسطة القد . متفادها مسطيلة جالسة .  
اجتمعتا شاركة تلحف الانخاب . ارسافها دقيقة معدلة  
الطول . اسبابها ثلاث مسطيلة الجرم ، مستقيمة  
الانفاث . القصيرة || تدفن في الكفتان والحماص .  
انحاصها قدر سطحية يحيطها اطار من حطام الصدف  
والقريع . اناثها تقص من يمشين الى ثلاث يمشيات  
تخضعها وسعها ٢ اسابيع || اعرف انواعه واشهرها  
سلاج كشش .

**سلاج كندوش** ١٣٩٠٤  
Haemastopus ostralegus (S). Hultrier-pie,  
Bécasse de mer, Pie de mer (F). Sea pie (E).

طائر من السلاج . موطنه يشغل معظم انحاء العالم القديم .  
مستاء البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . مصيفه البلاد الباردة .  
يألف القشوط البحرية وصفات الانهر والمستنقعات . شرته  
يعد بعض المئات || جسمه متوسط القد يطول نحو ٤٤ سم .  
بسطه نحو ٨٦ سم . قوته ثنائي اللون ، اسود الرأس والظهر  
والعنق ، ابيض الجناح والجلجل والساق والانفاج . جناحاه  
سود الصفة العليا ، يفي الاياهر والصفة السفلى  
ذليه ابيض للثم الساق ، اسود الطرف . حلقة عينه  
قرنزية اللون . جلونه برتقالية . منقاده احمر القاعدة  
والجسم ، اسود الملقط . رجلاه الى الحجرة || اناده لا  
تحسن اكثر من يمشين .

Haemastopodidae (S). **سلاجيات** ١٣٩٠٥  
Hémastopodidae (F). Haemastopodidae (E).

فصيلة طير من طوال الساق . اجناسها وانواعها المعروفة  
قليلة جميعها من القواطع الجلجلة . ملجتها الحيائي  
جامي . اسراجها وافر العدد . قوتها القشريات والرغويات  
والديدان والاسماك الصغيرة || اجسامها متوسطة القد ،  
اثوابها ملونة || اشهر اجناسها السلاج وكندوش للماء .

**سلاجي** ١٣٩٠٦  
Chelonia (S). Chéloniens (F). Chelonia (E).

رتبة من الزحافات البيوضة تشغل خمس فصائل تتميز  
باجسامها المبطنة البنية اللون . رؤوسها صغيرة . امتانها  
متوسطة الطول . لذكورها عادمة الانسان . قوائمها غليظة  
وصغيرة . بطونها قرنية الكثف . ظهورها مدقة بذهاب .  
اما فصائلها فهي : الحسليات والرتريات والقرقيات  
والسحليات والجبليات .

**سلاجية** ١٣٩٠٧  
Plasticité (F). Plasticity (E). هي الانطباع ، الطبع .

**سلاجية** ١٣٩٠٨  
Hirudiniculture (F). Leech-breeding (E). هي فن تربية السلق وتكثيره .

**سلاج** ١٣٩١٠  
Vin de goutte هو ما يسيل من العنب قبل حصره .



سلاج كشش



سلاجي

## ١٣٩٢٤ - سَلْبُوتٌ خَمْلِيَّةٌ ، سَلْبُوتٌ خَمْلِيَّةٌ ، كَبُوسِيْن خَمْلِيَّةٌ

*Tropaeolum peltocophorum* (S). *Capucine* de Lobb, *C. velue* (F). Lobb *nazurdum* (E).

عشبة ليلية مدادة زياه تطول من ٣ الى ٥ امتار. اوراقها مجنبة، ضلعا مستطيل كالشبكة. ازهارها برتقالية اللون. بتلاتها السفلى ستة الحار او مهدبة || ازهارها يستمر نحو ٥ اسابيع ابتداء من اواخر تشرين .

## ١٣٩٢٥ - سَلْبُوتٌ رَشِيْقٌ ، سَلْبُوتٌ رَشِيْقَةٌ ، كَبُوسِيْن رَشِيْقَةٌ

*Tropaeolum speciosum* (S). *Capucine gracieuse* (F). عشبة ليلية مدادة تطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها خضراء التفصيص رقة تكون سداسية . فصلها خلى البشرة حل صفحة السفلى . ازهارها ارطوانية اللون . مسطلة الهاميز ، قليلة البتلات || ازهارها يستمر طوال الصيف والبريف .

## ١٣٩٢٦ - سَلْبُوتٌ صَغِيرٌ ، سَلْبُوتٌ صَغِيرَةٌ ، كَبُوسِيْن صَغِيرَةٌ

*Tropaeolum minus* (S). *Capucine minora*, *Petite capucine*, *C. naine* (F). عشبة ليلية متقلبة تمل من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مستديرة ، اضلاعها مسطلة . ازهارها صفراء اللون يملوا تبيح ويخرج امر || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

## ١٣٩٢٧ - سَلْبُوتٌ عُمْلِيَّةٌ ، سَلْبُوتٌ عُمْلِيَّةٌ ، كَبُوسِيْن عُمْلِيَّةٌ

*Tropaeolum tuberosum* (S). *Capucine tubéreuse* (F). عشبة ليلية مدادة وعارية تطول نحو ١٠٠ سم. جلورها صفولية غروطية او اعليجية الشكل . اوراقها خضراء التفصيص . فصلها مالى البشرة. ازهارها صغيرة البتلات المستديرة ، منها الى الصفرة . صالقاها مأكولة تستعمل استعمال البطاطا .

## ١٣٩٢٨ - سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ ، سَلْبُوتٌ كَبِيرَةٌ ، كَبُوسِيْن كَبِيرَةٌ ، أُوْعَمْتَجَرٌ ، طَرْطُورُ الْبَاشَا

*Tropaeolum majus* (S). *Capucine majore*, *Grande capucine*, *Cresson d'inde* (F). *Tall nasturtium*, *Tall Indian cress*, *Canary creeper* (E). *Kapuziner-Indische kresse* (D). *Astuzzia maggiore*, *Nasturzio maggiore* (I).

عشبة ليلية مدادة عارية تطول نحو ٣٠٠ سم. ساقها ليلية خضراء مائلة الى الاحمر . جلورها غليظة نجمة كثيرة الانشعاب . اوراقها مجنبة الشكل ، فصلها ناعم البشرة الالامسة ، بحري الخصار . ازهارها لريضة التجميع ، محورية الارتكاز ، مغلوقة البتلات ، عديدة الاوان لها الاخر والاربعاني والقرنبي والبرتقالي والاصفر || وهي حولية في المناطق المعتدلة ، مسرة في المناطق الحارة . ازهارها يستمر طوال السنة || ذروع الزرين وكثبات يفل . ازهارها حريقة العلم السحب . تجارها الفتية تستعمل استعمال الكبر في الفلحات . يقال ان ازهارها واورقها لا تخمر من التلخينات المقوية .

## ١٣٩٢٩ - سَلْبُوتَات ، سَلْبُوتَات (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات الفلقة مستقلات القناتلات .

اجناسها وانواعها عديدة جميعها عشبية او ليلية مدادة وعارية عادية الحلقاق .

١٣٩٣٠ - سَلْبُوتٌ عُمْلِيَّةٌ  
*Zorotypus*  
جنس حشرات ملطسة ، واثمة ، صفرة اللد ، تعيش في التربة . انواعها قليلة . ذكورها حامدة الحنط . اناتها مجنبة . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل . ارساها ثنائية القمل . اما جهازها التناسلي فبني .

## ١٣٩٣١ - سَلْبُوتَات (S).

*Zoraptera* (F). *Zoraptera* (E). رتبة حشرات تنتمي الى طبقة الدبابات . انواعها عديدة جميعها من الحشرات الملطسة ، الواثمة ، الصفرة اللد . اقلبيها البلاد الحارة . تعيش في القرباب . اناتها مجنبة قشيرة اللون البسيطة . ذكورها حامدة البين عادية الحنط . قرونها الاستشعارية قلابية . ارساها ثنائية القمل .

## ١٣٩٣٢ - سَلْبُوتٌ (S).

*Sceloporus* (F). *Scelopora* (F). جنس حيوانات زساعة من الطاء وعلية البيشنيات . انواعها المعروفة نحو ٢٥ جميعها من طاء امريكية الوسطى والشمالية || اجسامها صغيرة اللد ، قصيرة القروس الفطس ، غليظة البطن ، ربة القوائم الانشطة . اثلواها مختلفة الاوان يكثر لها الاخضر والاصفر وتغطط قناب اسيد او جروي || قنيتها الحشرات الصغيرة والديدان والذباب والحمام .

## ١٣٩٣٣ - سَلْبُوتٌ (S).

*Salpigo* (S). *Salpigo* (F). *Salpigo* (E). جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة عمديات الاجنحة . انواعها المعروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها صغيرة ، حديد ، تطول من ٤ الى ٧ م. رؤوسها شبه غروطية الشكل . صيتا بارزة . تكاثيرها ويلاصها نظامية . قرونها الاستشعارية صولجانية كواسلها مغلوقة الخمد ، خبيثة الخيصر الضصور . احمادها لاسعة . قناتها نقيشة . اثلواها وسيدة اللون باكشيتها . اولها السائلة القودي والاشبه والادس والصفاني الاسم || تألف البراري والمواقع التي تكثر فيها الازهار . جميعها واثمة او دامة .

## ١٣٩٣٥ - سَلْبُوتَات (S).

*Salpingidae* (S). *Salpingidae* (F). *Salpingidae* (E). فصيلة حشرات من عمديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة متصلة العدد منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها صغيرة ، اعليجية الشكل ، محدلة البسيط ، تطول من ٣ الى ١٠ م. رؤوسها غروطية الشكل . صيتا بارزة . تكاثيرها ويلاصها نظامية . قرونها الاستشعارية قلابية الشكل والحجم . احمادها لاسعة . قناتها نقيشة . ارساها خضراء حولية القمل باستثناء الزوج الحلقى الرباعي القمل . اثلواها ملوكة || جميعها واثمة او دامة تعيش على الازهار او على المواد النباتية المنحلة || اشهر اجناسها السليين والكثير .



سَلْبُوتٌ كَبِيرٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ



سَلْبُوتٌ

الازرق تحوي من ٢٢ الى ٣٥٪ من الزيت الاصفر الصناتي الشائع الاستعمال الصناعي . كسبه على محوي نحو ٥٪ من الزيت من الباتات السبروية المغطاة التي لا تتأثر كثيراً بالأقلام بشرط ان لا تحت فيه الرطوبة . يوجد في جميع الارربة العميقة الفور غير انه ينضج المأسكة المنسوجة .

### ١٣٩٤٨ - سَلْتَم حَلْطِي \*

Brassica napus sylvestris (S). Navette, Chou-colza (F). Nape, Naphew, Winter rape (E). Stackrübe, Kohlrübe (D). Navone, Cavalò navone (I).

نبات عشبي دهني على برقي وزراعي من فصيلة الصليبيات قريب الشبه من السلق الا انه اصفر قداً واخذ سامة . يزود اما لاستخراج دهن بزرو التي تحوي نحو ٢٣٪ من الزيت واما كملف القاشية يفيد الفروع ويهلط اللد .

### ١٣٩٤٩ - سَلْتَج

Pardreau (F). Young partridge (E). السليح والسلف والسلك : فرخ الحجل . ج سلحمان .

### ١٣٩٥٠ - سَلْتَج

Poulaitte هو حصص الدجاج من الائمة المصنوعة للشجبة الذنية بصدر الزيت . متوسط تركيبة الكيلاري :  
 ازوت ٢,٥٪  
 حامض فسفوري ١,٣٪  
 عناصر مختلفة ٩,٢٪

### ١٣٩٥١ - سَلْتَج

السلج : بهاء الباه في البذران وحيثا كان . يقال ماء البه ماء السلج وماء الكرك .

١٣٩٥٢ - سَلْحَفَة Tortue (F). Tortoise (E). السلحفاة كوكبية نجوم شمالية الموضع مشهورة باسم قنطرة ، اطلها .

### ١٣٩٥٣ - سَلْحَفَة

Testudo (S). Tortue (F). Tortoise (E). جنس سلاحف من فصيلة السلحفايات . انواعه ٤ منشقة في جميع البلاد الحارة . جميعها ارضية المسرح خاضلة طويلاً بأرواح من ٢٠ الى ١٠٠ سم . ذلها متوسط الاضطهاد أكبر الآن تملو قدر قليلة مربية الشكل او مستطيلة ، لوها الى السرة الزرقية || تألف المراهي والسويل . تقضي حياتها الشتوي الذي يدوم نحو ٤ اشهر في جسر قليل اللود تحفره في التربة .

### ١٣٩٥٤ - سَلْحَفَة الْبَرّ

Tortue terrestre rude (F). نوع من السلاحف مشهور باسم سلحفاة خشنة ، اطلها .

١٣٩٥٥ - سَلْحَفَة عَشِيَّة \* ، سَلْحَفَة الْبَرّ Testudo scabra (S). Tortue raboteuse, T. terrestre rude (F). Rough tortoise (E).

سلحفاة برية خاضلة من فصيلة السلحفايات . طولها كال تمجلا لا يتجاوز ٢٢ سم . بما فيه الذنب الذي يطول نحو ٤ سم . الاثنى اعرض من الطيل واقرصر منه . فارق اللول والبرص نحو ٢ سم . || ذلها يبعثي الشكلا تملو قدر قليلة المادة . ثوبا الى السرة الزرقية . واسكلا اسطواني الشكل ، افضس الخلف . تقدها أطع خادم الانسان . لسانها متوسط الطول ملسا . تحتها ذليلة التجماع عند الانكماش .

١٣٩٦٦ - سَلْت هو الشليم ، اطله .

### ١٣٩٦٧ - سَلْتَة

Panier, Corbette (F). Pannier, Basket, Hamper (E). سل صغير من القصب او القضبان الخفيفة يستعمل في نقل الكار وبعض الخضار وما اشبه .

### ١٣٩٦٨ - سَلْتَة

في الابدسارون الاسباني عشبة علفية مخففة تسمن عليها الايتار والافنام . انبواها مثمرة تجمرها للتلح .

١٣٩٦٩ - سَلْتَة زَوَاعِي في العرن ، اطله .

١٣٩٦٠ - سَلْتَة عَرَف الْبَلِك في عرن الكرم ، اطله .

١٣٩٦١ - سَلْتَج \* ، نَعْبَة Celcia (S). Celcie (F).

سلج ج سلايلج . جنس نباتات برية وتربلية من فصيلة الخنازريات . معقودة التصريف على اسم اليوناني المويدي اولات سلايوس (Olaf Celcius) || اوراتها مفرقة . ازهارها عصفوري التجميع . ازهارها صغيرة القند مختلفة الالوان المابقة || عرف انواعها الزراعية يتبع .

١٣٩٦٢ - سَلْتَج اِكْرِشِي Celcia cretica (S).

Celcie de Crète, Queue d'our de Crète (F). عشبة سبروية محولة مهدا جزيرة اكرت . ساقها تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها متعاقبة لاشعة || ازهارها وردية اللون كبيرة القند . ساقها واوراتها لزجة || ازهارها يستمر من سوزان الى ايلول .

### ١٣٩٦٣ - سَلْتَج عُرْصِي الْوَرْدِي

Celcia buguifolia (S). Celcie à feuilles de bugle (F). عشبة سبروية مسمرة مهدا راثية والساحل اليوناني . ساقها تملو نحو ٥٠ سم . اوراتها السفلى غسبة التجميع ، يضيئة الشكل ، مفرقة ، فصلها مائل البشرة مائل الخضار || ازهارها الى الصفرة السمراد يطولها تسليج ازرق وولج اسفع .

١٣٩٦٤ - سَلْتَج قُرْشِي Celcia glandulosa (S).

Celcie de Chypre (F). عشبة سبروية محولة مهدا قبرص ووسائل الاناذية . ساقها تملو من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراتها متعاقبة خلية وغبية الاتصال || ازهارها صغيرة القند صفراء اللون || ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

١٣٩٦٥ - سَلْتَجَان هو الخلقوم .

### ١٣٩٦٦ - سَلْتَجَة

Huitre (F). Oyster (E). صفة بحرية نيا شوي ، يؤكل . ج سليج . اطلب محار .

### ١٣٩٦٧ - سَلْتَمَج \*

Brassica campestris (S). Colza (F). Colza, Rape, Carcol-oil plant (E). Otraps, Kolza (D). Colza, Napo oleifera (I).

نبات عشبي زراعي من فصيلة الصليبيات . جذره وكثي . ساقه غرياه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراته متعاقبة مفرقة ملتفة ، اصلها خلي اللوق سنن الحافة ، بحري الخضار . ازهارها عصفوري التجميع . ازهارها صفيرة ، رباعية البتلات ، يضا اللون او صفراء . ثمار عرولية مستطيلة . بزود صفيرة دقيقة مستديرة لوها الى السواد



سلج



سلج



سلج حقل



سلحفاة عشيّة

توأمها قصيرة وفيلقة. اصابعها كبيرة الاظفار المخدبة ||  
تسرح في القفار وفي الجبل. قوتها الاشباب والمواد النباتية  
والحويبات والخراطين || تعيش نحو ٨٠ سنة وتحتفظ  
بقلتها التناسلية اكثر من ٧٥ سنة.

١٣٩٥٦ - **سَلَفُوتَاتٌ** (S). *Chersides, Testudinidae* (F). *Chersides, Testudinidae* (E).

فصيلة حيوانات زاحفة بيوضة من رتبة السلاحيات. مهددا  
بإلحاح. اجناسها وانواعها عديدة جميعها خائفة  
أرضية المسرح، عظمية اللقمة للمضغوة. ذيلها عذب  
الشكل تملو قتر قرنية لاقياسية الشكل والحجم. زعنفا  
سداسي الثفر يخرج منها الفراس والذنب والقوائم الاربع  
التي تنكشف وتختفي عند الاستراحة او الخوف، داخل  
اللقمة || أشهر اجناسها السلحفاة والشرسين.

١٣٩٥٧ - **سَلَفُوتَاتٌ** (S).  
جنس فلور مجهرية من صمارة الطحائيات ريفية  
الكتكتيات. يتنبت بشجيرة الخبي التجميع ويكتالده الحلية  
الاطراف || انواعه قليلة العدد والافى. اعرفها سلمية  
البار.

١٣٩٥٨ - **سَلَفُوتَاتٌ** (S). *Voluetella fructi* (S).  
فلور مجهرية يركب الباد التناسلية المضمومة اخصبها انتاج  
والاجسام والدرائن والسفرجل والفلو والشمش || مظهره  
الحاربي تدف على اسود اللون يملو البشرة المسطوية  
نفضها ويضرب الب ويغور فيه.

١٣٩٥٩ - **سَلَفُوتَاتٌ** (S). *Voluetella fructi* (S).  
سلخ الفلوات، عاد بعد الحنج واعصر.

١٣٩٦٠ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Mue (F). Moulding (E).*  
سلخ الحية: جلدتها التي تسليق ضبا. يقال: هذا ارق  
من سلخ الحية.

١٣٩٦١ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Incontinence (F). Incontinency (E).*  
عدم استعساك البول او الغائط.

١٣٩٦٢ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات.  
اوراقها عصفية الشكل، ثنائياتها وسيدة الصف. يزوها  
مقارفة دقيقة يملوها حرك ريشي || أشهر انواعها ما يلي.

١٣٩٦٣ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
هو السلفيل الثري، اطليه.

١٣٩٦٤ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
هو اللدبع الزراعي، بقلة مأكولة الاوراق والجذور.

١٣٩٦٥ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة المركبات.  
اوراقها عصفية الشكل، ثنائياتها وسيدة الصف. يزوها  
مقارفة دقيقة يملوها حرك ريشي || أشهر انواعها ما يلي.

١٣٩٦٦ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
هو السلفيل الثري، اطليه.

١٣٩٦٦ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة سولية تملو من ٢٠ الى ٨٠ سم. اوراقها مرطاة  
التصل. ثنائياتها ثنائي السنتات. ازهارها حرة، اللون.  
ازهارها يستمر من نيسان الى حزيران.

١٣٩٦٧ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة سولية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية  
الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرمص، بتفضية  
السنتات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٦٨ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة سولية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية  
الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرمص، بتفضية  
السنتات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٦٩ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة سولية تملو من ٤٠ الى ٨٠ سم. اوراقها بحرية  
الخضار الباهت. ازهارها صفراء القرمص، بتفضية  
السنتات. ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٣٩٧٠ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد مناطق حوض المتوسط.  
عشبة سولية او محوة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم.  
اوراقها خلية التصل، بحرية الخضار. ازهارها كبيرة اللثة  
لونها الى البنفسجي الباهت. لوراقها وجلورها مأكولة.  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

١٣٩٧١ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد المناطق الجبلية. عشبة  
معمرة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها  
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يدوم  
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧٢ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد المناطق الجبلية. عشبة  
معمرة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها  
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يدوم  
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧٣ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد المناطق الجبلية. عشبة  
معمرة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها  
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يدوم  
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.

١٣٩٧٤ - **سَلَفُوتَاتٌ** (F). *Salestia (F). Salestia (E).*  
نوع من السلفيل الثري. مهد المناطق الجبلية. عشبة  
معمرة تملو نحو ٥٠ سم. اوراقها بحرية الخضار. ازهارها  
وردية اللون يملوها موج ارجواني || ازهارها يدوم  
اسابيع ابتداء من اوائل ايار.



سلفيل المرج



سلفيل بري



سلفيل شرقي

١٣٩٨٧ - سلطة المصان \* - *Marasmius sacchari* (S).

نوع من السلعة يركب عيدان المصان يقيف على نموها بعد ان يعلق السلايمات السفلى، عند انتشاب ليابطها، عشيقه اليه الاصفر الذي يسبب احمرار وجفاف العنقه، ثم اصفرار الصف وذبوله || مظهره الخارجي فطر ابيض اللون، يحمل الجسم، اوسمه جرسية الشكل قطرها نحو ١٥ م. يعيش على العيدان المقطوعة. نمته كثيفة الغشور تقسم من ٥ الى ٢٠ || يكافح بانتزاع الاقدام والطراريج للميوعة وبالاكثر من الاسمدة الازوتية التي تنشط النمو اليه والخضري.

١٣٩٨٨ - سلطة الموز \* - *Marasmius seminatius* (S).

نوع من السلعة يركب اريمة الموز ويظهر فيطليا ويقيف على الاوراق || مظهره الخارجي فطر صغير اللد، ساقه اسطوانية تحمله بيضاء اللون. اوسمه صابنية، ظهرها نحو ١٠ م. ثوبها متراكب الاولان، ظاهره البياض والصفرة والخمرة || يكافح في اول هذه بانتزاع الاقدام الميوعة وينفخ الازوتية باحد المركبات النحاسية المحلولة ٢.٤ ٪ يضاف اليها ١.٥ ٪ من الكلس || وبما ان هذا الفطر لا يقرب الا التباينات الضعيفة في المراتق الرطبة. لذلك يحسن اجتناب الاسكان الرطبة واستعمال الاسمدة للمطوية انحصار الازوتية التي تنشط الالياف والمواد الخضرية.

١٣٩٨٩ - سلطة حبيكة \* - *Marasmius perniciosis* (S). *Balai de sorcière du caçoyer* (F).

نوع من السلعة واسع الانتشار يكثر في البلاد الحارة. يركب بعض النباتات انحصار الكاكاو فيجيش الانسان والتموسي. ولده يصيب الثمار فيطرحها || مظهره الخارجي فطر صغير القد. ساقه اسطوانية تحمله جوياء طويلا نحو ١٠ م. لونها الى الصفرة الزاهية. اوسمه قلمسوة قطرها من ٢٠ الى ٢٥ م. لونها الى الجوة || يكافح بالتصاع وحرق الاجزاء الميوعة وينفخ الاجزاء بسائل يورده بعد طلي الجروح بالمستحلب البالي.

## ١٣٩٩٠ - سلطة

سلف البقرة وقشاة : خرج نابها وهي سالخ. والسلموخ في ذوات الاطفال بمنزلة البزبل في ذوات الاصفاف لانها اقص استلها. قوله البقرة اول سنة حبل ثم تبع ثم جلع ثم ثي ثم رباح ثم علبس ثم سالخ سنة وسالغ سنتين الى ما زاد. وقشاة اول سنة حلق ثم جلع ثم ثي ثم رباح ثم علبس ثم سالخ. ج. ع. س.

١٣٩٩١ - سلطة - *Alexan* (F). *Chestnut* (E).

من الثوب او ألوان الخيل وهو الذي غلخت شرقته.

١٣٩٩٢ - سلطة - *Pardreu* (F).

سلف صغير الحجل ان كان ذكرا اما الانثى قسلة.

١٣٩٩٣ - سلطة، مستغف، كرتب، كرتاب - *Young partridge* (E).

سلف صغير الحجل ان كان ذكرا اما الانثى قسلة.

١٣٩٩٤ - سلطة، كورتات - *Scarflage*

حرث سطحي بالسلفة تتبشر به ذرات الثوب ولا تقبل.

١٣٩٩٥ - سلطة، كورتات - *Sulfate* (F).

اسم شامل يطلق على مختلف املاح الحامض الكبريتي

## ١٣٩٩٦ - سلطة التقدير

*Pouvoir discrétionnaire* (F). *Discretionary power* (E). هي السلطة التي لم يبين مسلكها بقائمة قانونية تسيير عليها.

## ١٣٩٩٧ - سلطة القضاء

*Autorité de Justice, Judicature* (F). *Authority of Justice, Judicature* (E).

هي السلطة المنوطة لقضاة بان يقضوا بين الناس فيما يتعلق بالنفس والمال.

## ١٣٩٩٨ - سلطة قضائية

*Pouvoir judiciaire* (F). *Judiciary power* (E). هي التي استندت اليها ولاية القضاء.

## ١٣٩٩٩ - سلطان \* ، سلطان

*Crabe* (F). *Crab* (E).

السلطان والسلطان والسميران والسمير اسماء شاملة تطلق على عدة حيوانات مائية أو قارضة من القشريات المشاريات الاصل.

## ١٣٩٨٠ - سلطان الصخر

*Pouperet* (F).

حيوان من القشريات يدهي بوزار، اعطيه.

## ١٣٩٨١ - سلطان نهري

هو سرطان النهري

## ١٣٩٨٢ - سلخ \* ، حلق

*Cissus* (S).

*Cissu* (F). *Sorrel-vine, Wild grape* (E). *Cissus-planta* (D). *Cisso* (I).

جنس نباتات معمرة حرة حارشة من فصيلة الكرديات. انواعه عديدة منها خلية الساق كبيرة الحجم تمتد نحو سبعة أمتار. ومنها متوسطة وصغيرة كسائر المتبرعات. يستخرج من جلوعها عند حرها عصارة مشروبة نافعة تروي الغليل || اورانها بيضا او ليلية الشكل. نصلها قليل القرب جميل اخضر الشاحب، من الحافة. حولها خلية القرب محببة الاطراف. انزلها صغيرة خضراء اللون. ثمارها عنبية صغيرة القد || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

## ١٣٩٨٣ - سلخ مربع

*Cissu quadrangulais* (S).

*Cissu quadrangulais* (F). *Riz du singe* (E). *Edible stamed vine* (E). *Wildweinebaum* (D). *Vite cissu* (I).

نوع من السلخ المتداد الارض السماع. هذه البلاد الحارة. يطول من ٥ الى ١٠ امتار. سلخ زباد. اورانها معتقة مربعية الشكل، نصلها خلي البشرة اقرب الزناد والصلح والبروق || تسنها غزير المادة من العلم يروي النش.

## ١٣٩٨٤ - سلطة

هي السلطة، اعطيه.

## ١٣٩٨٥ - سلطة، عفدة دركية، عفدة

*Scrofule* (F). *Scrofula* (E).

علة مدلية للمظهر الخارجي سببا اعطال في التوازن الثلاثي وانسياع في الجسم يوجب لاقبال مختلف الجراثيم.

## ١٣٩٨٦ - سلطة

*Marasmius*

جنس فطور مؤذية من الفاريفقيات. انواعه عديدة تركب نباتات المناطق الحارة انحصار الحربية وبعض النباتات المروية منها الموز والصلح || اشيع انواعه واضرها ما يقع.



سلطان



سلخ



سلطة المصان



بالخامس الكبريتي . تركيزه التجاري الموصوف بحوي  
٤٠ أو ٥٠ ٪ من التيتانيوم الصف ٥ ٪ يستعمل  
في مكانة الخشبات علولا بالله بمثل يروح من ٥٠  
ال ٢ ٪

١٤٠٠٢ - سلفات (F). Emprunt (F). Borrowing (E).  
السلف والاشتات هو القرض .

١٤٠٠٣ - سلفات (F). Sulfatage (F).  
في المعالجة بالسلفات .

١٤٠٠٤ - سلفات (F). Sulfatage (F).  
معالجة الخمر بالسلفات اي بالخامس الكبريتي .

١٤٠٠٥ - سلفات (F). Sulfatage (F).  
في المعالجة بالسلفات وقد تحقن الآبار الزراعية بسلفور  
الكبريت لقتل الحشرات الجارية والخشبات .

١٤٠٠٦ - سلفور الكربون ، كبريت الكربون  
(F). Sulfure de carbone (F). Sulphid of carbon (E).  
سائل طيار حريف لا لون له يحترق قتال الجراثيم  
والخشبات .

١٤٠٠٧ - سلفوسيانور (F). Sulfocyanure (F).  
Sulphocyanate, Sulphocyanide (E).  
مادة جرسانية قوية في حريف الأمونيوم تقضي على  
الاعشاب والخشبات .

١٤٠٠٨ - سلفونترات الأمونيوم  
(F). Sulfonitrate d'ammoniaque

سماد كيماوي أزرق يحوي ٢٦ ٪ من الآزوت نسباً  
١٩٥ ٪ من الآزوت أمونياكي بلي . الأعطال و ٦٥ ٪ من الآزوت  
تتريكي سريع الانفعال والتشليل .

١٤٠٠٩ - سلفيت (F). Sulfite (E).  
ملح مركب من حمض الكبريت وبلادة أخرى .

١٤٠١٠ - سلفيديات (F). Sulfidates (F).  
راجع دقيقات .

١٤٠١١ - سلق (S). Beta vulgaris (S).  
Poirée, Bette, Bietta (F). Swiss-chard beet (E).  
Beetkohl, Bette, Gartenmangold (D). Bietra,  
Bietcola, Costa (I).

نبات حشيشي بقلي زراعي من فصيلة البسقيات . قريب  
للشبه من الشبتان . جلوه ويدي ليني أو راتة قرصية  
التجميع ، كبيرة القدة مستطيلة ، نضجها خليط النضج ،  
مالس البصرة ، شديد الخضار ٥ يتكاثر بالبذر .  
انتاش يزود به بمشرة أيام وقائية الانتاش تنمو نحو  
٦ سنتوات ٥ يوجد في جميع المواقع ويربغ في الآرية  
الدهالية للثنية بالنصر الآزوي .

١٤٠١٢ - سلق الماء هو جبار النهر ، اطليه .

١٤٠١٣ - سلق بيري هو حشيش الناقع ، اطليه .

الثانية من تألفه مع بعض المادتين اخصها الحديد والنحاس  
والكلسيوم واليوتاسيوم والصوديوم اللع .

### ١٣٩٩٥ - سلفات الأمونيوم

Sulfate d'ammoniac (F). Sulphate of ammoniac (E).  
سماد كيماوي أزرق ايض اللون ، دقيق البزفة ، يحوي  
نحو ٢٥ ٪ من الآزوت الأمونياكي البلي . الأعطال  
بسبب تربيته وما يتخللها من تحاميل وانفصالات موضعية  
تسببها ظروف التربة ورائها وسائلا الحكمة ٥ وهو  
من أشهر الأسمدة الآزوتية ولقدها استعمالاً ، يصنع  
ميدانياً ، لكافة النباتات وجميع الآرية التي لا تقتر  
الى الكلس اخصها الحمرية التي يروح دافها بين الدرجة  
السابعة والثامنة (راجع دائف) ٥ يحسن استعماله باكراً  
قبل حاجة النبات الى خمسة أو ستة أسابيع وذلك ليتسكن  
من اجتياز شئ التحاميل والاختلالات الالوية لتتربيته  
وتأهب تمثيله ٥ ويجرد أيضاً طوره في الآرية بعد ذره  
لئلا تسرب به الأمطار أو تجرد مياه الري .

١٣٩٩٦ - سلفات البوتاس (F). Sulfate de potasse (F).  
Sulphate of potash (E).

سماد كيماوي يستعمل من كلوريد البوتاس بعد معالجته  
بالخامس الكبريتي ٥ وهو مسحوق ناعم أصفر اللون  
أو أبيض يبري من ٤٦ ال ٥٢ ٪ من البوتاس الحريف  
مع ٢٥ ٪ من كلوريد البوتاس ٥ وهو سريع اللزبان  
بالماء وسريع الانفعال والتشليل يصلح لجميع الآرية  
اخصها الثقيرة بالكلس (راجع بوتاس) .

١٣٩٩٧ - سلفات الحديد ، كبريتات الحديد ،  
زجاج أخضر

Sulfate de fer, S. ferreux, Vitriol vert, Couperose  
verte (F). Sulphate of Iron, Green vitriol (E).

ملح متبلور أخضر اللون طعم الحاميل يلوي في الماء  
الساخن . يستعمل في التطهير وفي مكانة بعض الأمراض  
الفطرية اخصها اللثار والفوسن والبقان ٥ ويستعمل  
أيضاً كمضاف يقضي على الكبدان والحشيشان والفا .

١٣٩٩٨ - سلفات الصودا ، كبريتات الصوديوم  
(F). Sulfate de sodium, S. de soude (F). Sulphate of so-  
dium, S. of soda (E).

ملح أبيض اللون متبلور من اللزاق طالع الاستعمال  
البطري يصلح المنة جرحه تختلف باختلاف الحيوان .

١٣٩٩٩ - سلفات الكلسيوم ، كبريتات الكلس  
هو الجبس ، اطليه .

١٤٠٠٠ - سلفات النحاس ، كبريتات  
النحاس ، زجاج الأزرق

Sulfate de cuivre, Vitriol bleu, Couperose bleue (F).  
Copper sulphate, Blue vitriol (E).

ملح متبلور أزرق اللون ، حريف الطعم اللطيف  
يلوي في الماء . تقلله حشيشي بمشر ورقة اللزفيل  
الزرقاء . يستعمل في مكانة معظم الأمراض الفطرية  
وفي وقاية الاعمدة والمساند والمساكن من حيث الحشرات  
وقوضها .

١٤٠٠١ - سلفات النيكوتين  
(F). Sulfate de nicotine (E).

سائل قلوي سام يستخرج من ثمن التبغ بعد معالجته



سلق

١٤٠١٤ - سَلَق مُضَلَّع \* ، سَلَقِيَّة ، لَبْدَان

Beta cicla, B. vulgaris foliosa (S). Beta à cardes, Beta-épinard (F). Leaf-beet, Egyptian chard beet (E). Agyptischer beta, Ag. gartenmangold (D). Bietola foglia (I).  
ضرب من السلق البقل الزراعي يتميز بكبر أوراقه وفلاحة ضلوعها وصماكة نصلها المائل البشرة الشفيرة الخضراء || يوجد في جميع الأودية البادية المحيطة بالأنماج الدنية بالمصر الأزرق .



سلق مضلع

١٤٠١٥ - سَلَكَان

هو الثوب والأذن سلقه . ج سلق .

١٤٠١٦ - سَلَقِيَّة

هي السلق المضلع ، اطلبه .

١٤٠١٧ - سَلَكْ

فرخ الحجل الذكر ، ولأذن سلكة .



١٤٠١٨ - سَلَك حَدِيدِي

Fil de fer (F). Iron wire (E).  
الاسلاك الحديدية أنواع منها لملاء تستعمل في تسليد الشجر وغيرها ونها شاككة تستعمل في إقامة الحواجز متما من الصدي .

١٤٠١٩ - سَلَكَان ، دَمَجَانَة الْحَرَجَان

Bonasa (S). Gélinocte (F). Hazelhen, Hazelgrouse (E). Hazelwild (D).

جنس طير من عمارة الضرسيات. وصفية الطيوريات موطنه يمتد من شمال البلاد الآسيوية إلى أرويه ونيبال أفريقية الشمالية . يتميز بفقرات الصغيرة وبصر مقادير. ثوبه إلى الخمرية لونه زرقه صباه وبياض وطلاء وسواد . طوله يراوح من ٣٥ إلى ٤٥ سم. الأذن أصفر كذا من الذكر . قوة البرام والجوب والجار من اختلاف أنواعها . يعيش ذكراً وأنثى . يمتد في الأرض يرقب الفصوص بين الأدغال البنية أو بين الخشار وفي تخاليف الصخور. أثناء تقسم من ٨ إلى ١٢ بيضة تحضنها وبعدها || له نومان السلكان الشائع وسلكان للشرق .

سلكان شائع



سلكوت اريواني



سلكوت بتي



سلكوت حقل



سلكوت مذهب

١٤٠٢٠ - سَلَكَان لَشَرَقِي

Bonasa severtzowi (S). Gélinocte d'Orient, G. des steppes (F).  
طائر من السلكان طوله نحو ٣٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والرقعة . موطنه شمال البلاد الآسيوية . يألف الأراج والادغال .

١٤٠٢١ - سَلَكَان شَائِع

Bonasa sylvestris, B. betulina (S). Gélinocte des bois, Poule des bois, P. des coedriers (F).

طائر من السلكان طوله نحو ٤٥ سم. ثوبه متراكب الألوان والرقعة . موطنه يمتد من شمال البلاد الآسيوية ونيبال أفريقية الشمالية . يألف الأراج الكثيفة الظليلة .

١٤٠٢٢ - سَلَكُوت

Carabus (S). Carabe (F). Carabus, Carabid (E).

جنس حشرات دجوية مقترنة نافعة من فصيلة السلكوتيات. أنواعه عديدة منتشرة في جميع الأقاليم الحارة والمعتدلة . اجسامها كبيرة القد . أنوثها عابقة الألوان السوية . من ميزاتها الخاصة أنها إذا ذهرت من شه قلقت من شربها يسائل لأصبع يكثر فيه الحامض السي . رقاتها مقترنة . اجسامها مبطنة تستنق عند اطرافها || أشهر أنواعها ما يلي .

١٤٠٢٣ - سَلَكُوت أَرْجَوَانِي \*

Carabus violaceus (S). Carabe pourpre (F).  
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى السواد اللامع . ظوهرها أسفع المواج . جانبها إلى أنضار الازرقاني . تألف الجنائن وأخلاق والأحراج . مسرحها المويحي يستمر من أواخر الصيف إلى أواسط الشتاء . تقترس جميع أنواع البرقات الصغرة والحزرون والبراق .

١٤٠٢٤ - سَلَكُوت بَهِي \*

Carabus splendens (S). Carabe resplendissant (F).  
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى الصفرة اللحية يعلو مواج أخضر . مسرحها يستمر طوال الصيف والخريف . تألف الجنائن والأحراج تكثر في الأقاليم الجبلية . تقترس الحزرون والسبازق وتختلف الحشرات الدجوية .

١٤٠٢٥ - سَلَكُوت حَقَلِي \*

Carabus arvensis (S). Carabe des champs (F).  
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ١٢ إلى ١٨ م. ثوبها إلى الزرقه العابقة يعلو مواج أسفع . مسرحها المويحي يستمر طوال الخريف والشتاء . تألف الحزرون . تقترس مختلف أنواع البرقات .

١٤٠٢٦ - سَلَكُوت مَدَّ هَب \*

Carabus auratus (S). Carabe doré, Jardiniers, Sergeant, Vinaigrier (F).  
حشرة من السلكوت طويلاً يراوح من ٢٥ إلى ٣٥ م. ثوبها إلى أنضار المذهب يعلو مواج زرجدي ساطع . زبائنها وأرجلها صافية اللون . تألف الحزرون وأخلاق والبساتين . مسرحها يستمر من أوائل الربيع إلى أواسط الخريف . تقترس الحزرون والبراق ويمتد الحشرات الدجوية والجليل .

١٤٠٢٧ - سَلَكُوتِيَّات \*

Carabidae (S). Carabidae (F). Carabidae, Ground beetles (E). Laufkäfer (D).

فصيلة حشرات من رتبة عُمَدَات الإيجنة . اجسامها وأنواعها كثيرة العدد . معظمها كبير القد . أثوابها سوية الألوان العابقة اللامعة . تألفها قوية . ثوبها الاستثنائية خفيفة . أرجلها طويلة . أرساغها خماسية البقل || تسرح في الليل وتبيل في النهار تحت الأجساد والأشجار . جميعها من الحشرات النافعة ، تقترس الفصارة اجسامها الحزرون والبراق والفسقيات .

١٤٠٢٨ - سَلَكِيَّات \*

Nematoda (S). Nématodes (F). Nématodes (E).  
طبقة الديدان السلكية من شعبة المحيطيات تشمل العديد من الفصائل والأجناس والأنواع منها الصفر والمذاب وغيرهما .

١٤٠٢٩ - سَلَم

السلم مجموعة كواكب متعاقبة أسفل من المانة من بينها .

١٤٠٣٠ - سَلَم \* ، نَبَاح

Scalaria (S). Scalaria (F). Scalaria (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات سدديات الأبريل وصفية السليبات . أنواعه المعروفة نحو ١٥٠ منتشرة في

جميع بحار العالم . جميعها مقترنة قوتياً بالرخويات والكرويات الصغيرة || أجسامها متباينة الحجم ، يكثر فيها المسفر . أصدافها سلبية ، لامعة ، مردنية ، محزونة ومعددة ، تحمدها يبلو كالقوى المستعير .

١٤٠٣١ - سلم ، سلم *Acacia flava* (S). *Mimosa blond*, *Acacia blond* (F).

نوع من السطوط وهو شجرة من الغطاء ميمرة الشوك الحاد . تكثر في البادية . ورقها يمس القتر ويصلح للنباعة . الواحدة سلمة .

١٤٠٣٢ - سلم التفرجة ، عكس التفرجة

*Dénitrification*  
تحول يحصل في الاربة الرملية بتأثير ميكروبات خاصة تحول النتريتات الى نيتريت فامونيك فازوت . وهو بذلك يكون عكس التفرجة وفيه ضرر كبير لان النتريتات اسهل والقرب تمثيلاً وامصاصاً من النيتريت .

١٤٠٣٣ - سلمون ، سلمون ، سلمك سلمكان *Salmo* (S). *Saumon* (F). *Salmon* (E).

جنس اسماك بحرية - نهريّة مقترنة لاحة من فصيلة السلمونيات . انواعه نحو ٥٠ جميعها كبيرة القند تليح كامل نمواً بمرر ست سنوات حيث يراوح طولها ، بالنسبة الى انواعها ، من ٥٠ الى ٢٠٠ سم || والسلمون من الاسماك التي تعيش وتتكاثر في انحاء المياه وقد تعيش في المياه المالحة دون ان تتكاثر لانها لا تسر في البحر . اما الايدى في المياه العذبة فتكون صغيرة القند متوسطة الحجم . وهي يحاط بها الطبيعية ترسل الى المياه العذبة في التشارون وتسراً في الكواكين ثم تعود الى البحر بعد لقف سرتها وذلك في اواخر شباط . اما صغبرها فيقيم في الله الملب ردياً يبلغ الحولين فيسيل اذ ذاك الى البحر ويبيض عيشه جنبه ومعادته الفطرية في التجول والتمسرة || اشهر انواعه ما يتبع .

١٤٠٣٤ - سلمون البحريرات *Salmo lacustris* (S). *Saumon des lacs* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللحم . يعيش في المياه العذبة . يبلغ كامل نموه بمرر ٥ سنوات . طول يراوح من ٧٠ الى ١٠٠ سم .

١٤٠٣٥ - سلمون الفنايع *Salmo fontinalis* (S). *Saumon de fontaine* (F).

نوع من السلمون الايد المتوسط الصنف واللحم . يعيش في مياه الفنايع العذبة الباردة . طول يراوح من ٥٠ الى ٨٠ سم . يبلغ كامل نموه بمرر خمس سنوات .

١٤٠٣٦ - سلمون صلا ، سلمون مبدول ، سلمون مبروف *Salmo salar* (S).

*Salmon commun* (F). *Common salmon* (E).  
نوع من السلمون الرجل الكبير القند طول ، عند اكمال نموه ، يراوح من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . قوته متراكب الاولان . ظهوره اردوازي ويملو موج ازررق . جانبها الى الزبدية اللصية . يسلط الى الحمره || اثناء تسراً بظرف ثمانية ايام من ٢٠ الى ٢٦ لقف سرته تنقف بعد اربعة اسابيع ثم تنحور وتنقل ويبلغ كامل نموه النقص بمرر ست سنوات .

١٤٠٣٧ - سلمون كليفوريه ، سلمون كينات *Salmo quinnat* (S). *Saumon de California*, *Quinnat* (F).  
نوع من السلمون الرجل الجيد الصنف يرغب في مياه المناطق الباردة . طول يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . قوته متراكب الاولان تقف في ظهور اثره وتنقف في بطن الحمره .

١٤٠٣٨ - سلمونيات *Salmonidae* (S). *Salmonidae* (F). *Salmonidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مقترحات المائات فيها السلمون والدرنة والحدل الخ .

١٤٠٣٩ - سلمى *Stellaria* (S). *Stellaira* (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية وبحولة وبعمرة من فصيلة القرنفليات . انواعها الحمرية عديدة اصنافها مطر اقالم البلاد المعتدلة الحارة || سقمها خلية الحاد ، فروعها اوراقها لانظامية الازتكاز ، منها المتصلة والمضغلة ، ومنها المعتدلة واللاخلة والقلبية المتصلب والسانية والرحية . ازهارها فردية او حثكوية التجميع . اشهر انواعها :

سلمى وسطى ، حشفة القززال *S. Media* (S).

سلمى زهاب ، حشفة القززال المرطبة *S. pubescens* (S).

١٤٠٤٠ - سلميات *Scalaritides* (S). *Scalaritides* (F). *Scalaritides* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مبديات الاويل اماميات المتحركة . اجناسها وانواعها للمعرفة قليلة العدد مقترنة في جميع بحار العالم . جميعها مقترنة . ملجتها الحماطي ، جماعي ، جماعاتها قليلة العدد || اصدافها متباينة الاجسام ، محزونة ، يكثر فيها الشكل المزدني || اعرف اجناسها السلم .

١٤٠٤١ - سلونوغرافية *Sclénographie* (F). *Selenography* (E).

وصف القمر ورمه  
١٤٠٤٢ - سلوب *Longiligne* (F). *Longiline* (E).

نعت تعريفي يوصف به الطول في الحيوانات الداجنة .

١٤٠٤٣ - سلوت *Scalotus* (S). *Scalote* (F). *Scalotus* (E).

جنس حيوانات زحافة من الغطاء وفصيلة السقنورويات . انواعها المعروفة عديدة . اصنافها غسقة تمتد من الفريضة الاستوائية الى الشرقية ويحضر مدفكر || اجسامها صغيرة ، دقيقة ، حادة الاعتناق ، رؤوسها قصيرة . قوائمها شديدة الصلابة بين الاوتار من لا قوائم له . انواعها سوية الاولان يكثر فيها الكتني الاسمر الاسف || قوتها اللباب واغلام ولديان .

١٤٠٤٤ - سلور *Charas* (F). *Silurus*, *Shedfish* (E).  
جنس اسماك نهريّة من فصيلة السلورويات . انواعه نحو ٢٠ معظمها من اسماك مياه البلاد الحارة . جميعها مخلطحة الرأس ، مستطيلة الشكل ، حادة الحراشف || اشهر انواعه سلور الماسي والبربور والبر والياش والشلبة والقرموط .

سلم

سلمون صلا

سلوت

سلور

السرة تنقل على مكن الحرشيات ويدأها أعصها دودة ورق القطن والنبوة للقارضة .

#### ١٤٠٥٥ - سكونة الطلياريات \*

*Inostemma boeldi* (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجسم ، مستطيلة الأفراس . طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن الطلياريات وتقتني عليه .

#### ١٤٠٥٦ - سكونة القمامية \*

*Microphanurus semistriatus* (S).

حشرة صغيرة من السلويات غليظة الجثة القصيرة طولها يراوح من ١ الى ٢ م . تنقل على مكن جميع انواع القمامية .

#### ١٤٠٥٧ - سكونيات \*

*Scallionidae* (S). *Scallionidae* (F).

فصيلة حشرات نائمة من رتبة فشاتيات الاجنحة المنصورة . اجنحتها وانواعها عديدة جميعها صغيرة القد ، غليظة الرأس والبطن ، الزوايا الى السرة العادة الموج || تنقل هي ورفقاتها على مكن الثناكب وحشرشات الاجنحة ويمل بعض الديدان واليرقات .

#### ١٤٠٥٨ - سكونى هي الصرد نوع من البتلون ، اطلها .

*Amnion, Poche d'eau* (F).

*Amnion, Bag of water* (E).

السل الكيس الذي يكثر فيه الولد حين يخرج من الرحم ، وهو الغشاء الورقي الداخلي الذي يلف المجرى الجنين .

*Lyra* (F). *Lyra* (E).

#### ١٤٠٦٠ - سيلاتي

السيلاك كوكبة نجوم شمالية الخيعة مشهورة باسم قيثارة ، اطلها .

*Gymnantha* (F).

#### ١٤٠٦١ - سكيب \*

نمت تعريفي يطلق على كل نبات زهرته تتكون من الاضاء التناسلية دون سواها ، اي دون فصل وبيلات ...

*Romeria* (S).

#### ١٤٠٦٢ - سكيح ، رميركة

*Rosmaria* (F). *Rosmaria* (E).

جنس نباتات شبيهة حولية بزية من فصيلة اشغاشيات . انواعها المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || سقها فزاه ترتفع من ٢٥ الى ٤٥ م . اوراقها مثقلات ، مركبة ، ريشية التفريش . ازهارها طرفية ، فردية ، متفردة الحجم او كثيفة ، قززية اللون او بنفسجية . الثمرها ...

*R. orientalis* (S).

#### السلح الشرقي

*R. hydrida* (S).

#### السلح القلبي

#### ١٤٠٦٣ - سكينخة هي القرقة السيلية . اطلها .

*Huile de noix de muscade* (F).

*Oil of nutmeg tree* (E).

دعن جوز اللب .

*Scyllidae* (S).

#### ١٤٠٦٥ - سيلديات \*

*Scyllidae* (F). *Scyllidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من السلفنقيات القرشيات . اجنحتها وانواعها المعروفة قليلة العدد مشتركة في معظم بحار العالم

*Clariss oronthe* (S).

#### ١٤٠٤٥ - سلور العامي

*Clariss de l'Oronthe* (F).

ويسمى السك الاسود . نوع من السلور يكثر في العامي . طولها نحو ٥٠ سم . ثوبه الى السرة الخضراء . لحمه عادي الصنف ، يذلل اللذان .

*Silure commun* (F).

#### ١٤٠٤٦ - سلور الفرات

*Common silurus* (E).

هو الجري ، اطلها .

*Clariss du Nil*

#### ١٤٠٤٧ - سلور النيل

هو القرموط نوع من السلور يكثر في النيل .

#### ١٤٠٤٨ - سلور جتيس \*

*Silondie du Gange* (F).

سمكة ثورية من مفتوحات الخانة وفصيلة السلويات . اصلاها نهر الجنس اي الفنج || جسمها اطلبي الشكل ، كبير القد ، متدل التبط ، طولها نحو ٢٠٠ سم . راسها صغير الحجم ، غريبي الشكل . عظمها كبير القصد . منهاها كيرتان ، ماصتان . زعنفتها الظهرية الاولى متدلة الخيم اما الثانية فتشده السمر . وزعنفتها الثانية لينة . ثوبها الى الوردية السمر الغضبية الموج || لحمها كامن الصنف ، مأكول .

*Siluridae* (S).

#### ١٤٠٤٩ - سلوريات

*Siluridae* (F). *Siluridae, Catfishes* (E).

فصيلة الجري والسلور وهي من الاسماك العذبة الحراشف .

#### ١٤٠٥٠ - سطورس ، ناطق ، نطس

*Nepenthes* (S). *Népenthe, Népenthes* (F). *Nepenthes, Pitcher plant* (E). *Kannenstrauch* (D). *Nepente*

*Planta da broche* (I).

جنس نباتات ممرية من فصيلة السلويات . انواعها نحو ٣٠ منها البلاد الحارة . جميعها عارضة بزية وريشية . اوراقها متضاربة سانية التصل المستطيل الذي ينتهي بمائل يطول قدره ثم يتحول ويصور عند طوله يصبح كالجراب الجاسي يطول غطاء يلفق ويقتنص عند الانتفاخ يمتنع فيه رحيق سكري حامز لرج تفرزه غد غاصة لا يجذب الحشرات فلذا ما دخلت الحشرة لا تفرق الرحيق ازلفت في السائل وانطق عليها النطاء تفرق وتتمل وتصل الى غطاء يمتصه النبات || ازهارها سليل او حثول التجميع . كذاها صغيرة القد ، ثنائية المسكن || يقال ان منافعها الطبية عديدة .

*Nepenthesaceae* (S).

#### ١٤٠٥١ - سطورسيات

*Nepenthacées* (F). *Nepenthacées* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل جنس السلور دون سواه .

*La Lévyrie, Chiens de*

#### ١٤٠٥٢ - سطوريان

*chasse* (F). *Canes Venatici* (E).

السطريان كوكبة نجوم شمالية الملق مركها بالقرب من الدب الاكبر . نجمها عديدة ابزها من المرتبة الثالثة . هي تشتمل على سدين لوليين قريبا الشبه بكلي سيد .

#### ١٤٠٥٣ - سطور

هو سلويات القليل يستعمل طهراً للاسءاء .

#### ١٤٠٥٤ - سكونة الحشرقيات \*

*Telenomus bombycis* (S).

حشرة صغيرة من السلويات طولها مليمتر واحد لها الى



سلور جتيس



سلور



سلوة الحرشيات



سلوة الطلياريات



سلوة القمامية





المسكن || اوراقه وزوايه وصارفة سقة تستعمل في عدة صناعات كالدهانة والصبانة والبلاد || اعرف واشهر انواعه ما يتبع .

### ١٤١١٧ - سَمَادُ الدَّبَاغِين \* ، تَمَتَم

Rhus cortaria (S). Sumac des corroyeurs, Roure des corroyeurs, Corroyère, Vinaigrier (F). Sumach, Tanner's sumach (E). Esstgbaum, Gerbersumach (D). Seimmaco, Scottano romano (I).

هو الساق المعروف للميلول في البلاد اللبنانية السورية . فبجيرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . فروعها زاهية البعد اوراقها مركبة تد من ١ الى ١٥ ورقة نصلها باحت الخضار خلي الصفة السفل . ازهارها عثكولي كفيف التجميع يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . ازهارها خضراء اللون . ثمارها بلسنية الشكل ، جردية اللون ، خلية البشرة . يزورها شديدة الصلابة معقولة || اوراقها دباغية . سوق ثماره من التوابل الحامضة المانصة للشهورة .

### ١٤١١٣ - سَمَادُ الصَّبَاغِين ، عَرَبَرَب

Rhus cotinus (S). Sumac des teinturiers, Fustet, Arbres à perruque (F). Smoke tree, Wig tree, Venetian sumache (E). Echter perückenstrauch, Perückenstrauch (D). Sommacco à parrucca, Scutano, Rubione (I) .

بجيرة عابلة تملو من ٧٠٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة . ورقاتها سنائية ذلقة . نصلها حايق الخضار ، خلي الصفة السفل . ازهارها تاجي الازنكان هربي الشكل . اوراقها دباغية وصباغية ، غصبا اصفر اللون .

### ١٤١١٤ - سَمَادُ الطَلَاء \* ، عَتَرَب

Rhus vernix (S). Sumac vernis, Bois chendelle (F). Lac sumach (E). Lackbaum, Firnisumach (D). Sommacco d'India (I).

شجرة عابلة تملو نحو ٦ امتار . ساقها مائلة البعد . اوراقها مركبة تد من ٥ الى ٢١ ورقة نصلها سنن الزام الاعبر ينمو حايق الخضار اللامع ثم ينصرف الى الجلود . ويتنفي في اوائل الخريف باحمر البرتقالية || ازهارها ابطي . ازهارها صفراء اللون ، خلية البشرة . ثمارها بلسنية تطرها نحو ٤ سم . يزورها مفضلة . ثمارها واوراقها وصارفة قلبية للمادة جعالم اروني || عصارها خمرية ، تستخرج باخر ، يصنع منها الكهني الفاسر الصنت .

### ١٤١١٥ - سَمَادُ الْبَلَك \* ، Rhus verniciflua (S).

Sumac à laque (F).

شجرة عابلة تملو نحو ١٠ امتار . ساقها مفضلة البعد . اوراقها مركبة تد من ٧ الى ١٣ ورقة نصلها بطول نحو ١٦ سم . ازهارها هربي الشكل عثكولي التجميع . ازهارها الى الصفار الباهت || يستخرج من ساقها باخر حصاره صمغية لزجة يصنع منها الك الياباني الفاخر الصنت .

### ١٤١١٦ - سَمَادُ جُمَاعِي Rhus toxicodendron (S).

Sumac vénéneux, Arbre du poison (F).

جنية عارضة عابلة تطول نحو ٥ امتار . اوراقها مركبة ثلاثية . نصلها قلمي الشكل ، ذرب النعصة ، ازغب الصفة السفل . ازهارها عثكولي التجميع ، محوري الازنكاز . ازهارها خضراء اللون . ثمارها مجهم وشكل الحصى ، مله البشرة ، صفراء اللون || ثمارها جمالية تحوي بعض المواد القلبية الفتالة .

والانتاج الزايف الاثام || لذلك فالاممجة الكجوية حديد لانها وضعت ، ولا تزال توضع وترقى مع العلم والتقنية ، سدا لحاجة النبات وظروف التربة والاعليم || تقسم الاممجة الكجوية الى ثلاثة عناصر رئيسية : الازوت وحمض الشفوف واليوراني . ثم تلبها العناصر الثانوية كالكلور والمغنيزيوم والكريت واليورق ، الخ .

### ١٤١٠٢ - سَمَادُ مُرَكَّب (F). Engrais composé (F).

Compound fertilizer (E).

هو كل سماد سوي كامل او بعض العناصر الرئيسية وقد شاع استعمال الاممجة للصناعة المركبة نظراً الى تحققة من الاقتصاد ملموس بين نتائج طية .

### ١٤١٠٣ - سَمَادُ مُعَدَّنِي (F). Engrais minéral (F).

Mineral fertilizer (E).

هو كل سماد مصدره معادن الارض يستخرج ويستخلص في سبل التربة وراثت .

### ١٤١٠٤ - سَمَادُ وَسِيط (F). Engrais catalytique (F).

Catalytic fertilizer (E).

هو السباد الكجوي المنصري الذي اذا اخيف الى التربة نطت بمفعلة الخيمية نباتاتها المزودة دين ان تلتطى منه || الاممجة الوسيطة حديدية جيمها من العناصر الثانوية والثالثية . اشهرها الكريت والمغنيزا واليورق المنيزا .

### ١٤١٠٥ - سَمَكَر (F). سمكار هو الأصل ، اطليه .

١٤١٠٦ - سَمَكَرُ اخْضَر (F). سمكار اخضر هو الأصل العربي ، اطليه .

١٤١٠٧ - سَمَكَرُ شَالِك (F). سمكار شالك هو الأصل الكولاني ، اطليه .

### ١٤١٠٨ - سَمَكَرَة \* ، قَوْدَرِيح ، فِجَلُ الْجِمَالِ قُسْطُ بَرِّي ، سِيْمَبَرِيْن

Sisymbrium (S). Stymbrum (F). Hedge mustard (E).

Wegersuke (D). Sesambrio, Rapino (I).

جس نباتات حشوية برية سوية او مصرة من فصيلة الصليبيات . اوراقها متعالية مفرفة . ازهارها صغيرة القد صفراء اللون || انولها حديدية اشهرها البيرة اخضرية اوراقها وازهارها طية نقيها فيه بحة الصوت .

### ١٤١٠٩ - سَمَكَرِي \* Chauliolumus strepera (S).

Canard chipou, Chauliolumus, Chipoua bryuan, Ridenne (F). Gadwall (E).

طائر مائي وحيد الجنس والذراع من فصيلة الطيات . طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه ابيض اللون . متقال اسود . سقاء الى الحمرية البرتقالية . الانثى اصفر من الذكر . صدرها الى الصهبة المنشة بالاسود || وهو من القواطع محبوب الشرق واورو . يألف البجيرات والناقم . قوته الاشباح المتقنية والغمرات والديان والاسماك || يش منه في المنابع بين الادل . اثنتا تصع من ٨ الى ٩ بيضات تحضنها وسحما .

### ١٤١١٠ - سَمَاطُ جَوَقِي \* (F). Nappe phréatique (F).

Water ground (E).

هو جملة المياه الجوفية الخزونة في الارض .

### ١٤١١١ - سَمَاق (F). Rhus (S).

جنس اشجار وبجيرات برية وزراعية من فصيلة الراتنجيات . انولها حديدية . اوراقها متعالية ، كاملة النصل او مركبة ، ورية ، ثلاثية الورقيات او ريشية . ازهارها خماسية التركيب ، وصحية المبيض منها الحشوية والشرية وثلاثية



سمارة



سماري



سماق الدباغين



سماق الطلاء



سماق الك

## ١٤١١٧ - سَمَاق حَرْتَه ، عُرْبُ

*Rhus pentaphylla*, *R. albid* (S). *Sumac* à 5 folioles (F). Hawthorn like sumach (E). *Spitzdorn* (D). *Scotano alba* (I).

شجرة مروة تملو من ٤ الى ٧ أمتار. ساقها وورودها شاذكة. اوراقها مركبة ثلاثية او خمسية الورقيات. نصلها مالى البشرة ، مستطيل الشكل ، ثلاثي القسطن. ثمارها حلوة الطعم مأكولة || اوراقها دوائية وصيغية لكنها متوسطة السمف .

## ١٤١١٨ - سَمَاق عَطْرِ

*Rhus aromatica* (S). *Sumac aromatique* (F). شجرة عابلة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. نصلها مسن الحافة حطري الرائحة عند التفرك. ازهارها متشكلى مستطيل يسبق الازهار. ازهارها صفراء اللون || زرع لثمين ترعر من آذار الى نيسان .

## ١٤١١٩ - سَمَاق كَاذِب ، حَرْبُ

*Rhus succedanea* (S). *Sumac succédané*, *S. blanda* (F). *Tallow sumach*, *Japanese wax tree* (E). *Japanischer sumach*, *Wachsaum* (D). *Sommisco da sego* (I).

يكثر في الشرق الاقصى شجرة تملو نحو ٦ أمتار. يستخرج من ساقها بالخر مصادة صمغ لزجة يصنع منها اللك الصيني المادي الذي يعتبر من الاصناف الوسطى .

## ١٤١٢٠ - سَمَاقِي

*Granit*, *Porphyra* (F). *Granit*, *Porphyry* (E). حجر السباق وهو حجر صواني قاس اسود اللون او احمر او اخضر او موشح بالاحمر والاصفر والجلوي.

## ١٤١٢١ - سَمَاك

السماك منزل من منازل القمر الشامية ، ويدعى السماك الاوزل لان ليس امامه فيه في حين ان السماك الرابع الذي لا يزنله القمر ، يتبعه كوكب يقال له راية السماك . وبعض العرب يسمي من السماكين ساقا الاسد || ولب السماك يدعى بطن الحوت .

## ١٤١٢٢ - سَمَاك اَهْوَك ، سَمْبَلَة

*Epi*, *Spica* (F). *Spica* (E). السماك الاوزل او السنبلة نجم لير من برج العقراء . مركزه بالقرب من اليد اذنا السماك الرابع . يبعد عن الارض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية .

## ١٤١٢٣ - سَمَاك رَامِع

*Arcture*, *Arcturus* (F). *Arctures* (E). السماك الرابع نجم ثير احمر من كوكبة العقراء . مركزه بين فطلي البقار اي العقراء . ويدعى حارس البقار لانه لا يغيب حتى تحت اشفة الشمس . يبعد عن الارض نحو ٤٠ سنة ضوئية .

## ١٤١٢٤ - سَمَكَاك

دود في الماء الثلج .

## ١٤١٢٥ - سَمَاكَة \*

*Psammodius* (S). *Psammodie* (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفضيلة السباليات . ازهارها المروقة تناثر لثة . يصفى من متحمرات الاراضي الثالثة والبيض الآخر ماص نشر في جميع بحار العالم || اصداؤها شبه عظيمة الشكل ،

صغيرة القد . اجسامها صغيرة ، ثنائية الخنايب الطليقة المستطيلة || تعيش في الاسماك والرمال القليلة النور .

## ١٤١٢٦ - سَمَاكِيَّات

*Psammodius* (S). *Psammodie* (F). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم . اجسامها وازهارها المروقة عظيمة مظهرها من متحمرات الاراضي الثالثة || اجسامها صغيرة القد او متوسطه . مستطيلة الخنايب . اصداؤها شبه عظيمة الشكل ، جميلة الالوان المتراكبة الزاهية || اعرف اجناسها واشهرها السبالة والدسامة .

## ١٤١٢٧ - سَمَكَم

*Fourmi rouge* (F). *Reddish ant* (E). السمام وتسمى الساسم هي البنة للفرار .

## ١٤١٢٨ - سَمَاكَة ، مَخْطَف ، حَمِص

*Cypselus* (S). *Martinet* (F). *Swift* (E). جنس طير من فصيلة السباليات . ازهاره المروقة ٢٠ جمها من التراب ذات الحبيب والمشي . اجسامها مستطيلة . اجنتها عارقة الطول . اذنانها فارقة . ارجلها قصيرة مدرولة . متاهرها صغيرة . اشداؤها واسعة || وهي من الطيور النافذة التي تقضي على الحباب والحلم والبيض وبعض الحشرات الاخرى . تتميز بجهريتها الضمنية الكائنة تحت السطح . طيراتها قائل السرعة . تبنى اوكارها في اجاب الصخور وتحت سطوح البيوت . انها تحسن رسوخها من يقطين الى ثلاث بضع زهاء اسبوعين . اشهر ازوارها ما يلي .

## ١٤١٢٩ - سَمَاكَة الصُرُود ، حَوَار

*Cypselus melba*, *Micropus melba* (S). *Martinet alpin*, *M. à ventre blanc* (F). *Alpine martin* (E). من اكبر انواع السبالة . تألف البلاد الجبلية ، يكثر ويوجد في الشرق الاقصى وبلطيق . طولها نحو ٢٣ سم . ثوبها الى السواد الضحى . بطنها ابيض ، صدورها موشح بنم اسمر .

## ١٤١٣٠ - سَمَاكَة رَمْدَاك \* ، مَخْطَف اَسْمَر

*Cypselus murinus*, *Micropus murinus* (S). *Martinet murin* (F). *Little grey* (E). سمكة متوسطة القد طولها ١٧ سم . ثوبها الى الرمقة السوداء . عنقها ابيض موشح وسائل البحر المتوسط والبرقية الشرقية والجزيرة .

## ١٤١٣١ - سَمَاكَة سَوْدَاك \* ، حَوْصَق

*Cypselus apus*, *Micropus apus* (S). *Martinet noir*, *M. de murailles* (F). *Black martin* (E). سمكة كبيرة القد طولها نحو ٢٢ سم . ثوبها الى السواد الاسفنج يطو موانج اخضر . زورها ابيض الضحل . تألف جمع بلاد حوض البحر المتوسط وقد تتوغل في الداخل .

## ١٤١٣٢ - سَمَكِيَّات

*Cypselidae* (S). *Cypselidés*, *Apodidae* (F). *Cypselidae* (E). فصيلة الطيور السباليات من الجوامع اللثويات الناقير . اجناسها وازهارها مدنية . جمها من الطيور الجاهية التناقل . الصغيرة القد ، المستطيلة الجناح ، السريعة الحركة والخفيفة الطيران || معظمها من القواطع . قويا الحشرات والحلم .

## ١٤١٣٣ - سَمَان

*Pomacentrus symma* (F). سمكة بحرية تسمى حائل سمان ، اطفاها .



سَمَاة



سَمَاة الصُرُود



سَمَاة رَمْدَا



سَمَاة سَوْدَا



١٤١٤٧ - **سَمْعَاق** (F). *Periosteum* (E).  
جليلة رقيقة لينة المادة تنفي العظام .

١٤١٤٨ - **سَمْعَاق** ، **عَكْرُوس** *Cirro-stratus*  
نوع من الغيوم المتصلة البعد مظهرها طبقات متتابعة  
أفقية الارتكاز وشاحية الشكل مسطيلة يتخللها بعض  
الكتل المائية .

١٤١٤٩ - **سَمَخ** *Germination (débüt)* (F).  
هو بدء الانتاش . راجع انتاش .

١٤١٥٠ - **سَمْعَة** ، **صِرْم** *Sous-variété* (F).  
*Sub-variety* (E).  
السمة ج صمخ . هي افراد من ضرب واحد تتميز بصفات  
خاصة جعلها يكتسب بعض الشيء من القرب المتعددة منه .

١٤١٥١ - **سَمْعِيَّة** *Epigenèse* (F). *Epigenesis* (E).  
السمة هي الطريقة المتبعة في تمييز...تكوين الاجسام  
المركبة عند اضافة ما كان ينقصها أو ما كانت تفتقر  
اليه جبروتها .

١٤١٥٢ - **سَمَد** *Engraisser* (F). *To manure* (E).  
استعمل المهاد التربة .

١٤١٥٣ - **سَمَر** *Clair-obscur de la lune* (F).  
السمر اسم ظل القمر .

١٤١٥٤ - **سَمَر**  
هو السطح اللويبي اطلبه . وياء عن ابي حنيفة : « جهر  
من المشاء وليس في المشاء اجود غشياً منه ينقل الى  
القرى تنفسى به البيوت » الراشدة سمرة . ويقال ان  
الشجرة التي يبيع تحتها رسول الله كانت سمرة .

١٤١٥٥ - **سَمَرَمَر** \* ، **سَمَرَمَر**  
*Pastor roseus* (S). *Martin rosalin*, *Etourneau*  
*rose* (F). *Rose-coloured starling* (E).  
بين اسمائه باذنجان وسلكوت وسفرمادي . طائر قنبراني  
وحيد الجنس والنوع من فصيلة الثروازير طوله نحو ٢٣  
سم . رأسه ورطه وحنقه وحنامه وزيكاه الى السواد  
الازرق المالح . سائر ريشه احمر ودي . منقشاه  
ويجدها الى الصفرة في موطنه البلاد الحارة يجمعها في  
طلب الصيد والمخفى قوته الجراد والجنادب والقيايط .

١٤١٥٦ - **سَمَرَوِيَّة** \* ، **قَصَب** **هَر**  
*Simaruba* (S). *Simaruba* (F). *Simarouba* (E). *Simarubum* (D). *Simaruba* (I).  
جنس الشجار حرجية طية من فصيلة السمر وبيات . انواعه  
٦ منها امريكا الوسطى ، سيقها لمساء الماء تملو  
من ه الى ٢٠ م . اورقها متعاقبة بسيطة او مركبة  
انزاعها متكروني التجميع تاجي الارتكاز . انزاعها خشوية  
خامسة البتلات || اشجارها صلبة مفردة اللون فاحرة  
الصف . لحاء سيقها واضحا مرة الطعم طية . نقيها  
يستعمل في مكافحة الحشرات . يحرق اورقها وتنتجها  
مضاد لسم الاقضي وقد يستعمل في مما لجة السلس وبعض  
الامراض الجلدية .

١٤١٥٧ - **سَمَرَوِيَّات** *Simarubaceae* (S).  
*Simarubaceae* (F). *Simarubaceae* (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلات القلمات .

١٤١٣٤ - **سَمَانَة** *Callie* (F). *Quail* (E).  
واحدة السمان طائر من الطيوريات . يقال سمان الواحد  
ولجمع والواحدة سمانة جمعها سمانيات .

١٤١٣٥ - **سَمَانِي** \* ، **قِرِي** ، **قَتِيل** **الرعد** ،  
*Coturnix* (S).  
**قِرِيَّيِي** *Callie* (F). *Quail* (E).  
جنس طير من صمارة الحبيليات وفصيلة الطيوريات  
واحدته سمانة وقراية ، جمعها سمانيات قري . انواعه نحو  
١٥ جميعها من القواطع مظهرها صغير . اللد . طولها  
يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم . انوارها الى الصبغة الخفيفة  
المقل المزدوجة والرامي والكروم قتها الاشباب والحوب  
والطوام || الانثى اصغر قدماً من الذكر واضيق لوناً .  
تدخن انصوبها في الادخال وبين الاشباب الكثيفة  
وروصها بالحشيش الناعم . تضع من ٨ الى ١٥ بيضة  
تحضنها وحدها زهاء ثلاثة اسابيع .

١٤١٣٦ - **سَمَبَلُفُورَة** **مُحْتَشِمَة** *Cymbalophora pudique* (F).  
هي الطنوسية المحتشة ، اطلبها .  
١٤١٣٧ - **سَمَت** *Azmut* (F). *Azmuch* (E).  
اصطلاح علمي فلاني يدل على نقطة وهمية واقعة فوق رأس  
الراصد تدعى سمت الرأس يقابلها نقطة اخرى تقع تحت  
قدم ذات الراصد تدعى سمت القدم او التنظير . وسمت الرأس  
والقدم هما قطبا دائرة الافق .  
١٤١٣٨ - **سَمَت** **الرأس** *Zénith* (F). *Zénith* (E).  
سمت التنظير اي سمت القدم .

١٤١٣٩ - **سَمَت** **القدم** ، **نَظِير** ، **نَظِير** **السَمَت**  
*Nadir*  
١٤١٤٠ - **سَمَة** *Stigma* (F). *Stigma* (E).  
الجزء الاقل من مقلقة الزهرة وهو الذي يتقبل الويلج .  
وهي في الحشرات المصليفة فوعة تنفسية سطحية مباشرة  
الاتصال بالانابيب التنفسية .

١٤١٤١ - **سَمَة** *Nette* (F). *Netting* (E).  
سفرة من خوص تبسط تحت الثقل ويعد من الاجنار  
المثيرة ليعط عليها ما تثار منها . ج س .  
١٤١٤٢ - **سَمَة** ، **عَلَامَة** ، **وَسَم** *Etiquette*, *Marque* (F). *Ticket*, *Mark* (E).  
١٤١٤٣ - **سِمَة** **الشجر** *Marcelage* (syrv.) (F).  
*Marking of trees* (E).  
علامة يضعها مأمور الاجراع على بعض الاشجار الحرجية  
الجارز قطعها .  
١٤١٤٤ - **سَمِي** *Zénithal* (F). *Zenithal* (E).  
عنصر يسمت الرأس .

١٤١٤٥ - **سَمَخ** **السبح** : السبح لا حدة فيه .  
١٤١٤٦ - **سَمَاج** *Samar* (F). *Samar* (E).  
السماج والسَمَج : القوس الطويل النهر .



سمان



سمر



سمر به



ماحتان ، زعنفتها الظهرية تمتد من الخيط الى طرف الذيل .  
زعنفتها البالية مستديرة الطرف || لحمها فاخر الصنف ،  
مغروب فيه .

١٤١٨٧ - سمكة الشكل  
Ichtyomorph (F).  
Ichtyomorphous (E).

١٤١٨٨ - سمكة  
Vase (F). Silms, Mud (E).  
ج سمل وسماك وسماك وسمول . بقية الماء والحماة في  
الحوض والقدير .

١٤١٨٩ - سمكة  
السلق : لا تقدر لا نبات فيه وقيل القاع المستوي الاسفل  
الابر لا يمر فيه . ج سلق .

١٤١٩٠ - سمكة  
Rhagio (S).

Rhagio, Lepis (F). Rhagio (E).  
جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين.  
انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة  
والمتدلة الحارة والباردة || اجسامها متفارقة القد تطول  
من ١٢ الى ١٨ سم . رؤوسها كبيرة ، قليلة التكوير ،  
مستقلة . عينها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطامها مستطيلة . ملابسها  
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها شبه مدنية الشكل .  
رواشنها كبيرة ، ملونة . غنايب قوائمها الوسطى والخلقية  
ثلاثية المفاصل الحادة . اذنها ملونة || تألف الحراج  
والغابات والحقول . جميعها قانصة . يرقاتها والجمع تعيش  
في التيرب والحقالة والاعشاب النعرة .

١٤١٩١ - سمكة البياض  
Rhagionidae (S).

Rhagionidae (F). Rhagionidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم باستثناء  
استراليا . جميعها غائلة ، مفترسة || اجسامها متفارقة  
القد ، تطول من ٦ الى ٢٠ سم . رؤوسها قليلة التكوير ،  
مستقلة . عينها كبيرة ، فارقة عند الشقين . قرونها  
الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطامها مستطيلة . ملابسها  
صغيرة . كواسلها كبيرة . بطونها مستطيلة . رواشنها  
ملونة || اناتها اكبر قدأ من ذكورها . يرقاتها والجمع  
تعيش على ما تستطيع اقتراسه من دويبات تحسح في  
محيطها || اشهر اجناسها السليطة والتيريس .

١٤١٩٢ - سمك  
Beurre (F). Butter (E).  
سلاذ الزبدة المصنوعة بالمخاض الرية المتينة .

١٤١٩٣ - سمك  
Engraisser (F). To fatten (E).  
بالغ في تغذية الحيوان لتسمين لحمه وزيادة وزنه .

١٤١٩٤ - سمك نباتي  
Cocose, Végétaline  
هو دهن جوز الهند اي ثمرة الكناجيل . وكل دهن مأكول  
مصدره النبات .

١٤١٩٥ - سمكة  
Griviers (F).  
Thrush aviary (E).  
مطيرة فسيحة مشبكة الجوانب والسقف تستعمل لتربية  
السن .

١٤١٩٥ - سمكة  
Poissons (F). Fish (E).  
حيوانات قفارية من خلق الماء تعتبر من ذوات الهم  
البارد ومن ادف الحيوانات القفارية || رتبها وعضائها  
واجناسها وانواعها نحو ٤٠٠٠٠ . تتميز باعضائها التنفسية  
المركزة على الخياشيم التي تقوم بعملية تبادل الغازات .  
وبعضها الحركة التي تستند على الزعانف والمضلات .

١٤١٩٦ - سمكة أحمر  
هو النوع ، اطلها .

١٤١٩٧ - سمكة التيرس  
Rhombus (S). Turbot (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة المفلطحات . انواعها ٧  
موطنها الاقنيس الاطلس والبحر المتوسط . جميعها كبيرة  
القد مستديرة مبطلة . طولها يراوح من ٤٠ الى ١١٠ سم .  
انثيا الى الصبغة المختلفة الموانج يعلوها ثوب اسود .  
لحمها للذ اللحم ، فاخر الصنف .

١٤١٩٨ - سمكة الكراكي  
Brochet, Esox (F).  
Esox, Pike (E).  
هو الزنجير جنس اسماك نهرية كبيرة القد مستطيلة .

١٤١٩٩ - سمكة سلبان  
هو السلبان من الاسماك المشهورة .

١٤١٩٠ - سمكة فقي  
هو النسيمة ، اطلها .

١٤١٩١ - سمكة متعرج  
Ichtyolithe

١٤١٩٢ - سمكة موسى  
Solea (S). Sole (F).  
جنس اسماك بحرية من الملسوات الجانيات اليوم انواعها  
سنة موطنها جميع البحار . اجسامها مفلطحة صغيرة  
القد او متوسطة . طولها يراوح من ١٥ الى ٦٠ سم .  
لحمها للذ اللحم فاخر الصنف . اجسادها اميقها ثجبا .

١٤١٩٣ - سمكة  
Poisson (F). Fish (E).  
رايح اسماك . ج سمك وسمك وسمك وسمك . اطلها .

١٤١٩٤ - سمكة بيشه  
هي الزينة ، اطلها .

١٤١٩٥ - سمكة طليكة  
Poisson volant (F).  
Fish volant (E).

السكة الطائرة كوكبة نجوم جنوبية الملقح مركزها تحت  
برج الدلو || عدد نجومها ١٧ . جميعها من الرتبة الخامسة  
وبادونها .

١٤١٩٦ - سمكة موسى الشكيلة  
Solen solen, Pleuronectes solen (S).

Sole commune, Parérix de mer (F). Sol, Soul (E).

نوع من سمك موسى . سمكة بحرية يروض من فصيلة  
جانيات اليوم . اعطائها مقلع بحار البلاد المتدلة الحارة  
واعصها البحر الابيض المتوسط . تعتبر من اسماك اسلم  
الغاف . جميعها عويجي الحركة || جسمها مبطط الجرم ،  
الطليكي الثورن ، يطول من ٣٠ الى ٤٥ سم . تتميز

بالاستلقاء على الجانب الايسر مما يجعل عينيها في الصبغة  
البيضاء من الرأس . فوقها مائة المحيط التي تعيش فيه .  
الصبغة التي الى الخلفي الملقح . الصبغة اليسرى  
الى الليرة البيضاء . رأسها صغير الجرم ، انفس الخلق ،  
مستل اللشق . فكها الاصل يتقدم الاسفل . استنابها  
صغيرة ، ذوبة ، عديدة الصفوف . حيتاها صيرتان ،



سمك التيرس



سمك موسى



سمكة موسى الشكيلة

اللون أو يبيض، أو زرقاء. ثمارها نورية عديدة البزور || تنموها ربيعي .



سَمْنَة

١٤٢٠٣ - سَمْنَجِيَّات \* Epacridaceae (S). Epacridaceae (F). Epacridae (E).

فضيلة نباتات جبلية وبجيلة مسرة من ذوات الثقلتين. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. منها ينبت في المناطق الجبلية من البلاد المعتدلة الحارة || تنبت طبيعياً في المواطن المعتدلة الرطبة انحصار الحراج والعلبات || تتميز بكتلة ازهارها المحتبسة على الاغصان. لونها السائد الازرق ثم الاحمر الازرقاني والازرق || اشهر اجناسها السنسية .

١٤٢٠٤ - سَمْنَدَلْ جَبَلِيَّة \* Chloromyia formosa (S). Chloromyia balte (F).

حشرة من فصيلة البلياتيات. جسمها صغير القد. خلي القشور، يطول من ٦ الى ٩ سم. رأسها مستطيل الجرم، شبه مكور الشكل، اسود اللون. عينها بارقية قرن مناد. فمها صغيرة. زبالها منتصبان، سداسيا الفصل. صدغها اخضر اللون، جوي المثلج، ملعب الحمل. حشيتها مرسة. بطنها سداسي الشكل، اخضر اللون. وريشها مستطال الجرم، حطبا اللون. فوقها الى السرة || تألفت المواطن التي تكثر فيها الاعشاب والنباتات البقية || يربتها دودية الشكل، مرصاة اللون، تعيش في الجحالة على المواد النباتية الملتصقة .



سَمْنَة الدين



سَمْنَة عجولة

١٤٢٠٥ - سَمْنَدَلْ \* سُرُفُوت، سَمْنَدَلْ Salamandra (S). Salamandra (F). Salamander (E).

ومن اسمائه روفون وسمنه وسندل. جنس دوابات زسافة من السندليات. انزله عديدة منها الارضية والقارزية والمائية. جميعها بطيئة الحركة اجسامها مسطيلة الشكل طولها يراوح من ١٧ الى ٢٥ سم. ألوانها تحفظ باختلاف الانواع فيها الاسود والاسود الاضمر والدنج والاصفر. قشها الحشرات والحوام || زيم القماما ان السندل يدخل النار ولا تحرقه وحقبة الامر ان جله السندل يفرز مادة اكلية قارضة تنلي النار الى حد نسفها. ج. سماد،



سَمْنَة مطربة

١٤٢٠٦ - سَمْنَدَلْ أَسْوَد \* سُرُفُوت أَسْوَد Salamandra atra (S). Salamandra atra (F). Black salamander (E).

حيوان قارب سريد من فصيلة السندليات. جسمه مفلطح الشكل، وديكي القوام، يطول نحو ١٤ سم. منه الذكر ونحو ١٧ سم. عتة الاثني. رأسه مستطيل الجرم واسع الشفق، كامل القسطن في الفكين. عيناه صغيرتان جاحشتان مكملتان الجفون. عتة بالغة القصير. ظهوره متابع الاسقاط المتعاقبة. ذنبه خليل القاعدة مستطال الطرف. قوائمها قصيرة وبطيئة. قائمتاه الاماميتان باربعيا الاصابع اما الخلفيتان فاحشيتان. ثوبه سوي اللون الاسود تملو ماجة بنفسجية || يبلغ كامل نموه بمصر اربع سنوات ويعيش نحو ٢٤ سنة. يألف المواطن القريبة من الماء. يسرح في الليل ويبيت في الجار بين الصخور وتحت الحجارة || قوتها الحشرات واسرارها والديدان والزبوعيات || الاثني تقسم على حافة الماء سديلان كاملا الاعضاء داما اتياليم الخارجية. ثم تنفع بها الى الماء حيث يتيان نحو حفة اشهر قبل ان يتسكنا من السير على الارض || يعتبر من القوارض النافعة .

سَمْنَة



سَمْنَدَلْ



سَمْنَدَلْ

١٤١٩٦ - سَمْنَكَة \* ، حَسَن النسيج Valeriana locusta, Valerianella olivaria (S). Valerianella potagère, Mèche, Boursette, Doucette (F). Cornsalat, Milkgrass (E). Ackersalat, Echter feldsalat (D). Valerianella, Dolice mangiare, Doliceeta (I).

نبلة زراعية من فصيلة الناريديات. اوراقها غسنة لائشة مأكولة لزوع ويؤخذ في جميع الاثربة المختلفة التركيب. تتكاثر بالذر. يزورها صغيرة مستديرة تحافظ على قوة انبتها نحو ٦ سنوات .

١٤١٩٧ - سَمْنَكَة \* ، سَمْنَكَة Turdus (S).

ج. سمن وسمان وممان. جلس طير من الشمروريات. انزاهه عديدة معظمها من القواطع. اجسامها مسطيلة، رؤوسها صغيرة، مناقيرها جالسة. اوراقها دقيقة مارية. انوارها تحفظ باختلاف الانواع || قوتها الحشرات والفاير. تكثر اعدادها في الاجار والادغال. اناتها تبش من ٤ الى ٦ ساعات تحضنها بنبوة الاذكور. اشهر انواعها مائي .

١٤١٩٨ - سَمْنَة الدب \* ، سَمْنَة الحدائق Turdus viscivorus (S). Grive draine, G. du gaul, G. de brou (F). Middle-crush (E).

طائر من اوابه الشرق الاوسط واروبة. طولها نحو ٢٢ سم. ظاهر ثوبه الى الصبهة السوداء يعلوها موج جوي. زوره وبطنه وانفيكه الى البياض الاصفر تملو رقة مرصاة || اناته تحضن مرتين في العام. لكش عنها في الصنوبر والسنديان والزنان .

١٤١٩٩ - سَمْنَكَة مجرولة \* Turdus merula (S). Grive mauvis (F). Fieldfare (E).

طائر من القواطع خفيف الطيران سريع. يحب الشرق الاقصى واروبة وافريقية الشمالية. يألف الغابات والحدائق والرواقين والبروج وصفات الاخر. طولها نحو ٢٢ سم. لوبه ثوب سمن الدب. يطن الى البياض الاخر || ينش عنه في الادغال والشجيرات الحرجية الكثيفة || وهو تحضن مرة واحدة || سره كبير العدد يفوق المنة .

١٤٢٠٠ - سَمْنَكَة مطربة \* ، سَمْنَكَة شائعة Turdus musicus (S). Grive musicienne, G. commune, Merle-grive (F). Song-crush, Thrush (E).

طائر من القواطع يحب الشرق واروبة وافريقية الشمالية والشرقية. طولها نحو ٢٣ سم. رأسه عتته وظهوره ويتنجاه وذنبه الى الصبهة السوداء يعلوها موج زيب. حصار جناحه الى الصفرة. زوره وبطنه وبطنه وانفيكه الى البياض الاخر يملو تبش اسمر || اناته تحضن مرتين في العام. ينش في الادغال والشجيرات الحرجية الكثيفة || وهو من الطيور المروفة النسيجة التي تتغذى على الاغصان وتردها .

١٤٢٠١ - سَمْنَتُوس Sminthe

اطلب مرانة .

١٤٢٠٢ - سَمْنَجِيَّة \* Epacris (S). Epacride (F).

جنس نباتات جبلية مسرة برية وفريقية من فصيلة السمنيات. انواعها المروفة قليلة العدد منها ينبت في جبال البلاد المعتدلة الحارة من الماء القديم || شكلها قريب لشبه بالمثل. سواها منتصبه فرما. اوراقها متعاقبة متناوبة اتصال الضيقة. ازهارها صغيرة مسطيلة الاوراق حراء

١٤٢١٣ - سَمْنُودَةُ الْحَرَرِ \*  
Semanotus laurasi (S). Sémanote du genre-  
vriert (F). Semanotus laurasi (E).

حشرة غاشقة غاشية من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. تألف الجروود حيث يكثر الحرير والدفان والابيل. خنافسها تعيش حل الارواق والازهار وخلفا الحرايب. يرقاتها تركب الجروح والاضغان فتفترها وتردبها حتى الشكير || جسمها متوسط لثقة يطول من ٩ الى ١٢ سم. عند الذكر ومن ١٥ الى ١٨ سم. عند الانثى التي تتميز ايضا بكير المرو. ثوبها ثنائي اللون ، اسود الرأس والكولر والزيان والبلبن والجرازم ، افصح الظهران الخضب بمجمة متفرقة سوداء. رأسها معتدل الجرم. حينها كيرتزان جاحظتان. زباناها خيطيان مهدبان. ظهرانها مستدير الطرف الاصح عند الذكر || جيلها ثلاثي الجيل. تظهر الحشرة الجملانة في فيضان ويأتي حتى ايلول. تسرح في النهار. تشابه هذه ظهورها بنحو ثمانية اصابع. تزلز المن بين التفتور || البرقة عند الادراك تمام تطول من ١٨ الى ٣٠ سم. جسمها منحدر الطهر ، مبط الملب ، قصير الرواجب النولية. ثوبها الى السرة يطولها موج اشجع وتفتيح اخر عند من الحلقه الصدرية الثانية الى الشكة البطنية قبل الاخيرة. رأسها جزوي اللون يغور من الحلقه الصدرية الاولى || طور الاكمال الذي يستمر من ٥ الى ٥٥ يوما ينقضي عنه مدخل آخر تلقى احتفرته البرقة ضمن صلح من المواد النباتية المعجولة بالريال.

١٤٢١٤ - سَمْنُودَةُ \*  
Scymnorhinus, Scymnus (S). Scymnorhina (E).

جنس اسماك بحرية سرابدة من فصيلة السمندليات. انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها البحر الابيض المتوسط وتغلق مناطق المحيط الاطلسي اعصها المنطقة المتحدة المغرب الى البرتغال || مسرحها ليلي ولا تشاهد قرب المهاد الا نادرا. قوتها الاسماك الصغيرة والسرطان والقشريات والرخويات و اجسامها اهليجية الشكل ، تطول من ١٥٠ الى ٣٥٠ سم. رؤوسها شبه مخروطية. اعظامها ذلقة ، متفرجة الاضداد. اسنانها صغيرة ، متفرجة الاشكال ، متألثة في الفكوك العليا والسفلى. الزوايا الى الزرقة البحرية اليرداء الخليج تنقب مع اقترابها من السطح وتبيض وتغير عند البطن ، ويطلو في جوانبها تجليع كبير منكر الخطوط المتوازية || حولها بين متوسطة السنف وكاعنة. مسوكة فاخرة. مرغوب فيها || اشهر انواعها السمندوة المشقة والسمنودة المساء.

١٤٢١٥ - سَمْنُودَةُ مُشَقَّةٌ \*  
Echinorhinus spinosus (S). Echinorhina, Requin bouclé, Bouclé (F). Prickly-shark (E).

نوع من السمندوة. سمكة بحرية سرابدة. اعطائها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تعتبر من اسماك البجاج. اخلاقتها حية ، تنقب الانسان وتبتعد عنه || جسمها اهليجي الشكل يطول من ١٥٠ الى ٢٢٠ سم. مسكها عشن ميمر الشكل المشقة بمخمس عجمية ذرية الاطراف. ثوبها الى الزرقة البحرية اليرداء الخليج يمين وتشتد زرقته مع الاقتراب من سطح الطهر ويغير ويبيض عند البطن. ويطلو في جانبها تجليع اسود منكر الخطوط. رأسها معتدل الجرم ، ذلق الخط. لها سفلى الايتكار. شفها معتدل الرحابة. اسنانها متراصة ،

١٤٢١٦ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ \* ، سَمَنْدُور ، سَمَنْدَر  
Molge (S). Triton (F). Triton, Newt (E).

جنس دويبات زملاقة قازية من السمندليات. انواعه نحو ٢٠. جميعها صغيرة لثقة مسطيلة الشكل مبطلة. حشار ظهورها ثنجي الايتكار منس الحافة. حشار اذنانها عديم التنس. الزوايا مزرشكة وسنجية وبديعية || قوتها البيدان والخلود والاصليط. تألف المنطق تعيش فيها حتى فصل الشتاء. بيتها الشري يدوم نحو ٤ اشهر تنحس فيها تحت الحجارة وفي الارباب.

١٤٢١٨ - سَمَنْدَلُ الْمَاءِ الْمَبْدُول  
Triton vulgaire (F).

اطلب نيوت مبدول.

١٤٢١٩ - سَمَنْدَلُ مَبْدُولٌ \* ، سَمَنْدُور  
Salamandra salamandra (S). Salamander (E).

حيوان قازيز سرابدة من فصيلة السمندليات. جسمه متوسط لثقة دماي القدام يطول نحو ٢١ سم. عند الذكر ونحو ٢٤ سم. عند الانثى. رأسه مبط ، مستدير الخط. واسع الشفك ، كامل التنس في الفكين. عيناه صغيرتان جاحظتان. عنقه بالغة القصر. قوائمها قصيرة وفليظة. التامخاتن الاسمانتان ربابية الاصابع اما الخلفيتان فخاصيتها. جلده مشعل القشار. ثوبه الى السواد اللامع يطول تفتيح اصفر يمتد من الرأس الى طرف الذنب || يعيش نحو ٢٤ سنة. يألف شيفات مجاري الماء. يسرح في الليل ويبيت في النهار بين الصخور وتحت الحجارة. قوته الحشرات والبيدان والرخويات || الاثني تنقب على حافة الماء من ١٥ الى ٢٠ سنديلا طول الواحد منها يراوح من ١٥ الى ٢٠ سم. تعلق كلمة الاضداد ، كبيرة الخياشيم الخاطبية. وبعد مرور ساعة من الوضع تلتغ الاثني بمصارها في الماء فتبقى نحو سبعة اشهر الى ان تنقلص خياشيمها || يعتبر من القوازيب النافعة.

١٤٢٢٠ - سَمَنْدَلُ كَيْفُ \*  
Salamandridae (S).

فصيلة من السمنوديات اجناسها وانواعها عديدة تنجمها اربع عمارات افهرها السندل والسمنودور.

١٤٢٢١ - سَمَنْدُور مَبْدُول  
Triton vulgaire (F).

هو التيوت المبدول ، اطبله.

١٤٢٢٢ - سَمْنُودُ \*  
Semanotus (S). Sémanote (F). Semanotus (E).

جنس حشرات من فصيلة القرنيبات ورتبة غمدات الاجنحة. انواعه المعروفة قليلة العدد معظمها من حشرات المناطق الباردة. جميعها صغيرة لثقة مشيرة الملب التيق المستطيل. اجسامها تطول من ٨ الى ١٨ سم. رؤوسها وكولها سود او حر. اعظامها معتدلة الاوان منها الاصفر والاشاحب والخنفي والرودي والاسمر والاخضر. جميعها تنكسي بالاسود وتفرغها عند اتصافها جده عابطة اللون يظلب فيها الاسود || تسرح في النهار. تطهر في اواسط نيسان وتبقى حتى ايلول. مرتمة الازهار الحربية والبرية || يرقاتها غاشية تعيش على جلوح وانصاف الحر والابيل والزاب الخ...



سمندل الماء



سمندل مبدول



سمندل الحر



سمندلة مشقة

## ١٤٢١٩ - سَمُونُوسُ مُعَقِّبُ الرَّاسِ \*

*Scymnus frontalis* (S). *Scymnus à tête noire* (F).  
*Scymnus frontalis* (E).

حشرة غائلة آتية نافعة من فصيلة السمفويات ورتبة غليقيات الاجنحة. تألف جميع الاماكن التي يكثر فيها الاراك لانها مع ريقاتها تمض على جسمها صبر القند يطول نحو ٣ سم. ثوبها الى السواد القمي يبدو في كل غده بقعته حمراء. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها صقايان دقيقتان. فكهاا نثقيتان. ظهورها مستدير الطرف الاخسف. غمداما شديدا الصلابة. كحياتها لثلا. ارساها مستطيلة. واربعة المقل ١١ ارجاها الحولية ثلاثة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اوائل الربيع. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها ياسمين. تمتع المكن لطفاً شغية البعد على نصال الاوراق ١١ البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل. سطلي اللون ارجح المرح. ابيض الخمل القلبي التجميع ١١ طوط الاكامل قلبي تستمر نحو ثمانية ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة من نصل الورقة الى ان تم مراحل التطوير وينقل القفار.



سمورة مساء



سمونوس سوردي



سمونوس معقب الرأس

## ١٤٢٢٠ - صَمِيدَانُ \*

*Diplodadium*  
جلس تطور مجهرية من التفتحيات فضيلة الويليات. جره الكيتيدية متصبة يطولها فروع شمعية لثني يكناها فردية أو شعية التجميع. كنانها مستطيلة شاذة ثنائية الخلية ١١ انواحه عديدة مطعها لا يذ. وبهها يتغفل حل المواد الفسوية والنباتية المتحلة.

## ١٤٢٢١ - سَمُورٌ \*

سمور الزرع: لم يظف بليت. السمورة في الزرع هي عدم الاشتهاء. والانواع او الفرويق السمورة في القليلة الاشتهاء.



سوزل

## ١٤٢٢٢ - سَمُورَالُ \*

*Diatista adusta* (S).  
*Drosophila des fleurs* (F).  
حشرة صغيرة من المسجيات (ذباب الحار) يكثر وجودها في اللتاقع وعلى الازهار والثمار الناضجة.

## ١٤٢٢٣ - سَمُورٌ \*

*Muscula* (S).  
*Marca, Martre* (F). *Martre* (E).  
جلس حيوانات لاجئة مقفرة من السموريات. انزاعه عديدة موطنها العالم. تألف الاسراج والقطابات. لتلق الاثبار وتسرح في الليل والثمار ١١ اجسامها مستطيلة. رؤوسها اسفلية الشكل. اخطهاا ذلقة مقفولة. اذناها عريضة كاسية. اذناها مستطيلة جيلة. جرازها قصيرة. غالبا ذرية حادة ١١ اناها تضع من ٣ الى ٤ جروا. تيمر بعد وضعها ياسمين وتسلق الاشجار بصر ٧ اسايح.

## ١٤٢٢٤ - سَمُورٌ صَوْبِيَرِي \* هو الزبيلان ١١ لثله.

## ١٤٢٢٥ - سَمُورٌ شَائِعٌ ١١ عَمَرٌ ١١ سَمُورٌ

*Muscula martes* (S). *Marca commune, Martre commune* (F). *Common martes* (E).

نوع من السمور. طولها نحو ٤٨ سم. ارتفاعها ٢٥ وذبته ٣٠ سم. فويالها الجوزة الخفية. صفه وزودو وصدره ابيض. موطنه احرار الشرق الاقصى واروپا. يسرح في الليل والثمار وهو من الحيوانات الجوزة البطافة الثمة التي لا تفت من اي حيوان كان تستطيع اليه سبيلا.



متمور

ارباعية الصفوف في الفكين. عيناها لوزيتان. زانهاها الظهريه اثنتان. زانهاها الذيلية كبيرة القند تكمل القرعية ١١ تصاد لسكها الفاعر ولزيتها. لحما كامن الصف.

## ١٤٢٢٦ - سِمُونَةُ مَسَاءَ \* ١١ لَيْحَةٌ

*Scymnorhinus lichia*, *Scymnus lichia* (S).  
*Scymnorhina*, *Licha* (F). *Scymnus lichia* (E).  
نوع من السمودة. سمكة بحرية مقفرة. اصطنها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي. تمتير من اسماك الميجاج. اخطهاا رضية لا تشاكس ولا تقرب من الانسان ١١ جسمها وضي الشكل يطول نحو ٣٠٠ سم. سمكها مادم القبول والمنافس. ثوبها الى الربة السوداء البنفسجية المولج بملوها تمضيح اسود من الخط الجانبي الى شيج الظهر وتمضيح اخير فايض من الخط الجانبي الى قم العين. رأسها مستدل الجرم. مستغض الجبة. ذلق الخطم. لها سفل الزنكاز. شدقاها مستدل القرعابة. اسناها متوسطة الحجم. مثلة الزوايا. واربعة الصفوف في الفكين. عيناها لوزيتان. نهماها ثفرقان صغيرتان زانهاها الظهريه اثنتان. زانهاها الذيلية كبيرة جمدافية الذلقة العليا. مزوانية السفلى ١١ تصاد لسكها الفاعر ولزيتها الجيد. لحما كامن الصف.

## ١٤٢٢٧ - سِمُونَةُ يَمَاتُ \*

*Scymnorhinidae*, *Scymnorhinidae*, *Scymnidae* (F).  
*Scymnorhinidae*, *Scymnidae* (E).  
فصيلة اسماك بحرية سرودة من السمفويات ورتبة الاشلاق اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد. اصطنها معطر بحار العالم ١١ اجسامها اعليهاية الشكل تطول من متر الى ستة اذار. انواها الى الزرة البصرة الطمودة المولج يطولها تجطيم مقروص اسير في الجانين. مسكها بعض انواها مشتقة بدران شاذة. رؤوسها غروطية. اصطنهاا ذلقة. اشدقاها مستدلة الانفراج. اسناها لا تاسية الانظام بين الفكين ١٠ اناها معتدلة انتشار تفصح في كل مرة. في فصل الصيف. من ٣٠ الى ٤٥ جمراً ١١ اشهر اجناسها السمودة والمريفة.

## ١٤٢٢٨ - سَمُونُوسُ صَوْرِي \*

*Scymnus syriacus* (S). *Scymne syrian* (F).  
*Scymnus syriacus* (E).  
حشرة غائلة نافعة من فصيلة السمفويات ورتبة غدييات الاجنحة. تألف الحقائق والمبالل وبياتين الحشويات. خناهاها ويريقاتها تمض على القرمزيات والمظفرات ١١ جسمها صغير القند يطول نحو ٣ سم. ثوبها الى السودة الكستيدية تملوها شمفيحات مستطيلة تميد الى الخمل الاصهب القلبي التجميع في الكورول والقمدين. رأسها صغير الجرم. عيناها بارزتان. زباناها صقايان صغيران. ظهورها مستدير المؤخر الاخسف. غمداما شديدا الصلابة. ارساها واربعة المقل ١١ ارجاها الحولية ثلاثة. تخرج الحشرة الجملانة من بيئاتها الشتوي في اواسط نيسان. تسرح في النهار. تتغذى بعد غروبها من مكناها ياسمين. تمتع المكن لطفاً على مصحات نصال اوراق النبات المائل حيث تمض القرمزيات والمظفرات. ١١ البرقة عند بلوغها الادراك اتمام طول نحو ٤ سم. جسمها اعليهاية الشكل. ثوبها الى السودة الكستيدية المايقة يطولها نحو ٤ سم. طوط الاكامل الذي يستمر نحو سبعة ايام يتغني على النبات المائل حيث تتدل البرقة وتتدل من نصل الورقة.

كالاجاص والخوخ والجوز والكتنا. ويركب جلوع بعض الاجار الحرجية كالستيان والقيقب والسبط والمصناف والخور والدلب || مشبه يدخل من الجروح للقدية اليابسة فيسري الالفة ثم القلفة الخشبية الاولى التي يمتلئها بمادة لزجة كالصم تلتصق شيئا فشيئا بعد ان تشقق الخشب بالطلل والمرض على شكل مربعات تحيطها من جوانبها الستة اغشية المشيج البيضاء اللون || اما اللد بعد ذاته فهو كالقصع المتراكبة المنبسطة الحوائط المتصعبة المشربة . يظهر من ايار ال

تشرين وهو سريع النمو قطر نكته يبلغ نحو ١٠ سم . يصعبه عديدة الاذن ينطب فيها الاصفر الكبريتي ويوجد فيها الحطلي الباقي والزاهي والبرتقالي والوردي والاصهب والاشرق والبنّي والايض الاخير || وهو من القلوع المأكولة لكته يشكو من ملوثة المز الحليم . كانوا ولا يزالوا يستخرجون منه مادة صلبة صفراء اللون .

### ١٤٢٧٧ - سمية حوشية

*Polyporus squamosus, Melanopus squamosus (S). Polypore squameus (F). White rot (E). Schuppiger porling (D).*

ظفر من السميات كثير الانتشار يركب جلوع وارويات وجلوع بعض الثباتات الحرجية اخصها الخور والصفصاف والشت والستيان والزان وقد يصيب الثيت والدلب والجوز . تجته كلوية الشكل طليبا نحو ١٠ سم . لونها بني او سحلي . يطولها ستة من الحرافش الدقيقة الباقية المألج . لياه ابيض اللون طري في اول مهده ثم جلدي عند الادراك . رائحة كرائحة السل وهو من القلوع المأكولة المستعينة الطعم || اضراره قليلة لانه قلما يعلب الخشب والقالب || يكالغ بالظهور بعد انتزاع القلوع وتنظيف الجرح من الشكير اليابس والخشب الموصوم .

١٤٢٧٤ - سميج ٥ *Epigène (F). Epigène (E).*  
لثت تعريفى يطلق على كل ما اتصف بالهامة .

١٤٢٧٥ - سميدّر *Triton*  
هو سميتك الماء ، المله .

١٤٢٧٦ - سميدّر عيّدول *Triton vulgaire (F).*  
هو التوت المبلول ، اطله .

١٤٢٧٧ - سميرفوم *هو الكرفس البري ، اطله .*

١٤٢٧٨ - سميميم ٥ *Calluna vulgaris (S). Calluna vulgaris, Bruyère commune, Brando (F). Heather, Common ling (E). Gamales heidekraut (D). Brendolo, Scopa carnica, Erica scopia (I).*  
جثة برية معدرة من فضيلة الخشنيات . ساقها رفعا تلو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها غسبة ، رباعية ، متعاقبة . ازهارها رباعية التركيب ليلكية اللون || كثر في المناطق الجبلية الرملية . تستعمل استعمال الشيج لقر وفي صناعة المكائس .

### ١٤٢٧٩ - سميطر

السميطر والسميطر والسميطر اعماء غشقة لطار واحد . يعنى البشون الجبار طويل جدأ يرى ابدأ في الماء الفسضاح ، اطله .

١٤٢٧٦ - سموريات، صرغوريات، هوسيات *Musculidae (S). Musculidae (F). Musculidae (E).*  
فضيلة حيوانات لاحة مفترسة تشمل السمور والسرورب وابن عرس والقضاعة والقشقم والقربان والقنيزون والرائل الخ :

### ١٤٢٧٧ - سمولس ٥ ، لبين الماء

*Samolus valerandi (S). Samole, Mouron d'eau (F). Brook-weed, Water pimpernel (E). Samoskraut, Salsbungen, Wasserpimpernel (D). Samolo, Pimpernelia aquatica (I).*

ثبات عشبي بري متقني من فضيلة الربيعيات . ساقه متعصب . اوراقه معتقة بيضية متعاقبة . ازهاره صفودي التجميع . ازهاره صفيرة اللد يضاء اللون خامية البتلات . يقال ان عصاره ساقه تلزم الجرح بصره .

١٤٢٧٨ - سموم *Vent chad (F). Hot wind (E).*  
الريح الحارة . قال ابو عبيدة السموم بالهار والخور باليل .

١٤٢٧٩ - سميات *Polyporaceae (S). Polyporacées, Polyporiacées (F). Polyporaceae, Polyporiaceae (E).*

فضيلة ظفور من رتبة العمايات نكاتها كثيرة الحليم جلدية التركيب او قليلة تحمل على صفحتها السفل بعض السام والتعاوين . يورقاتها شفعية التجميع رباعية خشافة او ملوثة || اجناسها وانواعها عديدة منها سوية ومنها معدرة تتصلق وتمش على الاجزاء البالية من غشفت الاجار الحرجية والسمامية والرزينية والشمرة || مشبهها يسري الماء والفكر والقالب فيسب انحلال حواجز الاروية والخلايا ثم ينغص بيضه الكثيف على الاجزاء الخشبية فيطبخ ويوصمها بفضه القلي او الكسبي او التوروي او الهلالي || ومنها اجناس تتصلق على الانشباب المقطوعة والمصنوعة فتؤذي وتطبخها || اشتهر اجناسها من الربيعية الاقتصادية الزراعية : الحافرية ، الزار ، الساجوج ، السنجية ، السمية ، الطبق ، الليليس ، القوس ، الفزيت .

١٤٢٨٠ - سمية *Polyporus (S). Polypore (F).*  
جاس ظفور من السميات . انواعه جلدية منها المأكولة ومنها اللقضية والسامة . يربصها يتصلق على الثبات فيقع به بعض الاضرار .

١٤٢٨١ - سمية البن ٥ *Polyporus coffeae (S). Phitriose du caféier (F).*

ظفر يري من السميات يركب البن على اعضاءه الترية . يعيش من الستين الى الثلاث سنوات وقد يعلب الجلود والجالح || ويبدأ كيمة البطر تشأ عنه ارموية الساق اذا بكائته المستطيلة ، القفصية الشكل ، الزرية التركيب ، تمتد الى الجلود وتغشها بشبكة من المشج تمش على ما تفرزه الجلود من مواد سكرية يسبها ونخر الكوشيل . يكالغ بالقضاء على الكوشيل التي تمش سطم حياتها خارج الثرة على اعضاء ثباتات الحوائية .

### ١٤٢٨٢ - سمية السندريكان ٥

*Polyporus sulfureus (S). Polypore sulfureux, Pourriture rouge du chêne (F). Brown checked wood rot (E). Schwefelgelber porling (D).*

ظفر يري من السميات يتصلق على سرق الاجار المشربة



سمولس



مئة البن



مئة الستيان



سميم

## ١٤٢٥٠ - سنخة بري ، قاتيل ، قاتيل

*Cassia tora* (S). *Casse féodée*, *C. sauvage* (F).  
نوع من السنخة البري المحلي. كزينة الزينة، كثير انتشاره  
الحديثة. سوك يوازي سينا والعريش ويزرع في الجزيرة والصحراء.  
شجيرة تملأ من الماء إلى الغلة أثمار.



سنيق

## ١٤٢٥١ - سنخة عذكي

*Cassia corymbosa* (S).  
*Casse corymbiforme* (F).  
نوع من السنخة الزينية. شجيرة جادة تملأ من ٢٠٠  
ال ٢٠٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأوراج.  
وربها سنخة النصل. عناقيد الزهرة خفيفة الشكل،  
محورية وتأتي الارتكاز. أثمارها متصلة اللد، حيلة  
الصغار. ثمارها قرن لينة خشبية. صبارها سلوة  
العلم زينة. أثمارها يذوق أربعة أسابيع بتبقى في البوترة  
الأول من تموز.

## ١٤٢٥٢ - سنخة مريكتند

*Cassia marylandica* (S).  
*Casse du Maryland* (F).  
ويسمى السنخة الأمريكي. نوع من السنخة الزينية البري  
يعلم من ٦٥ إلى ١٠٠ سم. أوراقها ثنائية أو ثنائية  
الأوراج. وربها حليبية النصل، كالشكة الكرون.  
عناقيد الزهرة كثيفة التجميع. أثمارها في الصغار  
الزهراني. أثمارها يسمر من آب إلى تشرين.



سنا مزهار

## ١٤٢٥٣ - سنخة مزهار \*

*Cassia floribunda* (S).  
*Casse floribonde* (F).  
نوع من السنخة الزينية. وهو جنة جادة تملأ نحو  
٢٠٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خلية الأوراج. وربها  
سنخة النصل الفسق اللرب. عناقيد الزهرة حركلية  
الشكل. ثنائية الارتكاز. أثمارها كثيفة التجميع.  
أثمارها يسمر من حزيران إلى تموز.

## ١٤٢٥٤ - سنخة صكي \* ، سنخة حيكزي ،

*Cassia scutifolia* (S).  
*Casse à feuilles aiguës*, *Séné moka*, *Casse séné* (F).  
نوع من السنخة البري المحلي يكثر وجوده في تمام البحر  
الأحمر. ثمره سنخة اللد تملأ نحو ٢ أثمار. أوراقها  
خالية أو سباعية الأوراج. وربها خفيفة النصل  
الأخضر الأطول المائل. تقع أوراقه وقلمه سهل  
السنخة.



سنا صكي

## ١٤٢٥٥ - سنخاج

*Sua* (F). *Soot* (E).  
هي المادة السوداء التي تتجمع وتظلم على جدران الدخان  
وقد تتصلب كماء لزقي لأنها لا تخلو من.

## ١٤٢٥٦ - سنخة مبدولة \*

*Dios dios* (S). *Dios common* (F). *Common dios* (E).  
حورية من المناكب الساعية لقائمة ثنائية الرواية،  
سلبية المقتات، من فصيلة القويبات. جسمها صغير  
القد يصل نحو ٨ سم. عند الذكر وهو ١٢ سم. عند الأنثى.  
صغارها قنسي الشكل، صغير الجرم، اسمر اللون.  
يحياها زبختان. صغارها صغار. تكاثرها بديقات. جرائدها  
متباعدة الطول، كثيفة الملب. يلقاها يغيي الشكل،  
حتي الآن تتوسل بقعة بؤرية. تألف الأوراش  
للحاسة وتقترب من الساكن المملوء. قنبا الحشرات  
الصغيرة. تسرح في الجار. يأتها الشوي يسمر نحو  
خنة أشهر. مكاتبها صلبة بلورية الشكل تحركها تحت  
الحجارة. تعيش الآن إلى حين. تجمع المكان ونحسه.



سنخة مبدولة

## ١٤٢٥٠ - سنخيق

*Tanon*  
خيشة في البئر تحيط بعتق الثور كالطوق وها سميان.

## ١٤٢٥١ - سميك الدكيب

*Crucicade* (F). *Crassicaudate* (E).  
نمت ترمفي يطلق على كل حيوان متماثل اللب.

## ١٤٢٥٢ - سميك الساق

*Crassicaule* (F). *Thick-stemmed* (E).  
نمت ترمفي يطلق على كل نبات ساقه سميكة.

## ١٤٢٥٣ - سميك الزوكة

*Crassifolia* (F). *Crassifolia* (E).  
نمت ترمفي يطلق على كل نبات يحمل أوراقا متماثلة.

## ١٤٢٥٤ - سبيلق \*

*Cephalocaux* (S). *Céphalocaux* (F).  
جنس الشجار حرجية سبورية بطيئة النمو من الملقحيات.

أنواعه المروفة قليلة العدد. جميعها شرقية التمت مبعها  
الباهان والصين والهند وإيران. الشجار تملأ من ١٥  
ال ٢٠ سم. أغصانها متعاقبة. أوراقها أبيض. نصلها ضيق  
الصفحة بطول من ٥ إلى ١٠ سم. ويخرج من ٤  
٦ سم. صفحته السطلي مقبوسة إلى خمسة خطوط ثلاثة  
منها خضف واثنان اشيران. أثمارها وسيدة للسكن. طليقة  
التجميع. أغصانها صلبة حيلة الصف، شائعة  
الاستعمال السناعي واللزني.

## ١٤٢٥٥ - سسيلي

*Tarin common* (F).  
هو لكثير المبدول، أغلبه.

## ١٤٢٥٦ - سين \*

*Age*  
هي في الحيوان مقدار العمر منذ الولادة. وفي الشجرة  
منه يند نموها. وتعرف من الأوراق بلحم سناتها.  
أما من الشجرة فلهيتم مراكز النمو السقية في قطاع  
ساقها.

## ١٤٢٥٧ - سين \*

*Dent* (F). *Tooth* (E).  
من ج الأسنان. تعتبر الأسنان من أعضاء الجهاز الهضمي  
لأنها تقدم بوظيفة مضغ الطعام وإعدادها في مركزها في  
استنخ تلك الطوري والسلي. تتكون من ثلاثة أجزاء  
التي هي: التلق والجذور. ومن طيتين: التلقية للأحفة  
والجسمية الباطنية للمضغ. ويقسم الأسنان إلى عدة  
أنواع مرجحها العمل المنوط بكل منها. في الخيل مثلا،  
تقسم إلى: ثلثة ورهاية وقارح ولاب وفريس.

## ١٤٢٥٨ - سين العجوز

هي حرن لقم، أغلبه.

## ١٤٢٥٩ - سنكا ، سنكي

*Cassia* (S). *Casse*, *Séné* (F). *Cassia*, *Senna* (E). *Kassia*, *Sene* (D). *Cassia*, *Senna* (I).  
جنس نباتات مدمرة من فصيلة القويبات. أنواعه زهاء  
٤٠٠ منظرها بري ويضها زراعي زيني. فيها  
الأشجار والشجيرات والأجانب. أوراقها مركبة، وبيقة،  
ثلمية. أثمارها متدوية التجميع. أثمارها سنخة أو  
متصلة اللد، قصيرة الأنبوب، متراكبة للفصل والتلات.  
ثمارها قرن عذرية أسطوانية سطليقة. منهاها الحلية  
سوية. أشهر أنواعها الحلية والزينية ما لي.



ويعيش الذكر الى حين يكوم الاثني التي تنقضي عليه ||  
معتبر من الدواب المفيدة .

Emeri (F). - سَنَة دَج ، سَنَة جَج

Emery (E).  
سموق شديد الصلابة ينجم عن تحطيم القرند يستعمل في  
صقل وحش وتلك المادان والاخشاب .

Place (F). Ton (E). - سَنَة ك

من اجزاء الحافر عند الحيل .

1٤٢٦٨ - سَنَة ك

هو القاردين ، اطله ، مه الازرق والحداقي والاطليبي .

1٤٢٦٩ - سَنَة ك هِنْدِي هو اذخر مكى ، اطله .

1٤٢٧٠ - سَنَة ك ، سَنَة ك ، سَنَة ك

Epi (F). Ear of corn (E).

هي ثورة بعض النباتات انحصها النجيلية . والسنبلة  
جميعية من السليلات المتتابعة المركبة على محور واحد .  
اما السنبلة فهي وحدة التزير وقد تكون زرة او شعبة  
التجميع . ثمارها حبوب جافة .

Epiage (F). Earing of grain (E). - سَنَة ك

راجع اسهل .

1٤٢٧٢ - سَنَة ك

شعبة من النجيل تعرف بالنجيل الازرق . اطله .

Epi (F). Spica (E). - سَنَة ك

نجم لير من برج المدراء يعرف بالسالك الازل ، اطله .

Cymbula (S). - سَنَة ك

Cymbula (F). Cymbula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الايل  
وفصيلة السيلوليات . انواعها المرفوعة ثلاثة اعطائها البحر  
الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي انحصها  
الجنوبية || اصداؤها غسرية الماء ، اهلجية الشوزن ،  
شائكة الاطراف ، شائعة . اجسامها شفافة ، صغيرة  
الزروس ، ثنائية القواطع واليمين ، وبيدة الاعظام .  
زمانها مسطحة رقيقة ، بيضية الشوزن || تسبح وتقوم  
على ظهرها ، بطونها موجهة نحو سطح الماء .

Cymbulidae (S). - سَنَة ك

Cymbulidae (F). Cymbulidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الايل .  
اجناسها وانواعها المرفوعة قليلة العدد ، منتشرة في جميع بحار  
البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اصداؤها صغيرة ، اهلجية  
الشكل ، معتدلة التنطيط ، غسرية الماء ، متجانسة  
المصاريع ، مسطحة الزانفت اي الاربدة المسطحة  
البيضية الشوزن || اعرف اجناسها واشهرها السيلولة .

1٤٢٧٦ - سَنَة ك ك ك ، سَنَة ك ك ك

Exercice (F). Financial year (E).

هي في الاصطلاحات الحاسبية حساب السنة من المدة  
التي تنقضي بين حسابين متتاليين || وهي في الاصطلاحات  
المالية حساب المدة التي تنقضي بين ميزتين .

Année-lumière (F). - سَنَة ك

Light-year (E).

السنة الضوئية هي المسافة التي يجتازها الضوء بمدة ٣٦٥  
يوما بمعدل ٣٠٠٠٠٠ كيلومتر بالثانية . وقد تبلغ نحو  
عشرة آلاف مليار كيلومتر .

1٤٢٧٧ - سَنَة ك ك ك

Hypocraeasae (S). Hypocraeasae (F). Hypocraeasae (E).

عمارة فلور مجهرية من فصيلة المشويات ورثة الزرقوت .  
تتميز باصنافها البنية الزاوية الالوان || اجناسها  
عديدة تختلف باختلاف مثل البرغ وشكل البنية وما  
تصله من اصناف || افرها من الوجهة الزراعية  
الاقتصادية الاجناس التالية : الرءاء ، الماكوب ،  
المروحة ، الهوم ، القصبة ، القنار ، الحبة ،  
الهكة ، التوبة والوشية .

1٤٢٧٨ - سَنَة ك ، ك ك ، ك ك ك

Tapirus (S). Tapir (F). Tapir (E).

جنس حيوانات برية من فصيلة السناديات . اولاه خمسة  
منها واحد اسوي واربعة امريكية . جميعها كبيرة  
الجلقة القصبة ، جلقة الرأس والخط الذي يشبه الخرم  
القصير . ثوبها ابيض اللون ، اذنها صغيرة مستقيمة ، ذيلها  
بالقصر || اخلافتها حنية تعيش في المناطق والاحراج  
الكثيفة قوتها الاعشاب ويولدو النبات .

1٤٢٧٩ - سَنَة ك ك ك

Tapiridae (S). Tapiridae (F). Tapiridae (E).

فصيلة حيوانات برية وحيدة الجنس تتميز بفخامة الجفة  
وطول الخط وصغر الاذن وقصر الذيل . قوائمها ثلاثية  
الاصابع الخلفية .

Gompholobium (S). - سَنَة ك

Gompholobium (F). Gompholobium (E).

جنس نباتات برية جنسية ومشيعة معمرة من البذراريات  
وفصيلة القرنيات الفرافية . انواعها المرفوعة نحو ١٢  
منها بعض مناطق استراليا || اوراقها صغيرة النصال  
متقابلة . ازهارها عنقودية التجميع . ازهارها محورية  
الارتكاز او تاجية ، عطرية العرف ، منها الابيض  
والاصفر والوردي والايواني || اوراقها وازهارها جميلة  
لذيذ الماشية وقد تسب لها التسم ولوت .

1٤٢٨١ - سَنَة ك

Bosse (F). Boss, Hump (E).

حبة في ظهر البير وهي كتلة دنية تعلو السلسلة  
القفيرية يستند منها الجمل ما يننيه عن الطعام اذا خلا  
جوفه من الغذاء .

1٤٢٨٢ - سَنَة ك

Basifuge (F). Basifugal (E).

لست تعريفية يطلق على كل نبات هامى النوة فقط .

1٤٢٨٣ - سَنَة ك

Production alternative (F). Alternative produce (E).

صفة الاتجار المتناوبة الحمل كالزيتون .

1٤٢٨٤ - سَنَة ك ك ك

Lance d'arrosage (S).

Sprinkling spear (E).

جهاز يوضع في طرف القنصل او التبريع لضبط الماء  
وتوجيه رشه .

1٤٢٨٥ - سَنَة ك

Lancéolé, Lanciforme (F).

Lanceolate (E).

ما كان شكله كالسنان .



سناد

## \* ١٤٢٨٨ - سنجاب النخل

*Sclurus palmarum* (S). *Ecureuil palmiste* (F). *Palm squirrel* (E).

نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٥ سم. وذنبه ١٢، ثوبه ألّ الصبغة البهلاء ملوّه ثلاثة خطوط يمش تقطبه من النقرة إلى الذنب ٥ موطه الحث. يأنف الأشجار المشرقة أخصها النخل ويقترّب من الأماكن الآلة.



سنجل

*Sclurus indicus* (S). \* ١٤٢٩٠ - سنجاب الهند

*Ecureuil de l'Inde* (F). *Indian squirrel* (E).  
نوع من السنجاب الكبير القذ طولهُ نحو ٤٥ سم. وذنبه ٤٠، ثوبه متعدد الألوان رأسه واذنائه وصقته وأبطله إلى الجلاوة القنزيرة للوج. ظهره وذنبه وبرازمه سود. يمش إلى الصفرة البنية ٥ يأنف الإرجاج الكثيفة يسرح في البئر. قوته البئر والمعاد البنية.



سنجاب النخل

## \* ١٤٢٩١ - سنجاب شائع

*Sclurus communis* (S). *Ecureuil commun* (F). *Common squirrel* (E).

نوع من السنجاب موطه فسح الأرباب يمتد من أقاصي الشرق إلى أطراف أوروبا. جسمه مستطيل لشكل يبلغ نحو ٢٥ سم. وذنبه ٢٢ سم. ثوبه ألّ الصبغة الصبانية، صدره ويقله إلى البياض. فرائزه مستعدة شائعة الاستعمال.

*Scleridae* (S). \* ١٤٢٩٢ - سنجابيات

*Scleridae* (F). *Scleridae* (E).  
فصيلة حيوانات لبنة قاضية تشغل عدة أجناس والنبه من الأتواع. أعرف أجناسها السنجاب، الجلمج، والناميه والمطول والمربوط والبطش والبستينوس والبلمريس. جميعها مستطيلة الأجسام والأذنان، ملوّه الجراط العليا موطها العام. تألف الثباب والأسراج. تتسلق الأشجار، قوتها البئر ومغفل المواد النباتية.



سنجاب شائع

## \* ١٤٢٩٣ - سنجابيات الشؤوب

*Sciurumorphes* (F).  
مركبة حيوانات لبنة من رتبة القوافم تشغل ثلاث فصائل السنجابيات والحاروديات والحيريات.

*Centospora* (S). \* ١٤٢٩٤ - سنجة

جنس فطور مجهرية من الرينديات وظيفتها الطعيات. يتميز بكتانه المستطيلة الملبه، المحببة الشكل والقرنوية اللون ٥ يظل على الأوراق فيقرها ويل البئر فيملها قبل ادراكها ٥ أنوله للمفوعة أثنان:

*Centospora acerina* (S). سنجة الأسفندان

*Centospora bromi* (S). سنجة البرنق

*Bigarrure* (F). *Motley* (E). \* ١٤٢٩٥ - سنجة

اجتماع الأشكال والألوان دون رابط أو قواس.



سنجة

*Anergia* (F). *Anergy* (E). \* ١٤٢٩٦ - سنجلة

السجلة أخطاء عوارض الالتهابات.

*Pachycephalus* (S). \* ١٤٢٩٧ - سنجوس

*Pachycephala* (F).  
طائر من الجواثم سنات المنقتر يتسلي إلى فصيلة المهرجات. موطه يمتد من العراق إلى ماليزية ٥ يحوي موطها وعصاها في طلب القوت. قوته الحشرات والبروز والباراة.



سنجوس

*Centrosoma* \* ١٤٢٧٨ - ستروزوم  
هو الجسم المركزي الجبري في الحيوان والخلوي في النبات.

\* ١٤٢٧٩ - ستنروزم هي العملية، أمليا.

*Santonine* (F). \* ١٤٢٨٠ - ستنونين

*Santonin*, *Santoninum* (E).  
جهر نعال يستخرج من مختلف أنواع الشج أخصها الشيمان. وهو من المواد الطبية الشائعة الاستعمال.

*Centigrade* \* ١٤٢٨١ - ستنغراد  
مقسوم إلى مئة درجة.

*Centigramme* (F). \* ١٤٢٨٢ - ستنغرام

*Centigram* (E).  
الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها الفرام.

*Scintilla* (S). \* ١٤٢٨٣ - سنثيل

*Scintille* (F). *Scintilla* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرنويات صفيحات إيجلهم وظيفتها اللطويات. أنوله المفروقة نحو ٥٠ منتشرة من خط العرب إلى خطوط الهند وجزر ألبانيا ٥ أصدانها يبقية الشوزن، ولبنة اللقن، ثالثة المصارع، مالة السطوح جميلة الألوان الزائفة.

*Centilitre* \* ١٤٢٨٤ - سنليلتر

الجزء الواحد من أصل مئة جزء قسم عليها اللتر.

*Centimetre* (F). *Centimetre* (E). \* ١٤٢٨٥ - سنتمتر

وسدة قياسية متركبة تساوي جزء من أصل مئة جزء الذي يتألف منه المتر. والسنتمتر يقسم إلى عشرة ملليمترات.

\* ١٤٢٨٦ - سننج، سننج  
السنج والسنج هو الثياب، أمليا.

*Sclurus* (S). \* ١٤٢٨٧ - سنجاب

*Ecureuil* (F). *Squirrel* (E). *Eichhörnchen* (D).  
جنس حيوانات لبنة قاضية من فصيلة السنجابيات. أنوله نحو ٧٥ سم. جميعها صغيرات القذ، مرفحات الجواس، ولها الذئاب طوالب جيليات الصف. تألف الإرجاج والقابات. تتسلق الأشجار بسرعة وخفة. قوتها المواد النباتية. تفضل البئر والقرنيمات والزلوي. يقال أنها تستلذ بيش الصائير ٥ ترتب أجسامها في صغور الأشجار، مداخلها من الشرق وغارها من الغرب. أناتها تقسم من ٣ إلى ٦ أصداس تبصر يد وضها بانبسوح ٥ أعرف أنوله واشهرها ما يلي.

*Sclurus vistrinosus* (S). \* ١٤٢٨٨ - سنجاب القاب

*Ecureuil des jungles* (F).  
نوع من السنجاب صغير القذ طولهُ نحو ١٢ سم. وذنبه كذلك. ثوبه ألّ الصبغة الصبانية ملوّه ثلاثة خطوط صفر تقطبه من نقرة الرأس إلى طرف الذنب ٥ موطه سرنديب. قوته البئر. يقترّب من الأماكن الآلة ويدخل المساكن في طلب السكاكر والخلويات والبياض.

من أي نوع كانت ان سنية او غيرها ، الى مستأجرا ومن الواجب ان يشتمل على كل شروط عقد التخل .

١٤٣٠٨ - سَنَدٌ ثَلَاثِيٌّ (E). Triptyque (F).  
هو من السندات الخاصة التي يصرح بها استيراد بعض الاشياء وقتياً . انحصا السيرات على ان يصاد تصدير امثالها .

١٤٣٠٩ - سَنَدٌ قَائِلُ الْإِسْتِزَالَةِ Obligation amortissable (F). Redemnable obligation (E).  
هو السند الذي يمكن تسديد قيمته من طريق الاستهلاك .

١٤٣١٠ - سَنَدٌ قُسْطُ التَّأْمِينِ Billet de prime (F). Bonus bill (E).  
هو سند أذني يلتزم به المليون ان يدفع الى المليون قسط التأمين في يوم يتفقان عليه .

١٤٣١١ - سَنَدٌ حَامِلُهُ Billet au porteur (F). Bill to bearer (E).  
سند يلتزم موقه دفع مبلغ معين من المال في موقه معلوم الى أي شخص كان يحمل هذا السند .

١٤٣١٢ - سَنَدٌ لَدَى الْإِطْلَاعِ Billet à vue, B. à volonté (F). Bill payable at sight (E).  
سند يلتزم موقه ان يدفع الى شخص سمي او لأذله مبلغاً من المال بمجرد تقديم السند اليه .

١٤٣١٣ - سَنَدٌ مُرَوَّرٌ Passavant (F). Passe, Permit (E).  
سند بيان بضائع خاضعة لرسوم جمركية او ضرائب غير مباشرة تفق منها في مرورها الى وقت معين ومن مصلحة محددة .

١٤٣١٤ - سَنَدٌ مُتَدَوِّرُ الْفَدَاوِيلِ Effet négociable (F). Negotiable bill (E).  
من السندات التجارية المتداولة بالتحويل والتعامل بها . تحوّر في صيغ خاصة وتكون قيمتها وأجها الاداء لدى الاطلاع عليها او بعد اجل قصير .

١٤٣١٥ - سَنَدٌ مُتَصَرِّفٌ Effet bancable (F). Bankable bill (E).  
هو السند الذي يحمل جميع الشروط المطلوبة لحسمه من البنك .

١٤٣١٦ - سِنْدَارِيَّةٌ \* ، دُوَيْبِرِيَّةٌ \* Deuterophoma (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الفصليات . يتشيز بيكتيداته الحبيبة التركيب ، الموضوعة التي ، الخالية من الوثيمة الظاهرة . يوفاته قائمة عند اطراف المشيج الذي يلفف جويل البكتيدية الداخل في لونه الوسيد المعروف والمندوس حتى الآن هو التالي .

١٤٣١٧ - سِنْدَارِيَّةُ الْحَمِيَّاتِ \* ، وَهْمٌ سِكْتُو Deuterophoma tracheiphila (S). Mal sacco (F).  
فطر مجهري يصيب البسوت الحامض والارنج . مظهره الخارجي جفاف فباني يحمل بعض الانداز بعد استفرار وذيل اوراقها يبقية جفاف الماء وانحراف لون المادة الخشبية نحو الجورة الزاوية ثم السرة القائمة || يكالغ بتقليم وحرق الاجزاء الموصوبة وتطهير الجروح .

ملحبه الخيالي جماعي . جماعته متوسطة السدد || جسمه صغير القند بطول نحو ١٨ سم . رأسه كبير الجرم ، متقاربه مستد الحجم ، ضلع . جناحه اذنان . ذنبه مسطيل الشكل ، مغطرم الطرف . ثوبه الى الشقعة السوداء تيقن في الرأس والرقاء وتغير في البطن . زوره حاجي اللون يطوقه حمار اسود يمتد من قاعدة الشقار الى العين فالمنتق فأمل الصدر . ايلابه منشفة بالاعبر . متقاربه ورشاء واصابعه الى السرة القائمة || يدن منه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحفن وسدما من ٤ الى ٥ بيضات . الاكر يتنن ها الفداء .

١٤٢٩٨ - سَنَخٌ هو الغشروب ، اطليه . ج اسنخ .

١٤٢٩٩ - سَنَخٌ Collet (F). Collier, Neck (E).  
السرخ هو الأصل . وهو الجزء من الجذع تقدره التربة . ج اسنخ وسرخ .

١٤٣٠٠ - سَنَدٌ Obligation  
كل التزام قانوني يرتكز على عقد رابط .

١٤٣٠١ - سَنَدٌ Billet (F). Bill (E).  
كل ورقة مكتوبة تحتوي على التزام يدفع مبلغ معلوم من النقد .

١٤٣٠٢ - سَنَدٌ ، مُسَكَّنَدٌ Titre (F). Bond (E).  
هو المحرر الذي يوضح فيه للعدل القانوني او للعد المحامي الذي يحدث آثاراً قانونية كسدة الدين وسند الملكية . والسند صيغ عديدة ، أشهرها :

سند إذني  
سند اسمي  
سند إطلاق تصرف الدين  
سند إسمائي  
سند أولي  
سند تطليقي  
سند حامله  
سند وهمي  
Titre à ordre (F).  
Titre nominatif (F).  
Titre paré (F).  
Titre reconnaît (F).  
Titre primordial (F).  
Titre excusatoire (F).  
Titre au porteur (F).  
Titre putatif (F).

١٤٣٠٣ - سَنَدٌ إِذْنِي Billet à ordre (F). Bill payable to order (E).  
سند يصعد من موقه بان يدفع الى شخص آخر مبلغاً معلوماً بعد اجل قصير لدى الاطلاع على السند .

١٤٣٠٤ - سَنَدٌ الْخَوَّلُ ، سَنَدٌ هَبَاكِين Warrant  
سند أذني يثبت بموجبه دفع بضائع موقدة في الخازن السوية .

١٤٣٠٥ - سَنَدٌ الرَّهْنُ الزَّرَاهِي Warrant agricole (F). Agricultural warrant (E).  
سند أذني يذنه الزارع الى دائته يثبت به انه رهن له دين تقليه من الحيازة سبتجات زراعية او حتاداً صناعياً ومخاصيل ومأرا او عقارات بالقيمة او بالتخصيص .

١٤٣٠٦ - سَنَدٌ الرَّهْنُ الْمَقَارِي Cédule hypothécaire (F). Mortgage schedule (E).  
سند مغنور القيد كالأوراق المالية يدل على قيد الدين على المقار في السجل العقاري .

١٤٣٠٧ - سَنَدٌ الْفَحْنِ ، لَدَى كَرَةِ الشَّحْنِ Connaissement (F). Bill of lading (E).  
إيصال بالبضائع لشحونية يقسمه صاحب الشحونة ،



سندارية الحميات

الاصابع || جسمها صغير لثقله يطول من ١٢ الى ١٥ سم. رأسها مخروطي الشكل. عينها لوزيانية صغيرة. اذنانها خافتتا الغشاء السيلاني الاسمر الغلاف. منقحاً مستطلة القصر والحنطة. ذنبها مستطيل الطول، سريع الانقسام. ثوبها الى الصلبة الخشبية تلوحا رقيقة بمراء وتغطى الجير. ساقها ثوبها كثيف بالفصولة اي انها تلتصق المحيط المحيطة المحيطة فيه || الاذن اكبر قليلاً من الذكر ولها ثوباً سم. تعيش من ٤ الى ٨ يضيأت فطرها في الموائل الجنوبية المرض || تألف الرياح وكثيراً الريل. تعيش في افنق تتخلها بين بطور النبات. تسرح في النهار ويبيت في الليل. قوتها الحشرات الصغيرة والديدان والباب والهام || تعتبر من الزواقات النافعة.

١٤٣٧٥ - سِنْدِيَّانُ هو السندبان الاصغر، اطلبه.

١٤٣٧٦ - سِنْدِيَّانُ بِطُوط Quercus (S).  
Chêne (F). Oak tree (E). Eiche (D). Quercus (I).

جس أجار حرجية من فصيلة السندبانيات. أنواعها زهاء ٣٠٠ معظمها أجار كبيرة دائمة. اشجارها صلبة صناعية. أوراقها جامدة جلدية. ثوبها بلوطية حلقة. قشور بعضها فولية وأوراقها دباغة || أشهر أنواعها ما يلي.

١٤٣٧٧ - سِنْدِيَّانُ أبيض Quercus alba (S).  
Chêne blanc (F).

شجرة جامدة مهددة ارمكة الشالية. طولها من ٢٥ الى ٣٠ م. ساقها بيضاء اللحاء. ثوبها حلقة تطول من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من ٤ الى ٧. ثوبها ثلاثي او رباعي التضخيم الجانبي، أزغب الصلبة السلي، ابرط العليا. لونه يتغير مع العمر من الاصفر الباهت الى البنيجي || ثوبها صغير الحراشف. بلوطها طري القشور وألباب.

١٤٣٧٨ - سِنْدِيَّانُ أحمر Quercus rubra, Q. borealis (S). Chêne rouge (F).

شجرة مبروتية طولها من ٢٥ الى ٥٠ م. ثوبها وزواياها جلوية اللون. أوراقها تطول نحو ٢٢ سم. وتعرض ١٥. ثوبها مستعرض التضخيم، واسع الاطراف، جامد اللسيح اللامع الذي يتحرف من الخضار الباهت الى الحمرة الجلوية || ثوبها قوي الشكل مستطيل الحراشف. بلوطها كبيرة، حلقة، لها الى الحمرة السوداء.

١٤٣٧٩ - سِنْدِيَّانُ أخضر بِلُوطُ أخضر Quercus ilex, Q. Ballota (S). Chêne vert, Yew, Ballota (F). Evergreen oak, Holly oak, Holm oak, Ballota oak (E). Stechelche (D). Eice, Lccio, Lecina, Quercus verde (I).

نوع مبروتي كثير الحشوب يربط في الاربة الكلكية. أجارها طولها من ٢٠ الى ٢٥ م. اوراقها فلسة. ساقها حلقة اللحاء الصلبة الكمامة. اوراقها حرة، لاقامية الشكل والنتن، ثوبها حلق الحشور الاسمر، مره، تد من ٦ الى ١٠ اوراق || ثوبها بجمرة اللون، زغبية الحراشف المتراكمة.

١٤٣٨٠ - سِنْدِيَّانُ الأزغب Quercus lanuginosa, Q. pubescens (S). Chêne pubescent (F).

شجرة جامدة تربط في الاراضي الكلكية. طولها ٦

Utricularia (S).  
Utricularia, Lentibularia (F). Bladder-wort, Hooded water milfoil (E). Wassenschlauch, Grosser wasserhalm (D). Utricularia, Erba vessica (I).

نبات عشبي بري مائي من فصيلة السندبانيات. جلوده حرجية، ساقه طرية. اوراقه مركبة ريشية عطية. اثماره فردية او مضوية تتجمع وتتركز على السراخ. لها يختلف مع الانواع ثوبا الاصفر والاحمر والازرق.

١٤٣٨١ - سِنْدِيَّانُ فصيلة Lantibularia, Utricularia (S).  
Lentibulariades, Utriculariades (F).  
Lentibularia, Utricularia (E).

فصيلة نباتية من مزدوجيات الفلقة، قليلة الاجناس والانتواع جميعها من النباتات المائية التي تعيش في غمرة الماء او تطفو على سطحه. اشهرها السندبان.

١٤٣٨٢ - سِنْدِيَّانُ Thibaudia (S).  
Thibaudia (F).

الأشجار سندبان. جنس شجيرات برية وفردية من فصيلة الخنثيات. أنواعها المعروفة نحو ٤٠ جميعها من نباتات المناطق الاستوائية من المابين للقدم والجلد || ساقها فردية طولها من مترين الى اربعة امتار. اوراقها متعاقبة، سنانية الاتصال الجامدة القامة. اثمارها نسي الجسم، محوري الارتكاز. اثمارها جملة الشكل، عديدة اللون. جميعها الى الحمرة المتفاوتة التضخيم والملاجات.

١٤٣٨٣ - سِنْدِيَّانُ عذبة Tetracis articulata (S). Thuya articulata, Cyprès à sandarsque (F). Sandarsach tree (E). Sandarsachbaum (D). Sandaraca (I).

شجرة حرجية وسيدة الجلس والزنغ من السرويات. مهددة بلوط الاطلس. ساقها فردية كثيرة العقد القرية. بلوطها لثوي، طولها من ٥ الى ١٥ م. ثوبها حلقة. اوراقها ضيقة، رباعية، حرة. اثمارها كروية طولها يراوح من ٨ الى ١٢ م. جلاها أربع خير متساوية اللون || يتسفر منها صمغ السندبان المشهور. اشجارها فاخرة الصنف طرية اللون.

١٤٣٨٤ - سِنْدِيَّانُ Callitris (S).  
Callitris (F). Arar tree (E). Echter schmuckzapfen (D). Callitris (I).

جس أجار وشجيرات حرجية من السرويات. أنواعها نحو ٢٥ ساقها طولها من ٤ الى ٢٠ م. اثمارها كثيفة تتجمع. اوراقها فلسية الشكل، حرة. اثمارها وسيدة اللثوي والسكن. اثمارها شبه كروية، سلبية او ثمانية الجراحات الشفيرة الشكل، الخفدة. يزورها اهلجية وسيدة الجناح || يتسفر من بعض أنواعها صمغ السندبان الذي يشبه صمغ السندبان ويستخدم استماله. لها أجار غنية بالقطران. اشجارها رامة، جيدة الصنف شائعة الاستعمال الصناعي.

١٤٣٨٥ - سِنْدِيَّانُ Pammodromus (S).  
Pammodrome (F). Pammodromus (E).

حيوان يربط من البطاء وفصيلة السقايات ثابته الاسنان، مكثبات الاسنة الحرجية، ولباها القوام، خاصيات



سندبان



سندبان



سندبان



سندبان



سندبان



سندبان



سندبان

الحراثة. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها لمساء اللحاء. بتانقها مرسحة. أوراقها حرة، بيضية، مسنة الزام الاخير. نصلها جامد النسيج، بحري الخضار، خلي الصفعة السفلى، يطول من ٧ إلى ١٥ سم. ويعرض من ٣ إلى ٦ || تقرونها خلي الحراشف الدقيقة. بوليها مستطيلة.

### ١٤٣٣٧ - سِتْدِيَّان بِلَاح ، بَلَسْج

*Quercus coccifera* (S). *Chêne kermès*, *C. cocciné* (F). *Kermes oak*, *Scarlet oak* (E). *Kermes alch*, *Kermesbaum* (D). *Quercia della cocciniglia*, *Quercia del kermes* (I).

شجرة دقلة مهدها حوض البحر المتوسط تكثر في الاراضي الكلسية، ثلثو من ١٥ إلى ٤٠٠ سم. أوراقها حرة، احليلجية، ذلقة، تطول من ٢ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٢٥ سم. نصلها صلب النسيج المائل للاع، لونه ا الخضر الزاوي، حذاه مفرس الحافة، فسح الاضلاع، شالك الحلب || تقرونها شالك الحراشف المتراكبة. بوليها لاس قشرة الحطية يطوى توضيح عايق.

### ١٤٣٣٨ - سِتْدِيَّان عَصَصِيَّيْ الدمر

*Quercus conferta* (S). *Chêne à glands fasciculés* (F). شجرة سبروتية جميلة الشكل ثلثو من ٣٠ إلى ٥٠ م. أوراقها حاملة مستطيلة، نصلها متواج الصفعة. خلي لشيرة السفلى. نصوسه عديدة، متقاربة، ضيقة الاضلاع || تقرونها قلنوسو الشكل، قليل العمق، متراكب الحراشف النقية القوية. بوليها تطول نحو ٣ سم. يطوها نسيج مستطيل عايق. ثمارها ثنائية او ثلاثية التجميع.

### ١٤٣٣٩ - سِتْدِيَّان رُوسِي ، مَكُول

*Quercus aegilops* (S). *Chêne vilain*, *C. aegilops* (F). *Valonian oak*, *Valani oak* (E). *Knoper eiche*, *Valonian eiche* (D). *Quercia da concia*, *Q. della vallois* (I). شجرة سبروتية مهدها الشرق الأدنى ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. أوراقها حاملة، بيضية، مسنة الزام الاخير، تطول من ٦ إلى ١٢ سم. وتعرض من ٣ إلى ٧. نصلها جامد النسيج، منشاري الحافة || تقرونها كبير اللد مستطيل الحراشف شائع الاستعمال في البهاية والصباغ.

### ١٤٣٤٠ - سِتْدِيَّان شُورِي \* ، سِتْدِيَّان الْفَلِين

*Quercus suber* (S). *Chêne liège*, *Surfer* (F). *Cork oak*, *Cork tree* (E). *Kork eiche*, *Korkbaum* (D). *Quercia sughero* (I). شجرة جامدة مهدها بعض مناطق حوض البحر المتوسط. يتكرر ويوجد في افريقية الشالية، ترطب في الاتربة الرملية. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. خام ساقها شجيرة قوية التركيب يستخرج منها الفلين. أوراقها حرة، داخلة الخضار، تطول من ٣ إلى ٦ سم. وتعرض من ١٥ إلى ٤٠ م. نصلها يضي الشكل جامد النسيج، امروا الصفعة العليا المايقة الخضار، اذنب السفلى الطلاء اللين. حروته من ٥ إلى ٧ ازواج || تقرونها غزوي الشكل اطول الحراشف القصيرة المستعرضة. بوليها متوسط اللد، مدبب الشلام.

### ١٤٣٤١ - سِتْدِيَّان صِيْغَاي

*Quercus tinctoria*, *Q. velutina* (S). *Chêne querceron* (F). شجرة سبروتية ثلثو من ٢٥ إلى ٣٠ م. بتانقها وزيتاتها خفيفة، زياد البشرة، صفراء اللين. أوراقها تطول

الى ٢٠ م. جلدها زلي. ساقها عذاه متعرجة. قهوها مسطحة، عتقة، سواد اللين. اثنائها وبتانقها زياد اللحاء. أوراقها حاملة، خلية الصفعة السفلى، تطول من ٥ إلى ٨ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦ || تقرونها صير اللد، مدبب الحراشف الشاككة. بوليها ذقيقة، مستطيلة، مويجة، سادة الشلام الاسود.

### ١٤٣٤١ - سِتْدِيَّان اَسْوَد (S). Quercus ferruginea

*Chêne noir* (F). شجرة ريفية مهدها ايريك الشالية. ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. أوراقها كبيرة اللد تطول نحو ٢٢ سم. نصلها ثلاثي او خماسي التجميع، جامد النسيج، جلدي الحار، خلي الصفعة السفلى || تقرونها يضي الشكل. بوليها صغيرة اللد، ايرية الشلام.

### ١٤٣٤٢ - سِتْدِيَّان اَسِي الْوَرَق

*Quercus myrsinaefolia* (S). *Chêne à feuilles de myrte* (F). شجرة سبروتية مهدها اليابان. ثلثو من ١٥ إلى ١٥ م. ساقها مسطحة اللحاء. أوراقها حرة، احليلجية، آسية، تطول من ٨ إلى ١٥ سم. وتعرض من ٢ إلى ٤. نصلها غائر المروق امروا البشرة. بحري اللين.

### ١٤٣٤٣ - سِتْدِيَّان اَشْغَر ، سِتْدِيَّان تُرْكِي ، لِكْ

*Quercus cerris* (S). *Chêne chevalin*, *C. de Bourgogne*, *C. lombard*, *Cerro*, *Doudier* (F). *Iron oak*, *Mossyup oak*, *Turkey oak* (E). *Zarzelche*, *Turkische eiche* (D). *Quercia cerro*, *Cerro* (I). شجرة سبروتية مهدها الشرق الأدنى واروپة ثلثو من ٢٠ إلى ٣٥ م. أوراقها حاملة تطول من ١٥ إلى ١٤ سم. وتعرض من ٤ إلى ٦. نصلها جامد النسيج، عايق الخضار البحري، رياضي او سداسي او ثنائي التجميع. حروته الرئيسية تد من ٦ إلى ١٥ ازواج يتخللها اصابع متعرجة بيضاء || تقرونها قوي الحراشف الحطية الحطية البشرة.

### ١٤٣٤٤ - سِتْدِيَّان الْوَرَق \* ، عَذَر

*Quercus alata* (S). *Chêne starle* (F). شجرة سبروتية حرمية الشكل ثلثو من ٢٠ إلى ٢٥ م. يقال ان مهدها الجزائر وهي مبلولة في بعض جرد جبل وادنتين من تينان. أوراقها حاملة تطول من ٨ إلى ١٥ سم. نصلها جامد النسيج، مفروض الصفعة المستديرة التجميع، تقرونها اطول اللين غزوي الحراشف الحطية البشرة. بوليها كبيرة اللد طويلا نحو ٤ سم. وقطرها ٢.

### ١٤٣٤٥ - سِتْدِيَّان الْكَلْس ، سِتْدِيَّان الْبَرْتُكَل عَصَصِيَّي

*Quercus lusitanica* (F). *Chêne à galles*, *C. du Portugal*, *C. des teinturiers* (F). *Dyer's oak*, *Gall oak*, *Nut gall oak* (E). *Eiche galliche*, *Gallpilz eiche* (D). *Quercia della galla* (I). شجرة سبروتية مبلولة، ضيقة اللوحة، متصبة القروع ثلثو من ١٥ إلى ٢٠ م. اثنائها وبتانقها خلية اللحاء. أوراقها حاملة تطول من ٥ إلى ١٥ سم. نصلها يضي الشكل مفروض الحافة، ضيق الاضلاع، خلي الصفعة السفلى، اعترض العليا || تقرونها مدبب الحراشف بوليها مستطيل الشكل، مدبب الشلام.

### ١٤٣٤٦ - سِتْدِيَّان بَحْرِي الْوَرَق

*Quercus glauca* (S). *Chêne glauque* (F). شجرة سبروتية مهدها اليابان ترطب في المناطق المعتدلة



سيتيكان افروز



سيتيكان شور

جماد النسيج ، سنن الحافة ، حروف متزاوية الخطوط  
عدها يراوح من ٨ الى ١٢ زيباً كل واحد منها يتطو  
بسن || تقربها اطليحي الحرافش . بلوطها طويل  
نحو ٤ سم قطرها ٢ سم .

#### ١٤٢٤٨ - سِتْدِيَان لَاطِي لَاطِي الزَّهَر \*

*Quercus sessiliflora* (S). *Chêne sessile*, C. à crochets, Rouvra, Durin (F).

نوع سبروتي عديد الثروب يطول من ٢٠ الى ٣٠ م.  
اوراثها مستطلة لا لذنية . نصلها ساهي او ثنائي التخصيص ،  
خلي البشرة حل صفحت البقل || تقربها حاد الاذان ،  
حقيق الحرافش المتراكبة . بلوط سوي اللون الخلي ،  
مليس الشلام .



سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّهَر

#### ١٤٢٤٩ - سِتْدِيَان لَيْبَان \*

*Quercus libani* (S). *Chêne du Liban* (F).

شجرة سبروتية مهدها جبال لبنان تملو من ١٠ الى ١٢ م.  
اثنائها صغيرة اللد لونها الى الصفار الخلي . اوراثها  
عابطة تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ .  
نصلها جماد البشرة ، مشاري الحافة ، حاقب الصفحة  
العليا القديمة الخضر ، باحت البقل الصفراء الموج .  
تقربها يضي الحرافش الجلمدة الحليمة .



سِتْدِيَان لَاطِي الزَّهَر

#### ١٤٢٥٠ - سِتْدِيَان هَكِي \*

*Quercus aquatica* (S). *Chêne aquatique* (F).

شجرة جمادة ترطب في للمواقع القريبة قرب مجاري الماء .  
تعلو من ١٥ الى ٢٥ م . اوراثها صغيرة اللد ، قصيرة  
العتق ، مفرصة . نصلها يطول من ٤ الى ٨ سم . وهو  
اسرط البشرة حل صفحت || تقربها صاهي الشكل .  
بلوطها غليظة ، قصيرة ، حادة الشلام .



سِتْدِيَان لَيْبَانِي

#### ١٤٢٥١ - سِتْدِيَان مَدَّيَب الزَّهَر \*

*Quercus acuta* (S). *Chêne à feuilles aiguës* (F).

شجرة سبروتية مهدها الشرق ، ترطب في للمناطق الجنوبية  
المستوية . تعلو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراثها حرة ،  
يضية ، مديبة اقزام الاخير . نصلها عادم التشنج يطول  
من ٧ الى ١٤ سم . ويعرض من ٢ الى ٤ سم . يلو احمل  
اللون كليل الزغب ثم يتحول الى الخضر الاصفر .  
تقربها متراكب الصفات الحرفية البقية .

#### ١٤٢٥٢ - سِتْدِيَان عَرَبِي \*

*Quercus mirbecki* (S). *Chêne de Mirbeck*, Zâne (F).  
Overcup oak, Mirbeck's oak (F). *Quercus alba* (D).  
*Quercus alba* (S). *Quercus alba* (F).

شجرة سبروتية ترطب في المناطق المعتدلة للشجرة نحو  
الحارة . مهدها افريقية الشالية واسباهي . تعلو من ٣٠  
الى ٣٥ م . بانقتها زاء . اوراثها عابطة . مستطلة .  
نصلها جماد النسيج مفصص الحافة || تقربها جامد  
الاذان ، ثخين الحرافش القصيرة .



سِتْدِيَان مَرْدَة

#### ١٤٢٥٣ - سِتْدِيَان مَرْدَة \* ، سِتْدِيَان لَاطِي الزَّهَر \*

*Quercus pedunculata*, *Q. robur* (S). *Chêne pédonculé*, Rouvra, Gravolin (F). British oak, Female oak, Red oak (E). Steifeiche, Rozeiche (D). Rouvra, *Quercus pedunculata* (I).

نوع سبروتي عديد الثروب . اثماره حرة الشكل تعلو  
من ٣٠ الى ٥٠ م . اوراثها عابطة مستطلة طويلة الزناد .  
نصلها رباعي او خمسي التخصيص ، ازغب البشرة يلو  
اخضر اللون ثم يتحول ويظهر ان ينعني بالاجر .  
تقربها عجب الحرافش الصغيرة .

من ١٥ الى ٢٠ سم . وتعرض من ١٢ الى ١٥ . نصلها  
جماد النسيج ، سنن الحافة ، فسح الاضلاع ، خلي  
الصفحة البقل || تقربها قلنسوي الشكل . بلوطها  
صغيرة وصغيرة لونها الى السرة الحليمة .

#### ١٤٢٤٧ - سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّهَر \*

*Quercus phellos* (S). *Chêne saule* (F).

شجرة رقيقة ترطب في للمناطق الجنوبية وفي الارية للوصلة  
الانماج السميكة الثوب . تعلو من ٢٠ الى ٢٥ م .  
اوراثها مستطيلة مديبة اقزام الاخير ، حسيكة البضة .  
نصلها يطول نحو ١٠ سم . ويعرض ٢ سم . وهو اسرط  
البشرة حل صفحت . يلو اخضر اللون وينعني ، في  
الخريف ، الى الحمر الصفراء الموج || تقربها  
قلنسوي الشكل ، دقيق الحرافش ، لونه الى الجلمة .  
بلوطها صغيرة اللد ، سواه اللون .

#### ١٤٢٤٣ - سِتْدِيَان صِيْجِي \*

*Quercus chinensis*, *Q. variabilis* (S). *Chêne de Chine*, *C. variable* (F).

شجرة جمادة مهدها الصين ترطب في للمواقع الباردة تعلو  
من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ٨ الى ٢٠ سم .  
وتعرض من ٣ الى ٧ . نصلها جماد النسيج . سنن  
الحافة ، خلي الصفحة البقل التي تدير نفسية اللون .  
تقربها متعرض الحرافش القصيرة الصلبة .

#### ١٤٢٤٤ - سِتْدِيَان طَوِي \* ، سِتْدِيَان التَّوَكْسِي \*

*Quercus toza* (S). *Chêne cauxin*, *C. doux*, *C. brosse*, *C. angoumois* (F).

شجرة جمادة ترطب في المناطق الجنوبية . تعلو من ٣  
الى ١٥ م . جلودها ممداء ، غليظة ، غلسة . اثنائها  
زباء اللام ودية اللون . اوراثها عابطة تطول من ٦  
الى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . نصلها خلي الصفحة  
البقل || تقربها مسير اللد متباعد الحرافش القوية .  
بلوطها صغيرة ، لونها الى السرة ازيتية .

#### ١٤٢٤٥ - سِتْدِيَان هَكِي الزَّهَر \*

*Quercus laurifolia* (S). *Chêne laurier* (F).

شجرة جمادة مهدها امريكية . تعلو من ١٥ الى ٢٠ م .  
اوراثها تشبه اوراق اللار . نصلها يطول من ٨ الى  
٢٠ سم وهو اسرط الصفحتين ، جميل الخضر الباهي .  
تقربها قلنسوي الشكل ، صير الحرافش القوية .  
بلوطها صغيرة اللد ، متخيلة اللون ، يلوها موج صير زبي .

#### ١٤٢٤٦ - سِتْدِيَان كَبِير القَمَر \*

*Quercus macrocarpa* (S). *Chêne à gros fruit* (F).

شجرة سبروتية جملة الشكل مهدها امريكية الشالية .  
تعلو من ٢٠ الى ٣٥ م . اوراثها عابطة تطول من ١٠  
الى ٤ سم . نصلها خلي التخصيص ، صفحت البلى  
جملة الخضر ازباني اما البقل لخميلة البشرة لونها الى  
الصمبة || تقربها عبطي الحرافش التي تدير كالاداب .  
بلوطها كبير اللد طوله يراوح من ٥ الى ٦ سم . لونه الى  
الجلمة .

#### ١٤٢٤٧ - سِتْدِيَان كَسْتِي الزَّهَر \*

*Quercus castaneifolia* (S). *Chêne à feuilles de châtaigner* (F).

شجرة سبروتية مهدها القوقاز تعلو من ٢٠ الى ٣٠ م .  
اوراثها عابطة ايمارية الشكل كاوراق الكتنة . نصلها

الجلد والانفاد. اوراقها غليظة اي انها تغلق من مركبة ريشية، في عهد الفتوة، الى غلة بسيطة مبطنة في عهد البلوغ || جميعها من النباتات الراملة مهددا بالبلاد الحارة. احرف واشهر انواعها ما يتبع .

١٤٣١٤ - سَنَط اَبْيَض، هَرَسِي (S). *Acacia albida*.  
Acacia blanc, Mimosa (F). White scacia (E).  
Weisse akazie (D). Albergo blanco (I).

شجرة زينة مبروتية. ساقها مغطاة بالحاء اوراقها مركبة مابة. ازهارها زبدية اللون.

١٤٣١٥ - سَنَط اَزْرَق (S). *Acacia cyanophylla*.

*Acacia bleu, Mimosa bleu* (F).  
شجرة زينة مبروتية تسلم من متزين الى ٦ امتار. فلدها مستطيلة الشكل، نصلها لامع اللسج الاخضر اللون، الازرق المواج. متناقصها الزهرية صغيرة القد. ازهارها كروية متوسطة الحجم جملة الزبدى اللتارج || ازهارها يستمر طول شهر آذار.

١٤٣١٦ - سَنَط اَزْهَب (S). *Acacia pubescens*.  
Acacia pubescent, Mimosa pubescent (F).

شجرة زينة مبروتية تسلم من متزين الى ثلاثة امتار فلدها وراقها زباه. اوراقها مابة مركبة. امشاطها خيطية الورقات قد من ١٠ الى ١٥ زوجاً. متناقصها الزهرية محورية وتاجية الاوتكار. ازهارها خلية المالحق لونها الى الصفرة الثنائية || ازهارها يدوم طول شهر آذار.

١٤٣١٧ - سَنَط اسْتَقْبُول

هو اليزبا الحرير، اطليا.

١٤٣١٨ - سَنَط اَسْوَد

*Acacia nigricans, A. rufesfolia* (S). *Acacia noirtre*,  
*Mimosa noirtre* (F).

شجرة زينة مبروتية مغطاة الفكل. انتفاذها وراقها مغطاة الزوايا. وراقها غليظة. اوراقها مابة، مركبة، امشاطها خيطية الورقات المستطيلة، نصلها الى الخمس المالحق الاسود المواج. ازهارها فردية او خمسية التجميع، فواصه العرف الذي، لونها الى الصفار الكبيرى. ازهارها يدوم طول شهر نيسان.

١٤٣١٩ - سَنَط اَسْوَد الخشيب

*Acacia melanoxylon* (S). *Acacia à bois noir, Mimosa à bois noir* (F). *Black wattle, Green wattle* (E). *Schwarze akazie, Schwarzwattle* (D). *Acacia nera* (I).  
شجرة مبروتية خضراء الشكل. كبيرة القد تسلم من ١٠ الى ٣٠ م. انتفاذها مغطاة الزوايا. فلدها متناخبة مستطيلة، نصلها حلق الخمس الاسود المواج. ازهارها كروية الشكل، كبيرة القد، فواصه العرف، صفارها كبيرى. ازهارها يستمر من آذار الى نيسان.

١٤٣٢٠ - سَنَط السَنغال، قَتَاد، هَسَاب

*Acacia senegalensis, A. verek* (S). *Acacia du Sénégal, Gommier blanc* (F). *Gum tree* (E). *Weissliche akazie, Vereksbaum* (D). *Acacia del Senegal* (I).

شجرة مهددا بالبلاد الافريقية تكثر في السنغال يستخرج منها اجود الصوغ الحربية.

١٤٣٢١ - سَنَط العنابيد (S). *Acacia pycnantha*.  
Acacia à pompons, Mimosa à pompons (F).

شجرة كبيرة الحجم، خمسية الشكل، تسلم من ١٠ الى

١٤٣٥٤ - سَنَط يَكَاك مَسْنَن اَزْرَق

*Quercus dentata* (S). *Chêne denté* (F).

شجرة مبروتية جليلة الشكل مهددا باليابان تسلم من ١٥ الى ٢٠ م. يتناقصها مستطيلة خيطية زباه الحلاء، زغبها اصفر اللون. اوراقها مابة، كبيرة، تطول من ١٥ الى ٣٠ م. وتعرض من ١٠ الى ٢٠ سم. نصلها مبيك اللسج الجامد، سباعي او ثنائي التجميع. هروقه بارزة خلية البشرة. صفحتها السفلى زبابة مطلاة. تفرقها مستطيل الحرافش الخيطية البنية. بلوطها يبيض الفكل، متوسط الحجم.

١٤٣٥٥ - سَنَط يَكَاك مَسْنَن وُلِي

*Quercus macedonica* (S). *Chêne croyen* (F).

شجرة مبروتية مهددا باليابان تسلم من ١٥ الى ١٢ م. افانها خيطية صغيرة. اوراقها مابة، قصيرة المتق، تطول من ٤ الى ٦ م. وتعرض نحو ٤. نصلها جامد اللسج الاخضر على صفحتيه، سنن الحافة، عند هروقه يراوح من ٨ الى ١٢ زوجاً || تفرقها خيط الحرافش المستطيلة الممققة.

١٤٣٥٦ - سَنَط يَكَاك مَسْنَن قُصِي

*Quercus pauciflora* (S). *Chêne des marais* (F).

شجرة مبروتية تجرد في الشتاء ولا تغطي الرمال القاحلة تسلم من ٢٥ الى ٤٠ م. اوراقها تطول من ٨ الى ١٢ م. نصلها ثلاثي التجميع، ازغب البشرة. خليل الفصم والمروق || تفرقها سباعي الشكل، دقيق الحرافش الرقيقة البرمية الطب. بلوطها متوسطة القد، كسنية اللون.

١٤٣٥٧ - سَنَط يَكَاك يَتِيَات

*Cupuliferus* (F).  
هي فصيلة ايليوليات من ذوات الفلقتين البدييات المتناولات.

١٤٣٥٨ - سَنَط يَكَاك

*Syndes de faillites* (F).  
*Assignés in bankruptcy* (E).

هو الوكيل القانوني عن المكلف ومن كتلة البائسين.

١٤٣٥٩ - سَنَط يَكَاك

*Anamirta paniculata* (S).  
*Anamirta, Coque du Levant* (F). *Cockles plant, Cocculus indicus* (E). *Kokkaskörnerstrauch* (D). *Anamirta, Coccois di Levante* (I).

لبات بري وزراعي ممر وسيد الجنس والقرح من فصيلة القرنيات. مهدد البلاد الحارة اخضاها الاسوية. ثمار طيبة، عطرية، مسهلة وبقية شاملة الاستعمال تنهى سم السمك الحله.

١٤٣٦٠ - سَنَط يَكَاك

*Plante commune* (F).

هو السمور اشالح، اطليا.

١٤٣٦١ - سَنَط يَكَاك

*Rooted slip* (F).

كل فصيلة او عطف وما اشبه استقلت بمطوبها وبياز غرضها.

١٤٣٦٢ - سَنَط يَكَاك

*Pointe des vertèbres du dos* (F).  
حرف فقار الظهر سنان.

١٤٣٦٣ - سَنَط يَكَاك

*Acacia*  
بنس الشجار وحيوانات ونباتات برية وصناعية وتزيينية من فصيلة القرنيات. انواعها زهاء ٤٠٠ مغطاه شاك



سَنَط



سَنَط اسود الخشيب

## ١٤٣٧٨ - سُطُ صَمْفَرِيّ، طَلْح، أَمْ غِلَان، بَنَك

*Acacia gumifera* (S). *Acacia gommier* (F). *Marocco gum tree* (E). *Berberische akazie, Tschbaum* (D). *Acacia gommifera* (I).

شجرة من العشاء كثيرة الشوك الحاد الخشن مهددة أفريقية الشالية وقد انتشرت في جميع الاطراف الحارة . يستخرج منها صمغ السط الطيب الرائحة لكثير الاستعمال .

## ١٤٣٧٩ - سُطُ عَرَبِيّ، قُرْظ، شَوْكَة لَيْطِيَّة

*Acacia arabica* (S). *Acacia arabique, Mimosa arabique, Gommier rouge* (F). *Gum-arabic tree, Egyptian acacia* (E). *Arabischer gummlbaum* (D). *Acacia arabica* (I).

شجرة برية وزراعية مبدولة في الشرق العربي . يستخرج منها الصمغ الاخر وهو متوسط الصنف يعتبر دين صمغ الطلع والمشاب .

## ١٤٣٨٠ - سُطُ حَرْعَرِيّ،

*Acacia juniperina* (S). *Acacia-génévrier, Mimosa-génévrier* (F).

جنية تزيينية مبروتية تملو من مَرَيْن الى ثلاثة امتار . انتاجها اسطوانية زباد الحمار . فلها صغيرة الله ، حمرية الشكل ، صلبة النصل ، ذاككة القعدة ، لونها الى الخضار الباهق . ازهارها سلبية التجميع لونها الى الصفار البهوي || ازهارها يستمر من آذار الى نيسان .

## ١٤٣٨١ - سُطُ حَسَكِيّ، شَبَّة

*Acacia mellifera* (S). *Acacia mellifera, Mimosa mellifera* (F).

شجرة تزيينية مبروتية جبلية الشكل تملو من ٣ الى ٥ امتار . مهددة الين وتنام بحر القلزم . اوراقها حاملة مركبة . ازهارها عتقوية التجميع ، صلبة اللون . صمغها قليل الانتزاع جيد الصنف .

## ١٤٣٨٢ - سُطُ كَذَاب

هو البرويبية السطية ، أطليا .

## ١٤٣٨٣ - سُطُ كَشَو، كَدَاهَنْدِيّ، حَبْرَا

*Acacia catechu* (S). *Acacia au cachou, Cachoutier, Catéchu* (F). *Catechu tree, Khair tree* (E). *Katechu akazie, Kaca-mimosa* (D). *Acacia di cachou* (I).

نوع من السط الترابي يستخرج منه الكاشور .

## ١٤٣٨٤ - سُطُ لَوْتِيّ، سَمَر

*Acacia spiracarpa* (S). *Acacia à spirales, Mimosa à spirales* (F).

شجرة برية وزراعية كثيرة الشوك تسهل التسج سابقا تصير . فرمها وانتاجها عديدة متدلية الاطراف . اوراقها مركبة ، حاملة . ازهارها صفراء اللون ، قليلة الكثافة ، خفيفة البرق .

## ١٤٣٨٥ - سُطُ مُنْتَجِع

*Acacia elata* (S).

*Acacia alifé, Mimosa alifé* (F).

جنية تزيينية رطبة تملو نحو المتر . اوراقها البالية . فلدية ، قنفة ، جنبانية الشكل تنتهي بمسكة سادة . ازهارها الى الصفرة البالية || ازهارها يستمر ٤ اسابيع ابتداء من اواسط آذار .

## ١٤٣٨٦ - سُطُ حَسْتَحِيّ

*Acacia rissana* (S).

*Acacia de Rissé, Mimosa de Rissé* (F).

شجرة مبروتية تزيينية تملو من مترين الى ٦ امتار . انتاجها مضلعة متدلية الاطراف كالقرب . اوراقها فلدية

٣٠ م . فلها منجل الشكل ، مالم الصفحة الالامية الباقية الخضار . عتاقها الزهرية جانبية مسطيلة . ازهارها كبيرة الله ، عطرية البرق ، لونها الى الصفرة اللحية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٤٣٧٢ - سُطُ الْعَمَّيَرِ

*Acacia farnesiana* (S). *Acacia farnésa, Mimosa farnésa, Cassier, Cassie* (F). *Cassia, Popinac, Sponge tree* (E). *Antillen-akazie, Schwammbaum* (D). *Acacia farnésa, Farnesia odorosa* (I).

جنية مبروتية تزيينية وصناعية تملو من مترين الى ثلاثة امتار . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها وزرية ثلاثية او خمسية او سباعية . وزيقاتها عطرية تده من ١٥ الى ٢٠ زيبا || ازهارها كروية ، كبيرة الله ، فواحة البرق الطري يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر المشهور || ازهارها يستمر طوال الصيف وانخريف .

## ١٤٣٧٣ - سُطُ حَطَلِيّ الْوَرَق

*Acacia linearis* (S). *Acacia à feuilles linéaires, Mimosa à feuilles linéaires* (F).

شجرة تزيينية تملو من مترين الى ٥ امتار . فلها ثلاثي الورق ، نصلها خطي الشكل يطلو من ١٥ الى ٢٥ سم . ومرض نحو ٢ م . ازهارها صغيرة الله ، سلبية التجميع ، زائجة الصفار الكبريتي || ازهارها يستمر طوال شهر شباط .

## ١٤٣٧٤ - سُطُ ذَمَّاع، صَيَّال

*Acacia seyal* (S). *Acacia seyal, Arbra à gomme, Delle* (F). *Sittah tree, Shicim wood, Thirsty thorn* (E). *Seyal akazie* (D). *Acacia seyal* (I).

شجرة برية وزراعية كثيرة الصارة المسلية . صمغها يعتبر دون صمغ القُرْظ .

## ١٤٣٧٥ - سُطُ رَائِبِيّ، سُطُ كَثِير الْوَرَق

*Acacia retinodes, A. floribunda* (S). *Acacia floribond, Mimosa résineux* (F).

شجرة تزيينية مبروتية دائمة تملو من ١٠ الى ١٥ م . انتاجها لرغصة دقيقة طرية . اوراقها فلدية خفيفة مسطيلة ربيدة البرق . عتاقها ازهرية تاليجة الاينكاراز . ازهارها كروية ، فواحة البرق ، صفراء اللون . ازهارها يستمر طوال السنة .

## ١٤٣٧٦ - سُطُ مَرَح

*Acacia cultriformis* (S).

*Acacia-coutre, Mimosa-coutre* (F).

جنية تزيينية جانبية تملو من متر الى مترين . سابقا ورفوها اوراقها مرسة . فلها يهسية الشكل ، جانبية التسج البحري اللون . ازهارها عتقوية التجميع ، عتاقها رطبة مسطيلة || ازهارها يستمر ٤ اسابيع تبتدئ في اوائل ايار .

## ١٤٣٧٧ - سُطُ شَالَع، سُطُ عَمَّيَرِيّ، مِيحُوزَا

*Acacia decurrens, A. dealbata* (S). *Acacia parfumé, Mimosa commun* (F). *Silver wattle, Wattles* (E). *Silberakazie, Weisstliche akazie* (D). *Acacia dealbata* (I).

شجرة مبروتية مبدولة تملو من ٨ الى ١٢ م . انتاجها وانتاجها خلية الحمار . اوراقها حاملة مركبة . امشاطها عديدة . وزيقاتها حمرية . نصلها متوسط الصلابة في التبار ، ثنا في البلى || ازهارها فواحة البرق ، لونها الى الصفرة الزائجة . يستخرج منها بالتقطير صمغ العنبر || ازهارها يستمر من كانون الى آذار .



سط ذاك



سط عربي



الى ٢٠ سم. تتميز بأجنحتها الكبيرة المستديرة ، وبزنافنها الظهرية المستطيلة الشائعة الشاككة ، بشكل ظهورها وبطولها المقطوعة المتوسر || ألوانها شديدة العمان يكثر فيها الأحمر والأزرق والبرتقالي والوردي والفضي .

### ١٤٣٩٧- سَطَّ أَثَر ، تَسَنُّ

*Holocentrum rubrum* (S). *Holocentre rouge* (F). سمكة بحرية يعيش من السقف وفضيلة التعديلات . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط . يكثر وجودها قرب الشواطئ والمخارج المصرية وألبانيا || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٥ سم. قوسها الى الحمراء الايروانية يعلوها موج اسطع . رأسها شبه مخروطي الشكل قصير الخيط . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة كبيرة ، مستطيلة ، شاككة القسم الاسامي . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ١٤٣٩٨- سَطَّ شَانِي - *Holocentrus chani* (S). *Holocentre chani* (F).

سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المخارج التركية واليونانية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. قوسها الى الرقبة السمر المغايرة الماهجات القلبية ، رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها الاسفل يتقدم الاسفل . عينها كيرتزان بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١٠ متضخية الأطراف الحادة و ١٥ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة || لحمها متوسط الصنف مأكول .

### ١٤٣٩٩- سَطَّ شَتَم \* *Holocentrus ghanam* (S). *Holocentre ghanam* (F).

سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها بعض مناطق البحر الأبيض المتوسط أعضائها المخارج الأفريقية || جسمها أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ٢٠ سم. قوسها الى الكلبة القلبية يعلوها في جانبها غطاء أظفران وصف من الغضات صغير النقط المستديرة . رأسها مخروطي الشكل ، قصير الخيط . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، بارزتان . زعنفتها الظهرية واحدة مستطيلة تتألف من ٢٥ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و ٩ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية فارقة ، حلالية الشكل || لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

### ١٤٤٠- سَطَّ مَبْدُول \* *Holocentrus vulgaris* (S). *Holocentre commun* (F). *Common Holocentrus* (E).

سمكة بحرية يعيش من السقف . أعضائها معظم اقالم البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || سرسها المخارج . ملونها الخياطي كرسوي . جسمها شبه أحليجي الشكل ، معتدل التيطيط بطول نحو ١٨ سم. عراضها ستة الحمار . قوسها متعادل الاولان تقلب فيه الشبهة القلبية ويعلوها في جانبها خط خمس البقع المستديرة البرتقالية اللون . زنافنها الى الرقبة السمر يعلوها موج اسطر . رأسها يريسي الشكل ، قصير الخيط . شفتها متوسط الانفرج . فكها متعادلان . عينها كيرتزان ، ناضرتان ، ولها الاركناز . زعنفتها الظهرية كبيرة ، شائعة ، مستطيلة تتألف من ١٧ شعاع منها ١١ متضخية الأطراف الحادة و ٦ مفصليّة سرسة . زعنفتها الذيلية

مستطيلة لونها الى الخضار البحري || أنفها سفلية ، ناعمة ، كثيفة التجميع ، متدلية ، لونها الى الصفرة الفاحية || أنفها ينحصر نحو ٥ أسابيع يتفتح في اوائل نيسان .

### ١٤٣٩٧- سَطَّ مُسْتَقِيل الْوَرَكِي

*Acacia longifolia* (S). *Acacia à longues feuilles*, *Mimosa à longues feuilles* (F). شجرة تزيينية تملو من ١٥٠ الى ٤٠٠ سم. أنفادها فضلة الزوايا . فلها سنان الشكل بطول من ٥ الى ٢٠ سم. ويخرج من ١٥ الى ٢٠ سم. سنايها الزهرية مستطيلة . أنفادها صغيرة القند شديدة الصفار || أنفادها ينحصر من آذار الى ايار .

### ١٤٣٩٨- سَطَّ مَشَوَاك *Acacia armata* (S). *Acacia armé*, *Mimosa armé* (F).

شجرة تزيينية سرودية شاككة تملو من متر الى مترين . فلها فضية الشكل طول نحو ٣ م. أنفادها عشكولية التجميع ، محورية الاركناز ، لونها الى الصفار الباهت . أنفادها ينحصر من نيسان الى حزيران .

### ١٤٣٩٩- سَطَّ هِلَالِي *Acacia lunata* (S). *Acacia en croissant*, *Mimosa en croissant* (F).

شجرة تزيينية سرودية تملو نحو ١٠٠ سم. فلها حلالي الشكل بطول نحو ٢٥ سم. سنايها الزهرية صغيرة الحجم محوري من ٤ الى ١٥ أنفاد لونها الى الصفرة الشائعة . أنفادها ينحصر من شباط الى آذار .

### ١٤٣٩٠- سَطَّ طَيَات *Mimosaes* (F).

*Acacia*, *Mimosa* (E). سهل من فضيلة القرنيات . اولمة زهاء ١٥٠٠ منها الاجهار والشجيرات والجنات والاشجار السمر . منها الاسقام الحارة والصدئة . اوراقها متضخية ، مركبة ، ريشية . أنفادها صغيرة متضخية او عشكولية التجميع ، محورية ولحاجة الاركناز ، لثالية او رباعية او خماسية الاجزاء .

### ١٤٣٩١- سَطَّ *Jointure des doigts* (F).

*Jointing of fingers* (E). هي السلاسل التي تصل ما بين الاصابع والرسغ ، ج اسطع .

### ١٤٣٩٢- سَطَّ *Indignation*

رأبغ تخم .

### ١٤٣٩٤- سَطَّ *Jointure des doigts* (F).

هو الاقنعة المشيرة ، اطليا .

### ١٤٣٩٥- سَطَّ *Gousse, Escal, Comp* (F).

ثمرة فضيلة القطنيات كالذول والبلس وطبلة وغيرها . وهي وهاء ذات مصرلين يتفتح بعد تمام لحيته من بعض البزور .

### ١٤٣٩٦- سَطَّ *Holocentrus* (S).

جنس سمكة بحرية من فضيلة التعديلات الشاككات الزنايف . اولمة المروقة نحو ٣٠ ملونها بجار المناطق الحارة . جسمها صغيرة القند مأكولة ، طولها يراوح من ١٢



سَطَّ



سَطَّ لُحَام



سَطَّ مَبْدُول

تقابل الظهيرة . زعنفتها الليلية فاتحة || لحمها جيد الصنف ، مرغوب فيه .

#### سفنقيات

١٤٤٠١ - سفنقيات  
مرتبة اسماك بحرية من رتبة الاشلاخ تشمل القرشيات والسفنجيات البحرية .

١٤٤٠٢ - سفنقيات  
هو القرن ، اطليه .

١٤٤٠٣ - سفنقيات  
Ctenophora festiva (S). Ctenophora agræbilla (F).

حشرة لافقية من ذوات الجناحين وفصيلة السفنجيات . جسمها معتدل القبة قريب الشكل بقصم القيقول يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . لوها الى السرة الطويلة يملأها تجذيع وتبيج اصفر . زباناها قناديا الشكل ، عذما التجلد . رؤسها الى الصغار الخفي تملو بقية مراء الى وسط الزام الاخير || الاتي اكبر قدماً من الذكر . بطنها مردي الشكل . تظهر الحشرة الجلدة من ابار الى تشرين الاول . تألف الحراج والذباب والعدائق والنباتين || تمتع الاتي مكها في غاء الاجار الحرة المظلمة . يرقاها تمش مل المواد النباتية والعنصرية المنحلة .

١٤٤٠٤ - سفنقيات

في القرنيات فصيلة نباتية ، اطليا .

١٤٤٠٥ - سفنقيات  
Sanvitalia (S). Sanvitalia (F).

جس نباتات عشية حولية تزيينية من الشرفيات وفصيلة المركبات . ازواها ثلاثة . اوراقها منتنة متعابلة . لصلها يضي الشكل مهدب القاعدة لونه الى الخضار الاضطر . ازواها جزوية الرؤس الوسطي ، رتقالية السوات اخارية . يزودها مجتمعة ثنائية او ثلاثية الحك . ازواها يستمر طوال الصيف .

١٤٤٠٦ - سفنقيات  
Hierofasco (S). Gerfaut (F). Gerfalcon, Gyrfalcon (E).

جس طير من عازة الصقور وفصيلة الصقريات . موطنه البلاد الباردة . الزواها ستة جميعا من الجوارح الكبيرة البنية الشكل والمعتد . طولها يراوح من ٥٠ الى ٦٠ سم . ويصطاد من ١٣٥ الى ١٥٠ سم || اثوابها تختلف مع النوع والامر يغلب فيها الازيس . مناسرها قرية منتقاة البرية الذرية الحادة . سواقها كبيرة القبة ، لاذقة الاطراف . اذناها مستطيلة جالسة . عالجها قوية . تألف الاجرار والجبال المشرقة على البحر . تصيد السنجاب والاراب ويقتل القروام والبيل والاوز والنورس . تكثر في الاجمار البسقة او بين شاليف الصقور البيرة . اثابها تبيض وتخص من ٤ الى ٥ دنانير نحو ٤ اسابيع . اما ازواها ستة فهي :

Gerfaut blanc (F).

سفر ابيض

Gerfaut de Norrège (F).

سفر النروج

Gerfaut d'Islande (F).

سفر ايسلند

Gerfaut du Groenland (F).

سفر غروينلند

Gerfaut de Hallbell (F).

سفر هليل

Gerfaut du Mexique (F).

سفر المكسيك

Egretta garzetta (S).

١٤٤٠٧ - سفنقيات

Aligretta garzetta (F). Little egret (E).

طائر من البطونيات يحرب المناطق الجنوبية المعتمة من

اليابان الى اروية وافريقية واورالية || طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه الى الياض الباصي . مقادير اصغر الانتداب . اسود الجسم . يتميز بريشه الخافي القاصر السن . يمش اسراباً كبيرة . يألف الناق . قوته الاسماك والقشاد ويقتل الحشرات . يثن بين الامل والقصب اثنائه تبيض وتخص ثلاث يمشات .

١٤٤٠٨ - سفنقيات

Cénomanian (F).

Cenomanian (E).

صاف حصيلي يجتر قاعدة سفات الطبقة الطباشير بالماليا .

١٤٤٠٩ - سفنقيات

Sommet d'une plante (F).

Summit of plant (E).

اربع جزء في النبات .

١٤٤١٠ - سفنقيات

Zébu (F). Zebu, Indian ox (E).

السنة ج سم هي الابقار الهندية الرقيقة الحاركة السني الشكل . اطلب دوابي .

١٤٤١١ - سفنقيات

Cyme

شكل من الازهار النوري قوله ان المالحق الزهرية

تلقا في نقطة واحدة وتبلغ علوا واحدا مسطوريا في الانتداب والازكاز .

١٤٤١٢ - سفنقيات

Arbre à production alternative

تمت تعريفه يطل كل كى تجربة تحمل من وقش اخرى كا في الزيتون .

١٤٤١٣ - سفنقيات

Sénouin (F). Senouin (E).

صاف حصيلي يشمل النصب الاوسط من الطبقة الطباشيرية العليا .

١٤٤١٤ - سفنقيات

Pells (S). Chat (F). Cat (E).

جس حيوانات صغيرة القبة من فصيلة السنوريات وربة القوام منها ربة وحشية ومنها الية لا يطر منها بيت || اسماء السنور كثيرة اشهرها القبط والحمر والقبين واليس والبين والخيخ والحليل والحمر والدم وايزون والكنيس والحارون والفتناري || اما كته فابو دناين وابو فزون وابو الموش وابو شامخ .

١٤٤١٦ - سفنقيات

Chat tigré (F).

حيوان لاسم مقترى على مري ، اطليه .

١٤٤١٨ - سفنقيات

Felis catus, Catus ferus (S). Chat sauvage (F). Wild cat (E).

اكبر انواع السنابر ولشدها بطلأ واصليها حيدا . طوله الكامل يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . جسمه من ٣٨ الى ٤٤ دنانير من ٣٢ الى ٣٦ اما علوه الى الحاركة فوراوح من ٣٧ الى ٤٣ سم . ثوبه الى الصبهة الصفراء والسمراء يملو تخطيط وتجزع اسود || يألف الاجراج ويرح في الليل ويقتل الاجمار . يمش على كل حيوان ويطار يصطع اليه سيرا .



سفر



سفنقيات



سنور بيري

١٤٤١٩ - سُنُور دَاجِن \*

Felis domestica, Catus domesticus (S). Chat domestique (F). Domestic cat (E).

هو القط المعروف بالبيس وأخر والحجل والخديج والبيسن . شرويه كثيرة السند أصلها المسماء ، الأني أصغر قدماً من الذكر ، عملها يوم نحو ٩ أسابيع وهي تنزع من ٣ إلى ٦ جراء فيسور الثور يمد وضعا بالبيسين .



سنور داجن

١٤٤٢٠ - سُنُور شِيرَازِي \* قط أنقرة

Catus angorensis (S). Chat angora (F). Angora cat, Persian cat (E).

فرب من السنور الداجن هي الخلق مستطيل الور الجليل الناعم .

١٤٤٢١ - سُنُور مَصْبَكَة \* سُنُور مَرِين ٤

Catus maniculatus (S). سنور مصري Chat ganté (F). Egyptian cat (E).

نوع من السنائر البرية والذاتة مهد بلاد التوبة . قسمة المصريين في عهد الترامنة وانتقل مع الرحالة وقوافل التجار من بلاد ال بلاد فوصل إلى أوروبا عن طريق الجزيرة وسورية وتركيا ووصل إلى الأندلس عن طريق ليبيا وتونس وأجزاء . طوله الكامل نحو ٧٨ سم . جسمه ٤٤ وذنبه ٢٤ ثوبه سوي اللون يمتد عند الظهر . فرائحه رفيعة مجزعة .



سنور شيرازي

١٤٤٢٢ - سُنُور مَنُول \*

Catus manul (S). Chat manul (F). Manul cat (E).

نوع من السنائر البرية القوية الشديدة اللطف . هذه جبال وفياي المنحول . طوله الكامل ٧٨ سم . جسمه ٥٥ وذنبه ٢٨ أما طول فمحو ٤٥ سم . لونه مزيج من الأصفر والأبيض والأصمر رأسه مبيج بالأسود . غذاءه حشرات بالأسر السابق . اذنان صغيرتان . ذنبه مطوق التجزيع بالأسد .



سنور مصعد

١٤٤٢٣ - سُنُورِي

Félin (F). Féline (E). نمت تعريتي يطلق على كل حيوان ينتمي إلى فصيلة السنوريات .

١٤٤٢٤ - سُنُورِيَّات

Felidae (S). Félidés (F). Felidae (E). فصيلة حيوانية من رتبة القوام تشمل السنور والاسد والبر والسنر والرشق والذئب الخ .



سنور منول

١٤٤٢٥ - سُنُورَط ٥

Nidicolae (F). نمت تعريتي يطلق على فراخ الطير التي تنقف بيثة مريضة لا تستطيع الاستغناء من أبويها بعض الوقت .

١٤٤٢٦ - سُنُورُوتُو هو أنطاف ، أطله .

١٤٤٢٧ - سُنُورُوتُو الماه

هو التزيم من كليات القدم ، أطله .

١٤٤٢٨ - سُنُورُوتُو Alternativité de la fructification

صفة الإثمار المتناوبة الحمل . يقال نبات سنو ورجرة سنه .



سنينة

١٤٤٢٩ - سُنُوتُو ، سُنُوتُو حَوَكِي

Annual (F). Annual, Yearly (E). هو كل نبات يزهر في الحول الذي ينبت فيه ثم يذبل ويموت عقب الإثمار .

١٤٤٣٠ - سَهَقِيَّات المناقير

هي مشرويات المناقير ، أطلها .

١٤٤٣١ - سَهَقِيَّة Epilote (F). Spikelet (E).

هي وحدة التزيم في شكل الإزهار السنبلي . مجمرها المرفوض المتتابع الإنكاز كل محور واحد يؤلف السنبلة .

١٤٤٣٢ - سَهَقِيَّة Parapside (F). Parapside (E).

السنبلة جزء من الحلقة الصلبة الثالثة ، عند الخشرات ، توصل ثلمة اليرباد بالجناح وتحتها فيه . وهما الثتان يني ويسرى .

١٤٤٣٣ - سَهَقِي سَهَقِي

السنبق كوكب ثير أبيض الضوء .

١٤٤٣٤ - سَهَقِيَّة Mitra (S).

Mitre (F). Mitre (E). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل فضيلة السليميات . أنواعها المرفوعة كثيرة العدد والمعاصر منها يتناهز ٢٥٠ أصلها من البحار البلاد الحارة والاستوائية .

معظمها يعيش على مذائق الريان || أصلها عرناصة الشكل ، غروطية الاقواب الحلزونة مستطيلة الفروج الشفوية . أجسامها عادمة التشعر ، صغيرة الرؤوس ، ثنائية الفراش ، مستطيلة الاقواب || أنواعها المرفوعة في البحر الأبيض المتوسط صغيرة القد باعثة الالوان . أما أنواع بحار المناطق الاستوائية فكبيرة القد ، جميلة الزخارف والالوان الزاهية || يعيشها في الحشد « مأذنة » .

١٤٤٣٥ - سَهَقِيَّات Mitrada (S).

Mitrada (F). Mitrada (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاربيل امايات الخياشيم . اجسامها وانواعها عديدة ، بعضها من متحشرات الاراضي المائية والبيض الآخر معاصر ||

أصلها بليلة الحلزونة ، مديبة الاقواب ، غشقة التجويف القاعدي للانفسوب الاستدارة || أعرف اجناسها وأشهرها السنبعة .

١٤٤٣٦ - سَهَقَا ، سَهَقِي

السها والسهي نجم من كوكبة بنات نكش الصغرى .

١٤٤٣٧ - سَهَقَب ، سَهَقَبَة Scappe

البرية والقلاذ وكل منبسط سهل يبعد الاطراف القسيمة الخرامية .

١٤٤٣٨ - سَهَقَب Squame (F). Squama (E).

شرفة صغيرة طبيعية أو عارضة .

١٤٤٣٩ - سَهَقِي Squameux (F). Squamous (E).

نمت تعريتي وصي يطلق على الاشقية الحيوانية الحشرية السطح .

١٤٤٤٠ - سَهَقِيَّات Squamates (F).

Squamata (E). رتبة من الزحافات . التصنيف الحديث يقسمها الى مرتبتين : مرتبة الحيات ومرتبة البطليات .

Vive (F).

١٤٤٥٥ - سَهْلُون

جنس اسماء بحرية مشهورة باسم ترخين ، اغلب ترخين .

Vive pastos (F).

١٤٤٥٦ - سَهْلُون صَغِير

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين صغير ، اطاليا .

Vive araignée (F).

١٤٤٥٧ - سَهْلُون عَنَكَبُوتِي

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين عَنَكَبُوتِي ، اطاليا .

Vive commune (F).

١٤٤٥٨ - سَهْلُون مَبْدُول

سمكة بحرية تسمى ترخين مبدول ، اطاليا .

١٤٤٥٩ - سَهْلُون مَشْع الراس

Vive à tête rayonnée (F).

سمكة بحرية تسمى أيضاً ترخين مشع الرأس ، اطاليا .

Trachinidae (F).

١٤٤٦٠ - سَهْلُونِيَّات

نصيلة اسماء بحرية تسمى ترخينيات ، اطاليا .

Haliastur vocifer (S).

١٤٤٦١ - سَهْلُوج

Pygargue vocifer (F). Also called buard, African sea eagle (E).

طائر من الشبلي ينتمي إلى عائلة البشيان ونصيلة الصفرجات . يقال أنه من أجل البشيان وأحبها وأجلها . موطنه القارة الإفريقية . طوله نحو المتر . ثوبه أبيض لامع . راسه وردي وعينه وبشرته وباطن منقوش ونائبك إلى البياض الثلجي . ظهره وظاهر منقوش وبشرته إلى السواد الأزرق اللامع . مخالبه صفر . قوته الطير والاسماك والحيوانات الصغيرة ولا يفت من البشر أبداً شاهده كأن له في اقتناصه لذة خاصة .

١٤٤٦٢ - سَهْلُوك عَقَب مُوَزَّرَة

Pseudoeas, Aquila fasciata (S). Pseudoeas, Alge à queue barrée (F).

طائر من البشيان ورشد الجلس والترح . جسمه مستطيل القند وصفه كاسي الریش . مخالبه طويلة . ثوبه إلى السرة السفعاء . منقوش مؤزر بالأبيض . ذنبه مشوح بخطوط متفرقة لونها إلى البياض اللامع . من جحر من البشيان الأولاد موطنه يمتد من الهند إلى الشرق الأوسط واليونان وإيطاليا وإسبانيا وإفريقية الشمالية . يألف النابات والأشجار ويجري للماء وصفات الحيات . يصيد البيط والورز والوجع والحوسل والحمام والديج . يألف حقه في صيد السمور اللينة الثانية . أثناء تبيضه ولتين تحضنها وحدها نحو ٥ أسابيع .

Pseudoeas (F).

١٤٤٦٣ - سَهْلُوم

السموم شرب من البشيان يسمى أيضاً السهوك ، اطاليا .

Sahirus dubius (S).

١٤٤٦٤ - سَهْلُور أَشْكَل

Sahirus douteux (F).

حشرة من السهر ونصيلة الفاسيات . جسمها صغير القند ، مبطط ، اطاليا لشون : يولي نحو ٨ مم . من ثوبا إلى القزقة البشجية يطولها مشج شكل يسود فيه الأخضر فالأصفر فالأحمر . وأنها مستطيل الجسم ، قليل التكاثر . غطوها مستطيل الطول . ميناها صغرة ، ماحتان . زباناها مستطيلان . كوكها محب الظلم .

Plains (F). Plain, Flat country (E). سَهْل

سهل ج سهل : هي الأراضي المستوية السطوح . ممتدتها يمد إلى عاملين أساسيين : الارتفاع أو التحات والتمرية .

Action (F). Share (E).

١٤٤٦٢ - سَهْم

هو حصة أحد الشركاء في شركة مساهمة . وهو يبادل جزئاً من مجموع الأجزاء التي قسم إليها رأس مال الشركة .

Part

١٤٤٦٣ - سَهْم ، حِصَّة

هو جزء من ذمة مالية .

١٤٤٦٤ - سَهْم الإِنتِفَاع ، سَهْم التَّمَتُّع

Action de jouissance (F).

هو السهم التي دخلت قيمته وما زال حاصله يتقاضى ربحاً سنوياً عنه .

١٤٤٦٥ - سَهْم الرِّمِي

كوكب تير من برج القوس المعروف ببرج القوس .

Sagittaire (F).

١٤٤٦٦ - سَهْم المَاء

هو القسطية جنس نباتات مالية من المزاريات .

Action de quotité (F).

١٤٤٦٧ - سَهْم التَّصَاب

هو كل سهم لا يشار فيه إلى قيمة معينة من التقد .

Action de préférence, A. de priorité (F).

١٤٤٦٨ - سَهْم إِسْتِيفَال ، سَهْم مُفَضَّل

هو السهم الذي يمانى بالأسية إلى السهم الأخرى إما بزيادة حصته إلى الأربع أو في اقتسام الشركة عند حلها أو في حق التصويت أو في هذا كله مجتمعا .

Action à prime (F).

١٤٤٦٩ - سَهْم دُو حَلَاة

هو السهم الذي يصدر بسعر أعلى من سعره الحسي .

Action de capital (F).

١٤٤٧٠ - سَهْم رَأْس المَال

هو السهم الذي تكافئه حصته في رأس المال سواء أكانت حراً أم لنفذاً يقابله سهم العمل أو سهم الصناعة الذي تكون الحصة فيه عمل يدنياً .

Action d'apport (F).

١٤٤٧١ - سَهْم حَبْنِي

هو السهم الذي يسلم إلى الشريك مقابل تقديم حصته حراً .

١٤٤٧٢ - سَهْم حَلَاة

Action au porteur, Titre au porteur (F). Bearer certificate, B. bond (E).

هو السهم الذي لا يبين فيه اسم شخص معين وتكون حيازته لأبحاث ملكيته .

Action libérée (F).

١٤٤٧٣ - سَهْم مَدْفُوع القِيمَة

هو السهم الذي دخلت قيمته كاملة أو كان ممدداً لحصة قدما حله حراً .

١٤٤٧٤ - سَهْم مُتَعَدِّد الأَصْوَات

Action à vote plural, A. privilège (F).

هو من الأسهم التي تحوز حلتها في الجمعيات المسوية أصواتاً أكثر مما لحصة السهام الأخرى التي تتبادل معها سراً .



سَهْلُوج

١٤٤٧٥ - صَوَاعِد Vaisseaux mammaires (F).  
Mammary ducts (E). هي مجاري الحليب في القرسح .

١٤٤٧٦ - سَوَالف Epizootie (F). Epizooty (E).  
مرض المال وملاكه من آفة تسميه .

١٤٤٧٧ - سَوَام مُقَوَّح \* Cyanocitta cristata (S). Cyanocitta huppé (F).  
Blue Jay (E).

طائر من فصيلة الغربان . يصير من أجل طيور أمريكا الشمالية . يألف الإحراج والغابات ، قوته الحشرات والبزوط والثمار والبزود ويبيض المصابير ويحلبها || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٢ سم . صلته العليا ، من قرأس إلى القلب ، زرقاء اللون سفاه المواجه . صفته السفلى من الزور إلى الأنيك ، ريداء اللون يضاء المواجه . عند أسد يمتاز بجهته وقلادة سوداء قلوب عتق . جناحاه وذنبه مجعدة بالأسود والأريد . رأسه معرج بكشفة سوداء يطولها مواج أزرق || يدن عن في الأشجار الرقيقة . الاق تحسن وضعها من إلى ه يضايت بينا الذكر يؤن لها الغذاء .

١٤٤٧٨ - سُورَقُفَسَفَات Superphosphate  
من الاسمدة الكيماوية الرقيقة . يشل عنصر الفسفور الذي يشل في تركيب جميع الحوامض والمواد التزلاية الموجودة في الخلايا النباتية || خواصه وصفاته عديدة أبرزها :  
- حفن جذور النبات على الانشباب والتكاثر .  
- سح النبات على أتران الأتزرار وجودة البزيع وحسن التأثير والمقد ومع الانعلاص .  
- تشييط وحماة المادة البنية في السماء وبرادة الجلود وتقوية المناعة الذاتية ومكبتها من السموم في رجه الاوصام الجرثومية .  
- الحلول دين شلح الأزوت وعواقبه الوضية فيا لو زادت نسبتة من الممدل الاقص .  
والسورفسفات على اشكال منه المادي والمزدوج والمثلث وهذا يمد الى نسبة ما يحويه من الحامض الفسفوري للقبال الدوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || يدر على الأربة كاليتراس قبل التزارة ببعض الوقت ويظهر جيدا ذلك لتكتمل الحلات الطبيعية مع الانعلاص الكيماوية من تحويلة الى غذاء قابل للتشيل منه حابة النباتات اليه .

١٤٤٧٩ - سُورَفَسَفَاتُ السَّطَام Superphosphate d'os.  
من الاسمدة الفسفورية الضوية الجزيلة النفع يحوي من ١٢ الى ١٨٪ من الحامض الفسفوري القابل الدوبان في الماء وفي سترات الامونيكا || وهو بطلي الانفعال ينشط البيئة الجرثومية ويضما على التكاثر النظمي .

١٤٤٨٠ - سَوَجَر Oléastre (F).  
هو خللاص الضيق البزوق ، اطليه .

١٤٤٨١ - سَوَجَر هو الصفصاف ، اطليه .

١٤٤٨٢ - سَوَدَق \* ، صَعَرُ البَعْد Falco nigricape (S). Faucon des canards, Aléto (F).  
طائر من الصقور القزاط التي تجوب البلاد الممتدة الحارة . جثته تقارب جثة الشاهين وهو اغر الريش ،

جسمها وحشبا ظهرها متعادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة . قوتها مباشرة الحلب القصير || راحمتها كرينة .

١٤٤٨٦ - سَوِير مُطْلَع Sehirus maculatus (S).  
Séhiru maculé (F).

حشرة من السهير وفصيلة القسائيات . جسمها صغير القد ، مفلطح ، شبه يضي الشوز ، بطول نحو ٧ م . || فورجا الى الزقة الحدية المواجه يطولها تلطيخ اضر الشهب رأسها صغير الحجم . عضها مصطل الطول . زباناها مستطيلة . عينها صغيرتان ، غارتان . كسولها قبي كشرن . جسمها وحشبا ظهرها متعادلا الطول . قشرانها شفاف . بطنها الى السمرة القامعة . قوتها مباشرة الحلب || مرتها الكثير من الاعصاب اعصاب الشفويات || راحمتها كرجة .

١٤٤٨٦ - سَهِيْقَة Opercule (F).  
Operculum, Cover (E).  
هي الغلاف الرقيق الذي يسد مخاروب النحل . وهي غطاء اجنات الحامض . وهي لكشاء الفسفوري الذي يلحف مناعير البير الخ ...

١٤٤٨٧ - سَهِيْل Canope (F). Canopus (E).  
نجم من كوكبة السفينة يتميز بريقه لماله الذي يأتي بمد البرجوس والأبرق . يمد من الأرض نحو ٢٠٠ سنة ضوئية أي نحو مليون مليار كيلومتر .

١٤٤٨٨ - سَهِيْمَة ، بِسَمِيْت \* Boelenmitas (S). Boelenmita (F). Boelenmitas (E).  
جنس حيوانات بحرية من القزويات واسيات الارجل مزدجيات الحامض . وفصيلة السهيمات . انواعها المعروفة عديدة ، جميعها من احافير الحقبة الترياسية . حياكلها صغيرة سمية الشكل .

١٤٤٨٩ - سَهِيْمَات Boelenmitidae (S).  
Boelenmitidae (F). Boelenmitidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من القزويات واسيات الارجل مزدجيات الحامض . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من صخور الازمنة الفائرة . يبدو ان ظهورها يمد الى العصر البليوري وانقراضها كان في العصر الطليثري .

١٤٤٩٠ - سَوَة التِيْمَة Mauvaine fol (F).  
Dichonesty, False-hood (E).  
هو معرفة الانسان ما ينطوي عليه عمله اثنائي من حروب واجرام .  
١٤٤٩١ - سَوَاك هو الراعب ، اطليه .

١٤٤٩٢ - سَوَاكِيَة هو زردور البادية ، اطليه وين اسماله ام سليمة .

١٤٤٩٣ - سَوَاكِيَة هو البركت ، اطليه .

١٤٤٩٤ - سَوَاكِيَة

فجر واحدته سواة . قال ابو جنينة : السواس من الضفادع وهو شبه بالمرخ له سفة مثل سفة المرخ وليس له شوك ولا ورق ، يطلي في السماء ويستظل تحت وقال ايضا السواسي والمرخ والمنج متشابهة .



سهيمة



سَوَام مُقَوَّح



سودق

اصنع قرأس، اسحق القلح اللؤلؤ، لثبر البيلن. راسه وصفته وظهوره وصفناه وذنبه سفح اللؤلؤ. مسره وعالجه سودا ين في الانجبار الباسقة الثانية. يصيد اللؤلؤم والبريل انحصها الجردان والقط.

## ١٤٤٨٣ - سَوْتِيَّان، مِيَزُوكَرَب

Méscorpe (F). Mesocarp (E). هو الجزء المتصلب من غلاف الثمرة يعرف بإلح في ثمار القرطاس. تلطفه الخلطة ويلطف الانعكاس حيث المجنة أو البيلور.

## ١٤٤٨٤ - سَوْتِيَّان

هو الزرودة الدائم الخضرة، اطله.

## ١٤٤٨٥ - سَوْتِيَّان، سَرَّاحُ الْفُلَّةِ

Colchicum (S). Colchique (F). Colchicum, Meadow saffron (E). Lichtstume, Zeilose (D). Colchico (I). جنس نباتات بصلية طليعة مضمرة من فصيلة السورتيانيات. انزاعه زهاء ٢٠ مظهرها بري ويضاهي زراعي. مثالها الطليعة مبدلة انحصها در البيل وتسهيل للمعة وتسكين الاصابا والحلح على السن. ويستخرج منها مادة قلوية تدعى كلثمين شائعة الاستعمال الطبي || اوراقها قرمية الالتشاب سنائية التصل المستطيل. انزاعها كبيرة اللثة مستطيلة الانبوب مدالية البتلات المتساوية. ثمارها كسابر حقة الشكل تظهر مع الازداد بد ذبول الزهر واكبال ذوبل. الثمر انواعه ما يتبع.

## ١٤٤٨٦ - سَوْتِيَّان اَبْيَشي

Colchicum candidum (S). Colchique blanc (F). نبات سبروتي مهده جبال الشرق الاوسط. ديفسته برمية الشكل متوسطة الحجم. اوراقه شبيقة مستطيلة فارقة. انزاعه صبرية اللثة، يضاء اللون، طوية المأبر الصفر || انزاعه يستمر من آب ال ايلول.

## ١٤٤٨٧ - سَوْتِيَّان اصْفَر

Colchicum luteum (S). Colchique jaune (F). نبات سبروتي مهده الجبال والافلال. ديفسته صبرية الحجم اجناسية الشكل. اوراقه شبيقة مستطيلة، نصلها محدد المسطحة الزاوية المنحصر. انزاعه صفراء اللون، بتلاتها يضيء الشكل خلية البشرة الداخلية || انزاعه يستمر من نيسان ال ايار.

## ١٤٤٨٨ - سَوْتِيَّان الجبلي، قَرَجِ الاراضِ &amp; عَشَنَكَة

Colchicum montanum (S). Colchique de montagne (F). نوع من السورتيان مهده المناطق الجبلية ذات الاراية البرية. ديفسته صبرية اللثة قطرها نحو ٢ سم. اوراقه تطلو من ٨ ال ١٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٢ سم. انزاعه صبرية اللثة قطرها نحو ٥ سم. طولها يراوح من ٦ ال ١٢ سم. || وهو السورتيان الطبي المشهور ديفسته تدعى خيرة الصلار وراز القطة ولبة برية.

## ١٤٤٨٩ - سَوْتِيَّان اخضر، \* عَمَل، قَاتل

Colchicum autumnale (S). Colchique d'automne, Veilleuse, Tue-chien, Saffron des prés, S. lézard (F). نوع من السورتيان الباطل. ديفسته يضيء الشكل

تطلو من ٥ ال ٧ سم. اوراقه متصبغة تطلو من ١٥ ال ٣٠ سم. وتعرض من ٢٥ ال ٥٠ سم. انزاعه ليكية اللون، كبيرة اللثة، قطر فيها يراوح من ٨ ال ١٢ سم. وطول انبوبها من ١٥ ال ٢٥ سم. || وهو السورتيان الطبي المشهور الذي يستخرج منه الكلثمين.

## ١٤٤٩٠ - سَوْتِيَّان الشرق

Colchicum byzantinum (S). Colchique d'Orient, C. à feuilles de varaire (F). نبات سبروتي مهده الشرق. خروبوه زراعية مبدلة. ديفسته كبيرة اللثة، كروية الشكل، مغطاة القامعة. اوراقه تطلو من ٢٢ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٧ ال ١٠ سم. نصلها خطاط المسطحة كمثل الخربوق. انزاعه كبيرة اللثة مستطيلة الانبوب الابيض، خلية البتلات الوردية اللون || انزاعه يستمر طوال الشتاء.

## ١٤٤٩١ - سَوْتِيَّان الصخري

Colchicum haumknechtii (S). Colchique d'Haumknecht (F). مهده جبال الصخر. يرغب في الاماكن الصخرية. ديفسته شبه يضيء قطرها نحو ٦ سم. يطولها حتى يبلغ ٧ سم. اوراقه شبيقة التصل اللثة المسطحة. انزاعه خلية البشرة، صفراء اللون، وردية الفروق، مستطيلة الانبوب || انزاعه يدام طوال شهر تشرين الاول.

## ١٤٤٩٢ - سَوْتِيَّان بَرَكِينُون

Colchicum parkinsonii (S). Colchique de Parkinson (F). نبات سبروتي مهده غابات الشرق الاذل. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه اطيحية مستطيلة، نصلها متراوح الحشار فلش التربة. انزاعه متوسطة اللثة، انبوبا ابيض اللون، بتلاتها ضلقة وجزيرة بالابيض والاربعوني، مأرها زرق || انزاعه يستمر من آب ال ايلول.

## ١٤٤٩٣ - سَوْتِيَّان دَكِّي

Colchicum decaleni (S). Colchique de Decalene (F). مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. يجتر من النباتات الرقية. ديفسته متوسطة اللثة قطرها نحو ٤ سم. اوراقه الارل سنائية التصل ثم ثلثا اوراق شبيقة، ذلقة الزام الاخضر. انزاعه صبرية اللثة، وردية اللون، خلية البتلات يستمر من تشرين ال كانون الثاني.

## ١٤٤٩٤ - سَوْتِيَّان حَرَّاشِي القَرَق

Colchicum hirsutifolium (S). Colchique à larges feuilles (F). نبات سبروتي مهده الشرق الاذل. ديفسته متوسطة الحجم. اوراقه فارقة تطلو من ١٥ ال ٢٥ سم. وتعرض من ٥ ال ٩ سم. انزاعه مستطيلة الانبوب، خلية البشرة، لونها ال اليلك يطلو ملج اربعوني، مأرها صفر || انزاعه يستمر من آب ال ايلول.

## ١٤٤٩٥ - سَوْتِيَّان فَاحِي \*

Colchicum speciosum (S). Colchique superbe (F). مهده الشرق الاوسط. يزرع للزوين. ديفسته كبيرة اللثة، قطرها نحو ٦ سم. اوراقه تطلو من ٢٠ ال



سورتيان الحريف



سورتيان فاحي

١٤٥٠٢ - سُونْجَانْ أَيْبَسْ \*  
*Schizanthus candidus* (S). *Schizanthus blanc* (F).  
 عشية حولية تملو من ٥٠ إلى ٧٠ سم. أوراقها وريشة  
 قليلة الالتهيب واللستين. أزهارها كبيرة القند مستطيلة  
 الانبوب، مفرصة الصفحة السفلى، لونها الالبياض  
 الماجي || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٣ - سُونْجَانْ غِرَاهَام  
*Schizanthus grahmi* (S). *Schizanthus de Graham* (F).  
 عشية حولية أو حولة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقها  
 مستقلة القنوع. زلفها مبشر التجميع. أوراقها وريشة  
 مهدبة. أزهارها كبيرة القند، وردية اللون، صفراء  
 التبييض، يرتقح الزواكش || أزهارها يستمر من  
 حزيران الى ايلول.

١٤٥٠٤ - سُونْجَانْ هَدَّاب  
*Schizanthus pinnetus* (S). *Schizanthus penné* (F).  
 عشية حولية أو حولة تملو من ٢٥ إلى ٦٠ سم. ساقها  
 قنوع، فرونها كثيفة التجميع زبداء اللون. أوراقها  
 وريشة مهدبة. أزهارها كبيرة القند بنفسجية اللون صفراء  
 التبييض والمروق || أزهارها يستمر من حزيران الى  
 ايلول.

١٤٥٠٥ - سُونْجَانْ تَحِيل  
*Schizanthus gracilis* (S). *Schizanthus grêle* (F).  
 عشية حولية تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها زبداء  
 اللون. أزهارها صغيرة القند ليلكية اللون يملوها تبييض  
 بنفسجي حناره اصفر || أزهارها صبي.

١٤٥٠٦ - سُونْجَانْ وِيفِي  
*Charançon (F). Weevil (E).*  
 كلفة شاملة تطلق على معظم الحشرات التي تقرب الى  
 فضيلة السويات. ج سون || يبي يعملها خنافس  
 صغيرة القند تقرض الحبوب وتوقع بها اشد الاذى.

١٤٥٠٧ - سُونْجَانْ الْأَرْز \*  
*Calandra oryzae* (S). *Charançon du riz* (F). *Rice weevil* (E).  
*Reiskäfer* (D).  
 حشرة من السويات طويلا من ٢ إلى ٤ سم. جسمها  
 مستطيل الشكل. لونها الى البصرة الخشنة تحمل على غنيتها  
 أربع بقع حر || تركب شلب الارز وتقرض قبل  
 قشره.

١٤٥٠٨ - سُونْجَانْ الْبِرَاكِم \*  
*Pertelus sphaeroides* (S). *Pértélle gris* (F).  
*Pertelus griseus* (E). *Grauer Rüsselkäfer* (D).  
 حشرة من السويات طويلا يراوح من ٥ إلى ٧ سم. لونها  
 حنطي اللون يملو زغبة فبراء وولاج اسف || تركب  
 برام الانجرار والشجيرات المختلفة الاجناس والانواع بما  
 فيها التفاح والقيوت والكرمة والبيج تقرض اطرافها او تقضيها  
 وتوقع بها اشد الاذى || يرتقح تمش في التربة على المواد  
 الضوية للنبات.

١٤٥٠٩ - سُونْجَانْ الْقَتْنَب \*  
*Hylobius abietis* (S). *Sُونْجَانْ القَتْنَب* (F).  
*Charançon du sapin, Hylobus du pin* (F). *Fir-tree*  
*weevil, Pine weevil* (E). *Grosser branner Rüssel-*  
*käfer* (D).  
 حشرة من السويات. طويلا نحو ١٠ سم. لونها الى البصرة  
 الكستنية يملو تبييض مفسف الزواكش اصفر اللون.  
 تركب الاقنان والبنائق الحولية تفضي عليها. تمرى

٣٠ سم. وتقرض من ٧ الى ١٠، أزهارها كبيرة جيلة،  
 لونها الى الازرقاني  
 الميخج بالاصفر || أزهارها يستمر نحو ٧ أسابيع  
 يتعفن في اواسط ايلول.

١٤٤٩٦ - سُونْجَانْ كَلِيف  
*Colchicum amabile* (S). *Colchique gracieux* (F).  
 نبات جاحج مهدب الشرق. ديكسته صغيرة القند،  
 أوراقها خفيفة النصل الباهت الخضار. أزهارها نخلة،  
 مستطيلة الانبوب، خفيفة القنوع، اهليلية البتلات.  
 يتلونها زبداء البصرة الناعقة يملوها تضطبط ويتزعج ودي  
 واربراني || أزهارها يستمر طويلا شهر ايلول.

١٤٤٩٧ - سُونْجَانْ مَزِين  
*Colchicum variegatum* (S). *Colchique panaché* (F).  
 نبات مروجي مهدب مروج برياني الزيان. ديكسته  
 متوسطة القند. أوراقها متصبغة تعطي من ٢٠ الى ٣٥ سم.  
 وتقرض من ٢٥ الى ٣٥ سم. أزهارها مستطيلة الانبوب  
 الالبياض اللون، يتلونها خلية البصرة، وردية اللون،  
 يملوها مولج اسر || أزهارها يستمر من آب الى ايلول.

١٤٤٩٨ - سُونْجَانْ كَلِيف  
*Colchicaceae, Melanthaceae, Melanthaceae* (F).  
*Melanthaceae, Colchicaceae, Melanthaceae* (E).  
 فصيلة نباتية من ذوات الفلقة تشل السونجان والمريوق  
 وغيرها.

١٤٤٩٩ - سُونْجَانْ هِرْقُوسْ، شَجَرَةُ السُّوسْ،  
 رُكْلُكَلِسْ  
*Glycyrrhiza, Liquiritia* (S).  
*Régisse* (F). *Liquorice plant* (E). *Süßholz* (D).  
*Regolizia* (I).

جنس نباتات مخشوشة مصرية من فصيلة القرنيات الفراشية.  
 انولها مهدبة يعضها زراحي صناعي. تتميز بامتطالة  
 جلوريا الجسمودية. أوراقها متعاقبة مركبة وريية.  
 وريقاتها يعضة النصل، عابقة الخضار. أزهارها  
 سبلي التجميع، ابلي الانكاز. أزهارها صغيرة القند  
 لونها يخلط مع البصر، فيها الالبياض والازرق والبنفسجي.  
 ثمارها قرون صغيرة مبطلة. زروها مستديرة مفلطحة.  
 احرف وأشهر انولها السوس الغزني.

١٤٥٠٠ - سُونْجَانْ مَعَزُونِي \*، هِرْقُوسْ مَعَزُونِي  
*Glycyrrhiza glabra, Liquiritia officinalis* (S). *Régisse*  
*officinalis* (F).

جنية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. جلوريا جسمودية  
 مدادة اسطوانية الشكل، جرادتها برام اللون، لها اصفر،  
 سكري اللحم. مادته القنعة تسمى «رهبوس» وهو  
 سهل خفيف يناسب المرقش والشرع والحوامل. يفع  
 الصدر ويقي الكبد. مسحوه شائع الاستعمال الطبي  
 ويصنع منه شراب حرق السوس المستحب الناتج.

١٤٥٠١ - سُونْجَانْ  
*Schizanthus* (S). *Schizanthus* (F).  
 جنس نباتات عشبية حولية أو حولة من فصيلة الحاناريات  
 انولها ٨ سمها ربيعية. أوراقها متعاقبة مركبة ورشية.  
 أزهارها سني التجميع، تاجي الانكاز. أزهارها  
 جيلة الشكل، مفرصة، زغبة الالوان الشله || احرف  
 انولها وأشهرها ما يلي.



سوس غزني



سوس ابيض



سوسة الارز



سوسة البرام



سوسة القنوب

جميع أنواع التوتوب والصنوبر || يرقاتها تعيش على الجملوح الملقومة اليابسة .

#### ١٤٥١٠ - سوسة الجزر \*

*Liparus coronatus*, *Molytas coronatus* (S). Charançon de la carotte (F). Carrot weevil (E).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٢ إلى ١٤ سم. ثوبها إلى السواد اللامع || يرقها صغيرة القدر سواء اللون، سداة الرأس . تركيب جلود الجزر فتقرضها وتكثفها .

#### ١٤٥١١ - سوسة الخنطة \*

*Calandra granaria* (S). Charançon du blé (F). Granary weevil (E). Kornkäfer (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٣ إلى ٤ سم. جسمها مستطيل الشكل . ثوبها إلى السمرة الخنطية . تقرض البر وتكثفه وقد تصيب السلت والشعير والذرة . يكثر ويوجد في الأهرار والمخازن .

#### ١٤٥١٢ - سوسة الزيتون \*

*Otiorynchus meridionalis* (S). Charançon de l'olivier (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٧ إلى ٨ سم. ثوبها إلى السواد القمعي يملو حلب مبهر وأصفر . ارتبطها حر تركيب أوراق الزيتون فتقرض ساقه اتصل || يرقها تعيش في التربة على جلود النباتات البرية .

#### ١٤٥١٣ - سوسة الصليبيات \*

*Ceuthorrhynchus assimilis* (S). *Ceuthorrhynchus des crucifères*, Charançon de la rave (F). Turnip seed weevil (E). Kohlschotenrüssler (D).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٣ سم. جسمها يفي الشكل ، حطلي اللون . تركيب جذور الصليبيات اغصانها الفتق والتسليم والخرول والمولفون .

#### ١٤٥١٤ - سوسة القليل \*

*Lixus algeris* (S). Charançon de la fève (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٣ إلى ١٢ سم. لونها اسود لامع يملو مزاج حطلي || تركيب مع ريقها الأوراق والأزهار والحبوب .

#### ١٤٥١٥ - سوسة القرفة \*

*Amelorrhynchus melanarius* (S). *Ceuthorrhynchus du cresson* (F).

حشرة صغيرة من السوسيات طويلة نحو ٥ سم. ثوبها إلى الحطلي الباقع يملو تجزيع أحطل اللون مستطيل الخطوط ومنقرضها || تركيب أوراق القرفة وتمتص سبكها على الزهر يلفظ من ريقات تلتهم البراعم والكروبيات والبروزور .

#### ١٤٥١٦ - سوسة الكافور \*

*Otiorynchus ligustici* (S). Charançon de la livèche (F).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ١٠ إلى ١٢ سم. لونها أبيض اللون ، اسفح المزاج || تركيب الكافور وبعض النباتات الأخرى كالكرمة والشترند والقصة حيث تقيم البراعم والأوراق || يرقها تعيش في التربة على جلود النباتات .

#### ١٤٥١٧ - سوسة محذدة \*

*Otiorynchus sulcatus* (S). *Charançon sillonné* (F). *Vine weevil* (E). *Dickmaulritztler*, *Gefurchter* (D).

حشرة من السوسيات طويلة يراوح من ٨ إلى ١٠ سم. ثوبها إلى السواد اللامع يملو مزاج حطلي . زياتها زية

الفاصل، زيفها ذهبي اللون . تركيب مختلف قنابات الحقلية والكرية حيث تعيش على البراعم . ريقها فتتد بالجلود والبراقس النباتات الزيتية .

#### ١٤٥١٨ - سوسل \*

*Schizandra* (S). *Schizandre* (F). جنس نباتات جنينة عارضة من فصيلة السوليات . أنواعه ١٢ منها البرية والزرينية . أوراثها عابطة متعالية منقعة ، ستانية . أزهارها أبوية أو محورية الإرتكاز || أشهر أنواعه الزرينية ما يلي .

#### ١٤٥١٩ - سوسل آثر

*Schizandra rubriflora* (S). *Schizandre rouge* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ أمتار . أوراثها أحليجية الشكل تطول نحو ١٥ سم. أزهارها عنائقة مستطيلة ، متعالية ، لونها إلى الحمرة البالية || أزهارها يستمر طوال الصيف .

#### ١٤٥٢٠ - سوسل الصين

*Schizandra chinensis* (S). *Schizandre de Chine* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٤ إلى ٦ أمتار . أوراثها يفسية ذلقة ، نصلها سنن الحلاقة يطول نحو ٨ سم. أزهارها عنقودية التجميع ، محورية الإرتكاز ، عطرية البتلات ، من ٩ إلى ١٢ ، عطرية البرف ، لونها إلى الحمرة . ثمارها عنينة ، قريضة اللون ، سادنة العلم ، مأكولة || أزهارها يستمر من أيار إلى سزيان .

#### ١٤٥٢١ - سوسل كبير الزهر

*Schizandra grandiflora* (S). *Schizandre à grandes fleurs* (F). جنينة جادحة، عارضة، عطرية ، تطول من ٤ إلى ٦ أمتار . أوراثها يفسية الشكل ، عادية التسنين . أزهارها كبيرة اللد ، عنقودية التجميع ، لونها إلى الحمرة القويضة . أزهارها يستمر من نيسان إلى أيار .

#### ١٤٥٢٢ - سوسل مرمرى

*Schizandra marmorata* (S). *Schizandre marbré* (F). جنينة عارضة عطرية تطول من ٤ إلى ٦ أمتار . فروعها اسطوانية ، حراء اللون . أوراثها يفسية ، نصلها عايق الخفسار . احتلقها جوية . أزهارها صغيرة القدر مبرية ، متعالية || أزهارها يديم طوال شهر أيلول .

#### ١٤٥٢٣ - سوسل هنري

*Schizandra henryi* (S). *Schizandre de Henry* (F). جنينة مبروتية عارضة تطول من ٣ إلى ٥ أمتار . فروعها ثنائية الاصلب الخيشية . أوراثها أحليجية ، ذلقة الزام الأشعر . نصلها جميل الخضار الزماني ، قليل التسنين . أزهارها أبوية ، فردية ، كبيرة اللد ، عطرية البتلات ، يبيض اللون ، صرية الرائحة || أزهارها يستمر طوال الصيف .

#### ١٤٥٢٤ - سوسليات \*

*Schizandraceae* (S). *Schizandraces* (F). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة القملات . اجناسها وأنواعها المعروفة لا يتجاوز عددها ١٧ . جميعها نباتات جنينة عارضة . بعضها بري والبعض الآخر قريضي . أوراثها عابطة ، متعالية ، منقعة ، ستانية اتصال الجبيلة الخفسار . أزهارها محورية أو أبوية الإرتكاز ، الانثوي سننيل التجميع ، أما الذكرى قريضي . أزهارها صغيرة



سوسة الجزر سوسة الحنطة



سوسة الزيتون سوسة الصليبيات



سوسة القليل سوسة القرفة



سوسة الكافور سوسة محذدة



سوسل



اوراقه شيقة للتصل المحين . ازهاره ثلاثية او رباعية  
التجميع طول نحو ٦ سم . قناتها متعاقبة لونها الى الصفار  
البايت . بتلاتها الى الصفار الباقى يطوى تمرير بتسجي  
اللون ، حطلي الموضع || ازهاره يستمر من نيسان  
الى ايار .

#### ١٤٥٣١ - سوسن أحمر Iris fulva (S).

تبات جلمودي سبروتي يرغب في الأماكن الرطبة .  
ساقه نحيلة طول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها طول  
نحو ١٠٠ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ . ازهاره متوسطة القد ،  
عامة للعروق والرق . بتلاتها الخارجية والداخلية متعاقبة  
اللون يطوى ترشيع بتسجي وأخضر ، والداخلية منها  
ثلاثية التفصيص || ازهاره يستمر من حزيران الى  
تموز .

#### ١٤٥٣٢ - سوسن الجوزاء Iris unguicularis (S).

Iris à ongllet (F).  
تبات جلمودي عديم الساق ، وسيد الزهرة ، يرغب  
في المارص الجنوبية والأماكن النافذة . اوراقه عسقية  
الشكل ، لتصلها جامد اللصج ، أخضر الصلابة العليا ،  
بحري السفلى . زهره مستطيلة الانبوب ، كبيرة القد ،  
فواحة للعرق ، بتلاتها الخارجية والداخلية الى البياض  
الزاهي . حطايها ابيض || ازهاره يستمر من كانون  
الثاني الى نيسان .

#### ١٤٥٣٣ - سوسن المتألق Iris pseudacorus (S).

Iris faux-acore, I. des marais,  
Flembe d'eau (F). Yellow Iris, Yellow water flag (E).  
Gelber schwertel, Wasserschwertel (D). Iride  
gialla, Spadella d'acqua (I).

تبات جلمودي سبروتي ميلول يعيش في المواقف الرطبة  
وحل مجاري الماء وضيافات الأنهار . يطول من ٥٠ الى  
٢٠٠ سم . اوراقه متعاقبة الشكل ، بحرية التصل .  
ازهاره كبيرة القد عسقية العروق عامة المرق . بتلاتها  
الخارجية والداخلية الى الصفار الزاهي يطوى تمرير حطلي .  
ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

#### ١٤٥٣٤ - سوسن النم Iris tigré (F).

تبات قزوين من فصيلة السوسنيات مشهور باسم حومة ،  
اطبا .

#### ١٤٥٣٥ - سوسن باهت Iris pallida (S).

Iris pâle (F).  
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٦٥ الى ١٠٠ سم .  
ساقه نحيلة متعاقبة ، شرانها ابيض اللون . قناتها  
قبل التبلج الزهر . ازهاره متوسطة القد . حرقها ليموني  
الرائحة . بتلاتها الخارجية والداخلية زرقاء اللون الباهت .  
حرقها اصفر الانتشاب ، ابيض الطرف || ازهاره  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٣٦ - سوسن بحري Iris halophila (S).

Iris maritima (F).  
تبات جلمودي سبروتي يرغب في المواقف الساحلية البحرية .  
يطول من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه زباء التصل ، بحرية  
اللون . ازهاره متوسطة القد عامة المرق . بتلاتها الخارجية  
بيضاء اللون ، برتقالية المتق ؛ بتلاتها الداخلية مرققة  
بالاصفر || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

ملونة ، الذكورية تحمل اربع بتلات والذكورية ثمانية ||  
اشهر اجناسها السوسل الذي كان يعتبر في التصنيف  
أشابق من فصيلة المفلويات .

#### ١٤٥٣٥ - سوسن Iris (S), Iris (F), Iris (E).

جس لياتات برية وزراعية من فصيلة السوسنيات اتولاه  
زهاء ١٠٠ منظم جلمودي وبهشما دولسي . حطايها  
غليظة . اوراقها متعاقبة ، متساوية السطح ، فصلها  
متعاقب الصلابة متصل او حصى الشكل . ازهاره  
كبيرة القد ثلاثية الانقسام متميز باجزائها الخارجية  
المنخفضة الاطراف بينما الداخلية متمسكة وباتلاها  
القضيرة التي تعلوها سات نائمة ملونة || اشهر انولاه  
الزراعية ما يتبع .

#### ١٤٥٣٦ - سوسن أبيض Iris florentina (S).

Iris de Florence (F). Florentine Iris, Orris-root  
plant (E). Florentinische Iris, Veilchenschw-  
wertel (D). Iride fiorentina, Giglio bianco (I).

تبات جلمودي سبروتي مهله الشرق العربي . يطول من  
٦٥ الى ١٠٠ سم . ازهاره كبيرة القد ، فواحة العرق  
الطري . بتلاتها الخارجية بيضاء اللون ، زرق الرصاص ،  
حرقها اصفر . بتلاتها الداخلية حافية البياض . حطايها  
متعاقبة وسيدة اللون الكبريتي || ازهاره يستمر  
من نيسان الى حزيران . يستخرج من جذاميره مواد طبية  
نافعة ويستعمل من ازهاره مواد عطرية تستعمل في صناعة  
الطوب .

#### ١٤٥٣٧ - سوسن الجرد Iris imberbis (S).

Iris imberbis (S).  
تبات دولسي جانح . مهله افريقية القنالية . ساقه طول  
من ٣٠ الى ٥٠ سم . اوراقه متعاقبة شبه اسطوانية .  
ازهاره متوسطة القد ، صفراء اللون ، بتلاتها الخارجية  
مستوية اما الداخلية فقضيرة ومفلوية || ازهاره يستمر  
من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٣٨ - سوسن إسباني Iris xiphium (S).

Iris d'Espagne (F).  
تبات دولسي جانح . ساقه طول من ٣٠ الى ٦٠ سم .  
اوراقه متعاقبة ، اسطوانية ، غندة اللون . ازهاره  
كبيرة القد متمسكة العرق . بتلاتها الخارجية الى الصفار  
الزاهي ، بتلاتها الداخلية بتسجي اللون الانتشاب يطوى  
الزواوي || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٤٥٣٩ - سوسن أحمر Iris lurida (S).

Iris brunnea (F).  
تبات جلمودي سبروتي يطول من ٤٠ الى ٦٥ سم .  
ازهاره كبيرة القد ، حار قناتها يجمع قبل التبلج  
الزهر . بتلاتها الخارجية زرق القنافة والرق الاول ،  
صفير سائر المصلحة للمرة بالبفسجي . حرقها اصفر  
الجسم . اسد الطرف . بتلاتها الداخلية صفير الانتشاب ،  
زرق الصلابة تعلوها رشفة جوية || ازهاره يستمر  
من ايار الى حزيران .

#### ١٤٥٤٠ - سوسن أحمر Iris lutens (S).

Iris jaunâtre (F).  
تبات جلمودي سبروتي يطول من ١٠ الى ٣٠ سم .



سوسن ابيض



سوسن اسباني



سوسن المتألق

## ١٤٥٤٣ - سَوَسَن رُوذْبَاخ Iris rosenbachiana (S).

Iris de Rosenbach (F).

نبات دقيقي ، عديم الساق ، رف . اوراقة قصيرة . ازهاره ثلثية البند . بتلاتها الخارجية زبدية الالوان ، بتنجسية الصفحة ، عابية الختار . بتلاتها الداخلية الى البنفسجي الباق ، يملو تجزيع يرتقالي || ازهاره يستمر من شباط الى اذار .

## ١٤٥٤٤ - سَوَسَن سِنْدْجَار Iris sindjarica (S).

Iris du Sindjar (F).

نبات دقيقي جادح . مهد جزيرة ابن حافر . ساقه قصيرة تملو نحو ١٢ سم . اوراقة جيلة الخشار الزاهي . ازهاره كبيرة القند ، خافتة اللون . بتلاتها الخارجية زرقاء اللون ، صفراء المرق ، بتلاتها الداخلية اعليجية الشكل متجنبة اللون || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .

## ١٤٥٤٥ - سَوَسَن سَوْرِي Iris hortaei (S).

Iris de Lortet (F).

نبات جلمودي سروتي مهد الجبال اللبنانية السورية . يملو من ٢٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند خافتة اللون ، بتلاتها الخارجية الى الزرقاء البهية المنشة والمزقة بالزرقاء . مررها ذهبي اللون . بتلاتها الداخلية وردية يملوها تمرقيل بنفسي || ازهاره يدم طول شهر ايار .

## ١٤٥٤٦ - سَوَسَن سِيْبِرِيَّة Iris sibirica (S).

Iris de Sibérie (F).

نبات جلمودي سروتي رطب في المناطق الباردة . ساقه اسطوانية جفاه تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه انشامية حراء اللون ثم تستقر عند اكتمال نموها حل الاخضر . الباق . ازهاره صغيرة القند جيوتية الرائحة . قناباتها دسوة ، بتلاتها مستوية الشكل ، الخارجية منها يضاء البياض تشوها زرقاء زاهية ، والداخلية الى الزرقاء البنفسجية . ضروره الزراعية حذيفة ، فلقهاها الوأنا || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٤٥٤٧ - سَوَسَن شَالِب Iris versicolor (S).

Iris versicolore (F).

نبات جلمودي سروتي مهد امريكا الشمالية . يملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . اوراقه زبده انشليم . ازهاره كبيرة القند عادية اللون والمزق . بتلاتها الخارجية بضية الشكل بنفسجية اللون عابية الوسط . بتلاتها الداخلية وردية ارجوانية او يضاء اللون || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

## ١٤٥٤٨ - سَوَسَن شَبْكِي Iris reticulata (S).

Iris réticulée (F).

نبات دقيقي جادح . ضروره التزيينية حذيفة فلقهاها بالوانها واسطاة انانيبا . سقاها اثرية او شديدة القصر . اوراقها صفية الشكل ، تصلها يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . ازهارها كبيرة القند ، فواسة اللون . بتلاتها الخارجية والداخلية متشابهة الحجم والون يملوها نضيك ابيض البسة ، اصفر اللحام || ازهاره يستمر من شباط الى ايار .

## ١٤٥٤٩ - سَوَسَن شَوْشَان Iris sultana (S).

Iris de Suse, l. doull, l. tigré, l. crapaud (F).

نبات جلمودي رف مهد بلاد فارس . يملو من ١٥ الى ٥٠ سم . ازهاره كبيرة القند عادية اللون . بتلاتها

## ١٤٥٣٧ - سَوَسَن بَقْلِي ، سَوَسَن دَوْقِي ،

Iris asyrinchium (S).

نبات دقيقي جادح مهد حوض البحر المتوسط . ساقه تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقه خطية ، متبسة . ازهاره صغيرة القند . اسديتها متفحة الاقلام ، لونها الى الزرقاء الليمونية بتلاتها الخارجية موشمة بالاصفر . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٤٥٣٨ - سَوَسَن بِيْرْمَرْك Iris bismarkiana (S).

Iris de Bismarck (F).

نبات جلمودي سروتي مهد الشرق الاوسط . يملو من ٣٠ الى ٤٥ سم . ازهاره متوسطة القند عادية اللون ، بتلاتها الخارجية الى الصفرة المنشة والمزقة بالزرقاء يتوسطها بقية كستية . مررها اصفر اللون . بتلاتها الداخلية الى البياض الزهري يملوها تمرقيل ازرق . ازهاره يدم طول شهر ايار .

## ١٤٥٣٩ - سَوَسَن ثَوْرُس Iris tauri (S).

Iris du Taurus (F).

نبات دقيقي جادح . مهد جبال توريس . اوراقه صغيرة القند ، ضيقة النصل ، مفتحة الخشار . ازهاره متوسطة الحجم . بتلاتها اعليجية الشكل ملقبة . صفحاتها العليا لليمونية اللون يملوها تجزيع ابيض ، صفحاتها السفلى الى الخشار الباهت || ازهاره يدم طول شهر نيسان .

## ١٤٥٤٠ - سَوَسَن جِرمَانِي \* ، كَف الصَّبَاغ Iris germanica (S).

Iris d'Allemagne, Flambe, Flamme, Iris des jardins, Iris arnes de France, Glaiet bleu (F). German Iris, Blue flower de Luca (S). Deutsche Iris, Blaue Iris, Schwertlilien (D). Iris germanica, Giglio celeste azzurro (I).

نبات جلمودي سروتي لاقياسي الشكل والانتظام يملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . شرمان ازهاره قبي اللون بنفسي الرصاص . ازهاره كبيرة القند ، حارية اللون . بتلاتها الخارجية بنفسجية ، مررها اصفر . بتلاتها الداخلية الى الزرقاء الزاهية ، سلماتها مستطيلة ملونة || ازهاره يدم طول شهر آب . جذامير ، طيبة . ازهاره صناعية كالسوسن الابيض .

## ١٤٥٤١ - سَوَسَن عَشَاش Iris humilis (S).

Iris humile (F).

نبات جلمودي سروتي عديم الساق . وسيد الزمرة . اوراقه صفية الشكل ، ضيقة ، مستطيلة ، جامدة النصل الباهت الخشار . زهره لليمونية اللون الزاهي . بتلاتها الداخلية لسالية الشكل ، اما الخارجية فاعليجية . ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

## ١٤٥٤٢ - سَوَسَن عَمَّانِي العَرَف Iris sambucina (S).

Iris à odeur de sureau (F).

نبات جلمودي سروتي يملو من ٤٠ الى ٦٠ سم . حطار قناباته يبيع قبل ابتداء الزهر . ازهاره كبيرة القند ، خاتية اللون الفلواح ، بتلاتها الخارجية تملو نحو ٦ سم . صفحاتها زرقاء اللون يملوها تجزيع ابيض واربعوني . مررها اصفر . بتلاتها الداخلية جمدة الصفحة ، صفراء اللون ، يملوها تجزيع بنفسي ويملو اسفح || ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .



سَوَسَن جِرمَانِي



سَوَسَن سِيْبِرِيَّة



سَوَسَن شَبْكِي

الآزيرية حديثة. يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه زياة التصل البحري اللون. أزهاره متوسطة القد، متعددة الألوان، بتلاتها ملوكة الشكل، حطية الحار، حادة المرق || أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ١٤٥٧ - سَوَسَن مُنْتَن \* قُصُوص

*Iris foetidissima* (S). *Iris foetida*, l. gigot, l. à l'ail, Xyris puant (F). Gladdon, Gladwin, Stinkingiris, Roost-bee plant (E). Korallenschwertel, Stinkende Iris (D). *Iris foetida*, *Fiamma foetida*, *Ricottaria* (I). نبات جلمودي سبروتي يرغب في المواقع الظليلة. يعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه مفصلة. أوراقه متصلة الشكل، نصلها بأحد الخضار، متن الرائحة عند الفرك. أزهاره متوسطة القد حادة المرق. بتلاتها الخارجية خضرة الصفرة، زرقاء اللون. بتلاتها الداخلية إلى الصفار الموشح بالبنفسجي || أزهاره يستمر من أيار إلى تموز.

#### ١٤٥٨ - سَوَسَن مُهْدَب سَوَسَن

*Iris japonica* (S). *Iris frangé* (F). نبات جلمودي سبروتي مهدب الصين واليابان. يعلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقه خضرة الخضار الزاهي اللامع. أزهاره صغيرة القد، حادة الطرف والمرق. بتلاتها الخارجية مهدبة الحار، ليلكية اللون، موشحة بالأبيض والأصفر. بتلاتها الداخلية موية اللون اليلكي الزاهي. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

#### ١٤٥٩ - سَوَسَن مُوشَح

*Iris variegata* (S). *Iris panaché* (F). نبات جلمودي سبروتي حديث الصروب الزراعية. يعلو من ٣٠ إلى ٦٥ سم. أزهاره حديثة متوسطة القد، قنابها خضراء اللون. بتلاتها الخارجية إلى الصفار المرق بالبنفسجي، مرقها حطية. بتلاتها الداخلية إلى الصفار. أزهاره يذوم طولك شهر أيار.

#### ١٤٦٠ - سَوَسَن لَحِيْلِي الْوَرَق

*Iris graminea* (S). *Iris à feuilles de graminé*, l. *avoine* (F). نبات جلمودي سبروتي يعلو من ١٠ إلى ٣٠ سم. أوراقه صغرية الشكل، جامدة التصل، بحرية اللون، طولها من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أزهاره متوسطة القد. بتلاتها الخارجية والداخلية مستديرة الشكل، كبيرة الظلير لونها إلى البنفسجي الموشح بالأصفر || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ١٤٦١ - سَوَسَنِيَات

*Iridaceae*, *Iridae* (S). *Iridaceae*, *Iridae* (E). فصيلة نباتية من وبيدات الفللة. أجناسها وأزواها كثيرة الحد. أشهرها السوسن والزفران والدلوث الخ.

#### ١٤٦٢ - سَوَسَنِي

هو التفرعان الحزني، الخلية.

#### ١٤٦٣ - سَوَسَنِيَات

*Curculionidae* (S). *Curculionidae*, *Rhynchophora*, *Charanopoda* (F). *Weevils* (E). *Rüsselkäfer* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غمديات الاجنحة. عراوئها وأجناسها وأزواها الممودة حتى الآن زهاء ٥٠٠٠٠ جميعها صغيرة القد. رؤوسها عظمية الشكل لتتبي يمتلك قاضم ثقب. فرونها الاستثنائية صولبانية أو مرقية. فواصلها تراوح من ١٠ إلى ١٢. أرباعها خنسية التكوين، رباعية الظلير || مكناها صغير الحجم، كروي الشكل تمتصه الانثى فوديا في ثقب تملصا

الخارجية والداخلية ودية اللون ملصاة الرخاض يعلوها تجرير وتندب أسره، وتوسط الخارجية منها بتسج فصيلة فصيلة السواد || أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار.

#### ١٤٥٠ - سَوَسَن شَبِيقُ الْوَرَق

*Iris stenophylla* (S). *Iris à feuilles étroites* (F). نبات ديفسي جاح. مهدب الشرق الأوسط. ساقه أثرية. أوراقه خضرة التصل. أزهاره كبيرة القد بنفسجية أو زرقاء اللون يعلوها خضرة عابث شديدة البسة || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

#### ١٤٥١ - سَوَسَن طَنْجَمَة

*Iris tingitana* (S). *Iris de Tanger* (F). نبات ديفسي جاح. مهدب افريقية الشالية. ساقه رفيعة تملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه صغرية الشكل والتصل. أزهاره كبيرة القد، بتلاتها متساوية الحجم، بنفسجية اللون يعلوها في وسطها بقع صفر || أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان.

#### ١٤٥٢ - سَوَسَن عَكْرَبِي

*Iris plantifolia* (S). *Iris scorpion* (F). نبات ديفسي جاح. ضروبه الآزيرية حديثة، تتميزها يرتكز على قد الشراخ ولين الزهرة || شاربها الزهرية تملو من ٨ إلى ١٥ سم. أزهارها كبيرة القد، فواصة الطرف البطر، بتلاتها ليلكية اللون الزاهي اللامع. امتثالها إلى الصفرة. أوراقها صغرية الشكل، جامدة النسيج، طولها نحو ٣٠ سم. || أزهاره يستمر من كانون الأول إلى آذار.

#### ١٤٥٣ - سَوَسَن قَارِي

*Iris persica* (S). *Iris de Persa* (F). نبات ديفسي جاح. مهدب بلاد فارس. ساقه أثرية. أوراقه صغرية وقصيرة. أزهاره كبيرة القد، فواصة الطرف البنفسجي. البروا يطول نحو ٦ سم. بتلاتها الخارجية ليلكية اللون، حطية الحار الأزرق. بتلاتها الداخلية صغرية القد مستديرة اللون || أزهاره يذوم طولك شهر آذار.

#### ١٤٥٤ - سَوَسَن لَرَم

*Iris pumila* (S). *Iris pygmaea* (F). نبات جلمودي سبروتي حديث الصروب الزراعية. يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. أوراقه خضرة التصل البحري اللون. زهره وسيدة طول نحو ٢٥ سم. قنابها غالبا بنفسجية بتلاتها ملوكة تختلف مع الصروب. مرقها أزرق الجسم أصفر الطرف || أزهاره يستمر من آذار إلى أيار.

#### ١٤٥٥ - سَوَسَن مُدْهَب

*Iris aurea* (S). *Iris doré* (F). نبات جلمودي سبروتي يرغب في المناطق الجبلية. يعلو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه زياة التصل لونها إلى الخضار الباهت. أزهاره كبيرة القد، شاربها أخضر، بتلاتها الخارجية بيضيه الشكل، حطية الحار، ملحية اللون. بتلاتها الداخلية سائبة الصفرة، زاهية الصفار الاقل || أزهاره يذوم طولك شهر حزيران.

#### ١٤٥٦ - سَوَسَن مِلَوَكِي

*Iris spatulata* (S). *Iris en spatule* (F). نبات جلمودي سبروتي ميلو في المروج الرطبة ضروب



سوسن منن

Pied du champignon (F). **سوكه** ١٤٥٧٤

Tigel of mushrooms (E).  
السوقة من الفطر والطراوت ما كان أسفل التكمة وقد يقوم مقام الساق في الثبات ويسرف أيضاً بالزروج.

Foire des bestiaux (F). **سوكي المرواني** ١٤٥٧٥

Cattle-fair (E).  
سوق يجتمع فيها الناس في أيام مطوية ليبيع ويطراء للماشية.

Aloté (S). **سوكه** ١٤٥٧٦

Aloté (F). Aloté (E). Aloté (D). Aloté (I).  
جنس نباتات لحية ممررة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه عديدة بعضها عديم الساق. أوراقها خضراء مستطيلة التصلب، غصية التجميع. أثمارها عنقودية يصهلها شراخ بسيط أو مشعب. يستخرج من أوراق بعض أنواعه مصارة طبية مرة الطعم، مذهبها اللبنة تسمى سولجين (Alotme) مشهورة الاستهلاك الطبي. أعرف وأشهر أنواعه ما يلي

Aloté africain (S). **سوكه الإفريقي** ١٤٥٧٧

Aloté africain (F).  
شجرة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار. ساقها عديمة الأوراق. أوراقها طويل من ٤٥ إلى ٦٠ سم. تصلها بأخت الخضر، شائك الحافة والمقصة. أثمارها عنقودية لينة طويل نحو ٣٠ سم. لونها إلى الصفرة الزاهية. أثمارها يستمر من آذار إلى نيسان.

Aloté ghauca (S). **سوكه بحري البين** ١٤٥٧٨

Aloté ghauca (F).  
نبات عديم الساق. شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أثمارها عنقودية التجميع، وردية اللون، يطولها موج قريزي. أوراقها طويل نحو ٢٠ سم. تصلها بحري البين، ذلق أرقام الإصغر، عديم الحشف، أسود اللشام القصير. أثمارها صبي.

Aloté zaponaria (S). **سوكه عريض الأوراق** ١٤٥٧٩

Aloté zaponaria (F).  
نبات عديم الساق. شراخه الأزرق يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أثمارها حلقة التجميع كبيرة اللبنة، حلقة الحمرة الزاهية. أوراقها مستطيلة، مستعصية، تصلها بأخت الخضر يطول نحو ٢٠ سم. حوافها شائك الحافة، مذهب الحلقف أحاد اللشام. أثمارها يستمر من أيار إلى حزيران.

Aloté arboreus (S). **سوكه قرن الكيش** ١٤٥٨٠

Aloté arboreus (F).  
شجرة تملو من ٤٥٠ إلى ٥٠٠ سم. ساقها مستقيمة مشعبة القروص. أوراقها مستقيمة على الساق بدون انتظام. تصلها تحتين السنج، بحري الخضر، يطول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. صفته خشبة، حفرية الانتواء على شكل قرن الكيش. أثمارها عنقودية لينة ليس إلى الحمرة المرابية. أثمارها يذوق من كالفين الأول إلى آذار.

Aloté brevifolia (S). **سوكه قصير الأوراق** ١٤٥٨١

Aloté brevifolia (F).  
نبات عديم الساق يربغ في المراتق اللبنة. أوراقها طويل من ٣٠ إلى ٤٠ سم. تصلها إلى الخضر الأزرق، أسيف الحافة، مذهب المقصة، مستطيل اللشام. شراخه الزهري يملو نحو ٣٠ سم. أثمارها حمر طويل نحو ٤ سم. أثمارها صبي.



سولج



سولج بحري البين

لأخضائه. يرقمها حديد الأربل، مقصة، مدية الطرف. تبيض على غطف الأعضاء والمواد النباتية والعضوية.

Flagelliforme (F). **سوطي** ١٤٥٦٤

Flagelliform (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما كان كالسوط شكله ولذاته

Flagella (S). **سوطيات** ١٤٥٦٥

Flagellés (F). Flagella (E).  
شعبة حيوانات دنيا وسيدات الخلية من صف النقبليات.

Enflagella (S). **سوطيات أصليّة** ١٤٥٦٦

Enflagellés (F). Enflagella (E).  
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Rhizoflagella (S). **سوطيات جذريّة** ١٤٥٦٧

Rhizoflagellés (F). Rhizoflagella (E).  
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

Cystoflagella (S). **سوطيات مكانيّة** ١٤٥٦٨

Cystoflagellés (F). Cystoflagella (E).  
رتبة حيوانات دنيا من السوطيات.

Choanoflagella (S). **سوطيات مُنقوكة** ١٤٥٦٩

Choanoflagellés (F). Choanoflagella (E).  
رتبة حيوانات مجهرية من السوطيات.

١٤٥٧٠ **سُوْخِي** و **كريبوسوما**

Cryptomeria (S). Cryptométrie, Sugi (F).  
سوي هو الاسم الياباني، شجرة حرجية وحيدة الجنس والنوع من الطنوسيات. مذهبها الياباني. ساقها ترتفع نحو ٧٠ م. قشرها حطية اللون مبرقع اللوح. شوكها أبيض. غصنها أحر جوي. اتحادها لفة الأوتكاز. أوراقها غزيرة طول من ٦٢ إلى ٢٥ م. لونها إلى الخضر الأزرق. أثمارها وسيدة الشق والمسكن. أكرانها كروية، قطرها براون من ١٠ إلى ٣٠ سم. جرافاتها صغيفة الشكل مقررة. زوردها مجنسة، مستطيلة، مربابة السنن. وهي من الأشجار البرية المتوسطة النمو. أثمارها المناطق المعتدلة. تربف في الأرتبة الصيفية الدور المتوسطة الرطوبة. اغصانها صناعية جيدة الصنف.

Marché (F). **سوك** ١٤٥٧١

Market, Market-place (E).  
هو المكان الذي تباع فيه الحيوانات والهاضيل والمركبات، سوق الخيل وأثاث والفنر والزهر...

١٤٥٧٢ **سوك إنشعبر**

Halle, Marché des légumes (F). Market-hall (E).  
سوق تباع فيها البقول والخضراوات والفواكه.

Laburnum (S). **سوكوم** ١٤٥٧٣

Laburnum (F).  
جنس شجيرات ونباتات برية وزيينية من فصيلة البقوليات القراشية. أنواعه عديدة جميعها سبروتية. أوراقها عابطة، مركبة، ثلاثية الورديات. أثمارها حفرية لرافقة، عنقودية التجميع، طويلة اللشام، متدلية. أشهر أنواعه الحبق الشائع المعروف بالانوس الكاذب، أصلي.

Solena (S).

Solen (F). Solena (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة السولنات. أنواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في جميع بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جسده اسطوئي الشكل مستطيل تلحفه صفة بالقرب مشطية المخضر المنفرج. يعيش متنفذاً عريضاً في الرمال العميقة بالماء || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

Solenidae (S).

١٤٥٩٠ - سَوَيْكِيَّات \*

Solenidae (F). Solenidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم . اجتماعها وأبعادها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || اجسامها مستطيلة || أرجلها اسطوانية ، أصلها شبه غريبة الشكل ، ثنائية المصارع المتساوية || أرواف اجسامها وأشهرها السولن .

Fagaceae (S).

١٤٥٩١ - سَوَيْكِيَّات

Fagaceae (F). Fagaceae (E).

هي فصيلة السندليات من ذوات الفلقتين العديمات القامات . تشمل السنديان وإزان والكسنة .

Eurygaster integriceps.

١٤٥٩٢ - سَوَيْكَة \*

E. maurus (S). Souné, Sen (F). Suna pest (E). Aiatische Getreidewanze (D).

وتسمى أيضاً بقصة الزرع. حشرة خاد من فصيلة القامسيات. طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. جسمها مفلطح الشكل مسطح. ظهرها مجهز بنس صفيحة دقيقة الشكل لها إلى الصفار الزاهي تلوه خطوط مستطيلة قليلة الارتفاع وبكتبان جليتان عند انتهابه || موطنها بلاد الشرق الأدنى . تركب الحشرة والشعر وتقع بها اشد الاذى لأنها تمص اللبغ فتضع الاسبال وتسبب الذبول. تظهر الحشرة الكاملة في أواخر نيسان ثم تتزاوج بعد ظهورها بامبور . كويها يدمر بضع ساعات . وبعد كويها بارية أيام تمتع الاثني مكها الصغير ، الكروي الشكل ، الاخير اللون ، حل صفحات المصنف العليا ، لطفاً متساوية يراوح عددها من ١٢ إلى ١٤ وكل لفحة تحوي من ١٢ إلى ١٤ مكة تنفد ، بعد متنها بنحو ١٠ أيام ، عن يرقات دقيقة تبلغ طولها الحشري بعد انقضاء أربعة أسابيع تكون غلظاً قد مرت بارية انسلخات || والوسيلة شارة في جميع ادوارها لا سيما في الدور الحشري . تكالغ لما يستأكل اسد الحشيري النعامة تفرغ على الزرع فيفشي عليها بكاملها . وأما بحرقها بعد جمعها ضمن احباب خاصة تستعمل لهذه الغاية . ومن الطرق الناجمة استبدال انواع الحشرة البليدة بالوارع باكورية تمكن الزرع من الاسبال والمهيج قبل ان تستكن منه الحشرة .

١٤٥٩٣ - سَوَيْدُ الْقَيْصَةِ \* ، لِيغْرِبِلُ الْقَيْصَةِ

Colaspidea atrum (S). Négril de la luzerne, Colaspe, Colaspide, Babotte noire (F). Luzarna grub (E). Colaspide atrum (D).

حشرة من التفريل من فصيلة النصارياي جسمها بيضي الشكل ، عذب الظهر . طولها يراوح من ٤ إلى ٦ م. ثوبها إلى السواد اللامع . تمتع مكها على القصة فيتم من يرقات تلثم الارواك || تظهر في نيسان وتستمر إلى ايلول . تكالغ باستمال الرتيبتون .

Aloë officinal

١٤٥٨٧ - سَوَيْكٌ عَزْرِي

يسمى بالبالية ، اهلينا .

Aloë striata (S).

١٤٥٨٣ - سَوَيْكٌ مُخَطَّط \*

Aloë strié (F).

نبات عديم الساق شراخه الزهري يعلو من ٤ إلى ٦٠ سم. ازهاره مظلمة التجميع ، حمراء اللون . اوراقه قليل من ٤ إلى ٦٠ سم. نصلها ثخين اللبغ ، عديم الحشف ، عسلط الصلصة . عسلطها شائعة لها إلى الجزيرة . ازهاره يستمر من نيسان إلى ايار .

Aloë plicatilis (S).

١٤٥٨٤ - سَوَيْكٌ مِرْوَحِي

Aloë éventail (F).

جنية تعلو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. اوراقها متطابقة ، ثنائية التجميع ، مروحية الهيئة ، نصلها يعلو من ٢٠ إلى ٤٠ سم. لونه إلى الخضرة البحرية . حذاز مسن الخلق ، اسنانه نجيلية ، يضاء اللون . ازهاره رتيالية || متوسطة الارتفاع طولها يراوح من ٤ إلى ٥ سم. || ازهاره يستمر من ايار إلى حزيران .

Aloë grandidentata (S).

١٤٥٨٥ - سَوَيْكٌ مُسْتَن

Aloë à grandes dents (F).

نبات عديم الساق . شراخه الزهري يعلو من ٣٠ إلى ٤٠ سم. ازهاره مستطيلة الشكل رتيالية اللون || اوراقه قليل من ٣٠ إلى ٥٠ سم وتعرض نحو ٧ نصلها قليل التصديق يتخرج انخسار الارزق ، مسن الحلفة ، شاكلة الانسان الحادة المتقاربة || ازهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

Aloë ciliaris (S).

١٤٥٨٦ - سَوَيْكٌ مَهْدَب

Aloë cilé (F).

جنية مرصعة نجيلية الساق المستطيلة التي قليل نحو ١٠ امتار . اوراقها شبيهة كقصل الذي يعلو من ١٠ إلى ١٥ سم. ويعرض نحو ٣ سم. حذاز مهذب الحلفة حشفه ابيض اللون || ازهاره عتيقبة التجميع لها إلى الحيرة الزاهية للامعة || ازهاره يستمر من آذار إلى حزيران .

Tereksia (S).

١٤٥٨٧ - سَوَيْك \*

Téréksie (F). Téréksie (E).

جنس طير من طوالب الساق وصفيحة الزرقايات . انواعه المعروفة ثلاثة جميعها من الطيور القاطنات مشاعها البلاد الحارة الاسيوية والافريقية ، مصيفها البلاد المعتدلة الحرارة من آسيا الشمالية إلى اوروبا || اروف انواعه وأشهرها السويكة الشهاب .

١٤٥٨٨ - سَوَيْكَةُ شَهْبَاء \*

Tereksia cinerea (S). Téréksie grise (F).

طائر من السوط قريب الشبه من البريقفة السلطانية . جسمه متوسط القد ، صدر الرأس ، مستطيل للطاق العنق القليل الانحناف . رأسه وظهوره ورجلاه وذنبه إلى الكهبة الشهاب . زوره وصفته بوجوهه ويطه وانتيكه إلى الشهبه كيشية المراج . ذنبه غزوي الشكل ، قصير . ساقه إلى السرعة للسلطه . قوته الاغصان واليزور والحشرات . انشاء تفتن منها في انموس تقيمه بين الاغصان النجيلية المصلية القليلة الجهد من الماء . جسدها اربع يضا .



سولن مخطط



سولة شهاب



سولن



سولة



سويد القصة

تتميز باستطاعة تلك الأمل التي يتبعها بطن صلب ،  
استطيل الجرم ، منبسط الطرف . وتتميز أيضاً بدرجة  
انتفاخها التي تبلغ نحو ١٠٠ كيلومتر بالأسعة .

١٤٦٠٧ - سِيَاكِي \*  
Par série (F).  
From series, Standardized (E).  
هو في البرق الاقتصادي الإنتاج الآلي بالأسعة .

١٤٦٠٨ - سِيَاكِل \*  
Sial (F). Sial (E).  
اسم اصطلاحي يطلق على القشرة الأرضية الجامعة للكمية  
محتفظاً من محور سوانية وبازونية ، تقدر سماكتها بنحو  
٩٠ كيلومتر ، تلفظ القطع فيه المائع الذي يعطى منه .

١٤٦٠٩ - سِيَاكِلَة  
هي السطح اللامع شبيه غا ذك أبيض طوله إذا زرع  
سأل منه بين تلك صافية لينة طيبة . ج سياتل .

١٤٦١٠ - سِيَاكِلَة  
Fascie, Liste en tâches (F).  
السيلة والسائلة شبة مستطيلة الشكل كالقائمة .

١٤٦١١ - سِيَاكِيَان  
Slamang  
هو الجبين السند كتيل ، اطليه .

١٤٦١٢ - سِيَاكِيَانِيْدَة  
Cianamide, Cyanamide  
السياناميد أو الكلس اللازوتي من الاصطناع الكيماوية  
التركيبية التي يستحصل عليها بتثبيت الآزوت الجوي  
على كربيد ، الكلسيم . لشكائه التجارية الشائعة  
الاستعمال ثلاثة :

١ - السياناميد المبريل . يحوي من ٢٠ إلى ٢٤٪  
أزوت مع ٧٥٪ كلس . سميائه سواء اللون ، ثوبية  
الرائحة .

٢ - السياناميد المسحوق للزيت . يحوي من ١٨  
إلى ٢٠٪ أزوت مع ٩٠٪ كلس ويضاف إليه نحو  
٢٪ من الزيت المثلل لتسهيل لثته . مسحوق أسود اللون ،

ذمسي اللبس ، لثني الرائحة .  
٣ - السياناميد القوي أو نيتراسياناميد . يحوي ١١٥٪  
أزوت اميدي و ١١٥٪ أزوت نيتريكي . فهو كروي  
الجوهر ، حاد الرائحة . اسمر اللون .

١٤٦١٣ - سِيَاكِيَانِيْدَة \*  
Cyanella (F). Cyanella (F).  
جنس نباتات جنسوية برية وتربيت من فصيلة الزنبقيات .  
أزواها المرفوعة ستة منبهاً بعض مناطق افريقية انجوية ||  
جلديها درية لروضة . سفها خراشعية فراء . أزواها  
حاجسة ، مستطيلة ، متعاقبة ، زاهية الخضار . أزوارها  
عقودي التجميع . أزواها صغيرة جميلة ، زرقاء اللون أو  
صفراء || تزور في المراكز إنما تجنى البرد .

١٤٦١٤ - سِيَاكِيَانِيْدِين \*  
Cyanogène (F). Cyanogène (E).  
غاز شديد التفاعلية تتألف مركب من الكربون والآزوت .

١٤٦١٥ - سِيَاكِيَانُور ، سِيَاكِيَانِيْد  
Cynacro (F).  
Cynide (E).  
اتحاد السيانيدين مع جسم بسيط .

١٤٦١٦ - سِيَاكِيَانُطُس  
Ceanothus (S).  
Ceanothus, Ceanota (F). Blue tea bush, Red root  
tree (E). Säckelblume (D). Ceanoto (I).  
جنس نباتات برية وزيتية من فصيلة النبقيات . أزواها

١٤٥٩٤ - سُوَيْدَة

Albumen, Albumine, Endosperma, Parisperma (F).  
Albumen, Albumin, Endosperm, Perisperm (E).  
مادة نشوية أو دهنية أو آسية تكون في البزرة تحتلي  
مها للملحقة .

١٤٥٩٥ - سُوَيْدَة  
هي الدلول ، اطليه .

١٤٥٩٦ - سُوَيْدِيْ سَكَلِي  
Hypocotyle (F).  
Hypocotyl (E).  
هو الجزء السفلي من الجنين مركزه بين السنج والفلقتين .

١٤٥٩٧ - سُوَيْدِيْ عَكِيْرِي  
Epicotyle, Tigelle (F).  
Epicotyl (E).  
هو الجزء الاامل من الجنين مركزه فوق الفلقتين فوق  
الفلقتين تحصيل الباق من نمو .

١٤٥٩٨ - سُوَيْدِيْكَتَة  
Phlebocoma (F).  
هي السكيت نوع من البيض الصغير الساكث .

١٤٥٩٩ - سُوَيْلِي  
Egal, Parall (F). Equal, Like (E).  
السول أو المتديل .

١٤٦٠٠ - سِيَاك ، وَشِيْع  
Hale (F). Hedge (E).  
فاصل من الأشجار أو جنبات حية يفصل الحديثة أو  
الحقل عن غيرها .

١٤٦٠١ - سِيَاكِرَة  
Planète (F). Planet (E).  
السيارة أو الكوكب السيار جرم فضائي كبير القدر  
يدور حول الشمس ويسمى منها الثور كالارض وضارطة  
والمرئخ والنشري ...

١٤٦٠٢ - سِيَاك  
Ben (F).  
هو ألبان ، اطليه .

١٤٦٠٣ - سِيَاكَل  
هو سون المنافع ، اطليه .

١٤٦٠٤ - سِيَاكَل الْبَحْرِي  
Xiphias (S).  
Espadon (F). Swordfish (E).  
جنس اسماك بحرية كبيرة القد من فصيلة الاسقمريات .  
أزواها مهيئة بكثرة وجوها في مجار المناطق الحارة .  
تتميز باستطاعة حلق فكها الاامل الذي يدور كالسيف .  
اشهر أزواها سياف البحر المرووف .

١٤٦٠٥ - سِيَاكَل الْبَحْرِي الْمَرْوُوف \*  
Xiphiss gladius (S). Espadon commun, Polsson  
épée (F). Common swordfish (E).  
نوع من سياف البحر كبير الجثة والسيف والزنفسنة  
الظهيرية . طوله يبلغ خمسة أمتار . موطنه المتوسط  
والأطلسي .

١٤٦٠٦ - سِيَاكَلِيَات  
Xiphilidae (S).  
Xiphilidae (F). Xiphilidae (E).  
فصيلة اسماك بحرية من رتبة شائكات الزمائف كانت في  
التصنيف الماضي من توابع فصيلة الاسقمريات || أزواها

المرفوعة قليلة العدد ، اشهرها سياف البحر والرمال والسيارية .  
جميعها من الاسماك البنية التي لا تقترب كثيراً من المياه  
والساحل || موطنها مجار البلاد الحارة غير أنها لا تمتنع  
من تغيب أسراب الزنكة والسردين حتى في انهار البلاد  
المحتلة الحارة || أسماها كبيرة القد ، وشمية الشكل ،



سياف البحر المرووف



سيانة

الاحنة . وهي صورة ريبيل قائم على رجليه اليسرى وقد رفع رجله اليمنى ويده اليمنى فوق رأسه ويده اليسرى رأس غوط .  
حده نحوها ٩٩ أشهرها ٩ المرقق و ٥ رأس النمل و ٥ عاتق القريا .

Pommier (F).

١٤٦٢٤ - صَيْبُ

هو التفاح ، اطلبه .

١٤٦٢٥ - صَيْرْسُ الزَّرْعِ \*

Scythris temperatella (S).

فراشة صغيرة القند من فصيلة التاربات تورجا الى السمرة الداكنة . اجنتها مهدبة الاطراف . زياتها عبيطان مستطيلان . جيلها الحولي واحد . رقبها تسمى دودة الزرع ، اطلبها .

١٤٦٢٦ - صَيْكُسْ هو الزان ، اطلبه .

١٤٦٢٧ - صَيْفُورْ \* ، فَعْمَة مُتَوَجِّه \*

Cystophora (S). Cystophora, Phoque & capuchon (F). Hooded seal (E).

حيوان بحري لثوب من فصيلة الفقسيات . اصطاته مجاح يحار البلاد الباردة من التروج الى القطب والارض الجديدة طوله نحو ثلاثة امتار . قوته الى السواد الارزق المروج تلو رقبته يضاء . رأسه اطرافه سود . يمشي الذكر عذبة فباية تلو الرأس فزبدية تجمعا الى اثني قطع جبراً واحداً في الحلق ، ابيض اللون ثم يمسر مع العمر ويأخذ ثوبه النهائي عند اكتمال ثلاث سنوات الى قوته الامساك والقرش ثوبه والريش ثوبه يصاد من اجل فروه الفاخرة الصنف . ينهم من اكل اللحم ويستعمل الزيت والامعاء والطعام .

١٤٦٢٨ - صَيْفُكْسْ ، كَتَبُ الْبَحْرِ . Mustel (S).

Emissole (F). Smooth hound, Prickly hound (E).  
لا يمكن اعتداد اسم وكتب البحر لانه يطلق على اكثر من عشرة انواع من الاسماك الكبيرة المغترية الى والسجل جنس اسماك بحرية ولودة من فصيلة البنيكيات . انواعه المعروفة قليلة . اصطاتها يحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة جميعها مفترسة بطاشة لا تأخذ من شيء . سرسها الم تحفر كالسم الى اجسامها وبشدة الشكل . طولها من ٦٤٠ الى ٢٠٠ سم . ألونها تراوح بين الكحلة والبردة المخططة الماجات . رؤوسها مخروطية . اشدتها اسفل قصيرة متعرجة . اسناتها صغيرة ، حادة ، متأسكة الرصف . نوسها مجهوزان بصمات ساذنة تشجع وتثقل عند الطلب . قصيرة النسيم تتأخر مؤخرة العين الى زمانها متباينة الترتيب والاشكال . اللذلية كبيرة ، مستطيلة ، ثنائية التفرين السفل الى اعرف انواعه واشهرها السجل المبلول والسجل الاسل .

١٤٦٢٩ - صَيْفُكْسْ أَمْلَسْ \* Mustel (S).

Emissole lisee (F). Smooth hound (E).  
نوع من السجل . سمكة بحرية ولودة . اصطاتها البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي اعصها المخططة المنقطة من جبل طارق الى كوناكري في جيسما وشي الشكل يطوله من ١٤٠ الى ١٦٠ سم . ثوبها الى البردة الخطية تزرق وتسر في الظهر وبقيش في البطن . مسكها مالمس البشرة حاد الصليب . لمسها كاعين الصنف ، قل من يربط فيه . مسكها شائع الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف .

المعروفة ٢٠ منها المناطق الامريكية الحارة . اوراتها عابلة متعاقبة بسيطة . ازهارها عشوية ، خسية التركيب ملونة التيج . ثمارها جراء ثلاثية اللسان الى اشهر انواعه مالمس .

١٤٦٢٧ - سِيَاثُونُسْ أَمْرِيكِي Ceanothus

americanus (S). Céanothe d'Amérique (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم . اوراتها اهليلية ، ذلقة ، مطية . تصلها نام القصيع ، ضمن الحلق ، بحري الصنفه العليا ، ازنب السفل ، الزاد عاتية التجميع ، قمية البيلات انصامت اليباض الى ازهاره يستمر من حزيران الى آب . يستخرج من جلود مواد طيبة كثيرة التبع تصلح في معالجة السلس والزحار وبعض الحيات .

١٤٦١٨ - سِيَاثُونُسْ عَمَلِي Ceanothus

velutinus (S). Céanothe velouté (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٨٠ سم . اوراتها مستطيرة القامة ، مستطيلة الصل الذاق الحسل البشرة على صفحتي ازهارها يضاء اللون ، حشكوية التجميع ، صغيرة القند . ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٦١٩ - سِيَاثُونُسْ صَنْجُونِي Ceanothus

szuruz (S). Céanothe szuruz (F).  
جنية معمرة جادحة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروصها اسطوانية ، زياء اللحاء . اوراتها متباينة قليلة التسنين . تصلها مالمس الصنفه العليا ، حلي السفل الصنفه اللون . ازهارها كاسية التجميع ، سفلية الشكل ، صينية اللون الى ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٤٦٢٠ - سِيَاثُونُسْ فَيْدَلِر Ceanothus

fendleri (S). Céanothe de Fendler (F).  
جنية معمرة فراء شائكة ، تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروصها بحرية اللون . اوراتها يضيئة ، صغيرة القند ، حادة التسنين . تصلها مالمس الصنفه العليا ، حلي السفل القسية اللون . ازهارها عشوية التجميع لونها الى اليباض اليلكي الى ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٤٦٢١ - سِيَاثُونُسْ قُتُونِي الزهر Ceanothus

thyrsiflorus (S). Céanothe on thyrs (F).  
شجيرة تملو من ٣ الى ٦ امتار . فروصها سفلة مالمس اللحاء . اوراتها اهليلية ، حادة التسنين . تصلها ازنب العروق ، باحت الخضار . ازهارها قنوية التجميع ، سفلية الشكل ، زرقاء اللون الى ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

١٤٦٢٢ - سِيَاثُونُسْ مُسْتَن Ceanothus

dentatus (S). Céanothe denté (F).  
جنية برتوية معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراتها اهليلية مسنة ، تصلها مالمس الصنفه العليا ، مكثوف الخناك السنن ، حلي الصنفه السفل للثراء اللون الى ازهارها غنية التجميع ، زرقاء اللون . ازهارها يدوم طوال ايار .

١٤٦٢٣ - صِيَاكُونُسْ ، فِيرْسَكُونُسْ Persia (F).

Persous (E).  
سايوس او فرسوس وتسمى ايضاً حبلد رأس القمل ، كوكبة نجوم شمالية المقي مركزها بين ذات الكرسى وسلك



سِيرْسُ الزَّرْعِ



سَيْطُرْ



سَيْلْ أَمْلَسْ

لونها الى الجوزة تركب قشور الابر قرب ادراكها بقتلها.  
يكافح عند ظهورها باستمال احد الانواع البراغيز النملية  
الحفلة .



سجل ميدول

### ١٤٧٣٨ - سيجولوجية ، علم الخلايا

Cytologie (F). Cytologie (E).  
علم يبحث في ماهية وحياة الخلايا من جميع النواحي ان  
جسدية او كيميائية او خلافا .

### ١٤٧٣٩ - سيجورفولوجية

Cytomorphologie (F). Cytomorphologie (E).  
الدرس القياسي (المؤلفي) الخاص بالهياكلية .



سجلان الزرع

### ١٤٧٤٠ - سيجون

Stona (S). Stona (F).  
جنس حشرات صغيرة القند مسطحة الجسم من فصيلة  
المسيكات . انولاه عديدة تطول من ٥ الى ١٦ م .  
انولاه مختلفة الالوان السوية يكثر فيها الاطلس والخطي.  
تركب غشيت نباتات الفصيلة القرنية . انولاه زائدة  
لا تتجاوز طبع بعض الارواق .



سجلان زيم

### ١٤٧٤١ - سيجون مُعَلِّقَة

Stona lineata (S). Stona lineata (E).  
حشرة خاضعة داخية من فصيلة المسيكات وذرية معدلات  
الاجنية . خنافسها تعيش على لوراق القضايات البرية  
والزراعية . يرقاتها تركب الجذور لتصلها || جسمها صغير  
القند يطول من ٤ الى ٥ م . ثوبا الى الشبهة انفسه تملوها  
ماجة كسنتية جزوية تتقلب مع انكسار البثور . راسها  
مستعرض الجرم . حينها كبريات . زياتها راسها  
متكها مسطحة الطول . ظهورها مستعرض الحولف الكلاص .  
عندما كيفت اتمل ، غشيتا التحزير القاطب . ارسافها  
رباعية العقل الظاهرة || لها جليل واحد من الحولف .  
الحشرة الجملانة من نباتها الشورى في اوائل الربيع وتعيش  
حتى اواخر تموز . كسر في التبار . قشاة بمد ظهورها  
باسبيون . تمتع المكان بل فصل الارواق وني التربة .  
اما متوسط ما تمحه من سكن فنس ١٤٠٠ || العيلة عند  
بلورها الادراك اتمام تطول نحو ٦ م . جسمها مقوس  
الشكل عادم الرواجب ، نبي الحولف ، اسمر الرأس || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في التربة  
ضمن جراب من الطين والمولد النباتية .



سجلان

### ١٤٧٤٢ - سيجين

Cétine (F). Cétine (E).  
السيجين مادة دعنية تستخرج من بعض انواع الحيات انفسها  
السبر .

### ١٤٧٤٣ - سيججان

Scarus sigejan (S).  
Scara sidjan (F).  
سمكة بحرية من نبات مصفار مأكولة طية العلم كان  
لها شهرة في المصور للتارة .



سجلان عسل

### ١٤٧٤٤ - سيج

Run off surface (E).  
مقدار الماء الذي يسيل على مسلة معينة من الارض .

### ١٤٧٤٥ - سيج ، صهر ، صهر ، صهر ، صهر ، صهر

Fondre (F). To melt. To cast (E).  
ذوب  
قاد او درج التي الى حالة اللاتية .

### ١٤٧٤٠ - سيجسجل ميدول

Mustelus vulgaris, Mustelus mustelus (S). Emissola communis, Moutella (F). Prickly bound (E).

نوع من السجل . سمكة بحرية ولوح . اطالها فصيلة  
الارباب تشمل معظم المناطق الحارة والمعتدلة الحرارة من  
البحر الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || تعتبر من  
الاسماك البنية . سرورها عرض البحر || جسمها وشي  
الشكل يطول من ١٧٠ الى ٢١٠ سم . ثوبا الى الكلبة  
تزره وتتم في الظهر وتير في البطن . سكها مبشر  
التصيب والويل الصغيرة النملية الحميم || سكها شائع  
الاستعمال الصناعي . زيتها جيد الصنف . لها كان  
قل من يربط فيه .

### ١٤٧٤١ - سيجان

Cétone (F). Chafer (E).  
جنس غشاش من فصيلة الحليبات الزواحة المربعة نحو  
٢٠٠ جميعها حيلة الالوان الزاوية تعيش على رقيق  
الانوار ومن العصاة النباتية التي تمصها حيا استطاعت .  
يرقاتها تعيش على المواد العضوية النملية . اشهر انولاه  
ما لي .

### ١٤٧٤٢ - سيجان الزرع

Oxythres funesta (S).  
Cétone stictique (F).  
نوع من السيجان طولها نحو ١٠ م . ثوبا الى السواد لامع  
تملو رقعة يضاء || تركب الزروع قبل الاسبال  
تفتحي على القلايا . وتركب الانوار على اعتلاف  
انولاه وقد لا تمت في زمام الكربة في ابلان الارواق .

### ١٤٧٤٣ - سيجان زيم

Epicomets hirsella (S).  
Cétone value (F). Blossom feeder (E).  
نوع من السيجان طولها يراوح من ٨ الى ١١ م . جسمها  
ازغب البشرة . ثوبا الى السرة المابقة تملو رقعة غليظة  
من البياض . عندما مشوا يروح زفي اسهم الحولف .  
تركب انوار الانوار المصرة تفتريها ولا تمت من  
الورود والانوار الحقلية .

### ١٤٧٤٤ - سيجان مدحكة

Cetonia aurata (S). Cétone dorée, Hanneon des roses (F). Flower beetle, Sap chafer, Green rose chafer (E). Goldrosenkäfer, Goldkäfer (D).  
نوع من السيجان طولها يراوح من ١٤ الى ٢٠ م .  
ثوبا الى انفسها النملية تملو ماجة ذهبية || تركب  
الانوار والابر النملية ، يكثر وجودها على الورود والابران  
والمرابا || رقاتها تعيش على المواد العضوية انفسها  
جلود الصنفات المقطوعة .

### ١٤٧٤٥ - سيج بلازيم

Cytoplasme (F).  
Cytoplasm, Cytoplasma (E).  
هي المادة الاولى اي المادة البروتوبلازمية التي تحرك  
بجولة الخلية النباتية .

### ١٤٧٤٦ - سيج سبورينه

Cytoposporina (S).  
جنس فطور مجهرية من فصيلة المسيكات . يكتيها  
فضية التجميع تمصها وذرية الشكل نائلة . شفرتها  
اسطوانية . يورقاتها غليظة مستقيمة شفافة || انولاه  
قليلة اعرفها النوع الذي يمتري البين الجيني .

### ١٤٧٤٧ - سيج سبورينه البولي

Cytoposporina ceterperda (S).  
فطر مجهرية يصيب ثمار البين الجيني تملوها . مشورها  
الخارجي يقع مستوية منخفضة السطح طولها نحو ٧ م .



١٦٦٥٢ - سيركس هو الأرجس البري ، اطليه .

١٦٦٥٣ - سيراسيوم Cerastium (S). Céralste (F).  
Starry grasswort (E). Hornkraut (D). Cerastio (I)  
جنس نباتات عشبية ممرسة من فصيلة القرنفليات . أنواعه  
عديدة مظهرها بري وبضها زراعي رئيسي . سويها  
وفرعها مزفرية القدم ، زيتها أبيض || أوراقها متعاقبة  
نصلها شيق الصفحة ، أزهارها عديدة ، كبيرة القد ،  
بيضاء اللون || تزرع حل حافة الممرات وفي المواق  
الصخرية || أشهر أنواعه مايلى .

١٦٦٥٤ - سيراسيوم أبيض \*  
Cerastium candidissimum (S). Céralste blanc par (F).  
يعلم من ١٢ الى ١٥ سم . فروعها عديدة متراكبة زيتها  
كثيف التجميع ، ظفي اللون || أوراقه طول نحو  
٢ سم ، وتعرض نحو ٣ سم . أزهاره صغيرة القد شديدة  
البياض الثلجي || أزهاره يستمر من أيار الى حزيران .

١٦٦٥٥ - سيراسيوم كبير الزهر \*  
Cerastium grandiflorum (S). Céralste à grandes  
fleurs (F).  
يعلم من ١٥ الى ٢٠ سم . زيتها افرق الالتشاب .  
أوراقه غيطية طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض نحو ١ سم .  
أزهاره تده من ٧ الى ١٥ ، قطر الزهرة يراوح بين ٣ و ٣ سم .  
أزهاره يستمر من نيسان الى تموز .

١٦٦٥٦ - سيراسيوم مزفرية ، أذن الفأرة  
Cerastium tomentosum (S). Céralste tomentoux,  
Argentine, Oreille de souris (F).  
يعلم من ٢٠ الى ٣٠ سم . زيتها كثيف التجميع جمد .  
أوراقه مستديرة طول من ٣ الى ٤ سم . وتعرض من ٤  
الى ٦ سم . أزهاره مستطيلة ، بتلاتها سنائية الشكل لونها  
الى البياض اللابلر || أزهاره يستمر من أيار الى  
حزيران .

١٦٦٥٧ - سيركة ، سيلة ، مظمورة Silo  
حفرة مستديرة خاصة آر بلاء موصوف اسطواني الشكل  
ملسوط الارتفاع تحفظ فيها ، بعض البوت ، الجوب  
والجنود والسائل والكلاء الخ .

١٦٦٥٨ - سيركس Syris  
هي بقعة الثفل ، اطليه .

١٦٦٥٩ - سيرج ، حنجرع Huile de sésame (F).  
Sesame oil (E).  
هو دهن السمسم اي زيت يستخلص من زور السمسم  
بعد نزعها بالآلة وتصفيها وتحميمها وطحنها لانتاج  
الطعمية ثم ترسب الطعمية لفور السرج عن الكسب .

١٦٦٦٠ - سيريس ، سيريس Carcus (S). Cierge (F). Hedge cactus, Fench thistle  
(E). Kerzenkaktus, Säulenkaktus (D). Cero (I).  
جنس نباتات برية وزينية من الصباريات الشولية .  
أنواعه زهاء ٣٠٠ تتميز بتاتلها الجسودى اللائسي .  
مظهرها من نباتات المناطق الحارة الارمكية . أزهارها  
جميلة الشكل وكبيرة القد || اعرف أنواعه وأشهرها  
ما يلى .

١٦٦٦١ - سيدك Sida (F).  
هو الخورق جنس نباتات عشبية من الخيايات .

١٦٦٦٢ - سيدك كوكبة صخره \*  
Cibaria fulvata (S).  
Cidaria laune (F). Cidaria fulvata (E).

حشرة من فصيلة الاثليات ودية حشرغيات الاجنسة .  
مرتبها يشعل بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط  
والمناطق الجبلية الشاهة . فراشها جارية قشرا رقيق  
الازهار . مرتبها خاصة تعيش على اوراق المروج  
والشربن || جسمها صغير تقصيف طولي نحو ٩ سم .  
بسطها نحو ٣١ سم . رأسها مستدل الجرم اصفر اللون .  
جناها صغيرتان . زياتها غيطيان . مرتبها متوسط الطول .  
جويها اصفر اللون ، اكلف المواجه . بطها اصفر اللون  
افتح المواجه . وراثتها ، عند الفلقين ، الى الصفراء  
الكبريتي تملو في الزوج الامامي ثلاث بقع برقالية ||  
لما جيل واحد في الحول . تظهر الفراشة في حزيران . تسرح  
من الصبر الى فسة الليل . تعاطل بعد ظهورها بمنس  
سنة اسابيع وتفتح المكن مبيدات على الصفحات السفلى  
من نصال الاوراق || السرعة طول من ٢٠ الى ٢٤ سم .  
جسمها اسطواني الشكل ، ماس انتشار . ثوبها يمان  
البينة التي تعيش فيها . ورايتها البنية السلي ماصة ما  
يعدو يمس الى القنوس والشب عند الانتقال || طور  
الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينقضي في الجلالة  
ضمن صلجة معتدلة الحيلك .

١٦٦٦٣ - سيدك ، سيدك قى سيدك قى  
قل فيه : حجر ذو ساق قوية تشبه حراق ورياد حريق  
غشبه يبيض به فرك الكتان .

١٦٦٦٤ - سيدو ، حنجرع الفصاح  
Cidre (F).  
Cider (E).  
خر تصنع من صير تفلح السير .

١٦٦٦٥ - سيرك ، قيطير Tegmen, Secondine (F).  
Tegmen, Secundine (E).  
هو الكشاء الشفاف الباطي الذي يلفف البيضة والبرزة .

١٦٦٦٦ - سيركس سيريس \*  
Ceratophrys (S).  
Cératophrys (F).  
جنس سفادغ جامة من فصيلة الكدانيات . أنواعه الممرودة  
عشرة مدها معظم بلاد امريكا الجنوبية || اجسامها كبيرة  
القد طول من ١٨ الى ٢٢ سم . عند الذكور بين ٢٠ الى  
٢٥ سم . عند الاناث . رؤوسها غلظية مسطرفة تملوها  
تنبوات غشورية عجيبة الشكل تكنتت الرأس والحلق وفنت  
كاجية عبر الظهر الى السير . حيثها كبيرة مستديرة  
جاسنة . اجفانها متوجة بقرن مدية الاطراف غشورية  
اللدة . فمكركها السفلى حادة الاسنان . يلاونها الهوائية  
الصقية كبيرة القد ليموية الشكل والقدر . اصابع قوائمها  
الامامية ملطقة . اصابع القوائم الخلفية تصفة الخطاب .  
جلوها مثاق || انبواها متراكبة الالوان يكثر فيها الحطى  
والاخرى والامر المايق والصناني والاحمر || تعيش معظم  
سباتها التي لا تقل عن ١٥ سنة في البر . تسرح في الليل  
ويبيت في النهار داخل اندقاط سطحية تحفظها في التربة ||  
قشها الحشرات والقار والجربان والظاء والورغ والاساربع  
والديدان .



سيدك صفره



سيركس



سيراسيوم أبيض



سيراسيوم كبير الزهر

١٤٧٥٠ - سيلوري (F), Silurian (E).  
تمت تعريفه بطلق من الحقبة الثانية من الأياح القديم .  
يقال العصر السيلوري والأراضي السيلورية ، وهي  
تتميز بأحجارها على الكثير من الأحماك المصقفة الرؤوس  
أي على أول تقاربات .

١٤٧٥١ - سيلوفان  
ملدن سيلويزي شفاف قابل للتلوين .

١٤٧٥٢ - سيكيات (F), Scyllidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مغطاة الأربيل  
غلافات الخياشيم . اجناسها وأنواعها الممارسة المعرفة  
قليلة العدد ، أسطاتها بجوار البلاد الحارة || اجناسها  
حريضة ، حلابة ، مستطيلة ، رباعية الزوائد الجانسية  
الشكل . رؤوسها صغيرة . ملابسها صلبة || اعرف  
اجناسها السيلة والثيرة .

١٤٧٥٣ - سيكيس ، صون  
جسم مركب من السيليوم والسكيبين وهو من أكثر  
الاجسام ندية واعما انتشاراً يوجد في الأرض اما على  
سأله أو على شكل سيليكات .

١٤٧٥٤ - سيلسيوم ، سيلكون  
فلزات ثلاثي التكافؤ (س-٣) ينصهر في ١٢٠٠  
°سج. ويصعد مع الكبريت في ٦٠٠ °سج. ومع الأوزون  
في ١٠٠٠ °سج || يستخرج من السيليس أو من  
فلوسيكليكات البوتاسيوم .

١٤٧٥٥ - سيكيات ، صونات  
ملح يحصل من استزاج الحامض الصواني بأحدى التوليد  
كالبوتاس والكلس . يقال سيليكات البوتاس وسيليكات  
الكلس .

١٤٧٥٦ - سيلينية حلالية (F), Selenia lunaria (E).  
Selenia lunaria (E).

حشرة من فصيلة الأليات وربية حرشيات الاجنحة .  
موطنها يمتد من الشرق الأوسط الى اربية . فراشها جارية  
قوتها رقيق الزهار . مرشها غاصلة قوتها اوراق النباتات  
البرية اعصها البروق || جسمها متوسط القد يطول نحو  
١٤ م . مسطها نحو ٣٨ م . رأسها مستد الجرم . عيناها  
كبيرتان . زلماتها مشطيان مزيجان من الذكر ، غيبان  
عند الانثى . جيشها ويطنها كبقيا الخمل ، حشلا اللون ||  
وراشها عند الفشتين ، الى الخمل الاصهب للولج تلمو  
في الزوج الاسامي . جنة وسطى سمراء وسط مقوس اسمر  
وبقعة حمراء وتلمو في الزوج الخلفي جنة سمراء || لها  
جبلان في الخيل . تظهر قرائة الجبل الاول في نهان  
وتظهر قرائة الجبل الثاني في تموز . تسرح في الليل .  
تعاظم بعد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتتممكن لطفاً  
تطفها مادة غريبة تنبت على الصفحات السفل من نيمال  
الاراك || البرقة تطول من ٢٨ الى ٣٦ م . جسمها  
اسطواني الشكل يبدو كأنه قلعة من قصب مائل القشار  
تلمو ثلاثة أزواج من العمل المتعاقبة ، ثوبها الى الكسني  
الاشفع . تلمو شديدة السرة . رأسها أسود . وارجها

البنيّة لوسطى ماصة لما يسطرها الى التفتوس والشب عند  
الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوماً  
ينتفض نمس صلبة تحبها السرعة بين الارواق التي تبمسها  
بجوط حزيرية .

١٤٧٥٧ - سيمبا (F), Simba (S).  
جس الجمار برية طيبة من فصيلة السمرويات . أنواعها  
المروفة قليلة العدد مبعها بعض مناطق اريكة الحارة ||  
اجمارها ترتفع من ٦ الى ١٥ امتار . اوراقها متعاقبة  
مركبة ، وقرية التجميع ، خاصة أو رباعية أو تساعية  
الورديات الساتية اتصال || انماها طرية الارتكاز ،  
سالية التجميع ، شمارها حبوب لوزية .  
اشهر انواعها الطيبة الثلاثة التالية :

١٤٧٥٨ - سيمبا حديدية (F), Simba ferruginea (S).  
Simba ferruginea (S).  
Cedron du Brésil, Calunga (F).  
نوع من السياه . جبرتها تلمو نحو عشرة امتار . مبعها  
البرازيل وأخصها مقاطعة بايا || تستعمل في معالجة  
الحجيات وشد الاسهال وصر الحفم .

١٤٧٥٩ - سيمبا صندوبية (F), Simba cedron (S).  
Simba cedron, Quassa cedron (S).  
Cedron ura (E).  
نوع من السياه . جبرتها تلمو نحو عشرة امتار . مبعها  
البلاد الامريكية الحارة والاستوائية || ثمارها شامسة  
الاستعمال الطبي . يماجلها بها الكتب وبلغ الاناعي وبعض  
الحجيات || مادتها القلابة تدعى صندوب (Cedrine)  
مرة الملاك كالكتنا .

١٤٧٦٠ - سيمبا قلد ريبية (F), Simba valdivia (S).  
Simba de Valdivia (F).  
نوع من السياه . جبرتها تلمو نحو ثمانية امتار . مبعها  
مادة جمالية شديدة البقع تدعى للفلين (Valdivine)  
٢ ملغرام من هذه المادة تقضي على الاربث || تستعمل  
طياً في معالجة الحجيات الملوثة . مسبوقة قشور ثمارها  
مقوة فعال .

١٤٧٦١ - سيمباجية (F), Sémilogie (E).  
فرع من الطب يختص بدراس طرار وأعراض الأمراض  
واستلالاتها .

١٤٧٦٢ - سيمبنديس (F), Cymindis (S).  
Cymindis (F).  
جس حشرات قاصصة من فصيلة البليات وربية غديات  
الاجنحة . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار  
البلاد المنتشرة الحارة والباردة || اجسامها هائلة ، مستدلة  
الخطيط ، قطلي من ٨ الى ١٢ م . رؤوسها صغيرة .  
عينها صغيرة ، باردة . قوتها الاستيعادية خطية .  
تأثيرها وتكونها وداستها قياسية . كوكسلها ضغرة .  
يطنها مستطيلة . انماها لاسعة وبمسها شبه لاسع .  
قوتها نشيطة . انماها متباينة الانواع الجنية الزائرة ||  
الحشرة الجملانة قاصصة والبرقة ايضاً .



سيمبا ملاحية



سيمبا

ساقها وفروعها منتصبة ، عمدة ، زباد ، الحماة متفككة الرطب . اوراقها احليجية مستطيلة متفككة التصل . ازهارها رقيقة صفراء اللون || اعرف انواعها ما يتبع .

١٤٧٧٣ - سِيُونَان تَقَرِي \*  
Cephalaria tatarica (S).  
Céphalaire de Tartarie (F).

نوع من السيوان للمسمر مهدد روسية الشرقية . يطول من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . يقال انه ارفع عشية منتصبة مرفوعة . ازهارها عديمة اللد ، صفراء اللون تجمعها رؤيات كبيرة ثلاثية او خاسية الشكل .

١٤٧٧٤ - سِيُونَان سُورِي \* ، طَرْدَان  
Cephalaria syriaca (S). Céphalaire de Syrie (F).

نوع من السيوان للمسمر . مهدد البلاد السورية . يكثر بين الزروع . يطول من ٨٠ الى ١٥٠ سم . || ازهارها حذو الشكل ورؤياته خاسية او سباعية التجميع . ازهارها صفر .

١٤٧٧٥ - سِيُونِس \*  
Sicyos (S).  
Sicyos (F). Sicyos (E).

بجلة عمرة عارفة من فصيلة القرصيات . منبها بفض المناطق الامريكية . ساقها تطلو نحو عشرة اثمار . حوافها ثلاثية او خاسية للشعب . اوراقها قلبية الشكل ، خاسية القصوص . ازهارها الى الفشار الاصفر . المتكبة منها عشوية التجميع ، المغلفة خسية ، مستطيلة الحافيل . ثمارها فضية تطلو نحو ١٠ سم . وقصر نحو ٧ سم . لونها الى الفشار البصري الاربيد المالح ويطول سطحها حصف ذوب قليل الصلابة . لؤلكل مطبوخة .

١٤٧٧٦ - سِيُونَة ، مَيْع .  
Liquidité (F). Liquidity (E).

صفة المواد البائلة للمائة .

١٤٧٧٧ - سِيُون \*  
Clonus (S). Clone (F).

جنس حشرات من فصيلة السوسيات . انواعها عديدة جميعها صغيرة اللد تطلو من ٣ الى ٥ سم . انواعها مختلفة الالوان يكثر فيها الخطي الاسمر المالح . الحامدة مدجة وبزركمة وفيها الحامدة والمهددة || ريفاتها مخطئة تركب نباتات الفصيلة الحنازيرية فتضمم الارواح وتقرضها .

١٤٧٧٨ - سِيُون المَرَّان \*  
Clonus fraxini (S).  
Clone du frêne (F). Clonus fraxini (E).

حشرة غاشلة من فصيلة السوسيات ودية مدمدات الاجنحة . تألف البراري والقرائن . غشاشها وريفاتها تعيش على اوراق الزيتون والمران || جسمها صغير اللد يطلو من ٣ الى ٤ سم . ثوبا الى السمرة المتكسبة تملوها في طوارها طلوس وتزريق مختلفة . رأسها صغير الجرم ، مستطيل المنك المسطح القاصم التلقب . عيناها صغيرتان . زباناها مرقبتان صلبان . طوارها بيضي اللون . عمداها متناحرة التميز القاطب . ارسافها رباعية النقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحلو . تخرج الحشرة الجلجلة من مكانها في اوائل نيسان . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة ، عند بلوغها الإدراك التام ، تطلو نحو ٥ سم . جسمها احليجي الشكل ، مدب الرأس والطرف ، حنكي اللون الاصفر المالح ، اسمر الرأس والشرج .

١٤٧٧٣ - سِيَمَة \*  
Sima (F). Sima (E).

اسم اصطلاحي يطلو على الطلع المفتوح شبه المالح الموجود في وسط الكرة الارضية بين الطبقة السطحية المعروفة بالسيال وبين النواة المركزية . تقدر حرارة هذه الطبقة اي السمة بنحو ١٥٠٠ درجة ستيفراد . يابس حزام مشتل .

١٤٧٧٤ - سِيَمِيَة  
Facht (F).

١٤٧٧٥ - سِيَمِيرِس  
Salmitis

هو الكرز ويكثر فرد من فصيلة السوسيات .

١٤٧٧٦ - سِيَمَارَكِيَا \*  
Cintractia (S).

جنس فطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراعويات تتميز بجهدا القثار البارز الالتصاق ، الاذي الفكل . انواعها قليلة العدد تصبب بعض الاسليات والسدييات فتصلها .

١٤٧٧٧ - سِيَمَنَام \* ، دُوْدَة مَزْدَوَجَة ، دُوْدَة خَرَاء  
Syngama

جنس ديدان سلكية طفيلية تعيش على جهاز تنفس بعض الطيور اصحابا الجبل والبطروج || تمت بالفودة المزدوجة لان الذكر منها يلاصق الانثى ولا ينفرد منها .

١٤٧٧٨ - سِيَمَنِيَة  
Quinquina

هي لكنكتينا التي يستخرج منها الكينا ، اطليا .

١٤٧٧٩ - سِيَمَنِيَسْت \*  
Cénocys (F).

اسم يطلق على جميع الكائنات الضمورية المركبة من حزام .

١٤٧٨٠ - سِيَمَنِيَس \*  
Cynomys (S).

Cynomys, Chien-rat, Chien des prairies, Marmotte des prairies, Ecureuil l'appant (F).

Prairie dog (E). Präriehund (D).

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة السنجابات . انواعها خمسة جميعها امريكية . اجسامها دبة تطلو من ٢٧ الى ٣٥ سم . اذانها من ١٠ الى ١٢ سم . رؤوسها طفيلة . عيناها مستديرة . اذناها عريضة وقصيرة . جريزها قوية . اصابعها خالية ، اطرافها حادة . انواعها سوية اللون يكثر فيها الرمادي الاصعب || ساقها جلجة . تألف الحشاش حيث تركز قراها التي يراوح عدد اجسامها من ٥٠ الى ٣٠٠٠ جمرة قلنسوة الشكل قطرها نحو ١٢ سم . وطولها ٦٠ تبعد القوسية عن الاخرى من ٦ امتار . مدخلها وغاريها اتفاق مستقيمة عمقا نحو ٣٠ سم || بيتها الفتوي يدوم ما دام الصقيع والجليد . قبا الاعشاب والجلود والبرور والحبوب والفار والجرذان .

١٤٧٨١ - سِيَمَنَك  
التراب الذي تغيره الريح عن الارض .

١٤٧٨٢ - سِيُونَان \*  
Cephalaria (S). Céphalaire (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الدياسيات .



سِيَمَان



سِيَمِيرِس



سِيُونَان تَرِي



سِيُونَان سُورِي



سِيُونِس




سِيُون




سِيُون الزان



- 1 اعطيطود 2 مقربوط 3 صيروج 4 كثار مياول 5 كثار لورب 6 صيكلو 7 فوشك 8 مويوة 9 دوكوت 10 فاشك 11 حارون بحري 12 سكون  
 رشق، فوشك 13 حارون سش 14 بوليس 15 اشك 16 حبيبة 17 اكل 18 دوس 19 قوط 20 لوليد 21 غلاية 22 كوكاك 23 سلكانة 24 شيلر -  
 25 فليدة 26 كركيز 27 كركيز صوير 28 صير 29 غلاية 30 بديك 31 فلقون صيرج 32 حبيبة 33 رويد سستيل 34 رويد حلي 35 شك 36 بول ستر -  
 37 بول سستيل 38 سطر 39 سطر 40 سطر 41 سطر 42 سطر 43 سطر 44 سطر 45 سطر 46 سطر 47 دوة شيلر -  
 48 دالغ 49 جلاوب 50 صيكر 51 سدي 52 مروت 53 كركيت 54 كركيت 55 سدي 56 سدي 57 سدي 58 سدي 59 لومعة 60 قبة عمة 61 كبة  
 62 لوليد 63 حبيبة 64 فلق 65 مويوة 66 مويوة عمة 67 مويوة عمة 68 مويوة عمة 69 مويوة عمة 70 فركا 71 لوليد 72 مويوة -  
 73 نعمة مويوة 74 نعمة سدي 75 مويوة 76 لوليد 77 لوليد 78 لوليد 79 لوليد 80 لوليد 81 لوليد 82 لوليد 83 لوليد




١ قباب - ٢ فرخ - ٣ التماسيح - ٤ كبدية مبانة - ٥ كبدية - ٦ طرخ - ٧ مبداء - ٨ سمون - ٩ حوك - ١٠ جدانة - ١١ جنيح - ١٢ وساج - ١٣ قد -  
 بحري - ١٤ شطارة مبانة - ١٥ نعال - ١٦ ديك البحر - ١٧ دلاغ - ١٨ خضائف الماء - ١٩ شكة البحر - ٢٠ قري - ٢١ قسمة - ٢٢ حنيك - ٢٣ أبو طيق -  
 ٢٤ عبل - ٢٥ طروق القرن - ٢٦ طريوح حجري - ٢٧ زبر بحري - ٢٨ زبر أبو شوكة - ٢٩ زنتير - ٣٠ لع - ٣١ أم قوس - ٣٢ لينة - ٣٣ بولس المتوسكة - ٣٤ تيتور - أبو منقار -  
 ٣٥ طراغور - ٣٦ تود - ٣٧ ميف البحر - أبو سيف - ٣٨ شير - ٣٩ دهانة - ٤٠ اندلس



1. سمك السلمون - 2. سمك التونا - 3. سمك السلمون - 4. سمك السلمون - 5. سمك السلمون - 6. سمك السلمون - 7. سمك السلمون - 8. سمك السلمون - 9. سمك السلمون - 10. سمك السلمون - 11. سمك السلمون - 12. سمك السلمون - 13. سمك السلمون - 14. سمك السلمون - 15. سمك السلمون - 16. سمك السلمون - 17. سمك السلمون - 18. سمك السلمون - 19. سمك السلمون - 20. سمك السلمون - 21. سمك السلمون - 22. سمك السلمون - 23. سمك السلمون - 24. سمك السلمون - 25. سمك السلمون - 26. سمك السلمون - 27. سمك السلمون - 28. سمك السلمون - 29. سمك السلمون




1. شابر - 2. صقر قزويني - 3. قطاب ذهبي - 4. قطاب نيمسكية - 5. قطاب القليل - 6. بومة - 7. بومة - 8. قيقب - 9. بلنج - 10. ككتور ، نسر امريكي - 11. نسلج - 12. لودي - 13. نوبة - 14. المرقونة - 15. حنجرية بحرية - 16. ككتور، حمار القندمة - 17. ككتور، ديدندر - 18. ككتور، وديك - 19. ككتور، وديك - 20. قمرينة - 21. بوم - 22. طيعة بوم - 23. طيعة بوم - 24. قنطرة صفراء - 25. غرور - 26. بوم صفراء - 27. آيا صفراء - 28. آيا حراء - 29. آيا بنفسجية - 30. دفتاش ، ابر براتش - 31. سنكون - 32. بقات - 33. نلس - 34. ماس ، دج - 35. عقيق ازرق - 36. طوق - 37. طرزر - 38. فنجك كير - 39. فنجك موسي - 40. فنجك يولي - 41. سنطير ، عسل - 42. هاربرون - 43. بوبانة - 44. مرقنة - 45. ام الحنجر - 46. دسكة - 47. عقالب - 48. شطرو ابيض الجناح - 49. شطرو احمر الجناح - 50. وصة - 51. قرقش ازرق - 52. حنط ، دويك الجبل - 53. صر - 54. نفاق كير ، نقوة الصنوبر - 55. وورور احمر الجناح - 56. وورور اعظم الجناح - 57. بطوط - 58. تومس



- 1 غار القردوس الاسود - 2 رفاة سعادى - 3 طائر القردوس الاحمر - 4 طائر القردوس الكبير - 5 كيايه (الاسم المثلث) - 6 كلبه - 7 سكوده - 8 ربيع الفلوق الصغير - 9 ربيع الفلوق الاسود - 10 طائر النبال - 11 مران جهوري - 12 فراش غلوم كالكات - 13 فراش موز - 14 ريكاش - 15 ابو طير - 16 قنارل - 17 زعفران - 18 ابو دوح - 19 نير شعاع القدس - 20 نير رايح - 21 نير جوليا - 22 صليط احمر اللب - 23 صليط تانك - 24 صليط احمر القادر - 25 صليط جيل - 26 نور دوش اسبح - 27 طرود - 28 شره زرقاء الصعد - 29 قنرة سكمتة - 30 طيكين - 31 مدلب فان - 32 مدلب صافى - 33 لاورديه زرقاء المالح - 34 ام حرة - 35 لديرية ماحقة - 36 صفر طويل اللب - 37 فلكي - 38 ام ربال - 39 نيرة جردان - 40 نيرة طنكة - 41 قزاق ابو علة - 42 حليقت بونابر - 43 دريش دسك - 44 سكشور - 45 ابو ربال - 46 غريس احمر القرد - 47 طرفيس اردق - 48 حريس ابيض القرد - 49 خريس زيردي - 50 لغريس بهي - 51 لغريس طاردي - 52 لغريس مجرب - 53 لغريس شوق - 54 لغريس عوك - 55 نوك - 56 طلوراد - 57 سول طويل القشار - 58 نيرة كليوب - 59 دمك





- 1 طيور - 2 اديس - 3 تارح فالح - 4 تارح بلح - 5 تارح المهرت - 6 تارح نقي - 7 تارح ابو - 8 تارح سمرف - 9 تارح اوزك - 10 حرييل - 11 تارح بودابو - 12 سيمه شمس - 13 سيمه مير - 14 تارح ازن - 15 حط - 16 كيت - 17 غرغر لسي - 18 كولات - 19 حريال ، ديك بري - 20 ديك سقال - 21 ديك كس - 22 ديك كوشسي - 23 ديك حيرورغ فرغه - 24 حيت داجه - 25 حيت طما - 26 حام زابل - 27 حام حرك - 28 حام طرك - 29 حام كيتي - 30 حام بشوق - 31 حام دور - 32 حام مارجش - 33 حام ماني - 34 بيا امل - 35 اكس شوق - 36 اوزة - 37 تم ابيض - 38 تم اسود - 39 شيل - 40 ايشة - 41 بويط واط - 42 بويط ذرب اللب - 43 حلق - 44 زهم طرك - 45 زهم لاجام - 46 كتر - 47 تروور ميط - 48 تروور برتقال البسر - 49 تروور اكاب - 50 بنگال لجلل - 51 بنگال اسر - 52 برور







ش

لاحت. قوتها مستطيلة ، دقيقة || ثوبا الى السرة السوداء باستثناء قاعدة الرأس والقوائم فانها زجاجية اللون || تعيش من قصها على سطح المياه الراكدة وعلى الضفاف حيث تنمو بين النبات وذات الرشاقة التي تنظفها على سطح الماء .

١٤٧٧٩ - شايكة الماء  
Hydrometriscidae (S). Hydrométrides (F). Hydrométrides, Water striders (E).  
فصيلة حشرات من فصيلة الاجنحة . حشرات هلام طراة الارجل تنمى فوق الماء كاتها تدفعه || ابتناسها وانواعها عديدة اشهرها الجروس وشابة الماء .

١٤٧٨٣ - شايك  
Aloes (S). Aloes (E). Allice shad (E).  
جنس اسماك كبيرة القند من فصيلة السابونيات . انواعها قليلة القند موطنها بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اجسامها مفلطحة مستطيلة ، حناجر بطنها شاك الخرافات || اشهر انواعها الشايل البهلل والصابيرة .

١٤٧٨٠ - شايكة الماء \*  
Hydrometra (S). Hydromètre (F). Water strider (E).  
جنس هلام من فصيلة شايكات الماء . انواعه المعروفة نحو ١٠ جميعها نحيلة الاجسام ، دقيقة الارجل المستطيلة . تعيش من قصها فوق المياه الراكدة . تنمو على سطح الماء بشفة || موطنها جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة .



فايرة الماء

١٤٧٨٤ - شايك مبدئي \*  
Aloes vulgaris (S). Aloes communis (F). Common allice shad (E).  
نوع من الشايل وهو سمكة كبيرة القند طول من ٧٠ الى ١٠٠ سم . موطنها المتوسط والاطلسي . تمراً في الماء العذب وقد يتم ذلك في الربيع ثم تنمو الى البحر في اواخر الصيف || لحمها اللين اللحم . لكنها كثيرة الحسك .

١٤٧٨١ - شايكة الماء الرمادية  
Hydrometra cinerea (S). Hydromètre gris (F).  
حشرة من فصيلة شايكات الماء . جسمها صغير مستطيل بطول من ١١ الى ١٤ مم . || رأسها دقيق ، مكور الطرف . غطائها نحيل . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان ، فاشرتان . كسولها شبه برصي الشكل . ظهراتها ضيق وقصير . قوائمها مستطيلة . اوصافها ثلاثية البقل || ثوبا الى اريدة الابداء يمتد في الرأس وفي كل حرقفة ويغور || تعيش من قصها على سطح الماء حيث تنمو بسرعة منتشرة .

١٤٧٨٥ - شايك.  
Gros et gras (F). Stout and fat (E).  
صفه الحيوان السمين الكائن .

١٤٧٨٢ - شايكة الماء المتقيمة

Hydrometra stagnans (S). Hydromètre des étangs (F).  
حشرة من فصيلة شايكات الماء . جسمها مستطيل الحجم بطول من ٩ الى ١٣ مم . رأسها دقيق مستطيل . غطائها قصير . زباناها مستطيلان . عينها جانبيتان كبيرتان . كسولها اسطواني الشكل ويطنها ايضاً . ظهراتها ضيق

١٤٧٨٦ - شايك \* ، شراصيف  
Imperméable à la lumière (F). Light-tight (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل مادة لا يتغلل منها النور .

١٤٧٨٧ - شايجر \*  
Arboretale (F). Living in trees (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة مباشرة بالاشجار او يعيش من الاجمار ويطها .



شايل بهلل

١٤٨٠٤ - شاكري هو خائف القملقة ، اطلبه .

١٤٨٠٥ - شاكيب ، شاكيف Malgre, Sec (F).  
Maugre, Dry (E).  
المهزول من الحيوان شديراً او خائفاً لا مبرئاً .

١٤٨٠٦ - شاكش الشافي  
هو البليس وهو الكاكج ، اطلبه .

١٤٨٠٧ - شاكص ، شاكوتّر Raide (F). Stiff (E).

١٤٨٠٨ - شاكير Faon (F). Fawn (E).  
الشاعر والشعر : ولد الطيبة .

١٤٨٠٩ - شاكيب Anomoure (F).  
لمت تعريفي يطلق عل كل ذنب يشك شكله عن المألوف .

١٤٨١٠ - شاكطوكا هي البطونقا الطيبة ، اطلبه .

١٤٨١١ - شاكطط Anomal (F). Anomalous (E).  
شاذ ، غالف لواميس الطيبة او تولامدا .

١٤٨١٢ - شاكطي Bord, Rivage (F).  
Edge, Shore (E).  
هو شط البحر او النهر .

١٤٨١٣ - شاكيب ، شاكيب Rameux (F).  
Branching (E).  
الشجر الكثير الفروع .

١٤٨١٤ - شاكيت Sparsile (F). Sparsile (E).  
الشاحص هو التيم المنظر في الغشاء . كل نجم لا يدخل  
في جموعات الابرار او المجموعات الكوكبية يعتبر من  
الشواش .

١٤٨١٥ - شاكيم Asymétrique, Inégal (F).  
Asymmetrical, Unequal (E).  
صفة الشيء للامتناشق الاجزاء . م. شواش وشياش . ج  
شراش وشنو .

١٤٨١٦ - شاك Curatif (F). Curative (E).  
صفة العلاج الذي يقضي عل المرض فيسبب الشفاء .

١٤٨١٧ - شاك Ulcère (F). Ulcer (E).  
هي القترعة او القرعة الداملة .

١٤٨١٨ - شاكير هو الشفر ، اطلبه .

١٤٨١٩ - شاكيم Bélier (F). Ram (E).  
الشافع من الفسان كالتيس من المعزى .

١٤٨٢٠ - شاكول ، شاكول ، مطمّر ، قادون  
Fil à plomb (F). Plumb-line (E).  
جهاز مركب من قلمة من النحاس او الحديد عمودية  
للشكل ، معلقة بخط قوي ، يستعمله البناء لقياس من صفة  
عمودية الجاه ما ينس .

١٤٨٢١ - شاككا Acena (S).  
Acéna, Acéne (F). Burr, Rosy spined bur (E).  
Wierhaken, Acline (D). Acena (I).  
جنس نباتات برية وزراعية تريبتين من فصيلة الورد يات .  
انواعه قليلة جميعها صغيرة القند . سويها وفروعها شاككة .

١٤٨٢٨ - شاكح Autotrophe (F).  
Autotrophic (E).

شاح م. شاحية ج. شواح. تمت تعريفي يطلق عل جميع  
النباتات التي تحصل مواد الغذاء من الطيبة فتصيرها وتطبخها  
بواسطة الطاقة الشمسية .

١٤٨٢٩ - شاكبة ، شاكبة Déchaumouse (F).  
Scrubble-plough (E).  
محراث الشب او الفلاح .

١٤٨٣٠ - شاكين  
الشاحن من كلاب الصيد الذي يبعد الطريد ولا يصيده .  
ج شواش .

١٤٨٣١ - شاكينة ، كميثون Camion (F).  
Dry (E).  
سيارة مجهزة لنقل الاحمال .

١٤٨٣٢ - شاكول Mimétique (F). Mimetic (E).  
لمت يصني تعريفي يدل عل نبات الذي ينسج شكلا  
وليا مع البيئة التي يعيش فيها .

١٤٨٣٣ - شاكين Faon (F). Fawn (E).  
ولد الغليظة .

١٤٨٣٤ - شاكيج Hématite (F). Hematite (E).  
هو حجر الدم ، اطلبه .

١٤٨٣٥ - شاكول Chadouf (F). Well-sweep (E).  
الشواش او الناقلة آلة بسيطة قديمة الموه والاستعمال ،  
تولمها دلو وثقال . كانت ولا تزال تستخدم في رفع المياه  
من مجاريها المنخفضة .

١٤٨٣٦ - شاكدي Carcophtèque de Sabe  
هو حجر من ساء ، اطلبه .

١٤٨٣٧ - شاكّ Héteroclite (F). Heteroclit (E).  
ما مخرج من قواعد المجانسة او من مألوف لونه .

١٤٨٣٨ - شاكّر ، شاكّر الموضع اللطيف الكثير المحارة .

١٤٨٣٩ - شاكّر Désoepercaler (F). To uncup (E).  
شار واشتار الحسل : استخرجه من القربة واجتناه فهو  
مشهور .

١٤٨٤٠ - شاكرد ، لرون Ion  
الشوارد والايونات هي لوانج التحليل وتكون بلوريات لوانج  
التحليل الكيماوي الناتج عن مرور التيار الكهربائي في  
الجسم الملقص . رابع لرون .

١٤٨٤١ - شاكردية Ionique (F). Ionic (E).

١٤٨٤٢ - شاكولات الأجنحة Phalopanes (F).  
رتبة شحات نافذة من طبقة صصيات الجناح . فصائلها  
ولجنتها كثيرة العدد . تتميز بروثها السوداء . يتألفها  
مستلة القند ، اجنتها مستطيلة ، تأكلها مجهزة للنص .

١٤٨٤٣ - شاكولات الاسنان Acrodontes (F).  
Acrodontes (E).

لمت تعريفي توصف به فئات الانسان الشارة  
المتركة في الحالة الحارضية من الفك الاعل . يقابلها  
قابضات الانسان .



شارات الإجنحة

أوراقها مركبة . وريقاتها فضية تصل المسن الحلق .  
أزهارها حلقة تتجمع صغيرة اللقد يندب لها الأصفر  
والأحمر || أنزماردا صيني .

#### ١٤٨٢٧ - شاكيس \*

Apogonius (F).

Apogonius (E).

كل نبات يتكاثر بالبرعمة أو التعملة لأنه قد غاصت  
التكاثر بالانصباب الطبيعي أي بتطعيم الأزهار يدعى  
شاكس .

#### ١٤٨٢٨ - شاكس \*

Flanc (F). Flank (E).

هي الإحل والخاصرة . ج شواكل .

#### ١٤٨٢٩ - شال \*

Synodontis (S). Synodontis (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السلوريات أنباض نحو ١٥  
جميعها من اسماك مياه المناطق الاستوائية والحارة . أشهر  
أنواعه شال النيل ورازقون والسبي والقرقرور . جميعها  
ماكولة ، غريها متوسطة الحسنة .

#### ١٤٨٣٠ - شاليم \*

Salig (F). Ryo (E).

هو الشليم ، الحلبه .

#### ١٤٨٣١ - شالوف \*

Cascade (F). Waterfall (E).

هو الشلال صخر حجمة وارفع منحد .

#### ١٤٨٣٢ - شامك ، شم \*

Odor (F). Smell (E).

اسمى حواس الجسم الحاسة لاسيا عنه الحيوان الذي يتعد  
عليها في ذلك || حواس الشم هو الالف يلمس بالته الأمل  
مذلف بفشاء غاطلي يلمس الأصابع التي تظل الإحساسات  
التياسة الى المراكز الخاصة بها في المخ .

#### ١٤٨٣٣ - شامكة \*

Membre (F). Limb (E).

الشامة : ثامة آتابة . ج شوامت . ويقال لها الشاركة .

#### ١٤٨٣٤ - شامك \* ، شامال \*

Thérillon (F).

جنس حناكب من فصيلة التناذيات . أنواعه عديدة جميعها  
متوسطة القد أو صغيرة . أجسامها شبه يفسية الشكل ،  
جوانبها دقيقة مستطيلة . تحبب نوسها حل التيات وفي  
تجاريث الصخور والجدران والأبنية الممجرة .

#### ١٤٨٣٥ - شاميلات الكف \*

Totipalmes

بنيية طيور من شكيات التيم فيها البجع والذئق وليمها .

#### ١٤٨٣٦ - شان \*

Sutura du crâne (F).

Sutura for the cranium (E).

هو درز التفتع وفريشيل الدرز الأكليل واسم ولأسم .

#### ١٤٨٣٧ - شاشية \*

Fragata, Azogen (S).

Fragata (F). Frigate-petrel (E).

جنس طير من كليات القدم وفصيلة البجيات . له نوام  
مرفوفان : الشاشية الشافية والشاشية الحذبة || أعطانها  
مجامع البلاد الحارة والاستوائية . تألف المواق الصخرية  
والصخور الشائرة حل البحر || أجسامها مستطيلة .  
أذناها فائقة . متطابعا متدلة التبطيط ، حذبة الملائط  
التي الليرة ، متفلفة الملائط . السفل . إصافها قصيرة .  
شائر أصابعها نصفية الكفاف . غاليها حذبة ، ذرية ||  
طيرانها شديدة السرعة . قوتها الإسمالك تنقص عليها من الأجواء  
كأسهم وتخلصها من متفاديه الجريح والأخيل والقرور ||

تتثن في صلوع شحف الصخور وفي ألقابها العام تلو  
العام ولش قرب المش . شحبتا مؤلفة من يفتين لوتبا  
الى البياض الأبيض تملو ماجة غضراء أو حمراء وبهش  
التفتل الجهورية . القريش يستمر نحو أربعة أسابيع تقود  
به الاثن دون الذكر الذي يؤن لها الغذاء .

#### ١٤٨٣٨ - شاشية علكانية \*

Fragata marina, Azogen aquilus (S).

Fragata-Algic, F. marine, Grando frégate (F).

نوع من الشاشية . طائر كبير اللقد ، مستطيل الجسم ،  
طولها نحو ١٠٠ سم . وبهش نحو ٢٢٠ سم . أما وزنه  
فلا يتجاوز ١٥٠٠ غرام || ثوبه أسود اللون ، أخضر  
المواج . زووه ومقاده الى الحفرة . حلقه عتة شديدة  
السواد . رجلاه الى الجفوة || تبة الإسمالك يمتلأها من  
البرص ويخلصها من متفاديه طيور الماء || أعطانها مجامع  
أفريقية الاستوائية والحارة أن الى المحيط الاطلسي أو الى  
المحيط الهندي .

#### ١٤٨٣٩ - شاشية هندية \*

Fragata minor, Azogen minor (S).

Fragata indiana, Picta frégate (F).

نوع من الشاشية . طائر متوسط اللقد ، مستطيل الشكل ،  
يطول نحو ٦٠ سم . ويبلغ بسطه نحو ١٢٠ سم . وزنه  
لا يتجاوز ٧٥٠ غراما || أعطانها تبت من مجامع جزر  
الترابج الى الهند والبحر الأحمر || ثوبه الى السواد الأزرق  
المواج . مقدم عتقه الى البياض الأبيض . حلقه عتة  
سكنية اللون . مقاده شديدة السرعة . رجلاه الى السرعة  
يطولها مواج بحري || ثوبه الإسمالك يمتلأها كالشاشية  
العكابة ويدلن عتلا في صلوع الصخور وألقابها .

#### ١٤٨٤٠ - شاه أسيرم رصي \*

Querrellet (F).

أطبخ خزاس بحرية .

#### ١٤٨٤١ - شاه بكار \*

Autor commun (F).

Goshawk (E).

هو البازي ، أطابه .

#### ١٤٨٤٢ - شاهبكتج \*

Armée conys (F).

هو البرايون ، أطابه .

#### ١٤٨٤٣ - شاهبكتوط \*

Châtignier (F).

هو لكسكتا ، أطابها .

#### ١٤٨٤٤ - شاهبكتوط الحيسان \*

Marron d'Inde (F).

Horse-chestnut (E).

قوة اللندلي الهندي ويقال لها أيضا قسطة الحسان  
وقسطة مرة .

#### ١٤٨٤٥ - شاهقرج \*

Fumaria (S). Fumeterra (F). Ramping fumitory (E).

Erdrauch, Rankenerdrauch (D). Fumozerno, Fuma-

ria di Bor bianca (I).

نبات عشبي حولي بري من فصيلة التفتجريات . أوراقه  
مستطيلة ، متطابعا ، مركبة . نصليها كبير القفريش ،  
باحت أخضر البحري ، يفوح منه عتة اللقد مادة طيارة  
تقتل قمل الخنثان تأخذ الآلاف وتدمع العين || أنزاده  
لاقتلية التجميع ، صغيرة اللقد ، لونها الى البياض  
الأخيش يطلو مواج وردي .



شال



شاليد



شاشية



شاعرج

١٤٨٨٨ - شاكور\* ، كُسر

Brayers anthelmintica, Hagenia abyssinica (S).  
Cousotier, Couso, Kouso (F). Kuso, Tapo-  
worm plant (E). Kosoebum (D). Cuso (I).

عجوة برية طيبة من فصيلة الورديات منها بلاد الحبشة .  
اوراقها مركبة متعاقبة ، ورقها سناينة النصل ، مجنحة  
الشكل . اثمارها عشوية التجميع ، تاجية الارتكاز  
تستعمل في الطب وتقتل في عدة مستحضرات اعصها  
الادوية المعوية .

١٤٨٨٩ - شاكوي Aguardier (F).  
هو السقاء الذي يوزع مياه اري على مستحقها .

١٤٨٩٠ - شاكع ، شفاع ، مشتوك Indivis (F).  
Unidiv (E).  
هي الملكية الشاملة وهي حالة قانونية يوجد فيها من يملك  
حقاً مشتركاً مع غيره .

١٤٨٩١ - شاكك النجار Echincarpus (E).  
من النباتات ما كانت تقود ثماره محفوفة بالغلب الشاكك .

١٤٨٩٢ - شاكك الجناح Uncipenne (F).  
من الطير ما كان جناحه مجهز ببعض الريش الشاكك  
الاطراف .

١٤٨٩٣ - شاكك اللاكب Echinaire (F).  
نمت تربيته يطلق على كل حيوان أو دوية يملؤها في  
ذنبها حلب شاكك .

١٤٨٩٤ - شاكك القترام Echinpède (F).  
نمت تربيته يطلق على كل دوية أو شجرة يملؤها في  
قوائمها مناعس حادة كالشوك أو حلب بجانب شاكك .

١٤٨٩٥ - شاككات الرأس Acanthocéphales (F).  
Acanthocéphala (E).  
صنف من التود المحيطيات رؤوسها واعطائها مسلحة  
بالشوك .

١٤٨٩٦ - شاككات الزعاف Acanthoptera (S).  
Acanthoptères, Acanthopéry-  
gians (F). Acanthopterygien (E).  
رتبة من الاسماك المحيطيات . فصائلها واجناسها وانواعها  
كثيرة العدد معظمها بحري وبعضها نهرى || اشهرها  
البوري والثن والقاروس والمريجان الخ .

١٤٨٩٧ - شاكك الدليل Niqueté (F).  
الدرس الذي تلمت حبل ذنبه الخافضة لتسوق .

١٤٨٩٨ - شاي Thea (S). Théier (F). Tea plant (E).  
جنس جنبات برية وزراعية صنافية من فصيلة  
الكاسيات . هذه الصين . انواعها ١٦ جميعها متعاقبة  
الاوراق المنقطة ، تصلفها صغير القند ، مستطيل الشكل ،  
سمن الحافة . اثماره ابوية الارتكاز ، فردية أو ثنائية  
التجميع ، لونها يراوح بين الالبي والاصفر . عرفها  
غانت الزائفة المسماة || اشهر انواعها الزراعية الشاي  
الصيني ، اطليه .

١٤٨٩٩ - شاعترج مخزني\* ، بكلكة الملكة

Fumaria officinalis (S). Fumeterre officinale, Fiel de  
terre (F). Fumitory, Fumitarre (E). Echter Erdquich  
(D). Fumosterno officinale, Fiele di terra (I).

نبات عشبي حولي بري طلي من فصيلة الشاعترجيات .  
اوراقه مرة العلم غزيرة المادة القولية القمالة ويضغ  
المخلفات الضوية النافعة . فركها يمرح مع محواه من مواد  
طيارة تهيج الكلى وتسرع البول .

١٤٨٩٢ - شاعترجيات Fumariaceae (S).  
Fumariacées (F). Fumariaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجناسها وانواعها قليلة  
العدد جميعها نباتات عشبية . اثمارها متدغاة الارامات ،  
مزودة الفسل ، رباعية البلات ، ثنائية الاسدية الجانبية  
الارتكاز الثلاثية الانقسام || ثمارها جرد ثنائية الكرايل .  
يزودها اسية مزوية .

١٤٨٩٣ - شاكهد Témoin (F). Witness (E).  
هو الذي يدل بالشهادة . والشاهد قد يكون :

شاهد إثبات Témoin à charge (F).  
شاهد زور Témoin faux (F). Falsely witness (E).  
شاهد حل الشخصية Témoin certifié (F).  
Certified witness (E).  
شاهد غير مباشر Témoin indirect, Médias (F).  
شاهد قابل للعلم Témoin reprochable (F).  
شاهد في Témoin à décharge (F).  
Witness for the defence (E).

١٤٨٩٤ - شاكسفرم هو الحق الصغير ، اطليه .

١٤٨٩٥ - شاك صيني هو التابل ، اطليه .

١٤٨٩٦ - شاهين Falco peregrinus (S).  
Falcon commun, F. pèlerin, F. voyageur (F).  
Peregrine falcon, Royal falcon, Shahn (E).  
طائر من الصقور فضيلة الصقريات . هروقه حادة  
منقشرة في معظم الاطوار الاسوية والاوروية . وهو كبير  
الحامة والسقط ، اسود الرأس ، طويل القوائم ، واسع  
العينين ، رطب الصدر الاخير اللزج ، قصير المتق  
الايض ، نذل ، أزور ، جليلة البطنين ، قصير  
الساكن . ذنبه اسود مستطيل تعلو بعض الزرق || وهو  
أريد من الصقر وايضا مزاجاً ولاجل ذلك تكون حركته  
من القمل الى السفلى شديدة الانخفاض || جمه ضوامين  
وشياطين . قال فيه عبد الله بن المبارك :

وقد يلتصق المرء حائطاً تحيره  
وقد قصمت لك الحانوت بالدين  
بين الاساطين حانوت بلا غلق  
تتباين بالعين اموال للساكن  
صيرت دينك شايحاً قصيد به  
وليس يفلح اصحاب الشواطين

١٤٨٩٧ - شاهين Alshahin  
الشاهين نجم نير من كوكبة القناب .



شاعترج مخزني



شاهين



شاي ، كسر



شاي المروج



شاي بسلطانية



شاي صيني



شَبَّ اللَّيْلِ

تزارحم من ٣ الى ٤ اطنار || استأمر اوراقها يبدأ بند  
القرص بثلاث سنوات واجود الاوراق ما تنج من الانثان  
القنينة || اشهر البلاد المنتجة لشاي : الصين ، واليابان  
والهند واثمة الصينية وجزر الزنجبار وسرنديب .

١٤٨٦٦ - شاكينين (Théina (F).  
للادة القنولية الموجودة في ورق الشاي وهي يمشطها من  
البينين .

١٤٨٦٧ - شَبَّ (Alun (F, Alumi (E).  
الشب او حجر الشب، ملح معدني بلوري التركيب  
ايضاً اللين حاسر الطعم يتكون في الطبيعة من بعض  
الكبريتات انحصار كبريتات الاوليوميد وكبريتاتسيوم .  
يأوبى في الماء ويصير في حرارة ٩٢° مع || يستعمل  
في عدة صناعات انحصار الصبغة القطنية والصوفية حيث  
يثبت الالوان ويذكيها . ويستعمل في ترويض المياه الملوحة  
وفي سفلط الجلود ... كما يستعمل في الطب .  
وهو من القنويات التي توفى الزئبق والرومان .

١٤٨٦٨ - شَبَّ اللَّيْلِ \* ، نَوَّار اللَّيْلِ ، شَوَّاق ، شَبَّ الظرفين

Mirabilis(S). Nyctage, Belle-de-nuit(F). Four o'clock  
plant (E). Wunderblum (D). Balis di notte, Mervaglia,  
Gelsomino di notte (I).  
جنس نباتات عميرة ابيدة من فصيلة الخسنيات . انوامه  
قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سويقها فرام تملو من  
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة طرية العرف .  
ازهارها حذكوكة التجميع ، تاجي الازهار . انوارها  
خامسة البتلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرة  
الرائحة || اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال  
الشاي || اشهر انوامه ما يتبع .

١٤٨٦٩ - شَبَّ اللَّيْلِ الإثريقي ، شَوَّاق الإثريقي

Mirabilis dichotoma (S). Nyctage dichotome, Belle-de-nuit  
dichotome (F).  
نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو حشة عميرة تملو من ٩٠ الى  
١٢٠ سم . ساقها نحلة . اوراقها لائقة ، يضية . انوارها  
صغيرة اللد ، طرية العرف ، يضاء اللون او حراء .  
انوارها يستمر من تموز الى تشرين .

١٤٨٧٠ - شَبَّ اللَّيْلِ الجلسي ، شَوَّاق جلسي

Mirabilis jalapa (S). Nyctage faux-jalap, Belle-de-nuit  
faux-jalap, Mervilla du Pérou, Herbe triste(F).  
نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو حشة عميرة تملو من ٥٠ الى  
١٠٠ سم . اوراقها يضية الشكل ، نصلها انقب الصفة  
السفل ، ذلق الزام الامير . انوارها حادة العرف  
تقلو نحو ٣ سم . لونها زجاج من الالبيش الى الاحمر  
والاسفر والمزيج || انوارها يستمر من تموز الى تشرين .  
جنودها تستعمل في غش الجلب .

١٤٨٧١ - شَبَّ اللَّيْلِ المُسْتَطِيلُ القَرْفَر ، شَوَّاق

Mirabilis longiflora(S). مُسْتَطِيلُ الزَّهَر  
Nyctage à longues fleurs, Belle-de-nuit à longues  
fleurs, Belle-de-nuit odorante (F).  
نوع من شَبَّ اللَّيْلِ وهو حشة عميرة تملو من ٦٠ الى  
١٢٠ سم . اوراقها زينة النصل دقيقة . انوارها مستطيلة  
الانبيب ، خلية البشرة ، فولية العرف ، يضاء اللون ،  
حراء القانعة الداخلية || انوارها يستمر من تموز الى  
ايلول .

١٤٨٥٩ - شاي (Thé (F, Tea (E).  
هو ورق جنبة الشاي يعني نجيم ويصف في الشمس .  
ثم يلف ويحمص في مجاف خاصة . ثم يد للاستفاد  
بند تحضيره ومزجه بلسب متفارة القادر بين شطفت  
استاف الاوراق || عسره العالي الحولي زله ٥٠٠٠٠٠  
طن || اما تركيبيه المستصري فهو :

ماء ١٠٠٠  
من ٨٥٠ الى ١٠٧٠ %  
رمد ٨٠٠  
من ٧٠ الى ٧٠٠ %  
مواد ازوتية ٢٢٠  
من ٢٢ الى ٢٢٠ %  
مواد دهنية طرية ٣٨  
من ٧ الى ٧٨ %  
حطان ١٥  
من ١٥ الى ١٥٠ %  
شاوين (بينين) ١٠  
من ٣٨٠ الى ٣٨٠ %  
وبعض الحوامض الضوية والاملاح المعدنية بلسب يراوح  
مجموعها من ٣ الى ٧ %

١٤٨٩٠ - شاي العَرَب ، هو القنات ، الحلبة .

١٤٨٦١ - شاي اللُّرُوج \* ، قسوس

Ladum (S). Lédon, Romarin sauvage (F). Crystal-tea,  
Marsh cistus, Marsh rosemary (E). Sumpporat, Wild  
rosemary (D). Ledone, Ramerino di palude (I).  
جنس نباتات عميرة ابيدة من فصيلة الخسنيات . انوامه

قليلة بعضها بري وبعضها زينة . سويقها فرام تملو من  
٧٥ الى ٢٠٠ سم . اوراقها كاملة متعاقبة طرية العرف .  
ازهارها حذكوكة التجميع ، تاجي الازهار . انوارها  
خامسة البتلات ، نجمة الشكل ، يضاء اللون ، حرة  
الرائحة || اوراقها حيدة المنافع الصحية تستعمل استعمال  
الشاي || اشهر انوامه ما يتبع .

شاي المروج المنقضي

Ladum palustre (S).  
Lédon des marais (F).

شاي المروج المريض الورق

Ladum lasifolium (S).  
Lédon à feuilles larges (F).

١٤٨٦٢ - شاي المكشيك ، هو الزنج ، الحلبة .

١٤٨٦٣ - شاي بَرَاظَوي ، هو حشة الشاي ، الحلبة .

١٤٨٦٤ - شاي بَسَلْغانية \* ، مَوْتَرْدَه أَرْجَوَانِيَّة

Monarda purpurea, M. didyma (S). Monarda pour-  
prea, Thé d'Oswego, T. de Pensylvania (F). Oswego  
tea, Mountain tea, (E). Oswego, Doppelblumen-  
balsam (D). Monarda crenulata, M. scaberrima (I).  
نوع من المورده . وهو نبات حشي معمر من فصيلة  
الفلويات . ساقه كثيرة الازداد تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم .  
اوراقه متعقة ، نصلها كامل الصفة ، ساني اللد .  
شواهي الحافة ، انقب البشرة ، طرية الرائحة . انوارها  
حذكوكة التجميع ، مستطيلة اللد ، ارجوانية اللون ،  
فواسه العرف || انوارها يستمر من حزيران الى تموز .  
اوراقه حمية ناعمة تستعمل الشاي .

١٤٨٦٥ - شاي صيني \*  
Thé chinensis, T. viridis (S). Thé de Chine(F).  
Yea plant (E). Tounrauch (D). Té, Thé (I).  
اشهر انواع الشاي واعما زراعتا واكثرها صوروباً وايديها  
انتاباً . وهو شجيرة عميرة تملو من ترين الى ستة اطنار .  
متوسط طولها نحو ٣٥٠ سم . ترغب في الغصاف وفي الاربة  
المروية القليلة الانساج . تحشى رطوبية التربة المستحكة  
ولا تتأثر بالبرد || تفرس كشتول في مسترها على ابعاد





شَبَّ النِّهَار

## ١٤٨٧٧ - شَبَّ النِّهَار \* شَبَّاب مَعَكَّتْ الْأَلْوَان

*Convolvulus tricolor* (S). Belle de jour, Lisaron tricolora (F). Three coloured bindweed (E). Dreifarbige Winde, Kriachwinde, Winde (D). Bella di giorno, Emarocalle (I).

نبات عشبي حولي ترابي من فصيلة البلياتيات. لوراته اعليجية الشكل ، تصلها خلي البشرة . أزهاره كبيرة ، لونه زرقاء البريق يضاء الانبوب ، صفراء القاطعة . تنتشر في النهار وتعلّق في الليل || فروه الأزرقية عديدة جميعها زائفة الألوان || أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

١٤٨٧٣ - شَبَّاب حُر الطَّبْع ، أَلْبِه .

## ١٤٨٧٤ - شَبَّاب \* Coleophora, Espista (S).

*Colophora, Espista* (F). *Cambesars* (E). *Festermotten, Seckmotten* (D).

جس فراش من المعطيات . أزواحه عديدة أصنافها الاثنا عشر للمنتلة والباردة . جميعها غيلة الجسم صغيرة اللد ، يعلّقها رآوم من ١٦ إلى ٢٢ م . أجسامها حنطية . رولتها الانامية إلى الصفرة تعلوها الزواشك المخططة الألوان . رولتها الخلفية إلى البياض الاخير يعلوها شريط مختلف مداه ولونه مع الانواع . اطراف رولتها عريض التذهيب . تكثر فيه الألوان الغامقة كالاحمر || رولتها تحمل قراباً لا يلبس الشكل والرائع تليها إلى كما تقفل الحلائن . وهي عاصلة وإمارة تركيب النباتات البرية والاشجار للشرية تفطم الارواح بالآثار .

## ١٤٨٧٥ - شَبَّابَة

النشابة : بالقرب سامة تولد . ويقل يقرب صفراء . فطول حة المقرب .

## ١٤٨٧٦ - شَبَّابُوس

هي الشباروس ممكة من السرفوس ، أَلْبِه .

## ١٤٨٧٧ - شَبَّابُوس \* شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس ، شَبَّابُوس

*Oreus antiquorum* (S). *Oreus antiqua, Bugrana, Arrée-boud* (F). *Tall rest-harrow* (E). *Sollfische Haschchel* (D). *Bulimacola, Arrée-boud* (I).

لوع من البق وهو جنية متوسطة اللد غليظة الجلود المستطيلة . الاقنية الاستعداد . لوراته مركبة ، عاقلة الخمار . انزاع متقوية التسبب جملة الشكل صفراء اللون يعلوها شريط وردي || يقال أنها من النباتات البلية نفع انزاعها يفتح الصدر .

## ١٤٨٧٨ - شَبَّابُوس

*Février* (F). *February* (E). يعرف أيضاً بـشباب و فبراير . الشهر الثاني من السنة الشمسية مركب من كاثون الثاني وأذار . وهو من استحداث الفريسي وكان معتم شهر الطهور وأخر شهر السنة . ثم أصبح في ربهه الحالي منذ القرن الخامس قبل الميلاد . عدد أيامه ثمانية وعشرون يوماً أو في السنين الكبيسة فهو تسعة وعشرون || في الصباح منه تسقط الجيرة الاولى ثم يجري الماء في البعد . وفي الرابع حشر تسقط الجيرة الثانية وفي الحادي والعشرين تسقط الجيرة الثالثة . ومنى سقوط الجيرات ان الناس كانوا يتخلون في قديم الزمان اغنية ثلاثة في الشتاء يحيط بعضها يبيض وكان انحاء الاول ملوئاً لنواجم الكبار كالميل والابل والقر . والنواجم الثاني لنواجم الصغار كالتمير والماعز في الحياه الثالث . وكانوا يسلون جرات النار في كل غياه ويصطادون



شَبَّابُوس

الجمر للاصلاح . فلما كان الصباح من شباط اجبروا دواجم الكبار إلى الصحراء وبعثوا الصغار مكانها يوم سكتوا مكان الصغار فتمت سقطت من الجيرات الثلاث جرة . فلذا مضى اسبوع آخر اجبروا البقم أيضاً إلى الصحراء ولم سكتوا مكانها فسقطت جرة أخرى . فلذا مضى اسبوع آخر اجبروا إلى الصحراء وتركوا اشمال النار لقلعة البرد وطيح الهواء فسقطت الجيرة الثالثة || وفي السادس والعشرين من شباط اول ايام السجوز ويسام السجوز سمة : ثلاثة من شباط واربعة من آذار وهي لاخضر من البرد والرياح .

لقومهم الزراعي . اعماله الزراعية عديدة . احصاها :

١ - في الزراعات العلة الموصية - توزيع الاسمدة الازوتية النيتراية على الزروع بمعدل ٢٠ كيلو لطن الواحد وذلك لتنشيط النمو الخضري الذي يقرر جودة السبال وفرة الانتاج . بلز التحول . الاستعداد بمشاكل البقول والتبوع وقايتها من تقلبات التبول الجوية من حيث الحشرات والاصام . المباشرة . عند اواخر الشهر ، بتوزيع الاسمدة الكيماوية للمركبة على الارية لمدة لزراعة البقول والخضار .

٢ - في الاشجار الخشبية - متابعة غرس نصوب الاشجار المنتشرة على اختلاف انواعها . ومتابعة التشذيب والتقليم ثم قطع القمامة وشرتها بأكملها . متابعة نضج الاشجار بالزيوت البيض الخفيفة وبالواكين الفعالة .

٣ - في الحشويات - تهيئة وفسر مشاتل التارنج والليمون الحلو . تنظيف سوق وروع الاشجار من البعاد الصلقة والبقايا اليابسة والكشف على جلود الاشجار المعرصة للحاروت ونفسها بمطلي سلفات النحاس والكلس .

٤ - في الزيتون - اتمام جميع الاعمال الزراعية التي تمرر القيام بها في الشهر الماضي انصبا للتيسيد والحرق والتقليم والتقليم .

٥ - في الكروية - حرق الكروية وتقليمها ثم نفضها بمحلول سلفات النحاس . متابعة الفرس ان في المشاتل او في المستقر بعد مراعاة سيق التربة وفرونها الحكيمة وتقديرها الاندماجي .

٦ - في اللوز - المباشرة بفرس نصوب اللوز في الارية الخفيفة الثقيلة الانساج . تسيد الزراعات القائمة بالاسمدة الكيماوية المركبة والانتباه الى اضافة الكلس حيث تدور الحاجة .

٧ - في الاشجار الحديقية والحرجية - متابعة غرس الاشجار الناضفة والسرور والكروية والاراكسيس الخ .

٨ - في الخضار والبقول - متابعة زرع البقول التي صار تمدادها في الشهر المنصرم بضاف البها القريب والكمون والقزح . تسيد زراعات الباذنجان لتفطم على استمداد النور والاشجار . المباشرة بزراعة الخيار والكوسى والقزح في الموائع الدافئة .

٩ - في الزهور - زرع التربة وتمشيتها ونثر الاسمدة الكيماوية المركبة . تقليم الورود والمباشرة بفرس الزهور الصغيرة على اختلاف انواعها .

## ١٤٨٧٩ - شَبَّابَة

*Carpiculture* (F). *Carp-breeding* (E). الشبابة تربية الشبوط ، وقد تم ذلك في خدران فسيحة متوسطة الفود .

١٤٨٨٠ - شَبَّابُوس

*Cordon & fixer* (F). *Fassen-string* (E). حيط يشد البقي . لاستقراره في مكانه .



شباب



شيث الصلوات



شيث



شيث بري



شيطان



شيع

## ١٤٨٩٠ - شَيْتَالِيَّاتٌ \* Geophilidae (S).

Geophilidae (F). Geophilidae (E).

فصيلة دويبات من الشيداعيات الشفويات الاسك. اجناسها وانواعها كثيرة العدد اشهرها الشيطان.

## ١٤٨٩١ - شَيْتَالِيَّاتٌ \* Demodicidae (S).

Demodicidae (F). Demodicidae (E).

فصيلة حشرات جلدية مجهرية من رتبة اقتراديات. لا ترى بالعين المجردة، اجناسها مستقلة، ارجلها قصيرة. تعيش على غدد وبصيلات الشعر. تكاثر جميع الحيوانات الضخمية ولا تمتص من الانسان.

## ١٤٨٩٢ - شَيْدَعٌ \* Buthus (S).

Scorpion jaune, Buthus (F). Yellow scorpion (E).

ج شيداع. جنس عقارب متوسطة القد او كبيرة، سميكة، اللون، صفراء الخواص. تتميز بملامحها المزدوجة الانسان الداخلية. اصطناعها البلاد الحارة. تكثر في الارضية. مدمرها دجوي، راجع عقرب.

## ١٤٨٩٣ - شَيْدَعٌ اصْفَرُّ Scorpion jaune (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب اصفر، اظلم.

## ١٤٨٩٤ - شَيْدَعٌ حُمْطِيٌّ Scorpion brun (F).

نوع من العقارب يدعى عقرب حطلي، اظلم.

## ١٤٨٩٥ - شَيْدَعِيَّاتٌ Scorpionidae (S).

Scorpionidae (F). Scorpionidae (E).

فصيلة دويبات ولد خيش من رتبة العقربيات. اجناسها وانواعها عديدة. اصطناعها البلاد الحارة. جميعها دجوية. تسمى في الابل وقسريع في القهار في غاف. تألفها بين الحجازة وتحتا.

## ١٤٨٩٦ - شَيْدَعٌ \* Talitrus (S).

Talitrus (F). Talitrus (E).

جنس دويبات بحرية من القشريات البليسا فضيلة الدخاشيات. انواعها المبرولة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الباردة والمعتدلة الحارة. تعيش على القشوط الرملية. جميعها قصاصة وتنفس في الرئتين بمرارة || اجسامها صغيرة. طولها من ٥ الى ٧ سم. انواعها الى الشبهة القزقة يطولها موج مرجاني يتخلل الخشبي حته عند السكم || جميع انواعها مأكولة كالاربيان.

## ١٤٨٩٧ - شَيْدَرٌ Trifles (F). Clover (E).

هو الثقل. وله جاء في لسان العرب: « ثبات شيد بالربة الا انه اجل واعظم ورقة عروب شيد بالقرنية ».

## ١٤٨٩٨ - شَيْرٌ Empen (F). Spoon (E).

الشعر المساة القلابة بين طرفي الالهام والخصر عند كامل نجها. متوصلها ٢٢ سم.

## ١٤٨٩٩ - شَيْرِيَّسٌ Chameleon (F).

هو الجمل الصغرى لا يزال يبع له.

## ١٤٩٠٠ - شَيْرِيٌّ Chiton (F). Cuckin (E).

انزهر سليل قدي الشكل مشير الانعام العراقية المتابعة.

## ١٤٨٩١ - شَيْكَمٌ \* Skimmia (S). Skimmia (F).

جنس نباتات برية ريفية من فصيلة البشيات. انواعها قليلة العدد جميعها جنبات سريرية ترطب في المناطق المعتدلة المشربة نحو الحارة. سيقانها متضخمة فرياء. اوراقها عروسة متعقبة متعاقبة. نصلها جامد الصفحة الاطالية توشم القند البقية الشفافة. انزهرها حشوكلي الشكل طرفي الارتكاز. انزهارها صغيرة القند، كثيفة التجميع، فواصها العرف المسحب. ثمارها عنبة، كرزوية الحميم، حارة الين، مأكولة.

## ١٤٨٩٢ - شَيْكَلَكٌ

هو البرون، اظلم. وقد تكتب ايضا شاباك.

## ١٤٨٩٣ - شَيْبٌ Taureau (vieux) (F).

الشيب والشرب: لمن من الثيران.

## ١٤٨٩٤ - شَيْبٌ Aneth (F).

هو الشيب، اظلم.

## ١٤٨٩٥ - شَيْبٌ Demodex

جنس حشرات من الشيديات الجلدية المجهرية. انواعها عديدة تعيش على غدد الشعر وبصيلاته. تتطفل على جميع الحيوانات الضخمية وقد تصيب الانسان فتصيب سقوط الشعر وما لا يطلق من الحكة.

## ١٤٨٩٦ - شَيْبٌ الشَيْبِيَّاتُ

Demodex follicularum (S). Demodex follicularis (F).

نوع من الشيب المجهرية يركب الموائى اجسامها الاقار والافانم وركب الكلاب والسنانير ثلث شعرا ويطولها ويوطع بها لشد الاذى. وعندما يصيب الانسان يتركز عادة في وجهه.

## ١٤٨٩٧ - شَيْبٌ \* شَيْبٌ \* Anethum graveolens (S).

Anethum graveolens (F). Fenouil bâtard (F).

Anet, Dill, Dill-seed (E). Gerandill, Dill fenichel (D).

Aneto, Aneto odoroso, Neto (I).

نبات عشبي مسمر من فصيلة الخيميات. قريب لثيمه من الثيار وله يستعمل استعماله في التوابل. اوراقه متعاقبة مركبة شطيلة. يستخرج منها ومن البذور زيت طيار له استعماله الطبي || تنقع اوراقه وتجعلون فيه المدة والاماء ويعرفون بالغازات ويدعى الاصاب.

## ١٤٨٩٨ - شَيْبٌ بَرِّيٌّ \* Meum athamanticum (S).

Meum athamanticum (F). Aneth sauvage, Meum (F).

Meu, Bold-money, Spiguel (E). Wilder dillen, Feine Bärwurz (D). Mao, Mao barbuto, Finocchio (I).

نبات عشبي بري طلي مسمر من فصيلة الخيميات. جلور وصاله واوراقه وبذوره قديمة المدة وتوقي القلب وتصفرو الغازات وتوقي الفواكه. يستخرج من جميع اجزائه زيت طيار نافع له استعماله الطبي.

## ١٤٨٩٩ - شَيْكَمَانٌ \* Geophilus (S).

Geophilus (F). Geophilus (E). Erdläufer (D).

جنس دويبات مبرولة من فصيلة الشيدانيات. انواعها عديدة اجسامها مبطلة بيقة مستقلة مركبة من ضرات الخلفات. جرابها تد من ٤٢ الى ٧٣ زوجا لكل حلقة زوج. اصطناعها العالم. تألف الارضية الرملية. تعيش تحت البيل والصلاب. تسرح في الليل. فواصها فسفورية مسية. انثائها سطية. قربا الخارطين والجدان. تعتبر من الدويبات الفاسدة لانها تنقسم الجزر والسيارو.

14916 - **شَبَن** - Engraissement (F). Fattening (E).  
علف البواجن لتسمينها. وهي عملية اقتصادية ترتكز  
على قواعد تقنية وريقة الارتباط بالناسر الغذائية المختلفة  
للمفاهيم التي تحموا الاكلات من الاعشاب الى الحبوب.

14917 - **شَبَنَم** & **كُزُور** - Casarius (S).  
Casuar (F). Casowary (E).

جنس طير من الشبنيات قريب الشبه من النعام. انواعه  
٦ جميعها كبيرة الجثة. كناية الرأس ، جالسة المتأد ،  
قصيرة العنق ، زغبية الريش. عملية الاطوار الزاوية  
الاولان. ذكورها واناثها تتصل بالزوب بنفسه بين ميزاتها  
ان الذكر يحضن البيض دون الانثى || اصطناع بلاد  
الهند وبورما. يأنف الثنايات الكشيقة وضفاف الأنهر  
الدلتا. قوته الحشرات والمظاء والفصايد.

14918 - **شَبَنِيَّات** - Casuaridae (S).  
Casuaridae (F). Casuaridae (E).  
فصيلة طيور من البرادي قريبة الشبه من النعام الا انها  
اصغر حجماً وأقصر عنقاً وصفاً. تتميز بقناتها الكناكية،  
بمناخها الجالسة ، بامتصاصها القصيرة ورياحها وانثها  
اللاصق. جميعها شبيقة الخلق تقود وصوق.

14919 - **شَبَنَة** - Cuivre jeune (F). Brass (E).  
هو النحاس الاصفر.

14920 - **شَبَة المعدن ، معدنيد ، فلزات** - Métalloïde (F). Metalloid (E).  
اشياء للمعادن مواد بسيطة تتميز بقلة اصاليتها الحرارة  
والكهروية ، كما تتوحد مع الاكسجين الحارص  
والاكتيدات الاكتملة.

14921 - **شَبَة الشفاح ، الشفاح حكمي** - Quasi-usufruit (F).  
صيغة فقهية مناداة الانضمام بالمستلزمات وعلى المستمع  
الذي استهلكها او باعها فربما ان يرد اشلها وزناً وصفة  
ومثلاً حين زوال الانتفاع.

14922 - **شَبَة حياكة ، حياكة حكمية** - Quasi-possession (F).  
هي حيازة حق ارتفاق.

14923 - **شَبَة قَلَوِي** - Alcaloïde (F).  
Alkaloid (E).  
مادة عضوية ازوتية تستخرج غالباً من بعض النباتات  
التامة لتناثبات القلوة. راجع قلويد.

14924 - **شَبَهَان** - Laiton (F). Brass, Latton (E).  
هو النحاس الاصفر.

14925 - **شَبَهَان ، صَمُور** - Pallurus (S).  
Pallure (F).  
جنس اثمار ونباتات شائكة من فصيلة الشبقيات  
انواعه عديدة تملو من مرتين الى ١٥ م. اغناسها كثيفة  
مراكبة. اوراقها متصقة ، معقة ، بيضية النصل.  
انزاعها عشوائي التسبيح ، ابطي الانزكاك. انزاعها  
صنعة الله صفراء اللون. ثمارها قمية الشكل ، مرتفعة  
الاطراف المحضة. يقال انها لا تملو من المنافع الطبية.  
اشهر انواعه الشبان الشالك.

14926 - **شَبَرِي** - Amentiforme (F).  
Amentiform (E).  
ما كان شكله شكل الشبرية.

14927 - **شَبَرَم** - Euphorbe ptyssa (F).  
هو الشرب من النباتات الجحالية المؤذية ، اطلبه.

14928 - **شَبَرَمَة** - Vague hémipère (F).  
حشرة مؤذية من ابلديات تنمى فلقوس ، اطلبه.

14929 - **شَبَرَة الطول** - Renouée des oiseaux (F).  
هو ابططاط ، اطلبه.

14930 - **شَبَرَط** - Persicaria indigotica (F).  
هو ابططاط النيل ، اطلبه.

14931 - **شَبَر** - Polydesmus (S).  
Polydesmus (F). Polydesmus (E).  
جنس دويبات من فصيلة الشبريات. انواعه المروقة  
خمس اجسامها مبطلة مستطيلة مركبة من ٢٠ حلقة  
مضروبة الفواصل. طولها يراوح من ٨ الى ١٢ سم.  
تألف الخدائق والياقل. تميش تحت اهيل مكررة كالحاتم.  
قرباً المولد البتائية. تسرح في الليل تقضم الجزر وماتر  
البثيل الرنصة.

14932 - **شَبَرِيَّات** - Polydesmidae (S).  
Polydesmidae (F). Polydesmidae (E).  
فصيلة دويبات من الشبديات الشفويات الاربل ،  
اجسامها وانواعها عديدة اشهرها الشببر.

14933 - **شَبِي** - Nymphomania (F).  
Nymphomania (E).  
هو الانفكام والبلغة يمد الى مهبان الشفر واستمرار حالة  
الوبقان في الانثى.

14934 - **شَبِي** - Turgescence  
انتفاخ وتور في الازوية يصلها ويزيدها حجماً.

14935 - **شَبَكَة** - Filet (F). String (E).  
هي المبرقة تصاد بها الاسماك.

14936 - **شَبَكَة رِي** - Canalisation, Réseau de canaux (F).  
مجسمة الانية في كثرن الري في مزرعة او منطقة او بلاد.

14937 - **شَبَكِيَّات الاجنحة** - Raphidiopères (F). Raphidiopere (E).  
رتبة حشرات نافذة من طبقة عصيات الجناح. تشمل  
فصيلة واحدة وبعض الابناس والانواع. اجسامها  
متوسطة القد ، رؤوسها نافذة ، بجناثها مستطيلة. وهي  
من الحشرات النافذة للآحاة في دورها البري والحشري.

14938 - **شَبَكِي** - Rétine (F). Retina (E).  
احدى طبقات العين الداخلية تأتي بعد القرنية والقرنية.  
تتكون من وحدات مصية تبدو كالغشاء الرقيق ينفذ  
سلح العين الباطني. مركزها وراء البصلة وهي تستقبل  
الاشعة الضوئية فتنتقل عليها المزيقات التي تتفعلها شبكة  
الاصباب الى الشبكية البصرية بالمخ.

14939 - **شَبِل** - Lionceau adulte (F).  
Adult young lion (E).  
ولد الامة اذا ادرك السيج احبال وشبال.



شَبَر



شَبَر



شَبَن



شبهان شائك



شيرة سرطانية



شيرط



شيمة



شيط



شبكة

## ١٤٩٣٥ - شبهة - وشيلة الابنية

Segestria (S). Ségrestrie. Araignée des caves (F). Cellar spider (E). Kellerkrippe (D).

دورية من العناكب الساعية القاصدة ثنائية الرايا مادية الشان من فصيلة الشيشيات || جسمها مستطيل أفقدي يطول نحو ١٦ سم. عند الذكر نحو ٢٨ سم. منه اثني صدورها مستطيل الشكل، اسمر اللون، بنسجي الملمع. عيناها زجاجيتان. شفها ظفان حليمان. فكها عجلان. جرابها شفحة، كثيفة الحلب. بطنها بيضي الشكل، اسود اللون، بنسجي الملمع || تألف الكهوف والمغاور والاقبية والقنار والساكن الارضية. سرسها جديري. عذوها حكمة قرابية الشكل تسجها في الشقوق. قوتها الحشرات تسمى اليها بصرمة مدقة || لسبها ملحة مؤذية تسبب حي غفيلة تستمر نحو ثلاثة ايام.

## ١٤٩٣٦ - شيط

Xanthium (S). Xanthium, Lampourde (F). جلس نباتات عشبية برية حولية من فصيلة المركبات انواعه || اوراقها متموجة، مدقة || مغرسة للتصل للمنعج السفلى. ازهارها عذوكية النجج، محورية الاذنكاز. منافسها الطبية عديدة تدخل في طب مستطورات وتراكيب لغير انواعها الحلي والسي.

## ١٤٩٣٧ - شيط حشوي، كور الصيد

Xanthium abyssinicum (S). Xanthium abyssin, Lampourde d'Abyssinie (F). Burdock, Cockle-bur (E). Spitzklette (D). Lappola (I). نوع من الشيط. مهد بلاد الحقة. منافسها الطبية عديدة اعصها الامراض الجلدية.

## ١٤٩٣٨ - شيط سمي

Xanthium strumarium (S). Lampourde des écrouelles, Petite bardane (F). Lesser burdock, Burrweed (E). Echte Spitzklette (D). Lappe, Lapolone, Xanto. Bardana minore (I).

نوع من الشيط اللبلل مهد البلاد المعتلة الحرارة يكثر في الاماكن المتوسطة الرطوبة. يستعمل في معالجة داء الحنازير.

## ١٤٩٣٩ - شيط، صبور

Tuyas de pipe (F). هو قصبة الفلين من اي مادة كانت.

## ١٤٩٤٠ - شبك

Amaryllis هو الاناريلس، اعطب.

## ١٤٩٤١ - شبكة

Nassa (S). Nassa (F). جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل وعضلة الشبكات. انواعها الماصرة المعروفة عديدة منتشرة في مظهر بحار العالم. جميعها شبة تعيش حل الكشمان والرمال المصورة بالاء || اصداها شبة بالسلال الشبكية المستقلة للصيد. جميعها مغزلة الاغواق القوية، متباينة المظهر الخارجي، منها المالسة والمخرزة واهدة والمخرزة || اجسامها كبيرة. رؤوسها شفحة، مستمرة، ثنائية القياس المستقلة المعينة القواعد. اعطائها انبوية مستقلة. ارجلها قارئة ثنائية الاذنين الصغيرة الطرفية الاذنكاز.

## ١٤٩٣٦ - شبهان شائك، صبور شائك

Pallurus aculeatus, P. spina-Christi (S). Pallure épineux, Epine du Christ, Argolou, Porte-chapeau (F). Garland thorn, Christ's thorn, Jerusalem thorn (E). Södllicher Stechdorn, Christdorn (D). Palluro, Spina di Christo, Porto capello (I).

نوع من الشبان الكثير الشوك المركب السطلي الاعف. جنبته تملو نحو ٣ امار. يستعمل في السياجات. سياجه لا يشم. يمتد في جميع الارضية الزراعية ولا يخشى الرطوبة.

## ١٤٩٣٧ - شبوب

Adulte (F). Adult (E). هو من البقر والغلم والماعز ما تم نمو واكتست استانه. ويقال له شبوب.

## ١٤٩٣٨ - شبوة

Chellifer (S). Chéllifère, Scorpion des livres (F). Chellifer (E). جلس مشربان لافعة من العنارب الكاذبة تعيش في البيوت وفي شقوق الاخشاب اليابسة قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تقرض الاوراق والنبات.

## ١٤٩٣٩ - شبوة سرطانية

Chellifer caneroide (S). Chéllifère canéroide, Scorpion des livres (F). Book scorpion (E). Bücherskorpion (D).

نوع من الشبوة، دورية من فصيلة الكرنشيات وقية القربيات الكاذبة. موطها جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتلة الحارة من العالم الاقدم || جسمها صغير أفقدي يطول من ٤ الى ٦ سم. قوتها الى السرة الخفية. صدورها مزوالة. مقلها مستطيلان شبيها عجلين كواش المقارب. بطنها عادم اللذب. عيناها مركبتان صفيرتان. جرابها شفحة مستطيلة || تألف الموالع المظلمة والبيوت الآلة والمخرزة. تعيش بين الاخشاب وفي شفها. قوتها الحشرات الصغيرة اعصها التي تقرض القباب والورق || تعتبر من الدويبات النافعة اللامؤذية.

## ١٤٩٤٠ - شبوط، سبوت، سابوت، سبوت

Cyprinus (S). Carpe (F). Carp (E). جلس اسماك مأكولة من فصيلة الشبوبات. انواعه عديدة مظهرها من اسماك المياه العذبة. جميعها كبيرة أفقدي طولها يراوح من ٣٠ الى ١٠٠ سم. تتميز بفسخامة وسطها، وقله ذنبها وقصر رأسها ولين زانفها وروما فكها الاسفل. قوتها الاخشاب المائية. تعيش وتتكاثر في المساك البسيطة النور.

## ١٤٩٤١ - شبوبات

Cyprinidae (S). Cyprinides (F). Cyprinidae (E). فصيلة الشبوبات من رتبة مفتوحات اللسان. تشمل عدة اجناس اشهرها الشبوط والبيس والمطوقة.

## ١٤٩٤٢ - شبقيات، شوقيات

Nyctaginaceae (S). Nyctaginacées (F). Nyctaginacées (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين اجنتها وانواعها عديدة اشهرها شب الليل والبونفيلية والابروية.

## ١٤٩٤٣ - شبيدع

Scorpionnet (F). Young scorpion (E). صيفر الشبوع والعنرب.

## ١٤٩٤٤ - شبور

هو الكثير، اعطب.

١٤٩٥٢ - شجاعة \*، كليبتوسبورة \* Calyptospora  
جنس طيور مجهرية من فصيلة الشصيات. أنثاه قليلة  
تتميز بدعماطها الحليمة اللون، المستطيلة الوثيرة، الشفوية  
الانقسام، الثنائية أو الرباعية الاضحية || اما دعماطها  
تتميز وتكثر على الخلايا الدامية انحصار خلايا الاوراق  
والنواحي.

١٤٩٥٣ - شجاعة الشمام \*  
Calyptospora gossypiana, Aecidium colum-

nanum (S). Rouille de l'airelle (F).  
فطر مجهرية يتطفل على الثمام فيسبب الاوراق ويؤدي  
النواحي. وهو من الفطور التي تقضي طورها الايدي  
على الثوب وتتطفل بطورها النواحي على الثمام || ظهوره  
الخارجي اصفرار في الاوراق يفسه اصطالة في النواحي  
ثم جفاف في السماء وسلاية في الايات تؤدي الى احتلال  
الازران النشوي تتسقط الاوراق قبل زمن الاحمال وتبين  
النواحي قبل اكمال دورتها الحولية || يكالغ باستعمال  
مركبات النحاس.

Plant (F). Silp (E).

١٤٩٥٤ - شجاعة

هي كل نبت جديدة ستفاد الجلود يمكن نقلها وغرسها  
في مستقرا. ج شتلي.

Hiémal, Nival (F).

١٤٩٥٥ - شتوي

Hiémal, Nival (E).  
لمت تعريفي يطلق على كل نبات ينمو ويؤثر في الشتاء.

Plantule (F).

١٤٩٥٦ - شجاعة، نيتية

Young slip (E).  
كل شتلة في زمن النشوء الاول قبل ان يجرى اتلاصها.

١٤٩٥٧ - شت

الشت حجر مثل التخلع الصير. طيب الريح. مر العلم.  
يدخل بوفرة وهو كوروك الخلاف. وله رمة موددة وسنة  
صلوية فيها ثلاث حبات او اربع سوي مثل الشنيز يرماه  
الحمام اذا انتثر. واحدة شة (السان).

Abelle ouvrière (F).

١٤٩٥٨ - شت

Working bee (E).  
هي النحلة العاملة. ج شحات.

١٤٩٥٩ - شجاعت هي السادة، اطليا.

Arboriculteur (F).

١٤٩٦٠ - شجارت

Arboriculturiez (E).  
ال عالم المشتل بالبحث عن احوال الشجر (ابن البطار).

Dendrologie (F).

١٤٩٦١ - شجاعة

Dendrology (E).  
علم يبحث في هوية الاشجار وتصنيفها وتقسيمها.

Echle carinata (S).

١٤٩٦٢ - شجاعت

هو الورد ارض عظيمة ضمة الرأس دقيقة العنق ريشاء  
كدياء. اذا غشيت ورياق غلظها انفتحت. اصلاها  
البلاد الحارة تكثر في اواسط افريقية وفي الصحراء العربية  
وفي اليمن.

l'Hydra femelle (F).

١٤٩٦٣ - شجاع اثني

Hydra (E).  
الشجاع الاثني كوكبة نجوم جنوبية المخفج مركزها تحت  
الفراب والباطية والمنداس ووفق بروج السرطان والاسد

Nassidae (S).

١٤٩٦٤ - شجيات

Nassidae (F). Nassidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الاصل.  
اجناسها وانواعها المعروفة عديدة بعضها من مستحبات  
الاراضي المائية والبعض الآخر منتشر في معظم بحار  
العالم || جميعها واجبة تعيش على جيف الحيوانات البحرية ||  
اصداها مشابهة الاشكال، يكثر فيها الشكل القلبي  
المستطيل الطرف اللرب. جميعها ملونة، بعضها مائل  
الصفحة والبعض الآخر مسطح او محزوز او مخدّد ||  
اصناف اجناسها واشهرها الشبيكة.

Hiver (F). Winter (E).

١٤٩٦٣ - شتاء

احد اصول السنة الاربعة يبدأ عصا تكوين الشمس في  
ذروة بعدها من السبت وهو يوم ٢١ كانون الاول في  
نصف الكرة الشمالي ويمتد الى ٢١ آذار || وهو يتبع:  
١- بقلة سقوط الامطار باستثناء مناطق حوض البحر  
المعتدل. ٢- بقلة القتر لا سيما عند الاتساع من خط  
الاستواء وعند الارتفاع من سطح البحر. ٣- بكثرة الثلج  
واستباب الجليد في المناطق الشالية. ٤- يسكن الطبيعة  
واعمال الاجلار الشفوية وبيات الحيوانات والحشرات  
لمستكة وبصورة الطيور القواطع الخ.

Hibernal

١٤٩٦٤ - شتائي

لمت تعريفي يطلق على ما هو مختص بقصر الشتاء.

Défectuosité, Malformation (F).

١٤٩٦٥ - شتور

Defect, Malformation (E).  
يقال ثمار لا شتر فيها اي لا حبيب فيها.

Entropion (F).

١٤٩٦٦ - شتور داخلي

Entropion (E).  
عارض قوامه تغير حالة البني واقتلابه من الخارج الى  
الداخل.

Cetaceae (S). Cétacée (F).

١٤٩٦٧ - شتراك

جنس نباتات سرخسية من فصيلة البساجيات. انواعه  
مدينة يكثر ويوجد في المروج الرملية بين الصخور ومليها.  
اشهر انواعه الشتراك المغربي.

١٤٩٦٨ - شتراك مغربي \*، حقيقشة الذهب

Cetaceae officinarum (S). Cétacée officinal, Daurade (F). Scale fern, Scaly spleenwort, Rusty-back (E). Echter Vollfarn (D). Cetrac, Cetracca, Erbe do-  
rata (I).

نوع من الشتراك يعيش على الصخور والجدران. يستخرج  
منه صباغ ذهبي اللون. يقال ان الثبات يكامله يقيد  
السعال ويحل الصدر.

Palmure (F).

١٤٩٦٩ - شترة

الشترة والشترة والحطاب واحد. راجع حطاب.

Espace entre 2 doigts (F).

١٤٩٧٠ - شترة

التفريعة بين الاصابعين.

Carence (F). Deficiency (E).

١٤٩٧١ - شتقع

الشتع هو انقصار الجسم النباتي الى عنصر من عناصر الغذاء  
الرئيسية او الثانوية.



شتراك مغربي



شتة الثمام



Arbuste (F). Bush, Shrub (E). **شَجِيرَكَة** ١٥٠١٩ -  
هي من النبات كل شجرة صغيرة لقد تملو الجنبه ولا تترك  
الشجرة .

Braiment (F). **شَحَاج** ، شَحِيج ١٥٠٢٠ -  
صوت البتل والحمار .  
Bry of an ass (E).

Onagre (F). **شَحَاج** ١٥٠٢١ -  
حار الوحش . اطلبه .

Etiage (F). **شَحَاج** ١٥٠٢٢ -  
هو البروش ، اطلبه .

**شَحَارِيَات** ، شَحَرِيَات ١٥٠٢٣ -  
فصيلة نباتية تعرف بالسحليات ، اطلها .

Déchaumage (F). **شَحَب** ، فُحَاح ١٥٠٢٤ -  
Digging up the stubble (E).  
في الحراثة السطحية التي تعقب الحصاد القاية منها تهرية  
التربة واقتلاع الجذام وطمره .

**شَحَر** ١٥٠٢٥ -  
الشحر والشمرة : الشط الصيق ويجري للماء في بطن الوادي .

Turdus (S). **شَحُرُور** ١٥٠٢٦ -  
Merle (F). Black bird (E).

جنس طير من القواطع وخصية الشحورور ، أنواعه  
عديدة تتميز بأصواتها الخرجة التعريف ، بعضها المستديرة  
وبأصواتها البقية المستطيلة التي تتكلم بها عند الانتقال  
على الأرض بسهولة كلية || فويتا الحشرات والتبدان  
والآثار . تألف الحدائق والسيارات والأحغال وأحراج الصنوبر  
والسنديان . تكثر في الأشجار . أنثاها تبيض من ٤ إلى  
٦ بيضات تحضنها بمناولة الذكور نحو أسبوعين . أشهر  
أنواعه ما يلي .

Turdus merula (S). **شَحُرُور أُسُود** \* ١٥٠٢٧ -  
Merle noir, M. vulgaire (F). Common black bird (E).  
Amsel, Schwarzdrossel (D).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد له شتاه وصيفه  
دع أن يكتم من القواطع التي تجرب البلاد . طوله نحو  
٢٦ سم . ذكره أسود القرب ، جروني المقار وسوايب  
العين . أثناء فصية الظهر ، فضاء البطن الموشم بالأصود  
والأصهب . مقارنا أسمر || قوته الحشرات والديدان  
والحززون والآثار . يألف الحدائق والنباتات . يطن عشه في  
الأحغال القليلة الارتفاع .

Turdus aureus (S). **شَحُرُور مَدَّهَب** ١٥٠٢٨ -  
Merle doré (F). Gilded black bird (E).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه إلى  
الصفراء الذهبية تلبوه رشفة سوداء || يألف الأسراج  
والنباتات الكثيفة . يطن عشه في سَمَ الأشجار .

**شَحُرُور مَطُوق** ١٥٠٢٩ -  
Turdus torquatus (S). Merle à plastron (F). Ring-  
ouzel (E).

نوع من الشحورور وهو طائر غريد من القواطع . ثوبه إلى  
البردة القصية الملوحة . زوده أبيض اللون || يألف  
الحدائق وأحراج الصنوبر والسنديان . يطن عشه في الأشجار  
القائمة القليلة الارتفاع .

١٥٠٠٠ - **شَجَرَة التَنَكِيل** هي قرطة الغويان ، اطلها .

١٥٠٠١ - **شَجَرَة التَنَكِيل الكَذِيب**  
في التكنيس ، اطلبه .

١٥٠٠٢ - **شَجَرَة التَمَس**  
في اسطرافليس نوريس ، اطلبه .

١٥٠٠٣ - **شَجَرَة الكَبْد** ، بُلْدَمُ  
Boldoa fragrans, Peumus boldus (S). Boldo, Boldu (F).  
Boldo, Wood tree (E). Chilensischer Boldobaum (D).  
Boldo (I).

شجرة من فصيلة البنيات مدها بلاد الشيلي . أوراقها  
مروية ، طرية البرق ، طيبة ، تستعمل في علاجات  
الكبد ويستخرج منها مادة صالحة لتكفي بولدين (Boldine)  
تستعمل كخضبة وقوية ومغذية . ثمارها سكرية الطعم  
مأكولة وهي كالتزهر كذا يشكوا .

١٥٠٠٤ - **شَجَرَة الكَلَب**  
في الألبس اللهي ، اطلبه .

١٥٠٠٥ - **شَجَرَة البَن**

Brosimum galeotodendron (S). Brosima, Galeo-  
dendron utile, Arbre à lait, Piratins (F). Cow tree,  
Milk tree (E). Milchbaum, Kuhbaum (D). Palo di  
vacca, Albero del latte (I).

شجرة من فصيلة القرصيات . مدها أمريكا الاستوائية .  
منبتها الأماكن الغامضة . تملو من ١٥ إلى ٢٠ م . أوراقها  
مستطبة ضيقة ، كبيرة النصل . أزهارها ثنائية المسكن ،  
قريبة الصنيع ، ثمارها جراء جلدية القشور ، مأكولة  
البروز . يستخرج من ساقها باخر صافية لينة تشبه  
الكأسة شكلًا وتركيبًا ، تكون ملائجة ويصنع منها شيء  
كالبن .

١٥٠٠٦ - **شَجَرَة الله** في الألبس ، اطلبه .

١٥٠٠٧ - **شَجَرَة المسَاير** في القوتلا ، اطلها .

١٥٠٠٨ - **شَجَرَة المَطَاط** في الحيفية ، اطلها .

١٥٠٠٩ - **شَجَرَة المَعِيد** في الجينكو ، اطلبه .

١٥٠١٠ - **شَجَرَة المَلَل** في النوم ، اطلبه .

١٥٠١١ - **شَجَرَة المَيْحَة** (F). Liquidamber à styrax  
في النبر السماع الأمريكاني ، اطلبه .

١٥٠١٢ - **شَجَرَة التَبَق** في السدر ، اطلبه .

١٥٠١٣ - **شَجَرَة الزَوَك** في ايرتليون ، اطلبه .

١٥٠١٤ - **شَجَرَة غَبُور المَرُور** في البواب .

١٥٠١٥ - **شَجَرَة لِسَان المَصْفُور**  
في المزان ، اطلبه .

١٥٠١٦ - **شَجَرَة هَوَّه** في الأزدست ، اطلبه .

١٥٠١٧ - **شَجَرَة مَرَم** في قيسان نبات ، اطلبه .

١٥٠١٨ - **شَجَنَة** Ramification (F).  
جمل عروق الشجر من اغصان وفناد وإفان وخرايب .



شحورور أسود

لورقة تطول نحو ٥ سم. وترعرض ٨ سم. نصلها جيل الحصار الاجم. ثماره صغيرة القذ سوداء اللون || ازفراره يستمر من نيسان الى ايار .

### ١٥٠٣٧ - شعشع قريش الورقي

*Phillyrea latifolia* (S). *Filaria à larges feuilles*, *Phillyrea à larges feuilles* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٦ الى ٨ أمتار. لورقة قلبية الشكل نصلها مستعرض للناخلة، سنن الحافة، ثنائكة. ثماره عنية الشكل ولادة، مقبولة القبة، غمدة الطرف. لونها الى السرة السوداء || ازفراره يستمر طوال شهر ايار .



شعشع

### ١٥٠٣٨ - شعشع متوسط الورقي

*Phillyrea media* (S). *Filaria intermédiaire*, *Phillyrea intermédiaire* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من ٤ الى ٥ أمتار. لورقة اطليجية الشكل نصلها سنن الحافة عريضة نحو ٢ سم. ثماره عنية الشكل ولادة، جبروة القذ || ازفراره يستمر من نيسان الى ايار .

### ١٥٠٣٩ - شعشع صيكان

*Phillyrea decora* (S). *Filaria décorative*, *Phillyrea décorative* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من متر الى ثلاثة أمتار. لورقة تطول نحو ١٥ سم. وترعرض ٥ سم. نصلها جلدي التسج الباهت الحصار. ثماره يضية الشكل. لونها الى البشقي الغامق || ازفراره يستمر طوال شهر ايار .



شمس

### ١٥٠٤٠ - شحط

*Ficus* (F). *Dung* (E).

الشحط : ذرق البائر .

### ١٥٠٤١ - شيفطار

*Cyclopterus* (S). *Cyclopterus* (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الشيفطاريات ثلاثيات الزوائف. انواعه عديدة معظمها من اسماك بحار المناطق المعتدلة الحارة والصحرة نحو الباردة || اجسامها مستطبة الحجم، كروية الشكل، تطول من ٣٠ الى ٩٠ سم. سوكها بحجمية ويشللة. رؤوسها مستديرة، قصيرة الاضطام، رقيقة العين، صغيرة الاشدان || الثوباسا تختلف مع الانواع، تكثر فيها الرينة السراء. زناقلها معددة التسج. تحمل في مقدمها بحجمية طباية مستديرة مؤلفة من الزعنفتين الحويصيتين المتصقتين، تمكنها من التمسك بالأسل الصخري حيث تكمن راسدة قدم فرانسها || اعرف انواعه واشهرها الشيفطارة المبلولة .

### ١٥٠٤٢ - شيفطارة مبدولة

*Cyclopterus communis*, *C. lumpus* (S).

*Cyclopterus communis*, *Lump*, *Lompe*, *Livre de mer* (F). *Lump-fish*, *Sea-owl*, *Cock-padd*, *Half-padd* (E).

نوع من الشيفطار . سمكة بحرية يبيض . اطرافها بعض انحاء البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || جسمها يضيء الشكل، مستطال التسطيط، بطول نحو ٥٠ سم. ويميلون من الرأس الى الذنب سبعة صفوف من الصل المتناوبة الاحجام . نوبها الى الرينة يعطونها تسج ازرقة يسر في التلوه وينير في الجانبين ويعصر في البطن || رأسها مستطال الحجم، مستعرض الشكل، قصير الخلف، صغير الشفق



شيفطارة مبدولة

### ١٥٠٣٠ - شعوريات

*Turdidae* (S). *Turdidae* (F).

فصيلة طيور من الجوارم المشروبات التأثير منها لشعور والسنه .

### ١٥٠٣١ - شعوريات في السليات، الحلبا .

### ١٥٠٣٢ - شعشعورة

*Mantissa* (S). *Mantissa* (F).

جنس حشرات مقترنة من فصيلة الشعشعوريات وربة شارات الاجنحة . انوعها المرفوعة نحو ٥٠ مستديرة || معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || جسمها صغير نحيل مستطيل يضيء بشكله شكل السرمية . رأسها صغير . عضها عريضي . منابعا بارزتان . زيناها دقيقان . كسلها فيه اثري . مستطيل . اجنتها اربعة . جميعها شفافة كثيرة المروق والاصاب . جراسها ثلاثة ازواج منها زوج امامي مخصص للقبض أو القنص وهو كبير القد، ضليع القنوب المشاري الحافة الداعلية || مكين الرسع السنن الحصار ولدي يتطوق حل مشاري القنوب انصباك الملقط || الاثني اكبر قدماً من الذكر . والربة مقترنة كالخشرة الجميلة . يقال ان الاثني تنجح المكن في مكاديب الناكب وانصها الحثرك .

اعرف انواعها والهرها :

*Mantissa pagana* (S).

*Mantissa palena* (F).

التي يكثر ويدها في معظم مناطق البوصلة الباني .

### ١٥٠٣٣ - شعشعوريات

*Mantispidae* (S). *Mantispidae* (F).

فصيلة حشرات من صيبات الاجنحة وربة شارات الاجنحة . اجنتها وانوعها عديدة اطرافها بعض انحاء البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من البالي القديم || تتميز باجسامها النحيلة المستطيلة وبجراها الامامية الكبيرة المهيمة للقنص . اجنتها شفافة كثيرة المروق . اثريها تختلف مع الاجناس والانواع || انثها اكبر قدماً من ذكورها . بعض انواعها يهرق نحو ٨٠٠٠ مكنة . مكنتها اطليجي الشكل مذنب || اشهر اجنتها الشعشعورة

### ١٥٠٣٤ - شعشع، شعشع

والشمامة والشمامة والشمامة : شاة ذهب لونها كله . وقيل السنية . وقيل التي لاجل بها . وقيل التي لم يزد عليها قط . ج . احشاش واحشاش وشعشع .

### ١٥٠٣٥ - شعشع

*Phillyrea* (S).

*Filaria*, *Alavert*, *Aourat*, *Phillyrea* (F). *Mock privet* (E). *Feinlilze Lorbeerlinde* (D). *Filaria* (I).

جنس شجيرات برية وريوية من فصيلة القريصيات . قريبة القبة بالثم اوراثها ابيدة . صغيرة النصل . متقابلة . انهارها صغيرة . عوروية الارتكاز . ثنائية المسكن، رباعية النصل والريالات . ثنائية السداة . ثمارها عنية صمينة لونها الى البشقي الاسود || اجنتها شديدة الصلابة تستعمل في بعض الصناعات || اشهر انواعه ما يلي .

### ١٥٠٣٦ - شعشع شبيث الورقي

*Phillyrea angustifolia* (S). *Filaria à feuilles étroites*, *Phillyrea à feuilles étroites* (F).

نوع من الشعشع شجيرة تملو من مترين الى اربعة أمتار





طولاً نحو ٤ سم. تتميز بجسمها القوي الشكل، زعنفتها الشريفة الفارقة وبسيفها الرقيق الكبير .

١٥٠١٤ - شعاب هو الحليب ، اطبله .

١٥٠١٥ - شعاب \* Chrysididae (S).

فصيلة حشرات من شعابيات الاجنحة المصنوعة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد ، متصلة الجسم او صغيرة . اولياها زاهية الالوان الازمنة الموج . وروصها صغيرة . جواشها غليظة . بطونها مركبة من اربع حلقات ورجلات ، حناها مسنن الحافة . شوارها تتناسل ثلاثي الحلقاء ، مذنب الاشارة الى انها تتصلل حل غليظا لتصل وزناوير وند تحت مكانها في جمل الخناوير فينفذ من رقات قفوس الدجبة وتلق الشهه .

١٥٠١٦ - شعاب \* ، هي شعابكة

Tetracosus quadricornis (S).

حورن لوبن جيت من الغطاء وحيد الجنب والخرج ، موته الحن الى يتميز بصفر جسمه وبقروله الازمنة ، الثان صغيران يطوان العينين وثلاثان متوصلتان يطوان الرأس .

١٥٠١٧ - شعاب \* Diathermanidae (F).

الشعاب عامة انفاذ الحرارة المشعة .

١٥٠١٨ - شعاب Fagot (F). Faggot (E).

هو الجوال حلب دلب .

١٥٠١٩ - شعاب \* Setibem (S).

جنس حشرات من فصيلة الشعاب . انواعه قليلة تشبه الزناوير . طولها يراوح من ١٨ الى ٢٨ سم . لونها الى الزرقه الغفراء الموج . يكثر ويوجد من ايار الى تموز .

١٥٠٢٠ - شعاب \* Chrysis ignita (S).

حشرة من الشعاب صغيرة القد طولاً نحو ١٢ م. واسها ويوشها الى الخضرة الزرقاء . بطنها ذهبي اللون يملو موليخ اعرض . يكثر ويوجد قرب مجاري الماء وفي جوار التصل والزناوير .

١٥٠٢١ - شعاب Etanponner (F).

سنة الاضخان المثرة لثلا تنكسر .

١٥٠٢٢ - شعاب Pristipoma (S). Pristipoma (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات ، انواعه عديدة معظمها من اسماك البحار الحارة الى له لومان مرتمها المتوسط : التكروري والقرقور .

١٥٠٢٣ - شعاب هي ثنات اليربع اي الحجارة الكلسية الرخوة (ابن القطار).

١٥٠٢٤ - شعاب Filtre (F). To filter (E).

نخل الشراب : صفة .

١٥٠٢٥ - شعاب Caranx rhonchus (S).

نوع من السم وهي سمكة مأكولة توجد في المتوسط يبلغ



شذرة



شذب ازرق



شذب لاهب



شذرة



شكاة الازمار

١٥٠٢٦ - شعاب

الشعير من اصول الليل . قال الاصمعي : الشعير من القم والشعير من الشعرين والكرير من الصادر .

١٥٠٢٧ - شعاب Discordant

صفة الشيء لتجهم المادام الاتجام .

١٥٠٢٨ - شعاب Diathermans (F).

نمت شريفي يطلق حل كل مادة تغط الحرارة دين ان تستمر منها .

١٥٠٢٩ - شعاب ، قرون ، ويط Atzeler (F).

ربط الدواب بالمحروور . To put horses etc... (E).

١٥٠٣٠ - شعاب \* Salticus floricola, Stitcus floricola (S).

دورية من المتناكب السابعة القانصة ثنائية الروايب مداسية المشان من فصيلة الشعابيات الى جسمها صغير القد

يطول من ٥ الى ٨ م. الاثن اكبر كذا من الذكر . صدورها اسود اللون ، احمر الحلب الكثيف . صناعها زعنجان . شمسها صغيران عريان . فكلاها صولجانيان . جرمها مسطحة . بطنها بيضي الشكل ، اسمر اللون ، ابيض الزعنجان والزناوير . تألف الخلف مجاري الماء حيث تكثر الازمار . تسرح في النهار تسمى وراه قصها وكذا وقفا . قوتها الحشرات اعصها التي تنسج في خوات المجانين تسمى لما قرب الازمار الى مكنتها ييش في القرة تحفر تحت الحجارة الى تعبر من المتناكب المليدة .

١٥٠٣١ - شعاب \* Salticus formicarius (S). Saltique fourmi, Myrmarchae fourmi (F).

دورية من المتناكب السابعة القانصة من فصيلة الشعابيات . جسمها مستدل القد يطول من ١٢ الى ١٨ م. الذكر اصفر كذا من الاثن . صدورها اسود اللون وباهي انفسه البيض . صناعها زعنجان . شمسها صغيران . فكلاها مقصان . جرمها مسطحة . بطنها بيضي الشكل ، اسمر اللون ، ابيض الزعنجان والزناوير . تألف الخلف مجاري الماء . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة والذباب والحولم .

صكبتها ييش في القرة تحفر تحت الحجارة الى ملجأها الحيائي كلبين سائر المتناكب . بيتها الشري لا يتجاوز ١٨ اسبوعا الى تعبر من المتناكب الثالثة .

١٥٠٣٢ - شعاب \* Salticus (S).

فصيلة عناكب من رتبة الزناوير . اجناسها وانواعها

المعروفة كثيرة العدد منتشرة في معظم انظار العالم اعصها انظار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة الى جميعا مقترنة صغيرة القد زاهية الالوان البراقة تسرح في النهار وتحت انفة الشمس . تسمى وراه قصها وكذا وقفا . أشهر انواعها الشعاب .

الحُتار الحَارِجِي بِالْفَسْمِي أو بِالْأَزْرَق ۞ شُدَيْفَة مَوتَصَة  
الصَنْف ، مَأْكُولَة .

Tirant (F), Tie (E).

١٥٠٨٣ - شَدَاد

خَشَبَة أو مَرْزِيَّة شَدَدَ بِهَا الْبَاء .

١٥٠٨٤ - شَدِيدَات ۞

Membracidae (S).

Membracidae (F), Treehoppers (E).

Buckelszirpen, Buckelszikaden (D).

فَصِيلَة حشرات من فصيلة الاجنحة المتجانسة . اجناسها وانواعها المعروفة متوسطة البدن اطلسها منظر مناطق البلاد الاستوائية والحارة ۞ اجسامها صغيرة ، يتكرر لها الشكل القروني . رؤوسها وكوابلها مستعرضة . عيونها نازعة . اجنحتها جلوية الاسترمان ، لاحفة ، شفافة أو صفراء اللون ۞ اقوابها واجنحتها تمتاز للمواقع الموضوعة فيها .

Raphicerus (S).

Raphicère, Rhaiphicère (F).

جنس حيوانات عاشبة بحيرة من الظباء . انواعها المعروفة قليلة البدن . اطلسها اقارة الافريقية اجسامها المناطق الجنوبية ۞ اجسامها متوسطة القد ، عظام ، اناتها جمادى القروني ، ثنائية الاغلاف . ذكورها جالسة القرن الصغيرة القصيرة . اقوابها الى الصلبة الخشبية تنطبق مع اقوابها من الظهر وتقرع عند البطن . اعرف انواعها :

Raphicère champêtre (F).

Scenbok (E).

Raphicère à oreilles noires (F).

Gryabok (E).

١٥٠٨٦ - شَدَخ ۞ حِمَادِيَّة الْمَاء

Hydrotropism (F), Hydrotropism (E).

منسج يسير . الماء ويحدث غذاء . الماء ينشط شغاع النبات وازدياد حجم الخلايا فيسبب احديداً في التسح التي تتجه وتقيماً في التسح الماكسة ينسج مع اصحاب شغاعي .

١٥٠٨٧ - شَدَخ هو القطيفة ، اطلسها .

١٥٠٨٨ - شَدَخ هندي

هو القطيفة الخضراء ، اطلسها .

Segment (F), Segment (E).

١٥٠٨٩ - شَدَكَة

هي السمكة ، اطلسها .

Entomozoa (F).

Entomozoon (E).

١٥٠٩٠ - شَدَقِي

نمت ترميمي يطلق على كل حيوان من ذوات الاجسام الشدقة .

Schedophilus (S).

Schedophile (F), Schedophilus (E).

جنس اسماك بحرية بيوضة من فصيلة الاسقمريات شالكتات الزعانف . انواعها المعروفة قليلة البدن اطلسها بحار البلاد الحارة وبعض مناطق المتوسط ۞ اجسامها صغيرة القد ، اطلسية الشكل ، طولها من ١٢ الى ٢٠ سم . رؤوسها خدرية ، قصيرة الاغصان ، متدلة الاشدان . عيونها كبيرة ، مستديرة ، نازعة ۞ اقوابها الى الربعة او الخلطة القلبية الموانع يملؤها بريق عظمي او رقة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية الباقية . ظهورها اعين خضاباً من جوانبها وبطنها ۞ زعانفها الظهرية والشرجية كبيرة القد مخفية



شَدَان

١٥٠٩٢ - شَدَقِيل مَرَقُوش ۞

Schedophilus punctatus (S), Schedophile tacheé (F).

Schedophilus punctatus (E).

نوع من الشدقيل . سمكة بحرية بيوض . اطلسها بحار البلاد الحارة اجسامها البسر الاحمر وبعض مناطق البسر الابيض المتوسط ۞ جسمها شبه بيضي الشكل ، متدل التعليل يتطول من ١٥ الى ٢٠ سم . قوامها الى الطحلة القلبية تعلوها رقة زرقاء تمتد الى الزعنفة الذيلية . ظهورها اعين خضاباً من جانبيها وبطنها . زعانفها الظهرية والشرجية مخفية الحار الحارجي ۞ بالازرق ۞ رأسها صغير الحجم ، خدرية الشكل ، قصير الخطم . قوامها عموماً القليل المتدل الانفراج . ذكورها الاصل يتقدم الانفراج بعض الشيء . عيناها كبيرتان ، مستديرتان ، نازعتان ۞ مسرهما مناسبات القليلة القريبة الغور ۞ لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٥٠٩٣ - شَدَن

شدن الظبي وجميع ولد ذوات الظلف والذئب : قوي ورعرج واعتنى من امه .

Cervus (S).

١٥٠٩٤ - شَدَن

Cérus, Cervus (F), Cervus (E), Cervul-

blume (D), Cervus (I).

جنس نباتات عشبية برية عشبية من فصيلة المركبات . انزاعها قليلة البدن متنبها الجزيرة وبعض المناطق المصرية والافريقية . سيقانها وفروعها منتصبه متفرعة ، نورسها كاليامين .

Scavola (S).

١٥٠٩٥ - شَدَيْفَة ۞

Scévole (F), Scavola (E).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة البقوليات . مهدبا استوائية . سيقانها منتصبه صلبة تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متناظرة منتفخة . انزاعها يبيضاء اللون . كورسها وتوريجاتها غامسة الخلق المشقوق من جهة واحدة تدنو كأنها شقائق ۞ انواعها المعروفة قليلة البدن ، اشهرها التالية :

١٥٠٩٦ - شَدَيْفَة صَغِيرَة الْوَرَق ۞

Scavola attenuata (S).

Scévole à feuilles atténuées (F).

نوع من الشديفة . ساقها تعلو من ٥٠ الى ٧٠ سم . اوراقها شاذية تتطول من ٥ الى ٨ سم . نصلها سمك الصنفعة ، الحار . انزاعها يبيضاء اللون تتطول نحو ٢ سم . كورسها شاذية مستعرضة الخلق ۞ تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٥٠٩٧ - شَدَيْفَة عَظْرِيَّة ۞

Scavola suaeuolens (S), Scévole odorante (F).

نوع من الشديفة . ساقها تعلو نحو ٩٠ سم . اوراقها اطلسية الشكل تتطول نحو ٨ سم . نصلها سمك الصنفعة ، متعادلتين الحار . انزاعها يبيضاء اللون ، طويها نحو ٢ سم . قوامها نحو ٣ سم . طرية الرق المنتصب ۞ تنويرها يستمر طوال شهر آب .



شَدَل مَرَقُوش

## ١٥٠٩٨ - شديم \* ، قرود الغرب

Pithecius Inuus (S). Magot (F).

قرود وسيد الجلس والنوع من فصيلة الميمريسيات. موطنه بلاد المغرب. جسمه قصوري الشكل بطول نحو ٧٠ سم. ويرتفع من ٤٠ إلى ٥٠. ثوبه إلى البصرة الصفراء الملوحة. رأسه وعصره إلى البصرة المابتة. بطنه إلى الأبيض اللامع. ذنبه جملة || يعيش على الأشجار وبين الصخور. قوته الاعتاش والجذور والثمار.

## ١٥٠٩٩ - شدكة

Glossina (S). Glossina (F). Glossina (F).

جلس حشرات من فصيلة الذباب تنقل إلى الحيوان الذي تسلمه طائفة من الأمراض الطفيلية المؤذية. أنوعها عديدة، موطنها المناطق الاستوائية وجوارها.

## ١٥١٠٠ - شدكة لاصقة \* ، زُمب ، دُبابكة

Glossina moritani (S).

Glossina mordante, Mouche tsat-tsé (F). Tsetse (F).

أخبت أنواع الشدة وأكثرها انتشاراً تلصق الإنسان وتسبب له مرض النوم وتلصق الخيل والأبل والبقر فتلكها. موطنها مستعمرات افريقية الاستوائية والوسطى.

## ١٥١٠١ - شدكام

Dard (F). Sting (E).

حقنة الغرب والذبور والنحلة الخ.

## ١٥١٠٢ - شدكام ، صبرسي (S). Smarts (F). Picarel (F).

جلس اسماء بحرية من فصيلة المنغليات ، أولاه حديدية اصطناعها بحار البلاد الحارة والمعتدلة. اجسامها اطليجية الشكل. اغطائها غروبية مستطبة الاطراف. فتكرها عادمة السنين. زماقتها الطهرية وسيدة مستطبة. زماقتها الشربية فارقة || أشهر أنواعها الشدامة اللبلولة ، اطليا.

## ١٥١٠٣ - شدكامه صيدولة \* Smarts vulgaris (S).

Picarel commun, Jaret, Gerrat (F). نوع من الشدكام وهي سمكة مبلولة في المتوسط. طولها يراوح من ٢٤ إلى ٢٦ سم. توجب لغني التي حتى التجزيع والتشويح يسر ويمنع مع اقترابه من ليج الطهر. سرها يسر على شكل مروحة. لحمها متوسط الصنف.

## ١٥١٠٤ - شدك

Paillettes d'or (F).

Grain of gold-dust (E). الشدر: قطع من الذهب الطبيعي لا تزال على حالتها البدائية || والندر: اللؤلؤ الصغير. النواصة شدرة ج شدرات وشدور.

## ١٥١٠٥ - شدؤ \* Anomalie (F). Anomaly (E).

هو الاضداد من السلك النظامي المأثوب.

## ١٥١٠٦ - شركة هو الابتاع ، اطية .

## ١٥١٠٧ - شراب Strop (F). Syrup (E).

كل صير سكري العظم مستحب العرب .

## ١٥١٠٨ - شرابية الرامي \* Nemopanthos (S).

Némopanthos (F). Mountain holly (E). Berghulst (D). Nemopanto (I).

جلس نباتات برية وثرثينة من فصيلة البهشيات : منها امريكة الشالية . انواعها قليلة جميعها جنبات وشجيرات تطلع من ١٠٠ إلى ٣٠٠٠ سم. فرونها دقيقة مضلمة .

اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، مستطبة . تصلها اطليجي الشكل مسنن الحافة . انزهارها ابيطة الاكثر ، فردية لتجميع ، طويلة الزناد ، رباعية او خماسية البتلات البيض . ثمارها عنبة الشكل حراء اللون ، قطرها نحو ٧ مم.

## ١٥١٠٩ - شرماج هو الللى السنة ، اطية .

## ١٥١١٠ - شركوكة Etinelle (F). Spark (E).

ما يتطاير من النار. ج شرار وشرور.

## ١٥١١١ - شرماس Dextrine

هو الكسرين ، اطية .

## ١٥١١٢ - شرماكة Rhizographie, Rhizologie (F). Rhizology (E).

الشرافة علم يبحث في تركيب جلود النبات وفي تحليلها وظائفها .

## ١٥١١٣ - شرماسي Valliforme (F). Velliform (E).

لمت تعريفي يطلق ، في علم التاريخ الطبي ، على ما هو شكله كالذراع .

## ١٥١١٤ - شرماكة ، مشدوكة Collectivité (F).

Collectivity (E). صفة ما هو مشترك . يطلق على الجماعات والفتات .

## ١٥١١٥ - شران

حرام كالبيض تكثر قرب الماء ، تنشئ وجه الانسان ولا تمس . الواصة شرانة .

## ١٥١١٦ - شرليف سلخ الحية اذا قتله .

## ١٥١١٧ - شرمة Plinche basse (F).

Low between (E). هي السبكة المنخفضة التي يتم دحها بماء الجمر . ج شرب وشربات .

## ١٥١١٨ - شرمة Purge.

هي الدواء المسهل الذي يطلق البطن . أشهر الشرابات البطورية : سلفات الصوديوم وسلفات المنيوم وزيت الخروع .

## ١٥١١٩ - شريسي \* Cirrhobarbie (S).

Cirrhobarbe (F). جلس اسماء بحرية من شالكات الزوائف وضيعة القويونيات . انواعها المبرقة قليلة العدد اصطناعها بحار الجنوب الافريقي || اجسامها مستطبة الشكل ، مستطبة الطول . رؤوسها غروبية ، صغيرة ، اغشاها العليا والسفل مجزأة بولوس دقيقة . حيزها ناشرة . زماقتها الظهرية قاطبة . الصدرية والحوضية صغيرة . الشربية مستطبة . الذيلية شبه مستطبة . اقلها وردية اللون نسية للوانج || لحمها مأكولة ، متوسط الصنف .

## ١٥١٢٠ - شريليل Kleinia (S). Kleinie (F).

جلس نباتات خشبية او غشوية من فصيلة الميريكيات انواعها عديدة منتشرة في معظم اسواق العالم . اوراقها لحمية النصل ، سنائية الشكل ، متعاقبة . ورياسها الزهرية حادة للديانات والكميات يطولها سف من القنابات . بذورها مجزأة بقنابات خشبية || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .



شديم



شدة لاصقة



شدة مبلولة



شرابة الرامي



شريس

## ١٥١٣٩ - شُرْبَتَا حَمَلَا

Chourta Mnasayensis (S).  
Chourta de l'Himalaya (F).

طائر من الشرق. موطنه يمتد من جبال حملانا إلى الهند وإيران. يألف البراري والأحراج على السواء. قوته يمدّ ونفسها وقتل ويأبى. جسمه متوسط القد، يطول نحو ٢٥ سم. قوته إلى السواد الأخضر المالح. زوره ومثقه إلى الربة يطول طوق أسود يمتد حتى الحشر والين. صدره إلى الربة المشقة بالسود. جناحه لاسخان. قوته إلى الربة. ذنبه صغير، مقطوع الطرف. يمشي عث في الفصوص يقيه بين الأشجار الكثيفة. الأثي تحسن من ٨ إلى ١٢ بيضة. قرعها يستمر نحو ٣ أسابيع تقود به الأثي دون الذكر الذي يؤمن لها الفداء.

## ١٥١٤٠ - شُرْبَتَا

Engelure (F). Chilblain (E).  
عاري صيب الأشجار في غلث فرصا من جراء الصقيع فيسبب اللحاء ويبس جفاه. وهو في الحيوان تصعب الأطراف ويبس أحصر.

## ١٥١٤١ - شُرْبَتَا

هو الجزء الأسفل من الاسم ينتهي عند الاست حيث يخرج البراز.

## ١٥١٤٢ - شُرْبَتَان ، شُرْبَتَان

هو الشُرْبَات ، الحلبا.

## ١٥١٤٣ - شُرْبَتَا كَلِيَات

هي الشُرْبَات سبط من الفصيلة الباذنجانية.

## ١٥١٤٤ - شُرْبَتَا

نبت تعرفني يطلق على كل ما له صلة بخرج الحيوان.

## ١٥١٤٥ - شُرْبَتَا

الفرج ، حسب التصريف القلبي الحديث ، هي أولاً الفرة المرفوعة بدرب ثباته والطريق القبي. وهي بالتالي دخل وبه الشغل ، كل مجموعة سمن في الفضاء. لذلك فهي مشابهة الاكحال والجحيم. أسفرها حصاً بقدر طولها بمئات الوب السنين الضوية.

## ١٥١٤٦ - شُرْبَتَا

ناب البير.

## ١٥١٤٧ - شُرْبَتَا

جينة حافية شجرة تدعى آسية مأكولة ، الحلبا.

## ١٥١٤٨ - شُرْبَتَا ، شُرْبَتَا

Cestreu, Galant (F). Night blooming Jasmine (E). Hammerstrach (D). Cestrene (I).

جس جنات ونجيرات برية وزراعية من سبط الشُرْبَاتيات وطبيعة الباذنجانيات. أنواعه نحو ٦٠ مظهرها من نباتات للناطق الحارة بعضها يزهر الأزرق ومنها أنواع كريمة الرائحة لا تخلف من الناصر الجمالية للقاءة. سوطها تدور من ١٠٠ إلى ٣٥٠ سم. أوراقها كالماء صافية. نسلها عابث الحفرة ، مائل الصفرة العليا ، خالط. أثمارها متوسطة القد ، مستطيلة الأتوب. ثمارها جزوية الشكل والحجم ، مختلفة الألوان.

الانثوية لونها إلى الزرقة البنفسجية يطولها ملح أصفر يتخلله ثوب من الوردي. أكاريزا غروبية الشكل، قطرها يراوح من ١٢ إلى ١٦ م.

## ١٥١٣٩ - شُرْبِين تَوْسُونِيَّة

Chamaecyparis lawsoniana, C. boursierii (S). Cypress de Lawson (F). Port Orford cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية ، كبيرة القد ، سريعة النمو، موطنها أمريكا الشمالية تملو نحو ٦٠ م. لحاء ساقها إلى الربة الحمر. بناتها موقفة لونها إلى الأخضر البحري الأسفل المالح. أثمارها الذكرية قرزية اللون بنفسجية التشيع. أثمارها الانثوية إلى الربة الوردية المالح. أكاريزا صغيرة القد ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م. زراعها شائعة ، يكثر استعمالها في صد الرياح.

## ١٥١٣٥ - شُرْبِين مَتَقِيَّة

Chamaecyparis thyoides, C. sphaeroides (S). Cypress faux-thuya (F). White cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية متوسطة القد ترطب في الأراضي المنخفضة. تملو نحو ٢٥ م. لحاء ساقها إلى الربة السمر. بناتها متعصبة. أوراقها دقيقة. أثمارها الذكرية بنفسجية اللون ، قرزية التشيع. أثمارها الانثوية لسنتية الأساس ، وردية المالح. أكاريزا سداسية الجراحات ، قطرها نحو ٦ م.

## ١٥١٣٦ - شُرْبِين نَسْكَ ، نَسْكَ

Chamaecyparis nutsensis, C. nootkatensis (S). Cypress de Nootka, Nootka (F). Nootka sound cypress, Yellow cedar (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، أجابية الشكل ، موطنها أمريكا الشمالية. ترطب في المالح الرطبة، تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوز السمر. بناتها متدلية الأطراف ، شبيهة أخضر الباهت ، عذمة المالح الغني. أكاريزا رباعية أو سداسية الجراحات ، قطرها يراوح من ٦ إلى ٨ م.

## ١٥١٣٧ - شُرْبِين هِينُوكِي

Chamaecyparis obtusa, C. breweriana (S). Cypress hinoki (F). Hinoki cypress (E).

نوع من الشربين وهو شجرة سروية كبيرة القد ، مردلية الشكل. موطنها أواسط ويتوب اليابان. تملو نحو ٤٠ م. لحاء ساقها إلى الجوز السمر، بناتها موقفة ، مزدوجة التصليف ، عذمة. أثمارها الذكرية بنفسجية اللون يطول تشيع وردي وأصفر. أثمارها الانثوية إلى الربة الخضراء تملو شعبة وردية ومابة زرقاء. أكاريزا غروبية الشكل ، قطرها يراوح من ٨ إلى ١٢ م.

## ١٥١٣٨ - شُرْبَتَا

Chourta (S). Chourta (E).

جنس طير من فصيلة الطيوريات ودية العاجيات. أنواعه المعروفة نحو ٦ أصنافا تمتد من الهند إلى جبال سيرية. تألف البراري والأحراج. قوتها الحبوب والبرور البرية وبعض الحشرات ويكثها وأغصانها الجندب وقتل إلى أجسامها ربة ، تطول من ٣٤ إلى ٢٨ م. رقبها متوسطة الحجم. اعتاقها قصيرة. سنايقها صغيرة. اجنتها لاسخة. أظفارها قصيرة ، مقطوعة الأطراف. أظفارها متباعدة الألوان ، جميعها مغطاة الزور والصدور. مظهرها الحياتي جاحي إلا في زمن التكاثر والحضانة أظفارها تعد من عشرة أزواج إلى خسين زويبا. أعراف أنواعها وأشهرها شُرْبَتَا حَمَلَا.



شُرْبَتَا حَمَلَا

## ١٥١٥٧ - شِرْشُوحَاتُ مُسْتَحَبَّةٌ \*

*Saurus fasciatus* (S). *Saure rayé*, Lambert (F).  
*Saurus fasciatus* (E).

سمكة من الشروشوح ، أخطابها مظهر أقاليم البحر الأبيض المتوسط . جسمها وشقي الشكل يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . قوتها إلى الرعدة الغضبية يهبط عند الظهر ويبرز عند البطن . جانباها مستحان يتخلل خطوط قاعية زرقاء اللون . زعنفتها الذيلية مفصلة بالازرق || رأسها مخروطي الشكل ، كبير القمم ، واسع الشدق الرحب . أسنانها كثيرة العدد ، ثلاثية الصفيح في الفكين . صيادها صيرتوان ، مستديرتان ، ماصتان . زعنفتها لينة متشابكة الأشكال والأحجام . الظهيرة الأولى شرابية . الظهيرة الثانية جعدة . الصدرية صغيرة . الحوضية كبيرة || لحمها جيد الصنف لكنه كثير الحسك اللينق .

## ١٥١٥٨ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Fillicinas* (F).  
*Fillicinas* (E).

شعبة من سمكوات الزهر الوعائية . فصائلها وأجناسها وأنواعها كثيرة العدد ، معظمها من سمكيات الإزنة الناضرة أعصها الحقية الديفولية || نباتاتها صلبة التركيب المحبلة منها المشوية واليانية والحشوية . جميعها مجهزة بزوائد وريقة تدعى مراحم .

## ١٥١٥٩ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Epigastre* (F) *Epigastrium* (E). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

الجزء الأوسط العلوي من البطن يمتد من السرة إلى القفس .

## ١٥١٦٠ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Cherains* (S). *Cherains* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

جنس سلاسل من فصيلة السحليات . أنواعه عديدة ، بعضها البلاد الحارة ، جميعها أرضية المسرح خاضعة . ذيلها شديد الاستعداد والصلابة لونه إلى السمر يعطو تدرج أصعب . طول أجسامها يراوح من ٢٠ إلى ٦٥ سم . بيئاتها الشوي يدوم نحو ١٠ أشهر .

## ١٥١٦١ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Rollier bleu* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

## ١٥١٦٢ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Fringilla* (S). *شِرْشُوحَاتُ* (E). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

جنس طير من فصيلة الشروشويات . أنواعه قليلة جميعها صفورية صغيرة القدر . منافعها غزوية جالسة . أجنحتها مستطيلة ذقنة . أذناها طويلة غائرة ، أرماعها دقيقة . وهي من المصانير الثريدة المأمونة الزقوة . قوتها الحشرات والبرور البرية . تكثر في الأجبار . ألتائها تبيض من ٤

## ١٥١٦٣ - شِرْشُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَكْسِمِينَ اللَّيْلِ

*Cestrum nocturnum* (S). *Cestrum nocturnum*, Gaifan de nuit, jasmín de nuit (F). *Night scented castrum*, *Night jasmín* (E). *Nachtsstrauch* (D). *Galante di notte* (I).

نوع من الشروشوحات يزهر للزينة ، يطول من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقه لاهلية عاقبة الخضار اللامع . أزهاره جميلة الشكل ، أبيضانية اللون ، عرقها دجوي يفرح في الليل ويغنى في النهار || وهو من النباتات السبروتية للمسرة التي تعيش وتزيد في جميع المواقع والأزربة .

## ١٥١٦٤ - شِرْشُوحَاتُ اللَّيْلِ ، يَكْسِمِينَ اللَّيْلِ

*Cestrinas* (F). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

سبط من فصيلة الباذنجانيات ، أشهر أجناسه الشروشوحات .

## ١٥١٦٥ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Dasypocetidae* (S). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

فصيلة حيوانات لبرية قاضية من مرتبة شحيحات الشورب وريقة القوام . أجناسها وأنواعها عديدة أجسامها مغطاة بالاشكال والأحجام . أذنانها حريضة . أذنانها جعاع أو لصار . قوتها متوسطة أو وريقة . فرائدها خشنة الورب والصوت || موطنها أمريكا الوسطى والجنوبية . جميعها درجة نثرة سلة الأديان والترويض . قوتها المواد النباتية || أحرف أنواعها وأشهرها الإغربي والباكاس والمار والباكاس والكرابي .

## ١٥١٦٦ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Cercidophyllum* (S). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

## ١٥١٦٧ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Cercidophyllaceae* (S). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

## ١٥١٦٨ - شِرْشُوحَاتُ \*

*Saurus* (S). *شِرْشُوحَاتُ* (E).

جنس أسماك بحرية من فصيلة السمكيات وريقة منسومات المئات || أنواعها المرفوعة سمة معظمها من أسماك بحار البلاد الاستوائية والحارة || أجسامها وشية الشكل ، مستطيلة . ألتائها مغطاة الألوان . السائد فيها الرعدة الرصاصية الغضبية المواج ، تسمر وتمبق في الظهر ويبرز في البطن || تتميز بأشدها الكبيرة وبزعانفها الذيلية الغائرة || لحمها جيد الصنف غير أنها كثيرة الحسك اللينق || أشهر أنواعها الثروسة المستحبة .



شروشوح مستحبة



شريس

الى . يضاف تحفظها بتأدية الذكور || أشهر ازواجه  
الشرشور الفائع والجبلي والافريقي .

١٥١٦٧ - شُرُوطُ جَبَلِي  
Pinson d'Ardennes, Pinson de montagne (F). Brambling, Mountain finch (E).  
يرف بالانغاري ، اطلبه .

١٥١٦٨ - شُرُوطُ شَكْبَع \*  
Fringilla coelebs (S).  
Pinsons communs (F). Chaffinch (E). Buchink (D).  
نوع من الشرشور طوله من ١٦ الى ١٧ سم . جميعه  
سواء الرئيش . راسه وقنقه ويمتد الى الزينة الربادية الموج .  
ظهره اسمر اللون تلوين مابة زيتية . زيمك الى الخضرة .  
مستطاد بلون ظهره يمتد فيها خطان عاجيين . صدره الى  
الجلوة الغمرية ، يك يتصرف الى الصبغة ويتهي بالايض .  
الاني اسمر قدام من الادر واجهت ثوباً .

١٥١٦٩ - شُرُوطُ رِيَات  
Fringillidae (S). Fringillidae (E).  
نميلة طير من الجوائم المحرطيات المتانتير . منها الشرشور  
والسحون والتمار والكتنار .

١٥١٧٠ - شُرُوطِي  
Sercalis (F).  
هو الخلد ، اطله .

١٥١٧١ - شُرُوطِي شَقَوِي  
Sercalis d'iver (F).  
هو الخلد اششوي من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٢ - شُرُوطِي صَيَّيْ  
Sercalis d'été (F).  
هو الخلد اصصين من طيور الماء ، اطله .

١٥١٧٣ - شُرُوص  
هو الصديق ، اطله . ج حراس وحرصه .

١٥١٧٤ - شُرُوصُوف (F). Impardable à la lumière (F).  
هو ما كان لا ينفله النور . راجع شان .

١٥١٧٥ - شُرُوط  
Clause  
هو كل نص خاص يرتبط عملاً قانونياً .

١٥١٧٦ - شُرُوط ، شُرُوطَة  
Condition  
هو تمليق انقضاء عقد قانوني على حدوث حدث في المستقبل  
مشكوك في حدوثه . وقد يكون الشرط :

شرط احتمالي ، محصل  
Condition casuelle (F).  
Casual C. (E).

شرط اداري  
Condition processative (F).  
Protector C. (E).

شرط توقفي ، ملحق  
Condition suspensive (F).  
Suspensive C. (E).

شرط فاسخ  
Condition résolutoire (F).  
Abrogating C. (E).

شرط محظور ، غير جائز  
Condition illcita (F).  
Illicit C. (E).

شرط غفقي  
Condition défallite (F).  
Falling C. (E).

شرط مستحيل  
Condition impossible (F).  
Impossible C. (E).

شرط رافث ، منافي للاخلاق  
Condition immorale (F).  
Immoral C. (E).

## ١٥١٧٧ - شُرُوطُ إِسْتَادِ الْاِخْتِمَاعِي

Clause attributive de Jurisdiction (F). Attributive clause of Jurisdiction (E).

شرط اتناقي يقتضي بطرح المنازعة التي قد تلتصا من العقد  
على محكمة معينة .

## ١٥١٧٨ - شُرُوطُ الْاِخْتِمَاعِ وَ مُتَوَلَّطَة

Compromis (F). Compromis, Mutual agreement (E).

المشايعة هي اتفاق يبرمه كتاباً من بياض يذم نزاع ،  
هل ان يتمكنوا في فصله خصماً يتأمرن عليه ينص حكماً .  
ويختار للمطالبة حكماً من عقود التراضي وهو لا يصح الا  
من له اهلية الاداء المطلقة .

## ١٥١٧٩ - شُرُوطُ الْأَمْرِ ، شُرُوطُ الْأَمْنِ

Clause à ordre (F).

هو شرط يقتضي حتماً نص صيغة « لأمر ولأذن » وبذلك  
يمكن تحويل الدين بالتظهير . اما صيغة التظهير فهي :  
« ادفعوا لأمر فلان ... »

## ١٥١٨٠ - شُرُوطُ التَّخْفِيلِ

Pacte de préférence (F). Preference clause (E).

اتفاق يلتزم المرء بمقتضاه اذا احتزم تحرير عقد معين  
ان يفضل الموجود به بنفس الشروط التي يبرمها الغير .

## ١٥١٨١ - شُرُوطُ الْغَضَبَانِ

Clause de crocree (F). Garantie clause (E).

شرط يلزم الكفيل او الوكيل على دفع ثمن المشتري الى  
البائع اذا تأخر الشاري من ذلك .

## ١٥١٨٢ - شُرُوطُ الْحِرَاقَةِ

Clause de sauvegarde (F). Safe-guard clause (E).

شرط يربط الى وهد الالتزامات المالية بعضها بعض  
فيصح تنفيذ بعضها سلفاً على تنبيه البعض الآخر .

## ١٥١٨٣ - شُرُوطُ تَهْدِي يَدِي

Clause comminatoire (F). Comminatory clause (E).

شرط خاص يدرج في عقد المتبرع يتم اقيام بعمل معين  
ما ويمنع على اقتطاع مقدار معين فبا اذا امتنع المتبرع  
له من اقيام بالعمل المطلوب .

## ١٥١٨٤ - شُرُوطُ جَزَائِي ، شُرُوطُ الْعِقَابِ

Clause pénale, Pénalité (F). Penal clause, Penalty (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على تقديم مبلغ جزائي  
للمتبرع الذي يجب على المدين اذا لم ينفذ او اذا امر  
تنفيذ التزامه .

## ١٥١٨٥ - شُرُوطُ حِفْظِ الْأَمَدِ ، شُرُوطُ عَشْبَتِي مِي

راجع اشتراط حصة الامد .

## ١٥١٨٦ - شُرُوطُ وَقْفِ الْمَسْئُوتَةِ

Clause de non-responsabilité (F). No responsibility clause (E).

شرط يعلق المتعاقدون بمقتضاه على من المسؤولية من المدين  
اذا تأخر في تنفيذ التزامه . وهو من الشرط المحظورة  
في عقد النقل .

## ١٥١٨٧ - شُرُوطُ غُلُقِ الرِّهْنِ

Pacte commissaire (F). Binding on pain of clause (E).

هو اتفاق في التمديد للمدة الطرفين ينص فيه على انه في  
حالة عدم تنفيذ أحد الطرفين الالتزام الذي انشده عليه  
العقد فسخ العقد بقدر القانون دون ان ترتفع بشأنه دعوى



شرشور فائع

## ١٥١٩٦ - شُرعية أنيكة، بيئرية أنيكة

*Baeria gracilis* (S). *Baeria graciosa* (F).  
نوع من الشريعة عشبية زينة حولية . ساقها فراء تملو .  
١٥ سم إلى ٣٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .  
روسياتها الزهرية عديدة للسينات أيضا إلى الاسفر  
الجميل || تنورها يستمر طوال فصل الصيف .

## ١٥١٩٧ - شُرعية مدّنية، بيئرية مدّنية

*Baeria chrysotoma* (S). *Baeria dorae* (F).  
نوع من الشريعة عشبية زينة حولية . ساقها فراء  
تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها كاملة سنانية التصل .  
روسياتها الزهرية عديدة للسينات الكبيرة المستطيلة ، أيضا  
إلى الصغار اللهب || تنورها يستمر طوال فصل  
الصيف .

## ١٥١٩٨ - شُرطين

الشُرطين منزل من منازل القمر الشامية ينزل القمر في  
الليلة الأولى . ويقال لها قرنا الحبل والنطح . وها مترضان  
من التلال إلى الجنوب . وإلى جانب التلال منها كوكب  
صغير || ولب الشُرطين يسمى الثفر .

١٥١٩٩ - شُرغال ، شُرغان  
قناة ظلمة للتخل وما أشبه . وهو الكانور .

١٥٢٠٠ - شُرعطط  
*Phellandrium* (S).  
*Phellandria* (F).

جنس نباتات عشبية برية معمرة من فصيلة الخبيات .  
أنواعها قليلة البلد منها المناطق المتدلة ، جميعها ترهب  
في الموانئ البرية . أوراقها متعاقبة مركبة قريبة البنية من  
الشوكرا || أعرف أنواعها وأشهرها بالشُرطط المتقي .

## ١٥٢٠١ - شُرعطط متقي، شُرط الماء

*Phellandrium aquaticum*, *Enanthe phellandrium*  
(S). *Phellandria aquatica*, *Fenouil d'eau* (F). *Water*  
*drop-wort*, *Water hemlock* (E). *Wasser Pilsendal*,  
*Wasser Piersast* (D). *Falandrio*, *Finochio*  
*acquatico* (I).

نوع من الشُرطط وهو نبات عشبي بري مصر يكثر في  
المنطق والأراضي الرطبة . يعتبر من النباتات السامة التي  
تؤذي للماشية || استنبط أضراره الطبية بالماء فيله الربو  
ويستخرج من بزور مادة قوية جسمية لها استعمالها  
الطبي .

١٥٢٠٢ - شُرغف  
*Etèter* (F). *To pollard* (E).  
شُرغف القصب : قطع رأسه الثاني . والشُرغف : قطع  
الرؤوس الثانية في النبات .

١٥٢٠٣ - شُرغفة  
*Démagogie* (F).  
*Demagogy* (E).  
الشُرغفة حالة اجتياحية تسود فيها فوضى آراء الذين يدعون  
مناصرة الجماهير أو الشعب .

١٥٢٠٤ - شُرغفي  
*Démagogique* (F).  
*Demagogic* (E).

نعت شُرغفي يطلق على كل ما من شأنه تحريض أهواء  
الجماهير وشهواتها الانطاظية .

١٥٢٠٥ - شُرغيف  
*Démagogisme* (F).  
*Demagogism* (E).

الشُرغيف حلب الذين يثرون بالشُرغفة .

النفع . وهو أيضا اتفاق يبيع به أراضين العرب الحائر  
الربح ، الاستيلاء على الرمن في ساحة عدم ظلم الدين عند  
حلول أجل هذا الشرط محذور قانونيا .

١٥١٨٨ - شُرط مألوف  
*Clause de style* (E).  
*Style clause* (E).

هو من الشروط التي كدرج في جميع العقود للتشابهة  
بطبيعتها : مثال ذلك ما يرد في عقود الإيجار بأن المستاجر  
قد ملأ الأرض المؤجرة مائة تنني دعوى الجهالة شرعا .

## ١٥١٨٩ - شُرط معدّل، شُرط مخالف

*Clause derogatoire* (F). *Derogatory clause* (E).  
هو كل نص يدخل بمقتضا تعديل على الاتفاق المقيد  
أو يصرح به عنه .

## ١٥١٩٠ - شُرط مكسّمة للتفوّع له

*Pacta de quota litis* (F). *Quota litis clause* (E).  
شرط يتفق بين الخصم والمتقاضى على أن التآب التقضية  
تكون جزءا من كسبه وهو محذور في اللوائح المهنية .

١٥١٩١ - شُرعية  
*Shortia* (S).  
*Shortia* (F). *Shortia* (E).

جنس نباتات عشبية ركوبية معمرة من فصيلة القرنيات  
الفرارية معقودة التبريد على اسم العلامة وشُرطه . وكبها  
مستطيلة . أوراقها جلدية اللتلاب مستديرة الشكل أو  
كلوية ، جلدية التصل . أزهارها ملونة خالصة البتلات  
والاسدية الخسبة ، خالصة الاسدية المعقبة . أنواعها  
المرودة قليلة أشهرها التالية :

## ١٥١٩٢ - شُرعية كبيرة الأزهر

*Shortia grandiflora* (S).  
*Shortia à grandes fleurs* (F).

نوع من الشريعة الزينية . مهدا بعض مناطق أمريكا  
التيالية . أوراقها كبيرة القد ، شبه مستديرة الشكل ،  
قلبية التاعدة ، مسنة الحار . أزهارها بيضاء اللون ،  
خالصة العرف . قطرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من  
أيار إلى حزيران .

## ١٥١٩٣ - شُرعية وحيدة الأزهر

*Shortia uniflora* (S). *Shortia uniflora* (F).

نوع من الشريعة الزينية . مهدا اليابان . أوراقها كبيرة ،  
كلوية الشكل ، مسنة الحار المفرحس . زهرتها وحيدة ،  
وردية اللون ، خالصة العرف . قطرها نحو ٥ سم . ||  
تنورها يستمر نحو أربعة أسابيع ابتداء من أواخر نيسان .

## ١٥١٩٤ - شُرعية، بيئرية

*Baeria* (S). *Baeria* (F).  
جنس نباتات برية وزينية من فصيلة المركبات . أنواعها  
عديدة معظمها أمريكي المهد . ساقها فراء . أوراقها  
متعاقبة . أزهارها وركوبية التجميع ، قناباتها عديدة الفصل  
فردية الصف . تخنن غبروية الشكل . بزورها مجنسة  
مستطيلة قليلة العرض || أعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع .

## ١٥١٩٥ - شُرعية إكليلية، بيئرية إكليلية

*Baeria coronaria* (S). *Baeria coronaria* (F).

نوع من الشريعة الزينية المحلية القليلة العرف المستحب .  
ساقها زباد البشرة فراء تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أوراقها  
مفرسة غليظة التشرح . روسياتها الزهرية كبيرة التقد  
عديدة للسينات المتوسطة الطول لونها إلى البرتقال . بزورها  
مجنسة كبيرة الحسك || تنورها يستمر طوال فصل  
الصيف .



شريعة كبيرة الزهر



شُرطط متقي



كروية الشكل قدرها يراوح من حجم البنتلة الى الجوزة الصغيرة || اشهر انواعها وامرئها الشرفوف الاخضر .

*Hyla arborea* (S). شَرْهَوْبُ أُخْفَرٍ - ١٥٧١٣  
*Rhinophrynus dorsalis* (F). Green Tree-frog (E).

[illegible]

Hylidae (S). قُمُ خُفَّات - ١٥٢١

Hyllidae (F), Hyllidae (E).  
 منهم من ساما فداوح الشعر. فصيلة حيوانات من  
 القبيات ومربية الفريسات وربة التراب. انبعاث الحرة  
 نحو ٢٠٠ مشقة في سطح اقلار الماء. جميع انواعها  
 صغيرة القد، ودودة، تحمل الاطراف في مجرى السلي.  
 السحبية صفة، من طيلة الانواع في مجرى السلي.  
 تنحسب من طيلة السطح المائية. قلها الانواع  
 ضامة الاصلاح. ان التور العلي الذي يقرقر  
 العجز وقلها، وتجاو زما من القيد والفساد في التمدد  
 انحر استقامته الشريف والقيوم والمياة.

10210-22، 22

الشرف : ثبت آخر تصحيح به الثياب (ابن الاعرابي) .

۱۵۷۱۶ - ق. ۳، ج. ۱، ص. ۱۰۷، شریفیه

**Chionodoxa** (S). Chionodoxe, Gloire des neiges (F).  
Glory of the snow (E). Schneestolz (D). Gloria di  
neve (I).

جنس نباتات درفصية من فصيلة الزنبقيات أنواعه المروفة ٨ م هما الشرق الأدنى، ترطب في المناطق المعتدلة المنتشرة نحو الباردة . جيهما صغيرة القد قتل من ١٠ الى ٢٥ سم . وهي قريبة الشيء من الاشخيل . انجازها الجنوبية الشكل بظلتها ستعده الزمان الاول والثاني طليقة الثالث والرابع . اسديتها ووردي الشكل . لونها حميدة الالوان الازرق والوردي والبغسج .

١٥٢١٧- قسّمی، صکّر الذّال، ترمذی

*Falco chloquera* (S). Faucon chloquera (F). Falcon cherrug (E).

طائر من فصيلة العقربيات طوله نحو ١٠ سم. وبسطه ١٠٠ سم. وهو أجل الصقور ثوباً وأحسنها توشيحاً وإلحاحاً تنبيراً ولحمها موابجاً وأمرها اقتيلاً وأنتياداً. يسكنه فصح الأرياء بمنتهى إلى الشرق الأدنى وأفرقية الشرق والغربية. يألف السمران ويصعد من الفجر المبرش.

**Tordylium (S). Tordyle (F). شرغوب ١٥٢٠٦**  
 جنس نباتات عشبية برية حولية وعوالة من فصيلة  
 النجميات. أنواعه الممرية خشية أو أرواقها متشابكة، ممتعة،  
 لائحة الاذنين، كثيرة التفريش. أنحارها صلبة اللد،  
 بيضاء اللون || أشهر أنواعه الشرغوب الحزني والشرغوب  
 الحقل.

١٠٢٠٧ - شُغُب حَقْل، 'فِي الْحَقْل'

*Tordylium suaveolens* (S). *Tordyle suave* (F). *Hodgsonia* (E). *Zirnes* (D). *Tordillo* (I).

لوع من الشرعوب الحوفي البري يكثر في الحقل المزروعة.  
أوراقه وأزهاره مسحة العرف المنمش. أزهاره بيضاء  
اللون. جلوره طيبة يقال أنها تقلد الصرع وتسمى لوجاع  
الرأس.

٨٠٢-١٠ - قُرْبُ كُنُوزِي \* ، مَكْمَلِي ،

سَنَسْتَنَسِرُ ، نَكْفُرُ الشَّعَالَ

*Tordylium officinale* (S). Tordyle officinal, Séséli de Crète (F). Small hertwort (E). Kretischer Sesel (D). Tordilio, Seseli di Creta (I).

نوع من الشرعوب البري المحل. اوراقه معنقة ، متعاقبة .  
نصلها كثير التفريخ والتشريح . انظاره الى الياس  
الوردي || ينبت في الارربة القلينة المتوسطة الانساج  
والرطوة . جطوه طيبة تفيد الصرع وذاك النحلة .

Juridique (F). ١٥٢٠٩ - د.ع.، قفالي

امست تم بدو بطاقتہ ما۔ ما کان مطابقاً لقطعیات الشہ ع .

[illegible]

١٥٢١ - قس ، قس ، قس  
Titled (E) Titled (E)

هو صير الصفادع . وقد يطلق ، تمييزاً ، حل الصفادع في دورها البلورتي القائم بين نقت البعبل وكال الشكل النهائي .

Chirogalus (S). ١٥٢١١ - طبرستان

Chirogale (F). Chirogalus (E).

جنس سرولات كبيرة من البوميات أنشده المرحوم  
خـد مطبها جزيرة مدفسكـه || تألف الثمانيات والأصـاحـجـ  
ملبها الرشيقة باجمي || جامعات قليلة العدد || اجسامها  
وزيرة، والحيات صغيرة، تطول من ٢٠ إلى ٣٠ سم.  
بما فيه الإناث البالغة التي يراوح طولها من ١٥ إلى ١٥ سم.  
رؤوسها يرمية الشكل، أعينها صغيرة مستديرة كاسية  
ميتية باهية مستديرة ناشرة، أنفها جراحين قزحيين كاسية  
المايفة والدمرة الحطية || قوتها الثمار والحبوب والبقول  
والفصل والصغار والخزرات الكبيرة. بيئاتها  
شبهتكن في غيبوبة قامة يستمر من ١٠٠ إلى ١١٠  
أيام.

Hyla (S). ١٥٢١٧ - شُرْعُوف

*Rainetta* (F), Tree-frog (E).

جنس مفادع من فصيلة الشرغيفيات أنثاه المصورة  
ص ١٢٢ منشرة في مجلة أقطار العالم القديم ،  
اليابان الى اطراف ادمية وأفريقية الثالية باستثناء الحثا  
و ادمية الثالية ) اجسامها صغيرة القبة الطول من ٣  
٧ سم. ايوها الى اغصان الخواصث الحاصلات وزادها  
تميش منظم صباها الى قنور غور مشر سنات في البر  
تعلو الاشجار وتقم عليها ) ذكروها بجودة بلغة صينية



شرع و حق



شرعوب مخزني



شرح حال



شرعوف أغسطس



شرکت



شرق

## ١٥٢٢٧ - شَرَم قَلْبِي الْوَرَك

*Carpinus cordata* (S). Charme à feuilles en cœur (F). نوع من الشرم مهدد اليابان . جمرته سرقية تجرد في جميع المواقع والأماكن . تملو من ١٢ إلى ١٨ م . أوراقها تقبل نحو ٨ سم . نصلها ينحني الشكل ، قلبية الشكل ، مدبب الطرف . غشبا جامد الرقعة ، شديد الصلابة ، شائع الاستعمال الصناعي .

## ١٥٢٢٨ - شَرَم كَرُولِيَّة

*Carpinus americana* (S). Charme de la Carolines (F). نوع من الشرم جبل الشكل . مهدد البلاد الأمريكية . يملو من ٦ إلى ١٠ أمتار . يتميز ببراعم الغلظة القصيرة . أوراقه تحمر في أواخر الصيف وتبقى على أحمرها حتى الإحلال الذي يتم في أواخر الخريف || يعتبر من الأنواع الجالبة التي لا تجرد في أي موقع كان .

١٥٢٢٩ - شَرَم . *Fendou* (F). Clef, Split (E). صفة ما كان مشقوق أو مفكوك أو مصعد .

١٥٢٣٠ - شَرَكَل ، عَصَكَة . *Pampe* (F). Bâge (E). ورقة الحنطة والشعير وسطم النباتات الجنبية .

## ١٥٢٣١ - شَرَكَب ، شَبْرَم ، بِوَرَم وَبَع

*Euphorbia pithyusa*, *Tithymalus cutifolius* (S). *Euphorbia pithyusa* (F). Wild pesty spurge (E). Tanfeilmich (D). *Pituisa*, *Scabram* (I).

نوع من الثريبيون وهو نبات عشبي بري مسمر ينكسر في الأتربة الرملية الرطبة . لا شأن له في الزراعة إلا أنه من النباتات السامة الشديدة الضرر . كان يستعمل في الماضي البعيد كسول جارف . وقد جاء من ابن البطار قوله : « وقد قتل به الجبال الطوائف خلقت من الناس » . عشته فرحاً تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . ساقه لينة انضغاطاً . أوراقه متقابلة ، سنائية الشكل ، نصلها يطول نحو ١٠ سم . وهو وحيد الفلج ، عادم المرقق والشرايين ، لونه إلى الأخضر الداكن . انزهاره سنبل التجميع تاجي الارتكاز ، إزهاره صغيرة لثقة زرقاء اللون || ساقه ووروه ممتدة لثقة تستعمل في صناعة السلال .

١٥٢٣٢ - شَرَكَبِيَّات \* *Andraceae* (S). *Andraceae* (F). فصيلة من الطحالب تنتمي إلى رتبة السفانات .

١٥٢٣٣ - شَرَكِي . *Falcinellus* (S). *Falcinelle* (F). *Falcinellus* (E).

جنس طير من طوائف الساق وفضيلة التنظليات . أنوعه المعروفة أربعة ، ثلاثة منها أمريكية الموطن وواحد مهدد العالم القديم || أجسامها كبيرة . أعتاقها وسوطها مستطيلة . مناقبها مقوية . أوتابها مختلفة الألوان السبعاء المواج || جميعها من القواطع . تألف الحياة الجماعية . مريباً عنه الرحيل لا يقل من ألف زوج . تسير سطوط متناوبة متتابعة لا تتصرف إلا أنه المبروط حيث تأخذ شكل الأقواس المتتالية || قوتها التهديدان والخبرات المائية والفتريات اعرفت أنوعه وأشهرها الشرقي البهي .

١٥٢٣٤ - شَرَكِي بَهِيمِي \* *Falcinellus igneus* (S). *Falcinelle éclatant* (F).

طائر من الشرقي أطلق عليه العالم ريفون ، ليا مضي ، اسم كروان إيطاليا (Courais d'Italie) . أعضانه تشمل بعض المنطق الاسيوية والشرقي الأوسط وداوية الجنوبية الشرقية

يصيد القوامس والصائير . يذئن في أصالي الأشجار البلسنة . أعتاقه تسبع أربع وظائف تحضنها وحلها .

١٥٢١٨ - شَرَقَرَق *Rollier* هو الشرناق ، الحلب .

١٥٢١٩ - شَرَكَة *Société, Compagnie* (F). *Society, Company* (E).

مقد بين شخصين أو أكثر يتفقون به على أن يقدم كل منهم شيئاً للسل به واتساقاً بأرباحه .

١٥٢٢٠ - شَرَكَة إِرْتِقَابِيَّة *Tontine* شركة يؤلفها أشخاص متقاربين في السن عادة يقدمون فيها رؤوس أموال ويشترطون توزيعها على الأحياء منهم بعد زمن معين .

١٥٢٢١ - شَرَكَة أَلْبَان *Fruitière* (F). *Fruiterer* (E). شركة أو جمعية تعاونية تجمع الحليب وتستهه .

١٥٢٢٢ - شَرَكَة مَخَامَة *Société en participation* (F). *Profit-sharing society* (E).

شركة تجارية مسترة وجوبا فعملها أن يتفق اثنان أو أكثر على أن يقتسبا بنسبة معلومة ما تنتجها بعض الأعمال التجارية التي يقوم بها أحد أو بعض الشركاء أو ما يدره استغلال تجاري تمتد للأجل يقدم به الشركاء جميعاً بهمهم .

## ١٥٢٢٣ - شَرَم ، عَرَبِيَّيْن ، لَبْرَبَة

*Carpinus* (S). *Charme* (F). *Horn beach*, *Yoke elm*, *Hornbeam* (E). *Hagebuche*, *Hainbuche*, *Hornbaum* (D). *Carpine*, *Carpene* (I).

جنس أشجار حرجية من فصيلة البتوليات رطب في الأراضي الرطبة . أغصانها صلبة صلبة الكسر تستعمل في صناعات عديدة أغصانها الأنيار لها أشبه || سوطها متضخمة قفروها ملي . أوراقها نافذة ، متعالية ، متقنة . أنوعها وحيدة المسكن . شاربها الكبرية تأخر من حرارتها الاثوية أكثر من أسبوع || أشهر أنوعه الخمسة التالية .

١٥٢٢٤ - شَرَم الشَّرَقِي *Carpinus orientalis* (S). *Charme d'Orient* (F).

نوع من الشرم مهدد الشرق الأوسط . جمرته صغيرة لثقة تملو من ٦ إلى ٧ أمتار . ساقها متراكبة الإصقان ، معزلة اللحاء . أوراقها صغيرة لثقة . نصلها قلبية الشكل ، مسن الحافة || غشبا شديد الصلابة ، حنلي اللون .

١٥٢٢٥ - شَرَم أَلْبَان *Carpinus japonica* (S). *Charme du Japon* (F).

نوع من الشرم مهدد اليابان . جمرته شبه هرمية الشكل تملو من ١٠ إلى ١٥ م . أوراقها تقبل نحو ١٢ سم . نصلها مستدير المنحرفة ، ذات الطرف متباعد التسنين . متصمغ الصلابة || يعتبر من الأنواع الجادة التي تتطلب بعض الموانع الخاصة .

١٥٢٢٦ - شَرَم بِتُولِي ، شَرَم مَبْدُول *Carpinus betulus* (S). *Charme commun*, *Charnille* (F).

نوع من الشرم السبروتي الحربي الشكل ، يملو من ٦ إلى ١٨ م . أوراقه مجعدة التصل ، مسنة الحافة ، صفحتها تقبل نحو ١٠ سم . وتعرض نحو ٥ م حرقها متناوية الانتساب جدها يراوح من ٧ إلى ١٥ زويماً .



شَرَم



شَرَب



شَرَكِي بَهِيمِي

## ١٥٢٤١ - شَرَفَت \* ، غُلُوطُون ، غُلُوطُون

Gulo luscus (S). Glouton, Goulu, Carcajou (F). Glouton, Wolverine (E).



شَرَفَت حمراء

حيوانٌ وسيد الجنس والنوع من السُروحيات اللوامس . جسمه مستطيل الشكل طويلاً الكامل يراوح من ١١٠ الى ١٣٠ سم . رأسه كبير . لثته غروبي الشكل . أذناه مستديرتان . قوائمها قصيرة ، خالصة البرازيل الخلد . ذنبه جتل الصوف . بطول من ٣٠ الى ٤٠ سم . فروه لينة ناعمة لونها الى الصبغة الخفيفة اللامعة الموحج . موطنه البلاد الشمالية الاسيوية والامريكية . انتاده تقع اربعة جيرة تربتها نحو الحبل .

## ١٥٢٤٢ - شَرَهَائِيَّات \* Acrasiae (S).

Acrasidae (F). Acrasinae (E).

فصيلة من القنطور الخاطئة . اجناسها وانواعها عديدة تعيش على بعض المواد القلبية اغصنها خيرة كبيرة الرطبة وبراز الحيوانات العاشية كبروت الدواب وضلع البقر || جهازها البشري منطوف بمادة حلالية يخلط فيها الشكل والحلم واللين مع اختلاف الاجناس .

## ١٥٢٤٣ - شَرَهَائِيَّات \* Melandrya (S).

Melandryidae (F). Melandrya (E).

جنس حشرات من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة انواعها المبروة عشرة منتشرة في معظم سراج السويليات في العالم || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتدلة القليط ، بطول من ١٠ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة ، مستعرة ، قليلة التشويز . حيثها بارزة . كثرها معتدلة الجرم . ملاسها الفكية كبيرة . قرونها الاستشارية قلبية ، كاسلها محبة مقلية . بطيها مستطيلة ، مدنية المؤصر . اتحادها ملتحف كامل كليل باستثناء الطرف للملعب . قوائمها نشيطة . اواطها وسيدة اللون منها البانجاني والازرق الاسود المالحج والجوزي والاسود الاصفر والعتاني || تألف الجذور النشرة من مختلف انواع السويليات . سرعها دجوي . طرائها سريع الحركة . قوتها اوراق النبات والمواد النباتية المنطلة . يرقاتها فائجة ومباردة .

## ١٥٢٤٤ - شَرَهَائِيَّات \* Melandryidae (S).

Melandryidae (F). Melandryidae (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة . اجناسها وانواعها المبروة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها معتدلة الجرم ، يتكرر لها الشكل المستطيل . اطولها تراوح من ٤ الى ١٦ مم . وروصها صفيرة . حيثها بارزة . ملاسها الفكية كبيرة ، مدنية . قرونها الاستشارية غليظة او صولجانية او قلبية او لينة . فصلها ١٠ او ١١ . كاسلها مستعرة . اتحادها لائحة . قوائمها نشيطة . اساقها رباعية العقل في الزوج الخلفي ، خاسيتها في الزوجين الاباسي والاسط . اواطها ملية || جميعها غاشلة ودائمة تعيش على مختلف انواع النبات وعلى الاشعاب النشرة والقنطور وتحت اللحاء . يرقاتها غاشية او فائجة او شكاركة || اشهر اجناسها الشرعوية والدراسة والسماقة .

## ١٥٢٤٥ - شَرَهَائِيَّات \* Leptosperma (F).

جنس الجمار ويصين من الشرفيات وفصيلة الاسيات . انواعها عديدة ، نحو ٣٠ . اوارها صيرة متعاقبة سطرية . ازهارها فردية تتسبح بحورية الاوتكار . غارها كمبورية كثيرة البزور النقيطة || اوارها وانواعها غليظة تستعمل في عدة علاجات مقوية .

وافريقية الشمالية || جسمه كبير اقل بطول نحو ٧٠ سم . لويه الى الصبغة الورداء السغماء اللواح . رأسه عايق اللون . ظهوره وبتاساه غبر الموحج . عتقه ويصينه ويقله الى الصمرة الخطيئة . مقادفه وسطقة عنه الى الصمرة الكستنية . رجلاه الى اغصان البصري المايق || تألف المنطق والاشعاب والاهوار وضلعان مجاري المياه القليلة الانسياب . قوتها البندان والغشرات المائية واللباطيح ولقشريات || يفتن الى الانجار والشجيرات اللامالية على ارتفاع متر او اقل من سطح الماء . عتله مجموعة من البندان والقضبان والجذور والقش . انتاده تنقسم من ٢ الى ٤ يضمان لونها الى الغصان الازرق المادم القويش تحضنها وحدها نحو ٣ اسابيع .

## ١٥٢٤٥ - شَرَفَت Effaner, Effaumer (F).

To strip of leaves (E).

فقط رؤوس الصف .

## ١٥٢٤٦ - شَرَفَت Efficage (F). Stripping (E).

اعتطاع رؤوس صف الزرع عتله افراط النوبة يتم ذلك قبل الاسبال .

## ١٥٢٤٧ - شَرَفَت Cocon

في الصلابة ، الطليبا . ج شرائق .

## ١٥٢٤٨ - شَرَفَت هو الشرخ ، اطليه .

## ١٥٢٤٩ - شَرَهَائِيَّات \* Pyrochroa coccinea (S). Pyrochre rouge (F).

حشرة وائمة غاشلة دائمة والجمية من فصيلة الشرفيات ورتبة غديات الاجنحة . تألف الاجراج والبراري . غاشفها تميش على بنبات الانجار وعلى اوراق النبات . يرقاتها في اول عهدا تميش على المواد النباتية والغشوية ثم على ما تقتضيه من اساريع الحشرات الخاطئة || جسمها متوسط اقل بطول من ١٢ الى ١٥ مم . نوحها احمر الكفان اسود الرأس والبراز . رأسها مستدير الجرم . قوائمها سليمانية . زباناتها مستطيلة ، مشطيان عتله الذكر ، مشطيان عتله الانثى . حيثها بارزتان . ظهرها مستدير الطرف الاصح ، كليل الحمل ، عادم التحزيز || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانة في نيسان . يتبقى حتى تموز . تسرح في التبار . لسافه في ايار . تنجح الممكن ميحاديها تحت مله الانجار وقشورها || البرقة عتله بطولها الكلال الميسوري بطول نحو ٣٤ مم . جسمها مستطيل الشكل مبطل الجرم ، الحبر اللون ، مستطيل الرأس البني ، ضلعان التآكيد الفكية ، سداسي الرواجب . السسر || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما ينقضي في آخر سرداب دخله البرقة .

## ١٥٢٤٠ - شَرَهَائِيَّات \* Pyrochroidae (S).

Pyrochroidae (F). Pyrochroidae (E).

فصيلة حشرات وائمة وقائمة من رتبة غديات الاجنحة || اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف الخيوس والنباتات التريينية وازهار النباتات الطموعة والزراعية || جميعها صيرة لينة مبطة الاجسام المستعرة المؤصر . زباناتها مركبة من ١١ لصلة وفي مشطية الشكل عتله الاكوار ، منشارية الشكل عتله الاثا . اساقها خالصة العقل باستثناء الزوج الخلفي عتله رباعية || يرقاتها مبطة الجسم تميش تحت غلاء الانجار وقشورها الصلابة صاية وراء يرقات الحشرات غاشية لقتضاء عليها || اشهر اجناسها الشرعوية .



شَرَفَت



شَرَفَت



شَرَفَت

**1٥٢٥٥ - شَرَوْنَةُ فِصْبِيَّة** *Senecio argenteus* (S).*Sénéceon argenté* (F).

نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها سمكة التصل المفصص والمسنن، خلية البشرة، فضية اللون. أزهارها الى الصفرة الباهتة. ازهارها يستمر من آب الى الجلول.

**1٥٢٥٦ - شَرَوْنَةُ مَدْبِيَّة** *Senecio doria* (S).*Sénéceon Doria, Herbe dorée* (F).

نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. أوراقها اطيالية الشكل، لمبة التصل، بحرية اللون، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٠ أزهارها متوسطة القد، فائقة البلق، لونها الى الصفار المذهب. ازهارها يستمر من تموز الى آب.

**1٥٢٥٧ - شَرَوْنَةُ نَارِيَّة** *Senecio flammeus* (S).*Sénéceon rouge-feu* (F).

نوع من الشروة وهي عشبة سريرية معمرة تملو نحو ٦٠ سم. أوراقها الجلمية مسطحة المتق، سنانية التصل للسنة المخلقة. أوراقها السفلى فضية الاصل، وبضبة الشكل، عادمة التسنين. ازهارها ناروية اللون، حراء للمرج، حلقية التجميع. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

**1٥٢٥٨ - شَرَوْنِيَّات** *Sénécioides* (F).

سبط من فصيلة المركبات نباتاته عدة مئات مختلفة الاشكال والاحجام. اشهرها الشروة.

**1٥٢٥٩ - شَرِيَاخ** *Truffe gâtée* (F).*Tainted truffle* (F).

الكبأة الفاسدة التي قد استرخت (كلسان).

**1٥٢٦٠ - شَرِيَاط ٥٥** *Cepola* (S). *Cépole* (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة المنجيبات. انزاعة المرفوعة قليلة، اسطاتها المتوسطة وبحار البلاد الحارة. اجسامها سوية الشكل حراء اللون. رؤوسها غليظة مقطوعة الاضطام. زعانفها الظهرية والبطنية تمتد من القراس الى القلب. زعنفتها الشرجية غريزية الشكل. لحمها حادي الصنف قل من يرغب فيه.

**1٥٢٦١ - شَرِيَاطِيَّات ٥** *Cepolidae* (S).*Cépolidés* (F). *Cépolidés* (E).

فصيلة اسماك بحرية من الطشيات شالكتات الزعانف. اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من اسماك اساطم الثقات. اسطاتها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. تعيش بين المشريات وفي الاساطل. اجسامها سوية الشكل تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم. انوثها متباينة الاوان. زعانفها الظهرية والشرجية قاطبة. رؤوسها فضية، غليظة. اشدافها دمية. حويثا كبيرة. لحمها كصفة الصنف، لذي من يرغب فيها.

**1٥٢٦٢ - شَرِيَاك** *Arère* (F). *Artery* (E).

هو الحراء الذي يحمل الدم من القلب الى سائر اجزاء الجسم يقابله القوريد الذي يبعد الدم من اجزاء الجسم الى القلب. اما اتصال بالوريد فيتم بواسطة الاوعية الشعرية التي توصل نهاية الشريان بداية القوريد. تتقيم الشرايين في الجسم الحيواني الى اربعة اقسام رئيسية: اولى الشريان الاخر (الاورطي) الذي ينبع من البطن

**1٥٢٦٦ - شَرَهِيَّات ، شَرَهِيَّة** *Leptospermées*

سبط من فصيلة الآسيات، اشهر انواعه الشري.

**1٥٢٦٧ - شَرُو** *Miel* (F).

هر السمل، اطلبه.

**1٥٢٦٨ - شَرُو** *Mutation*

هو الانتحاء، اي التبدل الجفائي في الانتقال الوراثي لصفة او لصفات نوع اور ضرب من الاحياء.

**1٥٢٦٩ - شَرَوْنَةُ** *Senecio* (S).*Sénéceon* (F). *Groundsel* (E). *Graßkraut, Kreuzflanze* (D). *Senecio, Senecione* (I).

جنس نباتات حولية ومعمرة من فصيلة المركبات. انواعه زهاء ١٣٠٠ منتشرة في جميع اصقاع العالم. مسطها بري وبضها ترابي. منها الاصلاب والجنبات والشجيرات الملبانة الاشكال والالوان. اعرف انواعه واشهرها ما يتبع.

**1٥٢٧٠ - شَرَوْنَةُ اَفْرِيقِيَّة** *Senecio elegans* (S).*Sénéceon d'Afrique, S. des Indes* (F).

نوع من الشروة وهي عشبة حولية ومعمرة تملو نحو ٢٠ الى ٦٠ سم. أوراقها سنانية التصل، زهاء البشرة. ازهارها وريدية او ليلية البتلات. اقوامها الى الصفرة، قنابها موشحة بالاصيد. ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

**1٥٢٧١ - شَرَوْنَةُ بَرُونِيَّالِيَّة** *Senecio aurantiacus* (S). *Sénéceon orangé* (F).

نوع من الشروة وهي عشبة ريفية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أوراقها قليلة الحسل والزغب، بيضية اللصل، لمبة المقعدة. ازهارها برتقالية اللون، عمراء القرمص، صفيرة اللعل. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

**1٥٢٧٢ - شَرَوْنَةُ سَهْمِيَّة** *Senecio sagittifolius* (S).*Sénéceon à feuilles sagittées* (F).

نوع من الشروة وهي جنبة جادة معمرة تملو نحو ثلاثة اقطار. أوراقها سمية الشكل والسفل منها كبيرة فائقة تطول نحو ١٠٠ سم. وتعرض نحو ٤٠ أزهارها كبيرة القد، كثيرة العدد، حلقية التجميع، ثابئة الارتكاز. قنابها تينة اللون، لسناها حلقية. ازهارها يستمر طوال الخريف.

**1٥٢٧٣ - شَرَوْنَةُ شَالِكِيَّة ، بَابُونِج العُثْر** *Senecio vulgaris* (S). *Sénéceon commun* (F). *Common groundsel* (E).

نوع من الشروة وهي عشبة برية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. أوراقها سنانية التصل، شترية المخلقة، زهاء البشرة على مسطحها السفلي. ازهارها صفراء اللون، مائلة القرمص. يكثر ويوجد في الاراضي المزدرة. تأنفها الملائية لحسونة أوراقها وروانها. يتحولون لها طية تنظم الحسل وتقويه.

**1٥٢٧٤ - شَرَوْنَةُ عَوَكِيَّة** *Senecio scandens* (S).*Sénéceon grimpant* (F).

نوع من الشروة وهي جنبة سريرية معمرة تملو نحو ٥ اقطار. فروجها متراكبة نداء. أوراقها اطيالية مسطحة الزام الاخير، تصلها خلي البشرة على مسطحها رؤوسها الزهرية ثمانية التركيب، حلقية التجميع، ثابئة الارتكاز. ازهارها يستمر طوال الخريف.



شروة شاملة



شرايط

Desiccation totale (F). ١٥٢٧٥ - شُرَاكَاة

Total desiccation (E).  
شُرَاكَاة شُرَاة : كان يابساً جداً .

Encyrtus (S). ١٥٢٧٦ - شُرَاكَاة  
Encyrtus (F). Encyrtus (E).

الواحدة شُرَاة . جنس حشرات نافعة من فصيلة الخنثريات.  
انواعها متوسطة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المحيطة  
الحرارة . جميعها تتطفل على الحشرات الضارة من الخنافس  
والمنقبضات . اجسامها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، تعلل  
نحو ٢ م . اجنتها شفافة ، شفافة ، كبيرة عند الشقين .  
ألوانها سوية الألوان القاتمة .

Schizogonia (F). ١٥٢٧٧ - شُرَاكَاة  
Schizogony (E).

الشُرَاة ملودج تكاثري خاص تسلكه البرويات اللاشعوية  
حيث ان البويضات لا تنبثق الى قعد بعدها يطعمها عدد  
الجيلات .

Encyrtidae (S). ١٥٢٧٨ - شُرَاكَاة  
Encyrtidae (F). Encyrtidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة شفائيات الاجنحة الصغيرة .  
اجسامها وانواعها المرفوعة كثيرة العدد . جميعها نافعة  
تتطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين ومرششات  
الاجنحة . اسطواناتها معظم اقطار العالم باستثناء المناطق  
الباردة والاسوائية . حشرات صغيرة القدر قليل نحو  
ملليمتر واحد . اجسامها وقرونها الاستشعارية متشابهة  
الاشكال . رؤوسها مستديرة . جوفها اكبر من بطونها .  
مرفقاتها صغيرة مستديرة . انايبها مختلفة . وحيدة اللون ،  
وتلعب فيها المزاج الاسود . اظهر اجسامها القدرات  
واللون والبرق والشفرة .

Schizocodon (S). ١٥٢٧٩ - شُرَاكَاة  
Schizocodon (F). Schizocodon (E).

نبات عشبي من مصر من فصيلة الخنثريات . منه الجبال  
في المناطق المعتدلة الحرارة . ساقه جذبة . اوراقه ابيدة  
قرصية الانتشاح ، شبه قلبية الشكل ، مستطيلة المالحق .  
فصلها جوفية مسنة الحمار . لونها الى الخضار الاسود  
المزج يطبق حاشى اخر . افران وريدية اللون ، قطرها  
نحو ٣ سم . تنمو في شمس من آذار الى نيسان .

Flanc abrupt (F). Abrupt flank (E). ١٥٢٨٠ - شُرَاكَاة  
جنب البرادي الوبر الحادى .

Ossilet (F). Knechte-bone (E). ١٥٢٨١ - شُرَاكَاة  
كل عظيمة من اطراف القوائم لدى شُرَاة . جنس شُرَاة .

١٥٢٨٢ - شُرَاكَاة  
الغصيب من الشجر قيل ان يصلح . ج شُرَاة .

Schiste (F). Schist, Slaty rock (E). ١٥٢٨٣ - شُرَاكَاة  
اسم شامل يطلق على الصخور المنظمة التركيب التي  
تنقسم الى صفائح . ج شُرَاة .

Olpidium (S). ١٥٢٨٤ - شُرَاكَاة

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحريات . تكاثرها  
لاشي ، تتميز بحلقها البوقية المستديرة . بونها كروي  
الشكل يحمل حبة عيطية دقيقة . معظم فطور

الاسمر لطيف جلع الرئة اليسرى ثم ينحدر نحو الصدر  
حيث ينفرج وينقسم . ثانياً للشران السباتي وهو  
يقسم الى قسمين : الظاهري الذي يغلف ظاهراً الرأس  
والوجه وسط القدم ، والباطني الذي يغلف معظم باطن  
الجسم . ثانياً شران الاطراف العليا والسفلى وهي  
الشران الايطي والمعدني والحرقى . رابعاً الشران  
السطحية التي تسير تحت الجلد . انهما الكبري والمعدني .

١٥٢٦٣ - شُرَاكَاة عَصَب  
Nervure cordaire (F). عَصَب  
Tertiary nerve (E).

هو في نمل الاوراق النباتية ، الحرقى النسي الذي ينفرج  
من البرق .

١٥٢٦٤ - شُرَاكَاة صَبَاكِي هو البرق ، اظله .

Sauvageon, Franc (F). ١٥٢٦٥ - شُرَاكَاة  
Wild stock, Ungrafted (E).

النباتة الحاصلة من بذر ولم تطفئ ، ج شُرَاة .

Radicals (F). ١٥٢٦٦ - شُرَاكَاة  
هو الجذر ، اظله .

١٥٢٦٧ - شُرَاكَاة الماء

Sparganium ramosum, S. erectum (S). Sparganier  
rigide, Rubanier, Ruban d'eau (F). Common burd-  
reed, Knop sedge (E). Astiger igalkolben (D). Biode  
Chlodo di Dio (I).

نوع من السافرة وهو عشب مائي ممر من فصيلة البوطيات.  
اوراقه متشعبة ، حاشية ، صلبة الشكل ، جامدة لتصل ،  
سادة الاطراف . اوراقه ابطية ومائية ، كروية الشكل ،  
متنامة . يوجد في مياه البلاد المعتدلة الحرارة .

١٥٢٦٨ - شُرَاكَاة رِبَاكَاة  
Taanidus (S). Taenidus (F). Taenidus (E).

لفصيلة ديد من المنقبضات اجسامها وانواعها حديثة تتطفل  
على مختلف الحويان .

١٥٢٦٩ - شُرَاكَاة عَصَبِي  
هو البذ الخشبي ، اظله .

١٥٢٧٠ - شُرَاكَاة هي شكاكة التيه ، اظله .

١٥٢٧١ - شُرَاكَاة  
Amocé (F). Associated (E).

هو كل عضو في شركة او جماعة منتظمة .

١٥٢٧٢ - شُرَاكَاة في الالتزيم  
Coohligé (F). Coohligent (E).

هو من كان مريضاً بمعنى التفقه او القانين ان يشترك  
في دفع دين بالتضامن مع غيره .

١٥٢٧٣ - شُرَاكَاة  
Scaurella (S). Scaurella (F). Scaurella (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مغطيات الاوتل  
وفصيلة القبابيات . انواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع  
بحار العالم . اصنافها صغيرة ، بيضاء ، شفافة ،  
مشرية الحمار القاعدي الحادى الرأس . اجسامها شبيهة  
مسطحة ، صلبة الرزيس ، مسامية الواس الهدي .

١٥٢٧٤ - شُرَاكَاة هو الكشوث الحرقى ، اظله .



شُرَاة الماء



شُرَاة



شُرَاة

١٥٢٩٣ - شَسَّ شَغَرَكَاه \* ، نَقَارُ أَحْمَصَر

*Gecinua viridis* (S). Gécine vert, Pic vert, Pivert (F). Green woodpecker (E).

طائر من الشَّن مِطْعَة فَيْح الأرباب يمتد من الهند الصينية إلى الجزائر أوروبية || جسمه بطول نحو ٣٣ سم. ثوبه جميل الألوان الزاهية، متناقل الأخضر والاحمر والاصفر والاسود والابيض. رأسه احر اللون. ظهوره الى الأخضر الاصفر الماروج. اذنيكه اصفر. بطنه الى الخضر الفاتح الزاهي. عجمه الى السواد اللامع يرتكز ان على خط احر يمتد من قاعدة المنار الى اعلى المق. جناحه بجملته بالاسود والابيض والاصفر. منقاره صخلى اللون اسود الفيج || يألف الاسراع والمقايات والرياض القريبة من مجاري الماء. تربيته الحشرات واساريمها ويرقاتها ويكسها يلقنها بسمرة البرق يمكنه عليها لسانه المنطق الاخاذ. يمتد منه في تجاويف الاشجار. انشاء قصع من ٥ الى ٨ يعضات تحضنها بمثابة الذكر من ١٥ الى ١٨ يوما.

١٥٢٩٤ - شَسَّي \* *Schistose* (E).

ما كان مضد التركيب كالشس.

١٥٢٩٥ - شَسِيغَة \* *Curvuleria* (S).

جنس فطور مجهرية من الريديات وصلصلة الطليعات. انواعها قليلة العدد جميعها ربة قليلة الاذى تعيش على الانحاء النباتية الدالية || اعراف انواعها شسيفة الخروع (*Cur. humata*) التي تعيش على اللحاء البائرة نحو الياس في الخروع والشتا وبفس الحفصيات.

١٥٢٩٦ - شَسَّيْدَار \* *Tamier* (F).

هو الفلشرئين ، اطليه.

١٥٢٩٧ - شَسَّدَقَب \* *Marginalisme* (F).

قال داود الانطاكي: ولبت يميل الى صفرة واصلو الى الحمرية تته العلم فيه حدة بصرية واجوده المجلوب من دير النوبا. وهو ينفع من الاستقاء والجنين وضر التنفس ويحل البلم ويهد اليك ويهدل الريحه .

١٥٢٩٨ - شَسَم \* ، عَيْن الدِيك، عَصْبَة السُّوس

*Abrus pectorius* (S). Abre à régisse, Liane à régisse, Arbre à chapelet, Pois d'Amérique (F). Bond tree, Wild liquorice, Rosary pea (E). Paternosterkraut (D). Falsa liquorizia, Liane regolizia d'America (I).

نوع من الابروس وهو جنبة زراعية حارثة. جلورها صناعية تستعمل استعمال الكوك. زهرها مستديرة الشكل وقشورها جامدة ، سلية ، جلورية اللون ، سوداء النطقة. تستعمل في صناعة النسيج والقلاية. لهاها دعي غيد الاسم ويوم من استخرج منه مادة الابرين.

١٥٢٩٩ - شَسَّغَة \* هي الانبوج والنبوية.

١٥٣٠٠ - شَسَّ \* *Elaeochus* (S).

جنس حشرات من غديات الاجنحة وصلصلة السوسيات. انواعها المعروفة عشرة منتشرة في معظم اقطار البلاد الممتدة الحرارة. منظومة دامن يعيش على المواد النباتية المنحلة وبعضها يعيش على ثمارك الحور والصفصاف || اجسامها صغيرة امليلية الشكل. كواكها معدبة نائفة ازرقاها. احادها لاسعة مخددة ، منها انواع ثنائية الفيج وغيرها رباعية. قرونها الاستشارية صلبة الشكل. قواكها نشطة مستعدة القد. اقاربها تزارون من النشقة الى السرة يطوا على صناعي. يقبها الى السرة القديمة.

حار يتصل على النباتات الزراعية. اشهرها واضرها شس التبوغ واللغوف واقل.

١٥٢٨٥ - شَسَّ التَّبَوُّغ \* *Oplidium nicotianae* (S).

نوع من الشس يسبب سنج الشتل الفنية ، مركب اليها الكاشفة وغلادها فيلوجا ويقضي عليها || يكافح بتطهير التربة قبل البذر او باستعمال احد الفطريات التسمية المفضلة عنه ظهور الفوم.

١٥٢٨٦ - شَسَّ المَلْفُوف \* *Oplidium brassicae, Chytridium brassicae* (S).

نوع من الشس مركب سنج الملفوف وقد يكثر في الشاتل الربوية فيحطب سوق الشتل عند سطح الارية وبسبب يدها الجزئي تم انبساطها فوق بعضها ويرياها ويوتا. يكافح باستعمال احد الفطريات التسمية او غيرها من الفطريات الحديثة التي يزداد عددها كل يوم.

١٥٢٨٧ - شَسَّ التَفَكُّل \* *Oplidium trifolii* (S).

نوع من الشس مركب التفل فيلوجا وبسبب يدها || يكافح باستعمال احد الفطريات التسمية وذلك بعد حش التفل عدة وبجيرة لا تتعدى ٢٤ ساعة.

١٥٢٨٨ - شَسَمِي \* ، حَتَكَرِي \* ، حَكِيصِي \* *Marginal* (F). *Marginal* (E).

لست تعريفي يطلق على ما هو في الخار او ما جاءه من الحاشي.

١٥٢٨٩ - شَسِيغَة \* *Marginalisme* (F).

الشسمة نظرية اقتصادية تقول بان تعهد كمية الشيء منوط بدمال الحاجة اليه .

١٥٢٩٠ - شَسَف \* *شَسَف* : قيسر الذي يشفق ويعطف.

١٥٢٩١ - شَسَكْس \* *Chesacx* (S).

*Chesacx* (F). *Chesacx* (E).

جنس حوالات بحرية من الرخويات معلبات الاربل وصلصلة التيجنيات. انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد اصلاتها بعض مناطق المحيط الاطلسي || اصنافها صغيرة القد ، مرفوعة الشكل ، ملونة وبزخرفة . فواكهها بفسية مسطيلة ، مالة الارويسة المعادة التخفيف || اعراف انواعها شسكس مديرا (*C. maderensis*) الذي يكثر ويوجد على شواطئ جزيرة مديرا .

١٥٢٩٢ - شَسَن \* *Gecinua* (S).

*Gécine, Chloropic* (F).

جنس طير من فصيلة التقاريات يتلقى جلوع الاشجار وينتج قشورها وشكورها في طلب الحشرات واساريمها. انواعها المعروفة قليلة العدد. راحته شس || اجسامها تطول من ٣٠ الى ٣٣ سم. اقاربها متناقلة الالوان الجسيلة يتقلب فيها الاخضر. مناقبها غرطية ، مسطيلة ، مخددة. اجسامها متوسطة الحجم والانتفراج. اذنانها رتاجية ابريش. راسها قصيرة. اجسامها قوية. غالبا مستعدة الاطراف المجدبة الحادة || اشهر انواعها الشس الخضراء.



شس التبوغ



شس الملفوف



شس التفل



شس غفراء



شس



شس

١٥٣٠٩ - شَعْبُ الْكِثَانِ \* (S). *Melampora lini*

Rouille du lin (F).

فطر مجهرى يتطفل على جميع انواع ضرير الكتان من رية وزراعية فطرب الازراق ويطلع بالانتاج . يتطفل أولاً بشكله الايدي في اوائل الربيع حيث يركب نصل الازراق على صفحته . مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب لها الى الصفرة البرتقالية . ويته اكمال طوره الايدي تملئ خاشته في طورها الدماي فطرس البشرة من بورخ كليلاب لونه الى الجوزة الزاوية . يكلفه وقتاً اولاً باجتنب الموقع الرطبة . ثانياً باجتنب الارربة القوية الاندماج . ثالثاً باجتنب الاكثار من الاسمدة الفسفافية . رابعاً باستعمال البورد بمعدل ٥ كيلو الدم الواحد .

١٥٣١٠ - شَعْبُ الْمُفَاضِ \* (S). *Melampora evonymi-capreae*

Rouille du fusain (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وتواي للمفاض فيرشح بهنور الايدي الكثيفة التسجيع التي تهر صفراء اللون على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى دمايل من الدمايل ، لها الى الجوزة تطلب انسجة الازراق وتسبب يسلها .

١٥٣١١ - شَعْبِيَّات \* (S). *Melamporaceae*

Mélamporacées (F). *Melamporacées* (E).

فصيلة فطور مجهرية من رية الصمليات تتميز بتكوين اعضائها انتشارية (النمائل) تحت البشرة او تحت القاعدية الايدي . ائديتها فارقة طليقة . دمايلها صلبة تهر منطفة ثم تنفلق من بويئات فردية كشوة كليفة التسجيع . اجناسها عديدة ، اشهرها واعرفها من الربية الاقتصادية القنة التالية : الشعب والشعاب والشعوب والزلفسة والسلاج والشفسة .

١٥٣١٢ - شَعْدَقِي الرَّيح \* (F). *Rose des vents*

Compass-card (E).

هو الصميم المقروء به حالياً لبيان مصادر هبوب الرياح . يشمل ١٦ اتجاهاً منها اربعة زفوية وهي الشمال الى الجنوب

١٥٣٠١ - يَحْيَى ، مِينَكَا \* (F). *Hameçon*

Fish-hook (E).

خضائن او كلاب صير من فولاذ يثبت في خيط والخط في صفا طوية . يستعمل لصيد السمك .

١٥٣٠٢ - شَعَاب \* (S). *Melamporidium*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بلماثفه العادة التكات وبدماماته الخيطية الجليل والشفة . ائديته تركب الازراق على صفحتها السفلى . مظهره الخارجي بهنور صليقة برتقالية اللون مبهمة بدون ترتيب الى ان تدخل في طورها الدماي حيث تأخذ اللون الخليل ثم تنفلق الى انواعه قليلة اعرفها شعاب البتلا وشعاب الشرم .

١٥٣٠٣ - شَعَابُ الْبَتُولَا \* (S). *Melamporidium betulinum*

Rouille des feuilles de bouleau (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق البتلا فيذبلها ويسبب سقوطها الباكر الى مظهره الخارجي ، في طوره الدماي ، يقع فضلة مبهمة لونها الى الصفرة تهر على صفحة النصل العليا يقابلها على الصفحة السفلى بهنور مكنية من الخلائج الدماية الخيطية اللون الى اشراقه زهيدة لا تسبب الكائنات .

١٥٣٠٤ - شَعَابُ الشَّرْمِ \* (S). *Melamporidium carpini*

Rouille des feuilles de charme (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الشرم فيؤذيها الى مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل والحجم والترتيب تركب النصل على صفحته السفلى . تهر صفراء اللون ثم تتعرف الى الخليل تطلب لسج الخلل وتسبب الاجبال الباكر . لا يتسبب الكائنات .

١٥٣٠٥ - شَعْب \* (F). *Sécherité des plantes*

Stearility of plants (E).

هو عدم اثمار النبات سببه عارض جومورى يمنع النبات من التثير او يتحول الاندراج الى اوراق من فوط السو .

١٥٣٠٦ - شَعْب \* (S). *Melampora*

جنس فطور مجهرية من فصيلة الشصيات يتميز بلماثفه المبهمة بتكات دوسية . دمايلها مرامسة ، وشية الاركاز لا وثيرة الى انواعه عديدة لا تقل عن ٢٠ لشهرها ما يتبع .

١٥٣٠٧ - شَعْبُ الْحَرَو \* (S). *Melampora rostrupii*

Caoma mercurialis (S). Rouille du peuplier (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الايدي على الحور فيركب الازراق والسوق . وهو على الازراق يقع صيرة عديدة مبهمة يلحق انتظام تكثر منه الحرات النصل وفي زامه الاشر فطلب وتسبب سقوط الازراق وضف الاثمار .

١٥٣٠٨ - شَعْبُ الصَّبَوْبَر \* (S). *Melampora pinitorqua*

Caoma pinitorquum (S). Rouille tordue des rameaux de pins (F).

فطر مجهرى يتطفل بشكله الايدي على غرايمب وتواي الصبور كما يركب بشكله الدماي اوراق الحور . مظهره الخارجي على تواي الصبور يقع صفر يضية الشكل طولا نحو ١٢ م ومرفها ١٠ يعلوها صمبات صيرة تشولية تقرح اللما وتطلع بالبشرة فطلب صجين النامية ان لم تقص عليها .




شعاب الشرم




شعاب الحور



شعاب الصبور



شعاب الكتان



مستقة ، نصلها مالم البشرة شديد الخضار . تزوع لثريا  
المرقطة للشكل ، الشديدة الحرارة واللينة يمسف الغنيمات  
الزليسية انحصا الغنيماتين « ث » .

Partager en 2 parties égales (F). **شَطَر** ١٥٣٢٢  
To share in equal division (E).

قسم الشيء الى جزئين متساويين .

١٥٣٢٣ - **شَطَلَط كَتِي** \*

Sarcidornis melanotos (S).

Sarcidornis noiretre (F).

طائر من فصيلة البليات . اصالته تمتد من الرقبة  
الاستوائية الى برناميه في الهند لا جسمه كبير القد  
مستطيل المتق يعمل في الصفحة العليا من متفاده لخصه  
لحمية جارية اللون . جناحه كبيران لا طافان . ذنبه  
جذمة . لونه متراكب الاسمر والبنيجي والاسود .  
مؤخر عنقه وصدره وبطنه الى الياض الاخضر .

Excédent (F). Exceeding (E). **شَطَط** ١٥٣٢٤

هو ما زاد او تفيض او فاض . يقال لا وكس ولا شط  
اي لا نقصان ولا زيادة .

١٥٣٢٥ - **شَطَط السُلْطَة** ، **تَجَاوَز السُلْطَة**

Excès de pouvoir (F). Excess power (E).

هو ان يتجاوز احد القضاة او المأمورين الاداريين  
حدود سلطه .

١٥٣٢٦ - **شَطَب** \*

Discope  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الفرغيات ورتبة شالكات  
الزحائف . انواعه عديدة جميعها كبيرة القد . جملة المنظر ،  
ماكية ، ليلجة اللحم . طولا يراوح من ٤٠ الى ١٢٠  
سم . اشهرها من اسماك المحيط الهندي وبعضها يعيش في  
البحر الاحمر || من انواعه المشهورة البهار والشفل  
والشفط الوردي والشطف الاسمر والمبر .

Discope nigra **شَطَب اسمر** ١٥٣٢٧

سمكة من الشطف ، كبيرة القد طولها نحو ٩٠ سم . ثوبها  
الى الطحلة السمر . مرتها يتعد من البحر الاحمر الى  
الخليج الفارسي والهند وسريلنك .

Discope sebae **شَطَب زَوْدِي** ١٥٣٢٨

سمكة من الشطف كبيرة القد طولها نحو ١٠٠ سم . لونها  
الوردي الذهب المالح يطولو تخطيط احمر قاطب يمتد  
من الفرس الى الفترج . لحمها اللين الطعم مرغوب فيه .  
تكثر في المياه الحارة والاسترايلة .

Chaetomys (S). **شَطْمُوس** \* ١٥٣٢٩

Chaetomys (F). Chaetomys (E).

حيوان لبون قاتم وردي اللون من فصيلة الشجيات  
مركبة البرازيل . طوله نحو ٥٠ سم وذنبه ٢٥ . رأسه  
غليظ مفلطح . ذقنيه غليظ . خناجره مرقطتان عينا  
واذناه صغير . جرابه مستدلة القد . اطرافه قوية حادة .  
ذنبه كاسي القامة . حشيشه الباني ، لا اخاذ . شعره  
جليدي حدي فخر يخطله شوك صغير كاللؤلؤ ينقش عنه  
الدفاع من اللبس الى يافئ النايات والاحراج والمرامي  
والحقول . يسرح في الليل . يتسلق الاشجار . قبه المواد  
النباتية على اختلافها .

والجنوب اي لقليلة والشرق اي السبا والغرب اي القبور .  
واربعة ثمانية وهي الشال الشرق اي الحيف والشال الغربي  
اي الجرياء والجنوب الشرق اي الازيب والجنوب الغربي  
اي الصاية . وثمانية ثالثة وهي الشال الشمال الشرق اي  
ميت الشال . والشرق الشرق الشمال اي حيد السبا  
والشرق الشرق الجنوبي اي ازيب السبا والجنوب الجنوبي  
الشرق اي ازيب الجنوب ، والجنوب الجنوب الغربي اي  
صابت الجنوب ، والغرب الغرب الجنوبي اي صابت الغرب ،  
والغرب الغرب الشمال اي جرياء الغرب ، والشال الشمال  
الغربي اي جرياء الشمال .

Petit de la gazelle (F). **شَوَمَر** ١٥٣١٣  
Young gazelle (E).

هو صغير الغزال وينسج جدية . ج اشجار وشمار .

Mauvais laktère (F). **شَمُوس** ١٥٣١٤

Bad milk (E).

انثى البهائم القليلة الدرة . ج شمس وشماس .

Melampoirella **شَمِب** ١٥٣١٥

جنس تطور مجهرية من فصيلة الشصيات . ينسج بدماضه  
البدية التكتات وبدماضه الشفافة الجليد والشفاء . طوره  
الانثى يصل بمسقلان شارب || انواعه قليلة امرتها  
شصية التوب .

١٥٣١٦ - **شَمِب التَّوب** \*

Melampoirella caryophyllacearum, Melampoires  
cerastii, Acidium elastinum (S). Rouille vasculaire  
du sapin. Balai de sorcière des rameaux de sapin (F).  
فلر مجهرية يتصل على التوب لؤلؤه ويؤده الى السكة  
(تكتة السامرة) . ظهوره الاخضرية بقدر صغيرة غليظة  
التيمن والغربي لا لياسية الشكل والحجم تركيب التصل  
على صلحة السطيل بمؤازة الفلج تنصب الاحادب والنبات  
وتسبب السكة الذي يشو الاشجار ويؤثر نجما .  
يكافح بالتصاع يسرق الاتحاد المكونة .

١٥٣١٧ - **شَق** هو الشاطي . ج شطوط وشطان .

Tallo (F). Sucker (E). **شَقَة** ، **مُشَقَة** ١٥٣١٨

اشطاء ج شقوه واشطاءه هي فراخ الفروع . يقال شقا واشطا  
الفروع فهو مشط .

Tristocum (S). **شَطَس** ١٥٣١٩

Tristoc (F). Tristocum (E).

جنس نباتات عشبية ، برقة ، سولية من فصيلة النجيليات .  
انواعه المرفقة قليلة البلد منها جبال حوض البحر  
الابيض المتوسط || شكلها قريب للشم من الخرفال .  
بعض انواعها شقي . صفها مستطيل ، يامت الخضار .  
ازهارها منفرد تتجاذب السيليات .

Radiation (F). **شَطَب** ١٥٣٢٠

عمر من جدول او تليل .

Capiscum concinnum (S). **شَطَة** \* ١٥٣٢١

Piment à bouquet rouge (F). Cone pepper (E).  
Kleine Beisbats (D). Pape d'Ape, Pape  
rosso piccolo (I).

لوع من القليلة وهي بقلة عشبية سولية من الفصيلة  
الباذنجانية . تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سمية



شصب التوب



شَة



شطط كتي



شط



شطوس



Toile d'araignée (F). Cobweb (E). **شُع** ١٥٢٤١ -

هو بيت الشبكات الموشى بالنس.

Andouiller (F). Tine (E). **شُعَاب** ١٥٢٤٢ -

هو الاشعاب الخشبي الذي يحصل في قرون الايل والاريل واليسور. ومن هذه الشعاب يمكن تحييد عمر الحيوان.

Endroit boisé (F). **شُعَاوَر** ١٥٢٤٣ -

Wooded side (E).

الشعاب: مكان ذو شجر. وهو الشجر اللطيف او ما كان من الشجر في اين واطاء من الارض.

Rayon de lumière (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٤ -

Ray of light (E).

شعاع الشمس المنسكب الذي تراه مستطراً كالخيل.

Barbes (F). **شُعَاع** ، **شُعَاع** ، **شُعَاع** ١٥٢٤٥ -

Beard, Bristles (E).

هو سنا السنبل اذا ليس بما زال حل السبله || يقال اشع الزرع اذا اخرج شعاعه.

Actinomeris (S). Actinomère (F). **شُعَاع** ١٥٢٤٦ -

جسئ نباتات حشوية معمرة من فصيلة المركبات. انواعه قليلة. اوراقها فغده الشكل، السفل منها متعاقبة واعلىها متعاقبة. ازهارها صفراء. تتفتح كروي الشكل اسفلاً. يزورها ملقحة بمجنحة ثنائية المسك || اشهر انواعه الشعاب الخشبي وشعاب سكرودا.

Rayon Incident (F). **شُعَاع ساقط** ١٥٢٤٧ -

Incidental ray (E).

١٥٢٤٨ - **شُعَاع سكرودا**

Actinomeris squarrosa, A. alternifolia (S). Actinomère à feuilles alternes (F).

نوع من الشعاب وهو نبات حشوي معمّر يصلو من ١٢٠ الى ١٨٠ سم. اوراقه متعاقبة، مسطحة، مدببة، لائفة، جلدية النصل، مسنة الحافة. ازهاره رؤسية عديدة، قطرها يراوح من ٣ الى ٥ سم. || ازهاره مخزني.

١٥٢٤٩ - **شُعَاع طبي، حكيكفة السكرى**

Actinomeris halimifolia (S). Actinomère-Soleil, Herbe au diabète (F). Diabète weed (E). Strahlkraut (D). Erbe du diabète (I).

نوع من الشعاب وهو نبات حشوي معمّر يصلو نحو المتر. اوراقه بيضية لائفة، لها اذن زغب المسكة السفلى. ازهاره رؤسية قطرها من ٥ الى ٨ سم. فيها الى الشعاب الشمسي || ازهاره يثمر من نحو الى الجبل. يقال انه يلبس السكرى.

١٥٢٥٠ - **شُعَاع مَا وَرَاء النسيجي**

Rayon ultra-violet (F). Ultra-violet ray (E).

١٥٢٥١ - **شُعَاع كاثودية**

Rayon cathodique (F). Cathodic ray (E).

١٥٢٥٢ - **شُعَاع**

Radiateur (F). Radiator (E).

جهاز كهربائي يزيد مساحة الاشعاع.

١٥٢٥٣ - **شُعَاعَة**

Actinostome (F).

Actinostomium (E).

الشعاعية تأثير الاشعاع ان ضيائي او ضوئي على نزع النبات.

١٥٢٣٠ - **شُعَتَن**

Diformisme (F). Deformism (E). هو القيب التناسلي او الخلو من التماسق للأورث والانجمام المقبول او المتفق.

١٥٢٣١ - **شُعَتِي**

Cespitose (F). Cespitose (E). تمت ترويض به النباتات الكثيرة الاشطاء اعصاب النباتات النجيلية.

١٥٢٣٢ - **شُعَتُوس**

Dissident (F). Dissident (E). الشطرون من خالفت او ناقض الغير.

١٥٢٣٣ - **شُعَتُوس**

Squalius (S).

Chevaine, Chevesne, Chevenne (F). Chub (E).

جنس اسماك نهريّة من فصيلة الشبوطيات مفتوحات الفم. انواعه عديدة منتشرة في معظم بحيرات واطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها وشمية الشكل. زعانفها الظهرية فردية، متوسطة الحجم تقابل الزعانف الخشبية المنقسمة الى شطرين || الارباع خياشمة الالوان المتخلطة تكثر فيها الاربدة والزرقة البنفسجية. جوفها وبطنها فضية اللون. زعانفها الى الصغار الاصغر الخواج او الى الحشرة السمراء اعرف انواعه واشهرها الشبوط الملهول وشبوطه سوني.

١٥٢٣٤ - **شُعَتُوسَة سُونِي**

Squalius souffi (S).

Chevaine souffi (F). Bull-head (E).

سمكة نهريّة يعيش من الشطوط. اعطائها اوراقه والاطار الجرف السريعة التيار || جسمها صغير لكنه يطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الزرقة البنفسجية. جانيها وبطنها الى الفضي. زعانفها الى الخضار الاصفر الخواج || لجها كائن الصفه، قل من يررب فيه.

١٥٢٣٥ - **شُعَتُوسَة مَبْدُودَة**

Squalius caphalus (S). Chevaine commun, Muntier (F). Miller's-thumb, Bull-head (E).

سمكة نهريّة يعيش من الشطوط. اعطائها مطر اتر وبحيرات البلاد المعتدلة الحرارة || جسمها كبير لكنه طويلا نحو ٥٠ سم. ثوبها الى الاربدة الخراعية. ظهرها اصفر من بطها. زعانفها الى الخضار الاصفر الخواج || الاثنى تسراً من نيسان الى ايار || لجها متوسط الصفه، ما كويل.

١٥٢٣٦ - **شُعَتُوسَة**

Allosome (F). Allosome (E). اسم يطلق على كل نديّة فردية كانت ام اكثر موجبة في جيلة القامة انما تختلف شكلاً وقدما من الشعب العديدة. وقد يترى فيها التمايز الشقي.

١٥٢٣٧ - **شُعَطِير**

Secille (F). تمت ترويضه يطلق على ما هو قابل الانقسام.

١٥٢٣٨ - **شُعَلَف**

Biscourrage (F).

Castration by torsion (E).

حرم خصيتي الكباش بين حدين وشدها بقبب حتى تذبل.

١٥٢٣٩ - **شُعَلِيكَة**

Péroné (F). Fibula (E).

قصبه الساق السفرى.

١٥٢٤٠ - **شُعَلِيكَة**

Racorni (F). Herden (E).

الشطيف من اشجر: ما لم يجد ربه صلب من غير ان تلعب نومه.



شطوطه مدبلة

الى السرة الخفيفة بالاسفر. تركب الأيل والاريل والحيور والفر.

### ١٥٣٧٧ - شُعْرَانِيَّة الْبَشُون

*Ornithes metalica* (S). *Ornithes du héron* (F).  
نوع من الشعراء خفيفة الجثة ، قصيرتها ، طولها نحو ٤ سم. رأسها مستعرض الشكل ، هوائياتها كبيرة ، عظمها حلي الخنجر. ثوبها الى الخلف اسفح الموج. تركب البشون والقيق.

### ١٥٣٧٨ - شُعْرَانِيَّة الْحَتَام

*Pseudolynchia maura* (S). *Mouche du pigeon* (F).  
نوع من الشعراء جثتها مستعرضة مضمورة ، طولها من ٥ الى ٦ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة ، هوائياتها كالحلقة. تركب الحام على اعطاف النواهل.

### ١٥٣٧٩ - شُعْرَانِيَّة الْخَطَف

*Craetichina pallida* (S). *Anaphe pale* (F).  
نوع من الشعراء. طولها نحو ٦ سم. ثوبها حلي اللون ، اغبر الموج. جناحها مردنية الشكل ، صغيرة القد ، يعلها غليظ المؤخر فارق الطرف. تركب الخطف.

### ١٥٣٨٠ - شُعْرَانِيَّة الْخَيْشَل

*Hippobosca equina* (S). *Hippobosque du cheval* (F).  
نوع من الشعراء جثتها خفيفة الشكل مضمورة ، طولها من ٧ الى ٨ سم. ثوبها الى الصهبة السراء. جناحها مستطيل شفاف. يعلها مستعرض الشكل مذهب الطرف. تركب الخيل والابقار والكلاب.

*Stenapteryx hirundinis* (S). *Mouche de l'hirondelle* (F).  
نوع من الشعراء طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة العابقة جناحها مستطيل ضيق. يعلها فارق الطرف ، تركب السنونو وقد تصيب الانسان فتله.

*Ornithomyia avicularia* (S). *Ornithomyia aviculaire* (F).  
نوع من الشعراء خفيفة الصدر ، نحيلة البطن ، طولها نحو ٦ سم. ثوبها الى الريدة السراء. تركب الحيل على اختلاف فصائله وأنواعه من الكواسر الى الجواثم والمواجن.

*Melophagus ovinus* (S). *Mélophe du mouton* (F).  
نوع من الشعراء العادة الاجنحة. طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى السرة الخفيفة النبراء الموج. رأسها صغير القد ، مقطوع الشكل ، غائر في الصدر ، عظمها دقيق مستطيل ، يعلها ويحد القربة المستديرة عديم التحيز. ثوبها زبله الجسم ، حادة الحالب. تركب الغنم فتؤذيها.

*Hippobosca capensis* (S). *Hippobosque des chiens* (F).  
نوع من الشعراء طولها نحو ٨ سم. ثوبها الى الطلعة الكبراء يصلوها موج اسفح. جثتها مستطيلة ، جناحها متوسطا الطول ، هوائياتها بلون المناب ، تركب الكلاب والذئاب والكلاب.

### ١٥٣٨١ - شُعْرَانِيَّة الْخَيْشَل

عشب اعصر يقرب الى الثيرة (ابو حنبله).

### ١٥٣٨٢ - شُعْرَانِيَّة الْخَيْشَل

نوع من الشعراء خفيفة الجثة طولها من ٤ الى ٦ سم. ثوبها

*Radié (F.) Radiant, Radiata (E).*  
نمت تعريفي تصوف به الاثمار والحيوانات الدنيا الشامية الشكل.

*Radiare (F). Radiate (E).*  
ما كان تنظيمه او ترتيبه او تجهيزه شعاعي الشكل.

*Radiolaires (F). Radiolarian (E).*  
رقة كائنات حيوانية دفا من الخفريات.

*Radiées (F). Radiant, Radiata (E).*  
سبط من فصيلة المركبات منه الاسطر والاقصون البهار وحشيفة السمال.

*Section*  
الشفة في تصنيف الاحياء تأتي بعد الطائفة ويقل الطبقة.

*Section*  
شعير هو ابن اوى الخندي ، اطليه.

*Plasmode (F). Plasmodium (E).*  
ركبة في السج النباتية الحية يسببها تجميع بعض الفطور الدنيا.

*Pelage (F). Coes (E).*  
هو القرب الذي يعلها جلده الحيوان الثديي وقد يكون من الشعر او الصوف او الور.

*Poll (F). Hair (E).*  
هو ما ينبت من مسام البدن. الواسعة شعرة وبني مركبة من جزئين : ا. الجذر الملتصق في الجلد وهو الذي ينسج بالصلة تعلقها غدة دهنية تفرز المادة الزيتية اللازمة ، وبسم الشعرة الخارجة الخيطي الشكل الخفيف الطويل والمحيطة بالون.

*١٥٣٨٣ - شُعْرَانِيَّة الْاَوْس*  
هو كزرة البئر ، اطليه.

*١٥٣٨٤ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
هو ذيل الازب ، اطليه.

*١٥٣٨٥ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
هو الصمصاف الروبي ، اطليه.

*١٥٣٨٦ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
هو كزرة البئر ، اطليه.

*١٥٣٨٧ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
هو كزرة البئر ، اطليه.

*١٥٣٨٨ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
هو الهم الساني ، اطليه.

*١٥٣٨٩ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
جنس ذباب لاسع من فصيلة الشعراويات. انواعه عديدة بعضها صغيرة القد. قوتها الدم تنمسه من الثدييات والطيور بعد ان تلهب الجلد بلدها للؤلؤ.

*١٥٣٩٠ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
نوع من الشعراء السراء الذين طولها نحو ٦ سم. تركب الايل فتؤذيها وقد تسبب لها الجرب.

*١٥٣٩١ - شُعْرَانِيَّة الْاَرْكَب*  
نوع من الشعراء خفيفة الجثة طولها من ٤ الى ٦ سم. ثوبها

*Lipoptena cervi (S). Lipoptène du cerf (F).*

نوع من الشعراء خفيفة الجثة طولها من ٤ الى ٦ سم. ثوبها



شعراء الايل



شعراء الحام



شعراء الخيل



شعراء الطير



شعراء الغنم



شعراء الكلاب

## ١٥٣٨٢ - شَعْرَائِيَّات

هي التبريات فصيلة خشرات من ذوات الجناحين، اطبا.

## ١٥٣٨٣ - شَعْرَائِيَّات

Hippoboscidae (S). Hippoboscidae (F).  
فصيلة خشرات ذبابة من رتبة ذوات الجناحين، اجسامها وانواعها زهاء ١٠٠ اجسامها صلبة. اجنتها، عند وجودها، مستطيلة. رؤوسها صغيرة مفلطحة. اعطالها ثاقبة ماصة. قرونها الامتصاصية اسطوانة الفاصلة، دقيقة، غائرة. صدورها غليظة. بطنها مبطنة. غلافها سادة. مكها ينقف في جيب الزكة تحته الاثر او بالاسرى تنصه يرقاق كاملة تخرج بعد وضعها بساعة ثم تنحول الى طاردي بعد بضعة ساعات || تنوش طليقة ما لا تحصى من دم الطير والثدييات.

## ١٥٣٨٤ - شَعْرُور

هو القريون الخرنجى، اطبا.

## ١٥٣٨٥ - شَعْرُورَة

ثمرة القفا الصغيرة القده.

## ١٥٣٨٦ - شَعْرُورِي شَامِيَّة، شَعْرُورِي شَمِيَّة

لثاق اسماء لثيم نير من كركية الكلب الاصفر يمد من الارض نحو حشر سنوات ضيقة. وهو من منازل القصر. راجع فضياء.

## ١٥٣٨٧ - شَعْرُورِي بِمَالِيَّة، شَعْرُورِي هَبْرَة

أُتْرُك

## Canticule, Sirius (F).

Canticule, Sirius (E).  
الشعرى البائية والشعرى الببور والأبرق ثلاثة اسماء لثيم واحد من كركية الكلب الاكبر يعتبر الملم نجم في الفضاء من اسماء القديسين ان سهرق اقبل من ناحية اليمن واقلت الشعرى، البائية والشامية، من ناحية الشمال حتى انتهى المسير الى الحقبة. فوقف كل من الفريقين على شاطئ الحفرة وسطها سهل فاجابته على الزواج ووبرت اليه البائية منها فليل لها الشعرى الببور. ولم تسقط الشامية ان تبرز فوقف تكي وتقول السموح الحارة من حينها الفاضلين فليل لها الشعرى البميصاء.

## ١٥٣٨٨ - شَعْرُورِي

Capillaire (F). Capillary (E).  
نمت وصني وتسمى يلقب على ما له علاقة بالشعر ويول ما يشبه الشعر كالانابيب الشعرية والقرايين الشعرية الخ.

## ١٥٣٨٩ - شَعْرُورَة

Caryota urens (S). Caryota briliante (F).  
نوع من نخل الكريه منه الهند والبنغال والكوشئين وجزر الزايج. ساقه متضبة اسطوانية تملو نحو ٢٠ م. قطرها يراوح من ٤٠ الى ٥٠ سم. سفلها ثنائي التركيب، مؤسسي الشكل، غليظ الكرب، يطول نحو ٤ اشراب ويبرس من ٣ الى ٤ || تنامر مأكولة لكها حريفية الثغور يستخرج منها حن الكريه || وقد يزرع لقرنين وهو من النباتات البليغة السنو الجنبلة اخضر الفسقي.

## ١٥٣٩٠ - شَعْرُور

Cocotier commun (F).  
هو الجوز الهندي. اطبا نارجيل مروف.

## ١٥٣٩١ - شَعْف

Ecorce de prosopie (F).  
هو قشر الناف.

## ١٥٣٩٢ - شَعْفَة

Calson (F). Calson (E).  
الشفة من كل شيء اعلاه ومن الكساء رأسها ومن الجبل رأسه. ج. شفت وشيف وشطاف وشفات.

## ١٥٣٩٣ - شَعْفَة، نَعْفَة، قَطْرَة

Goutte (F).  
قطرة الواحدة من المطر او من اي سائل كان. ج. شفت.

## ١٥٣٩٤ - شَعْل

يئاض في ناحية الفرس او ذنبه وقد يكون في الفذال.

## ١٥٣٩٥ - شَعْن

Fane (F). Hauler, Dead leaf (E).  
ما تثار من ورق المشب ويخطف النبات به ذبوه.

## ١٥٣٩٦ - شَعْهَر

هو ابن كوى الصحراء، اطبا.

## ١٥٣٩٧ - شَعُور مَكَة

Pois absorbants (F).  
شور دقيقة في اطراف الجذرات تحس بالتحال الباعلي اللواد المنفنية اللابية في ماء القربة فتدملها وتصيرها اتسغ البابل اي اللتخ الساعد.

## ١٥٣٩٨ - شَعْبَات

Bronchies (F). Bronchia (E).  
اضاء التنفس في الحشرات تقوم مقام الرقة في الحويان.

## ١٥٣٩٩ - شَعِير، شَعُور

Hordeum (S). Orge (F). Barley (E). Gersta (D). Orzo (I).

جنس نباتات عشية حولية برية وزراعية من فصيلة النجيليات. ينبت من القمم النباتات الزراعية ورأسها انتشاراً نظراً لقدرته على احتياك الماخات المنطوقة فهو يزرع وينتج في البائرة القطبية الشمالية كما يزرع وينتج في بطن الصحراء || انماحه ١٢ مشتر في جميع اصقاع العالم. منها نوع زراعي هو الشعير المعروف بأخر تركي يسمى الشعير الاحمر وطيرة أنواع برية اخرىها ما ينتج. شعير القنار

## ١٥٤٠٠ - شَعِير لَيْس

H. murinum (S).  
شعير المروج.

## ١٥٤٠١ - شَعِير أَقْطَر

H. secalinum (S).  
هو البورج، نبات عشبي بري من النجيليات.

## ١٥٤٠٢ - شَعِير أَعْقَر

Egipso (F).  
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لقرنين وهو كثير الانتشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

## ١٥٤٠٣ - شَعِير الْكُتْبَان، أَيْمُون الرَّمَال

Hordeum jubatum (S).  
الانشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

## ١٥٤٠٤ - شَعِير أَعْقَر

Orge en crinière (F).  
نوع من الشعير البري الحولي يزرع لقرنين وهو كثير الانتشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

## ١٥٤٠٥ - شَعِير أَعْقَر

Hordeum jubatum (S).  
الانشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

## ١٥٤٠٦ - شَعِير أَعْقَر

Hordeum jubatum (S).  
الانشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.

## ١٥٤٠٧ - شَعِير أَعْقَر

Hordeum jubatum (S).  
الانشاء يملو من ٣٠ الى ٣٥ سم. ساقه مستقيمة متدلية تطول نحو ١١ سم. شامها كثيف التجميع، نحيل القده، وردى اللون || أسبالة يادوم من حزيران الى تموز وأب.



شعاع



شعير الكلبان



شعير مروف

1٥٤٠٦ - **شَعَكَار** (E). *Désérénce* (F). *Escheat* (E).  
هي صفة الموراث التي لا يرث فيها أحد خضو آل بيت المال أو الحكوة .

1٥٤٠٧ - **شَعَلَاكَة** (E). *Silex* (F). *Silex*, *Flint* (E).  
حجر من الكفر قسده يوك شرارة .

1٥٤٠٨ - **شَعْرُور** (F). *Cyrtandrus* (S). *Cyrtandra* (F).  
جنس نباتات شحية وجنينة من فصيلة الشفروريات .  
أنواع المروضة نحو ٦٥ منظرها بري وبضها زراعي .  
زيتي ، مهدا المناطق الاستوائية الاسيوية والافريقية .

1٥٤٠٩ - **شَعْرُورِيَات** (S). *Cyrtandraceae* (S). *Cyrtandraceae* (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وسيدة الغمالة . اجناسها  
وانواعها كثيرة البلد تجمعها حسة اذوات . جميعها من  
نباتات المناطق الحارة والاسيوية || اوراقها كاملة  
منقطة لا تقايمة التريب ، ثمارها حبة الشكل .

1٥٤١٠ - **شَعَف** ، **شَعَلَف** ، **شَعَلَفُور** ، **شَعَب**  
غلاف القلب . *Pericardium* (E). *Péricard* (F).

1٥٤١١ - **شَعْنَب** ، **شَعْنُوبِيَة** (F). *Pousse anticipée*  
هو الفصن الربط النضر الحول العمر . ج شغاب وشغابين .

1٥٤١٢ - **شَعَوَاك** (E). *Aigle* (F). *Eagle* (E).  
هي العقاب سميت بذلك للضل منقارها الاعمل على الاسفل .

1٥٤١٣ - **شَعِيْرَة** (F). *Aiguille à enfiler* (F).  
مير جهلي مستطيل ، مبط التصل الحاد ، مدبب  
الطرف ، يستعمل في شك اذوال التبع .

1٥٤١٤ - **شَعَاكَة المَحْصُوط** ٥  
*Chellinus mediterraneus* (S). *Chellinus de la Méditerranée* (F).  
*Chellinus mediterraneus* (E).

سكة بحرية بيوض من فصيلة الكيدسيات شاككات الزمانف .  
اصطانتها منظر اقاليم البحر الابيض المتوسط || سرسها  
المباح وبماضب النشاف . قنبا النباتات البحرية والبدانف  
والمداد الضوية || جسمها اعطليجي الشكل ، مستدل  
التيطوط ، يطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . حرافها ككية .  
نورها الى الزرقة السراء وملوها مروج آخر يقب في الرأس  
والظهر ويبر ويبيض في البطن . زانفتها الى الزرقة البحرية  
ملوها بلنجع مبرش آخر في الظهرية والشرجية والذيلية ||  
رأسها مخروطي الشكل ، غليظ الشفة العليا المشطعة .  
شغلها مستدل الانفراج . استانتها قاطمة مثلة الحدة . حينها  
صيرتان ، مستديرتان ، ماصتان . زانفتها الظهرية  
والخوضية والشرجية تحوي بعض المناسن الحادة . زانفتها  
الذيلية محدة الطرف || لها جبد الصف ، مرفوب فيه .

1٥٤١٥ - **شَعَاوِي** ٥  
*Dipus gerbois* (S). *Gerbois gerbois* (F).  
نوع من البرابيع الافريقية . يقال لها شأن البرابيع وزفول  
القبيل وهي اسمها وافضلها : يكون في اذنانها طول وصلها  
بعض الحب . اجسامها ربة الجفة تطول نحو ٢٠ سم .  
اما اذنانها فتطول نحو ٢٢ سم . اوتواها الى الصبهة  
الربداء وملوها مروج اسمر .

القروب والاصرام ، شائع الزراعة ، مستدل الانتاج حيه  
يحوى ٩٠ ٪ من النشا يستعمل في غذاء الانسان والحيوان  
وفي صناعة الجعة (كبير) ويورها من المستامات الكسولة .  
ينبت في جميع اقاليم الحفنة ويفرطها قدرة على مقاومة  
الحر والبرد . يرغب في الاربة التي لا تقتدر الى الكلس  
ودو في الاربة المتوسطة الاندماج ، السيقنة التور ،  
اوفر انتاجا واحسن صفا . وفي حالة امتداد التور  
الزراعية يحد حطب الحفنة والبطاطا والشمندر والقمطن  
وعطلف التفتايات . وين خصائصه انه لا يكثر من تعيل  
التلاء الا في شرطين من دورته الحياتية . الفترة الاول  
تستمر من الاندماج الى الاسبال والفترة الثانية من الانزهار  
الى النضج || ساقه جوفاء مستطيلة السلايات . اوراقه  
صغرة الشكل ، اذنية الهند . مستطيلة التصل . سلبته  
متصلة القذ ، ثلاثية الصف والسيلايت . زهره ثلاثية  
الاصمية . رباعية الصفيفات المقوسة الى جداليتين  
وبشرتين || غروبه كثيرة البلد تقسم الى ثلاثة اشكال :  
- قسم الشعير السداسي الحب وهو الذي تطفح جميع  
ازهاره فيتكون صف سيلايت من ثلاث حبات يتقابل  
صف مائل من ثلاث حبات .

- قسم الشعير الرباعي الحب وهو الذي تقطع فيه الزهرة  
الوسطى فيتكون صف سيلايت من سيتين يتقابل صف  
مائل من سيتين .

- قسم الشعير الثنائي الحب وهو الذي تطفح وتضرب  
فيه الزهرة الوسطى دون غيرها فيتكون صف سيلايت من  
حبة واحدة يتقابل صف مائل وسيد الحبة .  
اشهر غروبه واعما زراعة ما يتبع .

الشعير الاجرد ، شعير سموي *Hordeum coeleste* (S). *Orge céleste*, *O. nue* (F).  
سداسي الصف ، اجرد الحبة يرغب في الاربة الفتية  
والاقاليم الرطبة .

الشعير الاسود *Hordeum nigrum* (S). *Orge noire* (F).  
رباعي الصف . كبير الحبة ، اسود الحسكة ، يجد في  
جميع الاربة المستعدة الحصب . وهو من الانواع الوفرة  
الانتاج .

الشعير المخطط ، شعيرة *Hordeum hexastichum* (S). *Orge hexagonale*, *O. à six rangs* (F).

سداسي الصف ، حديد الاصرام جميعها وافر الانتاج  
يرغب في الاربة الخسبة التي لا تقصها الرطوبة الزائدة .

الشعير المروحي *Hordeum macrotum* (S). *Orge en éventail* (F).

رباعي الصف ، كبير الحبة ، منظر الانتاج في الاراضي  
المروية يهده في الزراعات المحلية ، لكنه يرغب في الاربة  
الخسبة الصيقة التور .

الشعير النحوي *Hordeum tetrastichum* (S). *Orge à quatre rangs* (F).

رباعي الصف ، متوسط الحبة ، مستدل الانتاج يحد  
في جميع الاربة المحلية ومنها الخفيفة والقليلة التور .

1٥٤١٤ - **شَعِيرَكَز** ، **شَعِيرَكَز** ، **شَعِيرَكَز** ٥  
*Amygdos*  
خبرة منقلة تربد في الرضاب وفي النبات ولذا تدعى خيرة  
الشعير التاتس ، تذيب في الماء حين الحبوب وتستعمل في  
تحويل النشا الى ملنوز .

1٥٤١٥ - **شَعَاكَة** (E). *Asymétrie* (F). *Asymmetry* (E).  
هو عدم التناظر أو التبادل .



شَعَاكَة المَحْصُوط



شَقَاوِي

١٥٤٢٧ - **شَفِيرِيد فُشِي** ⑤  
Shepherdia argentea (S). Shéphe'die argéntée (F).  
Silver shepherdia (E).  
نوع من الشفريد ، شجيرة تملو نحو ٥ أمتار. اغصانها  
شائكة. اوراقها بيضيه ، سائيه ، مستطيله ، نصلها  
حورني البشرة النضيه على صفحتيه . ثمارها حلزونه مأكوله.  
تزرع القزوين .

١٥٤٢٨ - **شَفِيرِيد كَنْدَا** ⑤  
Shepherdia canadensis (S). Shéphe'die du  
Canada (F).  
نوع من الشفريد ، شجيره تملو من متر الى ثلاثة أمتار.  
اغصانها سرسه . اوراقها بيضيه الشكل . نصلها اخضر  
الصفه العليا ابيض السفلى بشرتها حورنيه خليه . ثمارها  
تقنه . تزرع القزوين .

١٥٤٢٩ - **شَشَفِي**  
Umbra  
جنس اسماء نهرية تنمو بالفلاذ ، اطاليا .

١٥٤٣٠ - **شَشَفِي**  
Umbra (S). Ombrine (F).  
جنس اسماء بحريه من فصيلة البهاريات . انواعه المعروفة  
ثلاثة ، اقلها يمتد من المحيط الهندي الى البحر الاحمر  
فالتوسط فالبحر الاطلسي الجنوبي || أشهر انواعه  
واعماها الشغشف البهليل .

١٥٤٣١ - **شَشَفِي صَبْدَلِي** ⑤ ، كَرْبَل  
Umbra cinerea (S). Ombrine commune (F).  
نوع من الشغشف وهو سمكة مأكوله كبيرة الله ، اطليجية  
الشكل ، وديته لذلك الاسهل . مستطيله الزعنفة الظهرية .  
ظهورها اصفر اللون ، لزرق التشفيج . ينجذب الى الرودة  
القضية . مرتها على حديد المياه الاقلية . يقترب من  
المباحث والكشوطي في فصل الشتاء والربيع .

١٥٤٣٢ - **شَشَفُوف** هو الضمير . اطليه .

١٥٤٣٣ - **شَفَع**  
Pair (F). Even (E).  
ازواج من العدد . شفه وتر .

١٥٤٣٤ - **شَفَعَكَة**  
Prémption (F). Premeption (E).  
حق ينزله القاتلين في شراء مال معين . راجع حق القلعة .

١٥٤٣٥ - **شَفَعِيَة التَرْكِيْب**  
Paripinnata (F).  
Paripinnata (E).  
نمت وصفي يطلق على الاوراق المركبة المتبعية بورتين  
متقابلتين .

١٥٤٣٦ - **شَكَلِي**  
Crépuscule (F). Twilight (E).  
هو الضوء الذي يشاهد بعد الغروب نتيجة لانكسار  
ضوء الشمس على تحت الاقاع على السحب او ذرات الغبار  
المنتشرة في الجو . وقد تختلف فترة الشفق مع المكان فينبأ  
هي قصيرة جداً عند خط الاستواء اذ هنا تمتد بضع  
ساعات عند القطبين .

١٥٤٣٧ - **شَكَلِي** ، **شَكِي**  
Crépusculaire (F).  
Crépuscular (E).  
نعت يطلق على ما هو متعلق بالشفق كقولك الضفدع الشفقي  
ومشرقة شفقيه المرتع أي انها ترتفع في ذن الشفق .

١٥٤٣٨ - **شَكَل** ، **مِشَقَلَة** هي القناسة ، اطليا .

١٥٤١٦ - **شَفَاف**  
Hyalin (F). Hyaline (E).  
ما كانت ظواهره كالتزجاج .

١٥٤١٧ - **شَقَان**  
Coquette (F).  
سمكة بحرية تدعى كيمية ملونة ، اطليا .

١٥٤١٨ - **شَقَان**  
Vent froid (F). Cold wind (E).  
الريح الباردة مهما كان مهجا .

١٥٤١٩ - **شَكَة** ، **شَفَكَة**  
Labium, Labre, Lèvre  
الشفة من الحيوان والخرقة : طبق له . وما شفتان مليا  
وسفل تستران الفم وما فيه .

١٥٤٢٠ - **شَقَنَسَة** ⑤  
Syngénésie (F). Syngenesia (E).  
هي التتصام الاسمية بواسطة المآبر .

١٥٤٢١ - **شَقَدَع**  
Ralesto  
هو الشرفوف .

١٥٤٢٢ - **شُكُر**  
Lèvre de la vulve (F).  
Lip of vulva (E).  
سرف الفرج من ناحية انثوية وما شفران .

١٥٤٢٣ - **شَفِيرِيد**  
Stacholite (S). Stachéline (F).  
جنس شجيرات وشجيرات ممرية من فصيلة المركبات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد منها يمتد بعض مناطق حوض  
البحر الابيض المتوسط || سطها متصبية ترتفع من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقها عابية ، متعاقبة ، مدقة ، سنانية  
التصال الخليلية البذرة ، الغضبية الصلصبات الحفل .  
انزهارها حثكولي التجميع . انزهارها صغيرة الله ، متباعدة  
الاولان منها التبنسي الوردى المزاج ومنها الازرقاني ||  
انزهارها يستمر من ايار الى ايلول .

١٥٤٢٤ - **شُفْرُوسِ اصْفَر**  
Ursinia lutea (S).  
Sphéogynae jaune (F).  
عشبة تزيينية حولية ، حولية ، من فصيلة المركبات . مهدا  
افريقية الجنوبية || ساقها فرعاء تملو نحو ٦٠ سم .  
اوراقها متعاقبة مفردة وسنة . رؤيساتها الزهرية الى  
الصغار الكثيرة الزاهي . جليها ارجواني || انزهارها يستمر  
من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٥ - **شُفْرُوسِ اَبْيَض**  
Ursinia pulchra (S).  
Sphéogynae élégante (F).  
عشبة تزيينية حولية من فصيلة المركبات . ساتها فرعاء  
تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم . اوراقها متعاقبة مفردة شبيهة  
بارواق البانينج . انزهارها طرفي . انزهارها رؤيسية .  
رؤيساتها يرتقائية اللبسات ، صفراء الطياب ، مطوقة  
بالاسود || انزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٥٤٢٦ - **شَفِيرِيد**  
Shepherdia (S).  
Shéphe'die (F).  
جنس شجيرات حرجية وتزيينية من فصيلة الخلائيات .  
انواعه المعروفة اربعة . تملو من متر الى ستة أمتار .  
اوراقها كاملة ، مدقة ، متعاقبة ، حابية . انزهارها  
سنبل او عنقودي التجميع . انزهارها ثنائية المسكن ، صفراء  
اللون . ثمارها كروية الشكل ، يرتقالية اللون ، قشرها  
من ٤ الى ٨ سم . || أشهر انواعها ما يلي .



شفف مبليل



flower (E). Gartsanemone, Krönenwindröschen (D). *Anemone coronaria*, *Anemone scapula* (I).  
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٥ الى ٤٥ سم. اوردته سداة اللين . ساقه فداء . لوراته قلبية التفريص . ازهاره كبيرة القدة ، مسطرة البتلات نينا الياض والاخر والاروق واليفسجي والوردي والابيض . ازهاره يندوم طولك الربيع .



شَقَاة

**١٥٤٦٦ - شَقَار الجندل** *Anemone pulsatilla* (S). *Anémone des ruisseaux* (F).  
نوع من الشقار يملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. جلده جني الشكل . اوردته لاسقة . ازهاره خاسية البتلات الزرقاء اللون ، الصفراء الاسدية ، منته غلاف الانهر والجداول . ازهاره يندوم طولك شهر نيسان .



شَقَار اكليل

**١٥٤٦٧ - شَقَار الغلب** *Anemone nemorosa* (S). *Anémone des bois*, *Fleur du Vendredi-Saint*, *Sylvie* (F).  
نوع من الشقار يملو نحو ٢٥ سم. ساقه مدادة . لوراته معتقة . ازهاره سداسية البتلات ، يضاء اللون او حمراء وبه شروب زرقاء اللون زاحية || ازهاره يستمر من اذار الى نيسان .



شَقَار الغلب

**١٥٤٦٨ - شَقَار المصح**  
هو شقيق النيان الملهل ، اطله .

**١٥٤٦٩ - شَقَار اليابان** *Anemone japonica* (S). *Anémone du Japon* (F).  
نوع من الشقار للكبس يملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. لوراته مركبة ، شقيقة القصوص المسنة الحافة . ازهاره مكسبة ، كبيرة القدة ، كثيرة البتلات التي يراوح حددها من ١٨ الى ٢٤ سم. نينا الياض الثلجي او الياض الوردي للملج || ازهاره يستمر من آب الى تشرين .

**١٥٤٧٠ - شَقَار بترى** *Anemone sylvestris* (S). *Anémone sauvage*, *A. sylvestre* (F). *Snowdrop anemone* (E). *Grosses windröschen* (D). *Anemone silvestro* (I).  
نوع من الشقار يربط في الاتربة الكنسية وهو من نباتاتها الحولية . يملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقه فردية منتصبة وسيدة الزمرة . اوردته معتقة . ازهاره كبيرة القدة ، يضاء اللون او وردية ، خلية البصرة ، زبده الكرابل التي تبدو ككثف القطن || ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .



شَقَار اليابان

**١٥٤٧١ - شَقَار كزيمي هورق** *Anemone vitifolia* (S). *Anémone à feuilles de vigne* (F).  
نوع من الشقار يملو من ٦٠ الى ٨٠ سم. ساقه فداء . لوراته قلبية الشكل ، خاسية التفريص ، نصلها مفاري الحافة ، خلي الصفصفة السفلى . ازهاره كبيرة القدة ، ثمانية البتلات البيضاء شكلًا ولونًا || ازهاره يندوم طول شهر ايلول .



شَقَار بري

**١٥٤٧٢ - شَقَار كوكبي** *Anemone hortensis* (S). *Anémone des jardins*, *A. étolée*, *A. oeil de paon* (F). *Garden anemone*, *Star anemone* (E). *Sternwindröschen* (D). *Anemone stellata* (I).  
نوع من الشقار عديد الشروب والاصرام . يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم. اوردته ثلاثية او خاسية التفريص ، مسنة الحافة . ازهاره نجمية الشكل ، شقيقة البتلات انقارضة المختلفة الالوان السود الاسدية || ازهاره يستمر من ايار الى سوزان .

**١٥٤٧٦ - شَفَوْت** *Cheviot*  
سلالة شقان مهددا البلاد البريطانية تتميز بنزارة سوطها وبيضة سنفه .

**١٥٤٧٧ - شَقِي** *Sexa* (F). *Sex* (E).  
هو جلة الصفات الخلقية التي تكن للذكر او للانثى . وهو ايضا مجموعة الافراد من ذوات الاعضاء التناسلية المائلة .

**١٥٤٨٠ - شَقَاة** هو الكبير ، اطله .

**١٥٤٨٩ - شَقَاة** *Pigment*  
كل مادة صبغية عضوية تلوّن اللصج . ج شقاقات وصبغات وطلائع وصبغاب .

**١٥٤٩٠ - شَقَاة** *Pteropus* (S). *Rousette* (F).  
جنس حيوان من فصيلة الخفاشيات . انواده نحو ٦٠ جميعها ثائرة ، بقره ، كبيرة القدة ، مستطيلة القرطوسية اللافة المدية . ازهارها تختلف مع الانواع لكنها سوية الالوان وتطورها ابيض من اكناتها واعتاقها || قلوبها الهند وافريقية الشرقية وجزر المحيط الهادي حتى استراليا . اشهر انومها ما يتبع .

**١٥٤٩١ - شَقَاة الهند** *Pteropus medius* (S). *Rousette de l'Inde* (F).  
نوع من الشقاقات ، طولها نحو ٢٣ سم. رأسها الى

الجزء . جسمها مثني اسير يطوى ملج . جفوي يخفي السرة او زبكا || موطنها فصح الارض بينه من الهند الى شرق العرب ومن الهند الى سرنگيب وبلقه وانام . تعيش جماعات كبيرة يراوح حددها من ٥٠٠ الى ٢٠٠٠ . تألف اسراج الخمر وغابات الخيزران تملك بقضبانها ورافدها طولك البهار . تسرح في طلب قوتها من القروب الى الشروق . قوتها البهار على اختلاف اجناسها وانومها ما دعا البرتقال .

**١٥٤٩٢ - شَقَاة مأكولة** *Pteropus edulis* (S). *Rousette comestible* (F).  
شقاة كبيرة القدة طولها نحو ٤٥ سم. وبسطةا نحو ١٦٠ جلدها شقن للملص . قرطوسها اسفي الشكل . اذنها مستطيلة ذائفة . لونها الى الخشنى الاسمر ، حايق الظهر والراس ، زامر البق والصدر والابن || موطنها الهند وسومرا وبنار وبلقه . تعيش جماعات متفرقة يراوح حددها من ٥٠ الى ٢٠٠ . تألف الاسراج القليلة . مسرها من الشقق الى الفجر . قوتها البهار ويبيض الحبوب . لا تقرب البرتقال . شها ما كوكب يفاعرون به .

**١٥٤٩٣ - شَقَار**  
هو البهار ، مسكة طويلة السنام من الشطط .

**١٥٤٩٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اليمون**

**١٥٤٩٤ - شَقَار ، شَقَارِي ، شَقَر ، اليمون** *Anémone* (F). *Anemone* (S).  
جنس نباتات عشبية ، سبروتية ، معمرة من سبط الشفاريات وفصيلة الشفقيات . انواده عديدة مسطها بري وبسطةا زراعي زديني جميل الازهار المتعدة الالوان || اشهر انومها ما يتبع .

**١٥٤٩٥ - شَقَار إكليبي** *Anemone coronaria* (S). *Anémone des fleuristes*, *A. à couronne* (F). *Crown anemone*, *Poppy wind-*

هامة ، متكونية التجميع ، مستطيلة المائل || يقال انه مروج الرتبة الجسدية لانه يثير المراكز التنسية المهمة بها . وهو مدر للثقل وقد يسقط الحمل في اولى عهده . ويقال ان كثرة استعماله تسبب ردة فعل ناكسة ، مظهرها وزن شامل يعطو حصى مشتك .

#### ١٥٤٨٢ - شَكَل \* شَوَلَك

Praslon (S), Praslon (F), Great hedge nettle (E), Klippenlippe (D), Prasinne, Praslon (I).

جنس نباتات جنية برية من فصيلة الشفويات . انواعه قليلة . بعضها زهرها . اوراقها متعاقلة ، مستطلة ، نصلها قلبي للشكل ، مسن الحافة ، حطري الرائحة . ازهارها حطرية العرف ، تنجبه الاوتكاز . قالوا انها لا تنمو من للناضج الكلية دون ان يحدها .

#### ١٥٤٨٣ - شَكَاكِي الشَّان

هو الحيطان الاسوي ، اطبه .

#### ١٥٤٨٤ - شَكَب

وهو جنة كالكب ، واحده شكة . وهو شجر له خضرة وورق . ينبت كالزمان وورقه كورق السدر وينتاه كالكب وفيه ثوبى . (ابو حنيفة) .

#### ١٥٤٨٥ - شَكَب

مهواة ما بين كل جبلين . يقل مدح في كهوف الجبال ويصوبها الشارقة على الاودية يورق فيه العلي . ج شقاب وشقوب .

#### ١٥٤٨٦ - شَكَبَان \*

Mégapode (F), Megapod, Mound-bird (E).

جنس طير من فصيلة الشقباتيات . انواعه عديدة جميعها كبيرة الجثة طويلا من ٦٠ الى ٩٠ سم . وريثها واضائها صلهام طلاء . اجنتها مستديرة ضيقة . ارساغها وعضاها قوية . اثارها الى السرة السوية المنطقه المروج || تأتف الاحراج القريبة من الشواطئ . تعيش ذكرا وانثى كالحمام . ارساها كثيرة البند . قنسا الثار والجوب والهدان والحشرات || انثاها لا تحسن البيض بل ترصفه في حفن خاص من الرمل والفض والورق تقيمه قرب الشاطئ على حديد مرمى الله . شكله كالقنصة الكبيرة علوه نحو ٤ اطار وطوله من ٤٠ الى ٤٥ م . || والانثى تبني في موضعها من ١٢ الى ١٥ يضة بين الواحدة والاخرى ١٣ او ١٤ بيضا || اما البيضاء فتتفت بدد وضها باسبوسين من فرخ نشيط كاسي . فريش يدبر امر نفسه بدون عناء مستنفا من امه التي يجهلها .

#### ١٥٤٨٧ - شَكَبَاتِيَات

Megapodidae (S), Megapodidae (F), Megapodidae (E).

فصيلة طير من رتبة التيجانيات اجناسها اربعة . طيورها متوسطة القند او كبيرة . قوية النغار الاحسن . غالبها مستطيلة . اظفارها كبيرة متعقبة . اثارها الى الالوان المايقة || اجناسها الشقبات والبطاب والبن واليترس . طيورها تتميز بدم حنبا البيض وبالخاص التي تقيها .

#### ١٥٤٨٨ - شَقَّ

Quartier (F), Quarter (E).

ربع الحيوان الدابح .

#### ١٥٤٨٩ - شَقَح

شَقَح المجوزة : استخرج ما فيها .

#### ١٥٤٨٣ - شَقَار تَرْجَمِي \* ، شَقَار صِيَالِي

Anemone narcissiflora (S), Anémone à fleur de narciss, A. en ombelle (F), Narcissus flowered anemone (E), Bergwindröschen, Narzissen-Anemone (D), Anemolo narciss (I).

نوع من الشقار يلو نحو ٤٠ سم . اوراقه ثلاثية او خماسية للتفرغ ، نصلها خلي البشرة حل مسخته . ازهاره صيالية التجميع ، مستطيلة الامن ، يضاء اللون ، وردية الصفة الخارجية || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٥٤٨٤ - شَقَارِي

هو الشقار ، راجحه .

#### ١٥٤٨٥ - شَقَارِي \*

Psemmophis schokari (S), Couleuvre schokari, Schokari (F).

Schokari sand snake (E). الاسم النوبي العلمي والفرنسي والانكليزي مأخوذ من العربي . حية يهوس من البراريات وفصيلة الحشويات خليات الاعاويد || جسمها مستطيل الجرم بطول نحو ٦٥ سم .

ثوبها الى الزبد الحنطية يملوها اربعة عطوط يفض جانبية ما يحيل مايتها تصرف بالنسبة الى النور من الشقرة الصائية الى الحنطية . مدنها غير اسر . رأسها لوزي الشكل . عينها صديرتان فرتان . زاوية خلفها متوسطة الانتراج . عدد اسناتها ٥٤ منها ٣٠ في الفك الاسفل و ٢٤ في الاعلى من اصلها اربعة عتاف ثابتة غلظية الاوتكاز || تأتف اقبال والبراري . قوتها كل ما دب وتمكنت منه . تعبر من الشبان المؤدية .

#### ١٥٤٨٦ - شَقَارِيَات

Anémones (F).

سبط من فصيلة الشفويات ، اشهر اجناسه الشقار .

#### ١٥٤٨٧ - شَقَارِين

Anémone (F), Anemone (E).

مادة جصائية صالحة ، يضاء اللون ، لا عرف لها ، تستخرج من اوراق الشقار . وهي قليلة الاويان في الماء والكمول والايان . ثلوث وتشتل في السوال القلوية فيتم صبا الحامض الشقاري .

#### ١٥٤٨٨ - شَقَاكَاة

Partibilité (F), Partibility (E).

قابلية الانقسام .

#### ١٥٤٨٩ - شَقَاكِي

Javert (F), Ulcer on pastern (E).

نخر في اللسع الكلية والندرسية من الاجزاء السفلى في قوائم الخيل . والشقاق قد يكون :

شقاق جلدي .

شقاق غضروفي .

شقاق وتري .

#### ١٥٤٩٠ - شَقَاكِي

Ranchage (F), Dressing (E).

الشقاق او الفتح هو حوث الارض سراحة متباعدة الاكلام .

#### ١٥٤٩١ - شَقَاكِل \* ، سِيَسَاكِلِي حَشَقَاكِل

جَزَرُ الصِّلَاطِي ، حَرْمُ الصِّلَاطِي

Pastinaca schekakul (S), Sécacul (F), Rough parsnip, Sécacul (E), Schekakul (D), Pastinaca (I).

نوع من السيارون البري وهو نبات طبي مشي مدور غليظ الجذر . ساقه اسطوانية فروع تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . اوراقه مركبة ، متعاقبة ، لائحة الصلع . ازهاره



شَقَار رَجَمِي



شَقَارِي



شَقَال



شَقَال



شَقَان



١٥١٩٠

شقق واشقق البسر : تلون . وقد شقي عن يمينه قبل ان يشقق || وشقق النخل : ازمى .

## 10491 - صفحة

الشفة: ظبية الكلية وقيل مسلك التضييق من ظبيها .  
قال الفراء : يقال لحياه الكلية ظبية وشفة ولذوات الحافر

۱۵۱۹۲ - شکست

١٥١٩٢ - شَكْحَطَب  
Bélier à 4 cornes  
الكبش الذي له أربعة قرون. جر شقاسط وشقاطب.

## ١٥١٩٣ - شقة

**Gomphocarpus (S). شِفْدَة ١٥١٩٣**  
**Gomphocarpus, Faux cotonnier (F).**  
 جنس نباتات معمرة من فصيلة السقياقيات  
 العدد: جميعها نباتات تنضجة تلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم.  
 فروصها دقيقة زغبية اللحاء. أوراقها متضاربة، سنانية،  
 سيقانها. تصلها الخضر اللون، مائل البشرة على صفحي.  
 أزهارها خيمية التجميع صوبياها يعد من ٨ الى ١٢ أزهار  
 الوسا إلى البياض الماسي. وهي من النباتات الكثيرة الإزهار  
 والأوراق مستقيمة من حذر إلى الأعلى.

١٥٤٩٤ - مُكْدُم

Grenouille (petite) (F).  
Frog (small) (E).

١٥٤٩٥ - شُكْرُ عَمَات

١٩٩٥ • تشخيص عيانت

**Microhylidae (S).**

**Microhylidae (F).** **Microhylidae (E).**

فصيلة حيوانات دودة قاذبة من عدة الجمعيات ويرية السونيات ويرية البزاقات أي عديدات الذنب • أنواعها المعروفة كالمدة المدل لا تقل عن ٢٠٠ منتشرة في جوتي شرقي آسيا وفي افريقية وأريكة الشمال والجانبية • جميعها من الضفادع الصغيرة القد . تتميز بمساحة سطح ضلعي قوسها الصدري في مركز قنطرةها ويصعد الترسية العظمية الجانبية في قعره الجوف • رؤسها صغيرة مستطيلة الاطراف . تكوّنهما العليا مستنة . أوضاع قوائمها الامامية طليقة أما الخلفية فترافق القيد الخفايا • طولها صفائون الاشكال والثالثة الانظمة الصلبة . ألونها ابيض اسفان . تكثر في المسرة الدائمة والخضار الغنيس والرفقة والرطوبة • معظم أنواعها يعيش على النباتات والاشجار القريبة من الغدران والتمتع بجداري الماء • انثاها • اكبرها الباقية . تُسرأ في الماء الفصل . بلاحيها عادمة الخلف القربي والاسنان الشفوية .

١٥٤٩٦ - شلند - هو الحرباء ، اطلها .

۱۵۱۹۷ - شُکُذَّان

١٥٤٩٧ - شَكْدَان \* Taphius (S). Taphien (F).  
جنس خفاشيات من عائلة الترامسات . أنواعه قليلة جميعها  
صغيرة القد . رؤوسها مستعرضة ، فرائطها ذاتة . شفاها  
العليا مقشرة وعريضة || موطنها الهند الصينية . تعيش  
على اجساد قنديل العمد . تسرح في الليل . تهاج الخشرات  
جماع اختلافا . تألف الاجلج الحرسية لا تحب الاضلاع  
واسدته شائعة

١٥٤٩٨ - شك - هو الشك ، اظنه

١٥١٩٩ - شَعْبَانُ، شَعْبَانُ، شَعْبَانُ، شَعْبَانُ

جنس طير من فصيلة الشراقيات . اناؤه ١٥ جمها

١٥٥٠ - شُعْرُاقُ الْأَرْقِ \* ، شُعْرُاقُ شَالِمِ ،

**Coracias garrula (S). Roller شرقى**  
**vulgaris, Roller bleu (F). Common roller (E).**  
 روع من الشرق، وحطه الشرق الأوسط وأروبة الشرقية  
 الجنوبية وبلاد مصر. يحب مناطق الاوس الجسر المتوسط  
 رة في الامم. طوله نحو ٣٣ سم. لونه مركب الالوان  
 لتتخلط لزعامة الجميلة. يناب فيها الاغصن والازرق.  
 تنقلوه اسود، عيانه كستينيان، قاتمتا الى الصفرة  
 الصفرة الماس.

١٥٥١ - شِعْرُ أَقِي بِنْتِ عَلِيٍّ \* ، هُوَ هُوَ الْهِنْدِ

*Coracias benghalensis*, *C. indicus* (S.). Rollier du Bengale (F. Indian roller) (C).  
نوع من الشقراق ، موطنه الهند وجنوب الجزيرة  
والأفريقية الشرقية والشرق الأوسط . طوله نحو ٣٠ سم .  
ألوانه متراكب الألوان الزاهية يملأ فيها الأزرق والبنفسجي  
والخضضر والأصفر اللامع . وهو يصير المغار والذهب ،  
يستطيع الجناح . يألف الطيائن ويجاري الله . سره  
يبد من ٣ إلى ٥ أزواج .

١٥٥٠٧ - شِقْرَاقِ حَبَشِي، اُغْمِيل

*Coracias abyssinicus* (S). Rollier abyssin (F). Abyssinian roller (E).  
نوع من الشقراق ، موطنة الحبشة والسودان واليمن . طوله نحو ٢٧ سم . ثوبه مراكب الالوان مشيع الزرقة الزاهية . يتميز بريشتين مسطورتين تكسنان جانبي للذنب .

## ١٥٥٠٣ - شب القات

**Coraciidae (F). Coraciidae (F).**  
 فضيلة طير من الجواثم تشبه طيور حمامة وألوانها تتميز  
 بأصباغها الزرقة والبنفسجية المركبة الألوان الزائفة. مثاقيلها  
 خفيفة، قوية، حصة البهر، اجنتها وأذناها بيضاء اللون  
 الخوا، اسفانها قصيرة || موطنها يشمل جميع القارات  
 الأوروبية والاسيائية. قربها الحشرات على اختلافها والرسفات  
 وصغار الثدييات || تتغذى لوكانها في تجويف الأشجار  
 ولقالب المسحور. انثاها تضع من ٤ الى ٥ بيضات  
 فضفاضة متباعدة الكرو.

١٥٥٠ - شكراً إن شاء الله، فُحِصَتْ

اسم شامل أطلقوه على بعض الأمراض الفطرية من مختلف  
الانسان والانواع اغصها الدثمة والثمار والوريل والسبجة  
والشنة واللصيف واللصيف والاضطحة .

## ١٥٥٠ - شكر الناس

١٥٥٥ - شقرانيات  
Urdindae (F).  
فصيلة فطور من الشمرانيات ينظم اجناسها وانواعها ،  
بحسب الترتيب الحديث ، لا علاقة له بالاقتصاد الزراعي.

## ١٥٥٠٦ - شَهْرُ رَجَبٍ

15506 - شَقْرَدِيُون  
هو الثوم البري ، اطلبه .



شعراق ازرق



فقراق بنفالى

1٥٥٢١ - شُقِيص Copropriétaire (F).  
Joint-proprietor (E).  
شريك في ملك العقار . يقال هو شُقِيص في العقار .

1٥٥٢٢ - شُقِيصَة Rose des vents (F).  
في الفصنق ، اطلبه .

1٥٥٢٣ - شُقِيصِي أَجَر  
هو الخشخاش للموت ، اطلبه .

1٥٥٢٤ - شُقِيصِي الجَبَل  
هو الحوذان الثني ، اطلبه .

1٥٥٢٥ - شُقِيصِي التَمَنان ، هَوَاكِيَة Pulsatilla (S).  
Pulsatilla (F). Pulsatilla, Pasque-flower (E).

جنس نباتات عشبية مدمرة من سبط الفقاريات وعضيلة الشقريتين . انولاه قليلة البند جميعها جميلة المادة اللطيفة . سيروية ، تمش في جميع الموائل والأرتبة . جلورها حنايية خليقة . اوراقها جلورية الالتشاب . اشهر انولاه الثلاثة التالية .

1٥٥٢٦ - شُقِيصِي التَمَنان الجَبَلِي Pulsatilla alpina (S). Pulsatilla alpine (F). Mountain  
pulsatilla (E).

نوع من شقيق التمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٠ سم . يكثر في الاربة الرليلة الجبلية ، ازهاره كبيرة القند ، يضاء اللون ، زرقاء الموالج حل صفحتها الخاربية . ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

1٥٥٢٧ - شُقِيصِي التَمَنان الرِّيْصِي \* Pulsatilla vernalis, Anemone vernalis (S). Pulsatilla  
pratensis (F).

لوع من شقيق التمان ، يملو من ٢٠ الى ٣٥ سم . مهد جبال البلاد المعتدلة . اوراقه ابيدة ، لاشقة ، قدية . الثرفيس ، نصلها خلى البشرة . ازهاره متوسطة القند ، يضاء اللون حل صفحتها الداعلية ، ليلكية الصفحات الخاربية || ازهاره يستمر من نيسان الى تموز .

1٥٥٢٨ - شُقِيصِي التَمَنان المَبَلِيل \* ، شُقَار المَبَلِيل Pulsatilla vulgaris, Anemone pulsatilla (S). Pulsatilla  
commune, Fleur de Pâques, Herbe au vent (F). Pasque flower, Pass flower, Blue money (E). Echte kuh-schelle, Küchenschnelle (D). Pulsatilla comune, Fiore di vento, Erba del vento (I).

نوع من شقيق التمان ، يملو من ١٥ الى ٣٠ سم . يكثر بين الزروع وفي الاراضي البور . اوراقه نافذة تدهو بعد الاقترار وتصل في اواخر الخريف . ازهاره كبيرة القند ، قمرزية اللون ، بنفسجية الموالج ، فضية الزغب || ازهاره يستمر من اذار الى ايار .

1٥٥٢٩ - شُقِيصِي النُورُوط  
هو الحوذان الخريف ، اطلبه .

1٥٥٣٠ - شُقِيصِي حَكَلِي هو الحوذان الحقل ، اطلبه .

1٥٥٣١ - شُقِيصِي مَائِي هو الحوذان المائي ، اطلبه .

1٥٥٣٢ - شُقِيَّات Ranunculaceae (S).  
Ranunculacées, Ranunculacées (F).

عضيلة نباتية من ذوات الثلقين . انولاه المروطة زهاء ١٢٠٠ ، اجناسها ٣٠ يجمعها صفة اسباط اشهرها

1٥٥٠٧ - شُقُرُقِي هو الشقراق ، اطلبه .

1٥٥٠٨ - شُقِيَّات هي ملا البير وهي شيء كالبلغة العظيمة المراكبة الجيوب يحترق البير من فيه اذا هاج .

1٥٥٠٩ - شُقِيص Part, Portion (F).  
Share, Allowance (E).  
الشقس : النصيب والهم ولقطعة من الارض .

1٥٥١٠ - شُقِيَّات هو الاقتنا الحية ، اطلبه .

1٥٥١١ - شُقِيَّات Pot, Vase (F).  
هي الايصيص او المركان انه من غرت او فخار او غير ذلك يستعمل لزروع النباتات التزيينية البيتية .

1٥٥١٢ - شُقَل Pesée (F). Weighing (E).  
الشقل الوزنة والوزن . يقال اشقل في هذا البندار اي تته .

1٥٥١٣ - شُقِيَّات \* ، اصابع هرْمِيس ، حَكَلِي المَهْر Hermodactylus tuberosus, Iris tuberosa (S). Hermodactyle tubéreux (F). Finger of Hermes (E). Hermodactel (D). Hermodactillo, Iríde valluata (I).

نبات عشبي صفوي بري وزراعي من فصيلة السوسنيات . يكثر في الموائل الرطبة . صقله طية تستعمل استعمال السورميان ويستخرج منها سادة الثربطين . ماله خراشعة مبرقة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . تكتبي زهرة وسيدة عطرية القراكية ، كبيرة القند ، لونها الى الصفار الحظلي يملو موالج بنفسي . بتلاتها الخاربية اعلمجية لشكل مستديرة الطرف . بتلاتها الداعلية نسيقة النسل الدلق المنسوب ، صلتها جلولة ، خضراء اللون || ازهاره يدم من اذار الى نيسان .

1٥٥١٤ - شُقَمَكَة Papion chamaea (F).  
هو القردوح الخزيري ، اطلبه .

1٥٥١٥ - شُقَن Herzer (F). To harrow (E).  
شقن القرية : سلفها وبسطها .

1٥٥١٦ - شُقَوَاكس هو اللذن الاسباني ، اطلبه .

1٥٥١٧ - شُقِي Sexuē (F). Sexuality (E).  
كل ما هو ذات شق يمكنه من التماسل ان ذكراً او انثى .

1٥٥١٨ - شُقِيَّات ، جُنِيَّات Sexualité (F).  
Sexuality (E).  
مجسمة التماسر والفرق الجنسية الكلاسية الخاصة بالذكور والاناث .

1٥٥١٩ - شُقِيَّات Difforme (F). Deformed (E).  
نمت وصني يطلق على الحيوان القبيح الشكل .

1٥٥٢٠ - شُقِيَّات Chromatophore (F).  
Chromatophore (E).

الشقيقة خلية ملونة محيطيات من الشفاح عديدة الالوان ، انتشادها او انتشادها منوط بالحرفين . لللك يفيض الرغويات تمام الحق المحيطة فيه بمرسة فائقة لانها تحوي بعض هذه الخلايا .



شُقَل



شُقِي التمان الرِّيْصِي



شُقِي التمان المَبَلِيل

**Polymorphisme (F). ١٥٥٤٤ - شُكَاكَة ٥**  
**Polymorphism (E).**  
 تعدد الأشكال في مادة واحدة ، أو تعدد أشكال مادة  
 وحيدة تركيبتها الجزيئي لا تتبدل .



شُكْبَا

**١٥٥٤٥ - شُكْبُ ، شُكْبُ ، شُكْبُ ، بَكْسَاين**  
**Béccasine (F). Snipe (E).**  
 جنس طير من دجاج الارض . انواعه ستة جميعها من  
 القواطع . تتميز بأجسامها الصغيرة اللثة الهضبة الشكل .  
 أثوابها إلى السرة الخفيفة المرطبة المرقشة . منقوشها مسطحة  
 دقيقة . أرسافها حبيطة الجهة الامامية ، سرديّة الخلفية .  
 اصرت انواعها وأشهرها الشُكْبَا الصغيرة والكبيرة  
 والميلولة ، اطباها .



شُكْبُ الْبَحْر

**١٥٥٤٦ - شُكْبُ الْبَحْر \***  
**Centriscus (S).**  
**Centriscus, Béccasine de mer, Poisson trompette (F).**  
**Trumpet-fish (E).**  
 جنس اسماك بحرية من شاككات البحر . انواعه قليلة  
 مرتها مياه البحر المتوسط . جميعها صغيرة اللثة طولا  
 براوح من ١٠ الى ١٥ سم . تتميز بشكلاها المستعربة  
 وبأعطالها الانبوبية البنية الاطراف . أثوابها وردية  
 اللون ، ظهورها ملحية اللون ، جوانبها صفمية ، بطنها  
 فضية .



شُكْبَا صَغِيرَة

**١٥٥٤٧ - شُكْبَا الْبَحْر الْمِجَنَّة**  
**Centricus scolopax (S).**  
**Centricus béccasine, Béccasine de mer, Trompette**  
**de mer (F). Bellows-fish, Trumpet-fish (E).**  
 سمكة بحرية يبيض من فصيلة شاكبات البحر وردية  
 شاككات الزمائف . اصطلحها معط العالم البحر الابيض  
 المتوسط ويض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من اسماك  
 الغنق المتوسطة القنور . جسمها قريب الشبه بالشُكْبَا  
 العظيمة ، يطول من ١٢ الى ١٥ سم . لونها الى المرجاني  
 الاحمر المزجج تملوه شحنة خضية في الظهر ، فضية في  
 الجانبين وفي البطن . حوافها الظهرية جامدة صلبة ،  
 مجنحة الشكل . رأسها مستدلل الجرم ، غروبي الخيط ،  
 انبوبي الطول الاخير ، غطسي الطرف . لها عادم الانسان .  
 صيغها مستديرتان وليلتان . زعانفها متباينة الاشكال  
 والتركيب منها الصلبة والينة والكبيرة والصغيرة والمسطحة  
 لها كامن الصنف قل من يربط فيه .



شُكْبَا كَبِيرَة

**١٥٥٤٨ - شُكْبَا صَغِيرَة \***  
**Gallinago gallinula (S). Béccasine sourde, Focine**  
**béccasine, Bécot, Jaquet (F). Jack snipe (E).**  
 طائر من الشكب صغير اللثة طوله نحو ١٧ سم . قوته  
 يشبه قوت الشُكْبَا الميلولة . يحرب بلاد حوض البحر  
 المتوسط ويتقدم شرقاً حتى القفصا وروسيا .



شُكْبَا مِيلُولَة

**١٥٥٤٩ - شُكْبَا كَبِيرَة \***  
**Gallinago major (S). Béccasine double, Grande bé-**  
**ccasine (F). Great snipe, Solitary snipe (E).**  
 طائر من الشكب طوله نحو ٣٢ سم . قوته الى الصهبة  
 الخفيفة يعلوها مزج اسود وريقة يضاء . شتاته مناطق  
 وضفت بحيرات وأهوار البلاد الحارة . صغيفه يمتد من  
 سريره الى اذوية الشالاية .  
**١٥٥٥٠ - شُكْبَا مِيلُولَة \***  
**Gallinago scolopacina (S). Béccasine ordinaire (F).**  
**Common snipe (E).**  
 طائر من الشكب طوله نحو ٢٥ سم . قوته متواكب

الحذائيات والخرقيات والشقاريات والملمويات . جميعها  
 نباتات حفية أو شبه ليفية ، منتشرة في معظم اسماق  
 العالم . منها نباتات جمالية وأخرى طبية وبعضها زراعي  
 تريحي .

**١٥٥٣٣ - شُكْ**  
**Prise (F). Setting (E).**  
 الشك هو مقدار سرعة تماسك جبلة الامت .  
 فهو سريع اذا تماسك بين ١٥ و ٣٠ دقيقة . وهو  
 متوسط اذا تماسك بين ٣٠ دقيقة وساعتين . وهو بطيء  
 اذا تماسك بين ساعتين وسبع ساعات .

**١٥٥٣٤ - شُكْ**  
**Enflas, Enguirlander (F).**  
**To string, To engarland (F).**  
 ثقب نصال التبع بصلصوا وقد يتم ذلك بواسطة الشفرة  
 التي تخترق الفصّل لتسهيل مرور الخيط .

**١٥٥٣٥ - شُكَاكَة ٥**  
**Diététique (F).**  
**Dietetics (E).**  
 علم يبحث في قيمة المواد الغذائية والعامل الناتجة من سو  
 الاندفاع مع تحديد الاشكاد الثلاثة لكل مستهلك من  
 حيوان أو نبات .

**١٥٥٣٦ - شُكَار**  
**Lignivore (F).**  
**Lignivorous (E).**  
 نمت تعريفي يطلق على كل حيوان أو شجرة قوتها الشكر  
 والخشب .

**١٥٥٣٧ - شُكَاكَة**  
 كل قسم من ارض المزرعة خصص لزراعة معينة . يقال  
 شُكَاكَة ليع وشُكَاكَة ليع قول ... ج شُكَار .

**١٥٥٣٨ - شُكَاكَة \***  
**Fagonia (S). Fagonie (F).**  
 جنس نباتات حفية معمرة من فصيلة الباذليات . انواعها  
 ١٢ جميعها برية بعضها حوض البحر المتوسط . اوراقها  
 مستطبة ، مستنقة ، اذينية الزنبد المستطيل . نصلها ثلاثي  
 القصص ، ذات الطرف ، حاقب الخضار . ازهارها فردية  
 متجمعة ، محورية الزنكاز ، خاصة البتلوت ، لونها  
 غنفل باختلاف الانواع ، لها الاخر وبشقاته ثم  
 البشقي ثم الاصفر .

**١٥٥٣٩ - شُكَاكَة إِكْرِيْجِيَة ، شُكَاكَة عَرَبِيْجَة ،**  
**شُوكَان ، عَقْلُون الْغَزَال**

**Fagonia arabica, F. cretica (S). Fagonie de Crète,**  
**Trèfle épineux de Candie (F).**  
 نوع من الشكافة منبها حوض البحر المتوسط . ازهارها  
 قرزية اللون . قالوا انها طبية دون ذكر منافها .

**١٥٥٤٠ - شُكَاكَة صِنْفِيَة ، شُرَيْفَة**  
**Fagonia sinatica (S). Fagonie de Sinat (F).**  
 نوع من الشكافة منبها حوض البحر المتوسط . ازهارها  
 وردية اللون . يقال انها طبية .

**١٥٥٤١ - شُكَاكِي**  
**Onoporde, Onopordon (F).**  
 هي الاسون من النباتات الطبية ، اطباها .

**١٥٥٤٢ - شُكَاك**  
**Enguirlanderage (F).**  
**Enguirlander (E).**  
 هي عملية شك اوراق التبع بنظام وترتيب .

**١٥٥٤٣ - شُكَاك**  
**Aboc, Entrave (F).**  
**Clog, Hobbie, Shackle (E).**  
 وثاق تربط به يدا الفرس أو اسدي يدب بأسن ورجليه .

**1٥٥٦٢ - شكوي، مُطالبَة** Reclamation (F).  
Claim (E).  
هي مطالبة المزرع الاعتراف بحق مجيئه له . او اقرار  
حقه في حالة كائن يجب ان تكون له .

**1٥٥٦٣ - شكير** Aubier (F).  
Alburnum, Sap-Wood (E).  
هو القسم من الهيكل الخشبي الكائن بين اللحاء والخشب  
الصلب .

**1٥٥٦٤ - شكل ٥** Polymorphe (F).  
Polymorphic (E).  
متعدد الاشكال .

**1٥٥٦٥ - شكمة** Mors (F). Bit (E).  
حذبة اللجام الموضوعة الفم .

**1٥٥٦٦ - شكينوس\* ، شجرة اللفلفل الكاذب**  
Schinus (S). Schine, Faux pōlvrier (F). Pepper tree.  
Mastic tree (E). Mastixbaum (D). Aibero da pepe (I).  
جس اشجار وشجيرات برية وتربيتية من فصيلة البطيانيات.  
اوراقها متعاقبة ، مركبة ، وريشة . وريقاتها بيضيه  
الشكل ، تصلها سميك الصفحة . جمل الخضار الاسمر  
المايق ، ازهارها عصفودية التجميع ، حراء اللون او يضاء .  
ثمراها غنية الشكل ، حمصية اللد تبدو حراء اللون ثم  
تسمر || اوراقها وازهارها تتصل برامحة اللفلفل . يستخرج  
من اوراقها عطر شامع الاستعمال يدخل في عدة تركيب  
وستحضرات || انواعه المعروفة اثنان .

**1٥٥٦٧ - شكينوس بُطيني\* القزقي**  
Schinus terebinthifolia (S). Faux pōlvrier du Brésil  
(F). Brazilian pepper tree (E). Brasilianische Pfeffer-  
baum (D). Pepe del Brasile (I).  
نوع من الشكينوس شجيره تملو من ٣ الى ٤ امتار .  
يزرع القززين ويستحضر من اوراقه عطر اللفلفل .  
يستخرج من ساقه صمغ راتنجي يدخل في بعض المركبات .  
ازهاره يستمر من ايار الى تموز .

**1٥٥٦٨ - شكينوس رقيق** Schinus molle (S).  
Faux pōlvrier molle, Pōlvrier du Pérou (F). False  
pepper, Weeping pepper tree (E). Mollebaum,  
Amerikanische Pfefferbaum (D). Pepe del Peró,  
Falso pepe, Mole (I).  
نوع من الشكينوس ، شجيره تملو من ٧ الى ١٠ امتار .  
ورديقاته وريشة التجميع حدها يراوح من ١٥ الى ٢٧ .  
لصلها ستاني الشكل سنن الحافة . ازهاره محورية الايتكانز  
يضاء اللون . ثمار حمصية الشكل والقد ، حراء اللون  
تبقى عاتقة الى الشتاء || يستحضر من اوراقه عطر  
اللفلفل ويستخرج من ساقه صمغ راتنجي مضه يسول  
للمعدة || ازهاره يستمر من اواخر تموز الى اواخر آب .

**1٥٥٦٩ - شيل** Docynia (F).  
هو اللوسينييه شجرة مشرة ، اطليا .

**1٥٥٧٠ - شاكب ٥** Leersia (S). Léersie (F).  
جنس نباتات عشبية ، برية ، حولية ، مرغوبة من فصيلة  
التنجليات . انواعها المعروفة ثمانية متباينة بعض مناطق  
البلاد الحارة من الشرق والغرب || سوقها شطاف فراء .  
صفتها خفيف مستطيل . ازهارها متبلي التجميع . سبيلاتها  
متراسة . ازهارها خشوية .

النسبة والسرعة الحنطية المرفقة بالايض ، يسر ويميق  
في الظهور ، ينحرف الى الصهبة الشفراء في الصدر . عتقه  
يربطه الى البياض الاثير ، متقار مستطيل اسمر || اثناء  
تحليل الثوب عتق . يألف اللثاغ والمراعي والاراضي الرطبة .  
قوته للثيدان والحشرات والرخويات . يدخن اضمومه فوق  
الوقود الناشف بين الاشباب المتبقية . الاثني تيش من  
٤ الى ٥ يضاء تخضفها وحدها من ١٥ الى ١٧ يوما .

**1٥٥٥١ - شكبيات البحر** Centricidae (S).  
Centricidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شاكبات الزعانف . اجنسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد لا تتجاوز العشرة || اعطتها  
منظم بحار البلاد الحارة ويصف بحار البلاد المعتدلة الحارة .  
سرعها الاغواط والقفاف || تتميز باجسامها الربعية التي  
تطول من ١٠ الى ٢٠ سم . وباعظامها الحروفية الاثيوبية  
الالافار ، وبانذنها وبجنتها الظهريه الصلبة ،  
وبالمناسخ القوية الحادة التي تتقدم الزعانف الظهرية ،  
وبزمارتها الحويضية المتناسقة || الوأيا تراوح من الرودي  
الى المرجاني الاسف ومن القضي الى الذهبى || لشهر  
اجنسها شكب البحر .

**1٥٥٥٢ - شكدة** Ration quotidienne (F).  
Daily allowance (E).  
ما يكفي القادة يوما كاملا من الملف . حج الشكاد .

**1٥٥٥٣ - شكدة الصيانة ، شكدة العيش**  
Ration d'entretien (F). Maintenance allowance (E).  
الملف الذي يكفي الحيوان يوميا للعيش بلا عمل .

**1٥٥٥٤ - شكدة العمل ، شكدة الانتاج**  
Ration de production (F). Production allowance (E).  
الملف الضروري لحيوان العمل او الذي يمسّن او  
يدر الحليب .

**1٥٥٥٥ - شكدة النمو** Ration de croissance (F).  
Growth allowance (E).  
الملف الذي يكفي الحيوان للنمو والنمو .

**1٥٥٥٦ - شكدي\*** Diéetique (F).  
Dietetic (E).  
نعت تعريفي يوصف به ملابن الحمية او طريقة التشكيد .


**1٥٥٥٧ - شكدة** الشكدة : اثناء الفرع من الحليب .

**1٥٥٥٨ - شكع** شكع الزرع : كثر حبه فهو شاكع وشكع وشكوع .

**1٥٥٥٩ - شكل** Forme (F). Form, Shape (E).  
الهيئة الخارجية .

**1٥٥٦٠ - شكمة ، بؤمة ، علكة** Ration (F). علكة  
جزء من الشكدة وهو الغضة الواحدة من الملف البيوي  
المتوجب لحيوان .

**1٥٥٦١ - شكوة\* ، محي ، صلبه** Baratte (F).  
Churn (E).  
وهو مخفض فيه الكثرة لاستخراج الزبدة .



شكوة



شكينوس



شَلَح

Chalote (F). Chalze (E).

١٥٥٨٧ - شَلَحْ

عقوب سرتة البيضاء .

Stillation, Egouttement (F).  
Dripping (E).

١٥٥٨١ - شَلَحَلَة

التقطر نقطة نقطة .

Prangos (S).

١٥٥٨٥ - شَلَطَة

Prangosier, Foin du Thibet (F). Prangos, Hay plant (E). Tibetanisches Heu (D) Prangos (I).  
جنس نباتات عشبية برية مرعوية مسرة من فصيلة الخبيثيات . جلوسها عريضة ، سيقانها نجيلية قليلة القروص . اوراقها نازقة ، كبيرة القدد وبيضة . ازهارها صفراء اللون صفيرة || انبعاثها المرفوعة قليلة اشهرها مايلي .

١٥٥٨٦ - شَلَطَة الحَرَمُون  
Prangosier de l'Hermon (F).

نوع من الشلطة منبها جبل الشيخ والحرمون . اوراقها صفيرة القدد ، غليظة النصل . تستلها اللحية ويسم عليها الحليب .

١٥٥٨٧ - شَلَطَة عَشَقِيَّة ، قُرْش الضَّبْع  
Prangos asperula (S). Prangosier épre (F).

نوع من الشلطة منبها الجبال اللبنانية السورية للمتلة الانقطاع . اوراقها كبيرة ، مسطرية ، صميكة الصلصة الخشنة . لونها ابيض الفخار البحري الباهت .

١٥٥٨٨ - شَلَفَة \* ، غَرْلُوم \*  
Graphium

جنس فطور مجهرية من عصارة المديانبات وفصيلة الكعبليات . انبعاثها قليلة العدد ملونة الكرميات . منبها لقرية التي تعيش على بنس الاجبال الحربية اعصها الغرافار ومنبها الخشبية التي تتركب الابر الخشبية كالتلحاح والاباجص اذا واقفها ونشلتها عوامل البيئة .

١٥٥٨٩ - شَلَقِي ، شَلَقِيَّات ، اَشَلَق  
Sélaciens (F). Selachii (E).

رتبة اسماك غضروفية الزمانات . فصائلها واباجنها كثيرة العدد جميعها متوسطة وكبيرة القدد . اشهر اجناسها القروش والكوجج والمشار والياض والرمادة ، الخ .

١٥٥٩٠ - شَلَكَة ، شَلَفَة  
Œufs de lézard (F).  
Eggs of the lizard (E).

بيض النمل واشبلها .

١٥٥٩١ - شَلَك  
Anguille (F). Eel (E).

الشلك وسلك الشلك والزلز " هو الانقليس ، اطله .

١٥٥٩٢ - شَكَل ، كَالِج  
Paralyse (F).  
Paralytic (E).

مرض يسبب التهاب اللسان او اللسان القوي فينجم عنه الشلل .

١٥٥٩٣ - شَكَل وَرْدِي ، مُسَكَّرْدِين

Muscardinne  
مرض خبيث منه لا علاج له يسبب دود القز منه فطر مجهرى من الطلوسيات يدعى طلوسية بلسيانا (Botrytis) غيراته ذرية تغلفها الربيع وتغسل جسم الدود عن طريق الاكل تخلفني على الدم بعد أن تحوله الى سواض صفوية || مظهره الخارجي لمان في بشره الجلد يحميه اصفرار وردي ثم ارتقاه في الجسم زياد حتى الموت عند ذلك يصبغ الجسم ويسمر ثم تلوه ماجة صفراء اذا كان

١٥٥٧١ - شَلَحْ

نبات يعرف بحقيقة البركة ، اطلها .

١٥٥٧٢ - شَلَطَل \*

Spharites (S).

Sphérite (F). Sphaerites (E).

جنس حشرات من فصيلة الشلاطيات ورتبة خدييات الاجنحة . انواعها المرفوعة قليلة العدد منتشرة في معظم اقاليم البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صغيرة ، شبه بيضية اللون ، تطول من ٦ الى ٧ م . رؤوسها شبه مكورة . عيونها صفيرة ، بارزة . قرونها الاستشعارية صولجانية . تأشيرها وفكوكها غليظة . ملاسها كبيرة ، مسنة الحافة الداخلية . كواسها مستعرجة ، حادة الاطراف الجانبية والاسامية . الحادها لاسخة . قوائمها شديدة اللثظ . اثارها سوية الاولان ، تكثر فيها الجوزة السوداء المزاج || تعيش على البراز والمواد العضوية الفخرية والمنسلة .

١٥٥٧٣ - شَلَطَرِيَّات

Spharistidae (S).

Sphéristidae (F). Sphaeristidae (E).

فصيلة حشرات من خدييات الاجنحة . اجسامها وانواعها المرفوعة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها صفيرة ، شبه بيضية الشكل . تطول من ٥ الى ٩ م . رؤوسها مكورة . عيونها بارزة . تأشيرها وفكوكها لاسطانية . ملاسها الفكية كبيرة وصلية . قرونها الاستشعارية صولجانية . مركبة من ١١ فصلة . كواسها مستعرجة ، حادة الاطراف . الحادها لاسخة . قوائمها نشطة . ابراعها خمسية العقلي || تعيش على البراز والمواد العضوية والنباتية المتحللة || اشهر اجناسها الشلظ .

١٥٥٧٤ - شَلَاك

Cataracta, Chute d'eau (F).

Cataract, Waterfall (E).

منحدري مائي يتعرض بحرى البحر .

١٥٥٧٥ - شَلَبْ

Paddy

حب ارز غير المشور ويؤى زمت عنه جداته فهو الرز . واسمته شلبي .

١٥٥٧٦ - شَلَبَة \*

Schilbe (S). Schilbè (F).

جنس اسماك نهريه مأكولة من مفتوحات اللسانة وفصيلة السلوريات . انبعاثها صفينة جميعها من اسماك مياه البلاد الحارة والاستوائية . اجسامها صفيرة القدد ، جلوسها ماصة . رؤوسها مستدقة . ونسها قصير ، الوها الى الرتبة الكبرياء يملوا تنجوع اسيد || تصنيفها ياتي دون الوسط .

١٥٥٧٧ - شَلَبَة حَرَبِيَّة

١٥٥٧٨ - شَلَبَجَم

١٥٥٧٩ - شَلَبَجَم يَمَرِي

١٥٥٨٠ - شَلَبَج

١٥٥٨١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٢ - شَلَر

١٥٥٨٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٨٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٥٩٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٠٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦١٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٢٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٣٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٤٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٥٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٦٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٧٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٨٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٦٩٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٠٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧١٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٢٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٣٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٤٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٤ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٥ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٦ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٧ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٨ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٥٩ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٦٠ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٦١ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٦٢ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٦٣ - شَلَبَجِيَّة \*

١٥٧٦٤ - شَل

انواعها المعروفة قليلة أعطانها الشرق الأوسط . بعضها فراء .  
أوراقها السفلى قشائرية التصل وألمليا صغيرة مفردة أو  
مسننة . أزهارها صفراء اللون ، أرجوانية اللون . ثمارها  
خمرية . يزورها فردية . أحرف أنواعها ما يلي .

- E. tyrazus (S). شلوة قشائرية ، أبو قرن  
E. pterocarpus (S). شلوة جنية الثمر  
E. strangulatus (S). شلوة مخنقة  
E. arcustus (S). شلوة مقربة

**١٥٥٩٩ - شَلَوَف**  
هي البرعمة النامية على الساق الأرضية في الحليون والعليق  
وما كان على شكلها من النبات .

**١٥٦٠٠ - شَلَوَق ، شَمُوم**  
رعي لاهية مضيئة منها أزهر الجنوب .

**١٥٦٠١ - شَكُونَك**  
هي المواد القليلة الموجودة في نسيج الحيوانات الحية ،  
راسدتها شلوة .

**١٥٦٠٢ - شَم** راجع شامة .

**١٥٦٠٣ - شِمَاع ، شَمِيع**  
استمرار تقدم لنمو التنديمي في غطاء أعضاء النبات .

**١٥٦٠٤ - شَمَاذ** هو الشاهد ، راجع .

**١٥٦٠٥ - شَمَالِيَّات**  
Therididae (S).  
Thériddées (F). Therididae (E).

فصيلة عنكب من رتبة التريلاترات . اجناسها وأنواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم البلاد الحارة والمعتدلة  
الحارة . جميعها مفردة . منها الصغيرة الحجم والمتوسطة  
والكبيرة . تتميز بطولها المتضخمة المرفوعة وبجوانها  
المستقلة الأطراف || شعما دقيقة الحيك تتسببها على  
النبات وبين الحيازة وفي شقوق الصخور || أشهر  
اجناسها الثياذ والنداسجة .

**١٥٦٠٦ - شَمَار ، شَمَرَك ، شُومَار ، زَايَنَاج**  
Feniculum (S). Fenouli (F). Fenekel (D).  
Finocchio (I).

جنس نباتات عشبية برية طيبة معمرة من فصيلة الخيميات .  
أنواعها عديدة . بعضها كثيرة الفروع خضراء اللون .  
أوراقها مركبة شديدة الخضار الباق ، كثيفة الملمس  
وأقعد السطرية ، فواصة العرف الذي || أشهر أنواعها  
التيار الحلو .

**١٥٦٠٧ - شَمَار المَاء**  
Phellandria aquatique (F). هو الشرطوط المنقي ، اطبخ .

**١٥٦٠٨ - شَمَار حَلَو**  
Feniculum officinale (S). Fenouli officinal, Aneth  
doux (F). Common fennel (E). Echter Fenchel (D).  
Finocchio officinale (I).

نوع من الشوارد وهو من البقول المأكولة الأرواق .  
خواصها الصحية والطبية جزيلة الفتح توجد في جذوره  
وأوراقه . وهو منه معوي يعرف بأفازات ، يدر البول  
ويكسب للتشنج . أدمان شره يثبه التند الجسية .

الحل جافاً ، أو خلة يضاء كالنكس إذا كان الحل  
ربطاً || القاية منه تنحصر بالتصوير بالفرمول وبجرق  
القدان الرطبة فور أصابها .

**١٥٥٩٤ - شَكَم ، فَلَاش**  
Fish  
ويش نور مويوت يستعمل للتصوير في الظلام .

**١٥٥٩٥ - شِلُونُوس مَشْكُوس**  
Chlaenius spoliatus (S). Chlaenle spoliatur (F).  
Chlaenius spoliatus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات  
الاجنحة . تألف المواقع الرطبة وصفات مجاري للماء .  
خنافسها ويزقاتها تمش على المواد الصلبة وعلى ما تستطيع  
اقتحامه من الحشرات الدنيا || جسمها متوسط القد يطول  
من ١٤ إلى ١٦ م . ثوبها الى الخضار الجليل اللامع  
يكتسبه خط عاتشي أصفر يطوق الظهران . رأسها متوسط  
الجم . زياتلها عظيم مستطيلان . عيناها صغيرتان  
ناثرتان . ظهراتها مستدير الطرف للأخف ، تسامي  
الاعادية القندية القاطبة . أرساغها خالية العقل || الأث  
أصفر قدام من الذكر وأفتح ثوباً منه وأقصر زياتناً || لها  
جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في مطلع  
حزيران وتمشي حتى أوائل ايلول . تسرح في التبار وتبيت  
في الليل || البرقة مردنية الشكل ، تطول عند تمام ادراكها  
نحو ٢٤ م . جسمها أخير اللون ، اسر الرأس والشرج  
والمدب || طرز الاكمال يشتر نحو ٣٥ يوماً .

**١٥٥٩٦ - شِلُونُوس مَذْهَب الرَأْس**

Chlaenius chrysocephalus (S).  
Chlaenle à tête dorée (F).  
Chlaenius chrysocephalus (E).

حشرة راجحة قانصة من فصيلة القليسيات ورتبة غمديات  
الاجنحة . تألف يساقين السواحل . ثوبها المواد الصلبة  
وما تستطيع اقتحامه من الحشرات الدنيا || جسمها صغير  
القد يطول من ٧ إلى ١٠ م . ثوبها ثنائي اللون ، رأسها  
وكولها الى الحمرة النعاسية للغة المالح ، فعدا الى  
الزرقه السمره الخضراء المالح . زياتلها عظيم دقيقان .  
عيناها صغيرتان بارزتان . ظهراتها مستدير الطرف للأخف  
تسامي الاعادية القندية القاطبة المتوازية الاهداد . أرساغها  
خالية العقل || الأث أصفر قدام من الذكر وأفتح ثوباً  
منه وأقصر زياتناً || لها جيل واحد في الحول . تظهر  
الحشرة الجملانة في أواخر آذار وتمشي حتى أواخر حزيران .  
تسرح في التبار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام ادراكها  
تطول نحو ١٣ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، اسر  
الرأس والشرج ، أخير المدب .

**١٥٥٩٧ - شِلُونُوس**  
Anisochilus (S).  
Anisochèle, Anisochile (F). Anisochilus (E).

جنس نباتات طيبة برية حولية ومعمرة من فصيلة الشقيقيات .  
أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها الهند || الحولية منها  
عشبية أما المعمرة فخشبية متسببة . أوراقها معتقة .  
متقابلة ، ثلاثية . فصلاها يضيء الشكل ، خضراء الخضار .  
أزهارها سبيل التصبح ، اسطواني الشكل ، طرقي الارتكاز  
أنواعها صغيرة حمراء اللون || حصر أوراقها وأزهارها  
شائع الاستعمال في معالجة النزلة الصدرية عند الأولاد .

**١٥٥٩٨ - شِلُونَك**  
Enarthrocarpus (S).  
Enarthrocarpe (F).

جنس نباتات عشبية حولية برية من فصيلة الصليبيات .



شلوس غنلى



شلوس مذهب الرأس



شلبس



شمار حلو

## ١٥٦٠٩ - شِمَاط

Pygargues (F). Osprey (E).

جنس طير من العقبان وفصيلة البعريات. انواعه عديدة اشهرها الشيمطة الشائعة وشيمطة الانهر والرخاء والهجوج . تتميز ببارسائها الكاسية حتى نصفها الاعلى . منسلها من القواطع ، تأتلف الشطوط البحرية وشفاف الانهار والبيمرات . قوتها الاكمام والطيور المائية والبرمائيات الصغيرة.

## ١٥٦١٠ - شِمَاطَة

Chaetostroma

جنس فطر مجهرية من عارة الطحالبات وفصيلة الكنكيات . يلبته بجية الشكل ، حلبي السطح ، لها دقن كثيف اسمر اللون . جربه الكنيدي متفتحة ممرامة ، كئانه طرية الارنكار بيضة او مردنية الشكل . انواعه قليلة جميعها روية تركب المواد العضوية المنحلة .

## ١٥٦١١ - شِمَال ، شِمَال

Vent du Nord (F). North-wind (E).

هي الحواء : الريح التي تهب من قبل البحر بين مطلع الشمس وبنات نضج ويقل من مطلع الشمس الى سقط الترس . ويكون اسماً وصفة يقال حيث الشمال وريح شمال .

## ١٥٦١٢ - شِمَالِي

Septentrional (F). Northern (E).

نعت تعريفي يطلق على ما هو من الشمال او مركز الشمال .

## ١٥٦١٣ - شِمَالِي

Boréal (F). Boreal (E).

نعت وصفي يطلق على ما هو خاص بالشمال القطبي .

## ١٥٦١٤ - شِمَام

Cucumis melo (S).

Melon commun (F). Melon, Musk-melon (E). Melone (D). Melone, Popone (I).

ويسمى أيضاً البطيخ الاصفر . نبات حليبي حولي زراعي من فصيلة القرعيات . ضروبه واصرامه عديدة . ساقه اسطوانية مدادة زهاب البثرة خضرة اللبس . اولوه زنادية مختلفة الاشكال منها المستديرة والكلوية والمفصصة . نصلها مزهر الصفقة الخشنة ، ياهت الخضار البحري . ازهاره وحيدة المسكن ، الذكري تظهر قبل الانثوية بهشة ايام . ثماره مختلفة الاشكال والاحجام منها المستديرة والبيضة والاحليلجية والكبيرة والصغيرة ، قشورها ناعمة اللبس ، صفراء اللون ، فضلة . لهاها سبك السيق ، جانبه المكسر ، اصفر اللون ، سكري اللحم ، ذكي العرن . يزده مستطيلة الشكل ، تبتية اللون ، كثيرة العدد || يحد في جميع الاثرية الفنية بالمواد العضوية والناصر المدنية بطور ان لا تكون شديدة الانحاج . يزرع على مسافات تراوح ابعادها من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . تفرش ساقه الرئيسية (الام) على وحين . وتفرش سلاله الثانويات على ثلاث اوراق ثم تفرش سيقه الثانية على خمس اوراق . كما وتعيشيه ضروريان ، اما الاكارار من ربه ففصر .

## ١٥٦١٥ - شِمَام اخضر ، شِمَام كَنْتَلُو

Cucumis melo cantalupensis (S). Cantalupo, Melon galeux (F). Cantaloupe melon (E). Cantalupo, Beulen-melons, Rippen-Melons (D). Cantalupo, Melone cantalupo (I).

نوع من الثيام الزراعي المأكول ، اسرامه عديدة مختلفة الاحجام والاشكال تلب فيها الاستدارة . قشوره فضلة مبرقة بجمرة اللون حطية التاليل . لهاها سبك السيق ، لذيق اللحم ، مسطح الحلاوة ، ذكي العرن ، لونه الى الخضار الامثل || مصلته لزراعية لا تختلط من معاملة الثيام .

## ١٥٦١٦ - شِمَام عَجَمِي

Cucumis melo dudaim (S). Concombre dudaim (F). Apple cucumber, Queen Anne's melon (E). Apfel-melone (D). Cocomero melo (I).

نوع من الثيام الزراعي الرئيسي ، ثماره خضبة اللون ، مسطرة الله ، حبيبها حجم البرتقالة وهي نواحة الرائحة القذرة . قشورها ملدة البثرة ، عادمة التفصيص ، لهاها قليل البسكة كثير الاليات القروية || يزرع للزين .

## ١٥٦١٧ - شِمَام مصري

Cucumis odoratissimus (S). Melon égyptien (F). Sweet melon (E). Agyptische melone (D). Popone, Poponcino d'Egitto (I).

نوع من الثيام الاصفر المستطيل الشكل ، مهدد البلاد المصرية وقد اشتهر بتكهته ولذته طعمه وقوة رائحته الذكية المستحبة || يزرع ويصل كثير من الثيام وهو اجد صفناً في الاثرية غير القروية .

## ١٥٦١٨ - شِمَاطِي

Chimpanzé (F).

هو الجملة : جنس قرود كبيرة الله من فصيلة اشباه الانسان ، راسع بامنة .

## ١٥٦١٩ - شِمَاطِيَا

نوع من الحبوب القوية الفاعلة . راسع غر شيمانيا .

## ١٥٦٢٠ - شِمَاطِي

Michelia champaca (S). Michélie champac, Champac, Sompac (F). Champaca, Champ wood (E). Schampakbaum (D). Champacs (I).

نوع من الخشاليه من فصيلة المنيليات . وهو شجرة يرة طيبة مهدا الهند الصينية ، تحوي بعض الاصول المرة والطرية ، تدخل في عدة تركيبات وقويات مغذية ويستخرج منها عطر الشمين المشهور .

## ١٥٦٢١ - شِمَاط

راسع شلخ .

## ١٥٦٢٢ - شِمَد

الشدة : رفع اللب فهو شامد في شامد .

## ١٥٦٢٣ - شِمَدَكَة

شجرة تقرر وتقرر الى الكثرة ترتفع عليها .

## ١٥٦٢٤ - شِمَر الجَمَل

Tordyle suave (F).

هو الشرهب الخجل ، اطليه .

## ١٥٦٢٥ - شِمَر اخضر

Peucedane (F).

هو بنجر الاكراد ، اطليه .

## ١٥٦٢٦ - شِمَر الكَلْب

هو الجابنيق البن ، اطليه .

## ١٥٦٢٧ - شِمَرَاخ

Hampe (F).

Stem, Flower-stalk (E).

عضو باقي قروسي الانتساب متصّب الجالوس يحمل الازهار وقد يتوب من الساق في بعض النبات .

## ١٥٦٢٨ - شِمْرَاحِي

Scapigère (F).

Scapigerous (E).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ساقه كالمشراج او الزناد .

## ١٥٦٢٩ - شِمْرَاحِي الزَّهَر

Scapiflore (F).

نعت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره شمراعية الارنكار .



شام



شام اخضر



شام حبيبي



شام مصري



شبن

١٥٩٣٠ - شِمْرَاقِيَّةُ الشَّكْلِ Scaptiform (F).  
Scaptiform (E).

تمت تعريفه يطلق على كل ساق نباتية شكلها كالشمران  
أو الزناد .

١٥٩٣١ - شِمْرَاقِيَّةٌ هِيَ الشَّيْبَارُ ، اُطْلُب .

١٥٩٣٢ - شِمْرَاقِيَّةٌ بِحَرِيَّةٍ \* Crithme (S).  
Crithme, Fenouil marin, Perce-pierre, Pense-pierre (F). Samphire, Sea fennel, Peter's cress (E).  
Seebadkraut, Meerfenchel (D). Erba corda, Finocchio marino, Badgila (I).

نبات حشيشي . يري معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة  
الحميات ينبت على ضفوف الشواطئ البحرية . أوراقه  
سنائية لحية شبيهة بالصل البحرى الذين تغلظ وتتمتع  
كثيرا بالملوحة .

١٥٩٣٣ - شِمْرَاقِيَّةٌ هَرْدُ \* Thlaspi (S).  
Thlaspi arvense (S). Thlaspi des champs, Herbe  
aux écus, Térapic amer, Monnoyerba, Tabouret (F).  
Mithridate mustard, Penny-cress, Wild-cress, E.  
Feldpfefferkraut (D). Thlaspi, Erba sterna, Mile  
flore (I).

نوع من الاندلسية من فصيلة الصليبيات ، وهي من  
النباتات المشيئة البرية التي تكثر في البرور وتوجد في  
في الحقول المزروعة . أوراقها لحية النصل الكامل . أزهارها  
ملحقة التجميع ، ناجية الارتكاز ، ودية اللون . يقال أنها  
لا تغلظ من بعض المناطق الحلية .

١٥٩٣٤ - شِمْرَاقِيَّةٌ Meroisideros (S).  
Meroisideros (F).

جنس نباتات حشيشية برية معمرة من فصيلة الآسيات .  
أزهارها المرفقة مدنية ، مهدبا عند من لحد إلى جزر  
الزجاج || سطوها متصبية ، فراء . أوراقها متعاقبة ،  
معتقة ، يهيبة النصال الصغيرة الجامدة . أزهارها لائقياسية  
التجميع ، محورية أو إبطية الانتصاب ، طويلة الاصلع  
خامسة البتلات الصفرة ، مستطيلة الاسدية ، مستعبة  
المرق .

١٥٩٣٥ - شِمْرَاقِيَّةٌ Hymenocarpus circinatus (S). Hymenocarpa (F).  
Hymenocarpus, Circular Medick (E).

نبات حشيشي ، بري ، حولي ، وحيد الجنس والنوع من  
فصيلة القرقيات الفرائشية . منه بعض اصناف سواحل  
البحر الابيض المتوسط اغصانها الممتدة من انطاكية الى  
غزة || ساقها فراء زباد تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . أوراقها  
خالية النصال ، السفلى كاملة ، ملحقة الشكل ، قرصية  
التجميع ، اما العليا فمركبة ، وقرية ، خامسة الورديقات  
أو تساعية . الورديقة الانتهائية دائما اكبر من رفيقاتها ||  
أزهارها إبطية الارتكاز ، مستطيلة المالحق ، صفراء  
اللون || تنويرها يستمر من آذار الى ايار .

١٥٩٣٦ - شِمْرَاقِيَّةٌ طُرْثَالِيَّةٌ Tornella (S).  
Tornella (F).

جنس نباتات سريعة مدادة معمرة من فصيلة التلقاسيات .  
انواعها المعروفة ١٢ ، سطوها اسطوانية متناهية السلايات  
القصيرة ، الممتدة ، الجارية المقعد . أوراقها مستطيلة  
الزناد ، كبيرة النصل الفارز المزروع والتصنيف والتتابع  
التشريح . ثمادها اكرار عفرها اللون ، وغروية الشكل ،  
مستطيلة ، ترتكز على مالحق إبطية الانتصاب غليظة .



شوة بحرية



شوة مرة



شروس لديد



شمر



شروق بنيس

١٥٩٣٧ - شِمْرَاقِيَّةٌ لَدِيدَةٌ \* Tornella deliciosa (S).  
Tornella deliciosa (F).

نوع من الشمرين الشائع الاستعمال الزراعي المركزي .  
سلفه مدادة تطلو من ٦ الى ٨ امتار . أوراقه شبه قلبية  
الشكل عميقة التفريق والتشريح ، مستطيلة الزناد .  
نصلها مائل لبشرة ، جامد التشريح ، شديد الخضار .  
ثمادها اكرار غروية طويلا نحو ٢٠ سم . وقطرها ٤  
بمير عفرها اللون ثم تنحرف مع الادراك الى الاصغر  
فالاخضر . وهي سكرية المذاق للنبذة الطعم فواحة العرف  
الطري المستحب .

١٥٩٣٨ - شِمْرَاقِيَّةٌ Marsdenia (S).  
Marsdenia (F).

حشيشية معمرة جاحدة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها  
متصبية فراء . أوراقها معتقة ، متعاقبة ، يهيبة الشكل ،  
مقطوعة القاعدية ، ذلقة الزام الاخير . نصلها جبل الخضار  
اللامع . أزهارها خمسة التجميع ، عابية اللون ، عطرية  
المرق الفواح المستحب || أزهارها يستمر من ايار  
الى تموز .

١٥٩٣٩ - شِمْرَاقِيَّةٌ الْكَنْدُورُ Marsdenia condurango, Gonolobus condurango (S).  
Marsdenia du condor, Gonoloba du condor (F).

نوع من الشمرافس . حشيشية معمرة طيبة من فصيلة  
الصفليات . منهيا بعض مناطق أمريكا الجنوبية المتاخمة  
لحط الاستواء . يتكرر وجودها في البرور وجبال الكونديليار  
على ارتفاع يراوح من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م . من سطح  
البحر || ساقها سريعة مدادة ومتسلقة تطلو نحو أربعة  
امتار . أوراقها متعاقبة ، معتقة ، قصيرة الانعاق .  
نصلها اعطليجية الشكل ، مدبية الاطراف . أزهارها  
نوردية التجميع ، ابلي الارتكاز . أزهارها صغيرة ،  
معتقة ، خامسة البتلات ، ودية اللون . مستعبة المرق  
الفواح ينشترج من لحاء جلودها مواد مقوية مرة  
المذاق تسمى كنكوريت وكنكورينج تستعمل في معالجة  
الحلل السرطانية .

١٥٩٤٠ - شِمْرَاقِيَّةٌ Drymoxa (S).  
Drymoxa (F), Drymoxa (E).

جنس طير من الجوارم سفيات المنابر ينتمي الى فصيلة  
الديفكيات . انواعها المعروفة نحو ٧٠ اعطائها تمتد من  
افريقية الشرقية الى الجزيرة العربية والشرق الاوسط واروبة  
الجنوبية . جميعها صغيرة القد ، مستطيلة الشكل ، قريبة  
القش بالمشعل . انثواها ثنائية اللون . ظهورها الى الكهبة  
أو الربة القزينة المولج . يطونها الى الصفرة أو البياض  
التي || مستطعها من الطيور المحرقة الضاربة . تكثر في  
الاجنار القريبة وبين الصخور النافقة . مشائها قدسية  
الشكل ، معتقة الرباط . انثاها تضع من ٤ الى ٥ بيضات  
تضعها نحو ١٥ يوما بمثابة الذكور .

١٥٩٤١ - شِمْرَاقِيَّةٌ كَبِيسُ \* Thyatira bacis (S).  
Thyathre bacis, la Batis (F). Thyatira bacis (E).

حشرة من فصيلة الشمرقيات ودية صفراوات الانجسة .  
سوقها الاقدام المتعددة الحمرارة من المام القدم . فراشها  
جارية قتها رقيق الازهار . سرقها خاضعة تموش على  
أوراق الموج والسريرين || جسمها متوسط القد يطول نحو  
١٧ سم . يستلها نحو ٣٨ سم . رأسها معتدل الجرم . عيناها



## ١٥٦٥٠ - شَمِيشُ رَوَّاحٍ \*

*Troglodytes riparius* (S). *Troglodytes rufus* (F).  
*Troglodytes riparius* (E).

حشرة نائلة قانصة من فصيلة الدفريات رتبة عذبات الاجنحة. تألف شلاف مجري الماء. قوتها المواد الضوية والبيدات. جسمها صغير القدر طول من ٥ الى ٦ م. ثوبها اسود يستند الطول والجريان واثرها قاتلها جوية. رأسها صغير الحجم قصير الخط. زباناها عظيمات. عيناها كيرتان جاسطان. فمها صغير القدر لا يملك أكثر من حسي البطن. ابراسها خمسة السفل || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملدة في نيسان وتمشي حتى آب. تسرح في التبار. تناف بعد ظهورها بنمو ورواجها اسابيع. تمتع المكان في القرية تحت الجملدة والليل || البرقة عند بلوغها الكمال الجسدي تطول من ٨ الى ١٠ م. جسمها حدي التركيبة اسطواني الشكل، حلي اللين، اسمر اللون، اسود الفرس والرواج، نشيط للتأثير || الطول الاكمال يسير نحو ستة اسابيع ويتنقي في القرية ضمن جراب من اللين والمواد الضوية.



شميش رَوَّاح

١٥٦٥١ - شَمِيط  
*Coupage* (F). *Diluting* (E).

خلط بعض الحنود ببشما لغرض ما.

١٥٦٥٢ - شَمِيعُ حَسَكِيٍّ عَسُو  
*Cire* (F).  
*Beeswax* (E).

هو موم السمل مادة شمعية يفرزها النحل لبناء مخارجه.

١٥٦٥٣ - شَمِيعَةُ كَانٍ ، مَالِكَةٍ  
*Candellabre* (F).  
*Candelabrum* (E).

شكل من اشكال التشذيب خاص بالانجار المسند.

١٥٦٥٤ - شَمِيعَتُكَ هِي الْخَرَابُ ، اطليه.

١٥٦٥٥ - شَمِيعَاتُ  
*Myricaceae* (S).  
*Myricacées*, *Myricacées* (F). *Myricaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين. انواعها نحو ٣٠ ، جميعها ينسب واحد. نباتاتها اثمار ومجبريات فراء، السوق. اوراقها صغيرة القدر، جامدة القصل ؛ تفرز مادة شمعية تستخرج بقل الاوراق في الماء.

١٥٦٥٦ - شَمِيعِيَّةٌ ، شَجَرَةُ الفَسَحِ

*Myrica* (S). *Myrica*, *Cistrea*, *Arbre à la cire* (F). *Bayberry*, *Candle berry myrica* (E). *Wachsgel*, *Wachmyrta* (D). *Mirica*, *Albero della cera* (I).

جنس الشجار ومجبريات من فصيلة الشقيبات. انواعها المعروفة ٣٠ ، جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة. اوراقها ابيدة، متناوبة، مسطيلة الشكل، صغيرة القدر. تصلها جامد السنج، كثيف السام الشمعي. اثمارها سنبل التجميع، متراكب السفيولات. اثمارها صغيرة القدر خضراء اللون. ثمارها نوية لحية رسيطة السمية. اثمارها رسيطة للسوق ترطب في الاراضي الرطبة وتستعمل في اصلاح مناطق المنافع || اشهر انواعها الشمعية الثلاثة والسينية والسمر والقلبية والورق.

١٥٦٥٧ - شَمِيعِيَّةٌ هِي لَبِدةُ اللين ، اطلبها.

١٥٦٥٨ - شَمِيعَةُ الحُمُفِيَّاتِ

هي لبودة الحفصيات الضيئة، اطلبها.

كيرتان. زباناها عظيمات. مزلها ملتصق مسطيل. جوشها ويها الى الحظي ويملأ بها خط نجسي بني || ورشها الاناسيان، عند الشقين، الى البني الاكث يملأ خمس بلج ودية يتوسطها الحظي. ورشها الخلفيان الى الحظي الاخير تملأ مسحة شفاء || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنمو اربعة اسابيع وتمتع المكان لطعاً مسطيلة تتلفها مادة غروية تلتصقها بالصمغات السفل من نصال الاوراق || السفة تطول من ٣٥ الى ٤٠ م. جسمها شبه اسطواني الشكل، ماس الفشار. ثوبها الى السطة السوداء تملأها سمة عسوط متفرقة جانبية جوية. رأسها الى الجوزة. منها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يسير نحو ١٥ يوماً يتنقي بين وقتين تصبها السرة وتربها بجنوط حرورية.

## ١٥٦٥٩ - شُرُوبِيَّاتُ

*Thystridae*, *Cymatophoridae* (S).  
*Thystridae*, *Cymatophoridae* (F). *Thystridae*,  
*Cymatophoridae* (E).

فصيلة حشرات فراشية من حرشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ١٠٠ مسطحة من حشرات الاثام المعتدلة الحرارة المنتشرة نحو البادية || اجسامها رشيطة متوسطة القدر او صغيرة. رؤوسها صغيرة. عيونها زيمية جرداء. قرنها الانشعابية خيطية او مشطية. ملاسها صغيرة مسطحة الاطراف. مراضها مسطيلة. بطونها كثيفة الخلد والظب. حلقاتها جانبية الاثكان تقع عند قاعدة البطن. ورائها الاناسية الحول من الخلفية واقل امتدادة منها واكثر بقبجاً وزركمة. جرائها رباحية المناس. مكنها مذكور. اسرارها عريضة. خادراتها تلتصق بنصال الاوراق التي تجمعها الى بعضها البيض جنوط حرورية || اشهر اجناسها الشروق والرويش والقيل والهرسين.

١٥٦٦٣ - شَمْسُ  
*Soleil* (F). *Sun* (E).

الشمس جرم سماوي تدور الارض في فلكه حل بعد ١٧١٢١٠٠٠٠ كيلومتر. والشمس التي تعتبر مصدر الحياة على الارض بما تبته من حرارة وضوء هي جسم ناري يقدر قطره بنحو ١٦٠٠٠٠٠٠ كيلومتر وتقدر حرارته الباطنية بنحو اربعين مليون درجة وحرارته السطحية بنحو سبعة الاف درجة || ويتنقد بعض الفلكيين ان مصدر هذه الحرارة الرابحة الكافحة هو الطاقة الحرارية الناشئة من تحطم جزئيات العناصر التي تتكون منها والتي توف بالكمباب || اما مدة دورة الشمس حول محورها من الغرب الى الشرق فتتم في ٢٥ يوماً.

١٥٦٦٤ - شَمِيسَاتُ

رتبة كانتات حيوانية مجهرية من الجليات.

١٥٦٦٥ - شَمِيعَتُكَ هُوَ اليقْس ، اطلبه.

١٥٦٦٦ - شَمِيعَةُ الحُمُفَرِ

هو اليقْس الدائم الحفرة، اطلبه.

١٥٦٦٧ - شَمِيشُ هُوَ الخيل ، اطلبه.

١٥٦٦٨ - شَمِيشُ هُوَ المنثور البري ، اطلبه.

١٥٦٦٩ - شَمِيشُ هُوَ اليقْس الدائم الحفرة، اطلبه.

## ١٥٦٥٩ - شَمِيَّة شَامَّة \*

*Myrica communis* (S). *Cirier commun*, *Myrica commun* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. ثمارها نورية صغيرة القند ، بأذخانية اللون ، شمية القشاد ، أرواقها عارية تستعمل في صناعة الحبر الأسود. أما ثمنها فيستعمل كالشمع ويدخل في صناعة الصابون. يقال إن جلودها لا تغلظ من المنافع الطبية .



شمية شامة

## ١٥٦٦٠ - شَمِيَّة صِينِيَّة \*

*Myrica edulis* (S). *Myrica comestible*, *Cirier comestible* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية تملو نحو ٤ أمتار. مهدا البلاد الصينية ، ترطب في اللواتم المشتعلة الرطوية. ثمارها مأكولة مشبعة الطعم ، صفراء اللون أو صفراوات.



شمية صينية

## ١٥٦٦١ - شَمِيَّة عَطْرِيَّة

*Myrica gale* (S). *Galé*, *Piment royal*, *P. aquatique*, *Myrica bétard* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة سريرية كبرية القند تملو نحو عشرة أمتار. أرواقها صارية تستعمل في غسيل الثياب ولغظ الأفاع من حيث بعض الحشرات كالعث .



شمار

## ١٥٦٦٢ - شَمِيَّة قَلْبِيَّة الْوَرَق

*Myrica cordifolia* (S). *Myrica à feuilles en coeur* (F).

نوع من الشمية وهي شجيرة مشطبة القند تملو نحو ٨ أمتار. أرواقها قلبية الشكل ، يستخلص منها شمع أحمر اللون يستعمل كالشمع المادي ويدخل في صناعة الصابون.

## ١٥٦٦٣ - شَمِيَّة

*Biophytaxia* (F). *Biophytaxy* (F).

الشمق بيولوجيا مجموع وسائل المقاومة الممكنة إن جهزها الجسم لفيضان مائي ونشاطه .



شمندر برّي

## ١٥٦٦٤ - شَمِيل

ما ينبت في الغنجل بعد قطفه . ج شاليل . والثقال هي طوق النمل البالية .

## ١٥٦٦٥ - شَمَالِيَّة

*Palaeactica* (F). *Palaeactica* (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو خاص بالمنطقة الشمالية من العالم القديم ، أي من آسيا وأوروبا .

## ١٥٦٦٦ - شَمْدَر ، شَوَكْدَر ، بَسْجَر ، صَوَطَلَة

*Beta vulgaris rapa*, *B. rapa* (S). *Betterave* (F). *Bent-root* (E). *Echter Mangold*, *Rübe* (D). *Barbabetola* (I).

نبات عشبي زراعي محول من فصيلة السرميات . خضوبه وأصفره كثيرة العدد تقسم إلى ثلاث فئات . فئة الخضروب البقية التي تستعمل للأكل والخلالات وفئة الخضروب السكرية التي تستعمل لاستخراج السكر والكتا وفئة الخضروب الملحية التي تستعمل لذاد الماشية || جلود خضبة لياينة مختلفة الأشكال والأحجام ، ساقه ليفية فروع تملو نحو ١٠٠ سم . أرواقها الجلدية قرصية الانتساب كبيرة النصل ، غليظة الصلح المسراء ، متعجبة للتسج ، مائة البشرة ، عابطة الخضار . أنهاره غشوية خاصة التركيب . ثماره حبوب مقرقة ، جافة ، شاذكة ، تغلف بعض البزور الصغيرة القند ، الكلولية الشكل ، المسراء اللون . والثولدر رطب في الأرضة المتوسطة الانتساج والرطوية الصفة اللورد وهو ينشئ الأرضة الجسدية والصلصالية للتعجبة وكل تربة جافة عادمة الاحتفاظ بالرطوبة . يزرع عادة في أول النورة الزراعية مها كان قوامها



شمولة



شميلة

إن ثالثة أو ثالثة أو رباعية . وهو في الزراعات الكبيرة ينجر مباشرة في التربة على خطوط متساوية الإبعاد . أما في الزراعات البستانية فينجر في شتاتل خاصة ثم ينقل إلى مستقره عندما يبلغ ارتفاع شتله (بورشه) نحو ١٥ سم . أما معاملته الخاصة في الفترة الثامنة بين الخرس وبني الحصيل فيهاها حرق وتعشيب وري .

## ١٥٦٦٧ - شَمْدَر بَرِّي ، شَوَكْدَر بَرِّي

*Beta silvestris* (S). *Betterave sauvage* (F). *Wild beet* (E). *Wildier mangold* (D). *Bietola selvatica* (I).

هو الشندر البري الذي ينكر في المناطق والأراضي الرطبة . وهو من النباتات الحولية ، جلودها صغيرة دقيقة تكاد تكون متفرقة . أرواقه القرصية خضبة النصل المستطيل . ساقه منتسبة قليلة الفروع تملو من ٤٠ إلى ٧٠ سم .

## ١٥٦٦٨ - شَمِيدَاد

*Laminoir* (F). *Flasting-mill*, *Rolling-mill* (E).

الشهادة آلة لتصفيح المعدن وتقليده .

## ١٥٦٦٩ - شَمِيدَكَة

*Laminage* (F). *Laminating*, *Flasting* (E).

الشهادة تطريق المعدن لتصفيحه أو تحميده .

## ١٥٦٧٠ - شَمُولَا ، قَدَر ، قَادَر

*Rupicapra tragus* (S). *Chamois* (F). *Chamois* (E). حيوان من الغنم الحرة ، وسيد الجنس والفروع شبيه بالبعز والأروبة يتميز بقرنيه المجولين الأصفرين . أذناه متضبتان . عتقه مستطيل . جرمزه خضبة قوية ، ذنبه شديد القصر .

أثناء ثالثة الخلف . ثوبه يتغير مع فصول السنة والسن إلا بطة الثائم البياض || موطنه جبال أوروبا وآسية الصغرى . يألف الأماك النيرة ، يعيش على جلود التاج . أثناء قطع جليداً واحداً ترشحه ٣ أشهر وتحفنه حولاً كاملاً .

## ١٥٦٧١ - شَمُور

*Diamant* (F). *Diamond* (E).

هو الماس ، اطبه .

## ١٥٦٧٢ - شَمُول

*Mûre* (F). *Mulberry* (E). هو ثمرة الثوت وما شاكلها من الثمار كاشليك ... أما ثمرة العليق وأتباعه فتدعى مصة .

## ١٥٦٧٣ - شَمِيدَكَة ، شَمِيل

*Allophylus*, *Schmidella* (S).

*Allophylus*, *Schmidella* (F). *Allophylus* (E).

جنس نباتات مشجرة معمرة من فصيلة السابنديات . أنواعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الحارة من العالمين القديم والجديد . جميعها أشجار صغيرة الحجم ، مظلة الشكل . أرواقها متضاربة مركبة ثالثة أو روفيات . وريقاتها فضية النصل المسن الحافة . أنهارها أبلي الانتساج ، سبلي التجميع . ثمارها كروية الشكل والقند ، مستعينة الطعم ، سكرية المذاق || أشهر أنواعها الزراعية الثلاثة التالية :

## ١٥٦٧٤ - شَمِيدَلَة أُسُوبِيَّة ، شَمِيل

*Allophylus cobbe*, *Schmidella serrata* (S).

مهدا البلاد الآسيوية الحارة . ثمارها برتقالية اللون ، مأكولة .

على غصاف الاجار والبحيرات. يشن وكه الذي يبلغ قطره نحو ٢٠٠ سم. على القرية وصل المسخور وفي ثم الاشجار البسقة. انتاد تبين من الرتينين الى الثلاث رفقات تحفينا بسدح نحو ٥ اسايح.



شبة البحر

١٥٦٨٦ - شين<sup>٥</sup> Chen (S). Chen (F).  
جنس طير من كيات القمم فضيلة الوريات. انواعه المعروفة ثلاثة موطنها المناطق القطبية تجوما كل عام وقد تقرب من المناطق الباردة والممتدة الحرارة لكنها لا تقيم فيها اكثر من اسبوعين ثم تفلو || اجسامها كبيرة لثقة ارساها اطول من ارساخ قورق العبادي. مناقبها بيضاء الاطراف المحددة هرا. اثوابها سوية اللون الابيض تلموه بعض الزخارف التي تختلف باختلاف الانواع || تدفن في اجاميس تحطرها بين مسخور الحماح. الانثى تضع في ١٠ الى ١٢ بيضة تحفينا بمنجولة للذكر نحو ٣٠ يوما. اشهر انواعه شن الشمال الاقصى.



شيفة شالمة

١٥٦٨٣ - شن الشمال الاقصى<sup>٥</sup>، ورقة

الذهبيك<sup>٥</sup> Chen hyperboreus (S).  
Chen hyperboreus, Oie des neiges (F).  
Snow goose (E).

نوع من الشن فضيلة الوريات. اصغله مسط مناطق القطب الشمالي، ملجته الحياتي جامي || جسمه كبير لثقة، ابيض الثوب، اسود اطراف القوائم، انهب الحبيبة، احمر الالك الملوي من الشفاد، ابيض السفل، ازرقة اللطط اي الطرف. احمر الجفون. كسني الخدقة. اصفر الرقوع والقدم.

١٥٦٨٤ - شنلر<sup>٥</sup> Bartschelle, Perdrix bartschelle  
هو الجبل الرصي، امله.

١٥٦٨٥ - شتاش<sup>٥</sup>، موكليدي

Naturaliste (F). Naturalist (E).  
الشتاش العالم بالطبيجات او التاريخ الطبي او علم المولايه.



شن شمال الاقصى

١٥٦٨٦ - شينالمة<sup>٥</sup> Polymérisation (F).  
Polymerization (E).  
في انقسام او استراج ذرات متشعة في مركب تتجج عنه خواص طبيعية وكياوية مختلفة.

١٥٦٨٧ - شينالمة<sup>٥</sup> Fleurs (F). Teers (E).  
البنغ الذي يقطر من الشجرة حتر ساقها او تقليم اعضائها وقطبانيا. ويهي ايضا للذراع.

١٥٦٨٨ - شينالمة<sup>٥</sup>  
والرانة الامليسية ليس لها نوى وانما هي ماء في قشر على خلفة الحب من غير حجم<sup>٥</sup>. (السان).

١٥٦٨٩ - شيناليد<sup>٥</sup> Fleurs de colchique (F).  
Flowers of colchicum (E).  
هو زهر السورتيان



شتوت أسود الرأس

١٥٦٩٠ - شتوت أسود الرأس<sup>٥</sup> Amphimallus ater (S).  
Amphimallus ater (E).  
حشرة غاصلة صغيرة المسرح من فصيلة ابلجيات رقيقة مشمدات الاجنحة. موطنها مسط اتانم البلاد الممتدة

١٥٦٩٥ - شميندكة افريقية<sup>٥</sup>، افويل  
الافريقي<sup>٥</sup>

Allophylus zeylanicus, Schmidelia africana (S).  
يهدها افريقية الشرقية وسردنيد ولهند. ثمارها ارضوانية اللون مستحبة اللحم.

١٥٦٩٦ - شميندكة مأكولة<sup>٥</sup>، افويل  
مأكولة<sup>٥</sup>

Allophylus edulis, Schmidelia edulis (S).  
يهدها البرازيل. ثمارها حراء اللون لينة اللحم.

١٥٦٩٧ - شمينسكة، ميكروميريا

Micromeria (S). Micromérie (F). Micromeria (E).  
Barcaurel (D). Micromeria (I).  
جنس نباتات عشبية برية وزديين من فصيلة الشفويات. انواعه نحو ٦٠ جميعها من نباتات المناطق الحارة والممتدة. اورثاها صغيرة لثقة متعاقبة. ازهارها معتدلة التجميع. ابلي الاركاناز. ازهارها صغيرة الحجم، قصيرة المالحيل، دقيقة الامن. فيها الابيض والاحمر والازرق والمزلق. اشهر انواعه التريين ما يلي.

١٥٦٩٨ - شمينسكة الوعر<sup>٥</sup>

Micromeria rupestris (S). Micromérie rupestris (F).  
نوع من الشمينسكة المصرة تلمر من ٣٠ الى ٥٠ سم. ساقها قرمها صغيرة. اورثاها بيضيه التصل المقرق المتعاقبة تلمر نحو ٨ سم. ازهارها الى الابيض المزلق بالازرق. ازهارها يستمر من حزيران الى تموز وهي من لبيانات التي ترضب في الاراضي البويرة تميز بين الحياطة والصخور. وفي جميع الاماكن المعرضة للشمس.

١٥٦٩٩ - شمينسكة كروانية<sup>٥</sup>

Micromeria croatica (S). Micromérie de Croatie (F).  
نوع من الشمينسكة المصرة تلمر نحو ٢٠ سم. ساقها قرمها زبد. اورثاها قليلة الشكل، لائحة البق، تلمر نحو ١٠ سم. ازهارها حراء اللون او وردية، مستطيلة الامن العتيقة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

١٥٦٩٠ - شمينسكة الازهر<sup>٥</sup>

Pygargus leucorhynchus (S). Pygargue leucorhynchus (F).  
Sea eagle (E).  
طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. موطن الشرق يجوبه من تركيا الى الصين ومن الهند الى سيبيريا. طوله نحو المتر. الانثى اكبر حجما من الذكر. ثوبه الى السرة السفاد، رأسه وذنبه الى الابيض المالح، بطة متشنش الريش بالابيض || يائث غصاف الاجار والبحيرات. يشن عنه في ثم الاشجار البسقة.

١٥٦٩١ - شمينسكة شالمة<sup>٥</sup>، حلقاب الشف<sup>٥</sup>  
Haliastur albicilla (S). Pygargue vulgaire, P. à queue blanche (F). White tailed eagle (E).

طائر من الشياط ينتمي الى عمارة العقبان وفصيلة الصقريات. طوله نحو المتر. ثوبه يختلف مع البسر يرتكز على السرة. بطة متشنش بالابيض ونسبة الابيض في الريش تزداد حولا بعد كل تحير. رأسه ومقبعه الى السرة الربداء. ذنبه ابيض، مقاربه وغالبه سفر || موطنه فسح الاجاراج يحوب البلاد الاسيوية والاروية والافريقية الشمالية والاسريكية. يائث المسخور البحرية والاصراج القائمة

مهددا روائي حوض البحر المتوسط . توجد في الاراضي المخصبة . جذورها غشائية يستخرج منها صباغ احمر شائع الاستعمال البيولوجي والصناعي .

### ١٥٦٩٧ - شنبجار مَثَلَتُ الاُكُرُون

*Onosma albo-rosaeum* (S). *Orcanetta tricolore* (F).  
نوع من الشنبجار التريزي الممر . يطول نحو ٢٠ سم .  
اوراقه اعليجية الشكل ، نصلها مغطى القاعده اخضر اللون .  
ازهاره كبيرة لثقة تطول نحو ٥ سم . تبدو يضاء اللون .  
ثم تتحول الى الاحمر القوي وتشتفر حل الازرق .  
انفران يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٥٦٩٨ - شنبجار لَحْجَمِي

*Onosma stellulatum* (S). *Orcanetta stellée* (F).  
نوع من الشنبجار التريزي الممر . ساقه فراءه تطول نحو ٢٠ سم .  
اوراقه اعليجية ، مستطيلة ، ملتفة اختار .  
نصلها الى اخضر البشري الباهت تملو بقع من الزغب كالحلب نجمة الشكل . ازهاره الى الصفرة الكبريتية عليها مزج اخضر || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٥٦٩٩ - شنبجار هَرَمِي

*Onosma pyramideale* (S). *Orcanetta pyramidalis* (F).  
نوع من الشنبجار التريزي الممر . هري الشكل ، فصي اللون ، يطول من ٥٠ الى ٦٠ سم . ساقه فراءه زباد اللحاء .  
اوراقه المجدعة سنائية التصل تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .  
وتعرض نحو ٢٥ سم . ازهاره خلية البشرة تبدو ارجوانية اللون ثم تتحول الى اليلك || ازهاره يستمر شهراً واحداً  
يختصه في اوائل تشرين الاول .

### ١٥٧٠٠ - شنبجار كُتْمِي

*Lithospermum* (S). *Grémil* (F).  
جلس نباتات عشبية برية وريضية مصرية من فصيلة الحمسيات . انوله ٣٠ سمها اعشاب فراءه السوق .  
اوراقها متعاقبة ، صغيرة لثقة ، شبيكة التصل . ازهارها مقنودة التجميع ، محورية وطريقة الارتكاز ، مختلفة اللون . يزودها حلبة ، فراءه اللون ، لامة كالزلف .  
اشهر انوله ما يتبع .

### ١٥٧٠١ - شنبجار اَبْيَض

*Lithospermum canescens* (S). *Grémil blanchâtre* (F).  
نوع من الشنبجار التريزي . ساقه فراءه زباد اللحاء .  
تطو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقه لائقة خفيفة مستطيلة .  
ازهاره الى الصفار البهي . ثماره بيض || ازهاره يستمر من نيسان الى حزيران .

### ١٥٧٠٢ - شنبجار اَحْمَرُ حَمْدَمَة

*Lithospermum arvense* (S). *Grémil des champs*, *Lithosperme* (F). *Corn-gromwell*, *Bizard alkant* (E). *Ackersteinsame*, *Korngift* (D). *Lithospermo*, *L. del campi*, *Strigolo selvatico* (I).  
نوع من الشنبجار البري يطول نحو ٥٠ سم . اوراقه لائقة شبيكة ومستطيلة . ازهاره حمراء اللون . يزود طيبة .  
جلوره غشائية ، صباغها احمر اللون .

### ١٥٧٠٣ - شنبجار مخزني \* حَبَّ التَلْب ، كُتْمَر الحَجَر ، حَالُوم

*Lithospermum officinale* (S). *Grémil officinal*, *Herbe aux parasites* (F). *Common gromwell*, *Pear Plant* (E). *Echter steinsame*, *Perlenkraut* (D). *Lithospermo officinale*, *Erbe della parte* (I).  
نوع من الشنبجار البري يطول من ٢٠ الى ٥٠ سم .  
اوراقه شبيكة التصل المزهر الصفحة . ازهاره ودية اللون ، خلية البشرة . يزود لؤلؤية طيبة قدر اليل .

الخامرة من الشرق الاوسط واروية . تألت الحشاب والاراضي الملاحية التي يطغى عليها عنصر الجبس . غشائها تمش على اوراق الاعشاب . يرقاتها تقسم جلور التجليات ويغمرها من نباتات العشبية || جسمها متوسط القد ، يطول من ١٢ الى ١٤ سم . ثوبها ثنائي اللون اسود الرأس والكوسل وايقين ، بني الظهران والجرايز . رأسها صغير الجرم ، زباناها مرقية التركيب ، شاربيا الفص ، وبقيا الاطراف . كوسلها خلية الصفحة . اسافها خالصة العقل ، صعبة القالب || الاثني اميز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه واضحاً بقاءً واطولاً سراً || لها جيل واحد في الخيل .  
تظهر الحشرة الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اوائل آب . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند تمام نضجاً قريبة الشبه بالقمحة البيضاء . جسمها مقوس الشكل ، مستطيل الرأس البشري ، مستضيق الطرف ، ابيض اللون ، اخضر المزج ، سطح الكنك ، احمر الرواسب المهدبة الاطراف || طور الاكمال يستمر نحو ثمانية اسابيع .

### ١٥٦٩١ - شَنْبَجَرَة ، شَنْبَجَرَة

*Palmure* (F). *Web-footed* (E).  
هي الخياط مادة جلدية او غروفيية تجمع ما بين اصابع الطير وبشره من الحيوان . ج شتار .

### ١٥٦٩٢ - شَنْبَجَر

*Oncosma* (S). *Orcanetta*, *Orcanète* (F). *Orcanet* (E). *Orcanetto* (D). *Organetta* (I).  
جلس نباتات برية وريضية من فصيلة الحمسيات . انوله نحو ٢٠ سمها فراءه مهدبة اللحاء . اوراقها متعاقبة . نصلها خلية البشرة او نجمة الزغب . ازهارها خلية الترويعات مختلفة اللون فيها الالبض والاحمر والودي والازرق . اشهر انوله المرفوعة ما يلي .

### ١٥٦٩٣ - شَنْبَجَر اَلْمُوسِي

*Oncosma bourgeai* (S). *Orcanetta d'Arménie* (F).  
نوع من الشنبجار التريزي السروتي . منه اوبونية يطول نحو ٣٠ سم . ساقه فراءه . اوراقه سنائية الشكل نصلها مغطى القاعده ذات الطرف . ازهاره مدلاية يضاء اللون .  
ازهاره يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٥٦٩٤ - شَنْبَجَر اَلْبَر

*Alkansa tinctoriale* (F). *شَنْبَجَر اَلْبَر* .  
هو الكتبان الصبائي ، اطليه .

### ١٥٦٩٥ - شَنْبَجَر حَمْرِي

*Oncosma sericeum* (S). *Orcanetta soyeuse* (F).  
نوع من الشنبجار البري الممر . ساقه مغطى تطول نحو ٣٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل ، زباد لتصل . ازهاره حمراء اللون ، خلية البشرة في جميع اعضائها || موطنه حضاب وجبال الشرق الاوسط ، يمتد من الاناضول الى جبال ايران || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٥٦٩٦ - شَنْبَجَر صِبَاغِي \* اَلْمُؤَوَّزَة صِبَاغِيَّة ، يَطْلَعُ اَلْمُصْبَاغِيْن ، حَبَّ اَلْعُزْل ، كَحْمَلَة

*Oncosma achioides*, *O. tinctoria* (S). *Orcanetta vipérine*, *O. tinctoriale*, *O. de Provence* (F). *Dyer's bugloss*, *Dyer's orcanet* (E). *Färberechenszunge* (D). *Organetta tinctoria* (I).  
نوع من الشنبجار البري والزراعي الممر . جلوره ليفية غشوية لها الى الجولية . ساقه فراءه تطول نحو ٤٠ سم .  
اوراقه مسطحة ، لسة ، مقنودة القاعده . ازهاره حمرة ابلية وتنائية الارتكاز يعلب فيها الاصفر الالبض المزج .



شنجار صباغي



شنجار مخزني

## ١٥٧١٢ - شُتْدَك جَبَلَر

*Eryngium giganteum* (S). Panicaut géant, Grand chardon (F).

نوع من الشنتاب، يصل نحو ٢٠٠ سم. ساقه حمراء منتشية. أوراقه منفصلة وبغرضة. نصلها جامد المسنة، متباد التسنين، قوي الشوك. أزهار كبيرة لينة، ورؤسها قليلة التجميع، لونها إلى الأزرق الزاهية || أثماره يسمر من تموز إلى آب.

## ١٥٧١٣ - شُتْدَك جَمْسِي، شَوْكَة زَرْكاه

*Eryngium amethystinum* (S). Panicaut améthyste (F). نوع من الشنتاب، يصل نحو ١٠٠ سم. أوراقه خامة التفريش، جامدة النصل البحري اللون، حادة متباد التسنين مستطيل الشوك. أزهار ويبلغ أوراقه إلى الزرقه الجلسية || أثماره يسمر من تموز إلى آب.



شنتاب

## ١٥٧١٤ - شُتْدَك عَجَبي

*Eryngium eburneum* (S). Panicaut ivoirine (F). نوع من الشنتاب، يصل من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه طول نحو ١٠٠ سم. صفيحة البتلة خلية لينة، حادة اللون. أزهار صغيرة الرؤوسات، كثيرة العدد، بيضاء اللون || أثماره يسمر طولك الصيف.

## ١٥٧١٥ - شُتْدَك مُنْبَسَط الزُوك

*Eryngium planum* (S). Panicaut à feuilles planes (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٨٠ إلى ١٢٠ سم. أوراقه يشبه الشكل جامدة النصل المنبسط الصفيحة يصل نحو ١٥ سم. ويمرض نحو ٧ حادة لياقي التسنين، اسنانه صغيرة الحادب الشالك. - أثماره إلى الزرقه الزاهية. | أثماره يسمر من تموز إلى آب.

## ١٥٧١٦ - شُتْدَك مَتَقَمِي، شُتْدَك مَائِي

*Eryngium aquaticum* (S). Panicaut aquatique (F). نوع من الشنتاب، يربط في المنطق والمواقع الرطبة. يصل من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقه شرفالية مستطيلة القاعدة والطرف طول نحو ٧٥ سم. وترس نحو ٣. نصلها جامد المسنة، عايق الخضر البحري، شالك الحار المذهب. أثماره بيضاء اللون يصلها ملبج أخضر || أثماره يسمر من تموز إلى أيلول.

## ١٥٧١٧ - شُتْدُلْ

*Locustella* (S). Locustelle (F). جنس طير من فصيلة اللخليات. ألوانه المروقة ثمانية موطنا القرق الاقد وأروبه. أجسامها صغيرة اللد. متاقها غرضية الشكل. اجنسها وانها متوسطة الطول. تألت المرامي والمنطق وضفاف الأنهار. قويا الحوام واليزود البرية. تنن في الادغال وفي الانجار للندوة. اناسها قنع من ٤ إلى ٥ فيضات تحفها بتناوة الكور: أعرف ألوانه ولونها الشدال الامر.

١٥٧١٨ - شُتْدُلْ أَمْر \* *Locustella naevia* (S).

*Locustella tachteta* (F). Grasshopper warbler (E). نوع من الشدال. طوله نحو ١٤ سم. ثوبه متناقل الالوان. رأسه وظهوره وبناحه وذنبه إلى الطحة الخطية الزيتية الملبج تلونها رشفة سوداء. زود وصدره إلى الصغار المخلع. يلمه ولنفكه إلى الصغار الباهت الاخير الملبج || تألت ضفاف الأنهار والحدائق والجائث والمراج. يثن مشه في الادغال. اناد قنع أربع فيضات تحفها بتناوة للكر من ١٤ إلى ١٥ يما.

## ١٥٧٠٤ - شُجَيْر مُسَطَّح

*Lithospermum prostratum*, L. diffusum (S). Grémil couché (F).

نوع من الشجيرات الزيتية البروتي المعمر. يصل من ١٠ إلى ٥٠ سم. ساقه خشبية، مسطحة، حموة. أوراقه ضيقة، نصلها يمرض من ٢ إلى ٤ سم. أثماره خلية المسنة المخاربية، لونها إلى الزرقه البنفسجية. | أثماره يسمر من ايار إلى تموز.

## ١٥٧٠٥ - شُجَيْر مَلُون

*Lithospermum purpureo-coeruleum* (S). Grémil pourpre et bleu, Thé d'Europe, T. des bois (F).

نوع من الشجيرات الزيتية البروتي المعمر. يصل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه ضيقة النصل طول من ٤ إلى ٨ سم. وترس من ١٠ إلى ١٥ سم. أثماره تبدو قرمزية اللون ثم تتحول إلى الباهتوي المايق. | أوراقه تستعمل استعمال الشاي وهي مودة للبلل || يثن في جميع الارية وقد يجيد في المواقف المعتلة بالتعرض الشمس || أثماره يسمر من نيسان إلى حزيران.

## ١٥٧٠٦ - شُتْعُوب

فقرة ظهر البير. Vertèbre dorsal du dromadaire.

## ١٥٧٠٧ - شُتْدَك \*

*Eryngium* (S). Panicaut. *Eryng. Eryngion*, Chardon Roland (F). *Eryngo* (E). *Mannstreu* (D). *Eringo*, *Cardo stellaris*, *Socera* (I). جنس نباتات عشية شائكة معمرة من فصيلة الخليات. ألوانه كثيرة العدد. موطنا غرام منتشية. | أوراقها مفرقة شائكة شديدة الخضر. أثمارها رؤسية التجميع عطفة الالوان فيها الازرق والايضا والاخضر || أعرف ألوانه وأشهرها ما لي.

## ١٥٧٠٨ - شُتْدَك إَكْرِي، Panicaut de Crète (F).

هو القرمصة، اطلبها.

١٥٧٠٩ - شُتْدَك أَلْبِي، *Eryngium alpinum* (S).

*Panicaut des Alpes* (F). نوع من الشنتاب، يصل من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه قليلة الشكل طول نحو ٢٥ سم. وترس ٢٠ سم. نصلها عايق الخضر، أزرق الملبج، اشراك حكاوة دقيقة متبادلة. | أثماره قليلة العدد زرقاء اللون || أثماره يسمر من تموز إلى أيلول.

## ١٥٧١٠ - شُتْدَك أُنْطَاسِي الزُوك

*Eryngium bromeliadifolium* (S). Panicaut à feuilles de broméliacées (F).

نوع من الشنتاب، يصل من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقه غليظة ريامية الانتشاب. | أوراقه انناسية الشكل ولون يصل نحو ٥٠ سم. أثماره إلى البياض الاخير يصلها ملبج أخضر || أثماره يدم طول شهر تموز.

## ١٥٧١١ - شُتْدَك يَمَحْوي، غِيَّة العَمْر

*Eryngium maritimum* (S). *Panicaut maritime* (F). نوع من الشنتاب، يمش حل الشرايط البحرية، يصل من ٤٠ إلى ٦٠ سم. | أوراقه منقطة، عبقية التفريش، جامدة النصل المسن الشالك. لونه إلى الخضر البحري | الازرق الملبج || أثماره إلى الزرقه الباهتة الباهت. | أثماره يسمر من حزيران إلى أيلول.



شدل امر

انفادها مزيلة ، محببة ، خلية الباء ، يطولها بعض الحشف الثالث . أوراقها سنانية الشكل ، نصلها مسنة الحنار ، خلية البشرة . أزهارا وردية اللون متقلبة بالاصفر || تنويره يستمر من حزيران إلى آب .

### ١٥٧٧٧ - شسنتوم كشافى الزرك

*Chaenostoma linifolium* (S).

*Chénostome à feuilles de lin* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها قرنية للشبه بأوراق الكتان . أزهارها جريسية الشكل ، بيضاء اللون أو صفراء || تنويره يستمر من الصيف إلى الخريف .

### ١٥٧٧٨ - شسنتوم كثير الزهر

*Chaenostoma polyanthum* (S).

*Chénostome multiflora* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو نحو ٣٠ سم . أوراقها مساوية الشكل . نصلها جريسة الصفحات العليا ، خلية الباطل . أزهارها متفويده التجميع . عناقيلها تطلو من ١٥ إلى ٢٠ سم . أزهارها إلى اليافس الوردي الموالج || تنويره يستمر من حزيران إلى أيلول .

### ١٥٧٧٩ - شسروخ

*Passerina* (S).

*Passerine* (F). Sparrow-wort (E). Spatzenzunge (D).

*Passerina* (I).

جنس نباتات جنبية معمرة برية ودرتينية من فصيلة المازروبيات . أنواعه قليلة منها افريقية الجنوبية ، حيثها تشبه الخننج . أوراقها صغيرة متقلبة . أزهارها سنبلية التجميع ، تاجها الإيكاز . أزهارها صغيرة القذ . جيلة الشكل مختلفة الألوان ، يلب فيها الأزرق .

### ١٥٧٨٠ - ششلية

*Chinchilla*

جنس حيوانات كبدية قاضية من فصيلة الششليات . موطنها الاربعين وكشيل وليفية والبيرو || اجسامها متوسطة القذ يراوح طولها من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وأذناها من ١٢ إلى ١٥ سم . وذيها غروبية الشكل . سبالها ميمرة الحلب الاسح . حيثها مكحلة مستطيلة . أذناها كبيرة وحريفة . جرائها الانامية قصيرة خلية الاصابع . اما الخلفية فسطلية ودرباعية الاصابع . برائها قوية حادة . فرونها قصيرة الور شديدة التنبوة فاخرة الصنف . التواها إلى الصبهة اللؤلؤية يطولها مولج فضي تبق مع اقترابها من شبح الظفر وزهو وتميل إلى اليافس منه البطل . قوتها الاغشاب والجذور والطحالب . انائها تحمل ٨ اطباء . وتقع من ٤ إلى ٦ ادراس على ثلاث مرات في السنة || وهي نوان :

ششلية مصقة *Ch. lanigera* (S). *Ch. lanigère* (F).

ششلية قصيرة الذنب *Ch. brevicauda* (S).

*Ch. brevicauda* (F).

### ١٥٧٨١ - ششليات

*Chinchillidae* (S).

*Chinchillidés* (F). *Chinchillidae* (E).

فصيلة حيوانات لينة قاضية من مرتبة ششليات الشوزب ودية القواضم . اجسامها لثالة وأذناها خسة . جميعها قرنية الشيه من الالاب بفرائها الناعمة الحمرية وبأذناها المستطيلة الجلفة || موطنها امريكا الجنوبية . تعيش جماعات كبيرة البند ، اقلها المناطق المرتفعة اجسرتها رداء عديدة الانفاق والتعايز المتشعبة تخلفها

*Nérine* (F). *Nerine* (E).

جنس نباتات حشبية حذوية من فصيلة التريجسيات . أنواعه عديدة ، أزهارها شوية مستطيلة . أزهارها بجلة الشكل ميوانية التجميع تركز على شراخ مستط . اشهر انواعه ما يلي .

*Nerine undulata* (S).

*Nérine ondulée* (F).

نوع من الشس ، أوراقه دقيقة تطلو نحو ٤٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ١٥ سم . نصلها إلى الحنار الزاوي . أزهارها لا تليقية الشكل ، يطنها مكبرة عمدة . اسديها واقلها شجة . لونها إلى الوردي الزاوي . قذ من ٨ إلى ١٢ زهرة يحسها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أزهاره غريبي .

*Nerine humilis* (S).

*Nérine humble* (F).

نوع من الشس . أوراقه تنأخر من أزهار وهي شوية التسل التثالي الانقسام ، الحليل الحنار الزاوي . طولها يراوح من ٢٠ إلى ٣٠ سم . وعرضه نحو ١٠ سم . صيوانه الزهري يقد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة يحسها شراخ يملو من ٣٠ إلى ٥٠ سم . لونها إلى الحمرية القروية يطولها مولج احمر || أزهاره يستمر من تموز إلى تشرين الأول .

*Nerine podica* (S).

*Nérine podique* (F).

نوع من الشس . أوراقه تسبق أزهار وهي خلية الشكل نصلها حاني الحنار يطول نحو ٢٠ سم . ويعرض نحو ٦ سم . صيوانه الزهري يقد من ٤ إلى ٦ أزهار يحسها شراخ يملو نحو ٣٠ سم . لونها إلى اليافس الناصع يملو تخيط مستطيل احمر || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين .

### ١٥٧٨٢ - شس منجن الزرك

*Nerine curvifolia* (S). *Nérine à feuilles arquées* (F).

نوع من الشس . أوراقه مستطيلة محبة لتصل البحري اللون . أزهارا ارجوانية قذ من ٨ إلى ١٢ || اوان أزهاره يختلف باختلاف زين غربه . يعرض في المراكب ويحيو في جبع الاريرة الخوازة الفنية بالمواد المنسوبة .

*Nerine flexuosa* (S).

*Nérine flexueuse* (F).

نوع من الشس . أوراقه تظهر مع أزهار وهي شوية لتصل تطلو نحو ٣٠ سم . وتعرض من ١٠ إلى ٢٠ سم . عروبه واصرامه عديدة ، صيوانها الزهري يقد من ١٠ إلى ٢٠ زهرة ارجوانية أو قرنزية أو موشية يحسها شراخ يملو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . || أزهاره يستمر من أيلول إلى تشرين .

### ١٥٧٨٣ - شسنتوم

*Chaenostoma* (S).

*Chénostome* (F). *Chaenostoma* (E).

جنس نباتات حشبية وعشوية معمرة من فصيلة المازروبيات . منها بعض مناطق افريقية الحارة والمعتدلة الحرارة . سيقها تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها متقلبة ، مسنة الحنار . أزهارها ملونة ، خامية القلق المساوية || انواعها المروقة قليلة البند ، اشهرها التالية :

### ١٥٧٨٤ - شسنتوم جي

*Chaenostoma hispidum* (S).

*Chénostome hispide* (F).

نوع من الشسنتوم . ساقه تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم .



شسروخ



ششلية

والاحجام . جميعها مستطيلة الفؤاد القلبية الشكل ||  
أعرف اجناسها واشهرها الشك وهو من الاصداف المقدسة  
عند بعض جامعات الهند .

على اعماق تراوح بين ٥٠ و ١٠٠ م . || قوتها الاغصان  
والجلود . اما اجناسها الثلاثة فهي الشنيلة والبيديوم  
واللفسوم .

### ١٥٧١٢ - شَنَكِس \* ، طُكُوسُ التَّيْتِ

*Polypetecron chinquus* (S). Chinquus, Paon du Tibet (F).

طائر وحيد الجنس ولقرون من فصيلة الطيوريات . موطنه  
التبت . قريب الشبه بالطوروس والفرنج لكنه اصغر حجماً  
واقل روعة وجمالاً . لونه مذايب الالوان المزركشة  
الزلفية . ذيله فلي الشيش .

*Ratel de l'Inde* (F).

هو الراتل ابر كيم . حيوان راس بشاش قريب الشبه  
بالتريزيب يتخذ لنفسه نفقاً في الارض يخرج منه ، في  
طلب القوت ، بعد الغروب ويودع اليه في الصباح الباكر .

*Bruyère* (F). Heath (E).

### ١٥٧٣٣ - شَنَطَق

هو الخلع ، اطليه .

### ١٥٧٣٤ - شَنُغُوب ، شَنُطُوف

ما بني على اساق من الفصن بعد قله .

### ١٥٧٣٥ - شَنُفُ الدَلِك

هي دلبيجة شنف الدليك ، فجرة حرجية غشبا اخر  
اللون فانس الصف ، اطلبا .

### ١٥٧٣٦ - شَنُفَب هو الشك ، اطليه .

### ١٥٧٣٧ - شَنُفَكَر ، شَنُفُور هو السفر ، اطليه .

*Hydrobatas asiaticus* (S).

*Cincle de Pallas* (F). Asiatic water-ouzel (E).

طائر من بداج الماء وفصيلة التفتليات ، يعيش قرب  
المياه العذبة يسبح ويلبوس ويمسك الحشرات والارام .

### ١٥٧٣٩ - شَنُك \* ، شَنُك

*Turbinele* (S). *Turbinele*, Schanck (F). Schanck (E).  
جلس اصداق حلزونية كبيرة القصد من الرغويات  
المعديات . انولمه كثيرة البعد تعيش في مجار الاقاليم  
الحارة . اشهرها الشك الهندي المعروف بصفت الحنوس  
المقدس .

### ١٥٧٤٠ - شَنُكُوب \* ، شَنُكُوب

*Tribidium* (S). *Tribidium* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات معديات الاريل  
اماميات الخياشيم وفصيلة القصبليات . انواعها المعروفة  
عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة واغصانها  
المحيط الهادي . تعيش على حضور المجادح والشطوط ||  
اصداقها حبيبة للمساريع ، معدية السطح ، نائضة اللون ،  
متباينة الاشكال يكثر فيها التقرير الختاري ووجبة  
الاصولج . اغشيها الداخلية لؤلؤية . قشاورها الخاوي  
كلني للمادة || اجسامها رجة الازدي التي يراوح قطرها  
من ٣ الى ٥ سم . رؤوسها صغيرة ، ثنائية القواس اهرقية  
الشكل ، المعززة بقواعد الخارجية . عيناها ابرم  
مجموعات متعاقبة تطلق الجسم بمجموعة خاصة مستطيلة  
الشكل مركزها قرب الرأس ومن يمينه || جميع انواعها  
ماكولة مرغوب لها .

### ١٥٧٤١ - شَنُكُوبَات \* ، شَنُكُوبَات

*Turbinelellidae* (S). *Turbinelellidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات معديات الاريل  
اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في بعض مجار المناطق الاستوائية ومنها الهند ||  
اصداقها عتيفة الشكل ابرومعية ، متغلوة الباك



شَنَك



شَنَك



شَنَكِس



شَنَم



شَنَمُولُ الصَّيْنِ

### ١٥٧٤٣ - شَنَم \* ، شَنَمُولُ

*Polypetecron* (S). *Polypetecron* (F).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الشنيمات . انولمه قليلة  
العدد جميعها من اسماك البحر الابيض المتوسط . اجناسها  
مستطيلة القصد ، اسطوانية الشكل ، متباعدة الزعانف الظهرية  
المفرقة للشنار . تعيش في غث واسال البحر . دفعها  
تجري كلع الحيات .

### ١٥٧٤٤ - شَنَمُولُ \* ، شَنَمُولُ

جنس سميات مشرة من فصيلة الرورديات . انولمه قليلة  
العدد فيها السرعة والفاكلة . سطحها قصيرة الجلاع . اوراقها  
بسطة متعاقبة ، قصيرة الساق . ثلويها كروية تشبه  
الفريجل . لهايا جامد الكسر سبز العلم || اشهر  
انولمه الزرقاء ما يلي .

### ١٥٧٤٥ - شَنَمُولُ الصَّيْنِ \* ، سَكْرَجَلُ الصَّيْنِ

*Chaenomeles sinensis* (S). *Chaenomeles de China*, *Cognassier du Chine* (F).

نوع من الشنمولى فجرة تمل من ٤ الى ٥ م . ساقها  
سرة . اوراقها اطليجية الشكل ، قليلة القامة تطول  
من ٥ الى ٩ سم . وتقرض من ٣ الى ٦ سم . ثفلها ازغب  
الصفحة السفلى ، مثلثي الحافة . ازغاري الحافة . كبيرة  
القد ، وردية اللون ، فلية الرب . ثمارها كروية  
قطرها نحو ١١ سم . لهايا متوسط الصلابة طاهر الفصوصه ،  
حازر العلم .

### ١٥٧٤٦ - شَنَمُولُ اليابَان \* ، سَكْرَجَلُ اليابَان

*Chaenomeles japonica* (S). *Chaenomeles du Japon*, *Cognassier du Japon* (F).

نوع من الشنمولى فجرة تمل من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم .  
ساقه واغصانه شاككة . اوراقه سنائية الشكل تطول من  
٧ الى ١١ سم . وتقرض من ٢ الى ٤ سم . ثفلها مثلثي  
الحافة ، غلي البشرة على الصفحة السفلى . ازغاره لوزية ،  
ثلثية التجميع ، خضرة القد ، لونها الى الازرقاني || ثماره  
كروية ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٥ سم . لونها الى  
الغضار الاصفر . لهايا جامد الكسر ، متوسط الصلابة ،  
طاهر الفصوصه وسامر العلم .

### ١٥٧٤٧ - شَنَمُومَات \* ، شَنَمُومَات

*Polypetecridae* (S). *Polypetecridae* (F).

فصيلة اسماك من اللوامات كليات الزعانف . اجناسها  
وانواعها عديدة جميعها من اسماك المياه العذبة تعيش في  
الث والاسال .

### ١٥٧٤٨ - شَنُوص ، قُتُوص

*Lutodetra salmonus* (S). *Chanos salmon* (F).

سمكة بحرية من فصوات الحثايات فضيلة البياضات  
اعطانها البحر الاحمر والمحيط الهندي || جسمها وشي

## ١٥٧٥٧ - شَهَادَةُ التَّسْجِيلِ

Certificat de transcription (F). Certificate of transcription (E).

شهادة القيد التي يمررها أمين المكتب العقاري موضحاً فيها تاريخ تسجيل المند ورقه البيع.

## ١٥٧٥٨ - شَهَادَةُ التَّكْرِيمِ

Certificat de décharge (F). Unloading certificate (E).

هي الشهادة التي تعمل لآليات وصول البضائع وتفرغها.

Parère (F). Opinion (E). - شَهَادَةُ الْعَادَةِ

شهادة تدفعها الذرة التجارية لآليات عادة تجارية معينة.

## ١٥٧٦٠ - شَهَادَةُ الْعَمَلِ

Certificat de travail (F). Labour certificate (E).

هي الشهادة التي يبرز للمال أن مطالب باصطافها له حين انقطاع العمل عنه. فلا يثبت فيها إلا نوع العمل الذي كان يقوم به وتاريخ دخوله وانفصاله.

## ١٥٧٦١ - شَهَادَةُ الْكَفَافَةِ

Brevet de capacité (F). Capacity brevet (E).

راجع برأه.

## ١٥٧٦٢ - شَهَادَةُ الْمَصْدَرِ

Certificat d'origine (F). Certificate of origin (E).

شهادة يمررها المصدر وتثبت السلطة منحها تفيد عن منشأ البضاعة موضوع الشهادة.

Script - شَهَادَةُ رَحِيدِ

تحرر بقلمه المساريف والشركات إلى أحد الدائنين أو أحد عدة التستاد الذي لم يقبض كل الفوائد أو رأس المال المسدد والمستحق له وبهذه الشهادة يقدم مستندة ليقبض باقي المستحق له.

## ١٥٧٦٤ - شَهَادَةُ عَقْدَانِيَّةِ

Certificat hypothécaire (F). Mortgage certificate (E).

هي التي يمررها أمين المكتب العقاري ليثبت وجود أو عدم وجود دين أو حق عيني آخر على مقرر معين.

## ١٥٧٦٥ - شَهَادَةُ قَيْدِ

Certificat d'inscription (F). Certificate of inscription (E).

شهادة تثبت فيها السلطة المختصة كل ما سجل على الصيغة العقارية.

## ١٥٧٦٦ - شَهَادَةُ مَحَوِّ الرَّهْنِ

Certificat de radiation (F). Irradiation certificate (E).

هي الشهادة المفروضة للدلالة على محو قيد الرهن كله أو بيشه.

## ١٥٧٦٧ - شَهَابَانِ

Orang-Outan هو السلالة، الجليما.

## ١٥٧٦٨ - شَهَبَانِ

Clivia (S). Clivia (F). Caffe illy, Natal illy (E). Riesenblatt (D). Clivia (I).

جنس نباتات عشبية مسمرة أليفة جنسورية لا يصلية من فصيلة التريجيئات. أنواعه المعروفة قليلة. أوراقها متعاقبة قديمة، مستطيلة، ثنائية التصفيف تصلها عروق الخشاف اللامع. أزهارها كبيرة القند حواء اللون أو برتقالية و

صوبانية الإزهار يحبسها شراخ مغصت مستطيل. ثمارها كروية الشكل قروزية اللون. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

الشكل. يطلع نحو ٣٦ سم. رأسها صغير الجرم. عيناها كيرتان، ماصتان. خطها صغير الشفق. فكها عادم الأسنان. زعنفتها الظهرية شراعية الشكل تقابل الحظية. زعنفتها البالية قريبان متقابلان كالكلاية. قريبا إلى الرعدة النفسية يقيم في الرأس والظهر. لونها جيد الصفء مرفوف فيه.

١٥٧٤٩ - شَيْطَانِ

Polymère (F). Polymer (E). متضمن حلة اصول. اصطلاح يطلق على كل مركب كيميائي تكمل ظهوره على الشظاة.

١٥٧٥٠ - شَيْطَانِيَّةُ

Cuilleron (F). Winglet (E). صفيحة قروية صغيرة القند، نصف دائرية الشكل، توجد عند قاعدة الرزان في الحشرات من ذوات الجناحين.

١٥٧٥١ - شَيْطَانِيَّةُ

Sphaceloma (S). جنس فطور مجهرية من فصيلة الفريئات. أنواعه المؤدية قليلة تركب الأوراق والنباتات والجوار تنطليها. || يتميز بمرطوبته التي تنشأ خضونة في الطبقة الاممية ثم ترقى حتى البشرة فتصدها وتثرتها. جرابه الكندي قصير القند، بسيل التركيب. كئالده يفسية الشكل شفاقة. || أصف أنواعه وأشهرها شنية الورود.

## ١٥٧٥٢ - شَيْطَانِيَّةُ الْوُرْدِ

Sphaceloma rosarum (S). Anthracnose du rosier (F). فطر مجهرية يصيب الوردي في أوراقه وقضبانها. || مظهره الخارجي، على الأوراق، بقع مستطيرة أو مستطيلة تركب التصل لبيد لونها إلى القفرة ثم ينصرف إلى الجفوة يطول مولج رصاصي، يقضي على التسج للنجاعة فيذيلها ويثبها. || وهو على القضبان لطف قروية مستطيرة قفوها نحو ٢ سم. تسلب اللحاء وتكون فيها حتى الشكر. || يكافح باستعمال المركبات المركزة على الكبريت والنحاس.

١٥٧٥٣ - شَيْنُونُومُ

Chenail (S). Chenail (F). Chenail (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة البسلافويات وروية لمحيات الاجنحة. أنواعه المعروفة سبعة اصنافها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة. || اجسامها صغيرة، تطول نحو ٢ سم. رؤوسها صغيرة، شبه مزوانية الشكل. عيونها بارزة. قرونها الاستشعارية صوبانية. كثرةاها وتكونها قياسية. ملابسها مستطيلة، كزاسلها خفيفة. بطونها مستعرضة مدلفطة، الحمادها عددة، قصيرة، تلتصق نصف البطن. قوائمها نحيفة. الأليها وحيدة اللون يكثر فيها الجفوي والاسود اللصبي. || سرعتها دجوي. تعيش في الجفاة وفي قري النمل. قوتها ما تستطيع تنصه او ما يتطر لها من مواد عضوية.

## ١٥٧٥٤ - شَهْ

قند: طائر يشبه الشامين بأعلى الحام (الأسان).

١٥٧٥٥ - شَهَادَةُ

Attestation راجع اشهاد.

١٥٧٥٦ - شَهَادَةُ

Certificat (F). Certificate (E). عبارة اقراء يمررها احد الاقراء أو المؤسسات يثبت فيها أمراً معلوماً عنه.



شنية الورود



شيط



شهبان



١٥٧٨٦ - شوكوب عتطر هو القزم البري ، الحلب .

١٥٧٨٣ - شوكس \* Pavetta (S). Pavetta.

Baconia (F). Pavetta (E). Pavetta (D). Pavetta (I).

جلس نباتات جيتية مسرة من فصيلة القيويات . اوراقها مطوية متعاقبة . نصلها جامد الصلصة ، لام البشرة الزلغالية الخضر . ازهارها عتقودية التجميع ، ابيض وتساوي الايكاز . اثمارها رباحية البيلات والاصدية ، مسطوية الياس ، يضاء اللون او غصراء ، فواصة القرون الطري || اشهر انماه الثولس المحتدي الذي الرافضة الطرية . يزرع لزوين وهو من النباتات ليلية اوراقه مدرة قليل .



شهران

١٥٧٨٤ - شوكسيات Erubidae (F).

سبط من القيويات آجناسه تقارب للثة واوراه زعاء الف .

١٥٧٨٥ - شواطيب Anomours (F).

الشواطيب مرتبة دويات من القشريات عشائيات الاربل . كتنيز يتكوس بعض اعضاء اجسدها من الحافة المثل في حالة ادق .



شواس

١٥٧٨٦ - شوكالة ٥ ، فوكس Phlox (S). Phlox (F).

Phlox (E). Flammenblume (D). Phlox, Flamma (I).

جلس نباتات عشية حولية او مسرة من فصيلة القيسيات انزلها مدية مطعها ترابي . اوراقها ككلى . ازهارها طرية الايكاز ، متكوكية التجمع او طقية || اشهر اوله ما يلي .



شواطة مسرة

١٥٧٨٧ - شوكالة بيشية الزوك ٥ Phlox ovata (S). Phlox à feuilles ovales (F).

نوع من الشواطة وهي عشية زيبية مسرة تملو نحو ٥٠ سم . اوراقها بيضية الشكل . ازهارها ردية اللون متصبة البيلات مسعرة الفصل || ازهارها يستر من حيزان الى آف وهو متكوكي التجمع ، يستر الزينات القليلة .

١٥٧٨٨ - شوكالة درومند ٥ Phlox Drummondii (S). Phlox de Drummond (F).

نوع من الشواطة وهي عشية سربية زيبية حولية تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم . ساهيا متصبة فراء زربية السماء . اوراقها لاخت متعاقبة . نصلها قلبى الشكل ، خلى الصلصة السفلى . ازهارها تختلف باختلاف القربوب منها العادية والكنية بينها الحمره والبيضاء والوردية والارباحية والصفراء . الحضية المزاج || ازهارها يستر طوال الصيف واخريف .

١٥٧٨٩ - شوكالة مسرة ٥ Phlox glaberrima (S). Phlox glabra (F).

نوع من الشواطة وهي عشية سربية زيبية مسرة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقها سنائية ذلقة طول نحو ١٢ سم . نصلها خلى البشرة . ازهارها حولية اللون او ردية ، نصلها شيقة وبيضية || ازهارها متكوكية التجمع قليل الككلى ، يستر من حيزان الى آف .



شواطة متكوكية

١٥٧٩٠ - شوكالة عكوكية ٥ Phlox paniculata (S). Phlox paniculé (F).

نوع حديد القربوب والاصرام جميعها مسرة زيبية تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . اوراقها كبيرة ، متعاقبة ، سنائية

Grise, Erinose

وسم يصيب بعض النباتات سببه حشرة تسمى اريوزو ، راجع اريوزو .

١٥٧٧٠ - شهيد ، شهيد Rayon de miel (F).

هو السمل لا يزال في تخاروب اقراصه . Honeycomb (E).

١٥٧٧١ - شهيد الخج ، قننير Chênevis (F).

هو بذر القنب . Hemp-seed (E).

١٥٧٧٢ - شهيرة التجمر Achalandage (F).

Custom (E). هي اشتهار سمة التجمر بين الحرفاء والزبائن .

١٥٧٧٣ - شهيرمان \* Tadorna (S).

Tadorna (F). Shaldrake (E).

جلس طير من فصيلة البليات ، اوله قليلة العدد جميعا من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق . اجسدها ريشة القوام . اثوابا متراكبة الالوان الجميلة العابقة . روميا سيد او غصفر . غاطها قصيرة ، مبطلة ، جهورية اللون || تآلت الحشرات والشرط البحرية عند مصبات الانهر . قوتها الاغشاب المائية والقشريات وبعض الاسماك الصغيرة || تنن اناصمها في الاجمار والابرة المهورية . انثا تنقع من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بمناورة الذكور نحو ٤ اسابيع .

١٥٧٧٤ - شهوة الطين Pica, Picage (F).

زيفان في اللوق يقيد بعض الحيرانات كالدج كاتيل والبقر والغنم الى اكل التراب والوسول والجلود والريش وما اشبه . سببه المقدر نقص في الجسم وانتقاره الى بعض الموائد البذائية الكافورية .

١٥٧٧٥ - شيقى Inspiration (F). Inhaling (E).

حركة من حركتي التنفس قولها ادخال الهواء الى الرئتين . وقد يحدث ذلك بالسعال كجوف الصدر من اهل الى اسفل ومن ارقاء الى الامام كتصعد الرئتان وتغلغل بالهواء حتى يصل الى الحويصلات الرئوية فتأخذ منه الاكسجين وتخلص من ثاني اكسيد الكربون .

١٥٧٧٦ - شوكا ، شوى Périrène (F).

خلاف الشف اي مصلح الجسمة . Pericranium (E).

١٥٧٧٧ - شوكان ٥ Intempéries (F).

Indemancy (E). مختلف العوامل الجوية غير المألوفة او غير العادية .

١٥٧٧٨ - شوار Entraineur (F). Trainer (E).

من تعامل ترويض خيل السباق .

١٥٧٧٩ - شوارك أنفوي Organe femelle (F).

Female organ (E). هي الاعضاء التناسلية الانثوية في الحشرة .

١٥٧٨٠ - شوارك ذكري Organe mâle (F).

Male organ (E). هي الاعضاء التناسلية الذكرية في الحشرة .

١٥٧٨١ - شواوب الطع هو الجلبان اللثاق ، الحلب .

## ١٥٧٩٦ - شَوَاعِيَّات ٥

Eresidae (S).

Eresidae (F). Eresidae (E).

فصيلة حناكب من رتبة الرتيلاوات . اجناسها واولعها كثيرة العدد . اصطلحها البلاد الحارة والمنتلة الحارة من المالحين القديم والجديد || اجناسها متباينة القد ذكورها اصغر من انثاها بما لا يقل عن ثلاثة اجناس || جميعها رباعية الاريا والمشتان تتميز بخلو بطونها من الصفائح البنية التي تشغل المشاان || الواجس مختلفة الاوان والتركيب . تعيش تحت الحجارة وعلى الادغال والجنات البرية . عكادب الاجناس الارضية اياش تحضرها في التربة تحت الحجارة وتبطنها بفلاف من التماس انبوي الشكل . عكادب الاجناس الشجرة صلبية الشكل . تتسجها بين قضبان النبات || اشهر اجناسها الشواع .

## ١٥٧٩٧ - شَوَاقِي

Nyctage (F).

هو شب الليل ، نبات حشي تربسي معمر ، اطبله .

## ١٥٧٩٨ - شَوَاقِيَّات

هي الشقيات لفصيلة لبائية من ذوات الفلقتين .

## ١٥٧٩٩ - شَوَاقِي

Pitcho

طائر من اللشلال ، اطبل دسله شواله .

## ١٥٨٠٠ - شَوَان

Grainier (F). Seedsman (E).

خازن القلة وياتها .

## ١٥٨٠١ - شَوَت ٥

شجرة بيرة وتزيينية من القزليات المتدنيات . مهدا افريقية الجنوبية . ساقها بطينة النمو فراء . فروعها صلبة الالياف والخشب . اوراقها مركبة وريشية وتزير التجميع . وريقاتها بيضية الشكل ، مجنحة التصل الجليل الخصار اللامس . ازهارها ضمية حراء اللون تشب في الفروع القديمة التي يقو عمرها الجلي . ثمارها متابل مبطلة متوسطة الطول كستية اللون . يزورها احادية الصف ، كلوية الشكل سراء اللون .

## ١٥٨٠٢ - شَوُوح

هو الشروب الاناضولي ، اطبله .

## ١٥٨٠٣ - شَوْحَلَة

هي الرخصة ، اطبله .

## ١٥٨٠٤ - شَوْحَط

الشوط ، شجر تنمذ منه القسي وقيل نوع من النبع وقيل هما والشراب واحد ويختلف الاسم بحسب كرم منابها فا كان في قلة الجبل فنبع وفي سفحه فشراين وفي الخضيف فشوط . واسمته شوشة (اللسان) .

## ١٥٨٠٥ - شَوْحَلَة فَرْقَاء اللَّذَب ٥

Cecura furcula, Harpyia furcula (S).

Harpyia fourchue, Petite queue fourchue (F).

Cecura furcula (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة شحشيات الاجنسة . موطنها سطر الاصفاة المحتلة الحارة من العالم القديم . فراشتها جابسة قوتها رسيق الازهار . سرقها تعيش على اوراق الخور والصفاصاف || جميعها متوسط القد يطول نحو ١٤ سم . بسطها نحو ٣٥ سم . راسها معتدل الحجم . عينها كبرتان . زياتها شحشيان من الاثني ، شحشيان مزدوجان من الاكفر . جوشها الى الردة تتوسط بقعة

الشكل ، مزغبة الصل . ازهارها عديدة الاوان مستطيلة القصل المدبة الاطراف || ازهارها حشولي التجميع كبير القد يستمر من آب الى ايلول .

## ١٥٧٩١ - شَوَاقِي لَيْفِيَّة ٥

Phlox amana (S).

Phlox gracieux (F).

نوع من الشواقية وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . اوراقها امليبية تطلو من ٢ الى ٦ سم . السفل منها مقنطرة اما البليا ذلقة . ازهارها وردية او بيضاء اللان . فصلها مهدية تغلفية الشكل || ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

## ١٥٧٩٢ - شَوَاقِي مَدَاكَة ٥

Phlox reptans (S).

Phlox rampant (F).

نوع من الشواقية وهي عشية زركوية مدادة معمرة . اوراقها امليبية مقنطرة الطرف . ازهارها حراء اللون او وردية او بنفسجية . بتلاتها بيضية الشكل . فصلها خروطية ملية الاطراف || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

## ١٥٧٩٣ - شَوَاقِي مَرْفُحِيَّة ٥

Phlox pilosa (S).

Phlox polli (F).

نوع من الشواقية وهي بجلة سبروتية تزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٦٠ سم . ساقها وريوحها مزغبة . اوراقها ضمية التصل تطلو من ٣ الى ٨ سم . وتقرض من ٣ الى ٨ سم . ازهارها بيضاء اللون او حراء او وردية . بتلاتها خلية البشرة ديقة . فصلها عرزية الشكل || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

## ١٥٧٩٤ - شَوَاقِي مَطْمَحَة ٥

Phlox maculata (S).

Phlox macul (F).

نوع من الشواقية وهي عشية سبروتية تزيينية معمرة تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متعاقبة سنائية الشكل . فصلها ماس الصفحة المبطلة مختلف المجات الخضر . ازهارها حطرية للزلفه لونها الى الحمرة او البياض . ازهارها قنوي التجميع . يستمر من تموز الى آب .

## ١٥٧٩٥ - شَوَاقِي سَوْدَاكَة ٥

Ereus niger, Er. cinnabarinus (S).

Ereus noire (F). Ereus niger (E).

دورية من الحناكب السابعة القانصة رباعية الاريا والمشتان من فصيلة الشواقيات || جميعها يتنيز بفارقة القد الكبير بين الذكر والانثى . الذكر يطول نحو ١٠ سم . شبه الى الصبية الحمراء ويلوحا بتجميع ابيض واسود . الانثى تطلو نحو ٢٧ سم . قوتها الى الولاد الباقي يطول خلو الحبل وتهديب في الاطراف ويملو صفحة بطنها كشة رباعية اطقات سفراء اللون || صدراتها كبير القد ، مقنطوم الطرف . عينها زرقيتان . شوشها صغيران ذريان . فكها جميعا الاطراف ، كليلها الملب . جرمها قوية . بطنها بيضي الشكل ، مبطط الجرم || تألف البراري . سرحها جبوي . قوتها الخشرات والباب والحوام عكديتها يش اسطواني الشكل ، محودي الازنكار ، بعيد القور تحضرها في التربة تحت الحجارة || يياتها الشقوي يستمر نحو اربعة اشهر . تعيش نحو ثلاث سنوات . ملجتها الحالي لا يتحضر من ملجن غيرها من الحناكب || تعتبر من العوييات الثامنة اللازفية .



شَوَاقِي سَوْدَاكَة



شَوَت



شَوْحَلَة فَرْقَاء اللَّذَب

منقطة خاسية الاعية للتأينة الثلاثية أو الثلاثية السام  
للناسية || أشهر أنوعها واضرها شول الورد وشول  
القرمبواز .

#### ١٥٨١٠ - شَوَّحِلُ القَرَمَبَوَازِ \*

*Phragmidium rubri-ideal, Uredo rubri-ideal, Caecomyces* (S). Rouille du framboisier (F).

فطر مجهرى يتطفل على الأوراق فنباتها ويسبب سفطها  
البكر || مظهره الخارجي بنور قرحية لا ياسبة الشكل  
تركب الأوراق على سفحاتها العليا . تبدو صفراء اللون  
ثم تتحرف نحو البرتقالي تقسب جفاف التسبج وذيل  
الأوراق وسفطها البكر || افرازه زينة لا تتسبب  
المكافسة وإن كان لا يدها فامتثال اخضر النحاس على  
فصه أو فصفين كان لقفاه عليه .



شول

#### ١٥٨١١ - شَوَّحِلُ الْوَرْدِ \*

*Phragmidium subcorticium* (S). Rouille de rosier (F).

فطر مجهرى يتطفل على سطح الورود المزروعة . مظهره  
الخارجي يقع سفية لا ياسبة الشكل لنها إلى السفرة  
البرتقالية، تركب الأوراق على سفحاتها العليا تكثر  
على السفحات السفلى بنور سم مبيطة بدون انتظام تكثر  
قرب الفروع || وقد يصعب مالحق الانتار وكورسها  
ليستعطفها بوشاح غلي اللبس ينقل إلى || يكلف  
بأخضر النحاس أو بالاكسكلوروبر .



شول القرمبواز

#### ١٥٨١٢ - شَوَّحِلُكَ ، مِمْسِكَةُ ، Mimidsma (F). Mimesis, Mimicry (E).

خاصة كاتمة في بعض الحيوانات واخضرأت تمكنا من  
التشابه بالأشياء التي تحيط بها .

#### ١٥٨١٣ - شَوَّرْ

هو اجتناء السمل أو السمل المشور أي المشفرج من  
القوسية .



شول الورد

#### ١٥٨١٤ - شَوَّوْبِ هو غاطف الذباب ، أطليه .

#### ١٥٨١٥ - شَوَّرْكَ Ruche (F). Bee-hive (E).

هي مأوى النحل كالكيلة والقفير ، الخ .

#### ١٥٨١٦ - شَوَّرْذِ Cystoparis (S).

*Cystopérís (F). Cystopérís (E).*

جنس نباتات عشوائية ، برية ، معمرة من الراسم .  
انواعها المعمرة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم القديم  
والجديد || أوراقها مركبة قطون من ٢٥ إلى ٤٥ سم .  
وردياتها شبه الطليجية النصل . راجعها حشفة البشرة .  
زكاتها عريانة يطبقها حار كثيف لزق ، تبي اللون .



شوري

#### ١٥٨١٧ - شَوَّرِي Avicennia officinalis (S).

*Paldeuvier (F). White mangrove (E). Salzbaum (D). Avicennia (I).*

شجيرة سرجية معمرة من فصيلة هي الحام مهدا البلاد  
الاستوائية . قشورها سامة طيبة يقال أنها تغيد للمنة .  
لوراتها وانزادها مياحية .

#### ١٥٨١٨ - شَوَّوْبِيَّة ، قَلْفَة Morphologie interna (F). Internal morphology (E).

درس هيئة الاجسام الحية وتركيبها في الحيوان والنبات .

جوزية . بقلها جزوي اللون، اربه اللاتي السكية ||  
رواشها عن التشقين إلى البياض اللامي تملو في التزج  
الامامي زخارف جوزية وجماء || لما جيلان في الخول .  
تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل  
الثاني في تموز . نروح في الليل . تماثل بعد ظهورها  
بنحو اربعة أسابيع وتضع المكن مياحيا على السفحات  
السفل من نصال الأوراق || السرة قطون من ٢٨ إلى  
٣٠ م . جسمها مائل القشار ، اكبه اللون ، مسطوط  
الرأس ، مسطح البطن ، مستطال المزخر الذي يتسهي  
بقرنين منمقين أسودين || طور الاكمال الذي يستمر  
نحو ١٤ يوما ينقضي ضمن صلبة مهذلة التسبج تمكها  
السرة بين شقوق ماء الحور والصنفات .

#### ١٥٨١٦ - شَوَّحِيَّات \*

*Ceruridae, Notodontidae (S).*

*Ceruridae, Notodontidae (F). Ceruridae, Pro-*  
*ninentia (E). Zahnpinner (D).*

فصيلة حشرات فراشية من حرشيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة نحو ٢٠٠٠ منتشرة في جميع اصقاع  
العالم || تسرح في الليل . طيرانها طويل الشوط . اجسامها  
متوسطة القد . رؤوسها مستطلة الجرم . عينيها كبيرة .  
قرونها الاستشعارية شديدة مزودة عن الذكور ، غطية  
أو مسطحة عند الاناث . ملاسها صغيرة ونحيلة . مراشفها  
خامسة كلها تجازو الجذمة . بطونها كيفية الحمل والزحف .  
سكها الشرجية مسطحة بأخر من الهلب المستطيل . حلقها  
تقع على جانبي الجش . رؤاشها كبيرة ، جلوية  
الاستمرار عند الرأحة ، الامامية منها مزعزعة ، الخلفية  
وحيدة اللون . جزامها تامة النمو . ظاهيها الخلفية ثلاثية  
المناسخ أو رباعيتها || أساريها عريانة أو مبيطة الهلب  
القصير . اجسامها بيانية الاحجام والاشكال المستعرة .  
سكها الشرجية لتفهي بقرون صلبة || غاداتها طليقة  
أو ملحقة بالبالع مهذلة التسبج || أشهر اجناسها الفوشل  
والسمريرة والفيط والقاليرا والفيجرة والديكراتور .

#### ١٥٨١٧ - شَوَّوْشَم \* Aeschynanthus (S).

*Aeschynanthus (F).*

جنس نباتات مدادة من فصيلة الفشوريات . مهدا  
البلاد الحارة . سورها نخيلة ، ملتوية ، مدادة وحانية .  
اوراتها لحية متعاقبة . انزاعها فردي التجمع ، محوري  
أو حامي الانكاز . انزاعها كبيرة القند ، مستطلة ،  
ثلاثية اللون ، زاحية الحسة .

#### ١٥٨١٨ - شَوَّوْخ \* Physospermum (S).

*Physosperme (F). Physospermum (E).*

جنس نباتات عشبية معمرة برية من فصيلة الحيات .  
انواعها المعروفة قليلة العدد ، جميعها من ثوبت الشرق الاولي  
واروبة || سورها رفيعة قليلة الفروع . اوراتها متعاقبة  
مركبة ، صلبة الورديات الدقيقة . انزاعها سيولي  
التجمع ، حامي الانكاز . انزاعها صغيرة يشاء اللون .  
تنويرها صلي .

#### ١٥٨١٩ - شَوَّوْكَ Phragmidium

جنس فطور مجهرية من فصيلة السحابيات . انواعها نحو  
٥٠ تتطفل على نباتات الفصيلة الوردية || يتسرح نباتاته  
القائمة التي تركب ليلي النبات وأخر البار || نكاته  
صقية الشكل مستطية الانكاز يطوحا دملة مفردة

## ١٥٨٢٦ - شَوْشَبَة مَذْهَبَة ٥ Lonchaea surra (S).

Lonchaea dorée (F).

نوع من الشَّوْب ، طولها من ٢ الى ٣ م. رأسها واربعها سود ، جسمها زبرجدي اللون ، ملعب المراج . رقاتها تمش على الثَّار الناضجة الساقطة من أي نوع كانت .

## ١٥٨٢٧ - شَوْشَبَات ٥ Loncheidae (S).

Loncheidae (F). Loncheidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، طولها يراوح من ٢ الى ٦ م. أثوابها غنقلقة الألوان ينقلب فيها الأزرق والاعصر . معظمها من الحشرات الثنائية الخلفية . رقاتها تمش على المواد الضوية في الثَّار الناضجة وفي التزبل ويحت خلاء الاجساد .

## ١٥٨٢٨ - شَوْشَبَة ٥ Entéromorpha (S).

Entéromorpha (F).

جنس نباتات بحرية من الحفريات الخضر . أنواعها المعروفة نحو عشرة . اصطناعها بحار البلاد المعتدلة الحرارة || جميعها اسطوانية او دوسية القواعد . قصيرة الكلاب . عويطة او قذبة الازواك المستطيلة ، ثلثولية المراج .

## ١٥٨٢٩ - شَوْشَبَة ٥ Amome (F).

في المال ، اطليه .

## ١٥٨٣٠ - شَوْصَر هو الشمر ، اطليه .

## ١٥٨٣١ - شَوْط Course (F). Rîde (E).

هو الجري مرة الى الثانية .

## ١٥٨٣٢ - شَوْطَس ٥ Anomia (S).

Anomie (F). Anomia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وفصيلة المحار . أنواعها المعروفة عديدة معظمها من عصجرات الطبقة الجيرية السفلى . اما الانواع المعاصرة لثائرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصطناعها لانظمة الشكل ، يغلب فيها الاهليسي . مصارعها لامتبوية ، دائمة الانفراج ، قليلة التفاعل ، شبه شفاة ، ثلثولية الدائل . وبصارعها السفلية اي اليسارية متقوية قرب الرباط وينتفخ هذوها تمتد الفضلات التي تمكن الحيوان من الالتصاق بالاجسام الخارجية || لحومها مأكولة جيدة المصفت ، مرفوف فيها .

## ١٥٨٣٣ - شَوْع Ben olifère

هو شجر البان واسمته شوية ويقال لشجره حب البان وزيتو دهن البان وعطر ملش .

## ١٥٨٣٤ - شَوْع Sarcloir (F). Hoe (E).

الشوف : الحبر تسوى به الارض المحرقة (القاموس) .

## ١٥٨٣٥ - شَوْعَان ٥

هو الحرقان ، اطليه . وهو بري وسفلي وزراعي وعريان .

## ١٥٨٣٦ - شَوْكَال هو الشقال ، اطليه .

## ١٥٨٣٧ - شَوْكَة Choucas

في شراب الزرع ، اطليه .

## ١٥٨٢٩ - شَوَرَزْ مُزْغَب ٥

Cryptophagus pilosus (S). Cryptophage poilu (F). Cryptophagus pilosus (E).

حشرة دائمة وأنجم من فصيلة الشفوذيات ورتبة مفدمات الاجنحة . تألف الاجنحة والمفاويز والمساكن الارضية . غنقلها ويزقاتها تعيش تحت القش والجشاة على المواد الضوية والنباتية المنحلة || جسمها صغير القند بطول نحو ٣ م. ثوبها الى الصخرة الشفراء المالح . مرناعها كيرتان . زياتها صولانيان . رأسها مستطيل الجرم . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، كيتف الحمل والزرع . ارسافها خماسية المعقل || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الخريف وتعيش حتى اوائل الشتاء . تسرح في الليل . تنفع المكن مصادياً وتلقيه بين القش والصل || البرقة عند بلوغها الادراك التام تقول نحو ٤ م. جسمها اسطواني الشكل سداسي الرؤوب ، تنه القرن ، لمر الرأس ينهي ، في مؤخر شرجها ، بكتلاتين قريبتا الشبه بكتلاتي البهك .

## ١٥٨٢٠ - شَوَرَزْيات ٥ Cryptophagidae (S).

Cryptophagidae (F). Cryptophagidae (E).

فصيلة حشرات غنقلية ودائمة من رتبة شفوذيات الجناح || اجناسها وأنواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . تألف المواقع الرطبة والاماكن الظليلة والاجنية والمفاويز والكهوف . قوتها المواد الغنقلية والذاتة || جميعها صغيرة القند قلما يتجاوز طولها ٤ م. اجسامها خلية القشور . مسعرفة الرؤوس ، مستطيلة التزيان الصوبانية الاطراف المركبة من ١١ فصلة || احمادها لاحة . جرامزها نفضة . ارسافها خماسية المعقل || أشهر اجناسها الشفوذ والاتيواريه .

## ١٥٨٢١ - شَوَرَزْ ٥ Gaberi, Gaberit (F).

Mould, Full-sized model (E).

غنط الشيء بمقابله التسمية الصحيحة .

## ١٥٨٢٢ - شَوْش ٥ Zanchus (S). Zanco (F).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السحليات . انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مسطرة الشكل ، مغلطحة الجسم ، لامة الاذنان . تكثر في بحار البلاد الحارة . وهي من الاسماك المأكولة المتوسطة الصنف .

## ١٥٨٢٣ - شَوْشَبَة ٥ Lonchaea (S). Lonchée (F).

الشوشبة ج. شوب : جنس حشرات صغيرة القند من فصيلة الشفوذيات . أنواعها عديدة جميعها ثنائية الخلفية تمش على مختلف المواد الضوية الحيوانية والنباتية || أشهر انواعها الثلاثة التالية .

## ١٥٨٢٤ - شَوْشَبَة اليكَة ٥ Lonchaea chorea (S). Lonchée sociale (F).

نوع من الشَّوْب . طولها من ٣ الى ٤ م. رأسها سفلي ، اربعها سود ، جسمها ازرق لاح . رقاتها تمش تحت سلف طاء الانجار .

## ١٥٨٢٥ - شَوْشَبَة عَصْرَكَة ٥ Lonchaea aristella (S). Lonchée verte (F).

نوع من الشَّوْب . طوله نحو ٣ م. ثوبها الى الخضر . الباقي يطو ملج اسود . رقاتها تركب ثمار التين فضليا .



شورز مغب



شوش



شوشة اليلة



شوشة خضراء



شوش



ساقه قوية فراءه رقيق نحو ١٠٠ سم. بشرتها منشقة برقة ارجوانية جوية لا قياسية الانتظام. اوراقه مركبة تشبه اوراق البقدونس، نصلها شديد الخضار المابق نسيجه غزير اللادة الجسالية الفعالة. ازهاره صغيرة القد، يفضا اللون. ثماره كروية صغيرة || منته المناطق المعتدلة الحرارة يقرب في الاراضي البور المتوسطة الرطوبة. يكثر قرب السباحيات وجوانب الانية. وهو في البلاد الكثيرة الاشعاع الشمسي اغزر مادة وادى فاعلية. وهو من النباتات الطبية الجزلة التي يستخرج من حصارته مادة الشوكرين التي تدخل في عدة تركيبات ومستحضرات ناعمة || كان شائع الاستعمال في الصور الفائرة لتسميم الناس وقد أمر سقراط بشرب نقيته فات.

١٥٨٦٦ - شوكران سام\* ، شوكران مشين، قاتل البقر

*Cicuta virosa* (S). *Cicutaire*, *Cigu virose*, *C. des marais* (F). *Cow-bane*, *Water hemlock* (E). *Echter wasserschierling*, *Wütherik* (D). *Cicuta*, *Finochio acquatico*, *Cicuzaria* (I).

ليات عشبي بري طلي جبالني من فصيلة الحميات. يكثر في المنطق وحل ضفاف مجاري الماء. جلوده لينة غليظة. ساقه فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه مركبة، متعاقبة، ورية التجميع. ورقها لينة، حادة العنقة. نصلها عايق الخضار اللامع، مسن الحافة. ازهاره صغيرة القد. تلية اللون، خضره الموج. رائحة ازهاره واوراقه منته. حصارته غزيرة للمادة الجسالية الفعالة المسية، تستعمل في الطب استعمال الشوكران.

١٥٨٦٧ - شوكران صغير\* ، شوكران البستاني، بقدر ولس كاذب

*Aethusa cynapium* (S). *Aethusa*, *Petite ciguë*, *Ciguë des jardins*, *Ache des chiens*, *Faux-perill* (F). *Asse's parsley*, *Fool's parsley*, *Lesser hemlock* (E). *Hundsgleisse*, *Hunds Petersilie* (D). *Piccola cicuta*, *Prazzemolo bastardo* (I).

عشبة برية جبالية طلية من فصيلة الحميات تكثر في الاراضي المزدرة المتوسطة الرطوبة، ساقها تملو نحو ٥٠ سم. فروصها اقية الانتشاب. اوراقها تشبه البقدونس. حصارها جبالية مينة.

١٥٨٦٨ - شوكروت، ورق الملفوف الحفوظ الملح.

١٥٨٦٩ - شوكرين، مادة جبالية فعالة تستخرج من حصاره الشوكران والشوكران المتن والصغير.

١٥٨٧٠ - شوكل، هو البويع. واحدته شوكله وثمرته شمول.

١٥٨٧١ - شوكي، شكل من الزباني قلمه فواصل اسطوانية مستطيلة متتامة تستقل تدريجياً مع ابتعادها عن السكة ورأس الحشرة.

١٥٨٧٢ - شوكرات، الشوكيات قسم من الحيوانات البحرية. رقبها وفصالها وابناسها وانواعها عدة آلاف تبسها حبة سفوف ||

يكثر فيها الاسود والاشهب || اعرف انواعه واشهرها شوكراني الهند.

١٥٨٥٦ - شوكراري الهند\*

*Graeculus indicus* (S). *Choucarri des Indes* (F). نوع من الشوكاري. موطنه الهند. يألف القباب والاحراج قوة الاسراع والقدان ينتقب الاحجار في طلبها ان لم يجدها سارسة || جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٨ سم. ثوبه الملوي متراكب الاسود والاشهب. عيناه مغطتان بالاسود القاسم زووه وصدره ويطله الى الفرة. منقاده اسود. قائمتا واصابه الى السرة المابقة. جناحه وتاجي و ذلق، لاحت. ذنبه معتدل الطول خفي الطرف المستدير || يدلن حشه في الاحجار الدامية. الاتي تحضن بتناوبة الاكر من ثلاث الى خمس بويضات مرة واحدة في الحول.

١٥٨٥٧ - شوكران هو الشكامة، اطليا.

١٥٨٥٨ - شوكة

عضو خشبي صلب الجسم حاد الطرف يحصل من تحول ورقة او برمة او زينة او اذلة. والشوكه تكون دائمة الاتصال بنشب لينة.

١٥٨٥٩ - شوكة السباحين، اطليا.

١٥٨٦٠ - شوكة حادة

في الزرعور الشالك، اطليا.

١٥٨٦١ - شوكة زرقاء

في الشناب الجسني، اطليا.

١٥٨٦٢ - شوكة صفراء\* ، سكرليخس، قرنون

*Scolymus* (S). *Scolyme*, *Epina* (F). *Spotted golden thistle* (E). *Labgoldkorn* (D). *Scardiacione*, *Spina gialla* (I).

ليات عشبي بري وزعاري من فصيلة المركبات. ساقه مضطعة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقه كبيرة القد، كثيرة التفريخ والتمسج، قليلة الشوك، نائكة الازرة الطرفية الصفراء اللون || اكوازه الزهرية كوية القاعضة، ازهاره بنسجية الانتشاب زرق الازام الثاني وكالث، ليلية الزام الاخير || يزوع جلوده المأكولة السكرية الطعم.

١٥٨٦٣ - شوكة قبطية في البستل البري، اطليا.

١٥٨٦٤ - شوكة مباركة\*

*Cnicus benedictus* (S). *Chardon béni* (F). *Blessed thistle* (E). *Benedict ditzel* (D). *Cardo benedictus* (I).

ليات عشبي بري حولي من فصيلة المركبات. ساقه مضطعة فراءه تملو نحو ٦٠ سم. اوراقه الجلمية كبيرة القد منته، نصلها ثنائي التفريخ واضمحج، اخضر اللون، اصفر الموج، ابيض البروق، غليظ الشوك الطرفية. اوراقه القوية لاطنة، مستطيلة، مفرشة، مسنة الحافة، شالكة. اكوازه الزهرية صغيرة القد مستطيلة. ازهاره صفراء اللون، طيبة، تستعمل كقوية ومبرقة وداملة الجرح ومبيدة للاكل.

١٥٨٦٥ - شوكران\* ، طحجاء، يسئس

*Conium maculatum* (S). *Ciguë*, *C. tachette*, *Grande ciguë* (F). *Hemlock*, *Poison hemlock*, *Herb benet* (E). *Echter schierling* (D). *Cicuta*, *Erba grande* (I). ليات عشبي بري طلي جبالني حول من فصيلة الحميات.



شوكراري الهند



شوكة صفراء



شوكة مباركة



شوكران



شوكران سام



شوكران صغير

حل الشامي\* باتجاه الجنوب || له ثومان امريكا الفوس  
الايث.

١٥٨٨٣ - شونيس أبيض\*  
Chionis alba (S).  
Chionis blanc, Pigeon antarctique (F).  
نوع من الفوس طوله نحو ٣٦ سم. ثوبه الى الابيض  
الناصع. منقاده اخضر الجسم اسود الطرف. حبه الى  
الزرقه يحويها لطار اخر. رسله اسود فقد. جوي  
اللون، سردي الجلد. شتره اسبابه ضيقة مستطيلة.



شوكية

١٥٨٨٤ - شونيسيات\*  
Chionidae (S).  
Chionides (F). Chionidae (E).  
فصيلة طير وسيمة الجلس من رتبة طير الساق. اولوها  
المروقة قليلة العدد. اشكلها تجمع بين اشكال الزنراق  
والنورس والفلق. تتميز باجسامها الربية وبمنايقها  
المغلقة بفاد بعضها من القناعة الى طرف المنطق.  
موطنها العالم. تكثر في البلاد الاسريكية. تألت التطوط  
الصخرية. قوتها الحشرات والقشريات والاصنامك.



شونيس ابيض

١٥٨٨٥ - شونيز، شيشيل\*  
Nigella (S). Nigella (F).  
جنس نباتات شبيهة سولية برية وزراعية من فصيلة  
الفقيقيات. ازهاره ٢٠ معها البلاد المدعة الحرارة  
اوراقها مركبة غبيطة، ازهارها فردية، تاجية، غميلة  
الاولان. ثمارها جراء صغيرة اسطوانية الشكل، زورها  
دقيقة مستطيلة مواء اللين || اشهر اولها ما يتبع.

١٥٨٨٦ - شونيز إسباني\*  
Nigella hispanica (S).  
Nigella d'Espagne (F).  
نوع من الشونيز الزراعي المحلي في شرويه  
واصرامه عديدة قطو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اولوها كبيرة  
القد، حاملة القباب، حبيبة الاولان، يعلب لها الازرقاني  
والاقرق والليكي والمليح || ازهاره يستمر من سزيران  
الى تموز.



شونيز دمشق

١٥٨٨٧ - شونيز الحقل\*  
Nigella arvensis (S).  
Nigella des champs (F).  
نوع من الشونيز البري المحلي يكثر في الاراضي الكلسية  
وهو من نباتاتها الطويلة. يعلو من ٢٠ الى ٣٠ سم.  
ازهاره متوسطة القد، زرقاء اللون. كما به غروطية الشكل  
مستطيلة الطرف || ازهاره ربي.

١٥٨٨٨ - شونيز دمشقي\*  
Nigella damascena (S). Nigella de Damas (F).  
نوع من الشونيز الزراعي المحلي في شرويه  
واصرامه عديدة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم. ازهارها متوسطة  
الحجم، زرقاء اللون ابيض، قنبا حديد الاسم  
للمستطيلة الضيقة للمركبة || ازهاره يستمر من سزيران  
الى تموز.



شونيز زراعي

١٥٨٨٩ - شونيز زراعي\*  
Nigella arvensis (S).  
Nigella cutiviva, N. romaine, Cumin noir (F).  
Common fennel flower, Black cumin (E). Echter  
Schwarzkümmel (D). Nigella, Cuminella (I).

نوع من الشونيز وهو نبات شبي حولي زراعي يعلو  
من ٤٠ الى ٦٠ سم. ساقه فراء. اوراقه مركبة. ازهاره  
كبيرة اللثة، زرقاء اللون. ثمار جراء مستطيلة عديدة  
البذور || يزهره تمحي حبة البركة والحب السودة وهي  
صغيرة اللثة، مستطيلة الشكل، سيده اللون يستخرج  
منها زيت طهي يفيد الازلة الصدرية ويسكن السعال  
الصبغي. وجب البركة يستعمل كالتوابل والبهارات وهو  
مقو مرموق ينه الحضم ويهد القلب واليول.

بينها شامية. جهازها الهضمي وجهازها الدوري مستقلان.  
هيكلاها الانسي كلي التركيب مجهز، غالبا، بانوك  
مفصيلة متحركة. تقوب دروعها تسج بمرور الواس  
التي تستعملها اما للانتقال او للتثبت. اولوها مجهزة  
باعدات صلبة تحكها من الفسخ. اسامها ثنائية التلافيث ||  
اما صوفها الخمسة فهي: زنايق البحر، للتجويبات،  
الكروانيات، الاقويادات، قنانيات البحر.

### ١٥٨٧٣ - شوكية

الشوكية منزل من منزل القمر اليابانية. وهما كوكبان نيران  
متقاربان يكادان يمسان ذنب القرب. ويقال لما حدة  
القرب || رقيب الشوكية يدعى الحقة.

### ١٥٨٧٤ - شوكية

Dard du scorpion (F).  
Sting of the scorpion (E).  
هي حدة القرب.

### ١٥٨٧٥ - شوكية بيشهه

هي السنج، اطليه.

### ١٥٨٧٦ - شوكية\*

Macrorhamphus  
taczanowski (S). Macrorhamphus Taczanowski (F).  
طائر من طوال الساق الضارب وفصيلة الزنراقيات. اصطنه  
الشرق الاقصى. يآلت المناطق الباردة في السيف والذاتة  
في الشتاء. ملجئه الحياتي جاسي. جماعته في الزين المادي  
لا تتجاوز ١٠ ازواج وتتجاوز الخمسة الاف عند الرحيل.  
قوته الحشرات وبيوتها واليدان ودميل المتفاد ... ||  
جسمه متوسط القد، يعلو نحو ٣٥ سم. رأسه صغير  
الجرم. منقاده مستطيل جالس. جناحه ذلقان لاسفل.  
ذنبه قصير مقطوع الطرف. ثوبه متركب الاولان، وأسه  
وزوره وريده وجناحه الى الكمية السوداء، صفه ويطنه  
الى القشرة المنسقة بالريدة. جناحه مرقان بالنيمة  
يدن حشه بين احداط وأسل المناطق الرطبة غير  
المضروبة بالماء. الاثنى تحسن وسطا اربع بياض بينا  
الذكر يعلو لها اللذاه.

### ١٥٨٧٧ - شوكية

هو الثيلم، اطليه.

### ١٥٨٧٨ - شوكية

هو الثيار، اطليه.

### ١٥٨٧٩ - شوكية

Cephalanthus (S).  
Cephalanthus (F).  
جنس نباتات جفومرية برية معمرة من فصيلة السحليات.  
ازهاره المروقة قليلة العدد || يربط منها في لبنان الشيوخ  
الحسامي (الرقق (C. confertifolia). ينبت من ارتفاع  
١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ م. من سطح البحر. اوراقه منابتة  
التصال مستطيلة كغلام. ازهاره يضاء اللون، شرفاتها  
ملطقة بالاصفر.

### ١٥٨٨٠ - شوكية

هي الانبار، اطليه.

### ١٥٨٨١ - شوكية

هو الشندر، اطليه.

### ١٥٨٨٢ - شونيس\*

جنس طير من فصيلة الشونيات. موطنه شامي\* البلاد  
الباردة. وهو قريب الشبه بالهام يتميز ببناتة منقاده  
المثلث المحرطي الشكل، باصطاة اسبابه وضيق شترتها  
وبذنه المقطوع المربع الشكل || قوته الاغصان والحشرات  
ويض الفلق والطروح. انتاه ثمن في انصوس تقيره

جزوي اللون . عينها زيمتان . شيفاشا شيطان ، عينا العفاف الذرية . فكاه مستطيلان . جرانزا سمراء اللون ، كثيفة الحلب يعلها يضيء الشكل ، احر اللون تملوه خمسة خطوط يضيء متفرعة يقطبها خط مستقيم ابيض || تألف الاساكن القريبة من المساكن الزرقية ، عكدها قرب يطلو من ٣٥ الى ٤٠ سم . تقسمه تحت الحجابة وبهنا . سرسها دجوي . قوتها الحشرات الصغيرة || بيتها الشتوي لا يتجاوز ١٨ اسبوعا . تعيش نحو ثلاث سنوات || والاقى تتجسجس في الكفن في فضاء متين الحيك تلتد وتحمله لاصفاً شفاها حتى التلف . ثم تحسن الصغار عل ظلو يعلها نحو اربعة اسابيع || تتغير من اللويات المتعددة اللافوية .

١٥٨٩٨ - شيبا حيايت (S).  
Dysderidae (F). Dysderidae (E).

فصيلة عاكب من رتبة الارتبلاوات . اجناسها وارتوابعها المعروفة نحو ١٠٠ منتشرة في جميع البلاد المعتدلة الحرارة من العالم القديم . جميعها مقترنة ، مصطبة القدر او صغيرة . تتميز بما يعلها من رسوم متناسقة الاشكال . ويرتكز حيوها الزيمية الست التي لا تشرف حل حاقة الجلبة بل تتأخر عنها بعض الفويه . شيفاشا قوية و نشيطة ، مصطبة العفاف . الوها متباينة الالوان يكثر لها الاحمر والاسمر || سرسها دجوي . تخصي || الفهار حسن مكادب قرابية الشكل ، متينة الحيك ، سمراء اللون || اشر اجناسها الشياحة والشبيصة .

١٥٨٩٩ - شيبا (F).  
Schema (F).

١٥٩٠٠ - شيبا كاهية (S).  
Sciara huntia (S).  
Sciara messagere (F).  
حشرة لافوية من فصيلة الشياريات . جسمها صغير القدر يطلو من ٦ الى ٧ سم . رأسها مكور ، مستقل . عينها متلاصقتان عند الذكر ، متفارتان عند الاقنى . زباناها عيطيلان . قوتها مصطبة ، قصيرة . طنائها مجهزة بمناسخ ذرية . ورشاشا مستطيلان . ثوبا الى الخطي المايق الاطحل المايح || الاقنى اكبر قند من الذكر ، تتجسجس في الجلالة فيقتف من يرقات تعيش عل المواد النباتية المتحللة .

١٥٩٠١ - شيبا ريات (S).  
Sciariidae (F). Sciariidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وارتوابعها المعروفة عديدة منتشرة في سطر اسواق البلاد المعتدلة الحرارة . تعيش عل رقيق الاطرا || اجسامها صغيرة ، نحيلة ، مصطبة الشكل . رؤوسها مكورة ، مستقلة . اعينها صغيرة . حيوها زيمية ، متقاربة عند الذكور ، متباينة عند الاناث . قوتها الاستشارية عيطية تتألف من ١٦ فصلة . قوتها مصطبة ، نحيلة . طنائها مجهزة بمناسخ ذرية || يرقاتها انبوبية الشكل ، صغيرة القدر ، سوداء اللون ، تعيش عل المواد النباتية المتحللة .

١٥٩٠٢ - شيبا كاه (F).  
Diagmatrie (F).  
Diagmatrie (E).

الشياحة علم يبحث في لوصالية المواد المختلفة .

١٥٩٠٣ - شيبا كاه (F).  
Diagmatrie (F).

هي الاسوخ ، اطلية .

١٥٩٠٤ - شيبا (F).  
Diagmatrie (F).

هو وشق الناقع ، اطلية .

١٥٨٩٠ - شوبل (S).  
Dipteronia sinensis (S).

شوبل هو الاسم الصيني . شجرة شبه مظلة الشكل من فصيلة التفقييات . منبتها الصين . ساقها مائلة السماء منبسة الاضمان والافان ، تملو نحو ستة امار . اوراقها عابلة ، متقابلة ، مركبة ، وريقة التجميع عند ١١ الى ١٥ وريقة . نصالحا سنانية الشكل ، لافانية التسنين الحاربي ، تطلو من ٧ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ سم . انزراعها شحولي التجميع ، طري الارتكاز ، مصتب . انزاعها صغيرة القدر ، غفرار اللون ، خابية الترتيب || ثمارها جناسية يضيء الشكل ، ثنائية الكرايل ، رسيحة البزرة ، تطلو نحو ٢٥ سم .

١٥٨٩١ - شوبل (F).  
Tetaso (F).

هو الكزاز مرض حيوي .  
١٥٨٩٢ - شوبل (F).  
Porc-épic à queue blanche (F).

هو الشحم الابيض للذب ، اطلية .  
١٥٨٩٣ - شوبل (F).  
Agénésie (F). Agénésie (E).

الشربة اغتراف عضوي شاذ سبه عجز في الطاقة المبذولة .

١٥٨٩٤ - شوبل (F).  
Agénésie (F).  
شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٥ - شوبل (F).  
Shobul (F).

شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٥ - شوبل (F).  
Shobul (F).  
شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٦ - شوبل (F).  
Shobul (F).

شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٦ - شوبل (F).  
Shobul (F).  
شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٧ - شوبل (F).  
Shobul (F).

شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٧ - شوبل (F).  
Shobul (F).

شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٧ - شوبل (F).  
Shobul (F).  
شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٧ - شوبل (F).  
Shobul (F).

شوبل هو الحسون ، اطلية .  
١٥٨٩٧ - شوبل (F).  
Shobul (F).



شوبل



شكة حمار





شبت حكيبي



شبح قير



شبح اليهودية

للركبات الانبوبية الزهر . انواله عليفة منتشرة في معظم اصقاع العالم منها البرية والعلبية والسناعية والتربينة . فروعها نجلة خشبية . اوراقها صمغية زباد للصل . ازهارها دقيقة ، وروسية ، يعلب فيها اللون الاصفر المشع بالاصفر . اعرف انواله واشهرها الانسين والقيصوم وقشورلا والبيتران ، جميعها من النباتات الطبية التي تقطع البلم وتخرج الديدان وتذهب البرق والمص . يقال ان نفع ازهارها واوراقها يقيد ليل السكري . وادها مع اي دهن كان يرلى داء القلب والغاز . سريق اوراقها في المنازل يطرها ويذهب الحشرات والحولم . مادتها الدمالة تسمى ستينين .

### ١٥٩١٥ - شبح ابيض الزهر

*Artemisia lactiflora* (S). Armoise à fleurs blanches (F). نوع من الشبح وهو جينة عمرة هبرية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها وفروعها ملس للدهاء ، حمر اللون . اوراقها سنائية النصل ، خالية الصفة العليا ، عريضة الزلعة ، ازهارها مفرقة تجمرها النصل . قنايتها وسراشها ييض كالحليب . ازهارها يستمر طول الحريف .

*Artemisia pontica* (S). شبح ارضي . Armoise pontique, A. du Pont, Petite absinthe (F). Roman wormwood (E). Römischer Beifuss (D). Asenzio pontico, Piccolo asenzio (I). نوع من الشبح وهو نجلة عمرة تملو نحو ١٠٠ سم . ساقها وفروعها زباد للدهاء ، خالية الشكل . اوراقها لائقة الخفسار ، ثلاثية الانقسام ، ضيقة العرف . ازهارها عقودية ، مستعقة ، مثلية . قنايتها يستمر من آب الى تشرين .

*Artemisia atrata* (S). شبح أسمر . Armoise brune (F). نوع من الشبح وهو نبات بري وزراعي مصر يرضى في المواقف الجبلية . يملو نحو ٢٠ سم . اوراقه ثلاثية الانقسام ، غفراء اللون ، حادة العرف . ازهارها عقودية التجميع ، وروسياته الزهرية كروية الشكل ، مثلية ، قنايتها زباد البشرة حمر الخنار . ازهارها يستمر من تموز الى آب .

*Ascophyllum nodosum* (S). شبح قير . Ascophyllum nouveau (F). نوع من القيقس . اصلته بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي . كلاله صغيرة . ساقه مبطلة فزاه . اوراقه غليظة . مرحة شبه ضيقة الشكل . لونه الى الاسمر .

### ١٥٩١٦ - شبح اليهودية \* ، شبعان ، حبيشان

*Artemisia judaica* (S). ببحتران . Armoise de Judée, Absinthe de Judée, Samen-coetra (F). Judan wormwood (E). Wermut aus Judäa (D). Same zanto (I). نوع من الشبح وهو نجلة بوية طيبة عمرة تملو نحو ١٢٠ سم . مهادها البلاد الفلسطينية . اوراقها وازهارها تنصل بصفات سائر انواع الشبح الا انها خيرة المادة القحالة . يستخرج منها اصل الستينين .

*Artemisia annua* (S). شبح حوي . Armoise annuelle (F). نوع من الشبح وهو نبات حولي لولج العرف الطري

*Décembre* (F). شبيبان ١٥٩١٥ - هو شهر كانون الاول .

١٥٩١٦ - شبيكة هي فن الشبح ، املية .

١٥٩١٧ - شبيكة العجور هي سزار الصخر ، املية .

١٥٩١٨ - شبيث . *Scutigera* (S). *Scutigères* (F). *House centipedes* (E). *Spinnenasseln* (D). جنس دويبات من الشبذخات الخزانة . انواله المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم . جميعها مفترسة ، دجوية المسرى ، تفعل المنازل اعصها الارضية تقضي على الكثير من الحشرات المجنة وغير المجنة ومنها الديدان على اختلاف اجناسها .

### ١٥٩١٩ - شبيث حكيبي

*Scutigera araneoides*, *S. Coleoptera* (S). *Scutigère aranéide* (F). دويبة مفترسة من الشبيث وضيعة الشبذخات شطوية الاصل . تألف المراتب الربطية واللاصقة والكهوف . تسرح في الليل وتقتل المنازل الارضية وتقضي على الكثير من الحشرات اعصها المجنة وديدان الجناح والديدان . جسمها سكي ، التركيب ، مبط ، مستطيل ، كثير الجرامز الدقيقة التي يبلغ عددها ١٥ زوجاً . الذكر اصفر من الانثى ، يملو نحو ١٦ سم . والاني ٢٤ سم . راسها صغير . شهادها لافان . عندها مركبتان ، ثلاثية الزلثم . زها لاما نحيلان . تزوج الاخير من جازها بالمل الطويل الذي يفوق طول الجسم . تجر من القويبات الشائعة .

١٥٩٢٠ - شبة . *Particularité* (F). *Particularity* (E). هو كل لون يختلف اللون الفاصل ان في الخلل او في الابقار . فائقة والتسجيل والتعظيم من الشيات .

١٥٩١١ - شبة العيجان . *Ecison* (zooc.) (F). *Boutcheon* (E). حلافة في البئر الحلو يتنبت في اواسط او اعالي مظهر الفسح وتلبي عند طائر الفرج او في محيط . يستغل منها ، بالنسبة الى شكلها وسحبها وانفراجها ، من قابلية اللد في البقرة .

١٥٩١٢ - شيتين ، شوك . *Chitine* (F). *Chitin* (E). هي المادة القشرية التي يتكون منها جلد الحشرات والجمادات وهي باسطة شديدة المقاومة لاحتياها على بعض المواد الجبرية .

### ١٥٩١٣ - شبيث

*Gymnogramma* (S). *Gymnogramme* (F). جنس نباتات خشبانية ، بزية ، عمرة ، من فصيلة البسباسيات . الانواع المعروفة نحو ٣٠ منها بعض اصقاع البلاد الحارة من المال القديم . اوراقها كبيرة ، مركبة ، وتزينة التجميع ، جميلة الخفسار الزواحي . مراوحها غليظة . زكاتها شبه لمسونة باصابع النصال . منها انواع قترينة تزدهج في المراكن .

١٥٩١٤ - شبح ، ارضي . *Artemisia* (S). *Wormwood* (E). *Beifuss* (D). جنس نباتات عشبية خشبية بزية وزراعية من فصيلة



شجيرة نسي

يملون من ٥٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه خلية النصل، مستعرضة التثنية. ثباته شائعة، حروفها خضراء اللون || ازهاره يستمر من تموز الى آب.

### ١٥٩٢١ - شجيرة عرساني، قيصوم طبي

*Artemisia santonicum* (S). *Armoise santonique* (F). Holy wormwood (E). Helligger Balsam (D). Santonico (I).

نوع من الشجيرة وهو بحجم بريد طرية مسنة تملو من ٤٠ إلى ٨٠ سم. ساقها بقرورها زاه اللحماء. أوراقها مفصصة الصلبة، تملأ خلي البشرة عابث الخضار، قوي العرف. ازهارها مبشرة، كثيفة التجميع، فليسة الفلدا. أوراقها وازهارها طرية وتستخرج منها مادة السنتونين.

### ١٥٩٢٢ - شجيرة رومي، هو الابلست، اطليه.

*Artemisia frigida* (S). *Armoise rustique* (F).

نوع من الشجيرة وهو بحجم صغيرة مسنة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها بقرورها مزرقة اللون، كثيفة الزغب التي اللون. أوراقها وسيدة القورس، لثالية التثنية، خلية النصل، عادية العرف || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين.

### ١٥٩٢٤ - شجيرة ليفي، هيبيركان ابيض

*Artemisia argentea* (S). *Armoise argentée* (F). Silvery wormwood (E). Silber Wermut (D). Assenzio argenteo (I).

نوع من الشجيرة وهو جنية مسنة تملون من ١٠٠ إلى ١٧٠ سم. ساقها بقرورها كثيفة الزغب الكففي اللون. ازهارها متدلية عادية العرف، ثباتها مزرقة البشرة، زغبها ابيض اللون، نفي المواجه || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

### ١٥٩٢٥ - شجيرة كالكوري

*Artemisia camphorata* (S). *Armoise camphrée* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات مسمر فروع العرف الكالكوري يملو من ٣٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه متقنة النصل، خلية الصلبة الحولية البشرة. ازهارها متعددية التجميع، رطلة. ازهاره يستمر من تموز الى آب.

### ١٥٩٢٦ - شجيرة مكاليبي

*Artemisia scoparia* (S). *Armoise à balais* (F).

نوع من الشجيرة وهو نبات محلي يملو من ٣٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه بقرورها ملطحة اللون، سماء الزغب. أوراقه ملساء البشرة. ثباتها ازهاره جوية اللون، شائعة الخمار اللامع || ازهاره يستمر من تموز الى تشرين.

### ١٥٩٢٧ - شجيرة حبان، ارموزه دة جودا، هو حبيب اليهودية، اطليه.

*Armoise de Judée* (F).

### ١٥٩٢٨ - شجيرة البعر، شجيرة اليهود، ابو مريكة

*Lepocoyx monachus* (S). *Lepocoyx, Phoque moine, Moine* (F). *Leptocoyx, Monk-seal* (E).

حيوان بحري لوبن من زعتيات الاقدام فضيلة التفتيات. موطنه البحر الابيض المتوسط والبحر الاسود. ملجته الحيواني جماعي، جاماته قليلة البدن. قوته الاسماك والقشريات والرخويات || جسمه معتدل يطوي عنه الذكر من ٢٤٠ إلى ٢٦٠ سم. رأسه متوسط الحجم يتميز بكثافة سباله. ذيله سالي الشكل. ثوبه الملوي الى



شجيرة البحر

السرة المملوءة يملوها مواج اسود. يملو الى البياض المائي. ايطلاء مرقشتان بالاسمر الاسود || الاثني اسفر قفا من الذكر. طولها يراوح من ١٨٠ الى ٢٠٠ سم. تمنع جروا واحدا ترشحه نحو ستة اشهر ويبقى معها من ٢٠ الى ٢٢ شهرا.

### ١٥٩٢٩ - شجيرة الربيع، هو الاريفارون، اطليه.

*Antilope thibétaine* (F).

### ١٥٩٣٠ - شجيرة، هو النيرج، اطليه.

### ١٥٩٣١ - شجيرة، الثيرو حيوان لبن جبري يدعى طبي التبت، اطليه.

*Genista* (S).

### ١٥٩٣٢ - شجيرة، جنيسيت،

*Genêt* (F). *Genista* (E).

جنس نباتات جينية وجميلة مسنة من فصيلة القرنيات القرابية. انواعها المروقة قليلة المدد اصطناعا بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة || سيقانها فراء. فروعها متباينة الاشكال ونسبها الشاك. أوراقها بسيطة او ثنائية التجميع، صغيرة النصل الجامدة. ازهارها متعددية التجميع او فردية اجلي الانكاز. ازهارها صفراء اللون. اشهر انواعها:

*G. caesia* (S). *شجيرة افرية*

*G. libanotica* (S). *شجيرة لبنانية*

*G. lydia* (S). *شجيرة ليدية*

*G. scanthocida* (S). *شجيرة فلوكة*

### ١٥٩٣٣ - شجيرة شوكس،

*Schizocappa* جنس نباتات عشبية صغرية من فصيلة التكتيات. انواعها قليلة، منها البلاد الحارة، تزرع للزينة. ازهارها كبيرة اللد بحجم المنظر غطافة الالوان الزاهية.

### ١٥٩٣٤ - شجيرة شونل،

*Schizoneila* جنس فلور مجهرية من فصيلة الراهرديات تتميز بطولها القياسي الشكل ثم يعضها الكيفي القسي التجميع وبوبريقاتها الشمية الثنائية التركيب || يصيب السمديات حل اعتلاط انواعها.

### ١٥٩٣٥ - شجيرة، هو المرمر، اطليه.

### ١٥٩٣٦ - شجيرة، متهد، شس،

*Schista* (F). *Schist, Slaty rock* (E).

خضار صخر صلب التركيب اصابه غطط شديد في اعماق الارض. يرجع منه الى ما قبل الاراضي الطباشيرية في الحقبة الكانونية.

### ١٥٩٣٧ - شجيرة، شيليك،

*Chélidre* (F). *Chelicer* (E).

شيلسا الحشرة او الكونية حيا كلابيا ملقضا الشفوي.

### ١٥٩٣٨ - شجيرة شيليكيات،

*Chélicérates* (F). *Cheliceræ* (E).

فئة من المفصليات حيواناتها عادية الزياتي تستعصى منها بزيج من الشيلساف. يعضها غشيشي التنس كما في صف المرصعيات، والبيض الآخر لودي او قسيمي التنس كما في صف المتكبيات.

الرقابة تركت على اجتناب بطرية التربة وكثافة الاشجار .  
ثم استعمال الاسلحة الموزونة التركيب والصيغة واجتناب  
نقص الادوية في الاوقات الحارة .



شيش

Marginella (S). شيشع ١٥٩٤٥  
Marginelle (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل  
وضيلة الشيشيات. انواعها المروفة نحو ٣٠٠ وبها  
من متصبرات الاسحاب لثائية والباقي منتشر في معظم  
بحار البلاد الحارة . بعض انواعها يعيش على رمال الشواطئ  
المسورة والبعض الآخر على حشائش الجبال || اصنافها  
مائلة متباينة الاشكال والاحجام يكثر فيها الشكل  
البصري ثم الخدوني . فماتها مستطيلة ، غشقة .  
اريفاتها اليسرى ملتوية الى الداخل اما اليمنى فالى الخارج ||  
اجسامها كبيرة . رؤوسها واضحة ، ثنائية الالوان للمحيرة  
اعطائها صغيرة . اذنيتها فضفاضة . ارجلها ماعدة المغاط .  
اشهر انواعها الشيش السرديني (Marginella sarda) الذي  
يشبه السردين شكلًا وحجمًا والذي يكثر وجوده في البحر  
الابيض المتوسط .

Marginellidae (S). شيشيات ١٥٩٤٦  
Marginellidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مديات الايل .  
اجناسها وانواعها المروفة عديدة ، بعضها من متصبرات  
الاسحاب لثائية والبعض الآخر مناصر منتشرة في معظم  
بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اعراف اجناسها  
واشهرها الشيشع .



شيشع

١٥٩٤٧ - شيشرج هو الصاب ، اطبخ .

١٥٩٤٨ - شيشس الزفرين

Gonepteryx rhamni (S).  
Gonepteryx citron (F).

حشرة من فصيلة الكرنفيات وريقة برششات الاجنحة .  
اصطلاحها صباب وجبال الشرق الاذل وارودية والريفية  
الثالية . خرافتها واضحة فتها عنر الاضرار . مرشبات تعيش  
على براعم التينيات وتوليبها || جسمها بطول نحو ١٩ م .  
يسقطها نحو ٥٦ م . رأسها معتدل الحجم . احمر اللون .  
ميناها كيرقان . زباناها صولجانان يشبهان كثيف الخمل  
احمر اللون . بطنها اريد اللون عند الذكر ، الخمل عند  
الانثى . ووشانها الاسمانين الى الصفار البصري عند الذكر  
والى الخضار الباهت الازرق المروج عند الانثى . وتلونها  
نقطة برتقالية في كل ريشة وبض نقط حاشية فمسية  
اللون . الزوج الخلفي بلون الاسمانين وتلونه عند الششين  
نقطة برتقالية كبيرة واربع نقط صغيرة فمسية اللون ،  
حاشية || لها جيل واحد في الحول . الانثى تضع المكن  
زويبا زويبا على زيمات الزفرين والبقع والعتاب || السورة  
اسطوانية الشكل بطول نحو ٣٦ م . فورها الى الحاملة  
الخضراء يملوا عطلان جانبيين اسفراوا ونسمة خطوط  
كستنية يحدها اطوار اسود . رأسها اسود ملها ورواجها  
الى الحاملة الداكنة || طور الاكمال يستمر نحو ١٥  
يوما ويتقشر ضمن غشاء ضوحي اللدة ويملأ غيب  
سريري تعشده الحفصة .



شيشس زفرين

١٥٩٣٩ - شيشس ٥  
Rumex (S).  
Rumée (F). Rumex (E).

جنس نباتات دليصة من فصيلة السونيات . منبتها  
ساحل حوض البحر الابيض المتوسط . انواعها المروفة  
سنة . سوقها غمراخية ، قرصية الالتفاف ، لايامية الارواح  
منها الوحيدة وبها الفمية . اوراقها متماثلة شقيقة اتصال  
المستطيلة . زهارها فردية ، طرفية الازنكار . الوانها تختلف  
من نوع الى نوع ، منها البنفسجي والوردي والاصفر  
والبلكي والمزوط .

١٥٩٤٠ - شيشيان ٥  
Fourmi mite (F). Ant male (F).

هو ذكر النمل .  
Lanchoptera (S). شيشير ١٥٩٤١  
Lanchoptère (F). Lanchoptera (E).

جنس حشرات من فصيلة الشيشيريات وريقة ذوات  
الجانحين . انواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في معظم مناطق  
البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة هيفاء ، تطول  
من ٢ الى ٥ م . رؤوسها كبيرة ، مستعرضة . حينها كبيرة ،  
ناشرة ، غايقة عند الششين . قرونها الاستعمارية قصيرة ،  
ثلاثية الفصل ، تنهي بنسيلة دقيقة . اعطائها فمسية .  
ملابسها وحدة العلة . كولسها وبطنتها مساوية العرض .  
روافئها فيه شفاقة . قرونها مبرقة الحلب الشالك .  
الولها ملونة || تألف اللبابات وشفاف مجاري الماء .  
جسمها واضحة ، قوتها رسيق الازمار وطلمها . يرقاتها تعيش  
على المواد النباتية الجزئية الاصلول في الجلالة وفي كل  
مكان آخر .

١٥٩٤٢ - شيشيرات ٥  
Lanchoptéridae (S). Lanchoptéridés (F). Lanchoptéridés (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المروفة متوسطة العدد منتشرة في بعض اصقاع العالم ||  
تألف الحراج واللبابات وبعضها يعيش قرب مجاري الماء ||  
اجسامها صغيرة ، هيفاء ، تطول من ٢ الى ٥ م . رؤوسها  
كبيرة . حينها غايقة عند الششين . قرونها الاستعمارية  
قصيرة ، ثلاثية الفصل . اعطائها فمسية تتدرج في  
التجويف اللثكي . شفاهها السفلى لاصقة . تآكلها ضامرة .  
روافئها شبه متباينة الشكل . قرونها نقطة ، مبرقة الحلب ||  
يرقاتها مبطلة تعيش في المواقع الرطبة على المواد النباتية  
الجولية الاصلول || اشهر اجناسها الشيشير .

١٥٩٤٣ - شيشط ٥  
Brûture (F). Scald (E).

استراق النبات من الصمغ . يقال شيشط الصمغ النبات .

١٥٩٤٤ - شيشط البشركة ، شيشط التينار  
Rousissement de l'épiderme, Rousissement des  
fruits (F).

الشيط تشويه عايط يحل بمخلبا الادة فيفقد عايط ويوجب  
استبدالها بمادة فلفية . اسبابه عديدة احصاها :  
١ - العوامل الجوية اللاذاتية كالبرد والرطوبة وتنفذ  
الحارة التي تقب البقعة وتستر نحو ٤ اسابيع .  
٢ - الاختلال في توازن اللدلاء .  
٣ - الحش الخائن من استعمال بعض الادوية الكاوية .  
٤ - الازماد الباكرك اذا امتدى القابل قبل الازراق او  
ركب الازراق والتار في آن واحد .

من اللبالية الى السرة الخلفية يطبقها حصار اسود. رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخيط. شفها متوسط الانفرج. فكها متعادلان. اسنانها متراصة وسيدة الصف في الفكين. زعنفا مستديرتان، ولشزتان. زعنفا الظهرية لثنتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لحما وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

### ١٥٩٨١ - شيم طرخوري \* طرخورة

*Trachurus trachurus* (S). Saarel, Chinchard (F).  
Scad, Horse-mackerel (E).

سمكة بحرية يمرض من الشبهات الاسقرليات شالكات الزمائف. اصطلها جيم بحار البلاد المظلة الحارة من البحر الابيض المتوسط الى المحيط الاطلسي والمحيط الهادي من جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الاربعة اترقاء ينضّر ويسرّ عند الظهر ويبر عند البطن. رأسها مخروطي الشكل مستد الحبر. فكها الاسفل يتقدم الاسفل. تتميز باستطاعة زعنفاها الظهرية والشرجية. زعنفتها الذيلية فاقية. حرافض عظمها الجاني جانبية الشكل تملأها مناس متفقة تتجسم وتكبر مع الاقتراب من اللب || لحما متوسط الصنف، مأكول.

### ١٥٩٨٢ - شيم قراب \* قراب

*Caranx korab* (S). *Caranx korab* (F).  
*Caranx korab* (E).

سمكة بحرية يمرض من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويمرض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثقات واليم || جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٥٥ سم. ثوبها الى الشبه النضية المالح. ظهرها الى الزرق. زعنفاها الصدرية والخصوية الى الشفحة. الظهرية الى الخشار البحري، الشرجية شائعة بطولها حصار اصفر. الفلقة العليا من الذيلية الى الزرقه الخشراء الموج، الشفلة السفلى الى الصغار الباهت || لها في ظهرها زعنفتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لحما جيد الصنف، مغروب فيه.

### ١٥٩٨٣ - شيمييات

*Carangidae* (S). *Carangidae* (F).  
*Carangidae* (E).

عارة اسماك من الاسقرليات الشالكات الزمائف.

### ١٥٩٨٤ - شيميية \*

*Caractérologia* (F). *Characterology* (E).

الشيحة قسم من السيكلوجية يبحث في الطباع الخلقية.

### ١٥٩٨٥ - شيشير

هو الشيشير، الحلبه.

### ١٥٩٨٦ - شيم

*Hystrix* (S). *Porc-épic* (F). *Porcupine* (E).

جس سوزانات لينة قاسمة من فصيلة الشبهات انواعه سة. جميعها غليظة الاجسام المشفحة الصمورة. رؤوسها مكرنة. مقاصها مشقولة. خناياها استمورة. حيدنها وأذناها صلبة. اعناتها قصيرة. جرائزها مستدلة القدة قريبة. اخلافا مقومة حادة. اذنانها جدد بارزة. لها كيف التجميع قصير القدة يصله شوكة كاسلال متجانس الطول والغلقط يملو الجسم من قة الرأس الى طرف الذنب || اعرف انواعه الشيم الملبول والشيم الابيض الذنب. قال فيه الجاسط : « من شأنه انه يمدد قائما وذا رأى ما يكره انتفض وتنفص فيخرج منه شوكة كاسلال يجرح من اصابعه ».

كل مستطيلة. الككة تشمل من ٢٤ الى ٢٦ مكة تنقف بعد منها بنسبة او سبة ايام نسية الى موائل القس من رقات صغيرة نسية تنقل على الارواق وتغفر السورق ويبلغ كامل نمجا البرقي بنحو ثلاثة اسابيع ثم تتحول الى عذارى ومنها الى حشرات كاملة. طورها القذري يدوم في الربيع والصيف من ٤ الى ٦ ايام || اما البرقة الككالة فطولا نحو ٢٠ م. لونها الى الجلالة الخلفية يطبقها حسة خطوط ارجوانية مستطيلة تتكشف للظهر والجانين || موائلها عديدة اعلمها قصب السكر والارز والفلو الصغراء والبيضاء والذئب والتبيل || اخرها شديدة القبح لنها تحفر السورق وتغضي حل النواي.

### ١٥٩٧٧ - شيميكة \*

*Chilina* (S). *Chilina* (F). *Chilina* (E).

جس سوزات مائية من الرغويات مبدات الاربل وفضيلة الشفحات. انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلها اتر ويتابع ارمكة الجنوبية. تفتي التباينات للماكة || اصطلها نصف كروية للشكل، قصيرة الوب، كبيرة القوة المستطيلة. اجسامها مستطيلة. رؤوسها قليلة العرض مبطلة. لواسها مزوانية الشكل. اربطها وحيدة، مستعرضة، عادية السطاط.

### ١٥٩٧٩ - شيم اوبه \*

*Caranx glaucus* (S). *Caranx glaucus* (F). *Glaucous scad* (E).

سمكة بحرية يمرض من فصيلة الشبهات وربة شالكات الزمائف. اصطلها يمرض القالم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي... تتميز من الاسماك البنية || جسمها اعليجي الشكل، مستطيط، بطول من ٥٠ الى ٦٠ سم. ثوبها الى الاربعة يطبقها موج ازرق يتخلله الاخضر البحري يمتد في الظهر ويبر في البطن ويملو جميع فصي منه قامة الزنفة الظهرية الثانية والزنفة الشرجية. رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخيط. شفها واسع الانفرج. فكها متعادلان. اسنانها صغيرة وحيدة الصف في الفكين. زعنفا مستديرتان، مستديرتان. زعنفا الظهرية اثنتان. زعنفتها الذيلية فاقية || لحما وديك، ابيض اللون، مستحب اللحم.

### ١٥٩٨٠ - شيم صتمين \* صتمين

*Caranx zameun* (S). *Caranx zameun* (F).  
*Caranx zameun* (E).

سمكة بحرية من اللحم. اصطلها جيم القالم البحر الاحمر ويمرض مناطق البحر الابيض المتوسط. تتميز من اسماك الثقات واليم || لمنجها الحياتي جلعي يمد الادراك || جسمها اعليجي الشكل بطول من ٤٠ الى ٥٠ سم. ثوبها الى الشبه النضية الماحدة القس. زعنفاها الصدرية والخصوية عبره اللون. زعنفتها الشرجية والفلة السفلى من الذيلية الى الصغار الخفي الموج. زعنفاها الظهرية والفلة العليا



شيم



شيم اوبه



شيم صتمين



شيم طرخوري



شيم قراب

ورقة للقرص . اجناسها وانواعها عديدة تتميز باجسامها البنية المتقرصة . رؤوسها غليظة . مقامها مشوية . اذنانها قصيرة او طويلة اخاذة . جرائزها متساوية الطول رباعية او خمسية الاضلاع . انظرها قوية ذرية . جلودها حسية التركيب يطولا حلب دقيق وشوك كالشال متباين القلط والطول || جلودها المناطق الحارة من المائلين القديم والجديد . وهي بطيئة الحركة تسرح في الليل قريبا مختلف المواد النباتية والظاوع والاورغ والافاعي .

تقسم هذه الفصيلة الى فئتين :

— فئة الشياحم الشاجرة المتسلقة وهي تشمل ثلاثة اجناس الاروين والكتنوس والشطوس .

— فئة الشياحم الارضية وهي مؤلفة من جسيمن الشبح والاطرور .



شبح مدبل

#### ١٥٩٩١ - شبهات الفؤوب ٥

*Hysticomorpha* (F). مرتبة حيوانات لبونة من رتبة القوارض تشمل اربع فصائل الشبهات والافانبات والفنشيبيات والكندريديات .

١٥٩٩٢ - شبهات ٥ *Cheyota* (F). هو الشوك من نبات زراعي من القرميات ، اظله .

#### ١٥٩٩٣ - شيوخ ، شوكية شائعة

*Indivision* (Juv.) (F). Joint-possession (E). ساحة قانونية يوجد فيها من يملك حقاً مشتركاً مع غيره في مال او عقار لم يقسم بين مالكيه ويكون كل مشترك شريكاً بقدر نصيبه في كل جزء من اجزاء المال المشترك على الشيوخ ويكون نصيبه معنوياً محصاً بغير عه بالارقام كالنصف والربع والثلث في حين يبقى المال الذي ينصب عليه هذا الحق شاملاً .

١٥٩٩٤ - شينودكة *Chionodonta* (F).

هي الثرثرة ، اظله .

١٥٩٨٧ - شبهات أبيض الذئب ، شبهات ومدك *Hystrix leucura* (S). *Porc-épic à queue blanche* (F). نوع من الشبح كبير الجثة غليظا بطيء الحركة ، طوله يراوح من ٧٠ الى ٨٠ سم . وذنبه من ٧ الى ١٠ سم . ثوبه الى الصبغة البيضاء . عليه ابلق اللون وشوكه كلك . ذنبه ابيض الملب والشوك || موطنه الهند وباران والمراة حتى ضفاف بحر قزوين . يأنف المناطق القترية من العراق . جسمه ردة فسيحة مستطبة يطرحها على حق ٧٠ سم . يادى لها في النهار . يسرح في الليل . قوته الجلود والسقل والاضباب || اثناء تضع من ٢ الى ٤ ادناس تخلف باصرة كاسية .

١٥٩٨٨ - شبهات بحري *Hérion de mer* (F). *Porcupine fish, Sea hedgehog* (E). هو قنفذة البحر من الفئيات ، اظله .

#### ١٥٩٨٩ - شبهات ميدون \* ، شيقم ، دكك ،

*Hystrix cristata* (S). *Hystrix cristata* (F). نوع من الشبح غليظ الجثة الزينة الصمورة . بطيء الحركة . طوله يراوح من ٥٥ الى ٦٠ سم . وذنبه ١٦ . شوك فقرته ومنقعه دقيق مستطيل منطوف اقزام الاخير . طوله نحو ٣٣ سم . شوك ظهره كثيف التجميع مستطيل الشكل غليظ القذ ذريب الاطراف يطول من ١٥ الى ٢٥ سم . يلفسه الحيوان لتفادع عن النفس فيتعاد ويؤدي حيث يفرز || موطنه فسيح الارياب يعم كامل موطن البحر المتوسط || يأنف الاحراج والمغصبات والاماكن البعيدة عن العمران . جسمه ردة فسيحة يطرحها في التربة على حق ٦٠ او ٧٠ سم . مدغنها ويغريها لفق واحد طوله نحو ٥ امتار || يسرح في الليل . قوته الاضباب والجلود وجميع انواع الشوك والضميد وبعض الحشرات والديدان والورغ والظاوع والافاعي || اثناء تضع من درسين الى ٤ ادناس تخلف باصرة كاسية .

#### ١٥٩٩٠ - شبهات

*Hystriidae* (S). *Hystriidae* (F). *Hystriidae* (E). فصيلة حيوانات لبونة قاضية من مرتبة شبهات الفؤوب



ص

#### ١٥٩٩٩ - صابونيات ، قريسيات

*Clupoides* (S), *Clupéides* (S), *Clupéoides* (S).  
فصيلة اسمك حديثة الأجناس والأنواع، متفردة القدر  
الأسراب. أشهر أجناسها الصابونية والشابل والسردين  
والرلكة الخ.

١٦٠٠٠ - صابون *Sevon* (F), *Soap* (E).  
مادة صناعية تستعمل للتنظيف تتكون من تفاعل بعض  
المواد المعدنية مع بعض المواد القلوية .

١٦٠٠١ - صابونيات *Sapindacées* (F).  
هي فصيلة السينديات ، أطلبها .

١٦٠٠٢ - صابونية *Saponaria* (S).  
*Saponaire* (F), *Saponaria* (E).  
جنس نباتات برية وزراعية من فصيلة القرنفلية ،  
أنواعها نحو ٢٠ جميعها منقطة . أوراقها كاملة متفابلة .  
أزهارها ثورية التجميع . تاجية الارتكاز ، زاهية الألوان  
التي تختلف باختلاف الأنواع || أعرف أنواعها وأشهرها  
سائل .

#### ١٦٠٠٣ - صابونية دابكية

*Saponaria glutinosa* (S), *Saponaire visqueuse* (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة سريرية محولة تملو من ٢٥  
إلى ٥٠ سم . ساقها فراء مزغبنة . أوراقها كبيرة القدر ،  
تصلها ثلاثي أو خماسي المروحة ، أزغب البشرة ، داكن  
الأسود . أزهارها حربي الشكل . أزهارها قرمزية اللون ،  
صغيرة البتلات الجزلة .

#### ١٦٠٠٤ - صابونية زينة

*Saponaria ocimoides* (S), *Saponaire faux-basilic* (F).  
نوع من الصابونية وهي عشبة سريرية معمرة تملو من ٢٠  
إلى ٤٠ سم . ساقها فراء . أوراقها منقطة ، عطرية ،

١٥٩٩٥ - صادة *Délivre* (F), *After-birth* (E).  
ما يخرج من رحم أنثى الحيوان من القلي بعد الوضع .  
يقال ألت البقرة صانها .

#### ١٥٩٩٦ - صابة ، مكيلا

*Hippomane manchinella* (S), *Mancanillier*, *Arbre*  
*poison*, *A. de mort* (F), *Manchineel tree* (E), *Mancinellbaum* (D), *Mancanilla*, *Mancinella*, *Noce*  
*valenoso* (I).

شجرة من فصيلة السيمييات تملو من ٥ إلى ٧ أمتار ،  
شكلها على هيئة الجوز . ساقها سرية صهوية . أوراقها  
معتقة ، متعاقبة ، قلبية ، مستطيلة . تصلها شديدة الحصار ،  
متنوع الصفحة ، حبيك التسيج . أزهارها وسيدة المسكن ؛  
الذكورية قدية الشكل ، غدية التجميع ، والانثوية فردية .  
ثمارها كائناح الصغير شكلًا وحسبًا وهي مأكولة ، لذيلة  
العلم . والشجرة تفرز شائنة أي عصارة لينة حريفة ،  
كاوية ، سامة . ومنهم من قال إن كل من نام في ظلها  
كان نصيبه الموت . ج صاب .



صابة



صابونية

١٥٩٩٧ - صابونة *Aloose finta* (S).  
*Aloose*, *Feinte* (F), *Shad* (E).

سمكة من الصابونيات كبيرة القدر ، تملو نحو ١٠٠ سم .  
تكثر في المتوسط وعلى شواطئ الأطلسي . تتسلل الأغوار  
وتصعد الأنهار في زمن السرم ثم تعود إلى البحر في أواخر  
الصيف || لديها لذيلة العلم غير أنه كثير الحسك .

١٥٩٩٨ - صابونة النيل *Clupea nilotica* (S).  
*Aloose du Nil* (F), *Nile Shad* (E).

سمكة بحرية زهرية من الشابلات الصابونيات ، موطنها  
المتوسط . يكثر ربيدها في النيل من آذار إلى تموز وهي  
كبيرة القدر ، كثيرة الحسك ، مأكولة .



صابونية رعانية



١٦٠٤٦ - صَبَّارٌ بَيْضِيّ *Opuntia ovata* (S).

*Raquette ovoïde* (F).  
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ١٢ سم. ساقه ملسية  
اللون البني الشكل المبط. سداثر رافعة ، مضربة ،  
صفراء اللون ، حاتها مستقيمة مقلعة || انزاعها جزئية ،  
جيلة ، كبيرة ، قطرها نحو ٦ سم.

١٦٠٤٧ - صَبَّارٌ صَرَح *Opuntia inermis* (S).

*Raquette sans épines* (F).  
يزرع للزينة ولأشجار المأكولة . مهد بلاد الأنتيل ولزوريا  
غليه يملو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. ألوانه احليجية الشكل ،  
بحرية اللون تطلو نحو ٢٠ سم. سداثر قليلة ميمرة سمراء  
اللون ، مدامة الشكل || انزاعها كبيرة القد ، قطرها نحو  
٧ سم. لونها ال الصفرة الباهتة . ثماره يرتقالية الشكل  
متصلة الحجم ، سكرية اللب ، حوله الزور القرماسة .

١٦٠٤٨ - صَبَّارٌ سَتَنْكِي *Opuntia stanleyi* (S).

*Raquette de Stanley* (F).  
يزرع للزينة ، غليه يملو نحو ٣٥ سم. ساقه مقلصة .  
الوانه صفية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. سداثر رافعة  
خضدة يضاء اللون . حاتها كثيفة التجميع مشربة السرة  
تطلو من ٤ الى ٦ سم || انزاعها كبريتية الصفار ، زاهية  
اللون ، قطرها نحو ٥ سم.

## ١٦٠٤٩ - صَبَّارٌ قَنْطَدِي \* ، كاكوس شوكي

*Echinocactus* (S). *Echinocactus* (F). *Spine cactus* (E).  
*Igelkaktus* (D). *Echinocacto* (I).  
جنس نباتات زينة شاككة ميمرة من فصيلة الصباريات.  
ألوانه عديدة مهدا البلاد الأمريكية الراسل . ساقها  
عسكية واسعة القطعة ، يرتقالية الشكل بخضة الجسم ،  
مقلصة الرأس والعقب . سداثرها كثيرة العدد ، مستقيمة  
الابعاد ، حطالية اللون ، تركل على فوج الاغصان .  
حاتها ، قوية صلبة ، منسطة ، متشابكة || انزاعها  
حادية ، كبيرة القد ، بحرية اللون الوردية . زرع في  
الماكن لأنها تحض البرد .

## ١٦٠٥٠ - صَبَّارٌ مَعْرُوف \* ، صَبَّارٌ ، تين شوكي

*Opuntia vulgaris* (S). *Raquette commune*, *Figuler*  
*de Barbarie* (F). *Barbery fig* (E). *Gewöhnlicher Fel-*  
*genkaktus* (D). *Fico di Barberia* (I).  
لبات سبروتي شائع الاستعمال يزود التسبيح ولأشجار  
المأكولة . غليه كثيف التجميع يملو نحو ٢٠٠ سم.  
ألوانه كبيرة القد ، بحرية اللون . سداثر حطالية شاككة ،  
حاتها غليظة سادة || انزاعها كبيرة القد ، زاهية الصفار  
الجليل . ثماره مأكولة ، يضيء الشكل مقلصة الرأس  
والعقب . قشورها ال الخضار الاصفر تملو عند الادراك  
مشمسة حواء . وهي مستقيمة السداثر الشاككة . شوكها  
كثيف التجميع شديد أصلاية والفة . لبها سكري الطعم  
مرصوف الزور ، يقال انه لا يخلو من بعض المناسبر  
الندانية المفيدة ونها الحامض التسريفي الجزيل النفع .  
يميش في جميع الأربعة من البردية القاسية الى الحسية  
الندجية . يتكاثر بفرس ألوانه او بجزء منها .

١٦٠٥١ - صَبَّارٌ مَعْرُوف *Opuntia tunicata* (S).

*Raquette à tunique* (F).  
يزرع للزينة . غليه يملو نحو ٣٠ سم. ساقه ورعوية  
أسطوانية ، قلماسة ، قليلة التبطيط ، تطلو نحو ٥ سم.  
الوانه صفرة القد ، بحرية اللون . سداثر حطالية ميمرة ،  
حاتها قوية تيلة اللون تطلو نحو ٤ سم . || انزاعها الى  
الخضار الاصفر الزلامي المتاجج .

١٦٠٣٣ - صَبَّارِي الحِسَاب *Décompte* (F).

*Deduction, Allowance* (E).  
هو تين رصية الحساب المطلوب .

١٦٠٣٤ - صَبَّار *Epierreur* (F). *Clempur* (E).

الساكور الى المند آلة تقلع الحجارة من الارض ويجمعها .

١٦٠٣٥ - صَبَّارُوكَة *Fosse cérébelleuse* (F).

*Cerebellar fossa* (E).  
الصانورة : بلمان التصف لتشرق على الدماغ .

١٦٠٣٦ - صَبَّار *صال*

الصال : الحار الوحي الحاد الصوت ، ج. صالة .

١٦٠٣٧ - صَبَّارٌ ، لَقِي *Gommeux* (F).

*Gummosus* (E).  
ما كان معني المادة او ما كانت تملو مادة صفية .

١٦٠٣٨ - صَبَّارٌ ، صَبَّار *Sec, Desséché* (F).

*Dry, Withered* (E).  
١٦٠٣٩ - صَبَّارُوكَة

هو الشبان ، لبث شاكك من التنبهات ، اطلبه .

١٦٠٤٠ - صَبَّارُوكَة *هي لئن* ، اطلبه .

١٦٠٤١ - صَبَّار *Vent de l'Est* (F). *Easterly wind* (E).

هي الريح الشرقية ميمر من مطلع قمرها الى بسات نش .  
يقابلها القديور .

١٦٠٤٢ - صَبَّار *هو التمر الحضي* ، اطلبه .١٦٠٤٣ - صَبَّار *Opuntia* (S). *Raquette, Oponos* (F).

جنس نباتات حسية من فصيلة الصباريات . انزاعه عديدة  
مظمها بري وبسها زرامي وزفني . يميز بسكه  
وفره المركبة من عدة ألوان متباينة وتنسمة ، يضيء  
الشكل ، صمكة التصل ، بحرية اللون تملو بعض السداثر  
الشاككة الانطالية الاكثر . هذه الالوان تظهر وتند  
مبطلة ، مدامة الصلابة ، فزيرة المادة الكروية ثم تتصلب  
وتشده لالها مع كر الزين تصمد وتندرف نحو الشكل  
الاسطواني || انزاعها كبيرة القد ، زاهية الالوان المختلفة .  
ثماره متباينة الاحجام ، شاككة القشور ، لذرة اللب ، كثيفة  
البور الهلينة الشكل ، الصغيرة القد ، الشديدة الصلابة  
والسرة || احرف ألوانه واشهرها ما يبع .

١٦٠٤٤ - صَبَّارٌ الصَّرُوع *هو القرمية* ، اطلبه .

## ١٦٠٤٥ - صَبَّارٌ المِنْد \* ، صَبَّارٌ حِنْدِي ، زِين

المِنْد *Opuntia ficus indica* (S).

*Raquette des indes, Figuler d'Inde, Nojral* (F). *Indian*  
*fig, Prickly-pear* (E). *Indischer Felgenkaktus* (D).

*Fico d'India, Fichidindia, Pero pungente* (I).  
نبات سبروتي شائع الاستعمال . مأكول الثمار . غليه يملو

من ٢٠٠ الى ٥٠٠ سم. ألوانه الحولية يضيء الشكل  
تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. وتندرف من ٢٠ الى ٢٥ ،  
نصلها بحري الخضار يسلك نحو ٤ سم. سداثر ميمرة  
يبدن انتظام ، شوكها خيل مستدق || انزاعها كبيرة القد ،  
صفراء اللون . ثماره كتال الصير الا انها اقل استدارة  
وشوكا . لبها سكري الطعم مستحب للملق ، زوروا  
كثيفة التجميع ، سمراء اللون || زراعتة شائعة الاستعمال .  
ألوانه الحولية ملونة تأكلها الابل والبقار ويربين عليها  
نوع من الكوكشيل قريزي الخصاب .



صبار المند



صبار قنطدي



صبار معروف



صغير القند ، جبل الازهار المتتابعة الثلاث المرجانية اللون . لا ينشئ سوى كثرة الازوت والرطوبة المستحكة .

١٦٠٦٦ - صَبَّارَيْنِ هو القشاقخ الحزني ، اطليه .

١٦٠٦٧ - صَبَّارَيْنِ \* Saprinus (S), Saprina (F).  
جلس حشرات مقفرة من فصيلة الصبريات . انزاهه للمعرفة نحو ٣٠٠ جميعا صغيرة القند بنسبة الشكل طويلا يراوح من ٣ الى ٧ م . انزاهها مختلفة الالوان منها الاسود المنقط بالابخر ومنها الازرق الاخضر اللؤلؤ ومنها الاخضر الالس الاسفل اللؤلؤ || ريقاتها وانجحة وقائصة .

١٦٠٦٨ - صَبَّامَةٌ

نبات قريب القند من البام ، ابيض الثمر ، يألف الرمال وتألفه الطلح .

١٦٠٦٩ - صَبَّارِج \* Sepiolo (S).  
Sépiola (F), Sépiola (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاربيل ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز بقصبة الصبريات . انزاهه المعرفة قليلة العدد اصطلحها بعض بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها فيه اسطوانية لشكل مستديرة الاطراف . زمامتها غليظة مستديرة . جرامزها حافسة ، عادية الهامج ، منها ثمانية متساوية الطول ولثنتان مستطيلتان || اشهر انزاهه الصبورج المبلول (Sopiola vulgaris) الذي يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط . لحمه مأكلي جيد الصنف .

١٦٠٧٠ - صَبَّارِجِيَّات \* Sapididae (S).  
Sapididae (F), Sapididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات رأسيات الاربيل ، ثنائيات الخياشيم ، عشاريات الجرامز || اجسامها صغيرة القند جرابية الشكل او اسطوانية . اجناسها المعرفة اربعة اشهرها الصبورج الذي يعيش في بحار البلاد المعتدلة الحرارة . اما الاجناس الاخرى فاصطلحها بحار المناطق الشمالية .

١٦٠٧١ - صَبَّارِجَة Barilius (S).  
جلس امسك ثورية من الشبايط . انزاهها المعرفة ٧ جميعا من امسك المناطق الحارة وفي منطقة القند او صغيرة . اشهرها صورة الازدن المعرفة بالاشرى وصبره النيل وصبره القرات .

١٦٠٧٢ - صَبَّابٌ ، تَجَجٌ ، تَجَرٌ Débit (F).  
Gaueing (E).  
كية للماء المنقطة التي تنصب من ثمر وبيع وقناة وتقطط وغيرها في ثائرة أو دقيقة او ساحة .

١٦٠٧٣ - صَبَّابِج هو الحجار ، اطليه .

١٦٠٧٤ - صَبَّابٌ ، صَبَّابٌ Curneim  
نوع من الثيود الكثيفة التجميع المايقة للترابكة المستديرة الاطراف المتوسطة الارتفاع القزيرة الطول .

١٦٠٧٥ - صَبَّابٌ هو الصبار المروث ، اطليه .

١٦٠٧٦ - صَبَّابَةٌ Figue de Barbario (F).  
Barbary fig (E).  
ثمرة الصبير المأكولة .

١٦٠٧٧ - صَبَّابَةٌ Pétrographie (F).  
هي علم الصخور .

١٦٠٥٢ - صَبَّارٌ وَرَقِي هو القليلوكاكتوس ، اطليه .

١٦٠٥٣ - صَبَّارَةٌ

اسم شائع الاستعمال يطلق على الصبار والالوة والقمطرة .

١٦٠٥٤ - صَبَّارِيَّات Cactaceae (S).  
Cactaceae (F), Cactaceae (E).

ومنهم من قال شوكرات . فصيلة نباتية من ذوات الثقلتين مستقلة العائلات منخفضة اللبش || اجناسها ١٣ تشمل زهاء ٢٠٠٠ نوع ، مهددا البلاد الحارة ، معظمها امريكي المكتش .

١٦٠٥٥ - صَبَّارِج Colorant (F), Colouring (E).  
كل مادة ملونة تستعمل في التذهيب .

١٦٠٥٦ - صَبَّابٌ Nutation (F), Nutation (E).

الصَّبَّابُ ، فلكتك ، اتقابل المصروط في قطب الارض . دورته الكاملة في المدار الشمسي تستغرق نحو ١٨ سنة و٧ اشهر || والصَّبَّابُ ، نباتك ، الانحراف الظاهر الذي يطرأ على اوراق بعض النباتات او ازهارها في اوقات معينة من التهار او في ظروف خاصة من الاشعاع .

١٦٠٥٧ - صَبَّابٌ Proclivité (F), Slope, incline (E).  
الصَّبَّابُ حالة التدرج او المنحدر او المائل الى الامام .

١٦٠٥٨ - صَبَّابٌ Troupes de 20 à 40 bêtes (F).  
قطع من القاء والرمز ما بين العشرين الى الاربعين .

١٦٠٥٩ - صَبَّارٌ هو الآلة ، اطليه .

١٦٠٦٠ - صَبَّارٌ Diète (F), Diet (E).

هو احتساب البهيبة بلا خلف بعض الوقت في سبيل صحتها والصبر هو الجهد ، اطليه .

١٦٠٦١ - صَبَّارٌ لَفْشِي ، لَفْشِي ، مَلْجَح Givre (F), Hour-front, Rime (E).

طبقة غليظة من الجليد تتكون في عمس الاجسام الصلبة بتجمد قطرات ماء الصقيع .

١٦٠٦٢ - صَبَّارَةٌ Sabara (F).  
هو الجلمد الغضط ، اطليه .

١٦٠٦٣ - صَبَّارَةٌ ، كَاكْتُوس Cactus (S), Cactus, Cactier (F), Cactus, Torch thistle (E), Kaktus (D), Cacto (I).

جلس نباتات لحية برية ونبوتية من فصيلة الصباريات . انزاهه مدينة مهددا البلاد الحارة . معظمها صغير القند ، شائك النصل || تزرع في المراكب والمصارى . مجموعاتها نفيسة غالية الثمن يقوم بها بعض الهواة .

١٦٠٦٤ - صَبَّارَةٌ الْقَرْمِزِ \* Cactus coccinellifera (S), Cactus à cochenille (F), Cochineal bearing opuntia (E), Nopal (D), Cacto da coqueigle, Nopal del giardin (I).

نوع من الصبيرة الزراعية الصناعية منتبها البلاد الحارة . زرعونها ويربون عليها دودة القزير الصبغية .

١٦٠٦٥ - صَبَّارَةٌ الرَّمْجَان \* Epiphyllum truncatum (S), Epiphyll (F), Christmas cactus, Wintercactus (E), Blattsaktus (D), Epifilio (I).

نوع من الصبيرة وهو نبات تزئيني ، مركبي ، مصرى ،



صبرة القزير



صبرة المرجان



صبرين



صبرج

Surface de la terre (F).

١٦٠٧٣ - صحيف

هو الآدم ، اطلبه .

١٦٠٧٨ - صنع هو سحر الجش ، اطلبه .

Roche dure (F). Tough rock (E). صَحْمَة

الصخرة والصخينة هي الصخرة الصلبة .

Sueur (F). Sweat (E). سَعَر

هو عرق الجسم وفي التفصيص عرق الخيل ويلد حياما .

Santé (F). Health (E). سَهْطَة

حالة الجسم السليم من المرض .

Validité (F). Validity (E). صَحْه العَدَد

هي ان لا يكون شواهاً يسبب من اسباب البطلان .

Désert (F). Desert, Waste (E). سَحْرَاء

سهول ترابية الاطراف خاسمة المدى تتميز بجفاف مناخها وبالندام الحية النباتية والحيوانية فيها الا في بعض الواحات والاديار حيث تنضج وتسيل بعض البهون .

Désertique (F). صحراوي

Pertaining to (E).

لمت تعريفه يطلق كل ما هو يخص بالصحراء كقولك نبات صحراوي ومناطق صحراوية .

١٦٠٨٥ - صَحْب ، صَحْبَة ، صَحْبَة المتاع

Sphagnum (S). Sphagne (F). Bog moss, Gold beech Tarfmoos (D). Sphagno, Muschio di palude (I).

جنس طحالب من فصيلة الصمليات تعيش في المناطق والمياه الرطبة الصافية . انواعه قليلة العدد . سطحها غنية تملو من ١٥ الى ٣٠ سم . فروصها دقيقة متباعدة وريمية متفائلة الانتعاش تكسوها اوراق حرشلية مدهية مرصعة .

١٦٠٨٦ - صَحْبِيَّات ، صَحْبِيَّات

Sphagnaceae (S). Sphagnaceae (F). Sphagnaceae (E). فصيلة نباتية من الطحالب اجناسها والوانها قليلة العدد جميعها اشباب ممررة متجمعة تكثر في القرب وتعد باعضائها المنسلعة .

١٦٠٨٧ - صَحْمَاء

الصماء بقلة (السان) .

Jaune torne (F). صَحْمَة

١٦٠٨٨ - صَحْمِيَّات

Leptotrichaceae (S). Leptotrichaceae (F). Leptotrichaceae (E).

فصيلة من البكتريات تتميز بكتلها الاسطوانية المستطيل . خلاياها مغلقة ، وسية الانحاء ، عمودية الانقسام . اجناسها وانواعها عديدة لكن علاقتها بالاقتصاد الزراعي لا تتجاوز بعض الاضرار النباتية .

١٦٠٩٠ - صَحْن

Sole هي الصفيحة القرنية الباطنية السفلى من الحافر عند الخيل والبق والخيبر .

١٦٠٩١ - صَحْن الحَرَكَة

Cavité coxale (F). Coxal cavity (E).

هو موضع اتصال الحرقفة بالخدو .

١٦٠٩٢ - صَحْنَة ، صَحْنَة ، صَحْنَة

Tympan (F). Tympanum, Ear-drum (E).

تجويف الاذن حيث نصب وبتر النشاء الغتان المعروف بالشعاع الطبل .



صحب



صحيفة



صَحْن اروي

Placuna (S).

١٦٠٩٤ - صَحْفَة

Placuna (F). Placuna (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صليسيات الخياشيم ونصيلة المحاريات . انواعها المماثلة للمروقة خمسة ، اصلها تمتد من شاولي الخلق العربي الى الهند فالصين || لصدافها كبيرة لانظمة الشكل ، لاقامية المصارع ، مساربها ثلاثة الاضلاع ، ورقية الاصداف الشبه شفافة ، نغولية الغشاء الداخلي || اصفاها شائعة الاستعمال الصناعي .

Feuillet foncier (F). صحيفه عقارية

Landed leaf (E). شهادة يجرها امين المكتب العقاري موثقاً فيها كل ما له علاقة بقطر معين كالساحة والحديد والمشتلات والارتفاع والهيمن والخرن .

Lamellée, Lamellaire (F). صَحْفِيَّات

Lamellar, Scaly (E). شكل من الزباني ينتهي بفواصل صمغية رقيقة مستطيلة .

Bombycilla (S). صَحْفَاد

Jaseur (F). Waxwing (E).

جنس طير من فصيلة الصغاديات وريقة الجوارث غروريات المناقير . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها متوسطة القد ، ريمية الجسم . مثالها قصيرة غرورية الشكل ، مستنة الانك العاليا ، غائسة السيل . اجناسها ذلقة . اذنانها متوسطة الطول ، مقلوبة . اصباها قوية . رؤوسها متوجة بفرس من القريش التام المتسرل الى الوراء || افهر انواعه الصغاد الاروبي والاسيوي والامريكي .

١٦٠٩٨ - صَحْفَاد اروي

Bombycilla garrula (S). Jaseur d'Europe, J. de Bohême (F). European Waxwing (E).

نوع من الصغاد . موطنه يشمل جميع مناطق اوروبا الممتدة الحارة وبعض مناطق الشرق الاطل || جسمه ريع القامة يطول نحو ٢٧ سم . ثوبه الى الريد الصبانية تتركب عنه الظهر والجيشن وقشر عند البطن . ذوره وجهته الى السرة السوداء . جناحه اسود اللون يجمع بالابيض والاصفر والاحمر . ذنبه اسود اللون ، اصفر الطرف المقطوع || وهو من الصغاد التي تهجر البلاد في طلب الرزق والمصيف والشتي . يألّف الغابات والكرم . قوته الاشرار على اعتلات انواعها وصالها واكثرها الهامة ونها الحب || يدن حقه في الاشجار الدائسة على ارتفاع قليل لا يتجاوز عشرة اقدام من سطح الارض . الاثنى قطع من ٦ الى ٧ يمشات تحسباً بنوبة الذكر نحو ١٤ يوما .

١٦٠٩٩ - صَحْفَادِيَّات

Bombycillidae (S). Bombycillidae (F). Bombycillidae (E).

فصيلة طير من الجوارث غروريات المناقير . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة . موطنها يمتد من البلاد الاسيوية الى الاوروبية والامريكية || تتميز باجسامها الربعة وبطريها المتسرلة الى الوراء ويتناقصها الغرورية المستنة الانك العاليا || افهر اجناسها الصغاد .

## ١٦١٠٠ - صَخْرَة ٥

Lithogénésie (F).

Lithogenesy (E).

١٦١١٠ - صَدَأ ، صَدَأ  
هو شقران أقرع من الفطور الجهرية الشقرانية التي  
تركب الزروع .

الصخرة علم يبحث في العال وللوجبات التي هيئت على  
تكوين الصخور .

## ١٦١١١ - صَدَاع

Chant des oiseaux, Gazouillement (F). Chirping,  
Warbling, Twittering (E).

صوت الطائر . صبح الطائر : صبح وفرد وتفرق .

١٦١٠١ - صَخْد : الصند : صوت الحام والصد .

١٦١٠٢ - صَخْشُر

كتلة خضراء وسيدة اللؤل من الحجر . والصخر في العرف  
البادي يطلق على كل مادة صلبة تدخل في تكوين التلالف  
الأرضي . أما في العرف الجيولوجي أي الحسلي الذي لا  
يتميز الصلابة شرطاً لازماً ، فالصخر يطلق على الرو  
والحجر الجيري والزلزل والصلصالي || وقد تقسم الصخور  
حسبياً ونسبة إلى تكوينها الطبيعي إلى ثلاثة أقسام :  
(١) الصخور النارية وهي الأصلية أو المتبلورة التي  
تكونت من مواد معدنية مصهورة تصلبت بالبرودة كالصخر  
(البرلت).

(٢) الصخور الرسوبية وهي الثانوية التي تنبت من تراكم  
وتماثل فالت ذرات الصخور الأصلية مع مختلف المواد  
الحيوانية والنباتية كالحجارة الجسية .

(٣) الصخور المتحولة وهي التي كانت في أول أسرها  
أما نارية أو رسوبية ثم تحولت بتأثير عوامل طبيعية خاصة  
إلى حالة بنية جديدة كالرنام .

## ١٦١٠٣ - صَخْرَة

Rocher (F).

Steep, Crag (E).

كتلة من الصخر . ج صخر وصخور وصفا وصفوات .

## ١٦١٠٤ - صَخْرِيّ

Pétreux (F).

Stonellike, Petrosal (E).

لمت تعريفي يطلق على ما هو من الصخور أو يشبهها .

## ١٦١٠٥ - صَخْرِيَّات

Empetrous (S).

Empetrucées (F). Empetrucées (E).

نصلية نباتية من ذوات الملقنتين، أجناسها ثلاثة وأقوامها  
خمس . لباقتها جنات وأشباب مصرة . تثبت بين الصخور  
وفي الأماكن القاحلة .

## ١٦١٠٦ - صَخْرِيَّة ٥ ، صَخْرِيّ ، صَخْبُ الْفُرَاب

Empetrum nigrum (S). Empetra, Camarine, Cam-  
rigne (F). Crowberry, Black-berried heath (E).  
Echte krahenbeere, Ranchebeere (D). Empetro,  
Erica bacclifera ners (I).

بجلة بربة طيبة مصرية وسيدة الجلس والنرج من نصلية  
الصخريات ، منها جبال البلاد المظلة المنمرة نحو  
البرد . ماثيا مستقيمة تلوح نحو ٣٠ سم . أوراقها أبيضه ،  
خضراء ، صغيرة القد ، ضيقة الفصل || أزهارها حمراء  
اللون . ثمارها مأكولة لوردة الشكل ، عابقة السوداء ،  
حازمة القلم ، مضادة لداء الحفر ، قدر البزل وتضع  
في علاج بعض الحمايات .

## ١٦١٠٧ - صَخْم

Brûler (poêle) (F).

Roches-mères (F).

Basic-rocks (E).

١٦١٠٨ - صَخْمُور ٥

هي الصخور الأساسية الأولى .

## ١٦١٠٩ - صَدَأ

Rouille (F). Ruz (E).

مادة ميكروبية القدرات جزوية اللون حمراء المالح تتكون  
على سطح الحديد من حمراء تعرضه لطريقة الهلاك حيث  
يصد الأكسجين واللاد مع الحديد .



صخرية

١٦١١٤ - صَدَأَد

هو الزنقة ، الحلبا . ج صدائد .

١٦١١٥ - صَدَأَكَة

Proletariat (F). Proletarianism (E).

حالة الذين لا يستعملون الأبريق إلا بواسطة علمهم .

## ١٦١١٦ - صَدَح

٥ شجرة تمرتها أشد حرة من العنب . ٥ (اللسان) .

## ١٦١١٧ - صَدْر ، جَوْش ، جَوْشَن

Poitrine, Thorax (F). Chest, Thorax (E).

جزء من الهيكل العظمي يحضن القلب والرئتان يقع بين  
المتن وعضل الصدر . وهو تقص عظمي غروبي الشكل  
يتكون من عدة خلوع بقية متحدة الأطراف .

## ١٦١١٨ - صَدْر

الصدر نجم ثير من كوكبة الدجاجة .

١٦١١٩ - صَدْرَاس ٥

Céphalothorax (F).

Cephalothorax (E).

الصدوراس إتمام الصدر بالرأس في جزو واحد كما هي الحال  
عند بعض العنبريات كالتمناكب .

١٦١٢٠ - صَدْرِيّ

لمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بصدر الحيوان .

١٦١٢١ - صَدْع

Faille (F). Fauts (E).

١٦١٢٢ - صَدْع

Tempes (F). Temple (E).

ما هو من الرأس ما بين العين والاذن وهما صدغتان .

## ١٦١٢٣ - صَدَف ، صَدَك

Coquillage, Mollusque testacé (F). Shell-fish, Testa-

caous mollusc (E).

حواشيت في البحر من القشريات الحمايات . ج أصداف  
وأصداف .

١٦١٢٤ - صَدَقَة ٥

Conque, Coquille (F).

Conch, Shell (E).

ج صدقات . خطاء ضوي ثنائي الطبقات صلب للمادة  
يلطف أجسام بعض الرخويات . مادته مركبة من كربونات  
الكلسيوم ، أما طبقات الثلاث تصرف بالعمودية المنزقة



صدقة

الجزر فيضمه ويؤذي || مظهره الخارجي بنور صغيرة مستديرة متناهية مَرَامَة حلالية التجميع تقريبا اللون ثم تنصرف نحو الجلود تركب السوق والأوراق والمنايق القزمية || يكالغ بتطهير التربة ويحيد القبار وينتجيب تكرار الزراعة في الحق نفسه .

#### ١٦١٣٥ - صَدَكِيَّة الجيرانيم

*Uromyces geranii* (S). Rouille du géranium (F).  
نظر مجهرى يصيب أوراق الجيرانيم فيضبطها . مظهره الخارجي يقع صغيرة قليلة الاستدارة والكثافة تركب الأوراق، لونها ال الفقرة الباقية ويلجوا حواج آخر يشو الأوراق بتفجير بشره نصلها ثم يقودها ال القليل . يكالغ بانتزاع الشتل الموصوة وبطهير التربة بالكلس والكبريت بمعدل ١ الى ٢ .

#### ١٦١٣٦ - صَدَكِيَّة الخمض

*Uromyces rumicis* (S). Rouille des rumex (F).  
نظر مجهرى يصيب أوراق الخماض فيضبطها ويجعلها غير صالحة للاستعمال || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة ليدو حلقة اللون ثم تنصرف نحو الكستالي تركب ليدل الأوراق حل صفحتها || اضراره قائمة على مدى انتشاره لان الأوراق الموصوة لا قيمة لها || يكالغ حين ظهوره بسائل بودرة الهليل ١ % .

#### ١٦١٣٧ - صَدَكِيَّة الخمض

*Uromyces pisi, Aecidium euphorbiae* (S). Rouille du pois (F).  
نظر مجهرى يصيب الحمض والبريين || مظهره الخارجي على الحمض يقع صغيرة كثيفة التجميع تركب النصل على صفحته السفلى . تبدو صفراء اللون ثم تنصرف نحو المحلى فالاحمر ويفرغ منها اذ ذلك رائحة كريهة يمتصها الفجار البشرة ظليل النسيج والكلس يسقط الأوراق . وهو حل القريبين يقع صغيرة ميمرة بدون انتظام تركب الاذنات تقسب لها الارامم والشفلة مع قشر الأوراق وصاكة النصل . وهو حل الأوراق اوضح شكلا واكثر توشيحاً . يركب النصل على صفحته وقد يفضل العليا . يفرغ منه عند كمال دوره الحياتية ، اي عند تفجير الجيوب الباقية ، رائحة حلوية مستحبة لا تشعل الحمض وان حصرت فسمت والفطيل الى كرية || يكالغ بالكلس القوية وبسددها مع الاكثر من عصر الازوت .

#### ١٦١٣٨ - صَدَكِيَّة الد كشييل

*Uromyces dactylidis* (S). Rouille du dactyle (F).  
نظر مجهرى يصيب جميع انواع وضروب الدكيل فيلوي الأوراق ويميتها || مظهره الخارجي بنور صغيرة مستديرة لونها الى المفرة ميمرة بدون انتظام او مرصوفة يتناقص وتناسق . نصل ثقل الأوراق تقسب يدها بعد اضملاخ غصبي . يكالغ بالقتلح النباتات الموصوة وبطهير التربة قبل اعادة بلوها او غرسها .

#### ١٦١٣٩ - صَدَكِيَّة الشَّوْكَر

*Uromyces betae, Aecidium betae* (S). Rouille de la betterave (F).  
نظر مجهرى فسيح الشيع يركب أوراق الشوكر فيلويها . مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة تحمل بالاوراق السفلى وتنتشر حل صفحة النصل السفلى ميمرة بدون انتظام . لونها الى الجلود || اضراره قليلة لانها محصورة بتفجير وذيول الأوراق السفلى التي تضام نشاطها الحيوي .

والنصل الاساسية ثم الداخلية الصدفية البراقة المساء . والصفحات على لويين : الصفحات ذات المصراعين كما في الحار وي فيضية الشكل ، مربوية المصراعين ، رباطها شفروري التكون ، يلفض حوضاً مملأ يفسى القليل ويلفضه افرار المادة الصدفية || والنوع الثاني يشمل الصفحات الحلزونية التي تتميز بظلماتها واعادتها المتنازعة المربعة بتطوط واغاييد النور .

#### ١٦١٣٥ - صَدَكِيَّة

*Ostracod* (F). *Oysterous* (E).  
نمت تعريف يطلق على ما هو صدفى التركيب او الشكل .

#### ١٦١٣٦ - صَدَكِيَّة الجلود

*Ostracoderme* (F).  
نمت تعريف يطلق على كل حيوان جلده صدفى المادة .

#### ١٦١٣٧ - صَدَكِيَّات

*Ostracodes*  
رتبة من القشريات الحشرات الصف .

#### ١٦١٣٨ - صَدَكِيَّات الجلود

*Ostracodermes* (F).  
فئة من الاسماك المنحجرة ظهرت في الحقبة السيلورية وانقرضت في الحقبة الكربونية .

#### ١٦١٣٩ - صَدَوْدِيَّة

*Impénétrabilité* (F).  
مجم قابلة للتدخل .

#### ١٦١٤٠ - صَدَوُج ، شَدَق ، كتك

*Crevasse* (F). *Chape* (E).  
مواضع وشواطئ تحصل في جلد اسراخ الغراب والبر وني حلاء سوق النبات تقسب تصداعها وتشققها .

#### ١٦١٤١ - صَدَكِيَّة

*Uromyces*  
جنس تطور مجهرية من فصيلة السحابيات يتميز بدهاناته الوحيدة الحالية || انواعه عديدة تركب النباتات المختلفة المائلة الى القزيمات والقزليات والنيجيلات والسرنيقات والقزليات والبسبابيات والسلميات .

#### ١٦١٤٢ - صَدَكِيَّة الإشييل

*Uromyces scillarum* (S). Rouille des scilles (F).  
نظر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة القزمية اصحاب الاشقل والحاصل || مظهره الخارجي طلع قدية لا قياسية الشكل والحجم ، تلو الأوراق والانسلاط الخارجية . تبدو حلقة ثم تنصرف نحو الجلود وتنتهي بالمرسة عند انفجار بشره النسيج || يكالغ بتطهير التربة بالكبريت والكلس او القرموط بعد التلاح وسوق النباتات الموصوة .

#### ١٦١٤٣ - صَدَكِيَّة القوم

*Uromyces ambiguus* (S). Rouille de l'ail (F).  
نظر مجهرى يصيب الثوم بلوراته وزياده الزمري . مظهره الخارجي يقع صغيرة لا قياسية الشكل والحجم ، تركب الأوراق تلوها بعد ان تقضى على الغصيب فيصبح النصل حامد اللون || وهو حل الزناد يقع قزمية كسفائية يحيطها اطار ، تقلم غصيب ، لونه كالتين . يستحسن اجتناب تكرار الزراعة في ذات المكان الموهر .

#### ١٦١٤٤ - صَدَكِيَّة الجزر

*Uromyces lincolnet, U. scirpi* (S). Rouille de la carotte (F).  
نظر مجهرى يصيب بعض نباتات الفصيلة الحسية اصحابها



صدية الاشقل



صدية الثوم



صدية الجزر



صدية الجيرانيم



صدية الخماض



صدية الحمض



صدية الشوكر



صدئكة الفول

١٦١٤٥ - صدئكة الموز \* *Uromyces musae* (S).  
Rouille du bananier (F).  
نظر مجهري يصيب الموز في أفراته || مظهره الخارجي  
يظهر حمية الشكل والحجم، تركب النسل حل صفته  
السفل. تبدو حمية اللون ثم تتصرف نحو الجوزة السوداء.  
أضراره زرة لا تستجيب للمكافحة.

## ١٦١٤٦ - صدئكة التفاح

*Uromyces trifolii*, *Aecidium trifolii-repentis* (S).  
Rouille des trèfles (F).  
نظر مجهري يركب جميع أنواع التفل الرطبي والبري.  
مظهره الخارجي يقع حمية قليلة مميزة على صفته النسل  
العليا. تبدو صفراء اللون ثم تتصرف نحو ألبي الكستالي.  
وهو رسم لا يستجيب للمكافحة لانه يسلط النبات على  
التمو وازدياد المحصول الورقي ولكنه يذني نسبة الكربونين  
نحو ٢٠٪ مما يؤدي الى انخفاض عيق القيتامين ٥٠٪.



صدئكة القرنفل

١٦١٤٧ - صدئكة  
الصدى كوكب مرصفي سيار اكتشفه وفريون \* عام  
١٨٦٠.



صدئكة القرنفل

١٦١٤٨ - صدئكة  
هو الصوت الناتج من انعكاس صوت أصلي على سطح  
عاكس.



صدئكة الفول

١٦١٤٩ - صدئكة  
جاء في تحديدها: سمكة طويلة سوداء (السان).

١٦١٥٠ - صدئكة \* أم السهره أم قوتق  
*Aethes noctua*, *Carice noctua* (S). *Charvêche*, *Charvêche commune* (F). *Little owl* (E).



صدئكة الموز

طائر من البويات وممرات المصائد. ربح الحجة صليها.  
طوله نحو ٢٣ سم. منزه قوي الانقراض. حاد البصر.  
سقطه وذنيه صغيرة مستديرة. أرساغه كاسية || غشاه  
مدينة حادة، لونه الى الريدة المنشة بالارد || موك  
فسح الاربعه يسم جميع البلاد المحتلة الحارة. يالغ  
الاجراع وينش في منوع الانجار الصيوانة وفي الغراب  
والاقلاد. اثناء قطع نحو ه يضايت تحسبها ١٦  
الى ١٨ يبي || وهو من الراس يلمس كوك من  
الغرب الى القبر، يصيد الجرد والذباب والجلان  
والجراد.



صدئكة النفل

١٦١٥١ - صدئكة  
هو قيق الفروح والجيف الباردة الى الاحول المصوي.

١٦١٥٢ - صدئكة  
حليب وضع فريد نكهة البولية وهي القشرة الرقيقة حل  
ويجده.



صدئكة

١٦١٥٣ - صدئكة \* قيق  
نمت حال توصف به الانشاء القليلة او القابلة الانصاع  
والقلع من تأثير فعل المصقب قيا.

١٦١٥٤ - صدئكة \*  
*Pissurella* (S). *Pissurella* (F). *Pissurella* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الغرويات مبديات الاصيل  
امليات الشمام الحبيطة وصبلة الصدبيات. انواعها

يكتفح بقطع وطر الاوراق الصلبة وباحتجاب اخل  
لبلار من الامهات الموصية.

١٦١٤٠ - صدئكة الفستق  
رسم فطري يصير الفستق (اطلب ايريس).

## ١٦١٤١ - صدئكة الفول

*Uromyces fabae*, *Aecidium album* (S). Rouille de  
la fève (F).  
نظر مجهري يصيب عدة نباتات من الفصيلة القرنية،  
انحصها الفول ونها البقية والجلان والصبلة والكزسة.  
مظهره الخارجي يقع صفرة مستديرة مميزة على صفته  
النسل تبدو صفراء اللون ثم تتصرف نحو القشرة  
السراء، وقد يصيب السرق والمالين نبات الفول.  
يكتفح عند ظهوره اما باستعمال سائل يورود الحليل ١٪  
او غيره من الفوطير الفعالة اللاكوية.

## ١٦١٤٢ - صدئكة القرنفل

*Uromyces caryophyllinus* (S). Rouille de l'aillet (F).  
نظر مجهري يصيب القرنفل في جميع فصائل البتة ليلب  
الاوراق ويؤخر النمو ويؤدي الانزهار والازهار.  
مظهره الخارجي يقع صفرة بيضة الشكل بنية اللون  
تركب نسل الاوراق على صفحتها العليا تقسيب تجميع  
بشرة النسيج وتقرنل الغورة النضية ان لم تحل دون انجازها  
وبيرها الطيبي.  
يكافح اولاً: باحتجاب ريش الماء على الاوراق لان الماء  
يكني نشاط اللطع ويهيئ انتشار اليرم.  
ثانياً: بانتزاع وسرق الاوراق للامثلة والياينة مس  
القول اللارية.  
ثالثاً: بنسج النباتات للصابة بسائل يورود الحليل  
١٪ او بسلول بمسمنات البزاس او غيره من املاح النحاس.

## ١٦١٤٣ - صدئكة القرنفل

*Uromyces anethidis* (S). Rouille des légumi-  
neuses (F).  
نظر مجهري يصيب بعض النباتات القرنية سبا القرنية  
والكرس والفسلة والخشخوخ والحلبة والفلوس والامروس.  
مظهره الخارجي يقع مستديرة صغيرة تركب نسل الاوراق  
على صفحتها العليا تبدو مميزة بين انتظام || لونيا  
الى الشبهه ثم يتصرف تدريجياً نحو الكستالي || اضراره  
زديدة. يكثر ويبدو في بلاد حوض البحر المتوسط وفي  
اروبة الشرقية والغربية.

## ١٦١٤٤ - صدئكة اللوباء

*Uromyces appendicatus*, *U. phaseoli*, *Aecidium*  
*phaseoli* (S). Rouille du haricot (F).  
نظر مجهري يصيب معظم انواع وضروب اللوباء.  
مظهره الخارجي يقع لا نياية الشكل والحجم تطور نسل  
الاوراق فتوضها برقشة لا متجانسة الكثافة تبدو تلبية  
اللون ثم حمية لسراء، تؤدي الاوراق تقسيب بظاهها  
وصغرطها الباكر || وهو على القرون يقع قرنية نط  
نبا الاسارة تقدي على الانسبة الليلية دين ان نصل  
الى الحب || يربطاته بيضة لشكل طويلا يراوح من  
٢٢ الى ٢٥ م.م. عرضها من ٢٠ الى ٢٣ م.م. || يكتفح  
باستعمال اركسيكلوربر النحاس تقدياً على النبات يمد  
العصر صفحا تحف وطاة اشمه الشمس.

١٦١٦٥ - صِرَاكِي \*  
Orographique (F).  
Orographical (E).  
نبت ترفني يطلق على ما له علاقة بالصراة أي وصف الجبال.

١٦١٦٦ - صِرَاو  
Achète (F).  
اسم يطلق على جمع الحشرات الصراصة اخصها الجديد والزيز.

١٦١٦٧ - صِرَاو اللَّيْل هو الجديد، المطبخ.

١٦١٦٨ - صِرَاوَكَة  
Circaetus (S).  
Circaète (F). Serpent eagle (E).  
جنس طير من عمار السقاوت وفصيلة الصقريات .  
أنواعه ١٢ ، موطنها جميع المناطق المعتدلة من العالم القديم .  
اجسامها رفيعة متوسطة القدر تطول من ٥٥ الى ٧٠ سم .  
ويصلها تراوح من ١٢٠ الى ١٨٠ سم . ورونها كبيرة ،  
اعتناقها قصيرة ، مناسرها قوية البهرة الليرة الحادة .  
ارسلها سرحة ، غالبا دقيقة الاطراف الحادة || اثوابها  
كدراء اللون يملوها توشم لطيف حاقق ، صدرها وبطنها  
الفتح وانفي من ظهورها وسوقها || تألف الجبال  
والاخراج ويجاري الماء والادخال والبروج والنبات .  
الزسلمات من العطاء الى الانثى والصفاوح والاسماك  
والصافير والحشرات || كمن اوكارها الى الانجار  
والادخال . انثيا تضع من رطبتي الى ثلاث رفقات  
تحضنها بمناوبة الاكور نحو ٤ اسابيع || اشهر انواعه  
مرارة المتوسط .

١٦١٦٩ - صِرَاوَة الْمُتَوَسِّط \* ، أَبُو صَوِي  
Circaetus gallicus (S). Circaète Jean-le-Blanc (F).  
Short-toed eagle (E).  
نوع من الصراة كبيرة الجثة طولها نحو ٧٠ سم . ويصلها  
١٨٠ سم . ثوبها الى الربة السماء تعلوها بقعة مائلة .  
زورها وبطنها وبخوابها الى البياض الاخر يملو تهبج  
اسمر . منسرها الى الزرقه السوداء . مينها الى الصفرة  
اللامعة . رسلها واصابعها تلبية اللون ، غالبا سود .  
ويحي من الطيور القواطع تجوب البلاد رنحوم فوق الماء .  
تألف الجبال والاحراج والمناقع ويجاري الماء والسهول  
والشواطئ || قريبا الانثى والظاه والصفاوح والاسماك  
والصافير .

١٦١٧٠ - صِرَاكِيه \*  
Sauropodes (F).  
Sauropoda (E).  
الصراعية رتيبة من الزحافات المنقرضة ، الناصير ،  
جميع اجناسها وانواعها جبانة ، وبهاية القوائم ، عايشة ||  
ظهورها يمد الى الخفية التراسمية . وقد بلغت اوج انتشارها  
في الحقبة الجورية . وانتقرضت في الطباقيرية || اشهرها  
المرصد الجبلي (Atlantosaurius) الذي كان طول  
جسمه لا يقل عن ٤٠ مترًا ، ثم المرصد الصخري الرأس  
(Brontosaurus) الذي كان طوله من ٢٠ الى ٢٢ مترًا .

١٦١٧١ - صِرَاكَم ، صِرَاكَم  
Cueillea (F).  
Gathering (E).  
هو جنس الثمر في اوان أدراكه .

١٦١٧٢ - صِرَاكَم ، حَكَاك  
Serranus (S).  
Serran (F). Serranus (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الصرايات ذرية شاككات

المروقة قليلة العدد . اصطلحوا على تسميتها بحار العالم تيش على  
حضور المهادج || اصطلحوا تسمية الشكل مصنوعة القمة .  
وصدورها التي تسمح بمرور الماء اللازم للتنفس ، تسمح  
ايضا بخروج البراز . اجسامها مستطيلة الشكل . ورونها  
مقطوعة القمم . مينها تتمركز عند قواعد القوائم الخلفية ||  
عيالها مشطية في القسم العلوي . اوريثها ضفائفة  
تتمتد خارج الاصداف . انبساطها وسيفة مستعرة وميكة .

١٦١٥٥ - صِدْبِيَّات \*  
Fissurellidae (S).  
Fissurellidés (F). Fissurellidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربع  
امامات الخياشيم الجهمية . اجناسها وانواعها المروقة  
عديدة بعضها من متحجرات الاراضي التالوية والثالثة  
والبيضا الآخر من صلج بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||  
اصنافها وحيدة المصارع يومية الشوزن او مستعرة ،  
معتلة الاصداف ، مصنوعة القمم ، يكثر في صدورها  
الشكل المسطوح || اشهر اجناسها العاصرة الصلمية  
والحبيونة .

١٦١٥٦ - صِر \*  
Empaquetage (F). Packing (E).  
جمع الشيء وتلده وتقليد .

١٦١٥٧ - صِر \*  
Tichodroma (S). Tichodrome (F).  
جنس طير من فصيلة المتقلات . انواعه قليلة تتميز  
باصطالة المنظر ويكده ، بذلاقة الجوانح ، بقصر الارباع  
وبخفلة صغر الخالب الحادة . اثنويه عديدة تتخلف مع  
الانواع وتصل البسة . تألف المناطق الصخرية الجبلية .  
ينثر من الانهار . قوته الحشرات والتمك . يثن حقه  
في صرح المنخور . اناله تحضن وحدها من ٥ الى ٧  
بيضات نحو اسبوعين وذلك في شهر ايار . احرف انواعه  
واشهرها صر المنخور .

١٦١٥٨ - صِر \*  
Tichodroma muraria (S). Tichodroma de muralles,  
Echelette (F).  
نوع من الصر . ثوبه متراكب الااليان المنقطة المنقطة  
الجبلية . طولها نحو ١٧ سم . ويصلها ٣٠ || تألف الجبال  
الصخرية الجرداء . يكثر في صرود لبنان مشاء الادوية  
السبية والمغالب الصخرية .

١٦١٥٩ - صِرَاب  
الزعر ينثر في الخريف يمه اول مطر .

١٦١٦٠ - صِرَاوَج  
Pur (F). Neze (E).  
الحاصل من كل دس او ش . يقال نحو صرلج وزيت  
زيتون صرلج .

١٦١٦١ - صِرَاوَج  
الصرك طائر يؤكل (صحت المحيط).

١٦١٦٢ - صِرَاكِيه  
هي الدجاجة تجسبل لحظ الحمر .

١٦١٦٣ - صِرَاكَم  
سحاب بارد ندي ليس فيه ماء .

١٦١٦٤ - صِرَاكَاك \*  
Orographie (F).  
Orography (E).  
علم يبحث في وصف الجبال وتجليتها .



صلبة



صر المنخور



مرارة المتوسط

١٦١٧٨ - صُرَّاب ، صُرَّاب (F).  
Lak callé (F).  
Curdled milk (E). اللبن الرائب إذا اشعلت حوته.

١٦١٧٩ - صُرَّاب (F).  
Gomme d'acacia, G. rouge (F). صمغ القزط والطلع والحمرط بني حر كآبها سبالك تكسر بالمجبرة.

١٦١٨٠ - صُرَّابَة هي الثنواء ، انطاليا .



صُرَّان كَاتِب

١٦١٨١ - صُرَّابِيَّة ٥  
Sorbia  
مادة غلظية لا طعم لها تراقق السكر لكنها عادمة للقودور التسليل . وهي توجد في معظم بلاد المأكولة وسينها تاروح من ٥ الى ١٢٠ غرام في الكيلو .

١٦١٨٢ - صُرَّابِيَّة ٥  
Serjanie (S).  
Serjanie (F). Serjanie (E).

جنس جلبات سرجية عارضة من فصيلة السابنديات ، انواعها المعروفة نحو ١٠٠ منها من لبوت امريكة الاسرائيلي والبيض الآخر ينبت في جزر المحيط الهادي ويشمل الهند ٥ سطها سرجية . اوراقها متعاقبة ، مركبة ثلاثية التجميع . نصالها مسننة الحوافي ، غائرة الشقوق والبرق . انزاعها ابيض اللون كالحراشي ، عطوي التجميع . ثمرها جناحية ، ثلاثية التركيب .

١٦١٨٣ - صُرَّابِيَّة ٥  
Bryum (S).  
Bryum (F). Bryum (E).

جنس طحالب ممررة من فصيلة الصرغيفيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع اصقاع العالم ٥ تعيش على الصخور وفي التربة . اكياسها البورية حفية لشكل طرفية الارتكاز .



صُرَّابِيَّة

١٦١٨٤ - صُرَّابِيَّة ٥  
Bryncos (S).  
Bryncos (F). Bryncos (E).

فصيلة من الطحالب تنتمي الى رتبة السبديات .

١٦١٨٥ - صُرَّة ، صُرَّة (F).  
Cold (excore) (E). هو البرد الشديد .

١٦١٨٦ - صُرَّة ، صُرَّة (E).  
Eptar (F). صرَّة هو صرَّة .

١٦١٨٧ - صُرَّة ، صُرَّة (F).  
Lanios (S).  
Pie-grièche, Piegriacher (F). Shrike (E).

ج صردان . جنس طير من الطيور وطيعة الصرديات . انواعه ١٨ ، موطنها بلاد الشام القديم . جميعها يقام الوط . فضة الرأس . منقوشها خفيفة مسنة الخاطم المدلولة . سواقلها متصلة الطول مجلعة . اذانها زائجة الكريش . ارسافها جسمية الجلد . غلظها عاتية ٥ لا ترى الا في سفة او فجرة وهي شرسة الطباع ، ثقلة ، شديدة التنفوس . قوتها الحشرات والديدان والافاعي والاسماك . تنش في الاشجار الغناء . اناثها تنصع من ٤ الى ٧ بيضات تحضنها وسعدا نحو اسبوعين .



صُرَّة أُرْدِيَّة

١٦١٨٨ - صُرَّة أُرْدِيَّة ٥  
Lanios excubitor (S). Pie-grièche gris (grande).  
Bolsaltière (F). Great grey shrike (E).

نوع من الصرد الأبد الشائع . يتر من الطيور الفسارة . طولها يراوح من ٢٣ الى ٢٤ سم . نوبه الى البرقة الضللا .

الزنايف . انواعها المعروفة نحو ١٢٠ منها من املاك بجار المناطق الحارة ٥ اجسامها اعطليجية الشكل ، متصلة القد او صغيرة . اوراقها مختلفة اللونان يكثر فيها الاصفر الاجر الملح يملو تجليج متفرق لاقياسي الانتظام والالوان منها مبراشية الشكل : زانفها الظهريه شاذكة في الجزء الامامي ، سرسة في الجزء الخلفي ٥ بعضها يبر اغوار الاتيار ويبر في المياه العذبة ٥ طويها بين المتوسطة الصنف والجميدة ٥ اشهر انواعها الصران الكاتب والصران المبيج .

١٦١٨٩ - صُرَّان جَبَّار ٥  
Serran gisant (F).  
سمكة بحرية بيوض تدعى لقس جبار ، انطاليا .

١٦١٩٠ - صُرَّان كَاتِب ٥ ، حَدَدَة صُرَّانِيَّة ٥  
Serranus scriba (S). Serran écriture, Serran scribe (F). Serranus scriba (E).  
نوع من الصران . سمكة بحرية بيوض . اصطاتها غلجان وانصواع واغوار البسر الابيض المقطوع ٥ جسمها اعطليجي الشكل ، مستدل التعليط ، يطول من ٢٥ الى ٣٠ سم . نوبها متراكب اللونان يكثر حل الاصفر الحطلي . رأسها وظهورها مجلجان بالاسمر . جانبها مشعان بالازرق والكسني . زانفها مضروبة بالاجر . رأسها يبرسي الشكل قصير الخط . شفتها قليل الرطابة . عيناها صغيرتان ٥ زانفها متباعدة الاشكال . الظهريه مسطلة ، شاذكة النصف الاول ، سرسة النصف الثاني . الشرجية تقابل القسم السرح من الظهريه . البليدية مقوسة الطرف المنحوب ٥ لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٩١ - صُرَّان مَبْجَج ، حَدَدَة مَبْجَج ٥  
Serranus hepatus (S). Serran maculé (F).  
Serranus hepatus (E).

سمكة بحرية بيوض من الصران . اصطاتها انصواع وطحجان البسر الابيض المتوسط ٥ جسمها صغير القد ، اعطليجي الشكل ، مستدل التعليط يطول من ١٨ الى ٢٢ سم . نوبها يكثر حل الاصفر الاخر الحطلي المواج . رأسها وظهورها مبقجان بالكسني المايق . جانبها مجلجان وبغلجان بالاجر والازرق . زانفها مشعة وبنيية ينتظة . رأسها غمريري الشكل ٥ ذلق الخط . شفتها قليل الرطابة . عيناها كبرتان ٥ زانفها متباعدة الاشكال كما في الصران الكاتب ٥ لحمها متوسط الصنف ، مأكول .

١٦١٩٢ - صُرَّابِيَّة ٥  
Serranidae (S).  
Serranidae (F). Serranidae (E).

فصيلة املاك بحرية من رتبة شاذكات الزنايف . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٥٥٠ جميعها من املاك بجار المناطق الحارة والمعدلة الحرارة . تتميز بحيدة الصبح وبقلة اصباحها من المجاهد والمجلاجان والاصصاع ٥ اجسامها اعطليجية الشكل ، لاقياسية الطول الذي يراوح من ١٥ الى ٣٠ سم . حراشها مبراشية عشة متساكة الاطراف ٥ زانفها الخوضية مداسية الاضمة الخريفة بالمقتناء شجاع واند جامد شاذك . اجناسها الفكوية والحكوية منتظمة الصفوف المتعامة ٥ اشهر اجناسها الصران واللاتيارس واقتس واقتيب .

١٦١٩٣ - صُرَّابِيَّة المختلط اذا اصفر .

١٦١٩٧ - صَرَق  
الصُرَق: الزرع نصبت موه وأكملت مثابه دون حبه .  
الواحدة صرقة .

١٦١٩٨ - صَرَصَر  
هو الديك ، اطلبه .  
Coq (F). Cock (E).

١٦١٩٩ - صَرَصَرَكَن \*  
Scymnus iltchii (S).  
Liche, Gatta (F).  
سمكة بحرية وسيدة الجنس والنوع من السمكيات ، تلوذ نحو ثلاثة أمتار . جنبها اسطوانية الشكل ، دقيقة المخز ، كبيرة الزمقة الفرجية . ثوبها الى السمرة الزرقاء المولج يملؤها تجلج اسود . جلجها عادم الفلوس شائع الاستعمال الصناعي . لحمها مأكول .

١٦٢٠٠ - صَرَصَرَكَة  
Cri du milan (F).  
Cry of the kite (E).  
صوت البازي .

١٦٢٠١ - صَرَصُور  
حشرة مملوكة تعرف ببلت وردان ، اطلبها . منها الأمريكية والجرمانية والشرقية .

١٦٢٠٢ - صَرَع  
Epilepsy (F). Epilepsy (E).  
حالة عينية في الجهاز العصبي تصيب الحبل . تعرف من حصول البيرة والسقوط على الارض والتشنج في الحبل .

١٦٢٠٣ - صَرَعَاكَة \*  
Chrysobothris affinis (S).  
Chrysobothris complice (F). Chrysobothris affinis (E).

حشرة خاضعة ناعمة من فصيلة الزنبقيات ودية غمديات الاجنحة . تألف الاجراج والنبات والحدائق . خنافسها تعيش على اوراق الاشجار . يرقاتها مرقطة تمش على الاجبار الحمراء تقسودب السماء ولها كسب الشكير . جسمها متوسط القد ، بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية يملؤها مزلج اسفع . غمداء ثلاثيا النقر ، خضره اللون عند الذكر ، صفراء اللون عند الانثى . رأسها مستد الجرم . عينها كبيرتان ، ناشزتان . زباناها عيطان ، لمشاري التركيب . فمها شبيه جلوني الشكل ، ذلق المخز ، مقطوم الطرف . غمداء متتابعات التحيز الخفيف . ارباعها خاضعة المقل الى الانثى اميز قدًا من الذكر وأكد ثوبًا من والقصر زباناً . جملها نثالي الحبل . تظهر الحشرة الجبلانة في اوائل ايار وتعيش حتى اوائل آب . تروح في التبار ويبيت في الليل الى الريقة بطقية التو تطلعي عند الادراك انتم نحو ٣٠ م . جسمها مستطال المقدم والرأس ، مستدق المخز . ثوبها الى الطلعة .

١٦٢٠٤ - صَرَق ، صَرَقْ ، اصْطَرَاك \*  
Agio, Change (F).  
Agio, Premium, Exchange (E).  
لقرق بين سر التقد الاسمي وسره المظني .

١٦٢٠٥ - صَرَقَة  
الصرقة منزل من منازل القمر الشامية يتزل في الليلة الثانية حشرة . وهو نجم واحد نير تلقاء الزهرة غماط بكواكب صفار طمس . وميت سرقة لانصراف الحر والبرد بطولهما . ويند العرب من يسمي الصرقة قلب الاسد الى رقيب الصرقة قرق الدلو المقدم .

ظهور هايك المزلج الاسمر . يطله الى البياض الاخير . سقطاه الى السمرة الحامكة المخبية بالابيض الناصع . ذنبه اسود الوسط ، ابيض القاعدة والطرف . . متقاربه ومقله سود . يألف الرياض والاسراج القريبة من المروج والمراعي .

١٦١٨٩ - صُرَدُ الْجَنْبِ \*  
Lanius meridionalis (S). Pie-grèche méridionale (F).  
نوع من الصرد ، موطنه افريقية الشمالية وشمالى المتوسط . طوله نحو ٢٥ سم . ظهره اسود اللون . سقطاه الى السمرة . ذنبه ابيض الاطراف ، اسمر الوسط . صدره ويطه الى البياض الوردي المزلج . عيناه مكشفتان بالاسود الى يألف الغابات والخضاب للمسا والشرائط الصخرية .

١٦١٩٠ - صُرَدُ الْمُتَوَسِّط \* دَقَنَاش شَكَمِي  
Lanius senator, L. rufus (S). Pie-grèche rousse (F).  
Woodchat shrike (E).  
نوع من الصرد الجبال يحرب معظم مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٩ سم . ثوبه ابيض اللون تكثر فيه الصبغة . يألف الادلغال والحدائق والمروج . قوته الظاه والورغ والصفاد ويختلف الحشرات الى ين في الجنبات الفتاة القليلة الارتفاع من الثرة .

١٦١٩١ - صُرَدُ الْغُرَق \* نُهَس  
Lanius collurio (S). Pie-grèche écorcheuse, Pie-grèche grise (F). Red-backed shrike, Butcher bird (E).  
نوع من الصرد الجبال يحرب أكثر مناطق العالم القديم . طوله نحو ١٧ سم . ثوبه اسمر اللون يبق حتى الظهر ويبيض عند الزور والصدر . خضره الى السمرة القائمة . سقطاه الى السمرة الطلعة الخططة المزلج . ذنبه ابيض الاطراف . يألف الاسراج ويجاري الماء والحدائق والمراعي . وهو شرس الطبع ، ضيق الخلق . قوته الحشرات على اختلافها والوديات والصافير .

١٦١٩٢ - صُرَدُ وَرْدِي \* دَقَنَاش  
Lanius minor (S). Pie-grèche à poitrine rose, Pie-grèche d'Italie (F). Lesser grey shrike (E).  
نوع من الصرد الايه . موطنه يمتد من بلاد فارس الى اطراف اوروبا الجنوبية . طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه الى الصبغة الطلعة . رأسه اسود اللون . صدره وردي اللون . سقطاه الى الصبغة الخططة المابقة الى يألف الادلغال ويجاري الماء ، قوته الحشرات والوديات .

١٦١٩٣ - صُرَدَاك  
Terre meuble (F).  
الصرداد والصرداد والسرادة هي الثرة الية .

١٦١٩٤ - صَرَفَاح ، صَرَفَاحَة  
Terre délaissée (F). Abandoned ground (E).  
الارض الزراعية المهمله المتروكة لا تبت لها .

١٦١٩٥ - صَرَفَاحِي \*  
Edaphique (F). Edaphic (E).  
المسرب الى الصرصح ، اي الثرة ، باختياره ماسك من حوامل البيئة .

١٦١٩٦ - صُرَدِيَّات  
Lanidae (S).  
Lanidae (F). Lanidae (E).  
فصيلة طيور من الجوائم المشروبات المتناثر . اجنسها وانواعها عديدة تتميز بمناظرها القليلة ، القوة الجباله ، المنة الخامل الجبال . اجنسها متوسطة القد . ثوبها ما تقتضه من حشرات ووديات وصافير .



صُرَدُ الْجَنْبِ



صُرَدُ الْمُتَوَسِّط



صُرَدُ امْرِ



صُرَدُ وَرْدِي



صُرَدَاك



صُرَعَاكَة



روشتها الخلفيان سيقان بالازرق ويغضبان والبرتقال .  
الاثني سمراء اللوب ، روشتها الامامي يحسل بقعته غبرولية  
الشكل مخططه للثلث . روشتها الخالي يحسل من نقطتين الى  
ثلاث نقط صفر . ريشته تيش على ورق الزعرور  
والخوخ البري .

#### ١٦٧١٤ - صرْمُونُ السَّنْدِيَان \* Strymon ilicis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول من ٢٢ الى ٢٦ سم .  
الذكر اصفر نقا من الاثني ثوبه الى السرة الكستنية للمواج .  
رواشته مسنجة بالابيض والاخر . الاثني سوية الثوب  
الاسمر المايق تحسل في طرف كل ريش كل ريش من روشتها  
الخلفيتين نقطة صهباء اللون . ريشته تيش على ورق  
السنديان .

#### ١٦٧١٥ - صرْمُونُ السَّنَط \* Strymon scacis (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٧ سم .  
الذكر  
حنطي الثوب المحلل الروشن . رواشته زرق الانتقاص  
يلوحها تسليح متفرس ابيض وتيقع طرفي اصعب . الاثني  
سمراء اللون كستنية المواج . ريشته تظهر من نيسان الى  
ايار تيش على اوراق السنط .

#### ١٦٧١٦ - صرْمُونُ \* ، ذكَبُ الدَّهَبِ Saururus (S). Saurura (F). Lizard's tail, Swamp lily (E). Molchschanz (D). Saurura (I).

جنس نباتات عشبية جلدوية مدادة معمرة من فصيلة  
السروريات . انولها حليقة جيمها متعينة سرورية .  
سوقها تحيلة حليقة تملق من ٢٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها  
مستطقة ، متعاقبة ، نصلها قلبي الشكل ، متواجف الصفة ،  
خالي البشرة . ازهارها غشوية ، سلبية التجميع . ازهارها  
يستر من آب الى تشرين .

#### ١٦٧١٧ - صرْمُونُ رَمَادِيَّة في الويشة القنراء ، الحليقة .

١٦٧١٨ - صرْمُونَات  
Saururaceae (S).  
Saururaceae (F).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مدابة القتالات . نباتاتها  
عشبية معمرة . ازهارها غشوية . ثمارها جرداء غشقة  
الاشكال .

#### ١٦٧١٩ - صرْمُونُ \* هو الصرب ، راجسه .

١٦٧٢٠ - صرْمُونُ ، صرْمُونُ ، حقيق ، كزيم ، اصيل  
Pur-zang (F). Thoroughbred (E).  
نعت يطلق على كل حيوان اعلى من ملالة صائبة لتسب  
مستنخبة .

#### ١٦٧٢١ - صرْمُونُ \* Glacé (F). Ice (E). هو الجليد ، الحليقة .

#### ١٦٧٢٢ - صرْمُونُ \* هو الحصاد ، اطيه .

#### ١٦٧٢٣ - صرْمُونُ \* Palmeria (F). Daza-Garden (E). الحشاش المتجمع من التخل في الربال .

١٦٧٢٤ - صرْمُونُ الجدي ، سَلْطَانُ الجبل  
Lonicer (S). Chèvrefeuille (F). Caprifoly (E). Geiss-  
blatt (D). Caprifoglio, Capriola (I).  
جنس نباتات معمرة برية وتربيتية من فصيلة الهليانثيات .

#### ١٦٧٢٦ - صرْمُونُ ، صرْمُونُ Sous-variété, Cultivar (F). Subvariety, Cultivar (E).

الصرم ج . اصرام هي افراد من صرْمُونُ واحد تميزت بصفات  
معينة خاصة مثالا صرْمُونُ الساتركن ريش ر .

#### ١٦٧٢٧ - صرْمُونُ \* Sauromatum (S). Sauromata (F). Sauromatum (E).

جنس نباتات عشبية عقلوية معمرة من فصيلة اللقناتيات .  
متنبها بعض مناطق البلاد الحارة المستدة من الهند والافغان  
الى خط العرب . اصقالها كبيرة الجرم تطول نحو ١٥ سم .  
وتعرض نحو ١٥ سم . ازهارها يستيق الاوراق وله رائحة  
كرية . شرافتها بطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . وهو ضيق  
التصل ، لونه الى الحمرة البضحية المواج . ثمارها انحصر  
غشيتها غبرولية الشكل . اوراقها مستطيلة الممايق الحضر  
التي تطول نحو ٥٠ سم . نصلها قلبي الشكل تطول نحو  
٢٥ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . . تزدرد لثنتين لكنها  
تقتضى الموقع البادية . اعرف انواعها وانهرها التالية :

#### ١٦٧٢٨ - صرْمُونُ صرْمُونُ المَرْوُوق \* Sauromatum venosum (S).

نبات سروري شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت .  
صقالها مأكولة لكنها تحوي بعض المواد الحشالية التي  
تلعب بالتيق .

#### ١٦٧٢٩ - صرْمُونُ صرْمُونُ \* Sauromatum guttatum (S).

نبات سروري شائع الاستعمال التريبي ضمن البيوت وفي  
حدائق المناطق الحارة .

#### ١٦٧٣٠ - صرْمُونُ \* Strymon (S).

جنس حشرات فراشية من فصيلة اللقناتيات . انواعه عديدة  
منتشرة في معظم اقطار العالم . ذكورها واناثها غشقة  
الاثواب . مظهر كروي الشكل ، ريشاتها صلبة القد  
منخفضة الرؤس ، مدنية الاطراف . تيش على النباتات  
الشجرية . اشهر انواعه ما يلي .

#### ١٦٧٣١ - صرْمُونُ اَبْيَس \* Strymon album (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم . ثوبها  
الى السرة السوداء . رواشن الذكر حنطي اللون يلوها  
تسليج ابيض متفرس وتيقع برتقالي طرفي يحده اطراف  
اسود وخضر نقط سممر . رواشن الاثني سوية اللون الاسمر  
الداكن . يالفت الجناح والحدائق والقباب . يصرح  
من حزيران الى تموز . ريشته تيش على ورق التندار .

#### ١٦٧٣٢ - صرْمُونُ الخوخ \* Strymon pruni (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٤ سم .  
الذكر  
حنطي الثوب ، رواشته الى الصهبه يلوها تيقع وشيح  
وتسليج براوح من الابيض الى الاصفر والاخر والاخر .  
الاثني سوية الثوب الكسني المظفوت الاعمار . ريشته  
تظهر في ايار تركب اوراق الخوخ .

#### ١٦٧٣٣ - صرْمُونُ الزعرور \* Strymon teneos (S).

نوع من الصرمون ، فراشته تطول نحو ٢٢ سم .  
الذكر  
اسمر اللون ، حنطي الرواشن المسنجة بخط متفرس ابيض .



صرْمُونُ اَبْيَس



صرْمُونُ الخوخ



صرْمُونُ الزعرور



صرْمُونُ السنديان



صرْمُونُ السنط



صرْمُونُ

الآخر يملو توشع اصفر. ثمارها صغيرة القدر حمر اللون. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران // صارة ثمارها مرة الطعم سهلة تذلل في عدة مستحضرات طبية موعة .

#### ١٦٣٣١ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الزَّرْقَاءُ القُصْبِيَّة

*Loncera corulea* (S). Chèvrefeuille à fruits bleus (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .  
فروعها زباد اللحاء ، يبيض الملاك . ازهارها قُصْبِيَّة  
الانتشاب . توجعها عذوب الانبوب الاكروش . لونها  
الى البياض الاصفر تملو حلة ذمية . اوراقها بيضية ،  
مقطوعة القاعده ، زباد لونها الى الزرقاء المائلة // ازهارها يستمر من  
ايار الى تموز .

#### ١٦٣٣٢ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّالِكَةِ ، يَاسْمِين

*Loncera caprifolium* (S). **عَرَّالِيَّي**  
*Chèvrefeuille des jardins, C. commun* (F).  
جنية معمرة عارضة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء .  
فروعها عارضة الملاك . اوراقها عارضة بيضية الشكل ،  
مقطوعة القاعده . نصلها مائل الى البشرة ، اخضر الصنفه  
البلبا ، بحري السفل . ازهارها كبيرة القدر فواحة العرف  
الطري . لونها ارجواني الخارج اصفر الداخل // ازهارها  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٣٣٣ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّالِكَةِ

*Loncera spinosa* (S). Chèvrefeuille épineux (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية فراء .  
فروعها نخلية متدلية ، مكاهها ابيض اللون . اوراقها  
خلفية مسطوية مسننة القاعده . ازهارها قُصْبِيَّة الانتشاب ،  
انبوبية التوجع ، ضيقة القنابات الطويلة ، ودية اللون ،  
ثمارها الى الحمر الزرقاء المولج يطوها طيب الحبر .  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٣٣٤ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّرْقِيَّة

*Loncera orientalis* (S). Chèvrefeuille d'Orient (F).  
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. ساقها مثلية  
فراء . فروعها مثلية يبيض الملاك . اوراقها صغيرة  
القدر ، نصلها اخضر البشرة في صنفها . ازهارها ودية  
اللون يطوها توشع بنفسجي . ثمارها الى البشرة السوداء  
اللامعة // ازهارها يستمر من حزيران الى آب .

#### ١٦٣٣٥ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ القُصْبِيَّة

*Loncera myrsillus* (S). Chèvrefeuille-myrtilla (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها مثلية . مكاه  
فروعها ابيض اللون . اوراقها اهليلجية صغيرة القدر .  
نصلها عاق الحصار خلى الصنفه السفل . ازهارها قُصْبِيَّة  
الانتشاب ، انبوبية التوجع و جرسية الاطراف ، ضيقة  
القنابات المستطيلة . لونها الى البياض النقي . ثمارها  
مزدوجة ، لاصقة ، ثنائية الحدر ، حمر اللون // ازهارها  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٦٣٣٦ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ القُصْبِيَّة

*Loncera pileata* (S). Chèvrefeuille à cupule (F).  
جنية معمرة صغيرة القدر تملو نحو ٦٠ سم. ساقها مثلية  
فناء . لونها زباد اللحاء . اوراقها ابيدة بقية الشكل .  
ازهارها صغيرة الحجم ، قية القاعده يضاء اللون .  
ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

انواع نحو ١٥٠ تميل بعد نظمها . ساقها مثلية  
لو عارضة . اوراقها متعاقبة الارتكاز ، ابيدة او عارضة  
النصل . ازهارها لا قياسية الاحصام ، رقيقة الشكل ،  
حطرية الرائحة // اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

#### ١٦٣٣٥ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الأَيْدِيَّة

*Loncera sempervirens* (S). Chèvrefeuille toujours  
vert, C. de Virginie (F).  
جنية معمرة عارضة تملو ٥ الى ٥ امتار . ساقها مثلية  
فروعها عارضة الملاك . اوراقها بيضية الشكل .  
نصلها خلى البشرة بحري اللون . ازهارها مثلية التجميع  
تاجية الارتكاز حطرية الرائحة ، لونها الى الازرقاء الاصفر  
المولج // ازهارها يستمر طوال الربيع والصيف .

#### ١٦٣٣٦ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّيْبِيَّة

*Loncera thibetica* (S). Chèvrefeuille du Thibet (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها مثلية فراء .  
ملاك فروعها ابيض اللون . اوراقها صغيرة القدر ، نصلها  
اخضر الصنفه العليا ، الحامل للسفل الكثيفة الزغب .  
ازهارها قُصْبِيَّة الانتشاب ، انبوبية التوجع ، حطرية  
الرائحة ، ليكية اللون // ازهارها يستمر من ايار الى  
حزيران .

#### ١٦٣٣٧ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ القُرْبِيَّة

*Loncera tartarica* (S). Chèvrefeuille de Tartarie,  
Chamécristier, Caméristier (F).  
جنية معمرة تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها  
واسرها الزغبية عريضة ، ساقها فراء . فروعها القوية  
حمر الملاك اما الحولية فيضاه . اوراقها صغيرة القدر ،  
قلبية الشكل مقطوعة القاعده . نصلها حاد الحبل  
اخضر اللون . ازهارها تختلف مع القرب لونها  
الايض والودي والاجر ، كزوبها خماسية التركيب .  
ثمارها صفر او حر ، كروية الشكل ، مسطوية الاذن .  
ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

#### ١٦٣٣٨ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّيْبِيَّة

*Loncera alpigena* (S). Chèvrefeuille alpestre (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها فراء ، فروعها  
عارضة يبيض الملاك . اوراقها كبيرة القدر اهليلجية النصل  
المهبط . ازهارها جوية اللون توجعها مزدوجة القصور .  
ثمارها الى الحمر القُرْبِيَّة // ازهارها يستمر من ايار  
الى تموز .

#### ١٦٣٣٩ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ القُرْبِيَّة

*Loncera perlymenum* (S). Chèvrefeuille des  
bois (F).  
جنية معمرة عارضة تملو نحو ٥ امتار . ساقها فراء .  
فروعها عارضة الملاك . اوراقها بيضية الشكل ، ثقلة  
الزباد الاخضر ، نصلها مائل الصنفه العليا اخضره ،  
خلى السفل المصطاد . ازهارها فواحة العرف اللقي ، لونها  
الى الصفرة الجسلة يطوها مولج ارجواني // ازهارها يستمر  
من حزيران الى ايلول .

#### ١٦٣٤٠ - صُرْبَةُ الْجَدْيِ الشَّيْبِيَّة

*Loncera xylosteum* (S). Chèvrefeuille des haies,  
C. des buissons (F).  
جنية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقها مثلية  
فناء . فروعها جيت ، لونها حمر الملاك . اوراقها  
بيضية مقطوعة القاعده خلية النصل . ازهارها الى البياض



صُرْبَةُ الْجَدْيِ الأَيْدِيَّة

- نحو ٢ سم. أزهاره وردية اللون. حثولية التجميع.  
يستخرج من أوراقه وزهره دهن السحر الشائع الاستعمال.  
١٦٢٤٤ - **صَعْقَرُ الْبَرِّ** هو للعقار. اطبله.  
١٦٢٤٥ - **صَعْقَرُ الْجَبَلِ** هو ندغ الجبل. اطبله.  
١٦٢٤٦ - **صَعْقَرُ الْفَرَسِ** هو الطيريون الكوربي. اطبله.  
١٦٢٤٧ - **صَعْقَرُ بَرْزِي** هو سحر البر. اطبله.



صعر زنبق

- ١٦٢٤٨ - **صَعْقَرُ الْبَرْزِي** \*، **فُودَنْج**  
*Organum vulgare* (S). *Organ commun*, *Marjolaine*  
*bâtarde*, *Fausse marjolaine* (F). *Wild marjoram*,  
*Organy* (E). *Echtst. Dost*, *Wilder Marjoran* (D).  
*Origeno*, *Regano* (I).  
نبات عشبي طلي يري معمر من فصيلة الشفويات. ساقه  
قوامها خشوية تملو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. أوراقه منقطة،  
مقابلية، بيضيه الشكل؛ لصلها خالي البشرة، مبرش  
الجيوب المطرية. أزهاره وردية اللون. حر التفتاب.  
حكيكها الزهري عسيبي الشكل || يستخرج من أوراقه  
عطر الصمغ.



صعر البازي

- ١٦٢٤٩ - **صَعْدَكَة** *Tige dressée* (F). *Erect stem* (E).  
هي كل ساق تمكثها أليافها التماسية من الالتصاب دون  
وسط أو تفتيف.

- ١٦٢٥٠ - **صَعْرُورَة**، **عَقِيرَة**، **فُصْمُورَة**  
*Boule de scarabée* (F). *Ball of beetle* (E).  
الصمرورة أو البقرة أو القمصورة حشريّة من ذبيل  
ولتين تصطنعها بعض أاثا الخنافس، أخصها الجبل لآرؤ  
المكن في داغها.



صَعَق

- ١٦٢٥١ - **صَعَق** \*  
*Ictinia* (S). *Ictinia* (F).  
جنس طير من حارة الحدأ وفصيلة السقرات. أنوامه  
قليلة جميعها من القواطع الكبيرة الجفة. ألونها إلى السهية  
الرصاصية يعلوها موج أزرق. رؤوسها زائفة. سواقلها  
وأظفارها عابقة. حيرتها حر اللون، سود الأظفار والأهداب.  
متناسرها إلى السواد الأزرق، أرساغها جلوية || قوتها  
الطاهة وللأوبيا والخرطرات على اختلافها. تثن في الأشجار  
الباسقة. أثارها تقع من رفقتين إلى ثلاث رفقات تحضنها  
بمنارة ذكورها نحو لريمة أساييم.

- ١٦٢٥٢ - **صَعْفَع**  
*Rotor*  
نمت قريتي يعلق على القسم المتحرك الدوار من الحركات  
الآلية.



صَعْف

- ١٦٢٥٣ - **صَعْف** \*  
*Oxylophus glandarius* (S).  
*Oxylophus-Gel* (F).  
طائر من حارة البوقليات وفصيلة القيقويات. أحواله  
نسبة الأرجاء تشغل الشرق الأوسط وأجزيرة العربية  
وأفريقية الشرقية والشيالية || وهو من الضروب التي تعرب  
بالبلاد في طلب الرزق. جسده متوسط القد، يطلي نحو  
٤٠ سم. ثوبه متباين الألوان. رأسه إلى الوردية. جبينه  
وزوره وعلاطا عقه إلى السهية الصفراء. ينط إلى اليابس.  
ظهوره إلى الوردية الحطية الموج. ريش قوامه وسكاك  
وأباهر وذنبه إلى السرة الحطية باستثناء الأطراف البيض.  
مقاده أحر القاطدة، أسد الملاط. أفتاده إلى السرة

## ١٦٢٣٧ - صِرْمَةُ الْجَدِيّ النَّجْدِيَّة

- Lonicera syringantha* (S). *Chèvrefeuille-fils* (F).  
جنية معمرة تملو نحو ١٢٠ سم. ساقها منقسمة فروع.  
مكك فروعها أبيض اللون. أوراقها أبيضية صغيرة القد.  
نصلها مائل البشرة جبل الخفسار. أزهارها تولية الانتداب.  
الوردية التويج، خيشية القنابات، عطرية الرائحة و  
وردية اللون. ثمارها حمصة القد، حراء اللون، ثلاثية  
الحفر || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

## ١٦٢٣٨ - صِرْمَةُ الْجَدِيّ الْيَابَانِيَّة

- Lonicera japonica* (S). *Chèvrefeuille du Japon* (F).  
جنية معمرة عارضة تملو نحو عشرة أمتار. ساقها منقسمة  
فروعها متباعدة، عادمة المكك. أوراقها أليدة، بيضيه  
الشكل، مبدية الزام الأخير. نصلها خالي الصفة السفلى.  
أزهارها تولية التجميع، كبيرة القد، حرة الرائحة.  
لونها إلى الأبيض اللويح بالأحر || أزهارها يستمر من  
سزيان إلى تشرين.

## ١٦٢٣٩ - صَعْب

- Quela* (S).  
*Quéla*, *Dioch*, *Travailleur* (F).  
جنس طير من فصيلة التوطيات. أنوامه للمرة ثلاثة  
موطيا أفريقية الشرقية من شواطئ بحر القلزم إلى ما  
وراء الحيفشة. أجسامها مبردة الخيم طولها يراوح من  
١٢ إلى ١٥ سم. ألوانها قليلة الاختلاف من بعضها بكثر  
فيها الأحر المائي، رؤوسها وأعضائها وأجنحتها سود.  
حناجر قوامها وأباهرها صفر. متناظرها سود أو حر.  
أرساغها إلى السرة الحطية || قوتها الجيوب ولزور  
والطوام. تثن في الأدهال. حطافها عيوكة التفتش  
كروية الشكل، مغشوة للمخل. أثارها تقع من ٥  
إلى ٧ بيضات تحضنها بمنارة الكور نحو أسويين.  
ج صماب.

## ١٦٢٤٠ - صَعْبَر، صَعْبَر

- Berchemia* (S).  
*Berchemia* (F).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة البقيبات. أنوامه قليلة.  
سفيها عارضة طولها من ٤ إلى ٣٠ م. أوراقها عابطة بيضيه  
الشكل، مغشوة القاعدة. نصلها حديد البروق، بحري  
اللون. أزهارها صغيرة القد، غصراء اللون، حثوية  
التجميع، ثمارها زيتونية الشكل ولقد واللون، تسد  
عند الأدراك. أزهارها يستمر من أيار إلى أيلول.

## ١٦٢٤١ - صَعْقَر

- Frai* (F). *Spawning* (E).  
سره السمك قبل أن يخرج من الأنظام وهو الذي يحضر  
يصبح من المأكلا المفردة التيبة المعروسة بالطرخ  
والجباري || أنوامه عديدة تحضف باختلاف مصادر  
وصيحه السره ولونه وطريقة تحضيره.

## ١٦٢٤٢ - صَعْقَر هو السحر، اطبله.

## ١٦٢٤٣ - صَعْقَرُ الزُّعْب \*، زَيْعَر

- Origanum hirtum* (S). *Origan hirtus*, *Marjolaine*  
*hérissée* (F). *Hairy Marjoram* (E). *Kretischer Dostan*  
(D). *Origan di Creta* (I).  
نبات عشبي يري سطري معمر من فصيلة الشفويات.  
يكثر في الأراضي الجبلية المخساة. ساقه فروع تملو نحو  
٤٠ سم. فروعها دقيقة، خشوية، منقسمة، زغبية اللحاء.  
أوراقه منقطة، مقابلية، بيضيه الشكل، نصلها خالي  
البشرة. كثيف الجيوب المطرية، مسن الحافة، يطلي



صنفر



صنفر أزرق



صنفر أخضر



صنفر حمران



صنفر قنبرية



صنفر مجذعة

الخضراء || قوله الحشرات والإسراع . انشاء كائن القوق  
لا تخشى البيض بل تقسمه في عشائ غيرها من الطير  
اعصا عشائ الزناج . ج . صنف .

١٦٢٥٤ - صُنْفَرُ  
Fral (F). Spawning (E).  
الصُنْفَرُ سره السلك ويدعى صُنْفَرُ ، اطلبه .

١٦٢٥٥ - صُنْفَرِيَّات  
Chytridiaceae  
فصيلة ظهور مجهرية من مرتبة السريتات ورتبة البشيات .  
اجناسها وانواعها عديدة . اشهرها من الوجهة الاقتصادية  
الزراعية : الفس والوزم والرمحة .

١٦٢٥٦ - صُنْفَكَة  
الصنفة : غفلة فيها عرج واصول منها يجرده .

١٦٢٥٧ - صُنْفَلُ \*  
Galeria marginata (S).  
Galerina marginée (F).

نظر كامن الصنف لاما كمل من فصيلة الفاريقيات .  
اصطاك اقل الصنوبريات حيث يعيش بمجموعات على  
القصور والأخشاب المنفرة . جمجماته لاقنسية العدد الذي  
يراوح من ٦ الى ٢٠ يوجه الى الياض الاخضر . ساقه  
ممتدة الطول ثنية الين ، طويلا الى الحطلة . اوسمته  
شبه صبرانية الشكل غمدة الحافية ، قطرها نحو ٤ سم .  
لونها الى السمره يملؤها مواج اسفر . اطرافه ممتدة  
الكثافة بنية الين . وانحته عند اليس قريبة الشبه من راحة  
التيق .

١٦٢٥٨ - صُنْفَلُ زُهَب \*  
Clytus pilosus (S). Clytus polli (F).  
Clytus pilosus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مفدمات  
الاجنسة . تألف الجنان وكروم التين . غشائها تعيش  
على اوراق الاشجار . يرقاتها تسردب الجلود اليابسة ||  
جسمها متوسط الطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى  
الصفار الزيتي الاخضر المواج يملؤها في الظهران ست نقط  
سود . رأسها ممتد الجرم . عينها صغيرات بارزتان .  
زبانها خيطيان ، دقيقان . فكاهما ذربان . ظهرانها  
حراشيش الشكل لا يلبس السكة الشرسية . غذائها كيتفا  
الحمل والزنب . ابراسها رباعية المقل الظاهرة || الاثنى

اكبر قدأ من الذكر واطول سرأ منه واقصر زبأنا ||  
لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل  
حزيران وتبقى حتى اواسط ايلول . تسرح في النهار وتبيت  
في الليل || البرقة عند ادراكها الكوال الجسودي تطول  
نحو ٢٢ سم . جسمها حيدى التركيب قليل القفوس ،  
حامد الرواجب ، حطلي ، الين ، اخضر المواج ، اسد  
الرأس ، ميمر الحلب اللتيق .

١٦٢٥٩ - صُنْفَلُ أَهْيَت \*  
Clytus arcuatus (S). Clytus étroit (F).  
Clytus arcuatus (E).

حشرة خاضعة غاشبة من فصيلة القرنبيات ورتبة مفدمات  
الاجنسة . تألف اسراج الصنوبر والتنوب والشرين .  
غشائها تعيش على : ازالج الشفويات والصبرانيات . يرقاتها  
تسردب الجلود والأخشاب اليابسة || جسمها متوسط الطول  
اهيت الشكل يطول من ١٢ الى ١٦ سم . ثوبها الى السمره  
السودا يملؤها في كوتلها اربع بقع صفر ويعطوها في

ظهرانها اريمة تزاويق متقابلة صفراء الين . رأسها كبير  
الجرم . عينها كبيرتان جاحظتان . زبانها خيطيان  
دقيقان || ظهرانها فارقة للمخضر لا يلبس السكة الشرسية .  
غذائها محتاتبا التحزير الخفيف . ابراسها رباعية المقل  
الظاهرة || الاثنى اكبر عدأ من الذكر واطول سرأ منه  
واقصر زبأنا || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة  
الجملانة في اواخر ايار وتبقى حتى اواخر آب . تسرح في  
النهار وتبيت في الليل || البرقة عند بلوغها الادراك الجسودي  
تطول من ٢٥ الى ٢٤ سم . جسمها حيدى التركيب ، حامد  
الرواجب ، اصفر الين ، اسر الرأس والشرج ، ميمر  
الحلب القصير الدقيق || طول الاكامل الذي يستمر من  
٤٠ الى ٥٥ يوما ينتهي في آخر نفق تحفره البرقة قرب  
سلك الحول او الصنم الذي تقم فيه .

١٦٢٦٠ - صُنْفَرُ

هو الصنبر نبات عايش من التنبقات ، اطلبه .

١٦٢٦١ - صُنْفَوَة \*  
Regulus (S).  
Roiteale (F). Wren. Kinglet (E).

ج . صنو . جنس طير من فصيلة الشعليات . انواعه ٦  
جميعها من العصافير الصغيرة اللد . رؤوسها مطوقة .  
مناظرها دقيقة مستقيمة . اوتواها متباينة الالوان يعلب  
فيها الاملل والاضفر الزيتوني . اجنسها متوسطة اللد .  
اذنانها مقعرة الريش قصيرة || قوتها الحشرات والاطرام .  
تألف الادخال والاصراج والسجاجات . تدن في الاشجار  
الكثاء . اناثها تبيض مرتين في العام . المرة الاولى في ايار  
والثانية في تموز . حضنها يستمر نحو اسبوعين تقوم به  
الاثنى دون الذكر .

١٦٢٦٢ - صُنْفَوَة الخُطْب \*  
هي الاطالان ، اطلبه .

١٦٢٦٣ - صُنْفَوَة حُجْرَة الرَأْس \*  
Regulus ignicapillus (S).  
Roiteale à tête rouge (F). Fire cree. Fire  
crested wren (E).

نوع من الصنوة تألف الادخال والسجاجات والحدائق .  
طولها نحو ١١ سم . رأسها الى الحمرة الصنائية . محسرا  
الى الصنوة . ثوبها الى الوردية زهو في الصدر والجن ،  
يقل في الظهر ويملؤها مواج اخضر زيتي في الجناسين .

١٦٢٦٤ - صُنْفَوَة قُنْبَرِيَّة \*  
Regulus cristatus, R. regulus (S). Roiteale huppé (F).

نوع من الصنوة تألف الصنوبر والاصفر . طولها نحو  
١٠ سم . رأسها يرتقالي الريش المستطيل ، اسود الطوق ،  
اصفر الحسرين ، ظهرها الى الخضار الزيتوني . جناحها  
الى السمره اللقلاء . صفرها وبطها الى الوردية المملدة .  
تدن في الصنوبر والتنوب .

١٦٢٦٥ - صُنْفَوَة مُجْدَعَة \*  
Regulus aticapillus (S). Roiteale triple bandeau (F).

نوع من الصنوة طولها نحو ٩ سم . رأسها امير الين اسود  
الطوق . محسرا بجذعان بلاييض . سائر ثوبها كالصنوة  
القنبرية . تأم الجبل في اوائل ايار فتقيم حتى ايلول  
ثم ترسل الى الشواطئ هربا من البرد .

١٦٢٦٦ - صُنْفُول \*  
Acrocephale (F).  
Acrocephalic, Acrocephalous (E).

الصنول من كان رأسه ضيق القمة .



صُرُور

Emberiza citrinella (S).  
Bruant jaune, Verdrière (F). Yellow hammer (E).  
صفرور من الشراشير . طول نحو ١٧ سم. لونه الى  
الصفرة الخضراء المائل . رأسه رمق وصدره وبطنه صفر .  
ظهره وبنتاه وذنبه الى الصفرة الصفانية يطولها توشيح  
خطي . ابطاء موشية بالمخوري . جناها حليتان ، متفاداة  
ازرق . ريشه الى الصفرة الزرقية . الاذن اصفر تقاد  
واثل تزويجاً من الذكر || قوته الحشرات والديدان والحجرب  
الغيرة . يالغ الادغال والكروم والحلقوق والسيجات .  
يشن عته في الارض او على ارتفاع قليل منها في الادغال  
الكثيفة || اثناء تحضن من الزئرين الى الثلاث مرات  
في العام تحضنها تراوح من ٤ الى ٥ يبيضات .

1١٢٧٦ - صَفَّ  
Casse (F). Cass (E).  
هو في تصنيف الاحياء ما يأتي بعد القسم يقبل العائلة .  
راجع تصنيف .

1١٢٧٧ - صَفَاة  
Polyèdre (F). Polyhedral (E).  
جسم صلب متعدد الصلعات او الوجوه .

1١٢٧٨ - صَفَاة \* ، صَفَاة ، صَفَاة  
Orieolus (S). Oriole (F). Oriole (E).  
جلس طير . من البشريات القردوسيات . انواها ٢٤ جميعها  
من التواضع ، موطنها العالم . اجسامها رشيقة متوسطة القد .  
طولها يراوح من ٢٢ الى ٢٧ سم . مناقرها قوية مستطيلة .  
اجنحتها ذلقة . اذناها مغطاة الطول فضفاضة . ارسلها  
جسدية الجذ قوية . انورها الى الصفرة اللحية الجسدية .  
ازنادها واجنحتها واذنابها سود . عيونها الى الحمرة الزاهية .  
منقارها صلبة ، اجسامها رشيقة || قوتها الحشرات  
والقار . تلتن في الاجنحة الزرقية ، اناتها تقع من ٤  
الى ٥ يبيضات تحضنها وسعها .

1١٢٨٠ - صَفَاة  
Cotisation (F).  
ترتيب سبي الشكل موصد الاطراف او طليها يحصل  
عصا تكون الطاش في طور الميوزة .

1١٢٨١ - صَفَاة  
Epicrène (F). Epicranium (E).  
شفاه المهيمة وهو في الحشرات الجبنت .

1١٢٨٢ - صَفَاة  
Pélopie (F).  
قناة الجله .

1١٢٨٣ - صَفَاة  
Tère (F). Tère, Qualification (E).  
هي الاساس القانوني الحق كقولك مقد صفة تيرج .

1١٢٨٤ - صَفَاة  
Qualité (F). Quality, Capacity (E).  
هي الميزة التي تحو بلار الى التدخل في مقد قانوني  
او قضية ما وذلك بصفته وارثاً او وصياً . الخ .

1١٢٨٥ - صَفَاة  
Caractère (F). Character (E).  
الصفة جمعاً اوصاف وصفات هي الميزة الجسورية  
الخاصة .

1١٢٨٦ - صَفَاة غَالِيَة ، صَفَاة مَكُونَة  
Caractère dominant (F). Dominant character (E).  
هي في الدقة الصفة التوزيية التي لا يمكن طسها  
تظهر دائماً .

1١٢٦٧ - صَفَاة  
Acrocephale (F).  
Acrocephaly (E).

تشويه خلقي يحصل للرأس فيبدو شيق القمة . الصولة  
لا تخم حشف القوى المقلية .

1١٢٦٨ - صَفَاة  
الصعيد هو وجه الارض البلية وقيل هو المرتفع من الارض .

1١٢٦٩ - صَفَاة  
Lentes (F). Nits (E).  
الصب : يرض القلة ونحوها . الوحدة صفة .

1١٢٧٠ - صَفَاة  
Sphaerocarpidae (F).  
مرية فطور مجهرية من رتبة الزويجات تتميز بكتلتها  
المهيمة المصورة عن بؤفة مغلقة (بكتينة) || فصالتها  
اربع وهي الثلاثيات والصفنيات والمثنائيات والمذكرات .

1١٢٧١ - صَفَاة  
Sphaerocelis  
جنس فطور مجهرية من فصيلة الصفنيات . انواها عديدة  
نحو ٢٠٠ منها ردية ومنها طفيلية . بكتيناتها محصورة للشد  
سطحية الالتفاز . فصالتها خلية او متصلة . جملها خطي  
عابق يطوي من ثائي دقيق . شغراتها جذية . بونغاتها  
بيضية حشلية او مهيبة اللين .

1١٢٧٢ - صَفَاة  
Sphaeroidaceae (S). Sphaeroidaceae (F).  
فصيلة فطور مجهرية من مملكة الصفنيات ورتبة  
الزويجات تتميز بكتيناتها الضفسم ، الحصور المت  
التي السمة ، السيمك الجليل ، العابق اللين . بونغاته لا  
قياسية التركيب والشكل والتجميع . فهي صيغة الخلية  
او ثنائيات ، ورتبة او شعية الاضية ، خيلية او قدية  
الشكل ، فردية او ردية التجميع ، مستطيلة او متروعة  
الزوية المثلثة || اعرف اجسامها الاقتصادية للزوية نحو  
٣٢ ، ثوردها بالتسلل الاجدي كما جاءت في الموصفة .  
اسروره ، اسكوشيتا ، اسنبة ، اسنبة ، اكرالية ،  
بلنوس ، تريكويتوريه ، درلوسه ، ذكراليه ،  
دندروفيوه ، دويورال ، ديلويته ، ديلويوروه ،  
رديورور ، زقار ، ستروريه ، صبة ، سفروفيوه ،  
سندارية ، ميتوسوروريه ، دويديه ، صبة ، فيوه ،  
فويوبيس ، كرساله ، كويوروروم ، لزيوروريه ،  
لصف ، ملق ، مكرفيوه ، هتسوروله ، هتسورولي .

1١٢٧٣ - صَفَاة  
Petilum (S).  
Petilum (F). Petilum (E).

جنس حشرات من فصيلة الصفروريات ورتبة غديات  
الاجنحة . انواها المعروفة قليلة العدد اسطائها البلاد المطلة  
الحاررة من العالم القديم || اجسامها شديدة الصفر ،  
بيضية الشكل ، قليل نحو ١ م . رؤوسها مستعرضة .  
عيونها صغيرة ، ماحة . كأكبرها وكوكها وبلاسلها قياسية .  
قرونها الاستفادارية مستطيلة ، صرطانية الشكل . كولسلها  
حميدة ، مستعرضة . رواشها مهدية . الحامدا لاحة .  
قواها شديدة . انواها وصيدة اقرون منها الاثنت والاسهب  
والاسر || تعيش في الجفلة والديدي النباتي . قوتها يورغ  
الغليات .

1١٢٧٤ - صَفَاة  
Ptiline (S).  
فصيلة حشرات من غديات الاجنحة تسمى ايضاً  
اصفرات ، اطبا .



صَنَج



صَفَاة





صَفَافَات ابيض



صَفَافَات ارجواني



صَفَافَات اريد



صَفَافَات البلاتين



صَفَافَات الماعز



صَفَافَات ماعز

الطرف. اسديتها ثنائية . ثمارها زاهد اقشور مستدة الاذن الشديدة القصر || يعيش على الماء . زواحه منتشرة في جميع الاصقاع . قصباتها لينة ساعية شائعة الانتحال .

١٦٣١٧ - صَفَافَات الماعز \*  
Salix caprea (S).  
Sauce des chèvres, Bourzade (F).  
Goat willow, Sallow (E). Sahweide (D). Salice caprea, Caprareccio (I).

شجرة سريرية متوسطة القند ، ثمارها غير حذرة انتار . قصباتها واقتانها حديدية اللحاء . اوراقها مسطحة ، بيضيه ، صغيرة القند طول نحو ٥ سم . وتعرض نحو ٢ . نصلها خشن الملمس ، ازرق الصفرة السفل . حراشف شياؤها سواد . اسديتها ثنائية || يعيش في جميع الارضية والمواقع الرطبة . اغشاهها صناعية . لحاء سويها تصطبغ للدهانة .

### ١٦٣١٨ - صَفَافَات قَبِيْق القل

Salix acutifolia (S). Sauce à feuilles étroites (F).  
شجرة متوسطة القند ، تملو من ١٠ الى ١٥ فرسها تحلة متوسطة خلية اللحاء . اوراقها ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها لاسفة خلية . اسديتها اقلاما ثنائية التجميع || يعيش في الوديان ، يزرع في الكتبان لتثبيت رمالها المتحركة .

### ١٦٣١٩ - صَفَافَات قاصير \*

Salix magnifica (S).  
Sauce magnifica (F).  
جنبة سريرية جميلة الشكل ، ثمارها نحو ٢٥٠ سم . قصباتها ارجوانية اللحاء . اوراقها بيضيه طول من ٢٠ الى ٢٤ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٥ سم . نصلها جامد النسيج ، جميل الخضار الزاهي . شياؤها الذكرية طول ١٥ سم . والانثوية ٢٥ ، حراشفها جلدية اللون ، اسديتها ضفعية || يزرع القزوين جيد في جميع الارضية والمواقع للرطوبة الرطبة .

### ١٦٣٢٠ - صَفَافَات قزم

Salix herbacea (S).  
Sauce nain, S. argentea (F). Dwarf willow, Arctic willow (E). Krautweide (D). Saliceo nano (I).  
نبطة جبلية ترطب في المواقع الرطبة الباردة . تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . فرسها وقصباتها زاهد اللحاء . اوراقها صغيرة القند طول نحو ٦ سم . وتعرض نحو ٢ . حراشف شياؤها خلية فضية . اسديتها ثنائية .

### ١٦٣٢١ - صَفَافَات قصير

Salix fragilis (S).  
Sauce fragile (F).  
شجرة فرسها ، تملو من ١٥ الى ١٥ م . فرسها متدلية ، حادة الحبل الازرق ، سرية القسم . اوراقها سانية ، مدببة ، طول نحو ١٦ سم . حراشف شياؤها صفر . اسديتها اقلاما ثنائية التجميع ، مرطبة الاقلام || يزرع لاشغاه وقصباتها الصناعية ، يرغب في المواقع المستمرة الرطبة .

### ١٦٣٢٢ - صَفَافَات قَلْبِي الْوَرَق

Salix cordata (S). Sauce à feuilles en coeur (F).  
شجرة فرسها منتصبه الاقصان ، تملو من ٢٥ الى ٤٠ م . اوراقها قلبية الشكل ، نصلها مائل البشرة ذات اقلام الانثوي للشاري الحافة . حراشف شياؤها خلية . اسديتها اقلاما ثنائية التجميع مرطبة الاقلام || يزرع القزوين يرغب في المواقع الرطبة والارضية السميكة الغور .

### ١٦٣١١ - صَفَافَات، سَوَحَر

Salix (S).  
Sauce, Osier (F). Willow (E). Weide (D). Salice, Saliceo, Salicio (I).

جنس اشجار وشجيرات ونباتية سريرية ورتبية من فصيلة المصنعات . اوراقها مائلة مدببة متعاقبة تطبق فيها الاسطالة ، نصلها ازرق الصفرة السفل . اقلامها ثنائية المسكن ، شريفة ، وسيدة الشق || جميع اقلامها ترطب في الاراضي الرطبة . اغشاهها خفيفة لينة سهلة التصنيع لا تتفكك . لحاء سويها تصطبغ للدهانة . قصباتها تتسمل في صناعة البلال . اشهر اقلامها ما يتبع .

### ١٦٣١٢ - صَفَافَات ابيض \* ، إسبيد كز

Salix alba (S). Sauce blanc, Osier blanc (F). White willow, Swallow tailed willow (E). Silberweide (D). Saliceo bianco, Salicastro (I).

شجرة كبيرة القند ، ثمارها زاهد ٢٥ م . فرسها متوسطة الانبساط ، قصباتها واقتانها منتصبه ، لونها الى الخضار الزاهي . يعطونها زهاب ابيض . اوراقها سانية الشكل ، مدببة الطول طول نحو ١٢ سم . وتعرض ٢ . نصلها منشاري الحافة ، خلي البشرة التي تبدو فراء اللون . حراشف شياؤها صفر . اسديتها ثنائية || زواحه شائعة ، يرغب في المواقع الرطبة اغشاهها طرية وصناعية . لحاء سويها وفرومه دباغة .

### ١٦٣١٣ - صَفَافَات ارجواني \*

Salix purpurea (S). Sauce pourpre, Osier rouge (F).  
شجرة صغيرة القند ، تملو من مترين الى خمسة انتار . فرسها جلدية اللحاء . اوراقها سانية طول نحو ١١ سم . وتعرض ١٥ م . نصلها مائل الصفرة قليلا ازرق السفل ، مسن حافة الزايم الاخير . حراشف شياؤها قلنية ازرق . اسديتها اقلاما فردية ، مآبرها ارجوانية || يزرع القزوين .

### ١٦٣١٤ - صَفَافَات اُرْغَمَة \*

Salix cinerea (S).  
Sauce cendré, S. gris (F).  
شجرة صغيرة القند ، سريرية ، جميلة الشكل . تملو من ٨ الى ٦ انتار . شجيرتها اجوف التبخيد السويدي . اوراقها طول من ٥ الى ١٥ سم . وتعرض من ٢ الى ٤ . نصلها خلي الصفرة ، مدببة المقصبة المنسقة . حراشف شياؤها قلنية ازرق الايدي اللون || يكثر في الاقاليم المحتلة قرب مجاري الماء .

### ١٦٣١٥ - صَفَافَات اسود

Salix nigra (S).  
Sauce noir (F).  
شجرة كبيرة القند دائمة تملو من ٢٥ الى ٣٥ م . اوراقها مدببة ، اهليجية ، ضيقة ، طول من ٨ الى ١٥ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٦ م . نصلها مائل البشرة ، خلي العروق ، حاد الخضار القاتم . حراشف شياؤها سود . اسديتها ورتبة التجميع ثلاثية او خلية او ساعية . اقلامها مرط . ثمارها طليسة اقشور ، مستطيلة الاذن . يرغب في المواقع الرطبة وفي الارضية السميكة الغور .

### ١٦٣١٦ - صَفَافَات السككين \*

Salix viminalis (S). Sauce viminal, Osier vert, S. des vanniers (F). Basket willow, Osier willow (E). Kobweide (D). Saliceo vetice, Vinco, Srops (I).

شجرة متوسطة القند ، تملو من ٤ الى ١٥ انتار . ساقها فرسها ، عديدة القصبان اللينة المسطحة . اوراقها سانية ضيقة ، نصلها يطول نحو ١٢ سم . وتعرض ١٢ م . صفته السفل فضية الخمل . حراشف شياؤها سود

## ١٦٣٣١ - صَفَافُ طَوِيلُ الذَّكَبِ \*

Orthotomus longicauda (S). Orthotome à longue queue, Fauvette couturrière (F).

طائر من الصفصاف. أطناؤه تمتد من مايليزيا الى الهند وإيران وإفريقيا. ثوبه جميل الألوان الزائفة. ظهوره الى الخضر الزيفي "الاصفر". عنقه يمتدحه ويصل الى العنق الاخير المغطى بالاصفر. عزازان ذنبه مستطيلان || قوته الحشرات والحفنة والديدان والتسلق. يألف الحدائق والقباض والمتاع وشغاف بجاري الماء || الاثنى قطع من || ال || يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما .

## ١٦٣٣٢ - صَفَافُ \* ، سَيْسَلَك

Secotomus (S). Saccotome (F).

جنس حيوانات قاضية جامة من القاربات. أنواعه ٤ موطنها البلاد الافريقية. جميعها ربة الحقة ، صغيرة القند. الثوبان الى السرة تسود مع اقترابها من الظهر والرأس وتبيض عند البطن. قوتهاها قصيرة. اطفاؤها ذرية. رؤوسها غروبية. اذنانها كبيرة مستديرة. اذنانها دقيقة. قصيرة. كاسية || قوتها الجذور وجميع المواد الصبوية والحشرات. تألف الادغال الكثيفة وصفاف الانهار والمروج المرتفعة والاراضي للمساكن. مجارها انفاق مستطيلة تتخللها رداء قسيمة .

Manoqua (F).

Hand, Plug (E).

الضمة من اوراق التبغ المجافة المرسوة، مبسطة كانت او غير مبسطة .

Lethrinus (S).

Léthrin (F). Lethrinus (E).

جنس سمك بحرية من ثلاثيات الزعانف وبسليسة الاسبوريات. انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها بعض بحار البلاد الحارة || اعرف انواعه واشهرها الصفصاف المأكول وصفصاف الاطلسي .

## ١٦٣٣٥ - صَفَافُ مَأْكُولُ \*

Lethrinus esculentus (S). Léthrin mangeable (F). Esculent lethrinus (E).

نوع من الصلبد ، سمكة بحرية بيضاء . أطناؤه تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || جسمه اعطاليبي الشكل ، قصور المقعر ، مستدل التسطيط ، يطول من ١٦ الى ١٨ سم. رأسه كبير الجرم ، غروبي الشكل . شفة مستطيلة الانفرج . صيناه مقاربتيان نازحتان . زعنفته الظهرية مستطيلة ، ثلاثية القسم الامامي . اما الشرسية ثلاثية المناسخ الغريبة . والذيلية فاقرة . ثوبه الى الخضار الفضي المالح . رأسه اصفر . زعانفه حر . وتعلو بقية جروية في اواسط الايائل من الجانبين || لحمه جيد الصنف مرغوب فيه .

## ١٦٣٣٦ - صَفَافُ ، تَصْفِيقُ ، صَفَافُ

Décantage, Décantation, Soutirage (F). Decantation Drawing off (E).

نقل اخضر وسائر السوائل من آنية الى اخرى لفصلها من رواسبها .

Marché (F). Market (E).

## ١٦٣٣٧ - صَفَافُ

إتفاق يشهد على تسليم بضاعة .

## ١٦٣٣٨ - صَفَافُ مُسْتَحْ ، صَفَافُ رُؤْيِي ،

## شَجَرُ الْبَيْتِ ، أَمُ الشُّعُورِ

Salix babylonica (S). Saule pleureur, S. de Babylone (F). Weeping willow, Mourning willow (E). Trauer weide, Babylonische Weide (D). Salix pangsanta, Salice di Babilonia (I).

شجرة تسمى - الكبير ، تملو نحو عشرة امتار فرومها منسقة . قضبانها وانفانها دقيقة متعالية . اوراقها سنانة ، ضيقة ، قصيرة المتق ، تصلها يطول نحو ١٧ سم. ويعرض ٢٥ سم. وهو مائل المنسقة العليا ازغب السفلى وزنيه اطول اللين . حراشفها ضاربة خضلة . اسنيتها ثنائية . زراعه شائعة ، يرغب في الواقع الكثيرة الماء ، قضبانها صناعية ، خشب متوسط الجودة .

Salix fluviatilis (S).

Saule fluviat (F).

شجرة سرورية ، تملو من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم. فرومها منفرجة الزوايا . قضبانها شبه منسقة . اوراقها ضيقة تطول من ٦ الى ١٠ سم. ويعرض من ٥ الى ١٠ سم. تصلها مشاري الحافة ، خلي البشرة على مسنيتها. حراشف ضاربة وريدية اللون . اسنيتها ثنائية . اقلامها خلية ، ثمارها زقية القشور || يعيش على مجاري الماء وفي الحشبات وبين الصخور .

Salix elegantissima (S).

Saule pleureur du Japon, S. elegant (F).

شجرة متوسطة القند ، تملو نحو عشرة امتار. احشبا اقية الانتساب . قضبانها وانفانها متعالية ، زباه اللما . اوراقها ضيقة تطول نحو ١٥ سم. وتعرض ٢ سم. تصلها بارز البروق المهدبة . حراشف ضاربها مستطيلة ، وريدية اللون . اسنيتها ثنائية . ثمارها خلية القشور ، قصيرة الامن. يزود القرنين ، يرغب في الاربة الربطية المتوسطة الانتاج .

١٦٣٣٩ - صَفَافَاتُ ، صَالِيَاتُ

Salicaceae (S). Salicées (F).

فصيلة نباتية من ذوات القفلتين حاملة الثمارات تشمل الصفصاف والجرور .

١٦٣٣٨ - صَفَافِيَّةُ

في الاية نبات من اقلبيات ، اطليا .

١٦٣٣٩ - صَفَافِيْنُ ، صَالِيْسِيْنُ

Salicina (F).

Salicin (E).

غلوكوزيد يستخلص من قشور واوراق الصفصاف والجرور وهو مقو نافع ويستعمل في معالجة داء المفاصل .

## ١٦٣٣٠ - صَفَافُ \*

Orthotomus (S).

Orthotome (F).

جنس طير من فصيلة السليقيات ودية الجواثم . انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الاسيرية || تتميز بلونها الزائفة وبطريقة صنع احشائها الجارية الشكل المولفة من وديتين يجسهما وتبعكها محيط من القطن او النيل الناعم تحده وتقتله قبل الاستعمال بمقارها الذي يقوم مقام المفرك والابرة واليد || اعرف انواعه واشهرها الصفصاف الطويل الذنب .



صفاف مستح



صفاف طويل الذنب



صفصفة



صفصاف مأكول



## ١٦٣٤٨ - صَفِيْعِيَّاتُ الْقُرُونِ

Lamellifornes (F). Lamellifornes (E).

لمت تقريباً يطلق على الخنافس القليلة لفصيلة الجليديات ذلك لأن قرونها الاستفصارية الورقية تشكلت لتفتح وتغلق كصفحات الكتاب.

## ١٦٣٤٩ - صَفِيْعِيَّاتُ الْمَتَافِرِ

Lamellirostres (F). صَفِيْعِيَّاتُ الْمَتَافِرِ (E).  
رَبِيَّة طير من كليات السقم تتميز بمنقذها المبطلة الصفيحية الشكل، من فصائلها الطيغيات والوزيات ولتعلقيات، الخ.

Glatsement (F).

## ١٦٣٥٠ - صَفِير

صوت السر.

## ١٦٣٥١ - صَفِير

هو الثمن جنبة من الفطيات، اطليه.

## ١٦٣٥٢ - صَفِيرَاك

Sophora (S). Sophora (E). Sophora (D). Sofora (I).  
جنس نباتات معمرة برية وزراعية تربيتية من فصيلة الاتريجات القرشانية. أنواعها عديدة منها الأشجار والعشيرات والجنابات والأشباب. أوراقها مركبة ريشية. أزهارها متفرقة تتجمع بكثرة لها اللون الأصفر، بني متفرقة تجبرها لتتحلل في أشهر أنواعها ما يتبع.

## ١٦٣٥٣ - صَفِيرَاكُ الْكُنْكِشِك

Sophora secundiflora (S). Sophora du Mexique (F).  
شجرة متوسطة الحجم، تملو نحو ١١ م. ساقها سرسة. أوراقها إبرية. وريقاتها تد من ٧ إلى ٩، لصلها مائل للبرقة. حبل الخسار، حنابقها الزهرية أبطية وصافية الازتكاز. أزهارها بتجمعية اللون، فواحة العرف. أزهارها يستمر طوال الصيف.

## ١٦٣٥٤ - صَفِيرَاكُ الْيَابَانِ

Sophora japonica (S). Sophora du Japon (F). Japanese pagoda tree, Sophora japonica (E). Japonische Sophora (D). Sofora del Giappone (I).

شجرة سروقية كبيرة القد، تملو من ١٥ إلى ٢٠ م. فروعها المشهورة أريضة. ساقها سرسة. أوراقها عابطة تملو نحو ٢٥ م. وهي مؤلفة من نحو ١٥ ورقة لصلها باحت الخسار. حنابقها الزهرية محبوبة الازتكاز. حنابها حربية الشكل تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م. أزهارها خافتة العرف للمستحب لونها إلى الصفرة البيضاء المزعج. ثمارها قرنية يستخرج منها خضاب أصفر اللون كبير الشأن يستعمل في صباغ ثياب ملك الشمس في أعشاش صناعية ناعمة الرقعة جيدة الصنف في أزهارها يستمر من تموز إلى آب.

## ١٦٣٥٥ - صَفِيرَاكُ الْفَرِيكِيَّةِ

Sophora affinis (S). Sophora d'Amérique (F).  
شجرة تملو نحو ٢٥ أمتار. ساقها سرسة. أوراقها عابطة كبيرة مركبة من نحو ١٧ ورقة لصلها مائل للبرقة. حبل الخسار. حنابقها الزهرية أبطية الازتكاز. أزهارها إلى الأبيض المزعج بالوردي في أزهارها يستمر طوال الصيف.

## ١٦٣٥٦ - صَفِيرَاكُ يَتِيَّةَ الْوَرَقِ

Sophora viciifolia (S). Sophora à feuilles de vesce (F).  
جنبة سروقية معمرة، تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م. ساقها شاذكة. أوراقها عابطة صغيرة. وريقاتها مستطلة يراوح

## ١٦٣٣٨ - صَفَن

Guépier (F). Wasp's nest (E).

مادة الزناير. بيت تتصه الزناير ونحوا لها ولقراغها.

## ١٦٣٣٩ - صَفَن

Bourse, Scrotum (F). Scrotum (E).

الجراب الجدي الذي يغلف الخصيتان للظامرتان عند الحيوان.

## ١٦٣٤٠ - صَفْرُوكَة ٥، زُؤِيَّة ٥

Zonitica immaculata (S). Zonitica immaculata (F).

Zonitica immaculata (E).

حشرة طيبة واثمة غامضة وألحجة من فصيلة اللوزيات وربة معدلات الاجنحة. موطنها الاقاليم المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط إلى اوروبا. غشاشها تعيش على بتلات الازهار وفطيات النبات وهي تفرز منه لسها مادة صفراء اللون كروية الرائحة ونحوي في شوارها وهي جهازها التناسلي مادة لاصقة تهيج بشرة الجلد وتثير البلاء. يرقاتها مفرقة في جسمها متوسط القد يملو من ١٢ إلى ١٥ م. قوامها إلى الصفار الكاظم، رأسها وبراميزها سود. صفاها كيرقان وبارتزان. زناياها غطبان مستطيلان. ظهورها سائي الاطراف القليلة اللاحقة في حبل واحد في الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في أيار وتعيش حتى أواخر تموز. تسرح في النهار. تساهل في حزيران وتمتد المكان في كل مكان يكون له الغطاء البقية عند بلوغها الإدراك التام تظهر نحو ٢٢ م. جسمها شبه امطواني الشكل، عابهي الصفرة الداكنة، أصفر الحواشي الترحية، أفر الملب، سداسي الزواجب، بني الرأس. قليل الملب المجرى على الجالين في طور الكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يسا يقتضي في التربة.

## ١٦٣٤١ - صَفِي

لمت يطلق على كل حيوان اعلى صريح السلالة الصافية المتشعبة. رابع صريح.

## ١٦٣٤٢ - صَفِيْحَة

هي التصل، اطليه.

## ١٦٣٤٣ - صَفِيْعِيَّاتُ

Lamelliformes (F).

Lamelliform (E).

ما كان كالصفيحية شكلاً.

## ١٦٣٤٤ - صَفِيْعِيَّاتُ الْاَحْتَاكِ

Mysticetes (F).

مربية حيوانات بحرية لبونة. راجع ريشيات الاحتاك.

## ١٦٣٤٥ - صَفِيْعِيَّاتُ الْأَرْجُلِ

Palcypodes (F).

صف حيوانات من الرضويات يعرف أيضاً بصفيحيات الخناشيم وبلوات الصمغارين.

## ١٦٣٤٦ - صَفِيْعِيَّاتُ الْجُلُودِ

Piscodermes (F).

Piscodermata (E).

مرتبة من الاسماك المتحجرة ظهرت في اواخر الحقبة السيلورية وانقرضت في الكربونية. تميزت ببياكلها الففرفرية المادة الملوقة بمصالح عطية التركيب.

## ١٦٣٤٧ - صَفِيْعِيَّاتُ الْخَيْطَانِ

Lamellibranchies (F). Lamellibranchiata (E).

صف حيوانات من الرضويات يسمونها ابساً ذوات الصمغارين أو الصمغتين (Bivalves).



صَفْرُوكَة



صَفِيَاءَ الْيَابَانِ

مستوية القوام، سرية الطيران، حادة المزاج وقوية الشجاعة. تمرلها : الصقر وصقر الصنم وصقر المروج وصقر الهند والحُرّ والسوق والشاهين والفرق || اما كنيته فأبو شجاع وأبو الاصم وأبو الحمراء وأبو عمرو وأبو عمران وأبو حوان .

١٦٣٦٩ - صَفَرَاءُ ، أَجْدَاك ، جَمْدَك ، قُطَامِي  
Falco sacer (S). Faucon sacre, Sacre (F).

طائر من الكولاس تنسب إليه عارة الصقور وفضيلة الصقريات . وهو أبيض الجفّة ، حسن الشكل ، مجدل الدين ، طويل السنن والذنب ، عاري الساقين ، حاد الخالب . منسره قصير القد ، أعف الجبهة ، مسنّ الخطين . وهو أحد من البازي وأقنع منه وأبرد مزاجاً وأشدّ أقداماً وأكثر إلفاً || موطنه البلاد المعتدلة الحارّة من آسيا وأروبة الشرقية || يأوى الإسراج والثنايا الكثيفة والجبال الجرداء على السواء . قوته الطير من المسفّر والبط . ينش وكته في صدوع الصخور الثابتة أو في أعالي الأشجار العالية . أثناء تصع من ٣ إلى ٤ دقائق تحسبها وحدها نحو أربعة أسابيع .

١٦٣٧٠ - صَفَرَاءُ الْأَرْتَبِ هو العقاب السعاء ، اطليبا .

١٦٣٧١ - صَفَرَاءُ الْبَطِّ هو السوق ، اطليبا .

١٦٣٧٢ - صَفَرَاءُ الْجَرَادِ هو البوقس ، طائر من الصقريات ، اطليبا .

١٦٣٧٣ - صَفَرَاءُ الصَّخْمِ \*  
Falco orientalis (S). Faucon de Barbarie, Tartaret (F).

نوع من الصقر . أصلانه نجد من العراق إلى التبت . وهو أصغر قدّاً من الشاهين والأجدل لكنه أشرس خلفاً وأبليس مزاجاً وأشدّ بطلاً .

١٦٣٧٤ - صَفَرَاءُ الْفَرَكَالِ هو الشرق ، اطليبا .

١٦٣٧٥ - صَفَرَاءُ الْهَيَوَانِ هو مرّة الدجاج ، اطليبا .

١٦٣٧٦ - صَفَرَاءُ الْمُرُوجِ  
Falco mexicanus (S). Faucon des prairies (F).

نوع من الصقر . أصلانه البلاد الأمريكية يكثر في المكسيك . يألف المناطق البدائية يبدأ من الشواطئ قوته الصافير والقزائم والحشرات .

١٦٣٧٧ - صَفَرَاءُ الْهِنْدِ \*  
Falco calidus (S). Faucon des Indes (F).

نوع من الصقر ، متوسط القد ، جميل التوشيم الزاهي ، سريع الحركة والانفصاف . موطنه الهند وهو من طيورها الأبدية .

١٦٣٧٨ - صَفَرَاءُ يَزْ هو البازي ، اطليبا .

١٦٣٧٩ - صَفَرَاءُ جَرَمَاحِ هو السقاوة ، اطليبا .

١٦٣٨٠ - صَفَرَاءُ حَوَامِ هو السقاوة الشائبة ، اطليبا .

١٦٣٨١ - صَفَرَاءُ كَبِ هو الجروية ، اطليبا .

١٦٣٨٢ - صَفَرَاءُ \*  
Cycchraque (S). Cycchraque (F).

جنس حشرات واشمة من مخدات الاجنحة وفضيلة

معددا من ١١ إلى ١٥ . أصلها مالى البشرى ، بحري الصفة السفل . عتاقها الزهرية ومطة تقم من ٦ إلى ١٢. زهرة لونها الى الياض الموشح بالازرق || ازهارها يستمر طول شهر حزيران .

١٦٣٨٧ - صَفَرَاءُ مُدَهِّبَةٍ

Sophora chrysophylla (S). Sophora doré (F).

جنية تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . ساقها قليلة الشوك . أوراتها مستطيلة ، وريقاتها غيبية التصل ، خلية البشرى ، معددا يراوح بين ١٧ و ٢١ . عتاقها الزهرية لينة . ازهارها الى الصفرة اللحية العذابة || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

١٦٣٨٨ - صَفَرَاءُ الصنم هو الزرع المذرك .

١٦٣٨٩ - صَفَرَاءُ الْجَلْدِ  
Pachydermes (F). Pachydermatous (E).

١٦٣٩٠ - صَفَرَاءُ  
Méricarpe (F). Méricarp (E). كل غشاء من احبة الثمرة النافذة التي لا تنفلق من زورها .

١٦٣٩١ - صَفَرَاءُ هي الإبل نوع من العمر ، اطليبا .

١٦٣٩٢ - صَفَرَاءُ  
Scithare (F). صكة بحرية تسمى سطار . اطليبا .

١٦٣٩٣ - صَفَرَاءُ \*  
Egrisé, Egrisée (F). Bort, Diamond-powder (E).

الصقال مسحوقة لأم من اللاس يستعمل في صقل الحجارة الكريمة وبها اللام .

١٦٣٩٤ - صَفَرَاءُ  
Cri des oiseaux (F). Cry of the birds (E).

١٦٣٩٥ - صَفَرَاءُ \*  
Cicadula (S). Cicadula (F). جنس حشرات صغيرة القد من فصيلة الوزيديات . أنواعها عديدة . أصلها العالم . مرتها الصفات والوراثة وبظم النباتات المنضجة والماتية . أجسامها اعطليجية الشكل تطول من ٣ الى ٦ سم . أنثاها مختلفة الألوان حادة الزرقة منها الاصفر والأخضر والحطلي والبناني ، الخ .

١٦٣٩٦ - صَفَرَاءُ  
Sacré (F). Sugared (E).

١٦٣٩٧ - صَفَرَاءُ  
Substance sucrée (F). Sugary substance (E). ج سطار . كل مادة سكرية .

١٦٣٩٨ - صَفَرَاءُ  
Faucon (F). Falcon, Hawk (E). الصقر يجمع مقور وصقار وصقارة والأش مقرة . والصقر بالرف البدوي كل طائر يصيد ما خلا العقاب والسنر . فالصقر يشمل البازي والشاهين والفرق والحُرّ والباشق والبيشق والسقاوة والزرق والبيروق . . . . . والصقور عند البزادة تفتان : الصقور والبزاة . فالصقور سود البين حمدة الرووس طولك الاجنحة قصار الارجل . والبزاة صفر البين مدورة الرووس قصار الاجنحة طولك الارجل || اما الصقر بالرف البلي نهر جنس طير من عمارة الصقور وفضيلة الصقريات . أنواعه ثمانية منتشرة في جميع اقطار العالم جميعها حسنة الشكل والمعتاد ،



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ



صَفَرَاءُ

## ١٦٣٨٧ - صَفَلاب سُورِي \*، سِتْكِرُوْرَا، حَشْرَكَة

## الحوري

*Asclepias syriaca*, *A. cornuti* (S). *Asclépiade* de Syrie, *A. à ouate* (F). Silk cotton, Wild cotton (E). *Echte Soelenpflanze* (D). *Asclepiade di Siria*, *Falso cotone* (I).

جَنَّة تَعْلُو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اورثاها مستطيلة او رشيبة التجميع. نصلها احليبي الشكل بطول من ١٠ الى ٢٢ سم. ويغرس من ٥ الى ١٢. ازهارها الى العفرة الخضر الزاهية يعطوا مزيج احمر. ثمارها كمار احليبية لشكل، مدرة البشرة، فسقية اللون، تلبها حروري. ابيض. يزورها صغيرة مستطيلة مفلطحة سوداء اللون.

## ١٦٣٨٨ - صَفَلاب عُسْكُوِي \*، حَشْفِيْنَة ذَاكَة

## الجنش

*Asclepias tuberosa* (S). *Butterfly weed*, *Tuber root* (E). *Echtes mudarplanze* (D). *Asclepiade tuberosa* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٨٠ الى ١٢٠ سم. اورتها عسكولية. ساقها زبداء لعمدة المصاراة البنية. اورثاها لائفة، احليبية، مسطوية. ازهارها حامية، عوجها برتقالية، يلاتها صفراء. ازهارها يشتر من عرر الى ابيض. يستخرج من ساقها مادة جوية فعالة تشمل في الطب. ويقال ان اورثاها وازهارها تغيد المصاب ببلات الجنش.

## ١٦٣٨٩ - صَفَلاب كُفْرُوِي \*، صَفَلاب حَقُوْلِي

هو الغلقة من النباتات الطبية، احليبا.

## ١٦٣٩٠ - صَفَلاب مَدَقْسِي \*، زَهْرَة الدَّم

*Asclepias curassavica* (S). *Asclépiade de Curaçao*, *Apia sauvage*, *Herba à sang* (F). *Blood flower*, *Wild ipocacunha* (E). *Restard ipocacunha* (D). *Ipecacuna de Antille* (I).

بجلة عمرة تَعْلُو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اورثاها سنائية النصل تَعْلُو من ٥ الى ١٠ سم. ويغرس من ٢ الى ٤. ازهارها صوانية التجميع، حامية الارزكاز، وردية اللون او حمراء. ازهارها يشتر من سزيران الى ثشرين.

## ١٦٣٩١ - صَفَلابِيَّات

*Asclepiadaceae* (S). *Asclepiadaceae* (F). *Asclepiadaceae* (E). نصيلة نباتية من ذوات الفلقتين تشمل الصقلاب والبلغ والعشر والشقفة والشراشيف واليديد الخ.

## ١٦٣٩٢ - صَفَلاب \*، صَفَلاب

*Cyclops* (S). *Cyclope* (F). *Cyclope* (E). جنس ذويات مائة من القشريات الدنيا مجليات الارجل نصيلة الصقلويات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق ودعان البلاد الباردة والمعتدلة الحارة. اجسامها سكية التركيب تَعْلُو من ٤ الى ٧ سم. وزوجها ملتصقة بالحلقة الصدرية الاولى. حويها متعاطسة فيقها الفاخر اليها حيتا واحدة. بطونها جرابية الشكل. قوائمها ثنائية للمادف باستثناء الزوجين الاول والسادر. الاولان تراوح من الثيرة الكفية الى اللقطة والمعلقة البحرية للمزج.

## ١٦٣٩٣ - صَفَلابِيَّات

*Cyclopidae* (S). *Cyclopidae* (F). *Cyclopidae* (E). نصيلة ذويات مائة من القشريات الدنيا مجليات الارجل.

الذويات. انواعها المعروفة ستة احاطها البلاد الباردة. تألف الحراج. قوتها الاضرار اولا ثم التطور. اجسامها صنية القد، شبه ييشية الشكل، زبداء القشور دبوية الزباني. اولها سوية الالوان الزاهية يعطوا في كولها زوج او زوجان من النقط السود.

## ١٦٣٨٩ - صَفَرِيَّات

*Falconidae* (S). *Falconidae* (F). *Falconidae* (E).

فصيلة طير من قسم الصقور تنتمي الى فئة كواسر النبار وردية الحواج. تقبل ٦ عمارات وزها ٢٠٠ جنس ونوع. تتميز باجسامها الربية المسنونة التجانس الشكل. رؤوسها متوسطة الحجم كاسية الريش. حويها نائضة، شهلة، عجمرة داخل اورثاها الباردة الحليج. امتها قصيرة. ساقها كبيرة وارة. مناسرها قصيرة تتميز بمطاطها اللوية المسنة الاطراف. جهادها شديدة الانسلاف، حادة المحاجن. ارضها متوسطة الطول تغلب فيها السرولة ومنا حارية. غالبا ذرية قوية متغنية. انثاها في معظم الاجناس اكبر قدأ من ذكورها. تقتصر السيد وتقلل حرك بمخالها. تعيش ازواجا او افراد لا يجمعها سوى فطرة الانضمام الى الرصيل في الانواع القرواط. وهي تشمل، برون ريب، اجسر الطيور وانها خلفا واقلها سكية واصليها عودا. اما عماراتها الست فهي: العيقان والهداء، والمغرد والمزاة والسقاوات والمزيات.

## ١٦٣٨٤ - صَفَلاب \*، صَفَلاب

*Scatopse* (S). *Scatopse* (F). *Scatopse* (E).

جنس حشرات من فصيلة الصقلويات وردية ذوات الجنان. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القار العالم. اجسامها صغيرة تَعْلُو من ٢ الى ٥ سم. وزوجها صنية مزوانية الشكل. حويها فاقية منه الشقين. مرافها قصيرة. ملابسها ريشة الغلة. قرونها الاستشعارية نحلة وقصيرة. كولها احليبية يعطوا حل قصير. بطونها مستقيمة الظهر، مستقلة الطرف المستطير. رؤوسها كبيرة، قسطانية التضيق. قوائمها مستطيلة، عادمة الحلب والمناس. ملجسها الحايي كرمجي. تألف الاماكن الربة. يكثر وجودها على الاحشاب والازهار. اسارها نائلة او داسة.

## ١٦٣٨٥ - صَفَلابِيَّات

*Scatopidae* (S). *Scatopidae* (F). *Scatopidae* (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجنان. اجسامها وازهاها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم. جميعها داسة او نائلة. تألف الذنات والحراج والحدائق والمزارع اربعة اجسامها صغيرة، تَعْلُو من ١ الى ٩ سم. رؤوسها مفلطحة. حويها كلبية الشكل. مرافها وملاسها قصيرة. قرونها الاستشعارية نحلة قصيرة. كولها احليبية. بطونها شبه مدنية الشكل. رؤوسها قسطانية التضيق. قوائمها مستطيلة. يرقاها داسة او نائلة. اشهر اجناسها الصقلويين.

## ١٦٣٨٦ - صَفَلاب

*Asclepias* (S). *Asclépiade* (F). *Asclepias* (E). جنس نباتات برية وريزية من نصيلة الصقلويات. انواعها عديدة. جميعها جنات ومجلات واحشاب متغابة الاوراق الكاملة. ازهارها طبقية التجميع اطية او حامية الارزكاز. يزورها مفلقة زغب نام اليقة قصيرها شبه الحرر. اشهر انواعها ما يتبع.



صقلاب سوري



صقلاب حقولي



صقلاب مدسي



صقلاب مدسي

**Detrictidote, Detrictidphage (F). • صككام • ١٦٤٠١**  
Detritophagous (E).

صفة الحشرة التي تعيش على التفاتيات العضوية من أي مصدر كانت .

**Naja (S). • كوبرا • ١٦٤٠٢**  
Naja, Cobra (F). Cobra (E).

جنس حيات خبيثة من أفاعيل الأفاعيد . أنواعه المعروفة عشرة ، سمة منها أفريقية المهد وثلاثة آسيوية ، أولها إلى القشقة يطولها تحطيط أسمر ويقلع أصفر . أجسامها عادية الشكل طولها يختلف مع النوع وهو يراوح ما بين ٨٠ و ٤٥٠ سم . تتميز بأعناقها المبطلة المستمرة التي تنتفخ عند اللفظ || جميعها سامة لدغتها بحيث لا تنفخ نها الرقبة لأنها سريعة الطب والتفشي || أشهر أنواعها ما يتبع .

**١٦٤٠٣ - صيل "أسود العنق" و "حج" •**  
Naja nigricollis (S). Naja à cou noir (F).

نوع من الصل يكثر في بعض مناطق أفريقية الشرقية اعنيها أريتريا والصومال . ثوبه إلى القشقة المبطلة بالأصفر والأسمر . عنقه أسود ، رأسه أخضر أسمر . لسته ميتة .

**١٦٤٠٤ - صيل "الصحراء" •**  
Naja melanoleuca (S). Naja du désert (F).

نوع من الصل موطنه الصحراء الكبرى وأفريقية الاستوائية . ثوبه إلى الصبغة المخططة بتجلمج أصفر . لسته قتالة .

**١٦٤٠٥ - صيل "النوبة" •**  
Naja flava (S). Naja du Nubie (F).

نوع من الصل يكثر في النوبة والسودان ثوبه إلى الصبغة النابية يطولها تجلمج أسمر . لسته ميتة .

**١٦٤٠٦ - صيل "مصري" •**  
Naja, Asp. d'Egypte, Serpent à colles (F). Egyptian cobra, E. asp. (E).

نوع من الصل يكثر في البلاد المصرية . لسته ميتة . وقد اجمع المحققين على أن هذا النوع من الصل هو الحية التي كان يقسمها قدام المصريين وهو الحية التي اختارها كليوباترة القضاة على حياتها .

**١٦٤٠٧ - صيل "هند" •**  
Naja tripudians (S). Naja à lunettes, Serpent à lunettes, Cobra indien (F). Indian cobra (E).

نوع من الصل يكثر في الهند . لسته قتالة . يقال أن عدد ضحاياه المقتولة السنوية مع الصل الحثي ، لا يقل عن ٢٥٠٠٠ نسمة معظمها من الأولاد والرعاة .

**١٦٤٠٨ - صيل "هندي" •**  
Naja bungarus, N. hannah, N. morgani (S). Naja de Perse (F). Persian cobra (E).

نوع من الصل موطنه من الهند إلى بلاد فارس . يألف المناطق الحارة الرطبة . يطول نحو ٤٥٠ سم . قوته الانامي والقتال والفساد . ثوبه إلى القشقة المنقطة بالأصفر يطولها بعض التفرخ الصغير . سمه شديد الفعالية سريعها . لسته تقضي على الثور بطرف ثلاث دقائق .

**١٦٤٠٩ - صلاكة •**  
Dureté (F). Hardness (E).

خاصية مقاومة الصخر للشدش .

اجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في مياه البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || اجناسها شديدة الصغر ، سمية التركيب . الزوج الانامي من قوائم الذكور ، عند جميع الأنواع ، يمشي للثوزن ، أعلا || أعراف اجناسها وأشهرها المقلوب .

**١٦٣٩٤ - صككود •**  
Cincloides (S). Cincloide (F).

جنس طير من الطيور ريشات المنائر وصبغة الطيوريات . أنواعه المعروفة نحو ٣٥ منتشرة في معظم أقطار أمريكا الجنوبية || اجسامها ريشية تطول من ٢٠ إلى ٢٤ سم . مناقبها مستطيلة دقيقة . أظفارها مستديرة الأطراف . أولها صباينة الألوان ، جميعها مكحلة العين ، شبه مبطلة الاعتقال ، مرقوشة الصلور || قوتها الحشرات والبهائم والقتل .

**١٦٣٩٥ - صككور •**  
Falconiens, Faucons (F). Falcors (E).

عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل سبعة اجناس : الصقر والسفر والكنيع والساوق والزلزير والكمم واليومي . أما أنواعها فكثيرة العدد جميعها ريشة الجنية المنصبة اللند . أعناقها قصيرة . سواقلها كبيرة مستطيلة ذلقة . مناسرها قوية سلة الخاطم ، بهارها شديدة الانتفاخ . أرساها متوسطة الطول . غالبها عارة ذرية . مهدا الما تجوبه أو تلد في بعض أصنافه . حي من أضل طير الصقريات . طير بسرعة فائقة تحلق في الأجواء الرقيقة وتتقش كالسهم . تصيد مع الصباح ومنه الغروب . قوتها الطير والطيوريات وصائر الحيوانات التي تتسكن منها .

**١٦٣٩٦ - صككولين •**  
Secouline (S). Secouline (F).

جنس دويبات بحرية من القشريات الدنيا جندويبات الغرويس || أنواعها المعروفة قليلة العدد تتطفل على السرطان وغيره من القشريات .

**١٦٣٩٧ - صككي •**  
Masua (F). Club (E).

لست صيني يطلق على ما كان شكله كالصنق .

**١٦٣٩٨ - صككج •**  
Froidure (F). Coldness (E).

هو البرد البسي الذي يبيه خاصة صرد الهواء .

**١٦٣٩٩ - صكككة •**  
Parscaryum (S). Parscaryum (F).

جنس نباتات عشبية معمرة زيا من فصيلة الحمصيات . أنواعها المعروفة قليلة العدد اصطناعا تمتد من الشرق الأوسط إلى الهند || سواها كيفية الخمل والريز تطول من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أولها الجذرية قليلة الشكل ، سنانية الأطراف . أولها الجلمية يبيضه الشرنق . ازهارها متباين الأشكال منه المتقوي والشكوي . ازهارها عديدة الألوان يكثر فيها الأحمر والأزرق || أعراف أنواعها وأشهرها الصفيقة المستنوية المنقضية الازهار الزرقاء البين والصفيقة الكشميرية المشكولة الازهار الازرقالية || تنموها صيني يستمر من حزيران إلى تموز .

**١٦٤٠٠ - صكليل •**  
Liophyle (F).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات أولوه مالة اتصال .



صككود



صل مصري



صل هندي



صلص



صلب



صلبالية بحرية



صلبالية مرودية



صلبة



صلصل الحبيشة

## ١٦٤١٨ - صَلْبَانِيَّة مَرُودِيَّة \* ، صَلْبَانِيَّة مَرُودِيَّة ، حَقِيقَةُ الصَّلْبَانِيَّة المَرُودِيَّة

*Crucianella stylosa* (S). *Crucianella à long style*, *C. stylée*, *Croissette* (F). *Crosswort* (E). *Kreuzblatt*, *Kreuzkraut* (D). *Barbette*, *Pitcimbrosa* (I).

عشبة مسمرة تنمو بين الصخور وتكون من ٣٠ إلى ٦٠ سم. ساقها غرواء خالية. أوراقها خضراء تتجمع، سنائية الشكل. سنبها طويلة من ٨ أوراق متصالية. أزهارها وردية اللون ثوبية الرائحة || أزهارها يستمر من أيار إلى آب.

## ١٦٤١٩ - صَلْبَانِيَّة

*Scléroscia* (F). *Sclerotic* (E).

هي نباتات صلبة.

## ١٦٤٢٠ - صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة ، حَقِيقَةُ

*Rapport, Relation* (F). *Connexion, Product, Relation* (E).

تتضمن نسب وتنتج البيان للمرض.

## ١٦٤٢١ - صَلْبَانِيَّة \* ، صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة

*Cocoon* (F). *Cocoon* (E).

فساد واق عكس البدن حروري للمادة لتتجسم بعض الأسرار ككودة القز ليبدأها وتحولها إلى غادرة.

## ١٦٤٢٢ - صَلْبَانِيَّة

*Corbicula* (S). *Corbicula* (F).

جنس حيوانات مائية من الرضيات صليجات الخياشيم والأرجل بين فصيلة البيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ١٠٠ بعضها نهري وبعض الآخر بأف الأنهار في جميع مناطق البلاد الحارة || أصله مشتق من البحر أو صليبة ، شبه قذبة الشكل ، مقعرة القعر ، ثنائية الألوان ، مشاة بالأخضر أو البني. مخاطها ثنائية طبقة معتلة اللون. تنشط منقوعة في الأسماك.

## ١٦٤٢٣ - صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة

*Argile* (F). *Argile* (E).

الصصلال العفوف ، صخر طيني مركب من صليكات الألويسيوم ، حبيباته دقيقة متجانسة ، يتميز بشدة لزوجه عند التبلل وبهشكته وصلابة ذراته. وهو إذا كثرت نسبة في التراب صيره متصفاً صلباً || يوجد في الطبيعة عموماً باكسيد الحديد وأكسيد التنتزيم وغيرها || يستخدم في صناعة الآلات الكرفية. منه الصصلال الترابي الخالي من المواد القلوية والجيرية يستعمل في تجسين الآجران الكهري لانه يتحمل الكثير من درجات الحرارة العالية.

## ١٦٤٢٤ - صَلْبَانِيَّة

*Calamin* نوع من الصصلال يتميز بيباض لونه وبقلة المواد الثرية التي يحويها وهو دقيق الذرات اللزجة المتكاثرة. يستخدم في صناعة الآلات الخزفية.

## ١٦٤٢٥ - صَلْبَانِيَّة

*Argileux* (F). *Argillaceous* (E).

من التراب ما سوى التربة الكليكية من الصصلال.

## ١٦٤٢٦ - صَلْبَانِيَّة الحَبِيشَة

*abyssinica* (S). *Colombier d'Abyssinie* (F).

طائر من الصصلال وفصيلة الحماميات. أشباه تنمي صليقة. طولها نحو ٣٣ سم. ظهرها أخضر زهري ، بطنها أصفر ، رأسه وفتحة صدره إلى الخلف الرمادي. جناحاه إلى السواد الأصفر الأظفار. أنثىه لبيد الانتفاخ وإزلام الأول والثاني ، فهي الثالث والرابع || موطنه الحبشة

## Colomban (F).

جنس طير من الحماميات. أنواعه أربعة تتميز بأجناسها الزهرية وبشكل طيرانها. أنثاها تحفلة الألوان الزهرية ، يكثر فيها الأخضر الأسفح المزاج || أشهر أنواعه صصلال الحبشة ، أطله.

## Eau trouble (F).

*Amande* (F). *Karnel* (E).

هو لب التوت واللوزة.

## Sphaerium (F).

*Sphaerium* (E).

جنس حيوانات مائية سرولوية من الرضيات صليجات الخياشيم والأرجل ومن فصيلة البيرينيات. أنواعه المعروفة نحو ٩٠ أصنافاً أهر وبجيرات وأحواض المناطق الحارة والمعتدلة الحارة || أصنافها ثنائية الأقسام والأشكال يكثر فيها الإلهيليقي الثاني. القشرة. جميعها مسطوية المستطير. مخاطها ثنائية ، طبقة ، صليقة أو معتدلة الطول || تعيش منقوعة في الأسماك. لهاها كافة الصفات.

## Chapcia (S).

*Chapcia* (F). *Chapcia* (E).

جنس طير من الجوارث نباتات المتأخرات وفصيلة الكروكيات أنواعه المعروفة ثلاثة مرتبها بعض مناطق الهند وفرموزة || مسرهمها الغابات. ملجها الحياتي زويي. قوتها الحشرات والديدان || أجسامها طول من ٣٠ إلى ٣٢ سم. أنثاها إلى السواد الخفيف المزاج أو إلى السواد الغريب بالأخضر. ولونها عامرة المتنازع ، خفيفة السبال. أثنائها مستطيلة غائرة || تدعى أعضائها في البحار الأولية الفلر. الأنثى تحضن رطلها من ٣ إلى ٤ بيضات بينا الذكر يؤمن لها الغذاء والحماية || أشهر أنواعه الصلب الأسفح الذي يكثر وجوده في الهند (*Chapcia acnea*).

## Sempe (F).

*Sempe* (F).

صكة بحرية لحمي بشفة خضراء ، أطله.

## ١٦٤١٩ - صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة ، صَلْبَانِيَّة ، حَقِيقَةُ

*Crucianella* (S). *Crucianella* (F).

جنس نباتات عشبية ليفية برية من فصيلة الفوفيات. أنواعه المعروفة ٣٦ منها حوض البحر المتوسط وأوردة الغربية. أوراقها خضراء متصالية. أزهارها حلقة تتجمع ، توضعها خامة الفصوص ، وأعضائها تشبه التوت || يقال إن لبعض أنواعه منافع صليقة ، تليق الأسماء وتلتظ الحشم || أعرف أنواعه ما يلي.

## ١٦٤١٧ - صَلْبَانِيَّة بَحْرِيَّة \* ، صَلْبَانِيَّة بَحْرِيَّة

*Crucianella maritima* (S). *Crucianella maritima* (F).

*Senside crosswort* (E). *Pilberwurzel*, *Saeröte* (D).

*Robbia delle sabbie* (I).

عشبة مسمرة تكثر بين الصخور قرب الشواطئ البحرية. ساقها غرواء متضبة ، فروجها لغيفة الانتفاخ ، خلية السواد. أوراقها خضراء متصالية ، سنائية الشكل ، متفردة الطول ، متصلها عشرين الملسس ، بحري اللون ، أزهارها أبيضانية ، ثوبية الرائحة || أزهارها يستمر من أيار إلى تموز.

بعدة البحر يقال انها تبصر البوصة على بعد مئة متر .  
قوتها اللذباب والبوص والحوام والنمل المنج ومظم الحشرات  
الصفيرة || تقيم وكناتها في اقواب الصخور الطليقة .  
ركيزتها الرقيق الذي تفرزه يلفصق بالصخر ويجمد بسرعة .  
وكناتها فيه حلالية الشكل . اناثها تضع من بيضتين الى  
ثلاث بيضات تحضنها نحو اسبوعين || اعرف انواعه  
واشهرها الصلجان البيلو .

### ١٦٤٣٤ - صَلْجَان صَبْلُول

Colocalia nidifica (S). Salangane commune (F).  
Common salangane (E).

طائر من الصلجان . موطنه جزر الزانج وبعض مناطق  
آسية الجنوبية . يألف الحوارق والحادس الثانية || جسمه  
صغير القد اعين القوام ، يطول نحو ١٣ سم . بسطة  
نحو ٣٠ سم . توه الى الطلعة يسر في الرأس والظهر  
وبعض من الصدر والبطن والذني . جناحه وذني رقة زائقة  
الى السحرة السوداء . ذنيه فارقة الطرف . عيناه كبيرتان .  
سفلة عينه سوداء اللون . سباله مستدلة الكثافة والطول .  
متقاربه شديد القصر ، مستعرض الشفق ، اعقب الهرة  
كما في الطيور الجارحة . ريشه قصيرة ، عارية ، حمراء  
الون || طيرانه فائق السرعة . قوته الحشرات الصفيرة  
واللذباب والبوص والحوام || يقيم وكته في اقواب الصخور  
الطليقة . وكته حلالي الشكل والتقدير يشبه بالريق  
المزوج بالطحاب البحرية والفصوص والافنة . الاثني  
تضع من بيضتين الى ثلاث بيضات تحضنها رسدا نحو  
١٤ يوما بيتها الذكر يلين لها الغذاء || وفي الصين ويجزو  
الزبانج يتاقنن على اكل وكنات الصلجان ، مطبوخة  
او مسلوقة ، لانها شايقة لا مؤذية .

### ١٦٤٣٥ - صَلْجَ Pack (F). Pack (E).

الصلوج كلمة ضخمة من الجلبه العالم المتراكم المالح الحام  
قرب القطب الشمالي .

### ١٦٤٣٦ - صَبْلُول هو السلور ، اطلبه .

### ١٦٤٣٧ - صَلْبِي البَحْر

هو كوكب البحر ، اطلبه .

### ١٦٤٣٨ - صَلْبِي الْجُثُوب ، نَعَم

la Croix du Sud (F). the Southern Cross (E).  
صلب الجنوب ونعم اسمان لكوكبة نجوم واسعة مركزها  
الجنوب فيها اربعة نجوم مزدوجة وضادة ونجم مثلث من  
المرتبة الثانية يسمى « ثير نيم » .

### ١٦٤٣٩ - صَلْبِي الشَّال

Croix du Nord (F). Northern Cross (E).  
صلب الشمال مجموعة من ستة نجم تلاصق كوكبة الدجاجة .

### ١٦٤٤٠ - صَلْبِيَكَة

Sclerite (F). Sclerite (E).  
الصلبية ثيملة جامدة في هيكل الحشرات .

### ١٦٤٤١ - صَلْبِيَّ

Crucial, Cruciforme (F).  
Cross-shaped, Crucial, Cruciform (E).  
حل شكل صليب .

وسائر افريقية الشرقية والوسطى . يعيش اسراباً صغيرة  
برايح عددها من ٢٠ الى ٣٠ . يألف النابت والاحراج .  
قوته القار والحروب . يذثن عنه في تجاويف الاجمار .

### ١٦٤٤٢ - صَلْفَاة (S). Cirrocaethis (F). Cirrocaethis (E).

حيوان بحري مفترون وحيد الجنس والنوع من الرعويات  
وفصيلة الصلفاحيات . اصطناع بحار البلاد الباردة اصنها  
بحار الشمال || جسمه بيضي الشكل . زصانته ضيقة  
مستديرة الاطراف . رأسه مستعظم الجرم يحمل ثمانية  
جرامز عظمية ، متساوية الطول ، مجزوة نصف واحد من  
الحامس . جرامزه واسطحتها عند انتشارها تشكل قمماً كبيراً  
قاعته القم .

### ١٦٤٤٨ - صَلْفَاة حَيَات (S). Cirrocaethidae (F). Cirrocaethidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات ورأسها الارجل  
مزدويات الخوصم . ثمانيات الجرامز || لها جنس واحد  
معروف حتى الآن يسمى صلفاثة .

### ١٦٤٤٩ - صَلْفُوم (S). Glycymeris (F). Glycymeris (E).

جنس حيوانات بحرية من الرعويات صفحيات الخياشيم  
وفصيلة الصلفوميات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها  
كبيرة مستطيلة المنحاط . عتية الاصماف المخشعة من  
الطين . اصمافها فيه بيضات الشكل ، مستديرة التحزيز  
الخفيف || تعيش منفصة في الرمال قرب الشطوط ||  
لحمها مأكولة .

### ١٦٤٥٠ - صَلْفُومِيَّات (S). Glycymeridae (F). Glycymeridae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرعويات صفحيات الخياشيم  
اجتمتها وانواعها المعاصرة المعروفة متوسطة العدد ، منتشرة  
في معظم بحار البلاد المعتدلة الحارة || تتميز بفصاها  
المستطيلة وباصمافها الصلبة المتفربة من الطرين || اعرف  
اجتمتها واشهرها الصلفوم والسكبيك .

### ١٦٤٥١ - صَلْفُون

هو الخلج من النباتات العلية ، اطلها .

### ١٦٤٥٢ - صَلْبَانْج ، صَلْبَانْج

هو الاقنيس ، اطله .

### ١٦٤٥٣ - صَلْجَان (S). Colocalia (F). Salangane (E).

جنس طير من فصيلة الباميات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد جميعها من طيور الصين والهند وجزر الزانج . تألف  
المواضع الرقيقة الكثيرة الامات والصخور || اجسامها  
صغيرة القد ، وشيقة القوام هيفاء . اجتمتها ذلقة غارقة  
الطول ، اطول قواعدها الثانية . اذناها فارقة الطرف ،  
عشارية القرائ . عيشها كبيرة . سبالها مستدلة الكثافة  
والطول . متاقنرها بالغة القصر ، مستعرضة الاضلاع التي  
تحمل في وسطها . تحت رباط اللسان ، جيماً وصيماً  
يحتوي كية من الحشرات والحوام . اغابها قصيرة ،  
عارية ، حمراء اللون . اصامها نطيقة . غالبيتها متفربة ،  
مقبضة ، حادة الاطراف || طيرانها فائق السرعة . وتضمن



صلفاثة



صقلوم



صلجان بيلو

## ١٦٤٥٠ - صليبيات \* Aleopcephalus (S).

Aléopcéphale (F). Aleopcephalus (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الصليبيات. انواعها المروقة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة. جميعها لينة تعيش في الاعماق التي يراوح غورها من ٦٠٠ الى ٣٥٠٠ م. تحت سطح الماء. اجسامها مستطيلة مضيئة. تتميز ببروسها الرماطة الباردة الخرافش. اشهر انواعها صليبة المتوسط (Aleopcephalus rostratus).



صليبة

## ١٦٤٥١ - صليبيات \* Aleopcephalidus (F).

Aléopcéphalidés (F). Aleopcephalidés (E).

فصيلة اسماك بحرية من مفتوحات الخياشيم. اجناسها المروقة خسة اما انواعها فضيلة. جميعها لينة تعيش في الاعماق البعيدة للبحر ولا تقترب من الشاطئ الا في زمن الترسد. جميع اجناسها مستطيلة الاجسام مستطيلة الرؤوس الباردة الخرافش.

## ١٦٤٥٢ - صليبيات \* Cyanocorax chrysops (F).

Cyanocorax à capuchon, Cynurus à capuchon (F). Cyanocorax chrysops (E).

طائر من فصيلة الثريان. اصابته معظم مناطق امريكا الجنوبية. يألف الغابات والاسراج المبعثرة الاشجار. قوته الحشرات والفراخ والبروزر. اجسامه مستطال القدر بطول نحو ٤٠ سم. وله سم القطن والفرور الى السواد المايل يمتلئ به حمار العين الأزرق. ظهره ورجلاه وذنبه الى الزرقة الجميلة الملبقة بالابيض. حشوته وبطنه وانيته الى البياض الناصع. يدق عنده في الاشجار الرقيقة. الاثنان تحضن من ٣ الى ٤ بيضات بيضا الذكر ولين لها الفداء.



صليبة

## ١٦٤٥٣ - صليبيات \* Céryle (F).

هو الزراف الفاتح، اطبا.

## ١٦٤٥٤ - صليبيات \* Lathridium (F).

Lathridie (F). Lathridius (E).

جنس حشرات من فصيلة الصليبيات وبقية عمديات الاجنحة. انواعها المروقة نحو ١٥٠ اصنافا تنبت من اشرف الاقصى الى اطراف اوروبا. اجسامها صغيرة، قاطبة من ٢ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات صغيرة، ناعسة. قوتها الاستشارية قليلة. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. كولسلها وبطنها والحاداها فضلة. اتحادها لائحة، فسيحة القدم والفرور. اثنائها متباينة الالوان والاماجات. جميعها دامت تعيش في الجفافة والبردي النباتي وعلى الطحالب والفطور وتحت القشور والحاء.

## ١٦٤٥٥ - صليبيات \* Lathridiidae (S).

Lathridiidae (F). Lathridiidae (E).

فصيلة حشرات من عمديات الاجنحة. اجناسها وانواعها المروقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم. اجسامها شديدة الصغر طولها من ٢ الى ٣ م. رجليها غروبية الشكل. حبيبات بارزة. تأثيرها نظامية. ملابسها مستطيلة. قوتها الاستشارية بالغة الطول. مهدبة. حركتها ١١ فضلة. كولسلها فضلة. اتحادها لائحة. قوتها لينة. ارجاسها ثلاثية الشكل. جميعها دامت تعيش في الجفافة والبردي النباتي والطحالب والفطور. اشهر اجناسها الصليبة والفرور.



صليبة

## ١٦٤٥٦ - صليبيات \* Cruciferae (S).

Crucifères (F). Cruciferae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة الفصائل. اجناسها وانواعها كثيرة العدد. معظمها عشبي. اورثها متعاقبة. ازهارها نظامية رباعية الفصل والبتلات المتصالية. اصدانها سداسية، مغلفاتها ثنائية الكبريل، ثمارها غروبية. زهورها دقيقة زينة المادة. وهي تشغل الكثير من النباتات البتلية المشهورة بخواصها المضادة للحرق كالفلوف والجرول والبقيل والزباد والقررة والجرجير.

## ١٦٤٥٧ - صليبيات

هي الصليبية، نبات من الفصائل، اطبا.

## ١٦٤٥٨ - صليبيات \* Soliya (S).

Soliya (F). Soliya (E).

جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخياشيم. مهدبا بعض مناطق اسراليا. سوقها فناء تترقع من متر الى ثلاثة امتار. اورثها ابيدة، متعاقبة، كاملة. ستانية الاتصال الجلامدة. ازهارها عشوية التجميع، حلاج. ازهارها صغيرة القدر، مستطيلة الحاديق النسيمة. لها نومان ممروران الصلبة الحاذقة والصلبة الصغيرة الزهر.

## ١٦٤٥٩ - صليبيات صغيرة الزهر

Soliya parviflora (S). Soliya à petites fleurs (F).

نوع من الصليبة. ساقها تترقع من متر الى ثلاثة امتار. اورثها متعاقبة، صغيرة الاتصال، جملة الحصار الاسمح الحلاج. ازهارها شبيهة الصغر. ثنية اللون. تنويرها صبغي.

## ١٦٤٦٠ - صليبيات \* Soliya heterophylla (S).

Soliya heterophylla (F).

نوع من الصليبة. ساقها تترقع نحو ٢٠٠ سم. اورثها جملة الحصار الاسمح الحلاج، نصالا حاذقة طولها من ٣ الى ٧ سم. وقرص من ٥ الى ١٥ م. ازهارها مستطيلة الحاديق. صغيرة القدر، ينفاء اللون. تنويرها صبغي يستمر طوال شهر تموز.

## ١٦٤٦١ - صليبيات، صوبجكة \* Argent pur (F).

Naked silver (E).

الفضة الصلابة الخالصة.

## ١٦٤٦٢ - صليبيات \* Cardilla (S).

Cardille (F). Cardilla (E).

جنس حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وفصيلة الصليبيات. انواعها للماصرة المروقة قليلة العدد اصنافا مجامع البحر الاحمر والخليج الهندي. اصدانها شبه لينة الشكل مهدبة، ملوكة اللون المكورة. تعيش لاصفة بالصخور قليلة السمق. لفتها كليف المائدة قليلها.

## ١٦٤٦٣ - صليبيات \* Cardillidae (S).

Cardillidae (F). Cardillidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرنوبيات صليبيات الخياشيم وانواعها للماصرة المروقة قليلة العدد جميعها جنس واحد. اصدانها شبه قبية الشكل، مكورة اللون اللينة. اجسامها صغيرة وطعامها كلاك. صمغياتها كثيرة في الاراضي المائية.

1٦٤٦٧ - صَمْعُر \* Mesodesma (S).

Mésodesme (F). Mesodesma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة الصمريات. أنواعها المعاصرة المروفة نحو ٣٠ منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || أجسامها صغيرة قصيرة الخياشيم. أصدافها عديمة الشوئن أو بيضية. تعيش لاسقة بالصخور القريبة من السطح.

1٦٤٦٨ - صَمْعُورِيَّات \* Mesodesmatidae (S).

Mésodesmatidés (F). Mesodesmatidae (E).

صفيحة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم أجسامها المعاصرة المروفة قليلة العدد جميعها صغيرة القد ، بيضية الشوئن أو عديمة. تتميز بقصر خياشيمها وبسفر أرجلها الشديدة التطيل || أشهر أجناسها الصمسر .

1٦٤٦٩ - صَمْعُور \* Haplocerus montanus, Orsannus montanus (S).

Haplocère montagnard, Orsanne montagnard (F). Orsannus of Kennedy (E).

حيوان لبنى فلبج مجتر وحيد الجنس والنوع من ذوات الأضلاع ، عجوزات القرن. موطنه الجبال الريفية النائية وبعض الأضلاع النائية ومنها ألسكا || جسمه صغير القد وبضعه بطول نحو ٨٥ سم. ويرتفع نحو ٥٥ سم. قرنيه بطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. رأسه مع العينين والأذنين والقرنين كراس الخيل. جسمه كبش الماعز. أذناه مستقيمة الأطراف. حياته وقرباه إلى الأسود الحالك. شعره مستطيل يغطي كامل الجسم. لونه الأبيض الناصع. فرع الإنثى ثلاث الخلف. يحملها يقوم نحو ستة أشهر تضع عنه ثمانية بطورا واحدا || أجله قليل البدن إلى في فصل الشتاء الذي يستمر من تشرين الثاني إلى أواخر آذار.

1٦٤٧٠ - صَمْعُوم \* Gomme (F). Gum (E).

مادة لزجة داكنة عديمة الطعم والرائحة تفرزها بعض النباتات إما طيبيا أو رائحة حالة مرضية. لذلك فالصمغ طينة الأشكال ، خلطة التركيب وهي تقسم عادة إلى قسمين : قسم الصمغ القابلة للذوبان في الماء. وقسم الصمغ التي تنحصر الماء. أشهرها الصمغ العربي الذي يستخرج من السط وهو شائع الاستعمال ويدخل في معظم المستحضرات الطبية الخاصة بأمراض الجهاز التنفسي.

1٦٤٧١ - صَمْعُ الدَّهْن \* هو الطليق الآخر. اطلبه.

1٦٤٧٢ - صَمَل \* Durclir (F). To harden (E).

عمل لشجر : لم يجد رأيا ففعل.

1٦٤٧٣ - صَمَل ، أَبُو الْهَوَكِ \* Sphinx (F).

Hawk-moth (E).

جنس حشرات من فصيلة الموليات ، أنواعه نحو ٦٠ منتشرة في جميع الأضلاع المالمة. معظمها من الفراشات الصغيرة المتوسطة الحجم أو الكبيرة. أجسامها مرفوعة الشكل. وراشها كبيرة مزعزعة. قرونها الاستشعارية قلادة. برقاتها كبيرة القد ، مرطبة الجسم. عاداتها عادية || أشهر أنواعه الاقتصادية التي تركب النبات ما يتبع.

1٦٤٧٤ - صَمَل الحَذَائِقِ \* Sphinx ocellata (S).

Sphinx demi-paon (F).

فراشة كبيرة القد خيلطة الجسم ، طولها نحو ٤ سم. قرونها

1٦٤٥٦ - صَيَاخ الأَذْن \* Conduit auditif (F).

Cavity of the ear (E).

قناة الأذن التي تشكل صلة الوصل بين القسم الخارجي والداخلي.

1٦٤٥٧ - صَيَاخَة \* Hélicotropleme (F).

Helicetris (E).

أثر اتجاه الضوء في انحناء التنبؤ الثاني. لذلك فهو يسمى إيجابيا عندما يكون التنبؤ باتجاه الضوء وسلبيا عندما يكون في الحالة العاكسة.

1٦٤٥٨ - صَيَاخَة ، صَيَاخَة مَبْدُولَة \* Picaret commun, Gerret (F).

سكة بحرية تسمى شائعة مبلولة ، اطبا.

1٦٤٥٩ - صَيَام \* Soupepe (F). Valve (E).

1٦٤٦٠ - صَيَان \* Allos (F). Pan (E).

رأى من القرب صلب الهيكله نشطت صلاته بعض المواد الطرية أو أكسيدات البوليبيروم أو كربونات الكلسيوم أو ميروكسيدات الحديد.

1٦٤٦١ - صَمَك \* Sous-espèce (F). Sub-especies (E).

تأني الصمة في تصنيف الأسماء بين النوع والفرع وقد تشمل عدة غريب كان أن النوع يشمل بعض الصم.

1٦٤٦٢ - صَمْرَاخ \* Lutraria (S).

Lutnaire (F). Lutraria (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحيات الخياشيم وصفيحة الصمريات. أنواعها المعاصرة المروفة نحو ٣٠ معظمها من سطح البحر الأبيض المتوسط || أصدافها أحليجية الشوئن ، متساوية الصاريح لاشعورية الأضلاع ، غضة الصفة البيضاء الموضحة بالأخضر والآخر || تعيش منفردة في الرمال المعصورة بالأم. يكثر وجودها قرب مصبات الأنهر.

1٦٤٦٣ - صَمْرَان \* Penae (S). Pénée (F).

جنس نباتات جنينية برية من فصيلة الصمريات. أنواعها قليلة ، منها البلاد الحارة جميعها شائعة يستخرج من جذع طينا صمغية طرية تستعمل في العلاجات الخارجية لصحها الجروح. ويقال أنها تشبه الجمل وتزبل مجيئة.

1٦٤٦٤ - صَمْرَاكِيَّات \* Penescae (S).

Pénécées (F). Penescae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديمة الضمالات مرتفعة المبيض. أشهر أجناسها الصمران.

1٦٤٦٥ - صَمْرُورِيَّات \* صَمَك بحرية تسمى شائعة ، اطبا.

1٦٤٦٦ - صَمْعَاء \* Actus (S). Aote (F).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البذراريات وصفيحة القرنيات البذرارية. أنواعها قليلة جميعها جنات قرصه شائعة قليلة الأوراق الملطقة الشكل الصغيرة القد. أثمارها حلقة تاجية صفراء اللون ، ويقال لها ثنية الجروح وتقتني حل ملها.



صم



صمور



صم الحذائق





صَمَلُ الْحَوَرِ



صَمَلُ النَّحْلِ



صَمَلُ الْزَّرْنَدِيِّ



صَمَلُ الْمَسْتَدَانِ



صَمَلُ الصَّنوبرِ



صَمَلُ الْكِرْمَةِ



صَمَلُ الْكِرْمَةِ الْخَطَّطِ



صَمَلُ الْبِلَابِ

اسود. سيجفها وريدة المراج يطولها حصار بني ينهي  
عند الرأس. رواشها موشجة وبجعة || رقبها مستطيلة  
الشكل سمراء اللون تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول.  
تركب اذئاب جميع الصنوبريات.

١٦٤٨١ - صَمَلُ الْهَرَبَرِيَّةِ هو صَمَلُ الْبَرْدِ، الجلبه.

١٦٤٨٢ - صَمَلُ الْكِرْمَةِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَخْضَرِ  
*Pergesa elpor, Chamaecampa celery (S). Sphinx de la vigne (F). White-lined sphinx (E).*

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٢ سم. جسمها مردي  
الشكل، ثوبها الى الصبغة الصائبة السطاه المراج.  
رواشها موشجة بالاسمر والوردي الليلي، توضعها قلبية  
مفرغى. رواشها الاماميان مهملان بالمارق نقي || رقبها  
مستطيلة الشكل، شديدة الخضار تحمل حل جانيي رتبها  
الطنية بقما سود عيها اطار اصفر. تظهر في تموز وتبقى  
حتى ايلول. تركب اوراق الكرمة تفنيزها.

١٦٤٨٣ - صَمَلُ الْكِرْمَةِ الْخَطَّطِ، دَلِيلِيَّة

*Dalephila livornica (S). Déléphila de la vigne (F).*  
فراشة مجولة طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الصبغة السمراء،  
ونقط بطنها اربعة خطوط متوازية سيد وبض. رواشها  
موشجة مختلف الالوان يكثر فيها الاسمر || رقبها كبيرة  
القد خضراء اللون. تبيج ظهرها احر الخط يكتنفه من  
حل جانبيه خضلات اصفران يتخللها بقع سود نظامية تدنو  
جميع التراجيات. تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى  
اواخر آب. تركب اوراق الكرمة تصطبها وقد تدمر الكرمة  
من اوراقها اذا كثر جمعها.

١٦٤٨٤ - صَمَلُ الْبِلَابِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَلْفَقِ

*Sphinx convolvuli, Hiera convolvuli, Protoparce convolvuli (S). Sphinx du liaron (F).*  
فراشة مجولة تجوب البلاد. طولها نحو ٤ سم. ثوبها الغالب  
وبادي اللون. رقبها غسطة وبجعة بالاسود، ملقني تجديدها  
يكون رقم ٨ || تركب اوراق البلب والبطاطا وغيرها.

١٦٤٨٥ - صَمَلُ النَّحْلِ، جَالِيرِيَّة

*Galleria (S). Gallérie (F).*  
جنس ششرات من سرشنيات الاجنحة فضيلة الناريات.  
انواعها عديدة بعضها يتهدى حل حليا للنحل فيدخلها  
ويضع نكته حل ايتها استطاع فيخلف حل رقات دقيقة خمر  
سراويلها وانفاقها في النخاريب تصلف الرصع وتبريق  
الصل || اشهر انواعها الموزية اثنان: صَمَلُ النَّحْلِ الْعَسِيرِ  
وصَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ.

١٦٤٨٦ - صَمَلُ النَّحْلِ الْعَسِيرِ، لَكْرِيَّة الشَّمْعِ

*Gallerie alvearia, G. grisella, Melliphora grisella (S). Alveicole, Taïgne de la cire (F).*

فراشة من فصيلة الناريات صغيرة القد، كثيفة الحراشف  
طويلة الفراش، وبادية التوب تتقسم نحات وتلايا  
النحل حيث تحت مكنها حل النخاريب فيخلف حل رقات  
نهمة تفكك بالشمع وتغني حل الرصع والسمل.

١٦٤٨٧ - صَمَلُ النَّحْلِ الْكَبِيرِ، لَكْرِيَّة الشَّمْعِ

*Galleria cecilia, G. mellonella (S). Gallérie de la cire, Fausse-taïgne (F).*

فراشة من فصيلة الناريات كبيرة القد، كثيفة الحراشف

الى الصبغة الصائبة يطولها تجليج، اريد اللون. جنتانها  
حستلة. رواشها الاماميان مزخرفان وموحدان. رواشها  
الحطيان موحدان بالمرمة وتقلو كل واحد منها بقعة  
بيضية الشكل، سمراء اللون، يمشاه الحار الداعخل، سوداء  
الحضار الخاليي المستعرض || رقبها خضراء اللون،  
سوداء المتجديج تظهر في اواخر حزيران وتبقى حتى ايلول  
تشرن الاول. تركب اوراق جميع الانجار للشمرة، وقد  
شودت حل الصفصاف والحور.

١٦٤٨٥ - صَمَلُ الْحَوَرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمَوْشَجِ

*Amorpha populi (S). Sphinx du peuplier (F).*  
فراشة متوسطة القد، طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الحطلة  
القدراء. رواشها موشجة ومزخرفة بالاسمر والخطي والوردي  
والابيض || رقبها غبراء اللون، خضراء المراج، تظهر  
في اواخر حزيران وتبقى حتى ايلول. تركب اوراق  
الحور والصفصاف والبتولا.

١٦٤٨٦ - صَمَلُ الْفَلَقِي، أَبُو الْهَوَكِ الْمُبْجَجِ

*Daphnis nerii (S). Sphinx du laurier-rose (F).*  
فراشة مجولة تجوب البلاد. كبيرة القد، مريدة الشكل  
طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة الصائبة المراج يطولها  
تجيج ونوشج ومزخرفة وتزيين وتجليج. جملة الاشكال  
والالوان غلب فيها الاصفر || رقبها كبيرة القد خضراء  
اللون سمراء الظهر والمالب تظهر في اواخر تموز وتبقى حتى  
اوائل تشرين الاول. تركب اوراق اللؤل.

١٦٤٨٧ - صَمَلُ الْزَّرْنَدِيِّ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُسْتَعِ

*Himas ciliata (S). Sphinx du lilail (F).*  
فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. ثوبها الى الصبغة  
الخطية. رواشها مبهمة ومزخرفة بالايصر والاسمر.  
رقبها صغيرة القد سمراء اللون مجلعة بالاسود. تظهر في  
تموز وتبقى الى ايلول. تركب اوراق الزرنيخ والديدار.

١٦٤٨٨ - صَمَلُ الْمَسْمُومِ، أَبُو الْهَوَكِ الْأَسْمَرِ

*Acherontia atropos (S). Sphinx tête de mort (F). Death's head moth (E). Tockenkopf (D).*

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٥ سم. ثوبها الى الصبغة  
البنية يطولها تجليج متبرقي. سيجفها سمراء اللون يتوسطها  
فيه هيكل تملو جمجمة. رواشها غسطة وبجعة ومزخرفة  
يشي الالوان || رقبها في الطوارى الاول تكون خضراء  
اللون ثم تتحمر نحو الزرق. تخبز بطنها اسودين يركبان  
الرأس من جانبيه. طولها عند اكتمال نموها يبلغ ١٥  
خادتها تطول نحو ٥ سم. لونها الى القبي المايق || الخشرة  
الكاملة تقضم الخناس الضعيفة تقضم النخاريب وتلق  
الصل. اما البرقة فتركب اوراق السم والزرنيخ والبطاطا  
ومعظم نباتات الفصيلة الباذنجانية. تظهر ملدة في تموز  
وتبقى حتى تشرين الاول.

١٦٤٨٩ - صَمَلُ الْمَسْمُومِ الْيَاقَانِ

*Marumba quercus (S). Sphinx du chêne (F).*  
فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الاصفر  
التيبي. رواشها موشجة بالاسمر والوردي || رقبها مستطيلة  
الشكل حستلة اللون. تظهر في تموز وتبقى حتى ايلول.  
تركب اوراق السنديان حل اختلاف انوعه.

١٦٤٩٠ - صَمَلُ الصَّنوبرِ، أَبُو الْهَوَكِ الْمُرْسِي

*Hylocius pinastri (S). Sphinx du pin (F).*

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣ سم. جسمها صفالي اللون  
يسمره تجليج كشي ويقلبه خط حستلي يتوسطه سلك

**Bulbille (F).**  
**Bulbil, Bulbic (E).**  
اسم تعريفي يطلق على الزئمة الهوائية المحرقة الصلبة التي تظهر غالباً في ابط الورقة والتي يفصلها عن النبات الام وبزرها في التربة تنمو وتنمو.

**Elasmucha grisea (S).** **صموشة شهباء.**  
**Punalea grisea (F).**

حشرة من فصيلة القسايات. جسمها صغير القد ، مفلطح ، بجني اللون، بطول نحو ٨ مم. ثوبها الى الصفار البني تملوه شحمة ارجوانية وبشر اسمر ما يحمله اشهب الحاج. رأسها غروطي. خطمها مستد الطول. صينها صغيرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها قوي اللون. حقيقتها مدببة الطرف. ظهرها اغمر الكون. قدامها شفاف. بطنها الى الشبهه يملو في حثارة تجلجج اسود || مرملها اوراق الاشجار الحرجية واقرعها باستثناء السنوبريات || راملها كريمة .

**Somidia** **صميدة ك**  
تعريف عام يطلق على كل جسم مادي مركزه ضمن الخلية يتأثر بمجال الجين السببي .

**Scarleux (F).** **Scarlous (E).** **صمبل**  
نمت تعريفي يطلق ، في علم النبات ، على كل ما هو رقيق ، جليفي وشبه شفاف او مدغى .

**Amphilius (S).** **صميلة \***  
**Amphiliu (F).** **Amphilius (E).**

سمكة بحرية بيوض من شالكات الزعانف وصيلة الزناريات . موطنها عند من البحر الاحمر الى المحيط الهندي لقاهادي || جسمها مستطيل الشكل ، قليل المرض ، بطول نحو ١٦ سم. ثوبها الى الخضار البحري تملوه مابة فضية . رأسها صغير الحجم ، مستطيل الخط الاسفي الشكل . زينتها الظهيرة ذيلية الاركانز ، مستطيلة المنحس الطرفي . الحاد من ميئاتها انها تنفتح بضمها ، الانبوبي الطرف ، كتل الحوام الحامضة فوق سطح الماء لتضع فيه فتفترسها || عندها متوسط الصنف مأكلي .

**Thyrta (S).** **صميلة \***  
**Thyrta (F).** **Thyrta (E).**

حشرة من فصيلة الصمليات روية حشرليات الاجنحة . اصلها تشمل بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألف الموائع التي تكثر فيها الملمويات || جسمها صغير القد ، شبه اسطواني الشكل . يستط نحو ١٦ مم . رأسها مكور . صينها صغيرتان . زباناها مشطيان . خطمها مستد القد . ملامسها مستطيلة . اجنحتها مبطية ومدبجة . بطونها متكافئة السقف اللقيح . ظنايبها الخلفية رباعية المنحاس || سرقتها كثيرة ، لاهمة ، تعيش على وزن النصال وقد تحيل النصال الى لغانات شبيهة بالايواك .

**Thyrididae (S).** **صمليات \***  
**Thyrididae (F).** **Thyrididae (E).**

فصيلة حشرات من روية حشرليات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٩٠٠ منتشرة باكثريتها في المناطق الاستوائية من المابين القديم والجديد || اجسامها صغيرة ، صلبة ، شبه اسطوانية الشكل . يستطها تراوح من ١٥

البلية ، مستطيلة الراش الزركشة . ثوبها بني اللون تملو رقة سمراء . تقسم قنران التمل وتقع مكها على التناوب فينصف من رقات حاجية دقيقة لا تلت ان تكبر فيفسر فيها ويبلغ طول نحو ٣ سم. وهي تعيش كامل حياتها الحرة على شمع التناوب تنفض عليه .

**صنل الياسم \*** **أبو الحول المجعد**  
**Sphinx ligustri (S).** **Sphinx du croûble (F).**

فراشة كبيرة القد طولها نحو ٤ سم. ثوبها الى الوردي يتدرج بمجامع اسود ويغطي خط حطلي يملو سلك اسود . حقيقتها حطلية اللون تملوها جناة سمراء يحرقها حثار اسود . رواشها مزرقعة ومجلعة || رطلها كبيرة القد غليظة ، ثوبها الى الصفرة الخضراء يتدرجها تجلجج ابيض ونقط حر || تظهر في ايار ويبقى حتى اواخر حزيران . تركب اوراق الياسم والليلك والازدرخت .

**صنل البتروج ، صنل القريبون ، أبو الحول المخطط**  
**Calerio euphorbiae, Dellephila euphorbiae (S).** **Sphinx de l'euphorbe (F).**

فراشة متوسطة القد طولها نحو ٣٥ سم. ثوبها الى الريفية السمراء . رواشها بجيلة التخطيط والفتيح واقرعها البيض والخضر || رطلها سوداء اللون ، يضاء النشة النليقة ، صفراء النقط الارجية ، حراء الخط البنيجي القاطب ، صفراء الخط البني الجانيبي ، سوداء الملمب . تظهر في تموز ويبقى حتى ايلول ، تركب اوراق البتروج .

**صنل خيرون** **Sphinx empressé (F).**

فراشة من حشرليات الاجنحة لدى ابو الحول السببي ، اطلبها .

**صملاخ** هو "الآن" ، اطلبه .

**Amphideuma (S).** **صميلة \***  
**Amphideuma (F).** **Amphideuma (E).**

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صمليات التناوب وصيلة المختبريات . انواعها المعروفة حديثة منتشرة في سطر بمجر العالم . اصنافها شبه مستديرة الشكل ، قليلة الانحداب ، ثنائية المصارع ، وصيدة لورثالية الاستان الصغيرة . تعيش لاصقة بصخور المجامع المغمورة بالماء . لغتها قليل المادة والكتافة .

**صمليات ، هوكليات** **Sphingidae (S).** **Sphingidae (F).** **Sphingidae, Sphinx moths, Hawk moths (E).** **Schwärmer (D).**

فصيلة حشرات من حشرليات الاجنحة المخططات لزيان . اجناسها وانواعها زهاء ١٠٠٠ معظمها من القراشات اللدوية للمرح . اشتهر اجناسها الصنل .

**Myocetidium nobile (S).** **صمكيل \***  
**Myocetidae remarquable (F).**

نبات عشبي معمر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحمسيات . ساقه متعصبة زياء تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه لحمية كبيرة شبه قلبية الشكل تطلو من ٣٠ الى ٤٠ سم . نصلها بجيلة الخضار الزاهر . ازهاره متفويدي الجميع المتكاثف . ازهاره صغيرة الحجم ، زقاء اللون ، عادمة المرف || تنويره ديمبي .



صنل النسل الكبير



صنل الياسم



صميلة



صنبه



صميلة

### ١٦٥٧ - صِيَّات التَّبَع ، تَسَنَّة التَّبَع ، مِيلِيدُ التَّبَع ، عَفْلُولَةُ زَرْكَا

*Peronospora tabacina* (S). Mildiou du tabac (F). Blue-mold (E).

وصم فطري سريع الانتشار يركب التبغ فيضحي عليه وقد يصيب جميع التبرقع البرية والأزدينية والأفريقية || سببه فطر مجهري من الصنات بوله كروي الشكل، ظهر بأزوح ينظر من البعد إلى أبعاد شامة يتكاثر حيث يستطع الطفيل وسيت تلامحه البيئة || مظهره الخارجي على التبغ يتخذ خلية لينة لا نظافية تشبهت لملو بشره الناعم وصمته النسل الضيف تغير مزاج لونها من الأخضر إلى الأصفر فالوردي فالصناتي فالبنفسجي . وهو يسلط التسع والخلايا ويسبب ذبولاً ويبيها || نشأته يزودج إلى البيئة الرطبة المتفردة الخمراتين القصوى والدينا . وهو إذا أصاب التبرع في الماشات صلب الأوراق وأبانت الشتلات . وإذا أصاب الشتلات للبرسة في الحقل شوه أوراقها وأذبلها وحال دون النمو الطبيعي وقد يفضي عليه نفا إذا استمر كامل الأوراق .

يكافح وقتاً على الشكل التالي :

- ١ - بتغير مركز الماشات التي تظهر فيها الصنات أو بتغير تربة الأكواك إن حرارياً أو كيمياً .
- ٢ - بتطهير زرع التبغ بمطويع ملقات التحساس للركر ١٠ ٪ قبل استعمالها بمدة وبيرة .
- ٣ - باحتجاب البذار الكثيف وذلك باستعمال غرام واحد من البذر لكل متر مربع من الأكواك المشتل .
- ٤ - باحتجاب الزراعة في الأماكن الرطبة أو الظليلة .
- ٥ - بتخفيف كثافة الزراعة أي عدد الشتلات بالمتر المربع .
- ٦ - باستعمال الفطاطير الوقائية التي تمنع انتشار الرزم أو تحلل دون انتشارها . نفس منها بالأكرا الملقح والبرناب والبوليرام حل لاختلاف أشكاله وألوانها .
- ٧ - بطف شتلات الأكواك المصابة عند تفشي الرزم .
- ٨ - بثلث جميع الشتلات إن سلبه أو صابها فور الانتباه من قطرات الأوراق .

### ١٦٥٨ - صِيَّات الخشخاش ، مِيلِيدُ الخشخاش

*Peronospora arborescens, Botrytis arborescens* (S). Mildiou des papavéracées (F).

وصم فطري يصيب الخشخاش في جميع أصنافه المروية وفي جميع أطوار نموه من الإنبات وأشب إلى الإزهار والثمار || يركب الأوراق فيضحيها به أن يمجمها ثم يتوكم أخضرها إلى المصعة بالغة تملوها حمرات الشعر الحليمة ، الطعلا ، اللون ، البنفسجي المالح || وهو حل السوك يتخذ مستطيلة لا قياسية الحجم تنفر البشرة منه أن تفشي بمرسات الحليمة البرادية اللون || يكافح باستعمال احد مركبات البوليرام أو غيره من الفطاطير القاتلة .

### ١٦٥٩ - صِيَّات الشَّوْكَدَر ، مِيلِيدُ الشَّوْكَدَر

*Peronospora schachtii* (S). Mildiou de la betterave (F). Downy mildew of beet (E). Falscher Mehltau der Rübe (D).

وصم يصيب مشر الشوكدرة وولرته لفتية فيمنها عن متابعه نمواً أو يميل دونه فيضحي الأوراق للمصابة مشيرة . لقد ، شحوة الشكل ، بنفسجية اللون ، مريسة السلب . سببه فطر مجهري من الصنات مظهره الخارجي يقع لا قياسية

إلى ٢٠ م . رؤوسها شبه مكورة . حوزتها صغرة . قرونها الاستشعارية غطية ، ملاسها مستطيلة . أعطاشها كبيرة . بطونها متراكبة السهف الضيق . مرزاتها مستطيلة . اجنحتها مشرشرة الخطر ، عادمة التهديب . أثولها منزوعة || أساروبها كثيفة ، غاطيلة ، تموش ضمن لفافات من الورق بوقية الشكل || أشهر اجناتها الصيلة .

### ١٦٥٩ - صِيَّاتُ صِيَّاتُ

*Adenostoma* (F). جنس نباتات جنتية ممرعة من فصيلة الورديات . أنولها المهرقة قليلة العدد . سبها فرهاد . أوراقها ضمية التجميع ، شديدة الصغر ، صغرية الشكل . أزهارها عتقوي . أزهارها مستطيلة الكلوس ، خاسية البتلات ، خافتة العرف المستحب ، يضاء اللون أو صفراء .

### ١٦٥٩ - صِيَّاتُ

*Peronospora spinacea, P. effusa* (S). Mildiou de l'aspic (F). جنس فطور مجهري من عارة الورديات وفصيلة الصناتيات . أنولها عديدة تتميز بنمطها البروقية للفتية المستتابة الانفصال . أطرافها شحمية ، ثنائية ، لا متشعبة . متجمها عند المرشاش المتشعبة . تكاثرها غطوي وبغي . أشهر أنواعها وأضرها ما يلي .

### ١٦٥٩ - صِيَّاتُ الإِسْبَانْج ، مِيلِيدُ الإِسْبَانْج

*Peronospora spinacea, P. effusa* (S). Mildiou de l'aspic (F).

وصم فطري يصيب أوراق الإسبانج فيضحيها وقد يهيب تسبها || سببه فطر مجهري من الصنات مظهره الخارجي يقع لا قياسية الشكل ، منها المستديرة والبنيصة . ظهرها بأزوح بين ١٠ و ٢٠ م . تركب النسل في ولة أو عمده مرفقة فيضحي حل الصلصة البلى بتيج مرتفع عادم اللون يقابله حل الصلصة السفل تجويف خلل البشرة ، أحمل اللون ، بنفسي المالح || يكافح باستعمال احد الفطاطير القاتلة أعصها مركبات البوليرام || دون الصبح طرق الوقاية اجتناب الكثافة . والرطوبة .

### ١٦٥٩ - صِيَّاتُ البَرِّيَّة ، صِيَّاتُ الحَبَّابِ

*Peronospora viciae* (S). Mildiou des pois (F). Downy mildew of peas (E). Falscher mehltau der erbsen (D).

وصم فطري يصيب أوراق النباتات البقرية أعصها الجباب والبريلا والبقية واللؤلؤ والجصم || سببه فطر مجهري من الصنات . مظهره الخارجي يقع خلية مملوءة اللون ثم تحل إلى السرة تحلب الأوراق وتبب يلمها . يكافح باستعمال مركبات البوليرام والبرناب .

### ١٦٥٩ - صِيَّاتُ البَصَل

*Peronospora schieldani, P. destructor* (S). Mildiou de l'oignon (F). Blight of onions (E). Falscher mehltau der zwiebel (D).

وصم فطري يصيب البصل في أوراقه الفتية وفي شراجه الزهرية فيضحيها || مظهره الخارجي يقع بنية الشكل لا قياسية الحجم ، صفراء اللون ، خلية الحار البنفسجي المالح ، تركب الأوراق قصب ذبولاً الباكر وتركب الشرايح فترضا رمنها من إيصال التسع إلى الإزهار فتتمسك || يكافح باستعمال المركبات الحليمية المفعلة أو مركبات البوليرام والبرناب .



صنات



صنات الاسبانج



صنات البصل



صنات التبغ



صنات الشوكدرة

١٦٥١٨ - صِنَاجَة ، مَاصُوث ، مَعْمُود Elephas primigenius (S). Mammoth (F). Mammoth (E).

نوع من القيلة البائدة التي عاشت الإنسان في احيائه القديمة المألوفة الى ما قبل التاريخ . وجدا بعض جثثها واقعة على قراعتها مغطاة من حيث الزين في شائع سيرية وفيها من بلاد الشرق .

١٦٥١٩ - صِنَاج ٥ Séplon (F).

الصنَّاج صنفه داخلية مبرجة عنه بعض الرغويات كالخيار . وهو جسم بيض الشكل المستطيل ، عذب الصلابة ، ابيض اللون ، يتكون من مواد عضوية مزوية بكميات الكلس . وهو شديد الخفة اي قليل الوزن النسبي لانه كثير الفجوات التي يجمع فيها الازوت والحمض الكربوني .

١٦٥٢٠ - صِنَار Pistane d'Orient (F). هو الدلب الشرقى ، اطلبه .

١٦٥٢١ - صِنَارَة

هي الشمس ، تستعمل لصيد السك .

١٦٥٢٢ - صِنَاعَات زُرَاعِيَّة Industries agricoles (F). Agricultural industry (E). الصناعات التي تصانع المواد الالوية الزراعية بوسائل ميكانيكية كصناعة السكر والكحول والطور والزيت .

١٦٥٢٣ - صِنَاعَة ، كَيْش ، رَقْلَة Fascine (F). Faggot (E). اغصان واغصان ردا شبه توضع في وجه الماء لتحصيل قس منه الى مجرى آخر .

١٦٥٢٤ - صِنَاعَة التَحْمِير Zymotechnie (F). Zymotechnics (E).

١٦٥٢٥ - صِنَاعَة التَحْمُر Vinification علم صنع الخمر ومطبخها وتجويها .

١٦٥٢٦ - صِنَاعَة السِيَال Vannerie (F). Basket-making (E). تشتمل كل ما يصنع بقشبات الصلصات والخيزان والاسل وفيها من سلال وينساف ، الخ .

١٦٥٢٧ - صِنَاكَة Totalité (F). Totality (E).

١٦٥٢٨ - صِنَبَار مَبْدُول ٥

Crioccephalus rusticus (S). Crioccephalus rusticus (F). حشرة خاشية من فصيلة القرنيبات ورتبة مفدمات الالجنة . اصلها من مناطق الصينور || انثا اكبر قدما من ذكرها طول من ١٨ الى ٢٥ مم . اما ذكرها فتطول من ١٢ الى ١٧ مم . ثوبا الى السرة المغطاة الجفراء المولج . سرها دجوي يتغير من الغروب الى الشرق || تقطر في اوائل حزيران ويقتصر حتى اواسط تموز . تمنع مكها في شرق لحاء الاجبار القائمة والمقطوعة فينتفخ فيرات دقيقة صغيرة تتطور وتكبر بسرعة وتدمر اللحاء والتشكير الى ان يحل زين الاكمال حيث تتحول الى حوريات ونها الى حشرات جلالة تجم السرايب في

الشكل لونها الى البقلة ثم ينحرف ويستقر على السرة . يكاتف باستمال الفوطير المرتكزة على النحاس .

١٦٥١٠ - صِنَاء الصَلِيبِيَّات ٥

Peronospora brassicae, P. parasitica (S). Mildew des crucifères (F). Downy mildew of crucifers (E). Falscher Mehltau der Kreuzblüter (D).

وصم فطري يصيب سوق فروع ولورق وزاد نباتات النضبة الصليبية اعضها اللث والركب والفطون . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية غبراء اللون || تتحرف الى السرة تشوه الفروع والاوراق والازهار || يكاتف كثير من الصناء باستمال مركبات النحاس .

١٦٥١١ - صِنَاء القَنْب ٥

Peronospora cannabina (S). وصم يصيب اوراق القنب سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية صفراء اللون ثم غطية تصطب ليج الاوراق وتصب يباسها .

١٦٥١٢ - صِنَاء التَفَل ٥

Peronospora trifoliorum (S). Mildew des trèfles et luzernes (F). Downy mildew of alfalfa and clover (E). Falscher Mehltau der Luzerne (D).

وصم يصيب اوراق التفل والقص واللحس . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع خلية لا تباية الشكل والرتب لونها الى البقلة ويلها مولج بنفسجي ركب فصل الاوراق وتصب يباسها || يستحسن حتى النباتات الهامة منه ظهور المرض وان تصطب الخش لسب مجهرى فلا مانع من استمال الفوطير التنمسية شرط الانتاج من الخش قبل مرور ١٥ يوما على المكافسة .

١٦٥١٣ - صِنَاء الزُود ٥ ، مَبْدُول الزُود

Peronospora sparsa (S). Mildew du rosier (F). وصم فطري يمتري الورد في اصفاه الموالاة اعضها الازراق لونها وقد يشوها دون ان يقضي عليها بكاملها . سبه فطر مجهرى من الصناء . مظهره الخارجي يقع صغيرة القد ، مزوانية الشكل ، جزوية اللون ، بنفسجية الملاج ، ركب حنار الازراق واسناتها ولها الانداد الفنية ومماثل الازهار فطرسها وتصلها || يكاتف باستمال الفوطير التنمسية او غيرها من الفوطير المركبة الحديثة .

١٦٥١٤ - صِنَاكِيَّات Peronosporaceae (S).

Péronosporacées (F). Peronosporacées (E). فصيلة الفطور الصائفة من مرتبة التشنبات ورتبة البشيات || تشتمل ثلاث عمارات : الحصبيات والنباتات والبرصيات ، اما اجناسها وانواعها فمفيدة منها التسنه والخصيف والصناء والمصيل والللمة والنباغ .

١٦٥١٥ - صِنَاب ٥ Cardamina (S). Cardamina (F). جلس نباتات عشبية رية من فصيلة الصليبيات . انواعها نحو ٦٠ منها الحولية والخلولة والسرة . اوراقها مركبة متعاقبة حريفة الملاق . ازهارها بيض او وردية .

١٦٥١٦ - صِنَاب المَاء Cardamine des prés (F). هو حرف الخقل ، اطلبه .

١٦٥١٧ - صِنَاب يَمْرِي هو حرف السوط ، اطلبه .



صناء الصليبيات



صناء الورد



صناب



صنار مبدول

## ١٦٥٢ - صَنْجِيَّةٌ \* أَفْشُونُ ، ذَاتُ الْأَجْرَاسِ

## ذَاتُ الصَّلَاحِلِ ، كِرَوَال

Crotalus (S). Crotale, Serpenc à sonnettes (F). Rattlesnake (E).



صنط

جنس حيات خفية من فصيلة الصنطييات لها في أذنانها ما يشبه الحراشف تحدث ما تتحرك أو تلتصق التربة. صنفًا مكسوت الصنوج || يكثر وجودها في البلاد الأمريكية. يقضون عليها في الأماكن المربوبة بترية الخنازير لأن الخنزير يقتل منها ويقتلها ولا تستطيع إليه سبيدًا لأن سمومها لا تفسد في جلده.

## ١٦٥٣ - صَنْطَابُ ، صَنْخِر

هو الجمل الصخم اللتين : (F). Chameau gros et gras

## ١٦٥٣٧ - صَنْخَةٌ ، طَرْشِيلِيَا \* Transchella (S).

جنس ظفور مجهرية قريبة الشبه من الصندية. تتميز بهيئتها البوذية لذلك الشكل اللينق الانتشاب والفيلق اللثة. سماها الساسية حديثة استوائية الإرتكاز. ذنبها كثيرة التمامات الزردية التجميع. دعامتها مؤلفة من خيلتين لا متجانستين الشكل استوائية الشكل واللبا كروية. أعينها منفصلة || أنواعه الاقتصادية قليلة أشهرها صنخة الخوخ.

## ١٦٥٣٨ - صَنْخَةٌ الْخَوْخُ \* Transchella pruni-spinosa, Puccinia pruni-spinosa, Accidium punctatum (S). Rouille du prunier (F).

ظفر مجهرية يتطفل على منظم اللوزيات أصعبها الخوخ والنمش والدراق والوزر يلعب الأوراق ويضعف الأشجار ويؤذيها || مظهره الخارجي بخور صغيرة جردية اللون لا تباينة التجميع تركيب النصل حل صفحت أسفل بين المروق والفصل فظفر البشرة به أن تصطب التسج. لثاها يكثف ألا يجمع وقرق جميع الأوراق به مغولها. لثاها ينفع الأشجار التي كان ظهر حل أوراقها الجسم يأسد القوالب القمالة الشديدة الانحماص والالتصاق تؤك به الأوراق.

## ١٦٥٣٩ - صَنْدَرَةٌ \* Luciopeca sandra (S).

سمكة نهريّة من القضيبيات شالكت الزعانف. أظفارها قسيمة الأرباء تشغل معظم أشر البلاد المقتلة الحراوة للثروة بحر الباردة || طولهاراوح من ١٠ إلى ١٠٠ سم. ثوبها إلى الخضار الزهري يعلوها من جانبها توضع أسير زباد أسمرًا مع اقترابه من شبح الظهر || لحمها جيد الصنف مرغوب فيه.



صنخة الخوخ

## ١٦٥٤٠ - صَنْدَلُ

مجهرية من محيط التبغ الجاف يراوح عدد مشاكبيها ما بين ٣ و ٥ ح. صندل.

## ١٦٥٤١ - صَنْدَلُ هو أرقية الصنوبر ، الطلها.

## ١٦٥٤٢ - صَنْدَلُ Santalum (S).

جنس نباتات صمغية رية وزراعية صناعية من فصيلة الصندليات. أنواعه ثمانية منهاها الشرق الأقصى جميعها نباتات وأشجار صغيرة القد ، أوراقها ممتدة متعاقبة. لثاها عتقوي التجميع ، إبطي وتناهي الإرتكاز. أزهارها خشوية. ثمارها نوية. بذورها سود. تزرع لأخشابها للصنوبر اللين ، اللصاغة الصنف. أخشابها



صندر

طلب الحرية والكم وتفيد سبها الأولى مع حلول شهر حزيران || أضرارها شديدة الفيلق لثاها تنطب الأشجار الفاتحة وقد تسبب يباسها.

## ١٦٥٣٩ - صَنْطَابُ Camobita (S).

Cénobita (F). Cénobita (E).

جنس دوبييات بحرية من القضيبيات عشاريات الأبريل طويلات الذيل وفضيلة الباغوريات. أنواعه المرفوعة قليلة العدد منتشرة قرب شواطئ البلاد الاستوائية والشمسة نحوها || أجسامها مستطيلة الشكل ، صدرها قصير المتك. تتميز بهيئتها في الإصداق المجهورة ولا تقني سوى بطونها عند الانتقال || أشهر أنواعها الصنطاب الخشن (C. rugosa) الذي يكثر وجوده قرب شطوط المحيط الهندي والبحر الأحمر.

## ١٦٥٣٠ - صَنْبُوبُ \* Pila (S). Pella (F).

Pila (E).

جنس حشرات من فصيلة الصنوبييات وقبيلة ذوات الجناحين. أنواعه المعروفة عديدة أظفارها منظم أقطار العالم || أجسامها متوسطة الحجم تطول من ٨ إلى ١٠ م. رؤوسها شبه مكورة ، مستقلة. حيوتها صغيرة ، فارقة عند الشقين. قرونها الاستثمارية صغيرة ، تحمله. ملاسها صغيرة. أصطافها متوسطة الحجم. كواسلها مستطيلة ، ثنائية التحديق ، مبعثرة الحب. بطونها اهليلجية. رواشها كبيرة. قوائمها نشيطة. أنثاها عديدة ، جميعها وحيدة اللون || الجملدة واضحة تألف المروج والنباتات. البرقة نعمة تخرج الجلود والسوق فتقضي لثبات الذي تركه.

## ١٦٥٣١ - صَنْبُوبِيَّاتٌ \* Palidus (S). Palidus (F).

Palidus (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. أجسامها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم أقطار العالم. تألف المروج والنباتات ، تغرب في المروج أرضية || أجسامها ممتدة تطول من ٦ إلى ١٢ م. رؤوسها مكورة ، مستقلة. حيوتها فارقة عند الشقين. قرونها الاستثمارية خيطية متفارة الطول. ملاسها صغيرة أو ضامرة. كواسلها مستطيلة. بطونها اهليلجية. رواشها كبيرة. قوائمها نشيطة. أنثاها باهتة || الحشرة الجملدة تمشي على سطح الأزهار ورحيقها. البرقة تعيش في جذور النباتات المختلفة ونسها الجزر والقت والمالفون || أشهر أجناسها الصنبوب.

## ١٦٥٣٢ - صَنْبُورُ

النخلة دقت من أصلها وانجدر كرها يقل لحمها. والنخلة تخرج من أصل النخلة الاخرى من غير أن تفسد.

## ١٦٥٣٣ - صَنْبُورُ ، صَنْكِيَّةُ Robinet (F).

Cock, Tap (E).

جهاز يسمح لسوائل الحوض ، من ماء وغيره ، بالمرور أو بالعجز عن الطلح.

## ١٦٥٣٤ - صَنْجِيَّاتٌ ، أَلْفُونِيَّاتٌ Crotalidae (S).

Crotalidae (F). Crotalidae, Rattlesnakes (E).

فصيلة حيات سامة من انوبيات الأعداد. أجناسها وأنواعها عديدة جميعها خيطية سامة تتميز برؤوسها اللطيفة واحداثها الدقيقة ويوجد نقرة واضحة جلدية بين الانف والعين.

١٦٥٥٠ - **صَنْدَلٌ**  
Caranx saurus (F).  
سمكة بحرية تسمى شيم صندون، اطليها .

١٦٥٥١ - **صَنْعُ الْمَلَك، مَلَكَج**  
Malage (F).  
Malting (E).  
علية تحويل الشير وغيره من الحبوب الى ملت اي حبوب ناشئة (نايلة) .

١٦٥٥٢ - **صَنْف**  
Qualité (F). Quality (E).  
خاصة الشيء القيمة .

١٦٥٥٣ - **صَنْمَكَة**  
Hampes de la plume (F).  
Staff of the feather (E).  
قصة الريش استقلت او غلظت .

١٦٥٥٤ - **صَنْمَج**  
Critère, Critérium (F).  
Criterion (E).  
هو طابع الحقيقة الحاسم الذي يمكن من التقدير والفصل .  
ج. صنّاج .

١٦٥٥٥ - **صَنْوِير**  
Pinus (S). Pin (F). Pine-tree (E).  
جلس الجمار حربية وصناعية من فصيلة الصنوبريات .  
انواعه عديدة . بعضها متخسبة . تشوبها سلفة . اغصانها متفرجة . غراصيمها ضيقة الاوراق . اوراقها ابيدة عديمة مختلفة التجميع . ثمارها اقراص ريمية الشكل او مريضة . جميعها من الاشجار المقيمة الدائمة الاثمار ويستخرج من بعضها مادة راتنجية لها استعمالها الصناعي المشهور . افرع واثبع انواعه المزروعة ما يقع .

١٦٥٥٦ - **صَنْوِيرٌ أَيْضٌ**  
Pin blanc (F).  
هو صنوبر ويوت ، اطليها .

١٦٥٥٧ - **صَنْوِيرٌ آخَر**  
Pinus resinosa (S).  
Pin rouge (F). Red-pine (E).  
شجرة مبرقية مهدا امريكية الثابتة . خشبها احمر اللون غزير للمادة الراتنجية . تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اغصانها فارشة . غراصيمها جوية حادة المنسل . بتاتها خفيفة قصيرة حراء اللون . اعدابها شفعية ، ثنائية التجميع . نصلها عيني الشكل بطول من ١٢ الى ١٦ سم . ويرعى نحو ١ م . وهو مسنن الحافة حايك الخضار . اوراقها عريضة ، صندرية ، طولها نحو ٥ سم . وقلطر قاعدتها ٣ سم . جريهاها صاجية الشويز لونها الى البقرة الزرقاء المزاج . يعيش ويوجد في جميع المناطق المعتدلة والاربية الصيفية البور .

١٦٥٥٨ - **صَنْوِيرٌ أَرْمَنْدِي**  
Pinus armandi (S).  
Pin Armand (F). Armand-pine (E).  
شجرة مبرقية تزيينية سريعة النمو مهدا الشرق الاقصى تكثر في الصين واليابان تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اغصانها اقلية الاوراق . غراصيمها وبتاتها حادة المادة الشمعية الزرقية . راعها يضيئة ، صندرية ، دلفة ومديبة . اعدابها وريية . خلسية التجميع ، نصلها جامد الصفة المنطقية . انسلطه مرتق الشكل يمس في حدود الزلازم الاول . اكارزها غروطية طولها يراوح بين ١٥ و ٢٠ سم . وريهاها من ٨ الى ٨ سم . لونها الى الخضرة المتناسية الالوان . جريهاها مثلك الزوايا . منبسطة القتره الدائرة الحمار . يعيش في جميع اقالم الصنوبر دون ان يتأثر كثيرا بنوع التربة .

ناعمة الرقعة ، شديدة الصلابة ، حطرية اللوف لا تقربها حشرة ولا يفسدنا الزمن .

١٦٥٤٣ - **صَنْدَلٌ أَيْضٌ**  
Santalum album (S).  
Santal blanc (F). White sandalwood (E). Weisser sandelbaum (D). Sandalo bianco (I).  
نوع من الصندل الزراعي المشهور بانحشابه الصناعية الفاخرة وبسطرة الطبي الثابت الاستعمال . يربط في المولع الحارة ذات الارربة الخصبة . يتكاثر بالبذور وينبذ في مستنقذ الجبل الى الماشات لانه لا يقوى على القتال . ثمرته تملو من ٦ الى ٨ اثمار . خشبها غزير المادة السطرية يحرق نحو ٥ ٪ .

١٦٥٤٤ - **صَنْدَلٌ مَرْجَانِي**  
Adenanthera (S). Adénanthere, Bois de corail, Crête de paon (F). Red sandalwood tree, Coral tree (E). Korallenbaum, Phänakamm (D). Pavoniana, Sami di corallo (I).  
شجرة حرجية طيبة صناعية وزينة من فصيلة القزليات القزليات . مهدا البلاد الاستوائية . تملو نحو ١٢ م . ساقيها سرية ، اوراقها متعاقبة مركبة ريشية . ازهارها سليل التجميع ، مرتق الشكل ، ابيط الاوراق . ازهارها غشوية صفيرة الحجم ، حشوية الكأس والورقيات ، ضمية الالوان الوردية . ثمارها اقرون ليلية ضيقة مستطيلة محبنة . يزورها يضيئة الشكل شفيدة الصلابة تستعمل في صناعة السبعات . اغصانها مرجانية اللون صناعية . جلويها طيبة مقيية .

١٦٥٤٥ - **صَنْدَلَان**  
Pterocarpus santal (F).  
هو الثورز الصندل ، اطليها .

١٦٥٤٦ - **صَنْدَلِيَان**  
Santalaceae (S).  
Santalacées (F). Santalaceae (E).  
فصيلة ثنائية من ذوات الفلقتين عديدة القامات . اجناسها وازيلها عديدة تجميع الى ثلاثة اسباط . نباتاتها احباب ريشيات وبخيرات مغطيا ويش مطويلاً يرقم الحلية وعمل وتليفات الخشبية .

١٦٥٤٧ - **صَنْدَلُوقُ الْاَدْعَاك**  
Caisse de prévoyance (F). Foresight chest (E).  
منشأة خاصة في بعض المصارف والفرقات تنظم لاجل تحسين حالة المستفيدين والمال بالتصاع نسبة مئوية من اجورهم وادخلها لم يضاف اليها مغلها من رب العمل او احباب الشركة . واشهر ثرونها ان لا تكتف الى احصائها الا سنة مقاداة العمل .

١٦٥٤٨ - **صَنْدَلُوقُ التَّوْقِير**  
Caisse d'épargne (F).  
Savings-bank (E).  
نظام تنبه بعض الحكومات والمصارف قوائم التشجيع على التوفير وعمل الناس على الاقتصاد . فكل من يربط في الادخار يطلب دفراً يحرقه باسمه فيخرج بمقتضاه مبلغاً لا يقل من كمية محدودة من شاد ذلك . ويحسب له ربح على ودائمه . وله ان يسحب ما يربط في محبه على ان لا يتجاوز مبلغاً معيناً في يوم واحد .

١٦٥٤٩ - **صَنْدَلُوقُ الرِّزْم** ، **هَنْدَلُ**  
Caisse de manipulation (F). Manipulation chest (E).  
صندوق ميكانيكي الجوانب لا قتر له ترزم فيه نباتات التبع عند تقنيتهما سفياً متناوبة متراكبة الى ان تبلغ الارتفاع المطلوب .



صندل ابيض



صندل مرجاني

## ١٦٥٦٤ - صَوْنَرُ بُنْج Pin de Bungo (F).

هو الصنوبر الصيني، أصله .

## ١٦٥٦٥ - صَوْنَرُ جَرْدِي

*Pinus montana* (S). Pin à crochet, P. mugo, P. de montagne (F). Swiss mountain pine (E). Krummkiefer, Mugokiefer (D). Pino mugo, P. alpino (I). شجرة سروية تملو من ١٥ م. - ٢٥ م. أغصانها غريبة. قنبا غروبية الشكل، أهدابها شفافة ثنائية التجميع. أكرانها مسطلة ممددة. تنصلها إلى الأغصان المائتة. يتناسق. جرهاتها جزئية اللون، بارزة القشرة المنقطة السن || يعيش في جميع الأودية الجبلية وبين الصخور، يتصلل البرد المستمر ولا يتغذى.



صنوبر اسود

## ١٦٥٦٦ - صَوْنَرُ حَلَبِي Pinus halepensis (S).

Pin d'Alep, P. de Jerusalem (F). Aleppo pine tree, Jerusalem pine (E). Aleppokiefer, Aleppochichte (D). Pino d'Aleppo, P. di Gerusalemme (I).

شجرة سروية تملو من ١٥ م. - ٢٥ م. أغصانها منفردة. غراحيها سطحة اللون. يتناقلها دقيقة. براعمها بيضية الشكل. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تنصلها غشبي الشكل زاهر الأغصان يطول نحو ٨ م. ويبرس من ١ م. - ٢ م. أكرانها ممددة طولها نحو ١٢ م. وقطر قاعدتها ٤ سم. جرهاتها بارزة القشرة المنبسطة لونها إلى البازرة السداسي اللون || يألف الأودية الجبلية ومجيد فيها تمامًا.



صنوبر بحري

## ١٦٥٦٧ - صَوْنَرُ حَمَلَا Pinus excelsa (S).

Pin pleureur de l'Himalaya (F). شجرة جادة صنعية وزينية سرية النمو تملو من ٣٠ م. - ٥٠ م. أغصانها أفقية فائقة. يتناقلها غليظة الأطراف المتدلية. براعمها بيضية، مغطوة، حادة الزانج والمادة اللصية. أهدابها وريّة، خلبية التجميع. تنصلها جامد الصلابة الخيطية الكثيفة الاغصان. أكرانها غروبية طولها يراوح من ١٥ م. - ٢٥ م. ويبرس من ٧ م. - ١٠ م. لونها إلى السمرة الخيطية السداسي اللون. جرهاتها لينة القشرة المستديرة البارزة || يربب في الآلال والمواقع الرطبة.



صنوبر بري

## ١٦٥٦٨ - صَوْنَرُ كَمْبَرُو Pinus cembra (S).

Pin cembra, Ahvier, Arolla, Auvier (F). شجرة سروية تملو من ٨ م. - ٢٥ م. ساقها متعينة متناوبة الاغصان. أغصانها خضراء. غراحيها وبناتقها غليظة، كثيفة الزغب المسطحة. براعمها بيضية الشكل مدبسة الأطراف. أهدابها وريّة، خلبية التجميع، تنصلها جامد الصلابة يطول نحو ٧ م. لونها إلى الحمرة الزرقاء. أكرانها غروبية، مغطوة للقاعدة. طولها نحو ١٥ سم. وقطر قاعدتها ٦ سم. جرهاتها بارزة القشرة القميّة الضخمة، لونها إلى السمرة البنفسجية.



صنوبر جردى

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ صِينِي، صَوْنَرُ بُنْج Pinus bungeana (S). Pin de Bungo (F).

شجرة كبيرة أقدم منها الصين. ساقها متعينة تملو من ٢٥ م. - ٣٥ م. قنبا أجاسية الشكل. تشويها سلسة مسطحة الصفائح. أغصانها أفقية الجلبوس. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تنصلها جامد الصلابة، بيضية الشكل، يطول نحو ٩ م. أكرانها مدبسة القدر، الضخمة، لونها إلى الخشن الاسمر اللون || يزود لأغصانها الجيدة الصنف لكنه يمتد من الأنواع الجالسة التي لا يجيد إلا في مواقع خاصة ضمن إقليم معين.



صنوبر حلبي

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ اسود\*، صَوْنَرُ لِسِيُو Pinus laricio (S). Pin noir, P. laricio, P. de Corse, P. d'Austrice (F). Corsican pine, Austrian pine, Larch pine (E). Schwarzkiefer, Koralschichte (D). Pino laricio, P. di Corsica (I).

شجرة خضراء دائمة. ساقها تملو من ٣٥ م. - ٥٠ م. قنبا مريية الشكل. أغصانها منفردة فائقة. غراحيها وبناتقها غليظة الجسم خضراء اللون. براعمها بيضية مدبسة الأطراف. غراحيها كثيفة متراكمة ذرية. أهدابها غشبية. ثنائية التجميع. تنصلها جامد الصلابة، مسن الحلقاء، بحري اللون. أكرانها غروبية طولها نحو ٧ م. وقطر نحو ٣ م. جرهاتها بارزة نازحة، قنبا متصالية التصفيد لونها إلى الخشن الاسمر يطول مروج اصفر || يربب في الملقح الرطبة يبر من الانحجار السرية النمو.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ البَحْرُو Pinus taeda (S).

Pin à l'ancres (F). شجرة سروية خضراء تملو من ٣٥ م. - ٥٠ م. أغصانها منفردة فائقة. غراحيها وبناتقها كثيفة التجميع سطحة اللون. براعمها غروبية، جزئية المرافش المرفوعة. أهدابها وريّة، ثلاثية التجميع، تنصلها جامد الصلابة بحري اللون يطول نحو ٢٥ سم. ويبرس ٢ م. أكرانها غروبية الشكل طولها نحو ١٥ سم. ويبرس ٤ سم. لونها إلى السمرة السداسي اللون. جرهاتها مدبسة القشرة النازحة الغليظة المتصفيد || يمتد من الانحجار السرية النمو التي تجيد في جميع المواقع والأودية المتصلة الرطبة. غشبه ليزر المادة الزانجية البخورية العرف.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ الْكَبْشَان Pinastre (F).

هو الصنوبر البحري، أصله.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَحْرِي، صَوْنَرُ الْكَبْشَان Pinus pinaster (S). Pin maritime, P. de Bordeaux, Pinastro (F). Swamp pine, Sea-side pine, Cluster-pine, Pinaster (E). Starnkiefer, Seelkiefer, Bordeauxkiefer (D). Pino maritimo, P. pinastro, P. di Bardo, Pinastro (I).

شجرة سروية كبيرة خضراء. ساقها تملو من ٣٥ م. - ٤٠ م. تشويها صلبة مسطحة المتصلبة لونها إلى الحمرة البنفسجية. أغصانها غليظة متصلة الانفرج. غراحيها جزئية اللون. براعمها غروبية الشكل كثيفة المرافش المتراكمة. أهدابها شفافة، ثنائية التجميع، تنصلها جامد الصلابة، دأكن الأغصان، يطول نحو ٣٥ سم. أكرانها ممددة الشكل متدلية طولها نحو ٢٥ سم. لونها إلى البازرة المائقة اللامعة. جرهاتها بارزة، قميّة الشكل مدبسة القشرة || يعيش في جميع الأودية. إقليمه للمناطق الساحلية أصحها الأماكن الرطبة حيث لا يصلح غيره.

## ١٦٥٦٩ - صَوْنَرُ بَرْي، بَرْي Pinus sylvestris (S). Pin sylvestre, Pinasso, Pin de Norvège, P. d'Ecosse (F). Scotch pine, Birk apple (E). Nordische Kiefer (D). Pino sylvestre, P. silvestico, P. comune (I).

شجرة سروية تملو من ٢٥ م. - ٤٠ م. أغصانها قليلة الانفرج. غراحيها شفافة متناوبة. يتناقلها غروبية الشكل مرفوعة مدبسة. أهدابها شفافة ثنائية التجميع، تنصلها إلى الأغصان الأزرق. أكرانها ممددة طولها نحو ٨ م. وقطر قاعدتها ٢ سم. جرهاتها فائقة الخط. يزويها دقيقة مجنسة || ترطب في الأودية الرملية.

الحراشف والعلف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة أو خماسيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة الخيطيّة، لونها إلى الزرقة البهريّة. اكرانها غروبيّة، طولها نحو ٨ سم. وعرضها ٥ سم. لونها إلى الصفرة المائلة للأزرق. بذورها لوزيّة الشكل مأكولة البلب. البوبها بيضي الشكل يطول نحو ١٠ سم. ويعرض من ٧ إلى ٨ سم. وهو مستحب الطعم غريز المادة الصنيعة.

١٦٥٧٦ - صَوْبَرٌ مُصْفَرٌ \*  
*Pinus pinea* (S).  
Pin pignon, P. pinier, P. parasol, P. bon, P. d'Italie (F). Italian stone pine (E). Steinkiefer, Italienischekiefer (D). Pino pinea, P. da pinocchi, P. gentile, Pignolo (I).

شجرة سبروتية تكثر زراعتها في لبنان وفي مختلف تهايم وهضاب المتوسط من فلسطين إلى إيطاليا والأندلس. ساقها جالسة مستقيمة تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. قشورها مقلمة، سلسة، ممرّسة الطبقات. اغصانها غليظة فارشة. قنبها مظليّة الشكل. غراحيها سنطية اللون، صفراء المولج. بناتها مستقيمة براعمها اسطوانية. حراشفها جامدة الكوب ناشرة. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة، عاتق الحصار، يطول من ١٢ إلى ٢٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها بيضية الشكل مقلمة القاعدية، طولها يراوح من ٨ إلى ١٢ سم. وعرضها قطرها من ٦ إلى ٨ سم. جرهاتها شاذلة ناشرة، لونها إلى الخمرية الصنافية السفماء المولج || يعيش ويجمد في جميع الأرتبة إلا أنه بطيء النمو. بذور ثماره مأكولة وتستخدم في الطعام والحلويات.

١٦٥٧٧ - صَوْبَرٌ مَنَقِيحِي \*  
*Pinus palustris* (S).  
Pin palustre (F). Pich-pin (E).  
شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. ساقها جالسة مستقيمة كالشعنة. اغصانها صخرية أخفئة الارتكاز، غراحيها وبناتها كثيرة العدد متركبة. براعمها بيضية الشكل، قطنية الحراشف اللينة. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها جامد الصفحة يطول من ٢٥ إلى ٤٥ سم. ويعرض نحو ٢ سم. اكرانها غروبيّة تطول من ١٥ إلى ٢٥ سم. ويعرض من ٥ إلى ٨ سم. جرهاتها سنطية اللون يطولها مولج آخر || يرشب في المواعظ الرطبة العميقة الغور. أحشائها لينة، جيدة الصنف، شاملة الاستهلاك المنزلي والصنائي.

١٦٥٧٨ - صَوْبَرٌ مَتَيَّ \*  
*Pinus lambertiana* (S).  
Pin à sucre (F).  
شجرة سبروتية جبابرة بطيئة للنمو تملو من ٥٥ إلى ١٠٠ م. مهيمنة البلاد الأمريكية. ترتب في الأقاليم الرطبة والأودية العميقة الغور. غصنها ثقيل الوزن، أصفر اللون. آخر القليل. اغصانها خضرة فارشة. براعمها خدرية الشكل، متركبة الحراشف الجلورية اللون. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها شديد الانغصار، جامد الصفحة للظافة الزوايا، يطول نحو ١٠ سم. ويعرض ٢ سم. اكرانها غروبيّة كبيرة اللد طولها يراوح من ٣٥ إلى ٥٠ سم. وعرضها من ٨ إلى ١٢ سم. || وهو يتنبز بما تلوّزه بناتقه وبراعم من مادة سكرية تخبه المنبت.

١٦٥٧٩ - صَوْبَرٌ وَيَمُوتُ \*، صَوْبَرٌ أَبْيَض \*  
*Pinus strobus* (S). Pin weymouth, P. blanc, P. du Lord (F). White pine, Weymouth pine (E). Weymouthskiefer, Gemeine Weimutskiefer (D). Pino di weymouth, Pino bianco (I).

شجرة كبيرة الحجم تملو من ٣٥ إلى ٥٠ م. اغصانها

١٦٥٨٠ - صَوْبَرٌ كَثِيفُ الزَّهْوِ، صَوْبَرٌ يَابَانِي \*  
*Pinus densiflora* (S). Pin densiflora (F).  
شجرة سبروتية مهددة اليابان تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. شكلها شكل الصنوبر المحلي. اغصانها مغنبرة. غراحيها حطولة اللون. بناتها غليظة. براعمها غلورية مغنبرة الحراشف. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها إلى الحصار الأزرق يطول من ٨ إلى ١٢ سم. ويعرض نحو ١ سم. اكرانها كثيفة متركبة. اكرانها ريمية صخيرة اللد، جرهاتها منبسطة متوسطة التفرش لونها إلى الحمرية السطحة المولج || يعيش في جميع الأرتبة والمواعظ المعتدلة وهو في الأقاليم الرطبة أسرع نموًا واقل مادة راتنجية.

١٦٥٨١ - صَوْبَرٌ كَثِيفٌ \*  
*Pinus brucei* (S).  
Pin de Calabre (F). Calabrian cluster pine (E). Kalabrischkiefer (D). Pino calabrese (I).

شجرة سبروتية تملو من ٢٥ إلى ٣٥ م. اغصانها مغنبرة. غراحيها سطحة اللون. بناتها غليظة. براعمها غلورية. اهدابها شفعية، ثنائيّة التجميع، نصلها غصلي الشكل، باعث الحصار، يطول من ١٤ إلى ٢٥ سم. ويعرض من ٢ إلى ٣ سم. اكرانها ريمية، طولها نحو ٨ سم. وقطر قاعدتها ٥ سم. جرهاتها عددة القترّة القليلة التفرش. لونها إلى السمرّة الصنافية السفماء المولج || يعيش في جميع الأرتبة والمواعظ المعتدلة.

١٦٥٨٢ - صَوْبَرٌ كَنْتَلِيَّةٌ \*  
*Pinus canariensis* (S).  
Pin des Canaries (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. ساقها فرواه. فروجها خضرة صخيرة اللد. غراحيها نمحية. بناتها وبراعمها مسنة الحراشف المجلدة الأطراف. اهدابها وريّة، ثلاثيّة التجميع، نصلها يطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم. ويعرض نحو ١ سم. اكرانها غروبيّة مسطحة، لونها إلى الخمرية اللامعة، متوسط طولها نحو ١٨ سم. وعرضها ٥ سم. جرهاتها مميّنة القترّة البارزة المهددة || يصير من الانواع البريانية المعتدلة للنمو.

١٦٥٨٣ - صَوْبَرٌ كُوْرِيَّةٌ \*  
*Pinus korstenii* (S).  
Pin de Cordé (F).

شجرة دائمة تملو من ٣٥ إلى ٤٥ م. اغصانها خضرة كبيرة. غراحيها وبناتها غليظة فضية اللون. براعمها غلورية، قطنية الحراشف. اهدابها وريّة، خماسيّة التجميع، نصلها مغنق الصفحة، مسن الحافة، يطول نحو ١٢ سم. اكرانها غروبيّة غليظة، طولها يراوح بين ١٢ و ١٥ سم. وعرضها من ٥ إلى ٧ سم. جرهاتها مظلة الزوايا، ناشرة القترّة، لونها إلى السمرّة الصفراء || يصير من الانماجر السبروتية البريانية اللريمية التوالتي تجرد في جميع الأقاليم والمواعظ المعتدلة الرطوبة.

١٦٥٨٤ - صَوْبَرٌ لَرِيْسِيُ \*  
*Pin Laricio* (F).  
هو الصنوبر الأسود، أخضر.

١٦٥٨٥ - صَوْبَرٌ لَوْرِي \*  
*Pinus edulis* (S).  
Pin à amandes (F).

شجرة سبروتية زراعية متوسطة الحجم مهددة بلاد المكسيك وجولوا. تملو من ٣ إلى ٦ أمتار. قنبها هرمية الشكل. اغصانها متوسطة الانعراج. غراحيها وبناتها غليظة الأطراف. براعمها غلورية، سنطية اللون، غبراه



صنوبر مشر



صنوبر ويوت



١٦٥٩٢ - صَوْنَدِي  
الصودي : التفل الطوال وقد تكون بمنى التي لا تتركب .

١٦٥٩٤ - صَوْنُور  
Troupeau de gros bétail (F). Drove of cattle (E).  
هو قطع البقر والجواميس .

١٦٥٩٥ - صَوْنُور  
هو الصفور الذي يجب اذا دعي .

١٦٥٩٦ - صَوْنَان ، صَوْنَان  
Silix, Silica (F). Silica (E).  
هو السيليس .

١٦٥٩٧ - صَوْنَانَا  
في السيلكا ، اطبا .

١٦٥٩٨ - صَوْنَانِي  
Granitique (F). Granitic (E).  
ما كان تركيبة من الصوان .

١٦٥٩٩ - صَوْنَاي ، زَوْنَاي  
Maraca (S). Marica, Marique, Casard siffleur (F). Widgeon (E).  
جنس طير من البطيات انزله ثلاثة واحد اسوي وثلاث  
امريكيان . جميعها كبيرة الجثة ، حادة الزنبرك ، تنسج  
بمنقارها المفلطحة التي لا يبدل طرفها على الرأس . مناقشا  
صغيرة متباعدة ، اجنحتها منطوية عند زائفة ، تقضم  
الاصحاب كالزور ويتجنب غمر الماء والامساك كما يفعل  
البط || اما انزلها الثلاثة فهي :

صَوْنَاي امريكة

M. americana (S).

صَوْنَاي الشرق

Marque americaine (F).

M. penelope (S).

صَوْنَاي مجلان

Marque pénelope (F).

M. sibirizix (S).

Marque de Magellan (F).

نفس منها بالتحلية الصوي الشرقي .

١٦٦٠٠ - صَوْنَاي الشرق

Marque penelope (S).

Marque pénelope, Vingeon (F). Widgeon (E).

طائر من الصوي ربح الجثة طوله نحو ٥٥ سم . ثوبه

مزاكب الالوان ، جميل الزوايق والفرسكة . فيه الابيض

والاصفر والاشير والصناني والرمادي والاسمر والاسود .

هناك مستطيان . متقارب الى القربة الحمراء . سلاله وباديتان .

وهو من القواطع يحرب الشرق والغرب ، يألف البسرات

ويجاري الامر . قوت الاغصان وسطف اللوبيات المائية .

يشن منه في العشب حل شفة الماء . انتاء تيشن وتحسن

من ٨ الى ١٠ بيضات . يألف السنين اذا اخذ صغيراً

لكه يتطلب الكثير من الماء وما يتبع الماء من القشريات

والغشرات || سره متفاوت القدر يد من ٢٥ الى ٨٠

واكثر .

١٦٦٠١ - صَوْنَب

Point de direction (F).

Point of the direction (E).

نقطة الاتجاه .

١٦٦٠٢ - صَوْنَب

الصوب : زُرول المطر . صاب المطر صوباً وانصاب :

انصب وطل وانهر .

١٦٦٠٣ - صَوْنَبَة

Tin de graines (F).

Heap of seeds (E).

الكومة من الحبوب حل اختلاطها .

١٦٦٠٤ - صَوْنَت

Vote (F). Voice (E).

الصوت هو حركة اهتزازية تحدث من اضطراب الاجسام

للمادية كالقوافل فيوصل اثرها الى الاذن || ويطلق الصوت

على الاحساس السمي نفسه || ولكي يكون الصوت

خضة فاشرة . نراهيها وينالها غليظة ، قلنية الزنب .  
رارعيها يضيء الشكل مدنية الاطراف . سرانها تنية  
العين يضاء الخار الكليف الزنب . احداها وربة ، خلية  
التصنيع ، تسلفا ثلاثي الزوايا ، جهاد الصفة ، يجري  
الون . اكرانها مدنية الشكل تطول نحو ٢٠ سم . وتعرض  
في سم . جرهاتها منخفضة الحافة ، منبسطة القبة المتساوية  
الصفة . لونها الى السرة الخفية || يرغب في الازرة  
القلية والمواقع المعتدلة الرطبة وهو فيها سريع التنو .

١٦٥٨٠ - صَوْنَر يَابَانِي  
Pin densiflora (F).  
هو الصنوبر الكيف الزهر ، اطبا .

١٦٥٨١ - صَوْنَرِيَا ، صَوْنَرِيَا ، كَرَز  
Cône, Pommé de pin (F). Pine-cone, Fir-cone, Fir-nut (E).

شكل من اشكال اثمار . وهي ايضا ثمرة الصنوبر والارز  
والتنوب وغيرها من اثمار فصيلة الصنوبريات . تحليتها  
العلمية : محور وصفت عليه قنابات ليفية جامدة تنسج  
جهرات تحمل كل منها غشاء وزرئين مجتمين .

١٦٥٨٢ - صَوْنَرِيَا ، صَوْنَرِيَا ، صَوْنَرِيَا

Conférese (S). Conférese (F). Conférese (E).

فصيلة نباتية من باديات الزهر هريانة الزور تشل  
ثلاثة اسباط : التنويرات والسروريات والطقوسيات .  
اجناسها وانزلها كثيرة العدد معظمها اثمار راتنية صناعية  
شائعة الاستعمال .

١٦٥٨٣ - صِهَاء  
Sources d'eau (F). Springs (E).  
الصهاء : منابع الماء .

١٦٥٨٤ - صِهَاءَا  
Magma (F). Magma (E).  
الصهارة وتسمى بها كل مادة يذوب فيها مادة كالتحاج  
المصهور او كالمطلع الذي يغلف به البركان عند ثورانه .

١٦٥٨٥ - صِهَاءَا  
Molla (F). Marrow, Mochell (E).  
في الصنوخ الشرقي وهي المكاك .

١٦٥٨٦ - صِهَاءَا  
Vin blanc (F).  
الخير البيضاء .

١٦٥٨٧ - صِهَاءَا  
Colourless wine (E).

١٦٥٨٧ - صِهَاءَا  
Enologie (F). Enology (E).

علم صناعة الخمر يشمل كل ما يتعلق بصنعها وتحليتها  
وسقظها الخ .

١٦٥٨٨ - صِهَاءَا  
Citerne (F). Cistern (E).

وعاء يحكم البد كثير الاستيعاب يستعمل لنقل السوائل .

١٦٥٨٩ - صِهَاءَا  
Hennissement (F). Neighing (E).

صوت الخيل عاة .

١٦٥٩٠ - صَو  
في البحاري الصغيرة ، اطبا .

١٦٥٩١ - صَوَايَا

Rationalisme (F).

Rationalism (E).

الصوابية مذهب فلسفي لاهوتي يعتبر العقل محور السلطة

ويرسمها المريد فينفي الوحي والتسلسل الى العرف التتقليدي .

١٦٥٩٢ - صَوَايَا

Pollen

غبار الى الصفرة سكون من جذرات الطلع ينشأ في المنبر

اي في الجزء الاقل من السداة وذلك في باديات الزهر .



صوي الشرق

صوت الظلم	المرار	مسموحاً يجب ان لا تقل ذبذباته في الثانية عن ٣٠ اهتزازة
صوت الضج	المشعر	ولا تزيد من ٣٠٠٠ اما سرعه في الهواء فمطلبا ٣٣٠
صوت المفق	القممقة	متراً بالثانية وهي تتأثر بشدة وبالوسط الذي ينتقل فيه.
صوت التمايل	الشدقة	اما سرعه في الماء فتبلغ ١٤٣٥ متراً    ولصوت اسماء
صوت الذئب	المواء	كثيرة عند الحيوان والعلير ، ذلك لان الاصوات تختلف
صوت الثور عند اللع	المنغمة	مع اختلاف مساحدها    وقد وضعنا في الجدول التالي ،
صوت الابل	القليل	الذي نودده ايجدياً ، كل ما تيسر من هذه الاسماء :
صوت الحية من لها	الفحيح	صوت المزي
صوت الجندب	الفصيص	صوت البيط
صوت الخنزير	القياح	صوت القليلة
صوت الفحل من الابل	القنينة	صوت ثقب الخيل عند حفرها
صوت الفحل من الابل	القرقرة	صوت المكاء
صوت الفصح الاثني	القشاح	صوت المصفور
صوت القطا	المنطقلة	صوت القم
صوت المقاب	القممقة	صوت القشان
صوت البعر	القلغ	صوت البقرة
صوت الذب	القهاق	صوت الحمام
صوت الدجاج	الحقنقة	صوت الحيقان
صوت الدجاجة	القواء	صوت الدواب عند طلبها الملق
صوت الابل	الكت	صوت الحية في تماسها
صوت الجارو والسرکه	الكسكة	صوت الخيل من بطونها
صوت الابل	الكش	صوت الخيل عند طلبها الملق
صوت الحية من جلدها	الكشيش	صوت البقر
صوت الفأرة	الكميص	صوت الناقة المرفوع
صوت الفراخ المجهود	الكيد	صوت ذوات الخلف
صوت القفق	الققلقة	صوت البيط والاوز
صوت الحر	المواء	صوت الغراب
صوت الكلب	التياح	صوت الفحل من الابل
صوت التيس	التيب	صوت الببو
صوت الظبي	الزيب	صوت القرد
صوت الغراب (بالين)	التيب	صوت المصفور
صوت الغراب (بالخير)	التنيق	صوت النمامة
صوت الدجاجة	التننقة	صوت الادم
صوت الضفادع	التنيل	صوت القمري
صوت الاسود	التبوت	صوت البغل
صوت الحسير	التبوق	صوت البيل
صوت القليل والبروم	التشم	صوت الكيش والتيس
صوت الخلد	المخددة	صوت الحمار
صوت الابل	المخدر	صوت العصف
صوت الحمام	المخيل	صوت البراة
صوت الفشان	المرفرة	صوت الجراد
صوت الكلب عند الاستنكار	المزير	صوت النسر
صوت الورشان	الوت	صوت البديك
صوت صغار المصائير	الوصيح	صياح الطائر
صوت الذئب وابن آوى	الوصوعة	صوت الخيل
صوت العصف	الوق	صوت النبل
صوت الخيل من بطونها	الوقيب	صوت البديك خاصة والعلير عامة
صوت الابل	اليجار	صوت الثعلب

١٦٦٥ - صوتان ٥

Helminthosporium, Ophiobolus (S). Helminthosporiose (F).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفصيلة المشويات . يتميز باصان ضخمة ، متفصمة ، ظاهرة الملق ويبرغ وبيري الخلية ، غطلي الشكل ، متوازي الترتيب . نجمه تكات مسطوية || انواعه المعروفة اربعة تحديدها ما يلي .

صوت نفس الخيل عند حفرها  
صوت القرد  
صوت الكلب عند الجرح  
صوت الازب  
صوت القوق  
صوت التيس عند الهياج

الصنج  
الصنك  
الصفا  
الصناب  
الصراع  
الغلاب



صوجان اتمع



صوجان الارز



صوجان الحب



صوجان الزروع



صوچه



صوخم

اقلبيها اقمح من اقلب القاصوليا لانها اضع منها حل احوال  
الحرق والرطوبة في ايار يهمل و او ه كيلو  
لدم الوالد الذي يراوى معدل اثنائه العادي ٢٠٠  
٣٠٠ كيلو من الحب ويحرق ٣٠٠٠ كيلو من الكلاله  
الاخضر اما المواد الغذائية التي تتركب منها الحبوبه  
هي ، بالنسبة الى الحنطة والقمح ، ما يلي :

النوع	مواد ازوتية	مواد دهنية	مواد هيدروكربونية
صوچه	١٧,٠٠٠ %	١٧,٠٠٠ %	٩,٥٠٠ %
حنطة	١٢,٠٠٠ %	٥,٥٠٠ %	٦١,٥٠٠ %
قمح يفر	٢٢,٠٠٠ %	٢,٥٠٠ %	-

ومن الاطباء من ينصح باستعمال دقيقها عوضاً من  
الحنطة وذلك لمن كان مصاباً بداء السكري . ويستخرج  
من صوجان مادة حنطية غذائية شائعة الاستعمال ، اما كميات  
فيليب الحليب ، وزيد فيه نسبة الفيتيد اما علفها فتخرج  
في جميع المواني (راجع جدول المواد الغذائية).

Deséché (F). Dried (E).

صوچ وصوچ البقل . ثم يسه . يتقال صوچه الربع .  
أليسه . وتصوچ من البرد . يسه .

١٦٦١٢ - صَوْعَم \* Barraldé (S). Barraldé (F).

الوحدة صوغة || جلس الحجار وحبيرات برية وزواحية  
ازوتية من فصيلة القرماصات . انموذ المبرقة عديدة منبتها  
للمناطق الحارة والاسناتية من القارتين الاسيوية والافريقية ||  
سوها فرماه . اثنائها متعاقبة . اوراثها متعاقبة ، مضقة ،  
ستالية اتصال الجامدة . ازهارها عشوية ، فسيه التجميع ،  
محورية الارتكاز . ثمارها كروية ، مكللة باسنان  
التجميع || اوراثها حفصة اللدائق ، طيبة ، تستعمل في  
معالجة الجلباب والتهاب غطائية الفم .

١٦٦١٣ - صَوْدَا Soudé (F). Soda, Kali (E).

الصودا كايوتا مركب من الصوديوم والاكسجين اما  
تجاريها فهي مركب من كبريتات الصوديوم المتعاد .

١٦٦١٤ - صَوْدُوم Sodium

فلز ابيض نقي المالح ، شديد اللبنة ، اسدي ، يتكاثف .  
وزنه (ص-ص) ٢٣ ، وزنه الذري ٢٣ ، ثقله النوعي ٩٦٠٠ ،  
يتسهر في ٩٦ بسخ . وهو سريع الصدأ في الهواء  
الطلق ولا يبرده سفرداً بل الطيبة بل متحدة بمتناس  
اخرى يذلل معها مختلف المركبات ، اهمها : كلوريد  
الصوديوم او ملح الطعام ، ونيترات الصوديوم او ملح  
البارود ، وكبريتات الصوديوم او التطرون ، ويكبريتات  
الصوديوم . ويكبريتات الصوديوم او سلفات الصودا .

١٦٦١٥ - صَوْر Palmarale (F). Palm-grove (E).

الصور هو الخس من النخل في ابي تربة كان .

١٦٦١٦ - صَوْرِي Pictif (F). Feigned (E).

نمت تعري يطلق حل كل حقد ليس له ويبد قانوني حل  
الرمح من مظهره وشكله كالخس الصوري مثلاً .

١٦٦١٧ - صَوْص ، قُوب ، كَتَكُوت Poussin (F). Chick (E).

صغير البجاج من يوم نلقه من البيضة الى حين تزويده .

١٦٦١٨ - صَوْلَاة في الانراس ، اخله .

١٦٦٠٦ - صُوجَانُ اَبْنَع \* Ophiobolus harporichus (S). Pictin (F).

نظر مجري يصيب بعض التبيليات انحصا الحنطة .  
مظهره الخارجي يقع من تركب البقل من عتقا ومصادماً  
تضمها بعد ان تثل فيها الحركة التنبسية || اغترار  
تختلف باختلاف نشاطه وما يرافقه من عوامل مشجبة او  
قائمة . وان ربه الرياح في الارض قبل ادخال الحب نفس  
ونوى .

١٦٦٠٧ - صُوجَانُ الْاَرُوز \* Helminthosporium oryzae, Ophiobolus myribeanus (S). Helminthosporiose du riz, Burnson (F). Stripe disease of barley (E).

نظر مجري يركب الارز فيطيه || مظهره الخارجي  
يقع سفيرة فسيه التي تمتد وتتفرع وتم كمال تصل  
الشرائط تقسب اسمرار واصفرار وذبوله . بعد يابله  
عصيفات الحب يقشها بنكات سود تطلب القلب وتتخذ ،  
يكافح مظهر البذار باحتجاب الموانع المبروة .

١٦٦٠٨ - صُوجَانُ الْحَب \* Helminthosporium sativum, H. sorokinianum, Ophiobolus sativus (S). Helminthosporiose des grains (F). Spot blotch of barley (E).

نظر مجري يصيب الحنطة والاشير والقمح وبعض  
التبيليات البرية ومنها التليل || مظهره الخارجي يقع  
لاقياسية الحبيب تركب تصل الصف . اما الفطر فيراون  
سبة البذار من يوم اثنائها وتكون جلدوريا حتى  
اسبالها وتغيبها حيث يطب الحب ليد مرقتا وعرضا .  
اغترار محمودة لانه لا يتنثر الا بطرف خاصة من  
الحرارة والرطوبة .

١٦٦٠٩ - صُوجَانُ الزُّوْع \* Ophiobolus graminis, O. cariceti, Sphaeria cariceti, Rhaphidophora graminis (S). Pictin des céréales (F). Take-all of wheat (E). Schwarzbeinigkeit (D).

نظر مجري يصيب الزروع انحصا الحنطة فيؤذيها وقد  
يمنعها من ادخال الحب || مظهره الخارجي يقع حنطية  
هاقية تركب سلايات القصب من الباطن والخارج للقل  
التبادل التنسي وتسبب اصفرار القصب وذبوله تلبه الجلود  
والسود || اغترار جسيمة لانه يحلل دون ادخال الحب  
تفيدو السنايل يفضاه التي ذافرة .

١٦٦١٠ - صُوجَانُ ، صَوْنَة \* Glycine hispida, G. soja, Soja hispida (S). Soja, Soya, Haricot soja (F). Soja bean, Soya bean (E). Soja, Soja-bohne (D). Soja, Sola, Fava soja (I).

نبات عشبي زراعي صناعي وكلائي من فصيلة البقوليات  
الفرغاية . مهد الشرق الاقي وقد تمت زراسته منذ  
اصقاع العالم نظراً لفرائده الاقتصادية ولارتفاع نسبة ما  
يصويه حبه من المواد الازوتية والعدنية || اسمها الصيني  
« تيو » والياباني « دندو » وفي حبة حنطية فرعاء تملو  
نحو ١٥٠ سم . فروجها حنطية متعاقبة . اوراثها مركبة  
طويلة الزناد ، ثلاثية الوريقات الستانية اللدقة . ازهارها  
عشوية التجميع ، محورية الارتكاز . ازهارها بتنجسية  
اللون او سفراء . ثمارها قرون صغيرة التسد ، قليلة  
التجميع ، حنطية القشور ، تغلف من حبيبتين الى خمس حبات .  
اصرارها المشهورة بنحو ١٦ تحلف بالوان حبا وما تحويه  
من مواد حنطية وصلاحتها للاطعام والربية .... لذلك فهي  
تجود في جميع الارته بالنسبة والتوصلة الحبيب والاندماج .

## ١٦٦٦٦ - صَوَفِيَّات حَلَقِيَّة \* ، حَافِرِيَّة حَلَقِيَّة

Ungulus annosa, Fomes annosus, Polyporus annosus, Trametes radiciperda (S). Polypore annelé, Maladie du rond des pins (F).

ظفر من السيات ركب التنوب والعنبر والياض والرعر والابل والبتولا والصنوبر || يصيب الجذور فيقتضي على جوداتها ويبيها ويصيب السخ فيقتضي على الماء والشكيز دون ان يمتد السخ لان الراتنج يحول دون انتشاره . يبدو على الجذوة والشكيز اطراف حلقة متتابة باندجانية اللون تنحرف الى السرة عندما يبدأ حيف المشج بعمله الانجلاي في الاجزاء والمواد القليلة || اما القطر فلا يملو سطح القرية وهو صغير القدر حافري الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ٣ و ١٠ سم . ثوبه الى الصلابة الحظيفة . لبايه اخضر اللون ، لبني التركيب او غليبي || يوفاته بيفاته قيسها ٤x٦ ميكرون .

## ١٦٦٦٧ - صَوَفِيَّات كاذب \* ، فِلَيْتْس مِلْهَاب \* ،

Phellinus igniarius (S). Faux-amadouvier, Apoplexie, Esca (F).

ظفر من السيات موطن البلاد المعتدلة الحارة والباردة . ركب حدة نباتات حرجية انحصا الاسفندان ، البتولا ، الجوز ، الحور ، الدوار ، الشوم ، الصفصاف ، الفاسول ، الفيزاء ، القزولوس ، الخش ... وركب من النباتات الزراعية الطماخ والقرين والكرية || مشبهه اغبر اللون يدخل من الجروح اليابسة فيطبع في الاشجار الحرجية طبقاتها الخشبية حتى القلب ويصطب الشكيز في الجوز والصنديان . وقد يدوم حصة سنوات لانه يطوي النمو والانتشار . ويكون الخشب الموصوم شديد السرة او زاهي الصفرة عدم الحيرة سريع الانتعاش || وهو في الكرية رسم ونمط القالب لانه يفتحي على الحفة بسرعة بعد ان يعطب الماء واليابات الساك والجهاز الرعائي الذي يؤمن نقل النسغ وتبادلده || يكثف باقتلاع الاجفان الموصومة وينضج الكرية بعد تقليمها باسبور بعض المطهرات السائلة المركزة حل مادة القزوينج || اما القطر فتوسط القدر ، قبي الشكل ، قطر قاعدته براوح بين ١٠ و ٣٠ سم . لصادوده قليلة صميكة ، عمودية ، صهبا اللون او قزوين ، زبد السطح خيرا المل || لبايه حنطي اللون جامد الملقط الناعم . وهو من الفطور التي تضر من ٥٠ الى ٩٥ سة .

## ١٦٦٦٨ - صَوَفِيَّات \* ، Coniopterygidae (S).

Coniopterygidae (F). Coniopterygidae (E).

فصيلة حشرات \* من رتبة شرافات الاجنحة . اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد الباردة والمعتدلة الحارة . تألف الثنايات . حشرات الجملانة تعيش على تنسج الاشجار . يرقاتها مبرقة تعيش خاصة على الارق والحليسات || اجسامها صغيرة قطرها من ٢ الى ٥ سم . بسطتها تراوح من ٥ الى ١٠ سم . تشابهها مغلف بمادة طيسلية كالنقيق . وهي مجهزة بعدد خاصة مبرقة في جميع احاء الجسم ، تفرز مادة شمعية واقية . قربها الانتشارية مهدية عند الجملانة والبرقة . عينا صديرة . اجنسها انتشارية اللد بين الزوج الانثوي والخلفي || يرقاتها صغيرة ، مدنية الشكل ، خضيلة التاكثير ، مقترنة || اشهر اجنسها الصوق والسدال .

## ١٦٦٦٩ - صَوَفِيَّات حَلَقِيَّة ، فِلَيْتْس ، الحلب .

Semblable (F). صَوَفِيَّات صَوَفِيَّات (E).

Phylum (F). Phylum (E).

كل صَوَفِيَّات تسلسلية ، صَيَانِيَّة او نباتية ، تقتصل على انواع متعددة من يعضها البيض تقضى صوة .

## ١٦٦٧٢ - صَوَفِيَّات صَوَفِيَّات (F). Wool (E).

الصوف بالعرف الخام مجسمة من الشعر تؤلف الصفاء الذي ينطلي اجسام بعض الحيوانات المبرقة كالنم والممزر والابل الخ || اما شرة الصوف تتكون من ثلاثة اجزاء : البصلة وما فيها من مادة نشوية وبولونة ثم الطبقة الصموية البنية التي تفرز اللانعة واللزوجة ويلبها الطبقة الحشوية القرنية السطحية التي تمد خاصية التليد .

## ١٦٦٧٣ - صَوَفِيَّات كاذب \* ، حَافِرِيَّة

Ungulus fomentaria, Polyporus fomentaria (S). Amadouvier (F).

ظفر من السيات ركب الزان والبتولا والقزوين والحور والخروج والصنديان . رقة شديدة صلدة على الثوب والطح . وهو من اكبر فطور السيات واغلفها . شكله شكل سافر الحصان . خطوط قطر قاعدته نحو ٢٠ سم . وقد يبلغ في ظرف خاصة ٤٠ و ٥٠ سم . بيتا براوح ارتفاع فيه بين ١٠ و ٢٠ سم . || ثوبه في اول صده لبد اللون تبي المواج ثم ينحرف الى الخفي وينتهي باخوذي . لبايه غليبي ناعم ، لونه الى الصبغة الخشبية . بوفاته متطيلة مغلفة الاطراف قيسها ١٤x٥ ميكرون || يمتد الجملوح ويدخل الى قلوبها من جروحها اليابسة بعد ان يعطب لشكيز والخشب الذي يلفقه بالظفر والعرض الى مكبات حاكما سحاكة الطبقة الخشبية المتناثرة || مشبهه اغبر اللون يكتنف الكليات ويسبب انحلال موادها الخشبية .

## ١٦٦٧٤ - صَوَفِيَّات أَشْفَح \* ، فِلَيْتْس

Phellinus pomaceus, Polyporus fulvus (S). Phellinus (F).

ظفر من السيات ركب التفاحيات والوزيات في صوفها واحصائها . يدخل من جروح التشليل التي اعمل ملازمتها بالمستيك ويرد حتى القلب فيسبب انحلال المواد القليلة والخشبية || وهو حافري الشكل صغير القدر حبه من ٣ الى ٦ سم . سطحه خلي للمستقر قري اللون . لبايه صلب الملقط غليبي التركيب ، امير اللون || يكثف بانتراخ القطر ويصطير الجرح وظلاله بالمستيك بعد تنظيفه من المشج والخشب المتطوب .

## ١٦٦٧٥ - صَوَفِيَّات السندليان \* ، فِلَيْتْس السندليان

Phellinus dryadans (S).

ظفر من السيات ركبهم جلوج السندليان وقد يصيب الكنتنا || ظهوره الخارجي قيمة مستديرة ، غسدة ، فارشة الحافة ، قطر قاعدتها براوح من ١٠ الى ٢٠ سم . غلافها الخارجي الملوي رقيق القشرة الرضوة ، لونه الى البياض الاغبر ، يرشح بعض الفتق الخشبية اللون || لبايه حنطي عايق ، جامد الملقط الغليبي . بوفاته شفاقة او تنيبة اللون ، مدنية الشكل ، قطرها نحو ٩ ميكرون وقطر قاعدتها ٣ ميكرون || وهو من الفطور السرية النمو يظهر في اواخر تموز . مشبهه يسبب المغن الخشبي بعد ان يحرب الاوية ويطبها .



صوان



صوان اشقح



صوان حلفي



صوان كاذب

خلية السفسفة. اثرها طرقي، فربي التجميع، تحرك  
ضمنة من الاوراق المستعرضة.



صوبل الشام

١٦٦٣٧ - صَوَرَة \* Acharia (S). Acharie (F).

الصورة ج صوبر. نبات ليني عاشر مدر من فصيلة  
الصوبريات يكثر في التايغاس وصل سفات مجاري الماء.  
يزرع القرنين. جنين بكثرة فروه الحبيبة السبيجة،  
بقلة اوراكه للمبردة، يهدم جبال انظاره وبغرابة ثماره  
وزروره الجذيرة المستحقة الشكل.



صولة

١٦٦٣٨ - صَوَرَة البَقُول \* Misella oleracea,

Mamestra oleracea, Pollis oleracea (S).  
Misella potagère, Noctuelle potagère (F).  
Bright-line brown-eye (E).

حشرة مؤذية من الفسقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها  
يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اريوة. فراشها جارية  
قوتها مشتر الاثمار. سرقتها تموش على اوراق الصليبيات  
البرية والزرعاه وصل البقول. جسمها متوسط طوله  
نحو ١٥ م. بسطها نحو ٢٨ م. رأسها معتدل الجرم  
جذوي اللون. صحنها كيرتان زبلانها عيطان.  
حيثها الى الجذوة. بطنها الى الخلفي الاسمر ملو غط  
لحي من النقط السود. ورشها الاماميان الى الجذوة  
الاصفر، ويملوها تسنين طرقي بني اللون. ورشها  
الحليان الى الكلبة. اهدابها الى القطعة النصفية. لها  
جهدان في الخلف. تظهر فراشة الجبل الاول في حزيران  
وتظهر فراشة الجبل الثاني في ايلول. تسرح في الليل.  
تقاتل بده ظهورها بنسوخة ايام وتفتح المكن لطفاً  
على الصفحات السفلى من نصال النبات كمالاً الى السرعة  
تطوي نحو ٣٥ م. جسمها مائل للفسار. ثوربا الى  
الخضار الاسمر ملو غط لحي قاطب جذوي اللون يحمده  
من العينين واليسار غطان اهداب واربع نقط سود في كل  
الجزوة. منها الى الشبهة السمره المولج. رواجها سود.  
طوي الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوماً وينتهي في التربة.



صوبلية



صورة

١٦٦٣٩ - صَوَرَة القَرْفَل \* Misella compta (S). Misella parée, Noctuelle  
des dianthées (F). Misella compta (E).

حشرة من الفسقيات حشرقيات الاجنحة. موطنها بعض  
الام حوض البحر الابيض المتوسط. فراشها واسعة قوتها  
رقيق الاثمار. سرقتها نامة تلثم اوراق القرنفليات  
وتلقب الكماير وتلثم الزيتون للتسبيح. جسمها  
متوسط طوله نحو ١٤ م. بسطها نحو ٣١ م. رأسها  
خادوي الشكل اسهب اللون. صحنها كيرتان. زبلانها  
عيطان. حيثها وربتها الى الصخرة السوداء المولج.  
ورشها الاماميان الى الصخرة السوداء يملوها تجميع اسمر  
وتتبع ابيض وزرقة سفلية وتنتيط اسيد. ورشها  
الحليان الى الصخرة السوداء السوية اللون. اهدابها الى  
القطعة النصفية. لها جيل واحد في الخلف. تظهر الفراشة  
في ايار وتبقى حتى تموز. تسرح في الليل. تقاتل بده  
ظهورها بنسوخة اساييح وتفتح المكن لطفاً على الصفحات  
السفلى من نصال الاوراق. السرعة تطول نحو ٣٠ م.  
جسمها اسطواني الشكل. مشقة التفشار. ثوربا الى  
القطعة الخضراء يسمّر في الظهور وينير في الجانين. رأسها  
جذوي اللون. منها الى الربكة. رواجها سود. طوي



صورة البقول



صورة القرفل

Sperme des équidés (F). صَوَرَة \*

Sperm of the equidae (E).

هو افراز اللبد التناسلية الذكرية عند الوباب من خيل  
وجير.

١٦٦٤٠ - صَوَرَة \* Corynespora, كوريسبورة

جنس فلور مجهرية من الريديات وفصيلة الطعيات.  
جره الكيفية سمره اللون، اسطوانية الشكل، غليظة  
للمفاصل القدية، فردية او شعبة التجميع. كتانه  
سبيجة الترتيب، تحيلة الفواصل الشفافة. انواحه قليلة  
العدد، اعرفها صوبل الشام.

١٦٦٤١ - صَوَرَة الشَّام \* Corynespora melonis (S).

فلور مجهرية يتطفل على اوراق الشام والقرع والخيار  
والكمون. مظهره الخارجي يقع لاقبسية الشكل والحجم،  
لونها الى السمره المظلمة، اطرافها حالي حاقب اللون، تركب  
نصل الاوراق ففسب ذيوا ويملوها. يكالغ عنده  
ظهوره باستعمال المركبات النصلية المركزة ١٪.

١٦٦٤٢ - صَوَرَة \* Aeschynomene, أسكينومين

Aeschynomene (S). Aeschynomene, Sola, Nelitte (F).  
Sola, Bastard sensitive plant, Pitt-hat plant (E).  
Schampfanze, Sinnpflanze (D). Planta modesta  
bastarda (I).

جنس نباتات عشبية وجنية من فصيلة القرنفليات الفراضية.  
انواعه المعروفة سبعة مهاد البلاد الحارة تكثر في الصين  
والهند. اوراقها مركبة ريشية. ازهارها مختلفة الالوان  
الزاهية تتميز بكثرة اسديتها التي يبلغ عددها عشرة. وهو  
نوعان.

الصولة الصينية Aes. paludosa (S).

Aeschynomene de Chine (F).

ساقها مستطيلة، ليفية، لينة، تستعمل في صناعة الورق  
الفانخر المعروف بورق الرز.

الصولة الهندية Aes. cannabica (S).

Aeschynomene de l'Inde (F).

جنية ليفية مستطيلة السال اللطيفة. اربانها فزيلة متينة  
تستعمل في عدة صناعات منزلية وغيرها.

١٦٦٤٣ - صَوَرَة Argent pur (F). Para silver (E).

١٦٦٤٤ - صَوَرَة Calviforme (F). Calviform (E). صَوَرَة صَوَرَة

شكل من الزباني يشبه السويجان.

١٦٦٤٥ - صَوَرَة رَاحِيَات الثَوْنِي Rhopaloceros (F).

Rhopaloceros (E).

مرتبة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة. فصائلها  
عديدة تتميز بقرونها الاستثنائية الصوانية الشكل.  
خادراتها حارية لا يملوها في بيئاتها، فهي. مكها يربيل  
الشكل، فربي الوض، لا نظامي الترتيب.

١٦٦٤٦ - صَوَرَة Leucadendron argenteum (S). Leucadendron argenteum, Arbre d'argent (F).

شجيرة زينة سبروتية من فصيلة النسيات. ساقها  
متنصبة فراه. اوراقها تطوي من ١٠ الى ١٦ م. وتوش  
من ١٢ الى ١٦ م. نصلها جامد التسبيح، خلي البشرة  
القضية اللون. ازهارها انبوية، سفيقة، رباعية التفشر،

المرشدة الممرسة حُبًا برية موطنها النياض والادغال الرطبة  
وسُيَا زراعية تَرْيِيْنِيَّة. اشهرها السور.

١٦٦٤٣ - صَوْمَلَة Solenanthus (S). Solananche (F).  
الصوملة ح صول. نبات عشبي محلي من فصيلة الجُسمسيات.  
انواعه قليلة موطنها جبال الشرق الاوسط. سوقها زباء  
القضاء، عاصمة الفزوع، تملو من ٧٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها  
مستطنة، لاهليبية، ذلقة الزام الاخضر. نصلها خالي البشرة  
اثير اللون. ازهارها عتقدي التجميع، ابيض الزركاز.  
ازهارها انبوية الشكل تبهو خمره اللون ثم تتحول الى  
الاريجاني الازرق. ازهارها يستمر من نيسان الى  
حزيران.

١٦٦٤٤ - صَوْمَلِيَّات Protoblastoptères (F).  
Protoblastoptera (E).  
رَبِيَّة حشرات متفرقة من طبقة الوردانيات. اسماؤها  
تعود الى الحقيقتين الكربونية والبرمية من الاباج الاول  
الاسم العلمي يربط اليها من اسلاف الوردانيات.  
تربيتها البرشي واحد اما مقدم حوشنها فلا يسلط الرأس  
وكانت تعيش على الاشجار علافاً لنبات وردان الدالة.

١٦٦٤٥ - صَوْمِيَّة في الصورة، اطبا.

١٦٦٤٦ - صَوْمَلَة Ergot (F). Spur (E).  
غلب الديك في ساقه.

١٦٦٤٧ - صَوْمَلَة، صَوْمَلَة، صَوْمَلَة Coutard (F). صَوْمَلَة،  
هو كل نبات معرض لأمراض قاصاة أي لسقوط الزهر او  
لانتعاش الثمر بعد البعد.

١٦٦٤٨ - صَوْمَلَة السَمَك Cérýle (F).  
هو الغراف، اطبا.

١٦٦٤٩ - صَوْمَلَة الأَوْي Hippodamia (S).  
Hippodamie (F).  
جلس حشرات عديدة من فصيلة الدعاسيق ورَبِيَّة ممددات  
الاجنحة.  
١٦٦٥٠ - صَوْمَلَة القطيع من البقر.

١٦٦٥١ - صَوْمَلَة Formulation (F).  
Formulation (E).  
الصيغة وضع الصيغة وتوضيحها.  
١٦٦٥٢ - صَوْمَلَة Entretien (F). Keeping (E).  
هي جعل الاعمال المتروكة المتروكة الصلصال على الشيء سليماً من  
التشوايب.

١٦٦٥٣ - صَوْمَلَة Roc (F). Rock (E).  
الصخرة الصلبة الثابتة في مكانها.

١٦٦٥٤ - صَوْمَلَة، صَوْمَلَة، صَوْمَلَة Chasse (F). Hunting (E).  
هو اقتناص الطير والحواشي. ويملك الصائد قصصه  
بالاستيلاء.

١٦٦٥٥ - صَوْمَلَة Glibier (F). Game (E).  
الصيد هو كل ما صيد من حيوان ينتج بوقاهه او جناحه.

الاكامل يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتفي من جلباب  
من العين لتصفه الصلة بعد ان تنتمن في التربة على عمق  
٤ أو ٥ سم.

١٦٦٥٠ - صَوْمَلَة الْهَنْتَبَاء Misella dysodes (S). Misella dysodes, Noctuelle  
des chiorcées (F). Misella dysodes (E).  
حشرة مستجبة الرائحة من فصيلة النسيقيات ورَبِيَّة حشرافيات  
الاجنحة. موطنها يمتل محضر اناليم حوش البسر الابيض  
التنصود. فراشها واثمة قوتها منثر الازهار. سرقها تمش  
على اوراق وزبادي المركبات واخصها الهناباء. جسمها  
متوسط القند بطول نحو ١٤ سم. بسطها نحو ٣١ سم. رأسها  
غريب في الشكل. عينها كيرتان. زباناها خيطيان.  
سرقها محتال الجرم والقطر. حوشها وبعثها الى الرربة  
السراء الملوخ. وروشاها الاساميان الى الرربة الخنطية  
الملوخ يطولها تبيح امر متفعله نقط سيد. وروشاها  
الحلفان الى الرربة الخنطية الزائرة تسير قرب الاطراف  
لها جيل واحد في الجيل. تظهر فراشة في ايار وتبقى حتى  
نحو. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة  
اسابيع وتنتج للكن لعلها على الصفحات السفلى من نصال  
الارزاق. الرربة تطول نحو ٣٠ سم. جسمها اسطواني  
الشكل، مشعوب القشاور. ثوبها الى النطلة السراء يطولها  
خط لبي قاطب اسود اللون، ابيض الخنار من العين  
والبار. جانبها متقطان بالاسود والاصفر. رأسها اخر.  
مدبها الى الرربة. ورواها الى السرة. الى طور الاكامل  
الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع وينتفي في التربة ضمن  
جلباب من العين.

١٦٦٤١ - صَوْمَلَة رَحَاكَة Misella paragrana (S). Misella paragrana (F).  
Misella paragrana (E).  
حشرة من النسيقيات حشرافيات الاجنحة. موطنها مجادح  
وتنام حوش البسر الابيض التنصود. فراشها واثمة قوتها  
منثر الازهار كمين ضخامة الازهار من بقعة الى بقعة.  
سرقها تمش على اوراق السرق والحرض والقطف والاشنان  
والرث. جسمها متوسط القند بطول نحو ٣٥ سم. رأسها  
محتال الجرم، اربد اللون. عينها كيرتان. زباناها  
خيطيان. حوشها وبعثها الى الرربة الخنطية الملوخ  
روشاها الاساميان الى الرربة الخنطية تملوها رشة وزونقة  
تاروح من النطحة الى الصبة والشمية. وروشاها الحلفان  
الى الرربة التبيها الملوخ تملوها جده متفرقة تسبق اختار  
المنجبي. لها جيلان في الجيل. تظهر فراشة الجيل الاول  
في ايار وتظهر فراشة الجيل الثاني في آب. تسرح في الليل.  
تماثل بعد ظهورها بنحو حشرة ايام وتنتج للكن لعلها  
على الصفحات السفلى من نصال اوراق ثبات المائل  
السرة تطول نحو ٣١ سم. جسمها شبه اسطواني، الشكل،  
مائل القشاور، عادم الحلب والقطف السود. ثوبها الى  
الخنار الزبي تملوها ثلاثة خطوط قاطبة جوية. رأسها  
الى الحفرة المرجانية. مدبها ورواها الى السرة السراء  
طور الاكامل الذي يستمر نحو ١٥ يوماً وينتفي في التربة  
ضمن جلباب من العين.

١٦٦٤٢ - صَوْمَلِيَّات Achariaca (S).  
Achariaca (F). Achariaca (E).  
صليبة نباتية من ذات الفلتين عديدة الالامات. ازهارها  
كثيرة مظهرها الفريقي المنبت. جميعها من النباتات اللقية



١٦٦٥٦ - صَيْدُ السَّمَكِ (Fishing) (F).  
هو البحث عن السمك وإخذه بمختلف الوسائل . وتكون ملكية السمك للمصاد لصياده بحق الاستيلاء .



صيداء

١٦٦٦٦ - صَيْدُ الدَّهْمِ \*  
Sarcophaga carnaria (S). Mouche à daniens, M. de la viande (F).



صيدن أبيض الرأس

ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٧ و ٢٠ م. ثوبها أغرض اللون يعلو غسوط متصالية تشكل مبريات تشبه رقعة الشطرنج . يكثر وجودها من أيار إلى تشرين الثاني . تسرح في كل مكان . مكنتها ينفث في جراحها القرحي فضمه رقات صغيرة دقيقة على اللحم والجيف والافتقار .

Tumle

١٦٦٦٧ - صَيْدُ كَالِي

هو التسمية ، أطلقها . أما صيدنازي فن وضع القترق إلى كتور لين الملوغ .



صيدن أزرق

١٦٦٦٨ - صَيْدُ كَيْتَات ، لَكَاغِيَّات

Calliphoridae (S). Calliphoridae (F).  
فصيلة شرشات ذبابية من رتبة ذوات الجناحين . اجنتها وانزاعها نحو ٥٠٠ مقلها صغير القذ وبطنها متوسط وكثير . أنثىها تخطفه يلبس ثوبا الرصاصي . أرجلها زياء . ذكورها كالأنثى لا تفرق بينها سوى علة البك الملونة الظاهرة في مؤخر الحلقة الطرفية عند الذكور . قوتها مثل الأنياب والفرزات ، والعظام ، وأكثر المواد العضوية والبراز || يرقاتها هواكة وأجعة ومنها خاضعة وثالثة وبطنها لاصع يركب الحيوان ليخذه .



صيدن الجراد

Cynagétique (F).

Hunting art (E).

١٦٦٦٩ - صَيْدُ عِي

ما له علاقة بفن الصيد .

١٦٦٧٠ - صَيْصُورُ

اسم شامل يطلق على البلم الملتصق ويل بعض صفار السمك كالشعير والملت والرشا الخ .

صيدن العم

Bercail (F). Fold (E).

١٦٦٧١ - صَيْصُورُ

السيرة والسيارة . خاتمة البقر والتم والمز .

Inoceramus (S).

Inoceramus (F). Inoceramus (E).

١٦٦٧٢ - صَيْصُورُ

جلس حيوانات من الرضويات صغريات الجناحين هادمت اللصاب وفضلة الاطريات . أنواعه للمرة مدينة . جميعا من مستعمرات الاراضي الطليانية || اصداها شبه غروبية الشكل بالغة التشديد الطولي .

١٦٦٧٣ - صَيْصُورُ

هو السامة ، أطلقها .

١٦٦٧٤ - صَيْصُورُ

حب الطبع والمنظف والقيام وما أشبه الذي ليس في جوفه لب .

صم

Selsura inoleuca (S).

Selsura inoleuca (F).

١٦٦٧٥ - صَيْصُورُ لَيْلٍ \*

طائر من الجوارح منيات المنقير ينتمي إلى فصيلة اللذبابيات . يألف الغابات وصفات مجاري الماء . لبعبه الحياتي جامعي . جماعته قليلة العدد . قوته للذباب والرمال والديدان || جسمه صغير القذ يطول نحو ١٦ م . منقاره مخزني الشكل ، صغير الحجم . سباله كثيف قصير . جناحاه ذلقان . ذنبه مستطيل الشكل ، منقوش الحرف . ثوبه البهري إلى الخضار الالاس الاصفر الملوغ . زوره وصنوه ويطة إلى

صيصور ليل

١٦٦٥٧ - صَيْصُورُ

Callionymus (S).  
Callionyme, Chiqueux, Dragonnet (F).  
جلس اسماك بحرية من شالكانات الزنائف . أنولها مدينة منها واحد يقيم في البحر الأبيض المتوسط . وهو صغير القذ ، مستطيل الشكل ، كبير الرأس ، منقوش الثوب ، متجان الزنائف الخاطئة والمديجة بمختلف الألوان .

١٦٦٥٨ - صَيْصُورُ

هي الارض الحمراء التربة الغليظة الحجارة المستوية السطح

Hilbou (mâle) (F).

Owl (male) (E).

١٦٦٥٩ - صَيْصُورُ

ذكر البومة .

Pharmacopée (F).

Pharmacopoeia (E).

١٦٦٦٠ - صَيْصُورُ

بحث تركيب الادوية وطرق استخدامها للمعالجة .  
١٦٦٦١ - صَيْصُورُ ، زَيْصُورُ  
Sarcophaga (F).  
جلس ذباب يبيض ولد لاصع من فصيلة الصيدينات . أنواعه عديدة . جميعها وأجعة وثالثة يكثر وجودها في الصيف . أشهر أنواعها وأجعة الاربعة التالية .

١٦٦٦٢ - صَيْصُورُ أَيْصُورُ الرَّأْسِ \*

Chrysomya albiceps (S). Mouche à tête blanche (F).  
ذبابة من الصيدين طولها يراوح من ٥ إلى ٧ م . لونها إلى الزرق . رأسها أبيض . زبالها سوداوان . يرقاتها غيرة اللون ، زياء الجسم تدبش على الجيف .

١٦٦٦٣ - صَيْصُورُ أَغْشَنُ

Pollenia rudis (S).

Pollénie rude (F).

حشرة ذبابية من ذوات الجناحين فضيلة الصيدينات . جسمها متوسط القذ يطول من ٨ إلى ١٠ م . عليها متكاثف غشن . طيراتها منيف الحركة سريعة . رأسها كبير الحجم . غسوطها ذرب . زبالانها صغيران . حينها كيرتان ، صفراء اريد اللون ، حشلي الملوغ . بطنها إلى القردة . أسود الزركشة . ريشها كيرتان ، شفافان ، يملؤها شفخ حشلي . قوتها إلى السمرة || يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الثاني . تربط في المواقف الممرضة لاصعة الشمس || قوتها مثل الأنياب والفرزات أنثايتها وقد تقتحم المنازل الغريبة في طلب القوت || يرقاتها وأجعة وتكثف مل الخراطيم تقتضي عليها .

١٦٦٦٤ - صَيْصُورُ أَرْزَقُ \*

Calliphora erythrocephala (S). Mouche bleue (F).  
ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٨ و ١٢ م . ثوبها إلى الزرق اللامعة . يكثر وجودها من نيسان إلى تشرين الاول . مسرعها كل مكان مشمس . لا تدخل المساكن الا لتتبع مكنا على اللحم والجيف والبقول اللذابة . يرقتها دقيقة غيرة اللون ، سمراء الرأس ، مبرحة الحب .

١٦٦٦٥ - صَيْصُورُ الْجِرَادِ \*

Stomoxys calcitrans (S). Mouche des sauterelles (F).  
ذبابة من الصيدين طولها يراوح ما بين ٥ و ٧ م . ثوبها مجذع ومغط بالاسود والاخير . يكثر وجودها من سيران



صيف



صيف



صيف



صيف الخيل

البيض الناصع || يلدن حقه في الاجنار القريبة . الاث  
تحسن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٥ بيضات .

Formule (F). Formule (E). صيف  
تغير مجازي أو رقي يدل على كيات للمواد التي يتألف  
منها تركيب معين ما مع نسبة عناصره وعدد وسائمه  
الذاتية .

Ené (F). Summer (E). صيف  
اسد يصل السنة الاولية مدته ثلاثة اشهر تبدأ في نصف  
الكرة الشمالي في ٢١ حزيران وتنتهي في ٢٠ ايلول . وهو  
يتميز بقله حرارته وبطول نهاره وذلك لانه يبدأ عندما  
تكون الشمس في الست عمودية على مدار السرطان .

١٦٦٧٨ - صيف ، صيف  
Poussière suspendue dans l'air (F).  
الصيف والسيقة : الغبار الجائل في الهواء .

Loxia (S). صيف \* صيف  
Loxia, Bec-croisé (F). Crossbill (E).  
جنس صافير من فصيلة الشرشوريات . انواعه سبعة جميعها  
من صافير المناطق المتفلة . طولها يراوح بين ١٤ و  
٢٠ سم . انوثها حليلة الالوان فيها الجزوي والاصفر  
والاسمر والاسود والرمادي والابيض واللمنشن . متاقبها  
خلقة ، قوية ، مصالفة . اذناها فارة || يتألف  
الاراج اعصها اراج الصنوبر والتوب والسرو . قوته  
حب الصنوبر ويختلج البزور البرية والفراخية وبعض  
الحشرات والحلرم || يلدن في الاجنار الكثيفة . اناته  
تحسن وسعها || بيضات على مرتين في السنة بينا ذكروها  
قرون الغذاء وفرد .

Codex صيفان ، صيف  
المهجرة الرسمية التي تبحث في الادوية ودركاتها وطرق  
تحقيقها .

Smerinchus (S). Smerinchus (F). صيف  
جنس حشرات من فصيلة الحريات انواعه اربعة او خمسة  
جميعها دجوية تسرح في الليل . اجسامها متوسطة القند  
طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . القواها الى القبرة الخلفية .  
حجفلها مقبحة بالاسود . وراشها كبيرة ، مزركفة  
وبوهجة . قرونها الاستشارية تقليدية الشكل || رقاتها  
مرطاة الجسم يكثر فيها اللون الاخضر القاتم . وهي غاشقة  
قلتهم اوراق بعض الاشجار اعصها السنتيان والرزقون .

Rostellaria (S). صيف  
Rostellaria (F). Rostellaria (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل  
وفصيلة الدلاحيات . انواعه للماصرة المروعة عديدة منتشرة  
في بعض مناطق المحيط الهندي والبحر الاحمر والبحر  
الابيض المتوسط || اصداؤها مردنية الشكل ، متباينة  
القند ، تطول من ٤ الى ١٢ سم . جميعها محزنة حتى  
الاضباب . فوجاتها مستطيلة ، دقيقة الاطراف المزاوية ،  
مفرقة الجواض || اجسامها محزنة ، مستطيلة الرؤوس  
المنتهية باضطام مغلوقة . لوانها ثنائية ، مغلوقة ، مبهوة .  
ارجلها مشطورة الى لفتين ، الخلفية مجهزة بسقاط قوتي  
المادة ظلي الشكل .

Dériter (F). صيف  
Dériter, Wearing away (E).  
الصيفكة الانقراض بالاحتكاك او الماك .

Dérétique (F). صيف  
Dérétique (E).  
نعت تعريفي يطلق على جميع التكاوين الروسية المتأخرة .  
عن فتحت الصخور ميكانيكيا .

Sclerostomum (S). صيف  
Sclerostoma (F). Sclerostoma (E).  
جنس دود من السلديات . انواعه مديدة جميعها طفيلية .  
بعضها يتطفل على الدواجن اعصها الخيل .

١٦٦٨٦ - صيف الخيل  
Sclerostomum equinum (S). Sclerostome du cheval,  
Strongie armé (F).  
نوع من الصيلم يعيش طفيليا في مساريق وارباب الخيل  
ليرضيها بما يسببه من مفس مؤلم .

١٦٦٨٧ - صيف  
الصيف : شفة الخمر . يوم صيف وصيف : شديد الخمر .

Déserticole (F). صيف  
Deserticole (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل حيوان او نبات يألف  
الصحراء .

Lisse (F). Smooth (E). صيف  
الصعوج هو الاملس المعاد من النبات .

١٦٦٩٠ - صيف الكيات  
هي فصيلة الخبيبات ، اطباها .





ض

مره من ٤ الى ٦ بيضات تحملها بمناوبة الذكر نحو ١٧ يوماً :

١٦٦٩٣ - **ضايطة الصخر**  
Entropie (F).  
Entropy (E).  
طريقة تسمح بتحديد انعطاط جهد القوة الحرارية .

١٦٦٩٤ - **ضايطة بيطريه**  
Police sanitaire vétérinaire (F).  
جام القوانين والانظمة المرجعية الاجراء المأذنة الى مقاومة انتشار الامراض السارية والمعدية في المواجن .

١٦٦٩٥ - **ضايطة**  
Embouchure, Delta (F).  
هي دلتا النهر ونحوه او مصبه .

١٦٦٩٦ - **ضايطة**  
Carnassier (F). Felina animal (E).  
الحوان المفترس . م ضارية . ج ضوار .

١٦٦٩٧ - **ضايطة**  
Erratique (F). Erratic (E).  
تمت تعريفه يطلق على كل طائر ليس بأبنة او قاطع بل يجوب البلاد من منطقة الى اخرى في طلب الرزق . ج ضوارب .

١٦٦٩٨ - **ضايطة**  
Multipliant (F). Multiplying (E).  
ج ضوارب .

١٦٦٩٩ - **ضايطة**  
Procrustes (S). Procruste (F).  
جنس عنقاص مفيدة من فصيلة البرطانيات ورتبة مفدمات الاجنحة . انواعها عديدة جميعها كبيرة الجثة طولها يراوح بين ٣٠ و ٤٠ م . اثنائها الى السواد النحسي . تفرح في الليل وتفرس الكثير من الحشرات والمواد الضارة .

١٦٧٠٠ - **ضايطة**  
جنس البات : يكثر بالقنيس والقنيس اول الحج .

١٦٦٩١ - **ضايطة**  
Agelaius (S).  
Troupiale (F). Bobolink (E).

جنس طير من فصيلة الكاروبينيات . انواعه المعروفة اربعة . جميعها من قواطع القارة الامريكية تحضي فصل الشتاء والبرد في الاقاليم الحارة من امريكا الوسطى والجنوبية وفصل الصيف في امريكا الشمالية . نطالها الحياتي جامي . اسرارها وافر البند || اجسامها متوسطة القد طولها من ٢٤ الى ٢٩ سم . مناقبها مخروطية ، مستطلة الاطراف . اجنتها مستطيلة . اذناها مستديرة الاطراف . اسافلها معتلة الارتقاع . اثنائها سوداء اللون او كستنية . اكثافها ، اي لواحش اجنتها ، صفراء اللون او حمراء . اثنائها اصفر قدماً من ذكورها واهت اثنائها متبا || تألف الاجسام والمستنقعات ويجاري الماء . قوتها الحشرات والحبوب والبلودور . تقسم حقول الحنطة والارز والنقم .. فتقع بها اشد الانثى || اعرف انواعه واشهرها ضايطان آخر الشريط .

١٦٦٩٢ - **ضايطة البحر الشريط**  
Agelaius phoeniceus (S).

Troupiale à épaulettes rouges (F).  
طائر من الضايطان القواطع يجوب امريكا الوسطى والشمالية في طلب الحصيد والمضي . يأنث الاجسام ويجاري الماء والمستنقعات . سريره وافر البند || جسمه معتدل القد بطول نحو ٢٥ سم . ذوب الذكر الى السواد الاحمر الاسف . لواحش منكبها الى الحمرة الازرقولية . حلقة حبه كستنية الكون . مناقبه وساقاه الى السواد الازرق المالح . الانثى اصغر قدماً من الذكر ، قطرها نحو ٢٢ سم . ذوبها الى الكهبة تعلوها في صدرها وبنها رقعة سوداء || اخلافه مرسة ، فرحة ، آتمة . قوته الحشرات والحبوب || يثن عشه في الاشجار النارية على الماء . عشه قدسي الشكل رفيع الجانب . الاثني تحضن مرتين في الحول وتضع في كل



ضايطان احمر الشريط



ضارية

١٦٧١٣ - ضَبَاب (F). Oxypetalum (S).

جنس نباتات برية وتربيتية من فصيلة الصقلابيات. أنواعه ثلثة، سوقها مستقيمة. أوراقها متعاقبة، ممتعة، أحليجية النصل، قلبية القاعدة. أزهارها مستطيلة الأنبوب القارضة. الوحدة ضبابية || أشهر أنواعه الأترينية ما يلي.

١٦٧١٤ - ضَبَاب أَرْزَق (F).

Oxypetalum coruleum (S). Oxypétale bleu (F). نوع من الضباب وهي حشبة حولية تطلع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. ساقها ليفية فراء. أوراقها زبابة النصل حل صفحية. أزهارها تبدو زرقاء اللون ثم يتغير إلى أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٥ - ضَبَاب كَثِير الزَّهَر (F).

Oxypetalum solanoides, Tweedia floribunda (S). Oxypétale fleur-solanum (F). نوع من الضباب وهي حشبة ممرعة تطلع نحو ١٨٠ سم. ساقها غشوية فراء. أوراقها زبابة النصل حل صفحية. أزهارها زرقاء اللون يعلوها بتيجع وردي || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٦٧١٦ - ضَبَاب (F).

الضباب مجموعة كواكب كثيرة العدد أسفل من بنات نعل.

١٦٧١٧ - ضَبَابَة (F). Nivenia (S).

Nivénie (F). Nivenia (E). جنس نباتات حشبية تربيتية من فصيلة السوسنات. مهيذا بعض مناطق أفريقية الجنوبية. جلودها درنية. سوقها مبطلة، مستقيمة، قليلة الفروع ترتفع نحو ٦٠ سم. أوراقها سانية مشرعة النصل. أزهارها حلقي التجميع. أزهارها إلى الزرة الساجية. ثنائياتها بينة اللون || أنواعه المروعة اثنتان للآبارق بينها سوى شكل الأزهار وعدد الأجزاء ولونها || تنموه يستمر من الربيع إلى الخريف.

١٦٧١٨ - ضَبَابَة (F). Spadice (F).

Spadice (F). Spadix (E). الطلعة قبل أن تفتق من القريض.

١٦٧١٩ - ضَبَابَة، لَيْم (F). Cri du hibou (F).

Cry of the owl (E). صوت البوم.

١٦٧٢٠ - ضَبَاب (F). Cendre brune (F).

Brown ashes (E). هو الرماد الاسمر اللون.

١٦٧٢١ - ضَبَاب، ضَبَاب (F). Spadice (F).

هو حجرة جوز بوز.

١٦٧٢٢ - ضَبَاب (F). Dendromecon (S).

Dendromécon (F). Dendromecon (E). حشبة ممرعة من فصيلة النضبات. ساقها فراء. تطلع نحو ٢٥٠ سم. أوراقها أحليجية النصل، بحرية الخضار، ثلاثية القروعة، تطلع من ١٢ إلى ١٥ سم. أزهارها صفراء اللون، تطلعها يراوح من ٣ إلى ٧ سم. || تزدها قترين. تنموها يستمر من أواخر آذار إلى أواخر حزيران.

١٦٧٢٣ - ضَبَابَة (F). Galacantha (S).

Galacantha (F). Galacantha (E). جنس حيوانات بحرية من القشريات مشاريات الأرجل طوال الأبد وفضيلة الضبابات. أنواعه المروعة خمسة منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة ||

١٦٧٠١ - ضَبَابِين (F).

الضبابين من الخيل الذي لا يعطي ما عنه من الجري إلا بالغرب.

١٦٧٠٢ - ضَبَاب (F). Zizyphus lotus, Rhamnus lotus (S).

Jujubier sauvage, J. des lotophages, Lotus des aschiers (F). Lotus tree, L. Jujube, Wild jujube (E). Lotzebaum (D). Giugliolo salvatico, Loto dei lotofagi (I). حشرة حشبية ثلاثية من فصيلة النضبات. كانوا يقسموها في الزمان الثمار ويمزون إلى ثمارها حدة فضايل نضباتية وصحية. ثمارها صلبة القد، حشوية الشكل واللون، لليلة العظم. ثمرتها يغيد السفر ويقويه.

١٦٧٠٣ - ضَبَاب (F). Connectif (F).

نمت تمرني يطلع على بعض السج الحويانية المنسدة المنسدة.

١٦٧٠٤ - ضَبَاب (F). Ovis aries (S).

Mouton, Ovin (F). Sheep, Ovis (E). جنس حيوانات داجية مجترمة من فصيلة النضبات ترقى للضباب والصوف والخليب. للواحد ضبان للذكر وضبانة للإناث. والذكر القمل يعطي كيشاً والناث نمجة وشاة. أنواعه معروفه كثيرة العدد لا مجال للذكرها وتعليلها في هذه الموصوفة.

١٦٧٠٥ - ضَبَاب أَلْبَان (F). Ovis aries stantopyga (S).

Mouton à queue grasse (F). ضبان ذو آية وهو من السلالات المروعة في الشرق الأوسط وأوسط آسيا.

١٦٧٠٦ - ضَبَابَات (F). Ovinés (F).

الضبابات أو الضبابية اسم قسي فصيلة النضبات.

١٦٧٠٧ - ضَبَاب (F). Imperméable à l'air (F).

هو ما كان لا يتغلغل الهواء. راجع شيف.

١٦٧٠٨ - ضَبَاب (F). Uromastix (F).

حيوان من الزحافات يشبه الورل. موطنه البلاد الحارة يكثر في الجزيرة. يطلع نحو ٤٠ سم. وهو يبيع الحية والشكل، صغير الرأس، قصير العنق، مستطيل الذنب الأخرى المقعر المقلد. لونه إلى الصبغة وهي فيرة مشرعة سوداء. وأذنين أصفر صلب. يطلع يقض في الرمل فينتفضر بعد وضعه بارهين يرباً || قوته الجندب والذباب والقشيب. والغرب يمرضون على صيده وأكله. كنهه أبو حل. انشاء كنهى قبة وجهه ضباب وأشب وضبان.

١٦٧٠٩ - ضَبَاب (F). Brouillard, Brume (F).

Fog, Haze (E). غبار ماء كالغي سريح الانتشار يتكاثف قرب سطح الأرض فيضها ويصحب البرودة. أسبابه عديدة أرسسها: مرور دياح دافئة رطبة فوق سطح بارد أو اختلاط دياح حارة رطبة بغيرها أبرد منها.

١٦٧١٠ - ضَبَابَات (F). Griffe de lion (F).

Claw of lion (E). القشيب والقشيب والقشيب: برائن الأسد.

١٦٧١٢ - ضَبَاب (F). Glattement du cénard (F).

Yelping of the fox (E). هو حوله الضباب.



١٦٧٣٠ - ضَبَبَة عَشْرَاء \* عَشْرَاء

*Hyana brunnea* (S). *Hyana brune* (F). Brown hyana (E).

نوع من الضبب طوله نحو ١٠٥ سم. وذنبها ٤٢. ثوبها مستطيل الشعر الخشن الحلي الشكل. نزلها إلى السرة المائلة الحلقية الحاج، يملونها بجلد أصهب يفرض الظفر ورشفة غبراء ككتف الرأس والصدر والسيقان. موطئها للآدم الأفريقية الجنوبية الشرقية على البحر.

١٦٧٣١ - ضَبَبَة مُجَدَّه \* عَشْرَاء

*Hyana striata* (S). *Hyana strida* (F). Striped hyana (E).

نوع من الضبب طوله نحو ١٠٧ سم. وذنبها ٤٥. ثوبها إلى الزبدية الصفراء الحاج يملونها بجلد أصهب أسود. عرضها على الشعر، أسود اللون، يمتد من نقرة الرأس إلى الذنب. رأسها غليظ اللد. غروطي الشكل، أسود الحمر وما يليه من القلق. أذناها كبيرتان ذلقتان. ذنبها جمل الصوف. موطئها يمتد من اللد إلى تركيا ومن البلاد المراكشية إلى شواطئ أفريقية الشرقية.

١٦٧٣٢ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Hyana mla* (F). *Hyana mala* (E).

الضبان ذكر الضبب وإذا نثت قلت ضببين. والآن ضبانة وألعب ضببانين وضبانات.

١٦٧٣٣ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Hyenidae* (S). *Hyenidae* (F). *Hyenidae* (E).

فصيلة الضبب من رتبة اللوام تشمل الضبب والسيار.

١٦٧٣٤ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Almeife* (F).

الضبان والضبان هو الأبط، أطله.

١٦٧٣٥ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Famile* (F). *Family* (E).

مجموعة أفراد العائلة الواحدة من الحيوان.

١٦٧٣٦ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Lopus albomarginatus*, *L. sulcatus*, *Calocoris albomarginatus* (S). *Lope laboureur*, *Grisette*, *Margotta* (F).

حشرة من الضببات صنعة اللد مسطوية الجسم الرغوي. طولها نحو ٧ سم. ثوبها إلى السرة للونحة بخطوط صفراء وحلوة. الذكر كوز الابنعة. أما ابنة الابنعة فصغيرة الحجم لا تفكها من البطن. تركب الكرمة فتؤذي البرعة الزهرية والزهرية والحلوة به التبار. يمتدحها دقيقة الجسم تبعد عنه نطقها مرجانية اللون، رنانة الأرجل ثم تنصرف إلى الصفرة المائلة بالابيض وقد يكون ذلك حته بلونها الإسلاخ الأخير فبروح. إذ ذاك، طولها بين ٢ و ٣ سم.

١٦٧٣٧ - ضَبَبَة مُخَطَّطَة \* ضَبَبَة مُخَطَّطَة

*Calocoris strizus* (S). *Calocoris strid* (F).

حشرة غاشقة من فصيلة الضببات. جسمها مستطيل القبط، يمتد من ١٥ إلى ١٢ سم. رأسها صغير مزواني اللون. خطها مستطيل اللون. جنتاها صفراء نازقة. زياتها مسطوية. كسها شبه يرمي. لاحت. جنتها حمراء صغيرة. ظهرها شبيه لاحت. جنتها مسطوية. ثوبها إلى الخضار الأصفر الحاج، يملونها في رأسها شمة حمراء، وفي كسها وجنتها تنطبق

اجسامها مبطلة متوسطة اللد طولها من ٢٠ إلى ٣٠ سم. تتميز بذكر السمارس الذي يتوسطه منخن صلب ساد، وبذلة القرون الاستشعارية الشديدة الطول في لحيوها مأكولة جيدة الصنف.

١٦٧٣٨ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Heliosperma* (S). *Heliosperma* (F). *Heliosperma* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الترفليات. مهدا بعض أقاليم حوض البحر الأبيض المتوسط. سيقانها نحلة. أوراقها صغيرة. أزهارها بيضاء اللون. تزهر للترين بين الصغور. ترطب في الأثرية الكلسية في أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية:

١٦٧٣٩ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Heliosperma montana* (S). *Heliosperma de montagne* (F).

نوع من الضببية. عشبية معمرة. ساقها نحلة تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها مصلبة الشكل طولها نحو ٤ سم. وترطب نحو ٨ م.

١٦٧٤٠ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Heliosperma quadrifidum* (S). *Heliosperma à 4 lobes* (F).

نوع من الضببية. عشبة مخضرة معمرة. ساقها نحلة تملو من ١٥ إلى ٢٠ سم. أوراقها عطيفة، دقيقة الحجم، طولها نحو ٢ سم. وترطب نحو ١ م.

١٦٧٤١ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Rat*

الضبب هو طاب الاثنى لا ذكر في الحيوانات الحرة المصفا الأبل، ضبمت وأضبمت الثلاثة: أرادته الضمل.

١٦٧٤٢ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Hyana* (S). *Hyana* (F). *Hyana* (E).

جنس حيوانات مفترسة من فصيلة الضببات ورتبة اللوام. أنواعها ثلاث موطئها العالم القديم. تتميز بطنها القوية النشبة من جثث الكلاب الكبيرة. شعورها وأذناها قصيرة، ورؤسها غروطي الشكل حلوة. امتلها متوسطة اللد. قوائمها الاسامية أبيض من الخلفية فنيو كان ظهورها مستعدة إلى البراء. أي تبني من القرواس التي تسرح في الليل. ثوبها الجلب وظاهها التي تسحقها بها بثلث ثمنها. صباها شبه الضمك ويدس الشعر. والضحك مؤذنة ج أصعب وضباب وضع وضع وضبابات. ولا يقال ضبة للذئب بل ضبانة. وضبب الضبب أصعب. ومن أسماء الضبب الجليل والجلبار والحفصة والغزل والخضار. ومن كسها أم خنور وأم حامر وأم دهل وأم نول وأم القنور. وأم زبل وأم حنوف وأم دهل وأم دهم وأم جبار. ولا ذكر أبو حامر وأبو كلفة وأبو الحنبر وأبو غنل.

١٦٧٤٣ - ضَبَبَاتَان \* ضَبَبَاتَان

*Hyana crocuta* (S). *Hyana tachee* (F). *Spotted hyana* (E).

نوع من الضبب وهي أكبرها جثة، طولها نحو ١٥٠ سم. وذنبها ٣٥ سم. ثوبها إلى الصفرة الرمضاء للونحة بالاسمر. ترقق القلوب بين قاتمها الاماريتين والخلفيتين لا يتعد ١٥ سم. أذناها صغيرتان مستديرتان. ذنبها قليل الشعر. موطئها فسحح الأرباء بم ثلاثة أخماس الأثرية الأفريقية.



ضَبَبَة رِيَابِيَة فَتَلَق



ضَبَبَة رِيَابِيَة



ضَبَبَة جَلَحَة



ضَبَبَة الكَرْمَة

كثرة الازوت وقلة النيتروجين . ثانياً كثرة الرطوبة الجوية والحراة . ثالثاً الظل . الخ.

#### ١٦٧٤٧ - ضُبُوبَة \* Patersonia (S).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السوسيات . مهدا استراليا . سوطها جذمية قصيرة . اوراقها خضيفة النصال الجامدة . شواذها مائسة . ازهارها سليل التجميع . ازهارها ملونة بقلابات كبيرة زرقاء اللون تتألف من اثني عشر بتلات وثلاث بتلات خارجية كبيرة الحجم غافرة وثلاث بتلات داخلية دقيقة صغيرة متصبية || تزود الأزوين ضمن الليوت وفي الحقائق . ترضب في الاقوية المعتدلة الانماج الزائرة الخصب || انواعها المعروفة قليلة العدد اسموها التالية :

#### ١٦٧٤٨ - ضُبُوبَة نَاعِمَة \* Patersonia sericea (S). Patersonia soyauze (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع نحو ٣٠ سم . اوراقها مزغبة الخفاف تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقاء البنفسجية المواج . قناباتها الزهرية مستطيلة الزغب القاتم || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٦٧٤٩ - ضُبُوبَة هَزِيلَة \* Patersonia fragilis (S). Patersonia fragile (F).

نوع من الضبوبة . شواذها يرتفع من ٢٠ الى ٣٠ سم . اوراقها تطول من ١٥ الى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٥ م . ازهارها الى الزرقاء الجميلة . قناباتها الزهرية مرطاة . بتلاتها الخارجية اميلجية الشكل تطول نحو ١٠ م . بتلاتها الداخلية تطول نحو ٣ م . || تنويرها يستمر من ايار الى آب .

#### ١٦٧٥٠ - ضُبُوبَة \* Malaptera (S).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهديات الارجل وفصيلة الكنثيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || اصداؤها صندرة القد وشعيرة مخزنة . فروعها معتدلة الانفرج وباربعة الفلج اللسانية التي تبدو كاربيل الارز شككاً وحظاً .

#### ١٦٧٥١ - فيج Insolation, Luminosité (F).

Sun-stroke, Luminosity (E).  
الضج غرة الشمس على الارض وهو تقيض الظل .

#### ١٦٧٥٢ - ضُبُوبَة \* Rhagonyque (F).

حشرة من القراحات تكسى رقيق ، اظلم .

#### ١٦٧٥٣ - ضُبُوبَة Cri du singe (F).

Cry of the ape (E).  
صوت القرد .

#### ١٦٧٥٤ - فيحل Etage (F).

Low-water mark, Lowest water level (E).  
هو البروض ، المستوى الادنى لياه بحر او نبع . وهو المياه القليلة المسك بها كان مصفراً .

اسود . ظهراتها الى الطحلة الرمادية . ورضها عشائي ، قسطنطين  
الذين عند الانتشار . بتلها وينها الى المسرة || تألف  
الحراج والمواقع التي يكثر فيها الشبان .

#### ١٦٧٥٨ - ضُبُوبَة

الانثى الضيقة الاحليل ، الصعبة الوضع من البقر والتم  
والماز .

#### ١٦٧٥٩ - ضُبُوبَة كَرِيْفِيَّة \* Laccocleia cretica (S).

Laccocleia de Crète (F).  
نبات عشبي يري معمر من فصيلة النجيليات . منته  
جزيرة اكريت وبيال لبنان من ارتفاع ١٠٠٠ الى  
١٨٠٠ متر من سطح البحر || ساقه متصبية فراءة ،  
اوراقه مركبة ، وريشية ، السفلى مستطيلة اما العليا  
قصيرة . ازهارها صولاني التجميع ، تاجي . الانثى  
ازهارها صندرة تيفية اللون . ثماره يضيء الشكل ، حسيكة  
القشار ، ثنائية الفلج || تنويره ربيعي .

#### ١٦٧٤٠ - ضُبُوبَة \* Unileites (S).

Unileites (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مضطربات الارجل  
وفصيلة الكنثيات || انواعها المعروفة عديدة . جميعها من  
متحجرات الطبقة الارضية الاولى .

#### ١٦٧٤١ - ضُبُوبَة \* Brachyculeus (S).

Brachyculeus, Brachycule (F).  
جنس حشرات من فصيلة الضبوبات ، انواعها المعروفة  
اربعة جميعها صندرة القد بنية اللون الجاهج والموش بالاسمر  
والاخير . وراقها خضيفة اللون ، مراء المواج || تركيب  
مع رفاقها معظم التبيليات البرية انحصا التجميل والتنجير  
والأرنا خصص صارة الارواق وتلويها .

#### ١٦٧٤٢ - ضُبُوبَة مُعَرَّجَة \* Brachyculeus triangularis (S).

Brachyculeus triangulaire (F).  
حشرة غاشلة من فصيلة الضبوبات . جسمها صندرة القد  
يطول نحو ٨ م . رأسها مستعرض الفلج ، محرم ، بني  
اللون . خطها معتدل الجرم . عواذها صغيرتان . زباناها  
قشبان ، اسفان . كسلها بني اللون ، اسود الطوق .  
حجبتها صندرة سواد . ظهراتها لاصف . اورد اللون .  
بتلها الى المسرة السوداء . فروعها سيد الانفاذ والازراع ،  
بنية الفلجاني || تألف البراري حيث تكثر نباتات فصيلة  
المركبات انحصا الضفهاء .

#### ١٦٧٤٣ - ضُبُوبَة Ivoire (F). Ivory (E).

هو الما ، اظلم .

#### ١٦٧٤٤ - ضُبُوبَة

الضباب : صمغ يركل . وكل جيرة يسم بها الطير وقيل  
السباع .

#### ١٦٧٤٥ - ضُبُوبَة

و نبات كالفستاييس الا انه اعطى مربع التقيض يصير  
مارو في القرن الرابع فيليب || (السان) .

#### ١٦٧٤٦ - ضُبُوبَة شَمَل Verse (F).

Beat down (E).  
عارض يصيب الزرع فيستلقي على الارض . اسبابه  
عديدة امها عدم ازنان المتنامر التلقائية في التربة انحصا



نسيث



فستج



ضبوبة هزيلة

Contributions (F).  
Tax or rate (E).

في الاموال التي يجب على كل مكلف دفعها مساهمة  
ليساهم في النفقات العامة . وقد تكون ضريبة وقارية .

١٦٧٦٩ - ضرائب غير مباشرة

Contributions indirectes (F). Indirect taxes or  
excise (E).

في الضرائب غير المقررة التي تدفع بمناسبة على معين .

١٦٧٧٠ - ضرائب مباشرة ، ضرائب مقررة ،

وَرَبْعَةٌ

Contributions directes (F).

Direct or assessed taxes (E).

في المعاليد الثابتة أي الضرائب المصنفة بصفة الاستقرار .

١٦٧٧١ - ضرب

Multiplication

ضرب عدد في غيره .

١٦٧٧٢ - ضرب

Variétés (F). Variety (E).

الضرب ج ضرب في افراد حيوانية او نباتية من نوع

واحد تتميز بصفات خاصة فيزيولوجية وشكلية مثلًا

ضرب الفلح الساركون .

١٦٧٧٣ - ضرب هو العود ، اطلبه .

١٦٧٧٤ - ضرب دم ، مكتشفة ، حَبْطَةٌ

Apoplexie, Coup de sang (F). Apoplexy (E).

اسم شائع يطلق على غثط الاعراض التي تسبب عدم

الادراك القهالي . وضربة الدم قد تكون اما زحف او وضع

او انسكاب دموي في النسبة للمغ أو غيره .

١٦٧٧٥ - ضرب نخس في الرن ، اطلبه .

١٦٧٧٦ - ضربة

Mamelle (F). Breast (E).

الضربة في اصل الثدي وهي ايضا للفرع كله .

١٦٧٧٧ - ضرر

Dommage (F). Damage (E).

هو الاذى المادي والادبي الذي يقع على النفس او على

المال .

١٦٧٧٨ - ضرب ، فاحط

Molain, Mischellière (F). Molar, Grinder (E).

اسم اقسام الانسان الثلاثة وهي القواطع والانياب والافراس

وتعرف الافراس بالانواط لانها تنجد الطعام قبل اسياله

الى المعدة . اما مدحها فيختلف مع فصيلة الحيوان ويجه .

وهي في اول عهدنا تدعى لينة ثم تزول لتصل لمحلها الثانية

التي تتميز بسطورها المتعددة .

١٦٧٧٩ - ضرب الحنجر

هو الحسك ، اطلبه .

١٦٧٨٠ - ضربة

Nyctaribia (S).

Nyctaribia (F). Nyctaribia (E).

جنس حشرات راشنة من فصيلة الضربيات ودية ذوات

المناسين . انواعها المعروفة ١٦ منتشرة في مناطق البلاد

الاستوائية والحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة ،

مبطلة طول نحو ٣ م . وروسها صغيرة ، مزوانية الشكل ،

قليلة التشويز . عيونها شديدة الصغر اعطائها ثقلية ،

ماسكة . وهي عذبة الجناح والزران . قوائمها نثيفة .

اجسامها وقوائمها مجهزة ببص الحسك ، الحنين الطويل ||

تصلط على الطولويط وانغنايفس .

١٦٧٥٥ - ضربة

Lepturus (S). Lepture (F).

جنس نباتات عشبية برية ، معروية ، حولية او مسرة

من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في

جميع المناطق الحارة من المائلين القدم والجديد || جميعها

شدية ، صغيرة ، متكاثفة النصف ترتعها للماشية فيجود

درما وتسن عليها .

١٦٧٥٦ - ضربة

Orthogoriscus (S).

Orthogorisque, Môle, Molide (F). Sun-fish (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة السمكيات . اصنامها مياه

بحار المناطق الحارة . انواعها المعروفة ثلاثة جميعها غريبة

الشكل تبدو كأنها مقطوعة المؤخر . اجسامها غليظة

مطلقة طول من ٧٠ الى ٢٠٠ سم . زمانها القهرية

والبلنية مسطحة لتلاصق الفرجية القصيرة المرفوعة .

انثياها الى الصبهة للتلاد . ولونها فضية ، زمانها صر .

لونها مأكولة عادية وينهم من اعتبرها دون المادي .

١٦٧٥٧ - ضربة

Mollusca, Orthogoriscidae (S). Molluscs, Orthogoriscidae (F).

Mollusca, Orthogoriscidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من حيوانات الانسان ودية ملحويات

الذك . اجسامها ثلاثة . اصنامها مياه بحار المناطق الحارة .

جميعها غليظة الشكل ، خضة ، مبطلة ، مقطوعة المؤخر .

اشهر اجسامها الضمة .

١٦٧٥٨ - ضربة

Photoperiodisme (F).

Photoperiodism (E).

تأثير الضياء والاحتام في شراع النبات وينش انفعال النبات

من استجابة النهار أو الليل .

١٦٧٥٩ - ضخمة الرأس

Macrocephale (F).

Macrocephalous (E).

ذو رأس أكبر واظم من المعتاد . رأس .

١٦٧٦٠ - ضربة

Cramilobé (F).

لثت وصفي يطلق على كل نبات مستضخم الفلقة .

١٦٧٦١ - ضربة

هو الدلب اللبقي ، اطلبه .

١٦٧٦٢ - ضرب

Lutte (F).

زمن التزاو أو استانه عند انشأن والممز .

١٦٧٦٣ - ضرب ، مضطرب

Mots (F). Serving (E).

نزو الذكر على الانثى في الحيوانات العواجن .

١٦٧٦٤ - ضرب

هو الضرب ، اطلبه .

١٦٧٦٥ - ضرب

Brindille (F). Sprig, Twig (E).

هو دقيق الحطب ويقل ما ضعف ولان من الحطب الذي

يسرع اشتعال النار فيه ويقل ما لا بحر له وما له بحر

فهو جزل .

١٦٧٦٦ - ضربة

Pyrométrie (F). Pyrometry (E).

قياس درجات الحرارة الشديدة الارتفاع .

١٦٧٦٧ - ضرب

هو الضرب ، اطلبه .



ضمة

Mamelle, Pis (F).  
Breast, Udder, Dug (E).

### ١٦٧٨٨ - صُرْمَع

هو مدرّ اللبن عند البقرة والشاة والماعز .

### ١٦٧٨٩ - صُرْمَعَه ، صُرْمَعِيْ

هي النظية الصُرم من البقر والشاة والماعز وغيرها .

Mammaire (F). Mammary (E).

### ١٦٧٩٠ - صُرْمَعِيْ

لعت تمرّين يطلق على كل ما له صلة بالصُرم .

### ١٦٧٩١ - صُرْمَعِيَّات ، قَدِيَّيَّات ، لَبَنِيَّات

Mammifères (F). Mammifères (E).

أحد صفوف الحيوان الخمسة ، تميز بالثداء إناتها الرضعة ، يوضع الأولاد أسناء ويجهزها التنفسي الذي لا يخلو من اللثة . لذلك فهي تحتل مركز الصدارة بين الحيوانات الفقيرة || رتباً ١٤ تنتمي إلى شصتين المشفيات واللامشفيات .

### ١٦٧٩٢ - صُرْمَعِيْ \* ، صَبَّو الصُرْمُوع

Mamillaria (S). Mamillaire (F). Mamillary (E).

جنس نباتات لحية مسمرة من فصيلة الصباريات . أنواعها المعروفة زهاء ١٥٠ منبتها البلاد الأمريكية . معظمها زينة يزرع لفرابة أشكاله وحسن أزهارها وروائحها وجمالها .

### ١٦٧٩٣ - صُرْمُومُوس

هو الخدين الماء ، أطله .

Codium (S).

### ١٦٧٩٤ - صُرْمُوط \* ٥

Codie (F). Codium (E).

جنس نباتات بحرية من الخفيات الخضراء . أنواعها المعروفة قليلة العدد . أقطابها بجوار البلاد المعتدلة الحارة || جميعها أسلنجية التركيب ، غطائية ، عادمة الأوراق .

### ١٦٧٩٥ - صُرْم

٥ حجر يشبه الآثاب في منطه وروحه وله ثمر أبيض مدور مفلطح كعين الحماط الحصار يفسر (السان) .

Gourde (F).

### ١٦٧٩٦ - صُرْم

هو القرح الطويل ، أطله .

Querrellet (F).

### ١٦٧٩٧ - صُرْم

الصُرم هي الخوازي البحرية ، نبات طبي طيب الرائحة أزهاره مشربة بحبرها للسل .

Aiglon (F). Eaglec (E).

### ١٦٧٩٨ - صُرْم

هو قرخ الغراب .

Acidanthers (S).

### ١٦٧٩٩ - صُرْمُوم

Acidanthère (F). Acidanthères (E).

جنس نباتات عشبية دفيضية من فصيلة السونيات . منبتها بعض المناطق الأوربية . سورها دقيقة ترتفع من ٢٠ إلى ٣٠ سم . أوراقها عسفية اتصال معتدلة الطول ، بحرية الخضار . أزهارها عقودية التجميع . أزهارها مستطيلة الأنايب ، سداسية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة ثلاثة ، أشهرها التالية :

### ١٦٨٠٠ - صُرْمُوم أَصْفَر

Acidanthers lutes (S). Acidanthères jaune (F).

نوع من الصُرْموم . ساقه دقيقة ترتفع نحو ٣٠ سم . أوراقها عسفية اتصال البحرية الخضار . أزهارها كبيرة القد ،

Nycteriblides (S).

Nycteriblides (F). Nycteriblides (E).

فصيلة حشرات راشنة من رتبة ذوات الجناحين . أجسامها وأناقها المعروفة نحو ٦٥ منتشرة في معظم مناطق العالم . أجسامها الاستوائية والحارة || أجسامها صغيرة معتدلة الطول من ٢ إلى ٤ سم . رؤوسها مزوالية الشكل ، شبه مدسمة . عينها شديدة الصغر . قوائمها نشيطة . جميعها عادمة الأجنحة ولقرزان || جميع أنواعها راشنة تعيش على الفواطيخ والخفافيش || أشهر أجناسها القفرسة .

Gelsorrhiza (S).

Gelsorrhiza (F). Gelsorrhiza (E).

جنس نباتات عشبية دفيضية من فصيلة السونيات . مهدا بعض مناطق أفريقية الجنوبية . أوراقها ضيقة اتصال السيلية الشكل أو الخيطية . أزهارها سفلى التجميع يركن على شراخ قصير . أزهارها قبة الشكل ، متساوية البتلات الملونة || أنواعها المعروفة عديدة معظمها برقي وبضها زرامي تركبي ، أشهرها التالية :

### ١٦٧٩٣ - صُرْمُومَة بَصِيْغِيَّة الرُّوك

Gelsorrhiza ovata (S). Gelsorrhiza à feuilles ovales (F).

نوع من الصُرْموم الزرني . أوراقها بيضية الشكل قليلة العدد الذي لا يتجاوز ٤ فصلاً عابقة الخضار المنتصب بالأسود . شراخها يرتفع نحو ١٥ سم . وينتهي بسيلة ودلة عديدة الأزهار . أزهارها بيضاء اللون ، صغيرة القد ، قطرها نحو ٢٠ مم . || تنويرها يستمر من نيسان إلى أيار .

### ١٦٧٩٤ - صُرْمُومَة كَسْبِيَّة

Gelsorrhiza secunda (S).

Gelsorrhiza monotrope (F).

نوع من الصُرْموم الزرني . أوراقها غيظية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي بمجموعة الأزهار السيلية الترتيب . أزهارها بنفسجية اللون ، متصلة الحجم ، قطرها يراوح من ٢٥ إلى ٣٠ مم . || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

### ١٦٧٩٥ - صُرْمُومَة مَتَوَالِمَة

Gelsorrhiza humilis (S).

Gelsorrhiza modesta (F).

نوع من الصُرْموم الزرني . أوراقها غيظية . شراخها يرتفع نحو ٣٠ سم . وينتهي ببعض الأزهار المتتالية ، المتوسطة الحجم ، قطرها نحو ٣ سم . لنبا إلى الخضار الكثيف المشيز بالأحر || تنويرها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٦٧٩٦ - صُرْمُومَة نَشِيْطَة

Gelsorrhiza grandis (S).

Gelsorrhiza robusta (F).

نوع من الصُرْموم الزرني . أوراقها سيفية الشكل مستطيلة شراخها تثنى ضلع مدور يرتفع من ٢٥ إلى ٣٥ سم . أزهارها إلى الخضار الباهت التي الملوخ يطو تشيز وسطى أحر || تنويرها يستمر طوال شهر أيار .

### ١٦٧٩٧ - صُرْمُوط

٥ دابة بين الكلب والذئب أو بين الكلب والسنور (م).



صُرْمِيْ



صُرْمُوط

سداسية البتلات التي تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الكبريتي يملو تمسح برتقالي ناري الملمع || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران .

١٦٨٠١ - فُتُرو هو البطم الشرقي ، اطلبه .

١٦٨٠٢ - فُتُرو Limier (F). Bloodhound (E). الاثنى عشرة ج شواء . والفُتُرو كلب كبير الجفة شديد المراس يستندم في سيد الوشوش .

١٦٨٠٣ - فُتُروغ الفُتُروغ : الصنوبر من كل شيء

١٦٨٠٤ - فُتُري \* Polygama (F). Polygamist (E). صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفه كل نبات يحصل ازهاراً خشوية وذكرية واكثرية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - فُتُريكة Impôt (F). Impost, Tax (E). الضريبة هي حصص اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي لكل اسلوب تتبين به التكاليف العامة على الملكيين . والضرائب عديدة تخص منها :

ضريبة استدلالية  
ضريبة الارباح الاستثنائية  
Impôt sur les bénéfices exceptionnels

ضريبة البلدية  
Impôt municipal

ضريبة التراكات  
Impôt de succession

ضريبة التمتع  
Patente

ضريبة الدخل  
Impôt sur les salaires

ضريبة الدخل العام ، ضريبة الربع  
Impôt général sur le revenu

ضريبة الطرق ، بدل الطرق  
Prestation

ضريبة القيم المنقولة  
Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

ضريبة التصاب  
Impôt de quotité

ضريبة تصاعدية  
Impôt progressif

ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية  
Impôt dégressif

ضريبة توزيعية  
Impôt de répartition

ضريبة جزائية  
Impôt forfaitaire

ضريبة شخصية ، بدل  
Impôt personnel

ضريبة عقارية ، خراج  
Impôt foncier

ضريبة حقية  
Impôt réel

ضريبة غير مباشرة  
Impôt indirect

ضريبة مباشرة ، مقروءة  
Impôt direct

ضريبة نسبية  
Impôt proportionnel

ضريبة نفعية  
Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - فُتُريوف شُفُتُريوف

Multiple  
الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - فُتُريول Consanguinité (F). Consanguinity (E).

هو في اللغتين اسطفاً الاقارب فاستفادوا ذلك لاصح النسل او تحميمه او تكثيف بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - فُتُرياب Cri du lapin (F). Cry of the rabbit (E).

صوت الارنب اذا اخلت .

Portulacaris (S). ١٦٨٠٨ - فُتُريكة

Portulacaris, Pourpier en arbre (F).

شجيرة من فصيلة البرتليات . مهدا بعض المناطق الاريقية المختلفة الحاررة . ساقها متصبية تطو نحو اربعة امتار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، لاطئة ، مهيكة اتصال المماسية جميلة الخضار اللامع . ازهارها خضابة البتلات ، سداسية او سباعية الاسلية ، وودية اللون ، قطرها نحو ٣ سم . || تزرع التزيين .

١٦٨٠٩ - فُتُريسيات Trochilidae (S).

Trochilidae (F). Trochilidae (E).

فصيلة طير من الجوارثم مشقوقات المناقير . انواعها المعروفة عديدة ، زهاء ٤٠٠ موطنها معظم اصقاع العالم باستثناء القطبية . اكثر انواعها ، نحو ٩٠ ٪ امريكية المهد || جميع انواعها صغيرة الحجم ، جميلة الالوان التراكبية والزعانيف والاقواق || أشهر انجناسها الفُتُريس والبطونين والقطيل .

١٦٨١٠ - فُتُريع المجلدة على أنظم تحت البحر .

١٦٨١١ - فُتُريع Varech, Varac (F).

Varac, Sea-wrack, Sea-weed (E).

هو الفُتُريس نبات اعطى غثيف يرمي به البحر .

١٦٨١٢ - فُتُريك Vautour mâle (F).

Vulture male (E).

١٦٨١٣ - فُتُريوم Calorification (F).

Calorification (E).

الفرم احتاق بعض الحاررة من الجسم لان كل عمل يقوم به الجهاز الضروي يولد بعض الحاررة .

١٦٨١٤ - فُتُريوم Gommosa (F).

رسم يصيب الأشجار المنترة ويثيرها يمرض بالتصمغ ، اطلبه .

١٦٨١٥ - فُتُريالة Endogamie (F). Inbreeding (E).

التصاب بين اقارب من اصل واحد او بين النسل قفو واحد .

١٦٨١٦ - فُتُرية Echinops (S).

Echinops, Edinops (F). Echinops (E).

جنس نباتات زينة شائكة مسمرة من فصيلة الصباريات انواهم عديدة بعضها اسطوانية ، فضلة ، لحية ، فزوة الشثانة . سدائرها شائكة تركز على ثيج الاضلع . ازهارها كبيرة اللند ، جميلة الشكل والالوان تقوم حل شارينغ مستطيلة تكسيها الحرافف المرصقة القزابة . تزرع في المرائن لانها تخشى البرد .

١٦٨١٧ - فُتُريول Multiple

الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - فُتُريول Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

هو في اللغتين اسطفاً الاقارب فاستفادوا ذلك لاصح النسل او تحميمه او تكثيف بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - فُتُرياب Cri du lapin (F).

Cry of the rabbit (E).

صوت الارنب اذا اخلت .

١٦٨٠٢ - فُتُرو Limier (F). Bloodhound (E).

الاثنى عشرة ج شواء . والفُتُرو كلب كبير الجفة شديد المراس يستندم في سيد الوشوش .

١٦٨٠٣ - فُتُروغ الفُتُروغ : الصنوبر من كل شيء

١٦٨٠٤ - فُتُري \* Polygama (F). Polygamist (E). صفة كل حيوان ذكر يعيش مع عدة اناث . وصفه كل نبات يحصل ازهاراً خشوية وذكرية واكثرية على جذع واحد .

١٦٨٠٥ - فُتُريكة Impôt (F). Impost, Tax (E). الضريبة هي حصص اشتراك الفرد في نفقات الدولة العامة . لذلك فهي لكل اسلوب تتبين به التكاليف العامة على الملكيين . والضرائب عديدة تخص منها :

ضريبة استدلالية

ضريبة الارباح الاستثنائية

Impôt sur les bénéfices exceptionnels

ضريبة البلدية

Impôt municipal

ضريبة التراكات

Impôt de succession

ضريبة التمتع

Patente

ضريبة الدخل

Impôt sur les salaires

ضريبة الدخل العام ، ضريبة الربع

Impôt général sur le revenu

ضريبة الطرق ، بدل الطرق

Prestation

ضريبة القيم المنقولة

Impôt sur les revenus des capitaux mobiliers

ضريبة التصاب

Impôt de quotité

ضريبة تصاعدية

Impôt progressif

ضريبة تنازلية ، ضريبة انحدارية

Impôt dégressif

ضريبة توزيعية

Impôt de répartition

ضريبة جزائية

Impôt forfaitaire

ضريبة شخصية ، بدل

Impôt personnel

ضريبة عقارية ، خراج

Impôt foncier

ضريبة حقية

Impôt réel

ضريبة غير مباشرة

Impôt indirect

ضريبة مباشرة ، مقروءة

Impôt direct

ضريبة نسبية

Impôt proportionnel

ضريبة نفعية

Impôt cédulaire

١٦٨٠٦ - فُتُريوف شُفُتُريوف

Multiple

الحاصل من عدد مضروب في ذاته .

١٦٨١٨ - فُتُريول Consanguinité (F).

Consanguinity (E).

هو في اللغتين اسطفاً الاقارب فاستفادوا ذلك لاصح النسل او تحميمه او تكثيف بعض الصفات الخاصة .

١٦٨١٩ - فُتُرياب Cri du lapin (F).

Cry of the rabbit (E).

صوت الارنب اذا اخلت .



فُتُري

١٦٨٣١ - **سَمَط دَمَوِي** (F). Tension artérielle (F).  
Blood pressure (E).  
الضغط الدموي أو التوتر الشرياني هو قوة ضغط الدم على جدران الشرايين بفعل حركة القلب .

١٦٨٣٢ - **سَمَطِي** (F). Glapissement du lapin (F).  
Yelping of the rabbit (E).  
صوت الأرنب .

١٦٨٣٣ - **سَمَطِيَّة** (F). Luxuriante (F). Luxuriant (E).  
هي الغرسة الكثيرة الريانة وتُلبى الشفيرة من بقل وشب .

١٦٨٣٤ - **سَمَطِيَّة** (F). Cristatella (S). Cristatelle (F).  
جنس حيوانات طليعية من طائرات الشرج تعيش في المياه العذبة . الثواها متحركة .

١٦٨٣٥ - **سَمَط** (F).  
هي نارية الحطبة فراشة صغيرة القند سمراء اللون اذا لمست شري الجذع من لسعها وتذيق حراشفها . ج غفلة .

١٦٨٣٦ - **سَمَطَا** (F). Discoglossus (S).  
Discoglossus (F). Discoglossus (E).  
جنس ضفادع من فصيلة الضفاريات . أنواعه المعروفة خمسة ، أعطاهم تمتد من الهند الصينية إلى الشرق الأوسط وبعض البحر المتوسط . أجسامها صغيرة الحجم تطول من ٥ إلى ٨ سم . رؤوسها متوسطة القند . جبينها كبيرة نافرة . السنبا مستديرة الشكل . قليلة الحركة . أصابع قوائمها الخلفية قصيرة الحطاب الذي لا يتجاوز أنزاع الأول . جلدها عادية الناعمة والنعول ، شديدة العمة . الأنثى إلى السمرة الخفيفة يملؤها تزيج اسمر حادق وضط اصفر احمر تمتد من الرأس إلى العجز . وتحتل اسمران عايشان يمتدان من العنيتين إلى طرف الحلق . يطنها سوية الألوان الباهية يغلب فيها الحطلي الاخير . تعيش في المناطق الجارية الماء . تسرح في الليل . قنبا الحشرات والديدان . الإناث تسرا دعبها في الماء ضمن شللتين كل شلة تحوي من ٢٠ إلى ٣٠ دعبلة تتكثف بعد التمرلة بنحو ثلاثة اسابيع .

١٦٨٣٧ - **سَمَطَا مَلُون** (F). Discoglossus pictus (S).  
Discoglossus pictus (F). Discoglossus pictus (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة الضفاريات التي تحمل اسمه . جسمه صغير القند يطول نحو ٦ سم . عند الذكر ونحو ٨ سم . عند الانثى . رأسه متوسط الحجم . عيناه كبيرتان جاحشتان . حنكه واسع الشفق . مسن الفك العلوي . قاتمته الاماميتين رابعيسا الاصابع الطليقة . قاتمته الخلفيتين خامسا الاصابع المقيدة بخطاب قصير . جلده قليل الناعمة ، شديد البهتان . ثوبه إلى السمرة الخفيفة يملؤها تزيج اسمر وضط اصفر احمر تمتد من مقدم الرأس إلى طرف العجز ويبدتان كسكتيتان تمتدان إلى العنيتين إلى طرف الحلق . يطنه إلى الحطلي الاخير . يألف المنطق والتدن . يسرح في الليل . قوته الحشرات والديدان والذباب والحوم . يباه الشثوي يستمر نحو اربعة اشهر . يعبر من الضفادع النافعة .

١٦٨٣٨ - **سَمَطَا جِيَات** (F). Discoglossidae (S).  
Discoglossidae (F). Discoglossidae (E).

فصيلة حيوانات درداء قازية من لة القبيات ويرتبة

١٦٨٣٩ - **سَمَطَا** (F). Eurycaeros (S). Eurycaeros (F).  
طائر وحيد الجنس والنوع من الجواثم سنيات المنقار وصيلة الزرزوريات . موطنه جزيرة مدغشقر . جسمه معتدل القند شبه السمكة . ثوبه إلى السوداء اللامع . ذناؤه واباهره إلى السمرة الطليانية . منقاده أزرق اللون شبه غروبي الشكل . كبير ونظيف ولفظ مقدم الرأس كالكامنة . جناحه ذريا الاطراف . ذنبه مستدير الرقائل . قوته الحبوب والطار واخترت .

١٦٨٤٠ - **سَمَطَا** (F). Renardeau (F). Fox-cub (E).

هو ولد الثملة أي أنثى الثعلب .

١٦٨٤١ - **سَمَطَا** (F). Poinée d'herbes (F).  
Wisp of herbs (E).  
الضفت : تقيفة من حشيش غسطة الرطب باليابس . وكل ما ملا الكف من النبات فهو سَمَطَا . وضفت النبات : جعله اسفلتا .

١٦٨٤٢ - **سَمَطَا** (F). Roscoe (S). Roscoe (F).  
Roscoe (E).  
نبات عشبي نجيل الاروية من فصيلة الزنجبليات . مهدا بعض مناطق الهند والافغان . ساقها موقفة ترتفع نحو ٥٠ سم . اوراقها لامعة متعاقبة سنائية التصل بحرية الخضار انزاعيا سبلي التجميع . انزاعها صغيرة القند زرقاء اللون . تزود للقرين في الحدائق التي لا تفضي شدة القر .

١٦٨٤٣ - **سَمَطَا** (F). Poule (F). Hen (E).  
هي الدجاجة . ج . سَمَطَا .

١٦٨٤٤ - **سَمَطَا** (F). Pousée (F). Thrust (E).  
هو الطبع الاتي على جدار ما من جراء ككل التراب او الماء .

١٦٨٤٥ - **سَمَطَا** (F). Presson (F). Pressure (E).

١٦٨٤٦ - **سَمَطَا البَحَار** (F). Tension de la vapeur (F).  
Vapour pressure (E).  
هو قوة امتداد البخار .

١٦٨٤٧ - **سَمَطَا جَوِي** (F). Pression atmosphérique (F). Atmospheric pressure (E).

الضغط الجوي هو مقدار وزن الهواء في أي نقطة كانت سمته فوق سطح الأرض . وهو يقدّر حته سطح البحر بما يعادل ضغط هواء من التزيق ارتفاعه نحو ٧٦ سم . لذلك فالارتفاع عن سطح البحر يتعكس كمية الضغط كما هو الحال في الجبال حيث تقل كثافة الهواء التي تقرر الضغط . ويتأثر الضغط أيضا بميل الحرارة والرطوبة اذ كلما ارتفعت درجة الحرارة تمدد الهواء وضغط وزنه وكما زاد بخار الماء يزداد وزنه كذلك . وهذا الضغط الجوي يقاس بواسطة جهاز خاص يسمى المرواز (الباربوتر) .

١٦٨٤٨ - **سَمَطَا حَكُونِي** (F). Pression osmotique (F). Osmotic pressure (E).

اثبت العلم حل ان محتويات الحويصلات النباتية يد ان تأخذ كائنة مية من المحلول الملحي اللذائي تنفك من اللشاء الذي يحيط بها وتتقلص . فهذه البادرة الطبيعية الحيوية تسمى الضغط الحلو أو الانسلا .



سَمَطَا



سَمَطَا



سَمَطَا مَلُون



## ١٦٨٤٦ - هَفْدُغٌ أَحْمَرٌ \* هَدْمُولُ أَحْمَرٌ

Rana esculenta (S). Grenouille verte (F).  
Green frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله تشتمل معظم البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من الشرق الأقصى إلى الأندلس وأروية الجنوبية والوسطى والغربية وإفريقية الشمالية. جسمه صغير الحجم. الذكر أصغر حجماً من الأنثى. يطول من ٥ إلى ٦ سم. بينا تطول الأنثى من ٧ إلى ٨ سم. رأسه متوسط الحجم. خطمه مستعرض للشد. فكه السفلي عديم الأسنان. عيناه كبيرتان جاحشتان. أصابع قاتمته الأماميتين طليقة، أما أصابع الخلفيتين فليقة بحظاظ لا يتجاوز الزم الزم الثاني. جلده مائل البشرة الشائبة. ثوبه إلى الخضار القامق تلوين مائية حطية ورقيقة سمراء لاقياسية الشكل تكسّف الظهر والاطلاق والقرن من جوانبه الخارضية. ينقله إلى البياض الأخير. وهذا النوع من الضفادع يمان، يبيض الشيء، البينة التي يبيض فيها. يتميز الذكر بملفين في مؤخر الرأس من البين واليسار ينتفخان عند التلقيح، ثم بالعلاب المحبسة التي تملأ أطراف أصابعه الأمامية في زمن التكاثر. يبيض معظم حياته، نحو ١٠ سنوات، في الغدران والمناقع يتكرها في الليل عندما يسرح في طلب القرع ويمد إليها عند الفجر. قوته الحشرات والديدان. في الأناث تسراً في أوائل الربيع من ٥٠٠٠ إلى ١٠٠٠٠ ميلة طغر الواحدة نحو ١ سم. في ثلة هلامية المادة تلتفد بها في المياه الفسحة فتفترس وتستقر في مكانها حتى تنفث الذي تفرح منه من أسبوع إلى ثلاثة أسابيع. أما الطور البلعوي فيستمر من ٧٠ إلى ٩٠ يوماً.



ضفان



ضفدع أخضر

## ١٦٨٤٧ - هَفْدُغٌ أَحْمَرٌ \* هَدْمُولُ أَحْمَرٌ

Trichobatrachus robustus (S). Grenouille polue (F). Hairy frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. موطنه بلاد الكاميرون من أمال إفريقيا الاستوائية. جسمه صغير الحجم أبيض اللون بشكل يشبه بكرة قد الذكر الذي يطول من ١٢ إلى ١٤ سم. ويصغر منه الأنثى التي تطول من ٨ إلى ٩ سم. ويتميز الذكر أيضاً بشعره الكثيرة التي تكسّف الأظفار وبالحلقات الفلينية. رأسه مستعرض القامة، مقطوع الحلق، كبير الشفق. عيناه صغيرتان، مستديرتان، جاحشتان. فكه السفلي عديم الأسنان. أصابعه طليقة في القاتمات الأماميتين ومقيدة في الخلفيتين بحظاظ لا يتجاوز الزم الأول. أطراف أصابعه الأمامية والخلفية مجعزة بظباب حبيبية تمكّنه من تسلق السطح المائلة. ثوبه إلى الخضار الأسمر تلوين مائية صفراء قائمة ورضان أسودان يمتدان من مقدم الحلق إلى مؤخر الرأس، ويبدو سمراء قائمة تقطع الصفعة ألبانيا من قلة الرأس إلى العجز. ثم رشفة دقيقة سوداء وتنبج مستدير أسود يملأ مؤخر الظهر والقرن الأربع. في الأناث تشتمل بذات الثوب ولكنها عادة تشعور الكثيرة والظباب الخفيفة وهي تعيش وحدها في البراري والسهول القريبة من مجاري المياه بينا يعيش الذكر في مياه الجبال العالية الحارة ولا يقتض عن الأناث ويقترب منها إلا في زمن السفاد.



ضفدع شعر



ضفدع أحمر

## ١٦٨٤٨ - هَفْدُغٌ أَحْمَرٌ \* هَدْمُولُ أَحْمَرٌ

Rana temporaria (S). Grenouille rousse (F).  
Red Frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله

السويدات ورتبة البتراوات أي عديدات الذنب. أجسامها وأزواجها متوسطة الحجم. أجسامها شبيهة بأجسام الضفادع لكنها تتميز بالشئ المستديرة لقليلة الحركة. ثم يوجد إصلاح قصيرة ترتكز على الفقار الأمامية المتقدمة، وأصابعاً بتعدد التكاثر الطولية الجانبية القائمة على قعر العجز. أعرف أجسامها وأشهرها الضفادع والآكيت والفتاق.

## ١٦٨٤٩ - هَفْدُغٌ مَذْكَبَةٌ

Urodèles (F).  
Urodela (E).

رتبة من الضفادع تعرف بالسفريات، أطولها.

## ١٦٨٥٠ - ضِفَاعٌ

Boue de vache (F).  
Cow-dung (E).

هو خشي البشر.

## ١٦٨٥١ - ضِفَاعِيٌّ

الضفاني من الحيوان والذات الذي يعيش على ضفاف الأنهر والبحيرات.

## ١٦٨٥٢ - هَفْدُغَانٌ \* هَفْدُغَانٌ

Omostra colon (S). Omostra colon (E).

حشرة ناعمة دامت من فصيلة الرزليات ورتبة سمذات الازمنة. تألف الموائع الرطبة التي تكثر فيها الطفول. غناصها تعيش على الطفول وعلى المواد النباتية والفسوية المتحللة. يربطها ثوب الطفول وتعيش عليها دون سواها. جسمها صغير الحجم يطول من ٤ إلى ٥ سم. ثوبها إلى السمرة الجارية للماء. رأسها صغير الحجم. ضفادها صغيرتان، زباناها صليطانيان، نحيلان. ظهرها قليل الاحدهاب، مستدير الخواصر اللصق. ضفادها غليظة التميز، كهيئة الخيل. لها جيل واحد في الحلق. تظهر الحشرة الجملدة في أواسط الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف، تسرح في النهار. كسافه بعد ظهورها بسة أسابيع. تمتع المكان في تكاثر الطفول في البرقة عند بلوغها الإدراك التام تطول نحو ٧ سم. جسمها مستطيل للمقدم والرأس، مستطيل المؤخر، عداسي، الأرواج، حطلي، اللون أسمر للماء، حالك السمرة في الرأس والمفاصل. أطول الأكال الذي يستمر نحو ثلاثة أسابيع ينقضي في آخر تلقح تحضره البرقة في القطر العالي.

## ١٦٨٥٣ - هَفْدُغَانُ الضفادع هو الضفدع الحمر.

## ١٦٨٥٤ - هَفْدُغٌ

الضفدع مادة خضوية صلبة في حوض الحار من القفص. وقد تكون القفس. الحلب نسر.

## ١٦٨٥٥ - هَفْدُغٌ، هَفْدُغٌ، هَفْدُغٌ

Rana (S). Grenouille (F). Frog (E).

جنس حيوانات يترأ قاذية من فصيلة البومليات وصف الضفادعيات. أنواعه المعروفة ١١٧ موطنها العالم. تتميز بأجسامها الريمية وبامتدالة قوائمها الخلفية التي تساعدها على السط والرياسة. تبيض في المياه الرائكة، يبيضها يبيض السيل والقرن يفتق من بلاصت صغيرة تقع في الماء حتى بروز وإكمال قوائمها. قوته الحشرات والحوام والأسماك الصغيرة. ومن أمثاله البومول والنداد والفتاق. ولذكر يكتي بالي حيرة إلا الأناث تنصق ضفدعة ويحاجه وكنيتها أم حيرة. أشهر أنواعها وأهمها ما يلي.

## ١٦٨٥٢ - هُفْدُودَ جَبَّار \* ، هُدْمُولَ جَبَّار

Rana goliath (S). Grenouille géante (F).

Goliath frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. موطنه بلاد الكابرون من أعمال إفريقية الاستوائية. اكتشف في أوائل القرن الحالي ويستمر أكبر أنواع الضفادع المعروفة وأكثها وإبطها. الذكر ينطق. الذكر ينطق ٣٧ من ١٠ إلى ٢٧ سم. والأنيث تطول من ٤٥ إلى ٥٢ سم. يعيش قرب المنابع ويجاري الماء ولكنه لا يتراد الماء إلى زين الترسية. تقيته قريب الشبه بصيغ الفرو. قوته الحشرات والجوراء والمظاء والوزغ والفئران وكل ما دب ويمكن منه.

## ١٦٨٥٤ - هُفْدُودَ نَشِيط \* ، هُدْمُولَ نَشِيط

Rana agilis (S). Grenouille agile (F).

Agile frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الأدنى إلى أروبة الجنوبية الشرقية وللأنثى ٨ سم. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والأنيث تطول من ٨ إلى ٩ سم. ثورته قريب الشبه بصورن الضفدع الآخر إلا أنه يتميز بانسلاخ القائمين الخلفيين ما يجعل مجال قفزه نحو مترين. وهو يستعرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه صيرتان مستطيلتان. أصابه طليقة في القائمين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ متوسط الامتداد لا يتجاوز نصف الاصابع. جلده مائل البشرة، قليل الفصم الثقيلة المتبادلة المبيضة في ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشقعة المحتلطة تملحها رشفة سمراء في الظهر والقوائم وبيداتان كستيتان تمتدان من مقدم الحلق إلى مستوى الكتف. يطنه وشفاة إلى البياض الاصفر. يعيش معظم حياته في الحقل ويبيت في النهار ولا يقترب من الماء إلا في زين السفاد والكترة ويصنعا بكثرة يرد الشفاء على هجر الماء الأرضي إلى الماء. قوته الحشرات والديدان. ذكره عادمة البيلة القصيرة. الأنثى تسرا ابتداء من اواخر نيسان من ٨٠٠ إلى ١٠٠٠ دة في حبل حلامي المادة تطرحه في المياه الفصلة نفوس ويستقر في مكانه حتى تلف الذي يتم عادة قرب اواخر تموز.

## ١٦٨٥٥ - هُفْدُودَ صَبَات

Amphibia (S). Amphibiens, Batraciens (F). Batrachia (E).

صف حيوانات من الفقاريات الجملدية التنفس. سائله واجسائه وانواعه كثيرة المجد جميعها ثلاث رتب: حديدات الذنب وديدان الاربل والسروريات.

## ١٦٨٥٦ - هُفْدُودُ \* ، هُدْمُولُ

Odontophorus (S). Odontophore, Capucine (F).

جنس طير من فصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة نحو ١٧ أصلها من المناطق الاستوائية الاسيوية والارويكية. ملحيها الجاهلي حامي. جماعاتها قليلة العدد. تألف البراري والارحاج الضلة. قوتها الحشرات المختلفة الفصائل والانواع وبعض الاصناف والوزور والبرية. أجسامها ربة تطول من ٣٠ إلى ٣٦ سم. رؤوسها صغيرة متعوسة يتنازع قصيرة مرفية الشكل تمتد من قوائم الخناق إلى الاقداف متقبعا صخرة غليظة الشكل، مسنة الأذنان السفلى. عيونها صغيرة، حارها عامد الريش مخضب بالاحمر او الاصفر او الاصفر. سواقلها مستديرة، لاسنة. اذناها

تتمل معظم البلاد الاسيوية والشرق الاوسط واروية جسمه صغير القد. الذكر بطول من ٦ إلى ٧ سم. والأنيث تطول من ٨ إلى ١٠ سم. رأسه متوسط القد. خطمه مستعرض الشفق. ذكاه الانسان. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القائمين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ متوسط الامتداد. جلده مائل البشرة عامد الفصم. ثوربه إلى الشقعة المحتلطة المزاج يمتد في الاطليل ويبرز في الجبل وتعلو رشفة سمراء متروقة في القوائم ربة كستية منه مؤخر كل عين. وهذا الضفدع الذي يمانن إلى حد ما البيئة التي يعيش فيها يشقر ويسمر ويلون، بعض الشيء، بالوان يحيطه. يعيش معظم حياته في الحقل نحو ١٢ سنة قرب المنابع ويجاري الماء والقدان. يسرح في الليل ويحجب في النهار اما في الماء او بين الحجارة ونحوها في كل مكان يزين له الاستار والسكنية. قوته الحشرات والجوراء والمظاء والوزغ والديدان. الأنثى تسرا في أوائل الربيع من ٢٠٠٠ إلى ٤٠٠٠ دة. ظهر الوحيدة نحو ٢. في ثلة من الحبال خشابة المادة تموم حل سطح الماء. التفت يحصل بمد التدرج باسبوين ولما يتجاوز ثلاثة اصابع. والظهور البلوطي ينتمي في اواسط الصيف.

## ١٦٨٤٩ - هُفْدُودَ الْجَبَلِ، هُفْدُودَ السَّم \* ، هُفْدُودَ

الطيرين

Crapeud (F). Toad (E).

هو السليوم، الطبل.

## ١٦٨٥٠ - هُفْدُودَ الْحَكَل \* ، هُدْمُولَ الْحَكَل

Rana arvalis (S). Grenouille oxyrhina (F).

Arvalis frog (E).

نوع من الضفادع ينتمي إلى فصيلة البومليات. أصله قعر من الشرق الاوسط إلى أروبة الوسطى. جسمه صغير القد. الذكر بطول من ٥ إلى ٦ سم. والأنيث تطول من ٧ إلى ٨ سم. ثورته شوزن الضفدع الاخضر وهو مستعرض الشفق. عامد الانسان في الفك السفلي. عيناه كيرتان جاحظتان. أصابه طليقة في القائمين الامامين وبقية في الخلفيين بحظاظ ضيق لا يتجاوز الزام الاول. جلده مائل البشرة قليل الفصم الثقيلة المبيضة. ثوربه يمانن البيئة التي يعيش فيها وهو يتركز على الشقعة الصنابية تعلوها ماجة سطحية وتقيح اسمر وشفة بنية. يعيش معظم حياته في الحقل نحو ١٢ سنة في الحقل والرمال والنباض القريبة من الماء. يسرح في الليل ويحجب في النهار بين انبات وتحت الحجارة وتعلو كل موضع يزين له الاستار. قوته الحشرات والديدان. الأنثى تسرا نحو ٢٠٠٠ دة في ثلة حلامية المادة تطرحها في المياه الفصلة نفوس ويستقر في مكانها حتى تلف الذي لا يتجاوز مدته ثلاثة اصابع.

## ١٦٨٥١ - هُفْدُودَ لَن

الصفدع الثاني نجم لير من كوكبة قنص مركزه على الشبة الجنوبية من الذنب.

## ١٦٨٥٢ - هُفْدُودَ قُورِي \* ، هُدْمُولَ قُورِي

Rana muglens (S). Grenouille caureux (F).

نوع من الضفادع موطنه امريكة الشمالية. كير الجنة طوله نحو ٥٠ سم. ثورته يقبه صيغ البقر.



صفدع الحقل



صفدع جبار



صفدع نشيط



صفدود

١٦٨٦٦ - **فَكَيْكَلَة** °

Cypella (S). Cypello (F).

Cypella (E).

جنس نباتات عشبية حشوية من فصيلة السبوتيات، مهدبا بعض مناطق أمريكا الجنوبية. سيقانها مجراعية موقرة. أوراقها صغيرة، سنانية النصل. أزهارها متباينة التخصيب. تزهر القرنين ضمن البيوت وفي الحادائق. تروث في الأترية الخفيفة التي يكثر فيها عصر الليل. أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

١٦٨٦٧ - **فَكَيْكَلَة رَمَاحِيَّةُ الْوَيْن** °

Cypella plumbea (S).

Cypelle couleur de plomb (F).

نوع من الفصيلة. منبتها البرازيل. ساقها عذقية، كثيرة الأوراق الصغيرة، ترتفع من ٦٥ إلى ١٠٠ سم. زهراتها كبيرة الحجم، وسيدة، لونها إلى الأزرق الفرماسية المزاج يطولها بقية مستديرة وردية اللون. تنويرها يستمر نحو ثلاثة أسابيع ويكثر في شهر آب.

١٦٨٦٨ - **فَكَيْكَلَة هَرَبِيَّة** °

Cypella Herberti (S). Cypella de Herbert (F).

نوع من الفصيلة. منبتها فنزويلا. ساقها موقرة، عادمة العقد، ترتفع من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها صغيرة بحرية اللون. أزهارها عديدة صفراء اللون مغطاة بالادرناوي والبنفسجي. تنويرها يستمر من آب إلى الميول.

١٦٨٦٩ - **فَيْع** °

Côté (F). Side (E).

كل غيد من الخطوط التي تؤلف حدود الشكل.

١٦٨٧٠ - **فَيْع** ، **فَيْعِر**

Nervure médiane, Côte (F). Median nerve, Rib, Costa (E).

هي في الورقة عرقها اللين الذي يصل بالوسط والأي لتتشعب منه سائر العروق. وهي التي تنقل النسج إلى نسيج النصل فتورده بأغلة وتصنعه كلسا.

١٦٨٧١ - **فَيْعُ الْبَكْرَةِ** °

هو الخلداب، اطلبه.

١٦٨٧٢ - **فَيْعُ الْمَنَثَث** °

Côté du triangle (F).

Triangle side (E).

١٦٨٧٣ - **فَيْعُ الْمُنْعَق** °

Côté du polygone (F).

Polygon side (E).

١٦٨٧٤ - **فَيْلَمَة**

سكة صغيرة غضراء صغيرة الحجم (السان).

Costal

١٦٨٧٥ - **فَيْلَحِي**١٦٨٧٦ - **فَمَّ ، فَمَّ ، فَمَّ** °

Annexion (F).

Annexion (E).

هو اتباح شيء بأخر.

١٦٨٧٧ - **فَمَّ الْأَرَاكِي الْأَرَاكِيَّة ، جَمَلٌ ،**

Remembrement (F).

Reconstitution (E).

هو توسيع القطع في الأرض المحرقة أو ضم الأراضي الزراعية إلى بعضها بعض حتى يتسع الملك ويهيل استراح.

١٦٨٧٨ - **فَمَّ النَّعْمَةُ إِلَى الْوَلَكَةِ**

Consolidation de l'usufruit (F). Funding of usufruct (E).

هو إحدى وسائل زوال الانقطاع بقضاء حق الملكية وسن المنفعة في مالك واحد.



فَرْع



فَرْعَانِ عَاقِبِ الرِّبِّ



فَرْعَانِ مَعْدِ الْأَرْطَافِ

جذاع غزيرية الشكل. ثنائيا واساميا شديدة النقط. ألوانها تختلف مع الأنواع، تكثر فيها الشقمة السوداء المروثة بالأسود في الرءاء والجناس. اعتانها مطلقا بقلتها بيضاء اللون سود الحمار. تدفن أعشاشها في الفخيص تنهيا في التربة بين الأفاعيل المستحصية أو بين مخيل الخليلش الرفيع الكثيف. أنثاها تبيض وتحنن من ١٤ إلى ٢٠ بيضة. الترخع يستمر نحو ثلاثة أسابيع تقزم به الألائث دون الذكور التي تكون لها الحياة والبقاء.

١٦٨٥٧ - **فَهْقَر**

Maçonnerie en pierres sèches sans liant (F).

الفقر البناء بحجارة بغير طين ولا كلس.

١٦٨٥٨ - **فَهْقَر**

Excrément de l'éléphant (F).

Elephant excrement (E).

الفسق : نجس القليل.

١٦٨٥٩ - **فَهْقَر**

Parasitisme (F). Parasitism (E).

الفسق هو الرقعة، أطلبها.

١٦٨٦٠ - **فَهْقَر** °

Nychthomes (S).

Nychthome (F).

جلس غلافيش من حمارة المحيطات. موطنه المناطق الاستوائية الآسيوية والأفريقية والأمريكية. أنثاه عديدة، أجسامها صغيرة القد. رؤوسها مغطاة قبيصة. آذانها شبه مستديرة. فرائسها غزيرية. شفاها منفعة. يعيش جماعات كثيرة العدد. يسرح كامل الليل. قوته الخشرات على اختلاف أنواعها. يألف الانجرار الحربية الدائمة.

١٦٨٦١ - **فَهْقَر** °

Paxillus (S). Paxilla (F).

جنس فطور من فصيلة السحيمات. أنواعها المعروفة قليلة العدد أعطانها بعض مناطق البلاد الممتدة الحرارة. تعيش على التبدل والمواد النباتية المتصلة بالأرويات الشجرة. تتميز بكون نكاتها وبقرس سيقانها وبالوانها المابقة. أعرف أنواعها وأشهرها الفسقون المايق الزغب والفسقون المنصف الاطراف.

١٦٨٦٢ - **فَهْقَرُ عَاقِبِ الرِّبِّ** °

Paxillus strotomentaceus (S).

Paxille à tomentum foncé (F).

نوع من الفسقون. يعيش على أروعيات الانجرار العروة اغصانها السديان. ساقه غضة، قصيرة، كستية اللون. نكته كبيرة، عديدة، مزرية السطح، قطرها نحو ١٢ سم. لونها إلى الصبغة السوداء يطولها موج كسني. لحية مأكولة لليلة العلم.

١٦٨٦٣ - **فَهْقَرُ مَلَقَتِ الْأَرْطَافِ** °

Paxillus involutus (S). Paxille enroulé (F).

نوع من الفسقون. يعيش على المواد النباتية المتصلة. ساقه مستدة الانقطاع والفلانظ. نكته كبيرة، مغمرة، ملققة الاطراف، قطرها نحو ١٠ سم. لونها إلى الصبغة الشبهاء يطولها موج نحاسي اسفج. لحية مأكولة، لليلة العلم.

١٦٨٦٤ - **فَهْقَرَة**

جموعة عصيات حشوية.

١٦٨٦٥ - **فَهْقَرَةُ الْأَسَدِ**

فَهْقَرَةُ الْأَسَدِ كوكبة الأسد الاصفر.

اسمر المرقوق. يظنها اسمر الصفحة العليا، اسود السفلى. قوائمها الى الشقعة اسفرا || مسرعا البراري والنايات حيث تكثر الاغشاب التجيلية. قوتها صفت التجيليات .

### ١٦٨٨٨ - مُصَيَّرَة مَرَقُوشَة

Miridius punctulatus (S). Miris punctatus (F).  
حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٥ م. رأسها صغير ، محرم ، حنطى اللون . خطمها مستدل الطول . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها حنطى اللون . كوسلها حنطى مرقوش بالاسمر . حجبها صغيرة . حجبها ظهرها مستطيلتان ، حنطيتان ، تعلوها رقعة حمراء وتبقى اسود واصفر . ظهرها لائح . يظنها الى السمرة السوداء حنطاء اصفر تبي . قوائمها سمراء || تألف البراري والمواقع كفضلة مرتعها الاغشاب الجرية .

### ١٦٨٨٩ - مُصَيَّرَات

Capidae, Miridae (S). Capidae, Miridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة غشقات الاجنحة . اجناسها وانواعها كثيرة المدد . بعضها صار . جميعها مصيرة اللد ، مستطيلة الشكل . ألوانها مختلفة الالوان يظن فيها الاصفر ثم الاخضر والبي . قرونها الاستشعارية رباعية الفواصل . استنكاها ثلاثية الاجزاء . اسنانها ثلاثية القل . تمتص مكبا داخل الانسجة النباتية وتركب عدة نباتات تمتص منها .

### ١٦٨٩٠ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Panement (F).  
Dressing (E).  
حياة الجرح والملاج والسياد تسهل لانساه .

### ١٦٨٩١ - مُصَيَّرَة

Tetracentron (S).  
Tétracentre (F). Tetracentron (E).  
حشرة حرجية وزداعية تربيتية من فصيلة الغشقات . ساقها مستقيمة فناء ، طول نحو ٣٠ م. أوراها عابلة بيضية ، طول نحو ١٢ م. وعرض نحو ٧ م. ناصفا الى الخضار الزاهي ، مرققا حراء اللون ، عددا من . اذواج الى ٧ . اذواها صغيرة اللد ، صفراء اللون ، رباعية القصل ، ثلاثية البليات ، رباعية الاسدية .

### ١٦٨٩٢ - مُصَيَّرَة

Bouquet (F). Grove, Arbour (E).  
هي الآلة الصغيرة الخافضة ج. فموز .

### ١٦٨٩٣ - مُصَيَّرَة

Atrophie (F).  
Atrophy, Atrophie (E).

### ١٦٨٩٥ - مُصَيَّرَات اَلْمُصَيَّرَة

Protobranches (F). Protobranch (E).  
رتبة من الرغويات صفحيات المياشيم تتميز بنحاشتها الخيطية البسيطة المنتصبة ، غير المتعوية ، لتصلها يعضها او تجمعها الى يعضها نزع من الملب الحقيق القصير .

### ١٦٨٩٦ - مُصَيَّرَة

Turgia (S).  
Turgia (E).  
جنس نباتات عشية سولية برية من فصيلة الخياثيات . انواعها المرقوقة قليلة المدد متنبها بعض مناطق سوس البسر الايض المتوسط اصحها سورية ولبنان وفلسطين || سيقها مثلمة ، غشقة ، زبد ، قليلة الفروع الانشعاب .

### ١٦٨٩٧ - مُصَيَّرَة

Garantie (F).  
Guaranty, Warranty (E).

الضمان هو حاية شخص من ضرر يهدد او تعرضه من ضرر وقع عليه . لذلك فصيته عديدة تخص منها بالذك :

ضمان اليريب

Garantie des vices (F).

ضمان القتل الشخصي

Garantie de fait personnel (F).

ضمان فعل

Garantie d'éviction (F).

ضمان ملوك

### ١٦٨٩٨ - مُصَيَّرَة ، مُصَيَّرَة

Bouquet, Gerbe de fleurs (F). Bouquet, Bunch of the flowers (E).

### ١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة اَلْمُصَيَّرَة

Capsus vandilicus (S). Capsus du houblon (F).

حشرة من القمصيات ثوبا الى الصفرة الباضة . طول نحو ٦ م. ومرضها ٢ || تركب اوراق الجنبيل تنصص صارتها وتؤذيها .

### ١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة اَلْمُصَيَّرَة

Phytoecoris populi (S). Phytoecoris du peuplier (F).

حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٧ م. لونها الى البياض الاخير يطوي تقيج اسمر يشمل جميع الاصضاء بما فيها الزباني والقروا || رأسها صغير . خطمها مستدل الطول . حناها كيرتان ناضرتان . زباناها مستطيلان . كوسلها في الفكك ، مقطوم الطرف . حجبها حمراء . حجبها ظهرها مستطيلتان . قوائمها ميعرة الملب || تركب اوراق الخسور والصفصاف والزيون .

### ١٦٨٩٩ - مُصَيَّرَة اَلْمُصَيَّرَة

Capsus pestinaceus (S). Capsus du pansis (F).

حشرة من القمصيات ثوبا الى الزرقعة يملوها موج اخضر . طول نحو ٤ م || تركب مع رقاتها اوراق واخسار السيسارون والجزر .

### ١٦٨٩٥ - مُصَيَّرَة اَلْمُصَيَّرَة

Capsus carvinus (S).

Capsus du sainfoin (E).

حشرة من القمصيات طول نحو ٤ م. ثوبا الى الصفرة الزاكية . ارجلها خضر . زباناها الى الايبورية || تركب الرن حل اختلاط انوامه فتؤذي الارواق وتذبلها .

### ١٦٨٩٦ - مُصَيَّرَة اَلْمُصَيَّرَة

Capsus bipunctatus (S). Capsus du chou (F).

حشرة من القمصيات ثوبا فسقي اللون . طول نحو ٨ م. ومرضها نحو ٢ || رقاتها دقيقة الجسم خضراء اللون تنصف وتتشمل على اللقوف وتقتل فعل الحشرة الكاملة بالمتصاص عصارة الورق .

### ١٦٨٩٧ - مُصَيَّرَة سَوْدَاة

Capsus star (S).

Capsus noir (F).

حشرة غاشلة من فصيلة القمصيات . جسمها صغير اللد ، يطول نحو ٦ م. رأسها مستعرض القفن ، اسود اللون . خطمها مستدل الجرم . حناها صغيرتان ، ناضرتان . زباناها شديدة السمرة . كوسلها اسود . حجبها صغيرة حمراء . حجبها ظهرها مستطيلتان . ظهرها اظفر اللون ، اسود .



مصيرة الجنبيل



مصيرة السيسارون



مصيرة الرن



مصيرة اللقوف

من ذنب البلوغ والتجبر || يكثف ويستمال أحد الطرفين  
القائمة المركزة على النملى تروأ به الاثوار او عند ظهور  
عوارض القطر .

#### ١٦٩٠٢ - شَهَر

*Sternotherus (S). Sternothera (F).*

جنس سلاف مائية من فصيلة الخفيات . انواعه  
المعروفة ثلاثة - اصلاتها بعض مناطق افريقية الشرقية  
والخليج حتى الهند ، تألف الاثر والجيرات والتنانق ||  
اجسامها متوسطة لثقل طول من ٤٥ الى ٩٠ سم . ذنبها  
قليلة الابدواب ، شبه بيضة الشوزن . ثوبها الى السرة  
التيانية الماجات ، فيها الجروي والاخضر والامس والبي  
والصنابي . زعانها متوسطة لمسة بعد الفثال . رؤوسها  
مكرسة . اعناقها متوسطة الطول والعلاطة . اذنانها قصيرة .  
قوائمها شديدة النقط ، خاسية الخالب في الزويين .

*Debur masticurc (F).* **شَهَل** ١٦٩٠٣  
السهل والاضهال هو اول النضج المعروف بالادراك .

*Cyon (S).* **شَهَل** ١٦٩٠٤  
*Dohle (F). Dohles (E).*

جنس كلاب متوحشة مقررة موطنها سيرير ووسط مناطق  
آسية الوسطى والبرية . له ثوبان شهل الشمال وسهل  
الجنوب . يألف النباتات والبراري الجبلية . لحمه الجاني  
جاني . جماعته تعد من حة الى عشرة ازواج . لا يتشم  
فرسته منفرداً معها كانت الحال . انقل طراقة الطاء  
والشوان || شكله الخارجي منقسم المتقاطع فيه بالكب  
الاهل اما راحته العاطفة فرائحة ابن آوى . رين ميزان  
جسه ان عدد اطباء الاثات هو ١٢ و ١٤ في حين ان  
لكلية ١٠ اطباء فقط .

*Cyon javanicus (S).* **شَهَلُ الْجَنْتُوب** ١٦٩٠٥  
*Dohle méridional, Bureau (F).*

نوع من الشهل . موطنه يمتد من جبال حلايا الى جزر  
الزواج وبهال بورنيو . يألف الحشاب والجبال . جماعته  
تعد من ٤ الى ٥ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر جمع  
الميوذات الضعيفة والاوز والبط ... يصرح في الليل ولي  
التيار || جسه ابيض الشكل يطول نحو ٩٥ سم . ذنبه  
٢٠ سم . ارتفاعه ٥٠ سم . ثوبه الى الشفة السمر يزيداد  
اسمراراً في الصيف ويضع في الشتاء || وهو سهل المراس  
يألف حياة الاسر ويحب بون عناء اذا أخذ صيداً لكنه  
لا يطيع الا من يربي به ويقدم له الطعام || قيل لنا  
مضى ان بعض الكلاب الاطبية تلمحرت منه . ثم تحقق  
فما بعد ان النظرية خاطئة لان المادة السلية عند الكلب  
تقل ٤٢ سناً في حين انها لا تقلل سوى ٤٠ سناً  
عند الشهل .

**شَهَلُ الشَّال** ١٦٩٠٦ ، **الْبُونُ الجَبَل**

*Cyon alpinus (S).*  
*Dohle septentrional, Caon de montagne (F).*


نوع من الشهل . موطنه يمتد من سيرير الى التركستان  
والبيت . يألف المناطق الجبلية الكثيرة النباتات والارواح .  
جماعته تعد من ٥ الى ٧ أزواج يقودها ذكر مسن . يقتصر  
الطاء والارباب والراغور والافلح ... || جسه منقسم  
ابيض يطول نحو ١٠٢ سم . ذنبه ٤٤ سم . ارتفاعه ٥٢ سم .  
ثوبه الصفي الى الشفة كسر في الرأس والظهر وبيض



صبيك



فنجيل



شبه الماهوي



شهر



سهل

اوراقها معتقة ، حاشية ، متعاقبة ، مركبة ، وتربية  
التجميع . وديقاتها مستطيلة النصال المشارة التفرض .  
ازهارها صفيرة ، سبوانية التجميع ، بيضاء اللون او  
اريجوانية . ثمارها حب حقيق ، مستطيل ، إيرى الشكل  
المثابئين الطول || ثوبها رديبي || اعرف: الوأها واشهرها  
للصيدة المرفية الورق (*T. latifolia*) .

**شَبِيك** ١٦٩٠٧ *Benincasa cerifera (S).*  
*Bénincase (F).*

نبات زراعي حولي مداد وحيد الجنس والذو من فصيلة  
القرعيات . هذه الثمر الالحى . زراعته واسعة الانتشار  
يستخدم كالكرسى في الطبخ وكالبطين في المربيات ||  
ساقه مدادة طول نحو ٢٠٠ سم . حلقه متشعبة . اوراقه  
معتقة ، كدية النصل المتصبع المزئير ، خاسية الغصص  
او سابعيتها . ازهار فردية ، محورية ، كبيرة الله ،  
خاسية البليات ، صفراء اللون . ثماره مستطيلة شبه  
اسطوانية الشكل ، فطول من ٢٥ الى ٤٠ سم . ويطول  
يرواح من ١٠ الى ١٥ سم . ثوبها الى الخضار الباحت  
يملو توشع اسمر . قشور الثمار في اول مهدها كثيفة الزغب  
الحبي الاطراف ثم يتقلص الزغب ليشاعا مادة شبة  
تكتسل مع الادراك . لياها جامد المكسر ، ابيض اللون ،  
خافت العرف المسكي ، من الحفاق .

*Dangila (S).* **شَهَلِجِيل** ١٦٩٠٨  
*Dangile (F) Dangila (E).*

سمكة بحرية من مفوسات اللانة وفصيلة السرديات .  
موطنها جمع ابحر الهند والبلاد المجاورة || جسمها اعلاحي  
الشكل ، عذب الظهر ، يطول نحو ٣٠ سم . ثوبها الى  
الخضار الاخضر يمتد في الظهر ويتر في البطن . رأسها  
معتدل الجرم ، يرمي الشكل . غطها ثنائي الطبقات  
التيقة . شفتها قليل الانفرج . زعنفتها الظهرية كبيرة  
الله ، حلالية التقعر . زعنفتها الذيلية نايقة || فيها  
متوسط الصنف ، مأكلة .

**شَهَب** ١٦٩٠٩ *Dissymétrie (F). Dissymetry (E).*

الضهب عدم التانسق في التركيب الاحاسي او الجسموري .

*Cumminsiella (S).* **شَهَبَة** ١٦٩٠٠

جنس فطور مجهرية قريبة الشبه من الصدفية . تتميز بيغها  
البرخي المردلي الشكل ، الفيق الانتساب وتلطيف الله .  
ذميتها عديدة الدعامات الرزية التجميع . دملها مائلة  
من حليتين لا متجانستين النصل اسطوانية الشكل واقليا  
كروية . اغنيها متصلة السام الثنائية || انواعها  
الاقتصادية قليلة اعرفها شبه الماهوي .

**شَهَبَة المَاهُوِيَة** ١٦٩٠١ ، **شَهَبَة قُرْمُزِيَة**

*Cumminsiella sanguinea, Uropyxis sanguinea, Puc-*  
*cinia mirabilissima, Uromyces sanguines (S). Rouille*  
*du mahonia (F).*

فطر مجهرى يتطفل على اوراق وثمار الماهوي فيؤذيها  
ويطعمها || ظهوره الخارجي بخور عسبة مبرزة لاقليمية  
التجميع تركب الاوراق والثمار الفتية . تبو طلاء اللون  
فسفيسية الحافة تتصبع النصل وترفعه ثم تنصرف الى الجوزة  
فالسرة حيث تنفجر من بؤرها القرمزي اللون || وهو  
على الثمار وأنها بخور صفيرة مستدرة ورائحة مبرزة او  
متراسة تثير ملحة اللون ثم تحيل الى اللسرة مع اقترابها

الضفديات. مهدا البلاد الحارة. اجسامها دودية مستطيلة، سحلتها حرقفية التركيب، غشقة، متجانسة من الرأس الى طرف الذنب. وروصها وكثيرة. عيونها دقيقة مغلقة. قوتها الحشرات. تموت بين الحجارة وتحتها وفي انفاق تسربها كالحيات.

١٦٩١٧ - ضفديات  
Caecillidae (S).  
Caecillidae, Cécillidae (F).  
فصيلة حيوانات عادمة الارض من صف الضفديات اجسامها وانواعها عديدة مهدا البلاد الاستوائية والحارة. قوتها الحشرات والحوام والمواد العضوية المتحللة.

١٦٩١٨ - ضور  
Sinus  
هو التجويف للمقر في فصل النبات ج. اضلاع.

١٦٩١٩ - ضور  
ضور العين : مزج به الماء ووضعه كذلك.

١٦٩٢٠ - ضفدكة  
Enkanythus (S).  
Enkanythe (F).  
الاسم العلمي من اليوناني بمعنى « الزهرة الفسحة ». جنس اشجار ونباتات حرجية وتزيينية من فصيلة الخنجيات. منبتها يحد من الشرق الاوسط الى اليابان. ساقها ترتفع من متر الى عشرة امتار. اوراقها متعاقبة، مستطلة القواعد والاطراف. ازهارها حليق النجس، طرفي الازدكان. ازهارها ملونة، عشارية الالوان، مفرقة المتكاثرة || انواعها المعروفة قليلة العدد، اشهرها التالية :

١٦٩٢١ - ضفدكة جرسييه  
Enkanythus campanulatus (S).  
Enkanythe en cloche (F).  
نوع من الضفدكة. مهدا الشرق الاقصى. ساقها فرعاء تملو نحو عشرة امتار. اوراقها تطلو نحو ١٠ سم. وتقرض نحو ٤ سم. نصالها مهدية، ذرية الانسان الحادة. ازهارها كبيرة متدلية جرسية الشكل صفراء اللون تلوها مشعة وردية || تنويرها يستمر طوال شهر ايار.

١٦٩٢٢ - ضفدكة هندية  
Enkanythus deflexus (S). Enkanythe des Indes (F).  
نوع من الضفدكة. مهدا جبال الهند، اخصها حلايا. ساقها متحللة الضخامة تملو من ٣ الى ٧ امتار. اوراقها ولانها متراكبة. اوراقها لحياسية الشكل منها السنانية والاحليلية، تطلو من ٥ الى ٨ سم. وتقرض من ٣ الى ٤ سم. نصالها صغيرة الانسان اختارية. ازهارها حراء وردية. شجرة بالوردية || تنويرها يستمر طوال شهر حزيران.

١٦٩٢٣ - ضفدكة يابانية  
Enkanythus japonicus (S). Enkanythe du Japon (F).  
نوع من الضفدكة. ساقها فرعاء متراكبة الانفاذ والاغصان تملو من متر الى مترين. اوراقها احليلية تطلو نحو ٤ سم. وتقرض نحو ٣ سم. نصالها مستطلة الحمار. ازهارها يستيق الاوراق. ازهارها بيضاء اللون، جلجلية التبرجات الحلياسية الحذبات || تنويرها يستمر من نيسان الى ايار.

١٦٩٢٤ - ضور  
Rut des bovidés (F).  
Rut of the bovids (E).  
هو استمرام البقر وسبها واء الثيران.

في الاطيان والبلن. ثوبه الشوي الى البياض الاصفر || نباحه يخلف من نباح الكلب ومواء الذئب وضياح الثعلب || يسرح في الليل وفي النهار. قويلته الربوبية لا تتجاوز خمس ساعات.

١٦٩٠٧ - ضفدكة  
Abajous (F). Cheek-pouch (E).  
الشفوة : جراب في بطن الفد تتميز به بعض الحيوانات. اخصها القرود تستعمله لطبع الطعام من حبوب وثيرها. وما شفوة ج. عرسى. ج. انشاء.

١٦٩٠٨ - ضفدكة  
الشفول : البقرة والشاء والبئر والناقة التي قل لبها. وهي البئر الغنيلة الماء.

١٦٩٠٩ - ضفدكة  
Chardon (F). Thistle (E).  
الشفاه تشبه على اختلاف انواعه. والشفاه كل التي لا تحبس.

١٦٩١٠ - ضور  
Lumière (F). Light (E).  
الضوء هو المؤثر الطبيعي الذي يسبب الابصار. مصادر مختلفة منها طبيعية كالشمس ومنها صناعية كالمصابيح الكهربائية وغيرها.

١٦٩١١ - ضور  
منه تخرج من سواه الناقة والبقرة والشاء قبل خروج الولد.

١٦٩١٢ - ضفدكة شرسية  
Staurotypus triporcatus (S).  
Staurotype agressive (F).  
نوع من الضفدكة. سلطنة من فصيلة الحفانيات. منبتها يشمل معظم مناطق امريكا الوسطى. تألف المتعلق والعتوان والافواجر ويجاري الماء || اغلاطها شرسية قوية، تهاجم كل من يقترب منها || جسمها متوسط القد. ذيلها بيضي اللون، قليل الاحديداد، يطول نحو ٤ سم. زطها متوسط الملمس صلبوي الشكل. رأسها مستدل الجرم شارف الفك الاخر. سكتها ثنائي الزوائد القرنية. حقلها خليط قصير وذنبها قصير. قوائمها مستدلة القد، نشيطة || قوتها الضفادع والاسماك والبطا والضماني.

١٦٩١٣ - ضفدكة  
Haliotinales (S).  
Haliotinales (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرضويات مهدا الاربع غلفيات المحيطات وصيدا الكنجيات. انواعها المعروفة قليلة العدد، اطرافها البحر الاخر والخليج. تموت لامة بالصخور المنصورة القريبة من السطوط || اصداها صغيرة، داخلية، وريقة تلمس الظهور. اجسامها احليلية الشكل، متطرفة المقدم للمهب. اريدتها فضفاضة. غشايها يمينية الازدكان، نظلية الترتيب الصفي. افواها عضلية مستدلة الطول. لولاسها انبوبية مقلوبة السطوح الخارجية.

١٦٩١٤ - ضفدكة  
Erratiques (F).  
هي الطيور التي تغلب الرزق.

١٦٩١٥ - ضفدكة  
١٦٩١٦ - ضفدكة  
Caecilia (S). Cécilie (F).  
جنس حيوانات صماء، دجوية، دودية الشكل من فصيلة



ضور



صخرة

Callicetta (F). Rennet (E).

١٦٩٣٢ - صُفُون

هو الخشخشة ، اطليجا .

Rayonnement diurne,

١٦٩٣٣ - صُفُون

Radiation diurne (F). Diurnal radianca, Diurnal radiation (E).

هو الاشعاع الضوئي اليهاري .

Thalamiflora (F).

١٦٩٣٤ - صُفُون

Thalamifloral (E).

نمت تدويري يخلق حل النباتات المزروعة الخلاف الزراعي من ثنائيات الفلقة .

١٦٩٣٥ - صُفُون ، صُفُون

قال النعماني عن ابن سيدة : الضيب شي من دواب البحر على هيئة الكلب وخلقت .

Miel (F). Honey (E).

١٦٩٣٦ - صُفُون

الفصح هو السمل فصل من شهده .

Carenx sanson

١٦٩٣٧ - صُفُون ، صُفُون

سمكة كبيرة مأكولة تكثر في البحر الاحمر والمتوسط . وهي نوع من السمك تطلق نحو ٦٠ سم . ثوبها الاربعة القفصية زهر ويشقر حته البطن ويبقى مع اقترابه من ثوج القلبي .

Poulche (F). Filly (E).

١٦٩٣٨ - صُفُون

فوس لم يقطن الاثناث ولم ينز ثلد (السان) .

Hétérogame (F).

١٦٩٣٩ - صُفُون ، صُفُون

Heterogamous (E).

نمت تدويري يطلق حل النباتات المزروعة التي تحمل ازهاراً ذكورية وبائية في زرع واحد .

Hétérogame (F).

١٦٩٤٠ - صُفُون

Heterogamy (E).

الصفيرة جسمودياً حيوانياً هي تعاقب تواله بكري مع تواله كيمي صحي . وهي حداثاً حالة تباين التفاضات الوراثية من حيث الابداء المركزية او التكون . وهي شوزياً حالة وجود ازهار مختلفة الشكل في تنوير واحد .

Icticyon venaticus (S).

١٦٩٤١ - صُفُون

Icticyon (F). Icticyon (E).

حيوان لاح مقوس وحيد الجلس والنوع من فصيلة الكلبيات . موطنه بعض اصقاع امريكا الجنوبية اعصها البرازيل . يالفت اطراف الغابات والاصراج المشعة الاشجار قوية كل ما استطاع قتصه واقتراه من حيوان صغير . ملجته الحياتي جماعي ، جماعته تعد من ٥ الى ١٢ زوجاً . جسمه مستدل قليل الارتفاع بطول نحو ٩٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٣٢ سم . واهم مستضفئ الشكل عريض الجبهة والخلف . اذناه صغيرتان . فوهه الى الثلثة السرداء يمين في الراس والفقر ويبيت في البطن . ويرد قصير ليد . الاذن اصغر قدماً من الذكر واهت ثوباً سم . عدد اطرافها ١٢ . يحملها يشتر نحو تسعة اسابيع تقصع في تمامه من ٦ الى ٨ جراه طامسة لا يقصر التولد قبل مضي سبعة ايام .

Parasite

١٦٩٤٢ - صُفُون

هو الطفيلي ، اطليجا . ومن اسمائه بالني دون الاختصاص ليش .

١٦٩٤٥ - صُفُون هو الشرقاوي ، اطليجا .

Coraciidae (S).

١٦٩٤٦ - صُفُون

Coraciidae (F). Coraciidae (E).

فصيلة طير من الجواثم تدعى ايضاً شرقايات ، اطليجا .

Speotzzy cunicularia (S).

١٦٩٤٧ - صُفُون

Hiboux des terriers (F).

من اسماء ضوع الجوارح

H. des cavernes (F).

ضوع الكهوف

H. des lapins (F).

ضوع الارانب

H. des prairies (F).

ضوع المراعي

H. des marais (F).

ضوع المنابع

طائر من البويات وماراة الغداهات يحير البلاد في طلب الرزق لا يقم في مكان اكثر من شهرين . يبيض جماعات كبيرة ، سره يبد من ٢٠ الى ١٠٠ طائر في وطر من الطيور الكثافة اقارب حياتها . يالفت المروج والمراعي والبراري والنامق يبيض قوته في البهار . يصيد الحمر والذئب والذباب والسمكة والحيات والماراب . يبيض حشه في صخور الصغور والكهوف والجوارح وفي اسفل وفروغ الاشجار اليابسة . اثناء تضع اربع بيضات تحضنها ثلاثة اسابيع .

١٦٩٤٨ - صُفُون ، صُفُون

Engoulevant à collier (F). Fern-owl (E).

طائر من السبد الرواس طولوه نحو ٢٧ سم . وهو امدأ الريش الاخير الموشم بخطوط سود وحر . واهم مفلطح الشكل . متقار صغير لثقة راسه الشدتي يحمل صولجا يبيض الريش التدقيق الملبس الركب . حثقه مطروق بتلاتين حاجيتين . سقطاه مستطولات ذلقان . ساقاه مسرولتان . ذنبه متواهد الطويل . وهو من قرايط صوف البحر المتوسط . اذناه تثنى في الفصوص تدره وسط الادخال تحضن فيه اربع بيضات من ١٦ الى ١٨ يوباً .

Sallite (F). Cover (E).

١٦٩٤٩ - صُفُون

نرو ذكر الحيوان على الاذن . فاك الجواد الحبر : نزا ملها .

١٦٩٥٠ - صُفُون ، صُفُون

Moschoema (S).

Moschoema (F).

جنس نباتات حولية بعصرة من فصيلة الشفويات اذناه قليلة العدد جميعا من الرياسين . سوقها دقيقة مرية الزوايا تدور من ٦٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، فضية الشكل نصلها سبك النسيج ، منشاري الحافة ، خمل البثرة على صفحته . ازهارها سليل التجميع . اذهارها صغيرة لثقة ، فضية ، متعاقبة ، لونها يراوح بين الالبيس والالخير الباهت . ازهارها يستر من كائون الاذن الى شياط او من تموز الى آب . اوراقها وازهارها مسكية الحرف الطري .

Lioplox (S).

١٦٩٥١ - صُفُون

Lioplox (F). Lioplox (E).

جنس حيوانات مائية سرلودة من الرغويات مديدت الاجليل وفصيلة البليونيوات . انواحه المعروفة قليلة العدد اصلاطها يبيض مناطق مناطق المنذلة الحارة وشها امريكا الشالية في اصدانها اطليجية ، بطيية ، متباينة الاحجام ، رقيقة الشفاء اكليسي ، ملوية وزعفرنة .



ضوع



ضوع



صُفُون

## ١٦٩٤٨ - صَيْكَلَة سَاطِعَة \*

*Masdevallia ignea* (S), *Masdevallia flamboyans* (F).  
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ١٥ سم . أوراقها  
حرفشية . زهرتها حمراء ساطعة يملوها موج قمرزي يتخلله  
البنفسجي . فصلتها العليا مستطيلة منقطة عل الزهرة ||  
تنويرها ويهي .

## ١٦٩٤٩ - صَيْكَلَة قِرْمِزِيَّة \*

*Masdevallia coccinea* (S), *Masdevallia écarlate* (F).  
نوع من الصيكة . ساقها تملو نحو ٢٥ سم . أوراقها  
بريضية الشكل تطول نحو ٥ سم . زهرتها بنفسجية يملوها  
مواج قمرزي أسفم || تنويرها يستمر عدة أسابيع ، من  
أواخر آذار الى أوائل حزيران .

## ١٦٩٥٠ - صَيْكَلَة نَيْبُوتِيَّة \*

*Népocisme* (F), *Nepotism* (E).  
النضيلة تتجاوز مفاير للانظمة او الشرع يقوم به من  
ييده السلطة في سبيل مصلحة قريبه او صديقه .

## ١٦٩٥١ - صَيْحُرَان \* هو نعن الماء ، اطلبه .

١٦٩٥٢ - صَيُون  
*Matou* (F), *Tom-cat* (E).  
هو القط الذكر ج . صياون .

Parasitologie (F).

Parasitology (E).

Encastelure (F).

Contraction of the hoof (E).

عارض يصيب رجل القرس سبه ضيق الدابة في الحافر .

Paraphimosis

١٦٩٤٥ - ضَيْقُ الْقَتَبِ  
سوء تركيب طبيعي في القتب يمنع بروز الحشفة الى  
الخارج وهو شائع عند الكلاب تادر عند الجياد .

١٦٩٤٦ - صَيْكَل \* ، جَانُوس \*

Janus (S).

Janus (F), Janus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الارجل  
وفصيلة الخرشوبيات . انواعها المعروفة قليلة المدد اعطائها  
بحار البلاد المتعددة الحرارة || اجسامها حريالة مستطيلة  
مغطاة بلواس متكاثفة ورقية الاطراف || اعرف انواعها  
واشهرها الصيكل القنبراني (*Janus cristatus*) الذي  
يكثر وجوده في المناطق الشمالية من البحر الابيض المتوسط .

Masdevallia (S).

Masdevallie (F), Masdevallie (E).

١٦٩٤٧ - صَيْكَلَة \*  
جنس نباتات امنية من فصيلة السطيليات . جفورها  
لحمية قليلة الانشعاب . سيقها فيه اسطوانية الشكل .  
اوراقها حرفشية . ازهارها وسيدة ، كثيرة ، ملونة ||  
انواعها المعروفة قليلة المدد اشهرها التالية :




صَيْكَل



صَيْكَلَة سَاطِعَة





ط



طاية

منتشرة في معظم بحار البلاد المعتدلة الحرارة || اصداؤها شبه يفسية الشونن ، كثيرة الفاع المصراعي القاطب ، مألوفة الصفة المزخرفة بالالوان الزاهية ، عادة الحلزونة || اجسامها اعليجية ، فلق ارجلها تلحف الاصداف . رؤوسها قليلة الزنوج ، عادة الرأس .

Caractère (F). صفة - طابع ١٦٩٥٣  
Character (E).

Etage (F). Stor, Floor (E). طابق ١٦٩٥٤

Tapura (S). طابورة ١٦٩٥٥

Tapura (F). Tapura (E).

١٦٩٥٨ - طاحون ، طاحولة ، مطحنة  
Moulin (F). Mill (E).  
الرحى تحق الحب تنصره دقيقاً ، والطاحون يني أيضاً البيت المد الطحن . ج طواحين .

١٦٩٥٩ - طاعير ، طخورو ، Nimbostratus (S).  
ضرب من الغيوم وهو محاب مراكب له اكهب اللون او اسمر يحجب الشمس .

Bullidae (S). طابيئات ١٦٩٥٦

Bullidae (F). Bullidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل

خلفيات الخياشيم السقفية . اجسامها واتواها عديدة ، بعضها من متحجرات الطبقة الثالثة والبعض الآخر منتشر

في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة [ الحرارة ] اصداؤها

قراوح بين الاستدارة والاستطالة وقد يظف فيها الصفر

وارقة وهي كثيراً ما تكون مغلفة بالرداء او بالرجل .

غياشيمها مضمومة في تجاويف خاصة مركزها عند مؤخر

الظهر ينفلها الرداء . رؤوسها قليلة الزنوج عادة الموالس ||

اعرف اجناسها وانهرها الطابية والجبمية والحيمية والحيزوب

والكوارية .

Bullana (S). Bullée (F). طابية ١٦٩٥٧

Bullana (S). Bullée (F).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل

وفصيلة الطابيئات . انواعها المعاصرة المعروفة متوسطة المدد،

١٦٩٦٠ - طادة

الطادة ضرب من السمك (السان) .

١٦٩٦١ - طكرحة \* Pissette, Pipette

اداة غبرية تستعمل في لقاء السوائل المغنة .

١٦٩٦٢ - طاروق

الطاروق نجم يقال له كوكب الصبح .

١٦٩٦٣ - طكوى ، طكوى ، اتجق

Adventif (F). Adventicous (E).

نمت تمرني يطلق على بعض اعضاء النبات كالبرام

وغيرها التي تظهر عرضاً من القيات لم تألفها قياً .

١٦٩٦٤ - طكوى

Accident راجع اصابة .



طارسة



١٦٩٧٨ - طَاعُونُ الْخَيْلِ، مَرَضُ الْخَيْلِ الْأَفْرِجِي،

تَجَمُّعُ

Peste aquorum (S).

Peste equine, P. du cheval (F).

وباء شديد الخطر سريع الانتشار يصيب الخيل وصار الدواب فيسيبها أن لم تعالج وقائياً .

١٦٩٧٩ - طَاعُونُ الطَيْرِ ، طَاعُونُ الدُّجَاجِ ،

شُرْطَلَة

Pestis avium (S). Peste aviaire (F).  
وباء خبيث سريع الانتشار يفتك بالطيور الباجية انحصا الدجاج . يعالج وقائياً .

١٦٩٨٠ - طَاعُونُ الْكِلَابِ ، جَلَاعَتَةُ الْكِلَابِ ،

بُرْسْتُور

Febris catarrhalis x nervosa

caum (S). Maladie de Carré, Morbus carre (F).

وباء خبيث يصيب الكلاب فيسيبها أن لم يعالج وقائياً .

١٦٩٨١ - طَاعُونُ بَقَرِي ، أَبُو هَدَلَانْ ، أَبُو

دُمَيْعَةَ ، هَبْت

Peste bovine (S).

Peste bovine (F). Cattle-plague, Rinderpest (E).

وباء شديد الخلق سريع الانتشار يصيب البقر والغنم والماعز

والجاموس فيسيبها أن لم تعالج وقائياً .

١٦٩٨٢ - طَاعِيمٌ

Imperméable à l'eau (F).

Waterproof (E).

نمت تمريني يطلق كل مادة لا يغلها الماء .

١٦٩٨٣ - طَافِرٌ

Mutant (F).

فرد أو جزء من فرد ظهرت فيه طفرة أي شذو .

١٦٩٨٤ - طَاوَانٌ

Pecorinus petaurista (S).

Podomys petaurista, Taguan, Orul (F).

نوع من البطارييس وهو حيوان قاصم من السنجايات

موطن الهند وسريلاندي . طوله نحو ٥٠ سم . وزنه ٥٥ سم .

جسمه مستطيل الشكل . جوارزه قصيرة ، اطفاؤه صغيرة

مدينة . ثوبه الى الصهبة السوداء تدمق مع اقترابها من النهر

ولرأس والصدر . ينقل الى البيرة المرحضة بالابيض . رائحته

الجناسية المجلدية كاسية || يألف الاخراج الكثيفة

ويقترب من الاماكن الأكلة || قوته البأر والقشور

والحشرات والديدان .

١٦٩٨٥ - طَوَافٌ

Boopis (S). Boopide (F).

الاسم العلمي معناه « حين الثورة » والاسم العربي للماعز

الى شكل جميع الارواق والازهار . جنس نباتات مسمرة

بيرة وفزيين من فصيلة الكليريوات . منبتها الطوسي

بعض مناطق امريكا الجنوبية المعتدلة الحرارة || انواعها

المعروفة شرة ، اما ضروبها الزينية فكثيرة العدد .

سوقها غشوشية ، قليلة الفروع التي تنتهي بطاقات من

الارواق والازهار || تنويرها يستمر من اواخر الربيع

الى اوائل الخريف .

١٦٩٨٦ - طَافَةٌ

Energie (F). Energy (E).

صفة كل جسم يستطع القيام بعمل .

١٦٩٨٧ - طَافَةُ الْحَرَكَةِ

Energie cinétique (F).

Kinetic energy (E).

١٦٩٨٨ - طَافَةُ حَرَكِيَّةٌ

Dynamisme (F).

Dynamism (E).

١٦٩٨٩ - طَافَةُ عَفِيفَةٍ

Force cryptique (F).

هي القوة الخفية المستعدة التي تشمل تصميم الطبيعة الذي

يشمل بدوره الحياة والمثل والمثل .

١٦٩٩٠ - طَافَةُ كَامَتَةٍ

Energie potentielle,

Potentiel (F). Potential energy, Potential (E).

وتسمى الطاقة المقدرة أو المقدور الكامن .

١٦٩٩١ - طَافِيَةٌ

Energétique (F).

Energetic (E).

ما هو منوط بالثاقة .

١٦٩٩٢ - طَاكَنٌ \* ، طَعْمٌ

Budurcas taxicolor (S).

Takang, Takin (F). Takang (E).

حيوان لبون عاشب يجير من ذوات الاغلاف . موطنه يند

من الاسام الى التبت على حدود التلج الدائم . ملجته الحيواني

جامعي . قطبانه صغيرة متفرقة لتنجح الا عند الرجل من

مقاطعة الى اخرى فيبلغ عدد الاجل ، اذ ذلك ، نحو

٥٠٠ نفر || جسمه رمية ، مستطيل الشكل ، فيه من

الثور والكبش والظبي . يطول نحو ٢١٥ سم . ويصلو نحو

١١٥ سم . ويزن عند بلوغه الكلال الجسوري من ٣٠٠

الى ٣٥٠ كيلو . قرن الذكر يطول نحو ٥٠ سم . وقرن

الانثى نحو ٣٠ سم . ورأسه مستطيل الجرم ، عذبة نصبة

الانف . عيناه صغيرتان لوزيتان . اذناه صغيرتان

مستعرضتان . قرناه ضليمان يتحان الوجه . عنقه معتدل

القد ، كثيف الوبر المستطيل . صدره غريس النقص

مادم النيب . كفه مقوس الطرف المنحدر . قوائمها خفيفة ،

شديدة النشط . ثوبه الى الصهبة الزرقاء الملوحة بغير ويشرق

في صفحي الفتق ويشرق الى الشقعة في البطن . فرج

الانثى ثنائي الخلف || قوته الاصابه الخضره والجلشاش

الباجية .

١٦٩٩٣ - طَافِلٌ

Table de pointage (F).

جدول قياسي يحدد فيه قيمة الجزء من الذي بالنسبة الى

كامله .

١٦٩٩٤ - طَانٌ

Tan

الطان هو للمادة المائلة في مسوق لحد النقص وغيره

من انواع الستينان والكمسة الخ . يستعمل في تحضير

الجلود .

١٦٩٩٥ - طَانِخٌ

Indigene (F). Undigested (E).

ما تملر انهضاه على المعدة .

١٦٩٩٦ - طَاوُوسٌ

le Paon (F). Pavo (E).

الطاووس كوكبة نجوم جنوبية الميخ . مركزها بين المربع

الفلكي والثلث والثلثين || عدد نجومها تسعة مراتها تراوح

من الخامسة الى الثامنة .

١٦٩٩٧ - طَاوُوسٌ ، طَاوُوسٌ

Pavo (S).

Paon (F). Peacock (E).

جنس طير من فصيلة التندريبات . مشهور بمجال ريشه

والزهر يتنفس والخيلاء . كنيته ابو الحسن وابو الشبي .

انواعه قليلة . جميعها كثيرة اللمعة مستطيلة ريش القرواد

والزنجي ، قصيرة ريش الانثى . رؤوسها صغيرة عند

شعوية . متغيرها غليظة . ارسافها طويلة . مغالبها صغيرة .

انثيا متراكبة الالوان الهية يطولها تشيتم جميل ومشة



طَاوَان



طَاوَان



طَاوَان

Paradisea minor (S). طائر الفردوس الصغير  
Paradisier petit émeraude (F).  
Paradisea apoda (S). طائر الفردوس الكبير  
Paradisier apode, Paradisier grand émeraude (F).

1٧٠٠٧ - طائر الفينيكس \*  
Oiseau-lyre (F). طائر من الجوامع لاقتات النمل يدعى مانور ، اطلبه .

1٧٠٠٨ - طائر الفينيكس الأبيض \*  
Oiseau-lyre superbe (F). طائر من الجوامع لاقتات النمل وفضيلة المانوريات يدعى مانور ميلور او اتيق ، اطلبه .

1٧٠٠٩ - طائر المغاليب \*  
Oiseau des tropiques (F). طائر من كليات القدم وفضيلة الفينيكسات يدعى فيتين ، اطلبه .

1٧٠١٠ - طائفك \*  
Sous-classe (F). Sub-class (E). الطائفة في تصنيف الاشياء تأتي بعد الصف وقبل النعمة .

1٧٠١١ - طب أنثييل \*  
Hippiatrie (F). Hippiatry, Vetrinary art (E). علم يبحث في امراض الخيل وهداؤها .

1٧٠١٢ - طب بيطري \*  
Médecine vétérinaire (F). Veterinary medicine (E). هو طب الحيوان او طب الحيوانات الداجنة .

1٧٠١٣ - طباب ، ديسك \*  
Disque (F). Discus, Disk (E). شكل قرصي الهيئة مطع الصلصة اورد عليها او مقعها .

1٧٠١٤ - طباج \*  
Lagria (S). Lagrie (F). Lagria (E). جنس حشرات غاشلة من غديات الاجنحة وفضيلة الطابجيات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة تطول من ٧ الى ٨ م . رؤوسها شبه مخروطية . متكاثرها عموماً في عيينها كبيرة نافذة . قرنها الاستشعارية غيبطة . كواسلها ضيقة مستطيلة . بطونها املجية مقلطة . احمادها عذبة ، لاسعة ، خلية الكفار ، مهدية الاطراف . قوائمها مستطيلة || تألفت المواقم الدفلة . قوتها الارواق والازهار . يرقاتها حادة تعيش على المواد النباتية المنحلة في الجلالة وتحت القشور والحاء .

1٧٠١٥ - طابجيات \*  
Lagrideae (S). Lagridae (F). Lagridae (E). فضيلة حشرات من غديات الاجنحة مخفلات الاجزاء . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع المناطق الحارة . جميعها غاشلة قوتها المواد النباتية . يرقاتها تعيش في الجلالة وتحت القشور || اجسامها صغيرة تطول من ٤ الى ١٢ م . رؤوسها مخروطية . كواسلها ضيقة مستطيلة . احمادها جالسة القاعدة ، مستديرة الاطراف اللاسعة . قرنها الاستشعارية غيبطة مركبة من ١١ فصلة . مختلفة الاجزاء || اشهر اجناسها واعها انتشاراً الطابج .

غلاية . ذنابها ربة اللد ، مروحية النثر || موطنه الهند وجوارها وسرنيش . ياقظ الغابات والدياش والمروج الدفلة . يعيش اسراباً صغيرة براوح صعدا بين ٦ و ٢٠ . قوته اللد والجرب والاشباب وقنواي والحشرات والورغ والافاني || جمه الاشجار المنحطة الاضمان . اناته تقسم نحو ١٠ فصلات تحسباً وسجدا في انحصرت دلتته في آخرة بين الاعتدال والاشباب || اشهر انواعه ما يتبع .

1٦٩٩٨ - طاووس أسود \*  
Pavo nigripennis (S). Black peacock (E). طائر من الطاووس موطنه الشرق الاقصى . يتميز باموداد ريشه وبامتددة فصوص ذنابها وبالنشأة الفضية المواج التي تملو ريش صدره .

1٦٩٩٩ - طاووس الثيبث \*  
Paon du Thibet (F). هو قشكيس طائر من كندريجات ، اطلبه .

1٧٠٠٠ - طاووس صيني \*  
Pavo muticus (S). Paon spicifera (F). طائر من الطاووس . موطنه الهند . كبير الجفة والجمال . رأسه وقتره صفته الى الاخضر المايق الازرق المواج . صدره الى الاخضر الازرق الملعب المواج . بطنه شديد الخضار الازرق . ظهره اسفح لاصع يتخلله الاخضر والاصفر . قلدته الى الصبهة . اياهره الى السواد الازرق المواج . كلاء الى الخضار المايق . ذيله اكبر من ذيل الطاووس المعادي وازني لونا وابي رونقا .

1٧٠٠١ - طاووس عادي \*  
Pavo cristatus (S). Paon vulgaris, P. common (F). Common peacock (E). طائر من الطاووس رأسه صفته وصدره وبطنه الى الازرق الباقية والجلية ، الخضراء المواج . لة رأسه سوداء حمرة مشوح بالابيض . ريش ظهره اخضر اسفح ، اسيد الحافة ، قلدته الى الصبهة الباقية . اياهره الى السواد الازرق المواج . ذيله اخضر اسفح تملو فصوص سود يحرقها الاخضر الزاهي .

1٧٠٠٢ - طاووس \*  
Pavone (F). Penhen (E). انى الطاووس .

1٧٠٠٣ - طائر البوق \*  
Thalassidrome (F). هو البجسي اللجب ، اطلبه .

1٧٠٠٤ - طائر الترابيع \*  
Thalassidrome (F). طائر من كليات القدم مشهور باسم قندوم ، اطلبه .

1٧٠٠٥ - طائر الفيث \*  
Oiseau de pluie (F). طائر من فضيلة الفينيكسات يعرف باسم قشاق ، اطلبه .

1٧٠٠٦ - طائر الفردوس \*  
Paradisea (S). Paradisier (F). Bird of paradise (E). جنس طير من فضيلة الفردوسيات ورتبة الجوامع المشروبات المناظر . انواعه قليلة معددا جزو المحيط الهادي . تتميز بزدها اوتياها المايق الجمال . اجسامها متوسطة القد . طولها براوح بين ٣٠ و ٤٥ سم . رؤوسها معتدلة ، متقاربا مستطيلة ، عذبة ، ذرية . مناقشها قاعدية الارتكاز منشأة بالزغب . اجنتها متوسطة القد ، ذلفة . اذنابها قصيرة . ارباش افنتها الجانبية مقوكة الشكل متناحية في الفتة والرسية || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية .

Paradisea rubra (S). Paradisier rouge (F). طائر الفردوس الاحمر



طاووس صيني



طاووس عادي



طاووس الفردوس



طابج

## ١٧٠٢٥ - طَبَّرَحَى

Gutta-Percha  
مادة حليبية تستخرج من بعض اشجار الفصيلة السبوتية . تستعمل كأداة عازلة في غنظ الهنداعات لأنها لا تنقل الكهرباء ولا تقوب بالجليد أما تلويب بالكلوروزم ولفور الكبريت والبنزين .



طبار

## ١٧٠٢٦ - طَبَّرُودَه

هو الأبلوج ، الحلبه .

## ١٧٠٢٧ - طَبَّرُونْ

Pain de sucre (F). Sugar-loaf (E).  
هو السكر الأبيض المألوف والمقوب ويصنع الطبروز والطبرزل .

## ١٧٠٢٨ - طَبَّرُوسَه مُسْتَحَبَّةٌ

## Tetragnatha fufiva (S). Tetragnatha agréable (F).

دودية من العناكب الساعية القانصة من ثنائيات الروايا سداسيات المشانق وفضيلة الشياحات . موطنها معظم أقطار البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم . جسمها شبه مدني الشكل يطول عند العنكب نحو ١٨ مم . وعد العنكب نحو ٣٠ م . صدورها يلسي الشكل اسمر اللون . صياحها مركبتان زحيتان . شيفها دقيقان ذريان . فكاهما عجنان . جرائها مستطيلة ، نشطة ، مسنة الاطراف . فوجا الى الصخرة الجميلة يطويها تقارون قائمة في قوتها الحشرات اغصتها الذباب والحمام .



طبر

## ١٧٠٢٩ - طَبَّرِيَّات

Cyprinidae (S). Cyprinidae (E).

فضيلة حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشم الاويل . اجنتها وانواعها المروفة كثيرة العدد . متشربتها تظهر في الطبقة البلطيرية . انواعها اصفاء متشرة في معظم بحار العالم . اصداها سميكة الاصفاة متباينة الاشكال والاحجام . تتميز بنحاشها الانسارية ، ذننه ، عظامها الطويلة ، القصيرة وباربها المستطيلة القعدة الصفحات السفلى . اعرف انواعها واشهرها الطرية والوطيب واليوت .



طبروسة مستحبة

## ١٧٠٣٠ - طَبَّرِيَّة

Cyprine (S). Cyprine (F). Cyprina (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات سفيفيات الحياشم الاويل من فصيلة الطيريات . انواعها المروفة عديدة اصلاها مصبات انهر المناطق الشمالية . اصداها شبه غروبية الشكل خماسية الاطراف او سباعية ، سميكة الصفحة المشقة ، مالة الحمار . خيرا اللون غالبا . تعيش بين الرمال والحصى . لحمها كاعنة المصفت .



طبرية

## ١٧٠٣١ - طَبَّرْ

هو الفالح ، الجبل ذو السنانين ، الحلبه .

## ١٧٠٣٢ - طَبَّرُونْ

هو اللسان السوي ، الحلبه .

## ١٧٠٣٣ - طَبَّاب

Megacephale (S). Megacephale (F).

جنس طير من فصيلة الشبانيات . انواعه قليلة تتميز باختلاف اجسامها . رؤوسها صلع تعلوها خوذ قلبية الشكل . اذنانها كبيرة القند . طاهر انوارها الى السمرة الشايقة يطويها موج زيرتي . ياطن الثيابا ويطويها وانفاها الى السمرة الوردية . اجنتها مستديرة الشكل ، مستوية الحجم . اذنانها صغيرة فرقة . ارصافها قوية لونها الى البسود . تألفت الاجرالح القترية من الشولوي . تعيش



طباب

١٧٠١٦ - طَبَّارَة ، تَيْسَة شَتَوِيَّة (F).  
ثمرة الطبار وهي متمسكة الصنف كبيرة القند غلا الكن . والطبار غرب من التين الكشوي يعيش في البلاد المعتدلة الحارة .

## ١٧٠١٧ - طَبَّاشِير

Crals (F). Chalk (E).  
حجارة جيرية ناعمة البيضاء ، قليلة الصلابة ، حثية الأثر ، مسكونة من ذرات الجير تخالطها بقايا عارية صلبة صوطا مرور الزين بالضغط والترتيب . اما اصابع الطباشير التي تستعمل في الكتابة حل اللوح السدي فهي مزيج مركب من الجير مع كربونات الكلسيوم او كربونات الكلسيوم .

## ١٧٠١٨ - طَبَّاشِيرِي

Crétacé (F). Cretaceous, Chalky (E).

نمت تعريفه يطلق على الحقبة الثالثة من الاباح الاويل اي الثاني . وبهاذا التسمي تخالطها الاراضي الطباشيرية . تتميز هذه الحقبة بتطور انصاع القشرة الارضية وانقسامها الى بعض القارات . وبمجانة استعاب المناطق المناعية ، وبكثرة انتشار الرغويات وسبا سديات الاربيل ومزدوجيات المسامير ، وبالتشعار الزخامات الكبيرة والجلابة وتطور الثبيات الصغيرة القدية شبه بالثبيات الحالية .

## ١٧٠١٩ - طَبَّاقٌ ، طَبَّيْنٌ ، رَكْسَنٌ دَبِّي

Infus viscosus (S). Aunée visqueuse, Inule visqueuse, Conyze visqueux (F). Rock fles-bane (E). Alpenfloukraut (D). Enula viscosus (I).  
نوع من الراس وهو نبات عشبي بري مسمر من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه فراء ، زياء اللحماء ، تلور من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه صغيرة القند ، احليجية ، ذرية . اصلها انضب البشرة الحزبة على صفحيه . وكه جاء عنه في السان : والطباق شجر منابه جبال مكة كثير المنافع .

## ١٧٠٢٠ - طَبَّاقُ الْبَرَاغِيثِ

هو البرغوف ، الحلبه .

## ١٧٠٢١ - طَبَّاب

Disque solaire (F). Solar discus (E).  
شعاع الشمس وهي الطرائق التي ترى فيها عت طلوبها .

## ١٧٠٢٢ - طَبَّيَّة

كل تلمة من الارض مستطيلة الشكل ، خيفة العرض كثر لبانها او قل تدعى طبة .

## ١٧٠٢٣ - طَبَّرٌ ، عَتَدِرْمَةٌ

Ganoderma  
فطر من السيات يركب الجلعوق اليابسة في السديان والحر والاكابا واذا والينق فيسب انفلاتها الطولي ثم عليها وانقيامها البقي . شبيه ابيض اللون كثيف الحيز . فطر طلي الشكل ، تشج السطح ، جل الاطار ، نام البشرة الزياء الحلية للفس ، لونه اصعب اغبر ، يمتد عند منخض خط الاطار . اما الاطار فايفس والصفحة السفلى بنية . لباه قرني اللون ، جامد الحظ ، نقي التركيب . سماكه من ١ الى ٣ سم . يورثاته قمية الشكل طولا نحو ٨ ميكرون وقطر ناعمتها ٨ ميكرون .

## ١٧٠٢٤ - طَبَّرْ

Pisetre (F). Plaster (E).

Tétine, Tétin (F). **طَبِيْءٌ - طَبِيْءٌ** ١٧٠٤٥

Teat, Nipple (E). حلمات الضرع التي من تحت وتلف وحافر واسع وأكثر ما يكون الطبي السباح ج الماء .

١٧٠٤٦ - **طَبِيْءُ الْكَلْبَةِ** هو الخلاف القوي الورق ، اطيه .

١٧٠٤٧ - **طَبِيْبٌ بَطْنِيٌّ** Vétérinaire, Médecin vétérinaire (F). Veterinary, Veterinary surgeon (E). هو الطبيب المختص بعلاج الحيوان .

١٧٠٤٨ - **طَبِيْحًا** هي الجبوسا ، اطلبا .

Gasteropelecus (S). ١٧٠٤٩ - **طَبِيْرَةٌ** Gastéropélaque (F).

جنس اسماك بحرية من مفتوحات المثانة وفضيلة السلموثيات ، انواعها المعروفة قليلة العدد مملوكة عند مصبات الانهر || اجسامها صغيرة ، مبططة ، طرية الشكل ، تقوّل من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها واعظامها متوسطة الحجم . اشداقها شبه حويصلة الانفراج . زعانفها الظهريّة خلفيّة الاذن كاذب صغيرة . الصدريّة جناحية الشكل . الحوضيّة شديدة الصغر . الشريكية مستطيلة والذيلية فائقة . جميعها تتميز بطبونها النصف دائرية الشكل . الالوان الى الخضار الغني المالح .

١٧٠٥٠ - **طَبِيْجٌ** هو لب الطلعة .

١٧٠٥١ - **طَبِيْعَةٌ** Nature

١٧٠٥٢ - **طَبِيْعِيٌّ ، مَادِّي** Physique, Matériel, Naturel (F). Physique, Material, Natural (E).

١٧٠٥٣ - **طَبِيْقٌ** Coronula (F). جنس سيوليات بحرية من القشريات اصفاهاا طبقة الشكل ، مسننة الاضلاع ، صغيرة القد تعيش على غطاء اجناس الحيتان .

١٧٠٥٤ - **طَبِيْقِيٌّ** Hymenocallis (S). Hyménocallide (F). Hymenocallis (E).

جنس نباتات عشبية دوفضية من فصيلة التريسيات . موطنها بعض اقاليم امريكا الجنوبية . اوراقها اهليجية الشكل . ازهارها عطرية المرف ، صيروانية التجميع ، قواعده يحيط استنباط مستعرضة مندغة قديمة الشكل || تزود كثرتين ضمن البيوت وفي الحدائق . ترطب في الازربة القليلة الاندماج المنسوبة التركيب . المنصري الزائرة المواد الغذائية || انواعها قليلة العدد ، اشهرها الثلاثة التالية .

١٧٠٥٥ - **طَبِيْقِيٌّ أَهْيَافٌ** Hymenocallis speciosa (S). Hyménocallide élégante (F).

نوع من الطيب . عشبة دوفضية سبروتية . شراغها ثنائي الصلوع الزوارية ، يرتفع من ٤٠ الى ٥٠ سم . اوراقها اهليجية مستطيلة ، نصلها جيل الخضار الزاهي . ازهارها صيرواني التجميع . ازهارها بيضاء اللون ، كبيرة القد ، تقوّل نحو ١٠ سم . تاجها اي قدسها سداسي الشكل المندمعة المحلاة الخضار || تنورما خريفي .

ذكرًا وانثى كالحمام . اسرابها تعد من ٧ الى ١٥ زوجاً . قوتها الجيوب على استغلتها . انثاها تبيض في الفصوص كبير القد تقوّل براوح بين ١٢٠ و ١٥٠ سم . وعقد من ٣٠ الى ٦٠ سم . تنفخه مع ذكورها ورفيقاتها من السرب الواسد في دمال الشاطئ على حدود مرسى المد . وهي لا تحسن بيضها بل تقسه في الاقصوص وتطليه بطبقة من الرمل ساجتها نحو ٢ سم . يفتق بعد اسبوعين . وهي تبيض في موعدها من ٨ الى ١٠ يضايات تضعها بالتتابع حيث ينقضي بين الواحدة والي ثلثها من ١٢ الى ١٤ يوما . والبيضة كبيرة القد مستطيلة الشكل تبدو عند وضعها قريديّة اللون ثم تتحول الى الصفرة وتستقر على البياض . الفرخ يفتق كليا فثيلاً مستنقيا عن حضانة امه التي يحملها ولا تعرفه .

١٧٠٣٤ - **طَبْعَانٌ** Argile grasse (F). Clay, Greasy, Rich (E).

١٧٠٣٥ - **طَبِيْقٌ** Vertèbre animale (F). Animal vertebre (E). تقار القنبر عند الحيوان .

١٧٠٣٦ - **طَبَقٌ ، كَتَبٌ ، أَبُو طَبِيْقٌ ، أَبُو قُرْصٌ** Holacanthus (S). Holacanth (F). جنس اسماك بحرية من فصيلة السلطيات . انواعها المعروفة نحو ٤٠ موطنا بجمار البلاد الحارة . جميعها صغيرة القد مغططة مستدرة طولا براوح بين ١٥ و ٢٠ سم . انثاها زاهية الالوان الجميلة المحملة بالاصفر والبرتقالي والوردي .

١٧٠٣٧ - **طَبَقَةٌ** Scras, Stratum, Couche (F). Stratum (E).

١٧٠٣٨ - **طَبَقَةٌ** Superordre (F). Superorder (E). باب في تصنيف الاسباب يأتي بعد الشبة وقبل الرتبة .

١٧٠٣٩ - **طَبَقَةٌ مَوَلَدَةٌ** هي القلب اي الكيسوم ، اطيه .

١٧٠٤٠ - **طَبَقَةٌ** Tympan (F). هي الصمغاء ، راجع اذن .

١٧٠٤١ - **طَبَقَةُ الْأَذُن** Tambour de l'oreille (F). Ear drum (E). راجع اذن .

١٧٠٤٢ - **طَبَقِيٌّ** Tympanique (F). Tympanic (E). تمت تعريف يطلق على كل ما له علاقة بطبقة الاذن .

١٧٠٤٣ - **طَبْنٌ ، طَبْنٌ** Pître de charogne (F). Food of carrion (E).

الجيفة توضع فيصااد حلها السور والسباح .

١٧٠٤٤ - **طَبْرُوعٌ ، قَمَلُ الْعَاكَةِ** Phitirus pubis (S). Morpion, Pou du pubis (F). Crab-louse (E).

نوع من القترصيات صغير الجسم مستعرض الشكل طوله براوح بين ملبرم واربعة خطوط وعلبرم وسمكة خطوط . ارجله دقيقة ، ارساغه ثنتيني بمقاي خادشة حادة . يعيش بين الشعر الخشن كشر المانة والايط والحاجب .



طَبِيْقٌ



طَبِيْقٌ



طَبِيْقٌ



طَبِيْقٌ

## ١٧٠٥٦ - طليق كبير الناج \*

*Hymenocallis calathina* (S).  
*Hymenocallide à grande couronne* (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شراخها ثنائي الصلوع المزوانية يدلو من ٤٥ إلى ٨٠ سم. اوراقها قلبية الشكل، مستطيلة الطرف لذلك، طول من ٤٥ إلى ٦٠ سم. وتعرض من ٤ إلى ٥ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها بيضاء اللون، كبيرة القذ طول من ١٥ إلى ٢٠ سم. تاجها اي قدما سداسي الشكل للندغة الباحة الخضار للثوريما يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٧٠٥٧ - طليق متناجر \*

*Hymenocallis undulata* (S).  
*Hymenocallide ondulée* (F).

نوع من الطليق، عشبة دوفضية سريرية. شراخها عديم التضلع يرتفع نحو ٦٠ سم. اوراقها سنانية الشكل، رقيقة التصل المجزج، طول نحو ٣٠ سم. وتعرض نحو ١٢ سم. ازهارها سيولي التجميع. ازهارها عابجة اللون، كبيرة القذ، طول من ١٥ إلى ١٨ سم. تاجها سداسي الشكل للندغة، زيتي اللون للثوريما ديمي او غريفي.

## ١٧٠٥٨ - طليق \*

*Cryptocare* (F).

*Cryptocareus* (E).

نمت تعريفه يطلق على كل حشرة غطية الزباني.

## ١٧٠٥٩ - طليقة البطاطا \*

*Lygaeus solani* (S).  
حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا الى الخضرة. اطرافها صفراء اللون تتميز بكسيتها النظيف الغصم ورأسها الكبير المستعرض للتركيب اوراق البطاطا فتؤذيها.

## ١٧٠٦٠ - طليقة الزرع \*

*Blissus leucopertus* (S).  
حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى البصرة المايقة. جنداتها مستطيلان مزركان وينتشان. ارجلها صفراء، ريقها تبدو صفراء اللون عند التفت ثم تنصرف الى الخضرة ويزداد ازهارها بعد كل انشاج الى ان يستقر على الجزرة للتركيب الحطة والشعير والشيلم والشوفان والذعن والذرة والارز.

## ١٧٠٦١ - طليقة السنديان \*

*Lygaeus aequestr* (S). *Lygée aequestre* (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الطليقات ورتبة غطيات الاجنة جسمها مبطل الجرم يطول نحو ١٢ م. رأسها احر اللون، اسود اطليق الممثل الطول. عنابها صفيرتان، ناضراتان. زياتها مستطيلان، اسودان. كسيتها احر اللون، اسود القسم الذي يتنام الرأس، بلتها وسداسي الى الخمسة، سيجتها مزوانية، سوداء. طولها احر المضاف، اسود الطرف واليتيج ويدلو من طرفه الاسود يتجلى ايض وتنتظير. قشراتها شفاف. قوائمها الى البصرة للترمة السنديان.

## ١٧٠٦٢ - طليقة الفطن \*

*Oxycaenus hyalinipennis* (S).

حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٥ م. ثوبا الى البصرة السوداء. جنداتها بلن كفضة الالامه للتركيب براعم التطن الزرية وتقع بها اشد الاذى.

## ١٧٠٦٣ - طليقة الكرمة \*

*Pyrrhocoris apterus* (S). *Punaise tête de mort*, *Diabie* (F).

حشرة من الطليقات صغيرة القذ طولها نحو ٦ م. ثوبا ابيض اللون. اجنتها قصيرة. جنداتها جعقة للتركيب برام الكرمة فتؤذيها.

## ١٧٠٦٤ - طليقة \*

*Fourmis* (F). *Anta* (E).

هو النسل واجنته طرية.

## ١٧٠٦٥ - طليقات \* و طليقات \*

*Lygaeidae* (S). *Lygaeidae* (F). *Lygaeidae*, *Chinch bugs* (E). *Lang wazzen* (D).

فصيلة حشرات من رتبة غطيات الاجنة. اجنتها وازنها كبيرة العدد جميعها خاضعة او شائعة، صغيرة القذ او متوسطة. تتميز بطولها من عند فروز السوائل الكرمية الرائحة. عويناتها جانبية. قرونها الاستشارية مستطيلة، مقوسة، لثافة المفصل. ارجلها لثافة النعل. جنداتها خضراء اللون القاطية الطولية.

## ١٧٠٦٦ - طليقة \*

حشرة تسمر نحو لثافة مشوكة من اسفلها الى اعلاها شوكها غالب لونها وورقها صلب ولها ثورية يفسده يحرمها للتصل. ج طي (اللسان).

## ١٧٠٦٧ - طليقات \*

*Etudes des nuages* (F).

هي الايلان درس تكوين السحب وتحر كاتها.

## ١٧٠٦٨ - طليقات، طليقات، طليقات \*

*Cirrus*  
غرب من النجوم وهو يتجلب مرتفع رقيق روى السماء من غلاخ.

## ١٧٠٦٩ - طليقات مزرقة \*

*Tropiderus sepicola* (S). *Tropidère moucheé* (F). *Tropiderus sepicola* (E).

حشرة خاضعة غاشية دامت من فصيلة القاطريات ورتبة مفدمات الاجنة. تألف اجراج السنديان. غناشها تمش على الارواق. يرقاتها تمش على الجملع والاضبان اليابسة فتسريها بالقطول والفرس. جسمها صغير القذ يطول من ٤ الى ٥ م. ثوبا الى السوداء القوي الاصب المواج يطول تقريب اطول وبعض التوزيع الكستانية. رأسها مستد الجرم، غناشها متكي منق الطرف. منابها صيرتان. زياتها صيرتان. طولها مستد الموزع للاتصاف. جنداتها شديدا الصلبة، كسيتها الخمل. ارجلها لثافة النعل للها جيل واحد الى الحيل. تظهر الحشرة الجملعة في اوائل ايار وتعيش حتى اواخر تموز. تسرح في التبار. تساهد بعد ظهورها ينس اربعة اسابيع تمتع المكان في شفق الاضبان اليابسة او تحت قشورها للثقة عنه بلونها الكمال الجسموي طول نحو ٨ م. جسمها مستطيل الرأس والمقد، سداسي الرواج الصندرة. ثوبا الى التني الاصفر المواج. رأسها اسود. تكاها غليمان ذويان للطور الكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع يتقضي في السرداب الريقي ضمن غشاء خزيل.

## ١٧٠٧٠ - طليقات \*

*Rate* (F). *Spleen* (E).  
ضوء ياتي في الجسم يربط في تجويف البطن تحت الحجاب الحاجز. وظيفته التفاع من الدم عند الكبرويرات لذلك فهو يمتزج الكثير من كريات الدم احمر ويستهضمها عند الحاجة اليها. ج طليق والطحلة وطحالات.



طليقة البطاطا



طليقة الزرع



طليقة التطن



طليقة الكرمة



طليقة مزرقة

## \* ١٧٠٨٠ - طحروب السنديان \*

*Pleurotus dryinus* (S). *Pleurote du chène* (F).  
نوع من الطحروب . يعيش على جذوع السنديان وأغصانه .  
جميعته شبيهة العدد الذي يتألف من وحدتين أو أربع  
وحدات . ساقه شديدة القصر . نكتة مفروطة ، متحدة  
الحجم ، مكثفة الأطراف ، مزينة السطح ، لونها إلى  
الحملة الصفراء المروج يملؤها تنبتش اسمر . اطراسها إلى  
الصفرة السمره الملوحة || لحيته كاعثة الصنف ، غير  
مرغوب فيها .

## \* ١٧٠٨١ - طحروب صخاري \*

*Pleurotus ostreatus* (S). *Pleurote en huître* (F).  
نوع من الطحروب يعيش على جلود الصنوبريات .  
جميعته تعد من ٦ إلى ١٢ وحدة . ساقه قصيرة شبيهة  
اللون . نكتة عارية الشكل لونها إلى الكهية السمره ،  
اطراسها إلى اليلكي المالح || لحيته مأكولة ، لذيلة  
العلم .

*Nuage* (F). \* ١٧٠٨٢ - طحروب ، طحروب  
*Cloud* (E).  
الطحروب والطريرة : السحاب . والطحارب قطع  
السحاب المتفرقة .

*Muscleale* (F). \* ١٧٠٨٣ - طحلب  
*Muscolous* (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على النباتات  
الطحلية .

## \* ١٧٠٨٤ - طحلب ، طحلب ، طحلب

*Mousse* (F). *Moss* (E).  
اسم شامل يطلق على مختلف النباتات الطحلية دون تمييز  
رتبة أو فصيلة أو جنس . والطحلب من النباتات الماددة  
الانزاع والجلود الحقيقية تلتصق للذات بمخاض غيبطة  
تثبتها في التربة وعلى الشجر والصخور .

*Mousse* (F). \* ١٧٠٨٥ - طحلب السمك  
مرض سار يفتك بأشكال المياه العذبة . مظهره الخارجي  
نواص غلى التجميع ، قطبي اللون يملأ أجسام السمك .  
سبه نظر مجهرى ينحى سرولوجية (*Saprolognia*)  
يعيش في المياه الملوحة القذرة .

*Sphagne* (F). \* ١٧٠٨٦ - طحلب المتناقع  
هو الصمبل ، اطلبه .

*Bryophytes, Muscinées* (F). \* ١٧٠٨٧ - طحلبيات  
*Bryophytes, Muscine* (E).  
قسم من المملكة النباتية يتميز بخلو نباتاته من الجلود  
والانزاع . اجنسه وانواعه كثيرة العدد جميعها ثنائي  
فصائل تنتمي إلى أربع رتب وصفين .

\* ١٧٠٨٨ - طحلب  
هي الشوكران ، اطلبه .

*Mouture* (F). *Grinding* (E). \* ١٧٠٨٩ - طحن  
جبل البر وسائر الحبوب دقيقاً .

*Olivella* (S). \* ١٧٠٩٠ - طحيرب  
*Olivella* (F). *Olivella* (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مبيات الاربل  
وفصيلة الطحيريات . انواعه الماصرة المروقة نحو ٣٠

## \* ١٧٠٩١ - طحلب

*Mosses* (F). *Moss* (E).  
صنف من قسم الطحليات انواعه واجنسه عديدة جميعها  
اربع فصائل تنتمي إلى مرتبتين : السبقيات والسفحات .  
اما فصائلها فهي : الرويكيات والسفحات والثرنيثيات  
والصرغيات .

\* ١٧٠٩٢ - طحلب  
*Splénique* (F). *Splanic* (E).  
نمت تعريفي يطلق على ما له علاقة بالطحلب .

\* ١٧٠٩٣ - طحان  
*Meunier* (F). *Miller* (E).  
هو من تامل مينة الطحن من صانع الطحين وبائه .

\* ١٧٠٩٤ - طحانة  
*Meunerie* (F). *Miller's trade* (E).  
سرة الطحان وهي صناعة تحويل الحبوب دقيقاً .

\* ١٧٠٩٥ - طحروب  
*Olivancillaria* (S).  
*Olivancillaire* (F). *Olivancillaria* (E).  
جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مبيات  
الاربل وفصيلة الطحيريات . انواعه الماصرة المروقة  
عديدة موطنها بدار امريكية الجنوبية || اصداها شبيهة  
باصدا الطحرب الا انها ازلت منها وجوانسها مقوية  
الشكل . صفحاتها ناعمة ، جميلة الالوان والزخرفة .

\* ١٧٠٩٦ - طحروب  
*Olive, Dactylus* (S).  
*Olive* (F).  
الواحدة طحربة . جنس حيوانات بحرية من الرخويات  
مبيات الاربل وفصيلة الطحيريات . انواعه المروقة نحو  
٦٠ جميعها مفترسة . موطنها بدار البلاد الحارة . تعيش  
على السطوح الرملية الممطرة || اصداها مألوفة شبيهة زيتونية  
الشكل . متوسطة الحجم ، جميلة الالوان والزخرفة . بعض  
انواعها يفرز مادة صناعية لونها وركيبها كالارجل ||  
اثير انواعه واكثرها قذا ويؤمها ارجوانيا الطحرب الزرق  
(*Dactylus utriculus*) لونه إلى الشفحة المزخرفة  
بالكهية . موطنه المحيط الهندي .

\* ١٧٠٩٧ - طحيريات  
*Olividae* (S).  
*Olividae, Dactylidae* (F). *Olividae* (E).  
فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات مبيات  
الاربل . اجناسها وانواعها الماصرة المروقة عديدة موطنها  
بدار البلاد الحارة || اصداها شبيهة املحلية ، زيتونية  
الشكل ، متقاربة الاجسام ، جميلة الالوان . مستطيلة  
كتنوتها الضيقة الناعمة . ارجلها كبيرة ، ثنائية القلق ||  
اعرف اجناسها واشهرها الطحرب والطحيرب والطحارب  
والرولوب والمالعة .

\* ١٧٠٩٨ - طحيرة  
*Tégument* (F). *Tegument* (E).  
للشاة الناعم الذي ينفذ القوة والبركة وما اشبه .

\* ١٧٠٩٩ - طحروب  
*Pleurotus* (S). *Pleurote* (F).  
جنس طحروب كاملة التركيب من فصيلة الفاروقيات.  
انواعه المروقة قليلة العدد اصلاها غابات وسراج جبال  
المناطق المعتدلة الحارة . تعيش على جذوع الاشجار  
واغصانها دون أن تثقيبها . تتميز بساقها القصيرة وبكاعها  
القسمية الشكل || اعرف انواعها واشهرها الطحروب المالحوي  
وطحروب السنديان .



طحرب



طحرب السنديان



طحرب بحاري



طحرب



المروفة قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || مستتراتها نادر كمنقذ ملوثة قطنية الخشب تتوأم في اللاه توجهها ملاسها المديدة وما ينشأ لها من الياث راشية مستطيلة عجيبة الاطراف .

١٧١٠٤ - طرزيات \*  
Phyosphoridae (F).  
Phyosphoridae (F). Phyosphoridae (E).

فصيلة من الضفائيات المنشبات البحرية . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم مجار العالم || اشهر اجناسها الطرزة .



طخوف

Type ١٧١٠٥ - طركاز

١٧١٠٦ - طركاز برنقالي \*  
Rupicola crocea (S).  
Rupicola orangé (F).

طائر من فصيلة الطرزيات . موطنه بعض المناطق الجبلية من اليونان والبرازيل . تألف المراجع الصخرية والاراضي الوعرة باستثناء فصل الشتاء حيث ياتي الى الغابات . سره يند بعض المئات || جسمه مكروم الشكل يطول نحو ٣٠ سم . عنه الذكر نحو ٢٧ سم . عنه الانثى . ثوب الذكر الى الصفار البرتقالي . حمار قزخته الى الابيض المائل . لوانث قوامه وياهره الى الجوزة . وقال ذنبه جزوية اللون صفراء الاطراف . حقة عنه برقالية اللون . منقده وساقه الى الصفار المائل . ثوب الانثى الى الصفار المائل . طلعو مائة حمار في حمار في الانثى واللب || طيرانه خفيف الحركة سريعها طويل الطول . قوته التار المختلفة واليدور || يشبه وكسه في مخاليف الصفور . عمل طريقة السنور . بالثمن المزوج بالالياف النباتية . الانثى تحضن ثلاث مرات في الحمار . حفتها تتألف من بيضتين . القرحم يمشي نحو اسبوعين تقوم به الانثى بيتا الذكر يبين لها الشتاء .



طرزة

١٧١٠٧ - طركازيات \*  
Rupicolidae (S).  
Rupicolidae (E).

فصيلة طير من الجوزم سنيت المناظر . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى اعصها اليونان . تألف البير والواقع الصخرية التي لا تبعد كثيرا عن شلالات اللاه || اجسامها حيلة مكرومة مستطيلة الاجنحة قصيرة الاذنان والارواح . صفيرة المنقذ . كبيرة القنارح التي تبعد من المناظر الى الانثى . الوهاا تختلف مع القرح واثق || نظامها الحياتي جماعي . اسراجها تد بعض المئات . قوتها التار واليدور || اعرف انواعها واشهرها الطركاز البرتقالي .



طرز برنقالي

١٧١٠٨ - طرقة البع \*  
Terapha hyocinai (S).  
Punatse des Jusquiamas (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الكوريات وردية خضفان الاجنحة . جسمها ميجر الملب . متعل التبطيط . يطول نحو ١٠ سم . رأسها مستطيل . محرم . عظمها متعل الملب . عينها صيرتان . ناشزتان . زبالها مستطيلان || ثوبها الى الحمرة الصفراء المواج يعلوها تيج اسدي في الكول والحيفة وسنجي القلوان . طراهاا اريد اللون . قترانها شفاف . يطها الى الحمرة يعلوها تيج اسدي . قوائها متكافئة الملب || تركب العديد من النباتات واعصها الباذنجانيات ومنها البع .

موطنها مجار البلاد الحارة || اصداها مائة ثامة زيرفة الشوزن . صفيرة اللحم . حيلة الايوان الزامية || منه انواع تنفذ فوق سطح اللاه وذلك بواسطة ارجلها المغلفة المسكن نفخها .

١٧٠٩١ - طحين  
Farine (F). Flour (E).  
هو التيق . مسروق ناعم يحصل من طمن حبوب القمح والذرة الصفراء وغيرها من الحبوب .

١٧٠٩٢ - طخاف  
Cirrus (S).

ويدهى الطخاف . صباب مرتفع رقيق .

١٧٠٩٣ - طخوور \*  
Nimbostratus (S).  
هو الطاخور غريب من النجوم . اطلبه .

١٧٠٩٤ - طخوور \*  
Languria (S).  
Langurie (F). Languria (E).

جنس مشرات من غديات الاجنحة ديوسيات القرن ونصفية الطرزيات . انواعها المروفة نحو ٧٠ منتشرة في معظم اقطار البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها صفيرة . صفيرة الشكل . طولها من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها حمرة . عيونها نازرة . قزوتها الاستعمارية خيطية . ديوسية الاطراف . كولهاا شبه مكورة . بطونها اسطوانية . الخادها صفيرة . قوائها دقيقة . انولها ثمانية اللون . يكثر فيها الاحمر والبرتقالي . اخادها زرقاء او خضراء او كستنية او صفراء مدهية المواج || معظم انواعها يعيش على الشجر والبعض الآخر تحت قشور النباتات الخليل . رقاتها دامت .

١٧٠٩٥ - طخفاه  
الانان السوداء الاث .

١٧٠٩٦ - طخمكة  
Troupeau de chèvres (F).  
Flock of goats (E).

طبع المز .

١٧٠٩٧ - طخميل  
Cock (F). Cock (E).

هو البك المزر .

١٧٠٩٨ - طيخم  
Takang (F).

حيوان ليون عايب مجز . يدهى طاككان . اطلبه .

١٧٠٩٩ - طر  
Duvet (F). Down (E).

الطر : ما طلع من الور بعد التنول . وطر النبات : رطل او كبح .

١٧١٠٠ - طراخوور  
هو الاسقمري . نوع من السمك . اطلبه .

١٧١٠١ - طراخوور شائع  
Maquerasu commun (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري معروف . اطلبه .

١٧١٠٢ - طراخوور كليسي  
Maquerasu colias (F).

سمكة بحرية تدعى اسقمري كليسي . اطلبه .

١٧١٠٣ - طرارة \*  
Phosphora (S).

Phosphore (F). Phosphora (E).

جنس عضاء من المشيات وفصيلة الطرزيات . انواعها

## ١٧١١٨ - طرؤث \*

Balanothorus (S).

Balanothorus (F).

جنس نباتات لحمية فطرية الشكل معمرة من فصيلة الطروثيات. أنواعها المشهورة ثلاثة تصقل على جلود مختلف الأشجار. سيقانها صفراء صفراء القدر غليظة الجسم. أوراقها شريفة متراكبة. أزهارها صفراء أو بيضاء أو حمراء. عصارها اغاليجه شمية التركيب شائعة الاستعمال.

## ١٧١١٩ - طرؤث \* ، مصرور ، زب الأرض ،

إبر الحقيقش ، إبر الذئب

Cynomorium coccineum (S). Cynomoir. Cynomorium écarlate, Champignon de Malte (F). Maltese mushroom, Scarlet synomorium (E). Malteser Pilz, Schwammvon Malta (D). Fungo di Malta (I).

نبات طفيل يسيد الجلس والنوع من سبط المصرورات وفصيلة الطروثيات. منته حوض البسر المنحط. اغاليجه مأكولة قابضة وهو لا ينمو من بعض الحواص الطبية الصالحة للمقوية الثابتة ، كما يستعمل لقطع الزحف .

## ١٧١٢٠ - طرؤث أحمر \* ، هالوك شرقي

Phelipaea coccinea (S). Phélpée écarlate, Clendestine du Levant (F). Red showy broom rape (E). Clendestino di Levante (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفيليات ينمو من بعض مناطق الشرق الأدنى. لخصيه منسجي اللون ، أزهاره أرجوانية ، حمر المراح . وهو شديد البقع والضرر ، يؤذي النباتات التي يركبها .

## ١٧١٢١ - طرؤث حلو

هو الاغاريقون المرئي ، اطلية .

## ١٧١٢٢ - طرؤث مصري \* ، هالوك ريجيني

Phelipaea aegyptiaca (S). Phélpée d'Egypte (F). Sweet scented broom rape (E). Nalkensommerwurz (D). Succicamele piccolo (I).

نبات طفيل من فصيلة الجفيليات يركب أكثر الزروع السقية ويوقع بها اشد الأذى .

## ١٧١٢٣ - طروثيات

Balanothoraceae (S).

Balanothoraceae (F).

فصيلة نباتية من ذوات المثلثين. أجناسها وأزهارها عديدة تتميز بطلاقة سيقانها اللحمية . أوراقها شريفة متراكبة . أزهارها وبيدة أو ثنائية المسكن ، صغيرة القدر ، هامة الاوتكال ، قرصية التجميع ، لينة ، متتامة .

## ١٧١٢٤ - طرح

Soustraction (F), Subtraction (E).

Régime de banane (F).

Bunch, Stem (E).

هو القوط يتألف من عدة أشواط متتامة ترتكز على شخارح لني التركيب ، متين الحيك ، غزير العصاره اللدنية .

## ١٧١٢٦ - طرح في المؤايدة

Mise aux enchères (F). Bidding (E).

هو طرح مالى مقبول أو ثابت للبيع بطريق المزاد العلني ليشتره من يعرض أجل من فيه .

## ١٧١٢٧ - طرؤث

Corrupt water (E).

هو الماء الأجن .

## ١٧١٢٨ - طرح ، طرؤث

Puisard (F). Cesspool (E).

شبه حوض كبير عند خرج القناة يجمع فيه الماء .

## ١٧١٠٩ - طرائق الإستعداد

Méthodes de reproduction (F). Methods of reproduction (E).

طرائق الاستعداد في الحيوانات الدوابن تأتي بالنسبة الى البداية المتوخاة على حدة الاشكال : الاستعداد والتجهيز والانتقال والتخليط والانتخاب . واجهها في مواضعها .

## ١٧١١٠ - طرؤب

Tourbe (F). Peat (E).

هو التراب ، اطلية .

## ١٧١١١ - طرؤب

Tourbière (F).

Peat-bog, Peat-moss (E).

هي التراب ، اطلية .

## ١٧١١٢ - طرؤب مطوحي \* ، دوسة القصب

المطوكة

Cynchramus schoeniclus, Embertia schoeniclus (S).

Cynchrame schoenicole, Bruant des roseaux (F).

Dalmatian Reed Bunting (E).

طائر من الدوس وفصيلة الشروديات . موطنه اوروبا الجنوبية ويقع في الشتاء نحو قبرص ولبنان وفلسطين وسيناء ومصر . يتميز من الفصليات التي تقع في لبنان من شهر الى اربعة اشهر . جسمه ريع القامة ينمو نحو ١٥ سم . ويبلغ مسطته نحو ١٨ سم . ثوبه الى الطحلة البنية يعلوها توضيح كسفي . رأسه وذوؤه الى السرة . ويمتد من قاعدتي الشنئين خيطان ابيضان فاصلان بين احسرين والقرور ثم يتصلان بقلادة بيضاء تطوق الرأس . ويعلو الرداء والقنهر والسرير خطوط كسفية يتخللها الاسود . ذنبه مستدل القدر ، فارق الطرف . صدره ويطة الى القنرة البيضاء . ابطاء موشان بالني . حلقه عنه كسفية . منقاده سبورى اللون . الاثنى اصفر قدام من الذكر وشرها قريب الشبه بظهره . يبالغ المنطق والاجام وصفات جاري للماء . يدن عنه على الارض بين الاشجار الكثيفة . الاثنى تحسن مرة واحدة في العام . حشيتها تراوح من ٤ الى ٦ بيضات ترطبها بمتناوبة للذكر من ١٣ الى ١٤ بيضا . يعتبر من المصافير النافعة القليلة الاذى .

## ١٧١١٣ - طرؤبان \*

Equus asaticus (S).

Tarpan (F).

ضرب من الخيل موطنه فياني آسية الشمالية . علماء الحيوان لا تتعرف بالطران كنوع مستقل بل تقبل انه ضرب من الخيل توحش بعد ان كان داجنا . جسمه اصغر من جسم الفرس العربي . ثوبه كسفي اللون يمتد في الشتاء ويرفع في الربيع والصيف . يتميز بالصلاب والشاط . وبطلاقة الرأس وباسطالة النق الاطلس القصير العرف . ويصدر الحافر وبزواة شمر الذنب الذي يمتد حتى لوأخر الظهر .

## ١٧١١٤ - طرؤث العرأب هو لابل الحقل ، اطلية .

١٧١١٥ - طرؤة

الطرية هي القطة الواحدة .

## ١٧١١٦ - طرؤة

Bord (F). Edge, Margin (E).

طرؤة كل شيء : حرفة . وطرة الورقة حرفة او حنايا .

ج طرو وطرار وطرات وطرار .

## ١٧١١٧ - طرؤة

Huppe (F). Crest, Tufted (E).

شكل من اشكال القنطرة .



طرؤب مطوحي



طرؤبان



طرؤث



طرؤث



طرؤث احمر



طرؤث مصري



طرخون



طردوس



طرب



طرسوج امر



طرسوج دلي



طرسوج صهري

البايات . ملجته الحياتي زويي . سره دجوي . قوته الخشرات والذباب والبار وريق الانذار يرتفعه بلسانه الصيق المالح || جسمه صغير اقصد بطول نحو ١٨ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ١٠ سم . رأسه مخروطي الشكل ، دقيق القمم . عيناه صغيرتان . اذناه مستديرتان . قوائمه قصيرة . اياهه تقابل اسياحه . ويره كيت وقصير . ثوبه الى الشبهة يملوها موج لشع في الرأس والظهر وبداج اسفري في الصدر والبطن ، ويملوها ايضا خط بني اسود قاطب يمتد من القف الى قاعدة الذنب . حصره الى الشبهة الصنانية || الاثني تحمل بعض الثوب وما جراب في اسفل البطن تقيم فيه الوضع حتى الطام .

### ١٧١٣٩ - طُرْسُوجٌ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

Mullus (S). Mulla, Rouget (F). Mullet (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الطرسوجيات انزله ثلاثة موطنا شواطئ المتوسط والاطلس . جميعها صغيرة القند طولها يراوح بين ١٠ و ٢٥ سم . اجسامها ابيضية الشكل عفاة . اوتياها زائفة الالوان التراكبية المتداخلة بين الرادي والوردي والبرتقالي والاخر والبني والاسمر . رؤوسها صغيرة . عظامها قصيرة . طبانها ثنائية مسطيلة . زعانفها الشرجية فائقة || انواعه الثلاثة مأكولة ومستعملة اما متفولة الصنف .

### ١٧١٤٠ - طُرْسُوجٌ اَسْمَرٌ ، قُرْقُورَةٌ

Mullus fasciatus (S). Mulla brun (F). Dark mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الشجيرة واكثر البحرية الرملية والصخرية . يكثر في البحر المتوسط . طوله عند اكتمال بلوغه يقارب ٢٥ سم . ملمسه ابيض الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والوردي والاخر الصناني المالح . ظهره اسود لونا من جنبيه . رأسه صغير القند . عظمه متوسط البروز . عظامها خفيفة . عيناه صغيرتان . زعانفها الظهرية والصخرية معتدلة الحجم ، لينة . قوائمه صغيرة ودقيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة ومنهم من ماله ان لم يغسله حل الطرسوج الصهري .

### ١٧١٤١ - طُرْسُوجٌ رَمْلِيٌّ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

الرْمَلِيٌّ ، بَرَبَرِيٌّ صَاحِبُ

Mullus barbatus (S). Mulla rouget, Rouget-barbas, Petit barbarin (F). Red mullet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الردي البحرية . طوله يراوح بين ١٠ الى ٢٥ سم . ملمسه جالس الظهر . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يدخل فيها القوي والرادي والاردي . رأسه صغير القند . عظمه قليل البروز . عيناه صغيرتان . زعانفها الظهرية والصخرية معتدلة القند لينة . زعانفها الشرجية فائقة . قوائمه مستقيمة رفيقة || يصير من اجيد الاسماك المأكولة الا انه يأتي بعد الطرسوج الصهري . وهو مبلول حل الشواطئ اللبنانية السورية .

### ١٧١٤٢ - طُرْسُوجٌ صَحْرِيٌّ ، سُلْطَانُ اِبْرَاهِم

الصَحْرِيٌّ ، بَرَبَرِيٌّ

Mullus surmuletus (S). Mulla surmulet, Surmulet, Barbarin (F). Surmulet (E).

نوع من الطرسوج قوته الثوب الصخرية المأكولة . طوله يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم . ملمسه ردي الشكل . ثوبه متراكب الالوان الزائفة يعلب فيها الرادي والوردي

١٧١٣٩ - طُرْسُوجٌ هُوَ المذهب البري ، اطلية .

١٧١٣٠ - طُرْسُوجٌ Saurat (F).

سمكة بحرية تسمى شيم طرسودي ، اطلية .

١٧١٣١ - طُرْسُوجٌ

Artemisia dracunculus (S). Estragon, Armoise petit dragon, Dragons, Fargon, Tragon, Serpentine (F). Estragon, Tarragon (E). Estragon, Tragabueffus (D). Dragonte, Dragoncello, Targone (I).

بقلة زراعية مبرسة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر . ساقه تعلو من ٥٠ الى ٦٠ سم . اوراقه مستطيلة خفيفة النصل . انماها منبيلة التجميع ، وركسية الشكل ، بحورية الارتكاز || وهو من التوابل الشائعة الاستعمال . اوراقه ولونها مأكولة . جميع اجزائه عطرية . بعض الشبهة وفيه المدة || يتكاثر بالبذر والتضيق . يوجد في جميع الاربة الزراعية لكنه يثني الرطوبة والصقيع .

١٧١٣٢ - طُرْدُ ، طُرْدُ Essaim (F). Swarm (E).

هو فرقة النحل . ج . طرد .

١٧١٣٣ - طُرْدُكَانَ هُوَ السيران السوري . اطلية .

١٧١٣٤ - طُرْدُوسٌ Onychoteuthis (S).

Onychoteuthis (F).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل لفصيلة الطردوسيات . انواعه المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || اجسامها شبه اسطوانية الشكل ، مستطيلة ، تنقسم بزوائد موزانية كبيرة القند . رؤوسها معتدلة الحجم . صوبها كبيرة ماصة . جرابها معلقة ، ثمانية منها محمية متساوية الطول واثنان لقيقتان مسطيلتان تنبها برسي ستانية الشكل بمجوز كلابي . سادة || اشهر انواعه الطردوس القوي (On. robusta) الذي يكثر وجوده في بعض مناطق المحيط الهادي والذي يطول من ١٠ الى ١٢ متراً .

١٧١٣٥ - طُرْدُوسِيَّاتٌ Onychoteuthidae (S).

Onychoteuthidae (F).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات رأسيات الاجرل ، مزدنبات انخياشيم ، عشاريات الجرامز . اجسامها واوتياها المعروفة حديثة منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمتعددة الحرارة والباردة || اُعرف اجناسه واشهرها الطردوس والورانس والساس والفوس .

١٧١٣٦ - طُرْسُ Pouillet (F). Leaf (E).

جزء ودي الشكل من صفحة بعض الفطور . ج . اطراس وطروس . ج . الاطراس فهو كائنا اطراف اوراق مرصوة متناصبة مستطيلة .

١٧١٣٧ - طُرْسُامٌ Exuviable (F). Exuviable (E).

نمت تعريفه يطلق حل كل طائر يصير او حيوان يتجدد قشاره او جلده .

١٧١٣٨ - طُرْسَبٌ Tarsipes rostratus (S).

Tarsipede rostré (F).

حيوان حاشر ثامر وحيد الجنس والنوع من فصيلة القنقريات . موطنه بعض مناطق استراليا الشمالية . يألف

الزئيفة. الاناث تبني من ٤ الى ٥ بيضات والذكور تنابذ الاناث في الحضان.

١٧١٥٠ - طَرُوبِيَّات \* (S). Pteroptochidae  
١٧١٥١ - طَرُوبِيَّات (F). Pteroptochidae (E).

فصيلة طير من الجوارم نباتات المناظر. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. اصطلحوا بعض مناطق الشرق الاقصى وامريكا الجنوبية. تألفت البراري والمراعي قوتها الحشرات والحوام واليزور البرية || اجسامها صغيرة. اوتواها بعمامة الخشب الزاهر. اعرف اجناسها واشهرها الطرام والرامز.

١٧١٥١ - طَرُوب

هو الفرع الضخم الطويل المسترخي. ويقال لطويلة الفرع من الحيوان طربية.

١٧١٥٢ - طَرُوبِيَّة

الطربانية من المزر الطويلة شطري الفرع.

١٧١٥٣ - طَرُوبِيَّات (F). Vanneau huppé

طائر يدهي ابيض طيط متوج، اطلبه.

١٧١٥٤ - طَرُوب (F). Petite centauree

هو القنطريون الصغير او مرارة الحش.

١٧١٥٥ - طَرُوبِيَّة (F). Tartrage

هي معالجة الحمر ببعض الطريرك سدا لموز في نسبة حوضها.

١٧١٥٦ - طَرُوبِيَّة \* (S). Clinus argentatus  
١٧١٥٦ - طَرُوبِيَّة (F). Clinus, Crested blenny (E).

سكة بحرية يبيض من فصيلة الجربيات شاكات الزمانف. اصطلحوا بعض مناطق البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي || جسمها شبه اهلبيجي الشكل، يطول من ١٥ الى ٢٥ سم. ثوبا الى الخضار البحرية القفي للمراج يطو تجذع متفرع اسمر يمتد من الزعنفة الظهرية الى البطن. رأسها صغير الخطر الدلق يطو في وسط الجبهة رتة صغيرة تحمله غشروية المادة. زعنفتها الظهرية وبيدة مستطيلة || لحمها متوسيط الصنف، مأكول.

١٧١٥٧ - طَرُوب (F). هو البرازية، اطلها.

١٧١٥٨ - طَرُوبِيَّة (F). هو الكويين الكبير، اطله.

١٧١٥٩ - طَرُوبِيَّة (F). Topinambour

هو حباد الشمس المستولي، اطلبه.

١٧١٦٠ - طَرُوبِيَّة مُعَرَّز \* (S). كَبْرُوبِيَّات

١٧١٦٠ - طَرُوبِيَّة مُعَرَّز \* (S). Coprophilus striatus

١٧١٦٠ - طَرُوبِيَّة مُعَرَّز (F). Coprophilus striatus (E).

حشرة نائلة من فصيلة الدنيات وربة سفدت الاجنعة. تألفت المزراع التي تكثر فيها الماشية لانها تعيش على الزبل والورث || جسمها صغير القفد يطول من ٦ الى ٧ سم. ثوبا الى السمرة الكشمية الباقية. رأسها صغير الجسم ينتهي بفكين كبيرين. حياها بارزتان. زياناها غليبان دقيقتان. ظهورها يلمع نحو ثلث البطن. غمداها قليلتا الصلابة، متباينة التميز. بطنها مستطيل المخز ينتهي

والاجواني الصنابي اللوح. رأسه صغير القفد. غطله ذلق بارز. جذباه مستطيلتان. حياها اريوانيتان. زمانفه الظهرية والصدرية كبيرة القفد لينة. زعنفته الخشبية فارقة مستطيلة || يتبر من اقصر الاسماك واجودها صغدا. وهو مبدول على القشور النباتية السورية.

١٧١٤٣ - طَرُوبِيَّات (S). Mullidae

١٧١٤٣ - طَرُوبِيَّات (F). Mullidae, Goatfishes (E).

فصيلة اسماك من البطليات الشاكات الزمانف. اجناسها وانواعها عديدة جميعها مأكولة مستحبة العلم. اجسامها رفيقة متوسطة القفد او صغيرة. اوتواها زامة الالوان الجميلة. اشهر اجناسها الطرروج.

١٧١٤٤ - طَرُوبِيَّة (F). Eavrie (E).

الطرب ما يتخلل عه الجسم الحيواني عه التصير او الانلاخ او الاكمال.

١٧١٤٥ - طَرُوبِيَّة (F). Exuviabilité

١٧١٤٥ - طَرُوبِيَّة (E). Exuviability

الطرمة خاصة التصير او الانلاخ او ابدال القشور التي تنتج بها الطير والحشرات وبعض الحيوانات.

١٧١٤٦ - طَرُوبِيَّة (S). Aptenodytes

١٧١٤٦ - طَرُوبِيَّة (F). Mancho (E).

جنس طيور بحرية من دمديات الريش وكليات القدم. تتميز باجسامها الغليظة المستطيلة. طولها يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم. اجنتها بجذاف الشكل، حشوية الريش. اعتاقها وبنايتها مستطيلة، ورؤوسها صغيرة. اذنانها جدام كاسية || قوتها الاسماك والقشريات. تثن اوكارها في تخاليف المسنور فوق الماء. اناتها قبيض وتحسن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع.

١٧١٤٧ - طَرُوبِيَّات (S). Aptenodytes

١٧١٤٧ - طَرُوبِيَّات (F). Aptenodytes (E).

فصيلة طيور بحرية من دمديات الريش وكليات القدم. اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد. موطنها بحار القطب الجنوبي || اجسامها شبة غروية الشكل. رؤوسها صغيرة، متاقيها جالسة، معتلة الطول، غدة الالاف العليا الباترة السطام الحاد. اعتاقها مستطيلة. اجنتها بجذاف الشكل، حشوية الريش. اذنانها جدام كاسية. ارسافها متوسطة الجرم و رباعية الاصابع، كاملة الخطاف || اشهر اجناسها الطرروس والقفاف.

١٧١٤٨ - طَرُوبِيَّة (F). Agrodrome champêtre

١٧١٤٨ - طَرُوبِيَّة (F). هو حباد الشمس المستولي، اطله.

١٧١٤٩ - طَرُوبِيَّة \* (S). Pteroptochos

١٧١٤٩ - طَرُوبِيَّة (F). Pteroptochos (E).

جنس طير من فصيلة الطربليات. انواعه المروفة قليلة العدد. موطنها بعض مناطق امريكا الجنوبية. تألفت المروج والنباتات وضفاف مجاري الماء. قوتها الحوام والحشرات والينان واليزور البرية || اجسامها صغيرة تطول من ١٤ الى ١٦ سم. اجنتها قصيرة. اذنانها مستطيلة. مستقيمة الاطراف. اوتواها تراوح من الشقمة الى السمرة والصغرة والشبه. صغورها وبطنها من البياض الى التبرة الموشة بالاسود || تثن اعاشتها في الاجمار



طربوس



طربوس



طربوس



طربوس معرّز

١٧١٦٦ - طَرَفُونِيَّاتٌ \* Trogonidae (S).  
Trogonidae (F). Trogonidae (E).  
فصيلة طير من اللسقات. اجناسها وانواعها عديدة  
اصطلاحها البلاد الاستوائية. تتميز بامتلاكها اذنانها وبجل  
الوانها والوانها الزاهية. أشهر اجناسها الطرغون



طرفة

١٧١٦٧ - طَرَفٌ \*  
الطرف أو الطرفان منزل من منازل القمر الشامية. وما  
نجمان من برج الاسد يتقاسمان الجهة. سيما بذلك لاجلها  
كمنى الاسد || رقيب الطرف يعنى سد بلع.

١٧١٦٨ - طَرِيفٌ \*  
Racé, Pur sang (F).  
Thoroughbred (E).  
نعت تعريفى يطلق على كل حيوان سريع النسب الاصيل  
اي كرم الطرفين طرف الاب وطرف الام.

١٧١٦٩ - طَرِيفٌ \*  
Partie (F). Part (E).  
هو من اشترك في عقد قانوني مع غيره.

١٧١٧٠ - طَرِيقُ المَعَادِكَةِ \*  
Membres de l'équation (F). Members (sides) of  
equation (E).

١٧١٧١ - طَرِيقَاءٌ \*  
في الأثل، اطليه.

١٧١٧٢ - طَرِيقَاءُ الْمَنَى \*  
في أثل اللز، اطليه.

١٧١٧٣ - طَرِيقَايَاتٌ \*  
وتسمى اللآليات، فصيلة نباتية من ذوات الفلقين عديدة  
الاقلام. وأرجع الهيات.

١٧١٧٤ - طَرِيقَةٌ \*  
الطريقه نجم ثير من كوكبة برج السرطان مركزه على قائمة  
السرطان المؤخرة.

١٧١٧٥ - طَرِيقٌ \*  
Couvrir (F).  
طرق لفعل الاثنى. كما عليها (المساح).

١٧١٧٦ - طَرِيقٌ \*  
Ecrour (F). To hard-hammer (E).  
طرق المدن. مدد.

١٧١٧٧ - طَرِيقَةٌ \*  
Rangee de dactiers (F).  
Rangee of date-trees (E).  
صف البتيل بها طال وايضا زرع.

١٧١٧٨ - طَرِيقُونٌ \*  
Trygon (S).  
Patensague (F). Whip-tailed sting ray (E).

جنس اسماك ملحية بحرية من فصيلة الطرقيقيات. انواعها  
المعروفة قليلة العدد اصطلحها بحار البلاد الحارة ويكثر وجودها  
قرب الاغوار حيث تتلصق بالرايل والاسماك بانتظار ما  
تقتريه || اجسامها مبطلة فيه مستديرة الشكل تفلون من  
١٨٠ الى ٢٠٠ سم. بما فيه الاذناب المستطيلة كالسياط  
تحبسها متاخس حادة شديدة الصلابة جرسها مؤذية  
سامة وقد تنابت ميتة. اذنانها تفلون من ٨٥ الى ١٠٠ سم.  
الوانها تختلف مع الانواع. اعرف انواعها المجلد والبني



طريقون

١٧١٧٩ - طَرِيقُونٌ بِفَتْحٍ \*  
Trygon violacea (S). Patensague violette (F).  
نوع من الطرقيون. ويكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط.  
طوله بما فيه الذنب نحو ١٩٠ سم. ثوبه الكهلي الى

بشرج عريض. ارساغها خضابية الغل || طاجيل واحد في  
الحبل. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتموت حتى  
اواسط آب. تسرح في التمار وتبيت في الليل داخل افاق  
مستطيلة تحفرها في التربة || التربة عند بلوغها الاذناك  
التام تفلون من ١٠ الى ١٢ م. ثوبها الى السرة الكستنية.  
حلقاتها الصدرية مستطيلة الجرم. رأسها معتل للقد اسود  
اللون. ذكاتها فضيحات. ورجليها وشرجيها الى السرة  
السوداء || طرر الاكمال الذي يستمر نحو ستة اسابيع  
ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والمواد العضوية.

١٧١٦١ - طَرِطَبٌ \*  
Cephalopterus (S).  
Céphaloptère (F). Cephalopterus (E).

جنس طير من الجوارم سيات المناظر وفصيلة القطنجيات.  
انواعه المعروفة قليلة العدد اصطلحها بعض مناطق امريكا  
الاستوائية. تألف الغابات، قوتها اثار البرية. ملجئها  
الحياطي جاهي. انوعها قليلة العدد من ٤ الى ١٠ ازواج ||  
اجسامها متوسطة اللد شبيهة بالزرداب. رؤوسها متوجة  
كبيرة الطور. اعناقها مقفلة باخبرها مستمرة الرض.  
مناقلها ضلجة عزمة || أشهر انواعها الطرب المزين  
Ceph. ornatus (S). الذي يكثر وجوده على ضفاف  
نهر الامازون. ثوبه الى السواد الاسفج الازرق المايح.

١٧١٦٢ - طَرِطُكَةٌ \*  
Columbella (S).  
Colombelle (F). Columbelle (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربل  
وفصيلة الطرطليات. انواعه المعروفة نحو ٣٠٠ مظهرها  
يعيش على شواطئ بحار المناطق الاستوائية || اصداقها  
متناسكة شبه بيضية، غنية عازلة، قصيرة الطول، مبطنة  
ومجلمة بالالوان الزاهية. رؤوسها صغيرة مبطلة، ثنائية  
الواسر المنيعة الخروطية الشكل. انواعها ملحقة  
بالرؤوس، مستطيلة الانضمام الانبوبية. ارجلها مستطيلة.  
ضيقه مجهره باسقاط قرنية المادة.

١٧١٦٣ - طَرِطُكُونُوسٌ \* ، طَرِطُوسٌ ، طُشَانٌ \*  
Trachilus (S). Colibri, Ouesu-mouche (F). Humming-bird (E).

طرطلونوس وطرطوس من الجاسط. صفور صغير اللد  
طوله نحو ١٠ سم. ثوبه متداخل الالوان الزاهية الجميلة  
فيه الرمادي والاخر والاصفر والاسمر وفي جناحيه ريشة  
ذهبية. ذنبه متوازي التقط البيض النقية. متقاربه رقيق  
مستطيل. قوته الذباب والحمام وريق الزمار || يمش  
عشه في الاشجار الفتاة فوق مجاري الماء || انشاء تحسن  
من مرتين الى ثلاث مرات في السنة. حضنته لا تكسى  
اربع بيضات.

١٧١٦٤ - طَرِطُكِيَّاتٌ \*  
Columbellidae (S).  
Columbellidae (F). Columbellidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الاربل  
مشطيات الجاهيم. اجناسها وانواعها المعروفة عديدة  
منتشرة في سبط بحار البلاد الحارة والاستوائية || اصداقها  
صغيرة اللد متباينة الاشكال منها البيضية والخروطية  
والرشية، جميعها متناسكة الصفة المزخرفة بالالوان  
الزاهية || أشهر اجناسها الطرطلة.

١٧١٦٥ - طَرِطُونٌ \*  
Trogon  
جنس طير من الطرقيقيات لللسقات. انواعه عديدة  
جميعها من الحشرات تتنارات تألف غابات واشراج البلاد  
الحارة الاستوائية.

السديان . ساقه رفيعة ، متعصبة ، معتلة الجرم ، غيراه  
الذين . نكتة فائضة ، مستديرة ، قطرها نحو ١٠ سم .  
لونها الى الصبغة للسرار السفاه الموج . اطرافها الى  
الصبغة الوردية الموج || لحيتها جيدة الصنف ، مرغوب  
فيها .

١٧١٨٩ - طُرْمُوسُ  
Mouton engraisé (F).  
Fatten sheep (E).  
هو أغروف السمين .

١٧١٩٠ - طُرْمُوسُ المَرْجُحُ  
Longitarsus pratensis (S).  
Longitarsus des prés (F). Longitarsus pratensis (E).

حشرة من فصيلة النصاريات . موطنها بعض الالام سويس  
البحر الابيض المتوسط والناطق الداخلية المتاخمة . تألف  
المرج والاراضي وضايف مجاري الماء . خنافسها تعيش على  
اوراق النباتات التابعة لفصلي الفريونيوات والحمصيات  
ولا تصف من السرق والخوض . يرقاتها تعيش في التربة على  
جلود البزاق المائل || جسمها صغير القد ، شبه بيضي  
للشكل ، بطول من ٢ الى ٣ سم . قريبا الى الجلود يطولها  
موج اشجع . رأسها مستعرض الجرم ، اسفليها الملمع .  
زباناها غيبان مقوسان || لها جيلان في الحول . تخرج  
الحشرة الجبلانة من مكانها في اواخر نيسان . تصاف بهد  
ظهورها باسويين وتباهر منع المكان بهد الكرم يبين ،  
تنتفن من التربة وترز للمكان قرب استاخ ويظهر النباتات  
المائل || البرقة منه تقذف كتوبه نحو جلود النبات فتنتفب  
الادمة وتلق الى الداخل ، قريبا المصاراة والعلما النباتية .  
وتبقى حتى اكمال طولها البرقي اي نحو ٣٠ يوما ثم  
تلتصق الى التربة وتدخل في طور الاكمال . والبرقة عند  
بلوغها الادراك بطول نحو ٥ سم . جسمها حنطي اللون ،  
اسطواني الشكل ، رأسها اسود || اما خنافس الجيل الثاني  
فلياتها الشوي ينسر حتى يبين زين النشاط ويكون ذلك  
في اواخر نيسان .

١٧١٩١ - طُرْمُوقُ  
Vespertilion (F).  
هو الخفاش ، اطلبه .

١٧١٩٢ - طُرْمُودُ \* ، طُورْمُوسُ \*  
Torymus (S). Toryme (F). Torymus (E).

جنس حشرات من فصيلة الطريدنيات . انواعها المعروفة  
نحو ٢٥ اصنافها الاقاليم الحارة والمتلة الحارة || جميعها  
ناقة تصطف على الحشرات الضارة اخصها الابرار ||  
اجسامها صغيرة بطول من ٣ الى ٤ سم . رؤوسها مخروطية  
للشكل . كولعلها معتقة . بطولها فضية . مرزاتها دقيقة  
مستطيلة . اولهاا مختلفة الالوان ، لامة .

١٧١٩٣ - طُرْمُودِيَاتُ \*  
Torymidae (S).  
Torymidae (F). Torymidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المضمورة .  
انواعها عديدة . اصنافها الاقاليم الحارة والمتلة الحارة .  
جميعها ناقة تصطف على الحشرات الضارة || حشراتا صغيرة  
القد وعصاة بطول من ٢ الى ٧ سم . اجسامها نحيلة ملونة .  
رؤوسها مستعرضة . زباناها صولبانية . قولهاا طويلة .  
مرزاتها لاقامية الجرم منها القليلة منها الحارقة الطول ||  
اشهر انواعها الطريد والديبور والجمبرية .

١٧١٩٤ - طُرْمُوكَايَا  
Tornella (F).  
هي الشرس نبات من القلقليات ، اطلبه .

البفسجي السابق تملو حاجات قراوح من الاترق الى  
الاسود . ثوبه السفلى الى الخطي الاسمر . منشفه الليل  
كبير القد طوله نحو ١٨ سم . || لحمه متوسط الصنف ،  
مأكول .

١٧١٨٠ - طُرْمُوكُون مَبْدُولُ \*

Tryon pastinaca (S). Pastanagae communis (F).  
نوع من الطرُون يكثر وجيده في المحيط الاطلسي . طوله  
ما فيه اللتب نحو ٢٠٠ سم . ثوبه العلوي الى الشقة  
السرارة الناعمة . ثوبه السفلى الى الخطي الاسمر . منشفه  
الليل كبير القد ، حاد الطرف ، طوله نحو ٢٠ سم . ||  
لحمه متوسط الصنف ، مأكول .

١٧١٨١ - طُرْمُوكُونِيَاتُ \*  
Trygonidae (S).  
Trygonidae (F). Trygonidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من الصفقيات الاشراق . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مفترسة وريدة . مرزها  
الانحرار واغوار الشطوط || اعرف اجناسها واشهرها الطرُون .

١٧١٨٢ - طُرْمُ \* ، طُرْمُومُ  
Rayon de miel (F).  
Honey comb (E).  
الفرم والفرم هو الشهد من العسل .

١٧١٨٣ - طُرْمُ \* ، طُرْمُومُ  
Rayon (F). Ray (E).  
هو شعاع الجلود والجدوع .

١٧١٨٤ - طُرْمُومُ مَكَاكِي  
Rayon médullaire (F).  
Medullary ray (E).

صفائح مرشومية شعاعية الشكل تنطلق من محور الساق  
او الجذر الى المكاء والخشب والكثير .

١٧١٨٥ - طُرْمُومُازُ  
نعت تعريف يلقى على الفرس الكرم القراع .

١٧١٨٦ - طُرْمُومُ \*  
Ommatostrophus (S).  
Ommatostrophes (F).

الواحدة طرمعة . جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات  
وفصيلة الطرمحات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم  
بحار العالم || اجسامها كبيرة القد وشبة الشكل تنتهي  
بزمانف رمية . رؤوسها مستطيلة . حيونها كبيرة ،  
جاسقة . رمية منتقرة . ثمانية من جزامها محبة متساوية  
الطول واثنان مستطيلتان تنهان برسي ستانية الشكل ||  
تتميز بشدة اليابس والنشاط وبالقفر فوق سطح الماء حتى  
ان ينسها يقع على سطح المراكب || اشهر انواعها  
طرمعة كولانتي (Omm. Cloandeti) التي يكثر وجيدها  
في البحر الابيض المتوسط .

١٧١٨٧ - طُرْمُومُحِيَاتُ \*  
Ommatostrophidae (S).  
Ommatostrophidae (F). Ommatostrophidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية مفترسة من الرخويات ورأسيات  
الاريل ، مزدويات الخياشيم ، حشاريات الجرامز .  
اجناسها المعروفة قليلة العدد اما انواعها فكثيرة جميعها  
يمية لا تقرب للشطوط . ملجها الحياتي جامي ، اسرانيا  
تد بعض اللات || اعرف اجناسها واشهرها الطرمع .

١٧١٨٨ - طُرْمُومُوثُ \*  
Pluteus cornutus (S).  
Pluteu couleur de cor (F).

طرممأكول من فصيلة القارديقيات . يكثر وجيده في  
النباتات الجبلية . يعيش على رويات الاشجار المبررة اخصها



طرُون مَبْدُول



طرمع



طرموث



طرموش المروج



طرميد



طريشون الصافي

1٧٢٠٦ - طريق أشهب  
*Trigla milvus* (S).  
*Trigla milva* (F).  
نوع من الطريخ يطول من ٥٥ إلى ٦٥ سم. ثوبه الـ  
للشبة القفصية يملأ مويج وودي يتخلله شيء من الأصفر  
والأخضر .

1٧٢٠٧ - طريق رناري  
*Trigla gurnardus* (S). *Trigla gurnardus*, *Gronidus*  
*gris* (F). *Gournard*, *Gurnard* (E).  
نوع من الطريخ يوجد في جميع البحار أما يكثر في الترسد  
ويط الشواطيء الاطلسية الاوربية والاثرية || يطول  
نحو ٦٥ سم. ثوبه الى الربة القفصية يمتلئ مع اقترابه  
من فيج الظهر ويبيض منه البطن .

1٧٢٠٨ - طريق صبور  
*Trigla aspera* (S).  
*Trigla rude*, *Cavillon* (F).  
نوع من الطريخ الصغير القند يطول نحو ١٢ سم. ثوبه  
الى الصفرة المرجانية الزاهية يزيد احمراراً مع اقترابه من  
الظهر ويصفر نحو اليافس الاكبر منه البطن . يوجد  
في جميع البحار .

1٧٢٠٩ - طريق كير  
*Trigla corax* (S).  
*Trigla parlon*, *Parlon*, *Parlan* (F).  
نوع من الطريخ يطول نحو ١٠٠ سم. ثوبه الى الربة  
القفصية السراء اللحية . يسكن منه الظهر ويبيض منه  
البطن . يكثر وجوده في المحيط الهادي .

1٧٢١٠ - طريق مرجاني  
*Trigla cucullus* (S).  
*Trigla morruda*, *Gronidus barbarin*, *Orgus* (F).  
نوع من الطريخ يكثر في المتوسط يطول من ٢٠ الى ٢٧  
سم. ظهوره الى الحمرة المرجانية . جانباه ويك الى اليافس  
الأصفر اللؤلؤ .

1٧٢١١ - طريق متمش  
*Trigla lineata* (S).  
*Trigla Imbrigo*, *Surmulet sans barbe*, *Camard* (F).  
نوع من الطريخ يبلط في جميع البحار يطول من ٢٥ الى  
٣٥ سم. ثوبه الى الحمرة الجوزية اللامعة تعلوها نمشة  
سوداء .

1٧٢١٢ - طريق غياني  
*Triglide* (S).  
*Triglide* (F). *Triglide* (E).  
فصيلة اسماك بحرية من رتبة الشبليات الشاكلك الزعانف.  
اجناسها وانواعها عديدة اعرفها واشهرها الطريخ والبلنج .

1٧٢١٣ - طريق  
*Rameau de moins d'un an* (F).  
الطريخ هو العريون قبل ان يبلغ الحبل .

1٧٢١٤ - طريقلا  
جلس اسماك بحرية تدعى الطريخ .

1٧٢١٥ - طريق  
*Courlis malle* (F).  
*Carlew malle* (E).  
هو الكروان الذكر .

1٧٢١٦ - طريق  
*Voie* (F). *Way* (E).  
طريق ج طرق . كلمة شاملة تشمل في عدة معنى اشياء :  
*Voies de recours* (F).  
طرق الملن

*Voie* (F).  
طرق المواصلات

*Voie de droit* (F).  
طرق قانونية

*Voies et moyens* (F).  
طرق واساليب

*Voie d'excusation* (F).  
طريق التفسير

*Voie classée*  
طريق تنظيمية

1٧١٩٥ - طريخ ليلدة  
*Tornelle délicate*  
هي الشمس اللذيذ للأكل آثار ، اطليه .

1٧١٩٦ - طريخ  
هي البليط ، اطليه .

1٧١٩٧ - طريخيا  
*Trazschalla*  
جلس ظهور مجهرية يعرف بالصفحة ، اطليا .

1٧١٩٨ - طريخيل  
هو حديد الشمس السوي ، اطليه .

1٧١٩٩ - طريخيل الصافي  
*Chrozophora tinctoria* (S). *Chrozophora tinctoria*.  
*Chrozophora tinctoria*, *Croton des teinturiers*,  
*Maurille* (F). *Turnesola*, *Dyer's litmus paper* (E).  
*Turnesolpflanze*, *Färber-Kroton* (D). *Turnesola*,  
*Girasole* (I).  
نبات عشبي زراعي صناعي من فصيلة القريزيات ، اطليه  
موسس البحر للتصود ، يذهب في الربة الجيدة التركيب  
المختلة الانساج . زراعت تتطلب بعض الناية الخاصة  
كالنق وكتشيب بعد التفتيح || يستخرج من سوكه  
منه الانزهار ويعد لعلها ومحقها صارة صباغة شامة  
الاستعمال الصناعي .

1٧٢٠٠ - طريخ  
*Torula*, *Torulée* (F).  
جلس ظهور مجهرية من الفصليات وفصيلة الطحيات .  
مشبه مؤثر التركيب . جربه الكنديية سبحة الانساج .  
انواعه عديدة تعيش على ماء الانسان اليابسة والارواح  
المتارة على الخضوض ولواحد البصوية البائرة الى الانحلال .

1٧٢٠١ - طريخ  
*Torreya*  
شجرة حرجية من القسوسيات تعرف بالوطوق ، اطليه .

1٧٢٠٢ - طريخ  
*Lithodorus* (S).  
*Lithodorus* (E).  
جلس حيوانات بحرية من الرخويات فصليات الخياشيم  
وفصيلة الميديات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ١٢  
منتشرة في معظم بلاد الحارة والمختلة الحارة ||  
اصنافها شبه اسطوانية الشكل متراكبة الصفائح للملحمة  
بمشاد آدمي . اجسامها قسورية مشقة || تعيش في اول  
مهدبا لاصقة بالصخور للمفورة ثم تتحدر من قيعها  
اليقني فتشطب احصل الصخور وتعيش في الانفاق التي  
تخلدها .

1٧٢٠٣ - طريخ  
هو السرح ، اطليه .

1٧٢٠٤ - طريخ  
*Trigla* (S). *Trigle*, *Gronid* (F). *Gurnard* (E).  
جلس اسماك بحرية من فصيلة الطريخيات . انواعه نحو ١٥  
منتشرة في جميع بحار العالم . رؤوسها كبيرة مسطحة ،  
هزينة للشكل . اجسامها مختلفة الاجسام تطول من ١٢  
الى ١٠٠ سم . زعانفها كبيرة شاكلك لاقطية . انثياها  
متراكبة الالوان الزاهية . طويها مأكولة ، مستحبة ،  
جيدة الصنف || اشهر انواعها ما يلي .

1٧٢٠٥ - طريخ آخر  
*Trigle pin*, *Rouget rouge*, *Trigle hirondelle* (F).  
نوع من الطريخ ، يمتلئ في جميع البحار ، يطول من ٢٥  
الى ٣٠ سم. ظهوره احمر اللون . جانباه الى الودي الزاهي .  
يعد اغبر الين .



طريخ

الجذور المتحرة تنقبض عليها وتتركز بين الجرادة والالياف الخشبية حيث تتابع نشاطها الجيوي وعملها التخريسي الذي يؤدي النبات لانه يمتص الاوية ويمنع التبادل التنفسي || يكافح بتفادح النباتات الموسومة ويظهر التربة بالكلس الحراق او بلفور الكربون.

Tazard (F).

١٧٢٢٦ - طزور

مكة بحرية تسمى اسفري طزار ، اطلها .

Véranda (F).  
Veranda (E).

١٧٢٢٧ - طزور ، فوكندا

١٧٢٢٨ - طسق ، طسك ، تكس

Taxe, Contribution (F). Tax, Impost (E).

الطسق : ما يضع من الوظيفة على الجربان من الخراج المقرر على الارض . وكسب عمر الى صان ارفع الجزية عن رؤوسها ومنح الطسق من ارضها . وقيل شبه الخراج له مقدار معلوم (السان) .

١٧٢٢٩ - طسل

هو الماء الجاري على وجه الارض وهو التراب البقيق الناعم ذو قوة السراب .

Géotropisme (F).  
Geotropism (E).

١٧٢٣٠ - طسم

اثر الجاذبية الارضية في انحناء النمو النباتي . وهو يندعي ايجابياً اذا كان متجهاً نحو مركز الجاذبية الارضية وسلباً اذا اتجه ابتعاداً ماعاك .

Desman (F).

١٧٢٣١ - طسمان

جنس حيوانات حاشية من فصيلة البريديات . يألف ضفاف الأنهار والعيصيرات ، قوته الحشرات المسالية والاسماك الصغيرة . له نيجان طسان المسك وطسان الجبل .

١٧٢٣٢ - طسمان المسك \*

Myogale moschata (S). Desman musqué (F).  
Musk-rat (E).

نوع من الطسان موطنه فسج الارباه يمتد من بحر ارال الى بحر قزوين وإلى ضفاف بحر البندير . وهو يشبه الزبابة لكنه يجمع السنجاب الكبير . صخر الين . فاسر الفراء . مستطيل الخطم والذنب . يعمل عند قلعة ذئبه خلد مسكية للمادة القوية المرفق || قوته الحشرات المائية والاسماك الصغيرة . يعيش في نفق يخلده على مستوى الماء .

Spheniscus (S).

١٧٢٣٣ - طسناج \*

جنس طير من طيور الرشي ، كفيات القدم ، وفصيلة الطسناجيات . انواحه المرفقة قليلة العدد موطنها القطب الجنوبي || اجسامها قطبي من ٦٥ الى ٨٠ سم . رؤوسها صغيرة . اعناقها قصيرة . مناقبها جاسلة ، مبطلة ، متعددة الافاك الملياة انشابة المبدودة الخواقي . اجنتها مجنافية الشكل ، حشوية الرشي . اذنتها جداد كاسية || تدن في اخاصيص متدلة المسك . انائها تبيض وكفن بيضة واحدة نحو اربعة اسابيع || قوتها الاسماك والقشريات .

Spheniscidae (S).

١٧٢٣٤ - طسناجيات \*

فصيلة طيور بحرية من طيور الرشي ، كفيات القدم .

Voie privée (F).

طريق خاص

Voie publique (F).

طريق عام

Voie de fait (F).

طريقة التفت

١٧٢١٧ - طريق البحر ، طريق السحب

Chemin de halage (F). Towing-path (E).

هي الطريق المصفاة حذاء النهر او القناة المصفاة لاجلحة وهي يجرز استعمالها لجر المركاب او سحبا .

Chemin rural (F).

١٧٢١٨ - طريق ريفية

Rural road (E).

كل طريق في الريف تربط للمساكن والقرى ببعضها بعض .

Chemin agricole (F).

١٧٢١٩ - طريق زراعية

Agricultural road (E).

كل طريق يمر بين الاراضي الزراعية او تربطها ببعضها بعض .

Méthode (F).

١٧٢٢٠ - طريقة ، منهج

Method (E).

هي الاسلوب المفروض اتباعه في شئ معين . كقولك طريقة الاستيثار او الاستئذال او العمل .

١٧٢٢١ - طريقة الحدف

Méthode de réduction (F). Method by reduction (E).

١٧٢٢٢ - طريقة سيكية

Méthode sexagésimale (F). Sexagesimal method (E).

Système décimal (F).

١٧٢٢٣ - طريقة عشرية

Decimal system (E).

Système métrique (F).

١٧٢٢٤ - طريقة مترية

Metric system (E).

هي طريقة القياسات المترية .

١٧٢٢٥ - طرمم \*

Armillaria mellea, Armillariella mellea, Agaricus melleus, Rhizomorpha intestica, R. subcorticis, R. fragilis (S). Armillaire de miel, Pourridié-agric (F). Root-rot honey agaric (E). Hallimasch (D).  
طرمم من الفطريات موطنه فسج الارباه ، يركب الجذور فيقطنها . يصيب من الاثمار الحرجية السنيان والزان والقرنم والبيولا والحور والاكسبا والسنوبر والحبوب والارديس . ويصيب من الاثمار المشرة الكربة والحوو والمشمش والدلائن والكرز والكتفان والاباجوس والجوز والحشويات على اختلافها ثم للوز والقرنم والين والشاي والكاكار والكتنا والمطاط . ويصيب أيضاً بعض النباتات الزراعية والفريضة كالطاطا والفلقاس والجزر والاماليا والدرجس والوزام || ظهوره الخارصي في دوره الفطري الصحيح : طر طويل الساق النعيلة الاسطوانية ، اسوته قلنسوة الشكل ، بقية الحافة المنكسرة الى الداخل ، ظهرها نحو هـ م . قوتها اصفر صلب يعلو مروج زني . لباها جباله المنقط ، ابيض اللون مر الزراق . وهو من الفطور الماكولة . مردود تلعيب مع الفل || يظهر في الخريف ويؤدم حتى اوائل الشتاء . يركب للمواد العضوية والخشبية المنحلة على الجفوع والاشخاب المظروسة ارضاً || وهو في دوره المشيجي ينتج بيرة مفطسة حديدية الاطراف ظهرها نحو ١٢ م . لونها الى البسرة ، تغلق من خيوط كتلية مستطيلة تسرح في التربة المسطحة الى ان تلتقي



طرمم



طسان المسك



طسناج



1٧٢٤٣ - طَعْمِيَّة Agraine, Agrénage (F).

نثر الحب في مواقع معينة لتجذب عليه الطير فصاد.

1٧٢٤٤ - طَعْن، وَجُوع، إِلْجَاء Recours (F).

Recours (F).

هي الالتجاء الى السلطة المسمول على القائد حكم أو تمليك

أو تقصير أو إعادة بحث.

1٧٢٤٥ - طَعْنُ الشُّهُود Reproche de témoins (F).

Objection of witness (E).

وسيلة يتلوع بها احد المتخاصمين ليلجئ بشهادة شخص معين.

1٧٢٤٦ - طَعَام اربال الطير والسباع.

1٧٢٤٧ - طَفَر

الطفر طائر. ج طفران (السان).

1٧٢٤٨ - طَفْمُوس Gorilla (F).

هو الغوريل، أظلم.

1٧٢٤٩ - طَفْمُوسٌ مُعْتَقِيَّةٌ \*، سَمَكُفُورَةٌ

مُحْتَشِمَةٌ Cymbalophora

pubica (S). Cymbalophora pudica (F). Cymbalophora pudica (E).

حشرة من فصيلة الحريدات ورتبة حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض مناطق حوض البحر الايئش المتوسط.

لرأشتها جارية قتها رحيق الأزهار. مرتبها خاصة قتها

صفت التنبيلها || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٧ م.

بسطها نحو ٤٤ م. رأسها غلوري للشكل، عيناها

كبرتان باقنيتان. زباناها مطببان. مؤلفها مستطيل.

حبشها حطلي اللون. يملأ الى الخلفي الاخر المراج ||

روشناها الاسمان الى الياض التي يملو بضعيم ويجمع

كسني. روشناها الخلفيان الى الياض الوردية المراج

يملو تقيج كسني || لها جبل واحد في الحبل. تظهر

لقراشة في حزيوان وبشي حتى أب. تسرح في الليل.

تتأكل بعد ظهورها بنحو اربعة أسابيع وتتمتع الممكن على

الصفحات الغسل من لصال الأوراق || السرعة طول نحو

٣٠ م. جسمها انوبي للشكل، ايد الالون، سم المراج

تلمو مجعوبات متفرقة من الحلب الاسود الانتشاب،

الحطلي الاطراف. رأسها اسود. معها ورواجها الى

المرادى || طسود الاكمال ينسمر نحو اربعة اسابيع

ويتنقي فمن صلبة تحبكيها السرعة في شقوق الحاء أو

تحت القشور.

1٧٢٥٠ - طَفَف، طَلْطَف، طَلْحَاكَة

Excédent de mesure (F).

1٧٢٥١ - طَفَف

الطفف هو منع الجبل وساحل البحر ج فلوب.

1٧٢٥٢ - طَفَا Emerger (F). To emerge (E).

برز على سطح الماء.

1٧٢٥٣ - طَفَكَر \*، طَفِي الوَعْر

Oreotragus salicitor (S). Oreotragus sauteur (F).

Kilppbok, Kilppspringer (E).

حيوان لبون يجتر من اللحاء وسيد الجنس والزوج. موطنه

ينته من الحيفة الى كنيه اولندا ورويديه. يألف

اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد، أصلها التقلب  
الجنوبي || ملجئها الحليان جماعي تعيش معظم حياتها في  
الماء ولا تألف الجزر الا في زمن القساة والترسيم ||  
قوتها الاسماك والقشريات || أشهر اجناسها الطنجاج.

1٧٢٣٥ - طَسِيفَةُ النَّعْنَان \*، نَارِيَّةٌ شَهْبَاء

Cryptoblabes gnidiella (S).

Pyrale grise, Cryptoblabes polyphage (F).

Cryptoblabes gnidiella (E).

حشرة صغيرة من فصيلة الكاربات حرشفيات الاجنحة.

موطنها بعض المناطق الشرقية من حوض البحر الايئش

المحيط. تألف يساتين الليمون ويسانز اللوزان والمطوق التي

يكثر فيها النعنان، فراشتها عجيقة تعيش على غزونها

الاسمان، مرتبها ناعمة تعيش على بشرة ثمار البرتقال وصل

اوراك الدراق والكرية والنشنان || جسمها صغير قصيف

بطول نحو ٤ م. بسطها تراوح من ١١ الى ١٣ م. رأسها

ممتلئ الجرم، قصير الخطم. عيناها كبرتان، نافذتان.

زبانها عظيمات. طسساها دقيقان. مؤلفها جعدة.

حبشها وبعثا الى الشفة || رواشتها الى الشفة يملوا

مواج ثنيي وخار اسم || لها جيلان في الحبل. تظهر

قراشة الجبل الاول في ايار بقراشة الجبل الثاني في آب.

تسرح في الجبل وقبيت في التبار || السرعة، عنه بلولها

الادراك التام، تطول نحو ١٠ م. جسمها شبه اسطواني

الشكل، مستنق القدم والمخسر. ثوبا الى السرعة الجارية

المراج يملوا عطان جانبيين، قاطبان، شديدة السرعة.

رأسها اسود. معها ورواجها الى الخلفي الاسمي || طرد

الاكامل في الجبل الاول ينسمر نحو ١٥ يوما وينسمر

في الجبل الثاني نحو ٢٨ اسبوعا ويتنقي فمن صلبة

تسجها السرعة بين شقوق الحاء أو تحت القشور.

1٧٢٣٦ - طَعَامُ الْأَرْتَب Phagnale (F).

هو الحلبي، اطبه.

1٧٢٣٧ - طَعْمَلُورٌ \* Tolposporium (S).

جنس فطور مجهرية من فصيلة الفارغيات. بنوره

البولية لاقامية الشكل والحجم. طلاله حشوة لامتجانسة

تتغلل عنه بلولها من غيرات حبابية لونها الى السرعة

القائمة.

1٧٢٣٨ - طَعْمُ Goût (F). Taste (E).

هو ما يؤذيه اللزق من تصنيف لكل ما يدخل الفم.

1٧٢٣٩ - طَعْمُ Appét (F). Bait (E).

كل ما يوضع من طعام لاجتذاب الصيد من طير أو سمك

أو دسحش.

1٧٢٤٠ - طَعْم، مَطْعُوم، هَرَبْر، قَلَم، هَرْلُوف

Greffon (F). Greff (E).

هو جزء النبات المطلوب تكثيره واصلد للاستماد بالعلم.

1٧٢٤١ - طَعْمُ الْمُرْدُوع، نَطْلُ

Goût de verrou (F). Native tang (of wine), Raciness

(of style) (E).

علم خاص، يعود الى التربة والمخض، يكون في بعض

الحاصلات كالنبيج والنبع وما اشبه.

1٧٢٤٢ - طَعْمَكَة Production (F). Product (E).

هي ما تنتج من محصول.



طبيّة للنّان



طفنوسه ممتنة



طفار

Hydrargyris (F).  
Hydrargirim (E).

١٧٢٦٢ - **ملقح زنجبي**

تسم بالزريق .

١٧٢٦٣ - **ملقح وزدي**

هو الحامى مرض جلدي ، اطلبه .

Electrophanes nivale (S).  
Electrophane des neiges (F).

١٧٢٦٤ - **ملقح الثلج**

طائر من الجوامع غروبليات المناقر وفصيلة ثورثوريديات . موطنه يمتد من بلاد القطب الشمالي الى حوض البحر الابيض المتوسط ذلك لانه من القواطع التي تجوب البلاد في طلب الرزق والصيف والمشتى . ملجته الحياتي جماعي . انجواجه تد بضعة الاف . قوته البزور والحشرات || جسمه صغير اللقد بطول من ١٧ الى ١٩ سم . ثوبه النشوي يكثر فيه البياض وتقل فيه الشفحة والسمرة . ثوبه الصيفي يبقى حل البياض الصناعي الموج في الزور والصدر والبطن والاذنيك . اما الرأس والحشران والرداء والسقطان والذنب قال الشفحة المتباينة الماجات والمطوقة بالابيض . سقطاء ذلقان . ذنبه فارق الطرف || يدخن عنه بين الحشرات وفي تخاليف الصخور . الاثني تقع من ه الى ٩ يبضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٢ يوما .

Mutation

١٧٢٦٥ - **ملقحة**

تبدل فيالتي يحصل في وثل وسلة وراثية . راجع اختباه وشروء .

١٧٢٦٦ - **ملقح**

زين احمرار الشمس قبيل الغروب .

Argile (F).

١٧٢٦٧ - **ملقح**

هو التصلال ، اطلبه .

Tendre, soyeux (F).  
Tender, Silky (E).

١٧٢٦٨ - **ملقح**

الفلل : الرنص التام من كل شيء . ج . طفال ومفلول .

Cotyledon (F). Cotyledon (E).

١٧٢٦٩ - **ملقح**

هو الافران نبات عشبي ، اطلبه .

Emerson

١٧٢٧٠ - **ملقو ، ملقرو**

Herbe tendre (F).  
Tender herb (E).

١٧٢٧١ - **ملقوة**

الطرق : لبت الرقيق .

Paralique (F). Paralic (E).

١٧٢٧٢ - **ملققي**

تست قريفي يطلق على كل ما له سلة بالطن اي باسأل البحر .

Echis (S). Echis

١٧٢٧٣ - **ملققة**

جنس حيات خفية من فصيلة الافيات الانوبيات الاعايد . انزلها مدينة جيهما من افاعي البلاد الحارة . طولها نحو ٧٠ سم . ثوبا الى الصبغة السوداء تملو رقشة يضاء وضمان اسودان اوا ابيضان متعرجان . وبصفا حنلي الثوب الابلق ، مطوق البق || اشهر انواها الطلية الحرة وام الطليتين وضد الجوز والأردب .

التجاد الرقبة التي تملو من ٢٤٠٠ الى ٢٧٠٠ م . عن سطح البحر . ملجته الحياتي جماعي . إجله يتألف من ثلاث الى اربع اناث ومن ثلاثة الى اربعة شواذ يقودها ذكر مانع . قوته اوزال السط والاعشاب المختلفة . يسرح في طلب القوت من الفجر الى الساعة التاسعة ومن العصر الى الشاء ولا يرتاد الماء الا ابد المشاء . سميه طفر وساء || جسمه قريب الشبه من الشبوة ومن الرم . طوله نحو ٨٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٨ سم . ارتفاعه نحو ٥٦ سم . وطول قرن الذكر نحو ١٠ سم . اما الانثى فحياء واسم مستعري الجبهة صغير الخطم . اثنائه متصبتان . عيناه كيرتان كستيتان . قرناه غروبليات جبالان . مجاريه الدمعية جلوة الرافض . جرائزه شديدة التلشط . ثوبه يتغير مع فصل السنة الا ان اللون السالك هو الصبغة الموحشة بالاسود . بطنه دائما ثوبي القرن احمر المواج || الاثني تتسلي بخوب الذكر وبني ثنائية الخلف . تقع شادنا واسدا قترهه نحو ثلاثة اشهر .



ملقاة

Zamenis (S). Zamenis

١٧٢٥٤ - **ملقاة**

جنس حيات من الثباتيات . انواها مدينة منتشرة في جميع البلاد الحارة والمعتدلة . جميعها طوال دقائق تطفر بين الصخور وورق الكمال وفي للاء . اطولها تراوح من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . قوتها الاملاك والضفادع والوزغ والفظاء . الخ .

Podocnemis (S).

١٧٢٥٥ - **ملقاةة**

Podocnemis (F). Podocnemis (E).

جنس سلاحف مائية من فصيلة الخفاشيات . انواها المعروفة عشرة . اعطائها بعض مناطق امريكة الجنوبية جزيرة مفسكر . تألف الاثني والبييرات والقدنار واللتاق || اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة ويطوي والكبيرة . الصغيرة تقبل نحو ٣٠ سم . اما الكبيرة فطول من ٧٥ الى ٩٠ سم . ثولها الى الكلبة السوداء ذابها شمكة . قليلة الاحيداب ، يفضية الثوزن . زعانها منبسطة مسطحة تحت الدبال . رؤوسها مكروسة . اعناقها متصلة الطول والفلافة . اخناها قصيرة . قوتها شديدة التلشط ، غلبة الخالب الامامية ، رباعية الخلفية .

Parélie, Parhélie (F).

١٧٢٥٦ - **ملقاةة**

Parhelion, Mock sun (E).

الظلال صورة الشمس متعكسة في سحابة .

Immaturité (F).

١٧٢٥٧ - **ملقاةة**

Immaturity (E).

حالة الشيء غير الناضج . الملاق الحاضر في معظم الآبار دليل الطفانة .

Carne (F). Ring (E).

١٧٢٥٨ - **ملقاةة**

البائرة الطالرة في مقطع جلع الشجرة .

Lave (F). Lava (E).

١٧٢٥٩ - **ملقح**

ملقح ج . طلوح . هي حم المادن للصهورة اللابة التي يثلف بها البركان عند ثورانه .

Débordement (F).

١٧٢٦٠ - **ملقح**

Overflowing (E).

سيلان الماء خارج مجراه .

١٧٢٦١ - **ملقح التزو** هو البثار ، اطلبه .



ملققة

١٧٧٨١ - طَلْسُونٌ *Taxus (S). W (F). Yew (E).*

جنس اشجار حرجية من الطلصونيات السنوريات . يقال لها قمر نحو ٣٠٠٠ سنة . انواعه وضروبه عديدة . اشجارها متفانية القدر تملر من ٥ الى ١٥ م . اخصابها وفروعها منتصبه تقبل للتشذيب والتقليم . اوراقها متعابضة ، ثنائية الصف ، شديدة الخضار المايك ، لامة الصفعة العليا ، وهي جميلة للحدائق النبات والحدائق ولزينة القبور والمنازل والفسان . ثمارها غنية الشكل ، محبة اللحم ، صالحة للمواد السامة . اشعاشها صناعية جيدة الصنع ، ناعمة اللمعة ، قوية الاتداج والورب ، لونها في الجيرة المستنبة بالاسمر . شكرها ابيض اللون قليل الباك .



فَيْفِيَّةٌ حَرَّةٌ

١٧٧٨٢ - طَلْسُونٌ عَادِيٌّ \* *Taxus baccata (S). Il commun (F). Common yew.*

*Yew tree (E). Echta Eibe, Eibenbaum (D). Tasso, Libo, Livo, Albero della morte (I).*  
نوع من الطلصون الجبلية شجرته تملر من ١٢ الى ١٥ م . ضروبه عديدة . جميعها بطيئة النمو الا انها تنضج لثمنت طرائق التشذيب الذي يجعل منها شئ الاشكال الممكن انسجامها مع الحظوظ والمكان .



فَيْفِيَّةٌ حَرَّةٌ

١٧٧٨٣ - طَلْسُونِيٌّ \* *هو التكميدوم ، اعليه .*

١٧٧٨٤ - طَلْسُونِيَّاتٌ *Taxinées, Taxodinéas (F).*  
سبط من فصيلة السنوريات يشمل الطلصون والطوق والاشج والسميلق .

١٧٧٨٥ - طَلْعَقِيٌّ \* *هو الاربل ، اعليه .*١٧٧٨٦ - طَلْعَقِيَّةٌ \* *Chetusia (S).*

*Chétusie, Chécusie (F).*  
جنس طير من طوال الباق وفضيلة الزرقائيات . انواعه نحو ١٥ : جميعها من القواطع تجوب البلاد في طلب الرزق وللصيف والشتي . وقد تكثر الانواع في البلاد الحارة . اجسامها صغيرة القد ، رشيقة القوام . اناثها صغيرة . ظهورها وابيضتها الى السمر . بطونها الى البياض || تألف المنافع ويجاري الماء والمروج الفناء . قوتها الحوام والخشرات والقشريات . تكثر في المنافع بين الاعشاب . الاثني تحسن وسعها نحو ٤ بيضات .



طلصون عادي

١٧٧٨٧ - طَلٌّ \* *Sève (F). Sap (E).*

هو اللغ ونهم من غصبه بالتسج الحامض .

١٧٧٨٨ - طَلٌّ \* *Brume (F). Hize, Mist (E).*

قيل اخف المطر واضمعه وقيل الذي يقبل ويؤخر دونه المطر . ج طلال وطلل .

١٧٧٨٩ - طَلَّا \* *Faon (F). Fawn (E).*

الصغير البسر من ذوات الظلف ج . اطللا .



طَلْعَقِيَّةٌ

١٧٧٩٠ - طَلَّا \* *Enduit, Vernis (F).*

كل مادة مائعة تستعمل طلاء .

١٧٧٩١ - طَلَّاطِلَةٌ ، طَلَّاطِلَةٌ \* *Coating, Varnish (E).*

١٧٧٩٢ - طَلَّاطِلَةٌ \* *Luette, Uvule (F). Uvula (E).*

زائفة لحية التركيب ، غروية الشكل ، متحركة ، ناضجة ، توجبته تدعى مثل الحلقوم .

١٧٧٩٣ - طَلَّاتَةٌ \* *Habitus*

رسم هيئة الشئ ، او النبات الخارجية الطبيعية .

١٧٧٩٤ - طَلْعِيَّةٌ حَرَّةٌ \* *Echis echis,*

*Echis vulgaris (S). Echis commun, Vipère des sables (F). Echis (E).*

سحبة سارودة من الاتامي اثيوبيات الاغاضيد . جسمها معتدل الكثافة بطول نحو ٨٥ سم . نوبها الى الصبغة الخفيفة متلوها وقشرة بياض غنية ونضلات اسودان متبرجان . راسها لوزي الشكل . عظامها مسطحة الجرم . عيناها خرزيتان ، انثارتان . منقحها رافضان مرتفعتان نحو العلاء . عدد اسنانها ٤٨ منها ٢٤ في كل فك . عظامها اماميتان متصركتان || تسرح في الليل وفي النهار . تنس في الليل والتراب بصره . قوتها كل ما داب وطار وتكثرت منه || يباها الشقي يستمر نحو حة اشهر . تبلغ كامل نموها بمر عشر سنوات وتعيش نحو ٨٠ سنة || الاثني تساد بمر اربع سنوات . جراجها الشواري يحوي من ١٢ الى ٢٠ بيضة . يتفك البيض عند خروجه من الانطوية الى الجراب ثم يسلك الشوار حتى الفلج حيث يخرج لقاء النور جوارن كاملة البنية سارسة || لثقتها غمة ان لم تملح بصره وقد تكون قاضية اذا اصابت احد الشرايين الدموية || تعبر من الثاميين السامة المحيطة الشديدة الاثني .

١٧٧٩٥ - طَلْعِيٌّ ، مَعْقَلٌ ، مَعْقَلٌ \* *Parasite*  
كل كائن يعيش على ما هو حي من النبات او الحيوان .

١٧٧٩٦ - طَلْعِيٌّ بَاطِيٌّ ، اَنْتُفِيَّتٌ \* *Entophyte*  
نعت تعريفي يطلق على الفطور المهرية الغلافية التي تعيش داخل النبات المبتلى بها .

١٧٧٩٧ - طَلْعِيٌّ ظَاهِرِيٌّ ، اِنْتُفِيَّتٌ \* *Ectophyte*

نعت تعريفي يطلق على كل فطير ينمو على ظاهر الاعضاء النباتية او الحيوانية .

١٧٧٩٨ - طَلْعِيٌّ \* *Immature*

نعت تعريفي توصف به الثار والبلور غير الناضجة .

١٧٧٩٩ - طَلٌّ \* *Tockus (S). Tock (F). Tockus (E).*

جنس طير من فصيلة الاركوبيات . انواعه قليلة البند ، جميعها من الطيور الافريقية . اجسامها كبيرة القد . متايها غليظة ، محببة ، مسنة الكفاف ، تتميز بتلوها من التلووات القزمية || يألف الحيس والقنابات والاحراج . قوته الثار والبربر والبلور والخشرات والعطاء والفئران || اعرف انواعه الطن الاحمر المنقاد .

١٧٨٠ - طَلٌّ اَحْمَرُ الْمَنَقَادِ \* *Tockus erythrorhynchus (S).*

*Tock à bec rouge (F).*

نوع من الطن . اعطاه تعد من الحيسة الى السنفل . جسمه كبير القد بطول نحو ٨٥ سم . منقاد غليظ القاعدة مغوس الشكل ، مسن طلائع الخطل الاحل ، احمر اللون . اسمر المنطق || يألف الفياض وضفاف الانهر . طيراته يديه المهي متقطع الشوط كالنقاد || قوته الثار والبلور والخشرات والورع ويطرد في يدين في تجاويف الجبلوع . تضع الاثني من ٤ الى ٥ بيضة تحضنها نحو ١٥ يوماً محجور عليها بالطين واقتش على غرار البقير والخنو .

**1٧٢٠٧ - طلع الوانسي \***  
*Ixodes reduvius*,  
*Hyalomma aegypticum* (S). Tiquet du bétail,  
Réduve (F).

نوع من الطلع الاسمر، المبط، البيضي الشكل، الصغير  
القد. الذكر منه بطول نحو ٤ مم. والانثى بطول نحو  
١٨ || يتطفل على جميع المواشي اغصها الابقار والاشنام  
والجمال.

**1٧٢٠٨ - طليحيات**  
*Ixodidae* (S).  
*Ixodidae* (F). *Ixodidae* (E).

فصيلة حشرات من القرايات قوتها الدم تنصه حيث  
تستطيع. اجناسها وانواعها عديدة، جميعها صغيرة القد.  
ذكرها اصفر حبيبا من اناتها. تتميز باخطائها الثاقبة  
للماشة الفشارية التركيب التي تشبه في اجسام الموال  
التي تركبها. لذلك يصعب زرع الطلع في عائله دون  
فصل جسمه حيث يبقى الرأس مع اجزاء الدم في جلد  
المائل.

**1٧٢٠٩ - طلع**  
الطلع : ما يني في الحوش والدير من ماء كثرت فيه  
التعاطيس لا سليل الى شربه.

**1٧٢١٠ - طليحكم**  
هو القليل في ذروة يأسه ونشاطه.

**1٧٢١١ - طليسة \***  
*Botrytis*

جنس تطور مجهرية من الطليسات. وظيفه الوطحات.  
يتبين جميعها الموزع الاسطواني الشكل، الطليط القطر،  
اخوي او السطحي الانتساب. جرياره الكندي منصوب  
الجلوس، حديد الفروع العمودية الاوتكان. كائانه  
طرية، متقوية او ضمية التجميع، يضييه الشكل،  
نحيلة الثلاث، وحيدة او ثنائية الخلية || انواعه كثيرة  
المد اعرفها وانهرها ما يتبع.

**1٧٢١٢ - طليسة البعل \***

*Botrytis squamosa* (S).  
لفظ مجهرية مركب اوراق البصل فيسبب يباس اطرافها  
بمد اغتطاف لونها || يكالغ باستعمال بيسلفيت  
الكلسيوم.

**1٧٢١٣ - طليسة التوليب \***  
*Botrytis tulipae* (S).

لفظ مجهرية مركب اوراق التوليب فيؤذيها وقد يصيب  
الشمراخ الزهري فيطعمه || مظهره المخاربي يقع صغيرة  
شبه مستديرة وباعية اللون تركب التعلل تقسب جفان  
نسجه المتحارة || وهو حل الشمراخ الزهري لطف متدرة  
صغيرة تشبه الزهور به ان تسي الى مجعا || يكالغ  
من ظهوره باستعمال بيسلفيت الكلسيوم وبطبيخ  
التربة بالكر بولين.

**1٧٢١٤ - طليسة الثوم \***  
*Botrytis alli* (S).

لفظ مجهرية يتري الثوم والبصل في اثناء صفاتها. مظهره  
المخاربي وشاح كيندي له التجميع، خلي الحية، اغبر  
اللون، مركب اقراص اقوام الثوم والبصل فيطعمه || يدارك  
باختتاب حفظ الثوم والبصل في الامكان الرطبة.

**1٧٢١٥ - طليسة الدمية \***

*Botrytis galanthina* (S).  
لفظ مجهرية مركب السمكة عند انكشافها من التربة  
فيتمتعها بولاع اغبر اللون نقي الشكل يسطر حل الازراق  
فيقرسها بمد ان يؤمها ييغوره السود الكثيفة.

**1٧٢١٣ - طلام، قنير**  
*Chénévris* (F).  
هو القنير اي حب الشامدنج.

**1٧٢١٤ - طلاع**  
هي الاعراض التي تسبق المرض ويشير اليه.

**1٧٢١٥ - طلاع**  
هي البواكير، اطليا.

**1٧٢١٦ - طلب، عريضة، إلتباس**  
*Requête* (F). *Requête* (E).

هو كل مطلب يقدمه صاحب ال سلطة تملك حق النظر  
بقضية واجراء اللازم.

**1٧٢١٧ - طلب، دعوى**  
*Demande* (F). *Demand* (E).

هو ما يرميه الماوس حل المحكمة راجيا تقرر ويحب حق  
له. ويأتي بمعنى الدعوى تيمنا.

**1٧٢١٨ - طلب الإلغاء**  
*Recours en annulation* (F). *Petition for annulment* (E).

هو طلب الغاء حل اداري.

**1٧٢١٩ - طلب إعادة النظر في القضية**  
*Pourvoi en révision* (F). *Petition for rehearing* (E).

هو طلب اعادة النظر في بعض القواعد القانونية لتثبت  
من صحتها او في بعض الاحكام لالغائها.

**1٧٢٢٠ - طلب قبول الإلتباس**  
*Reccision* (F). *Reccision* (E).

دعوى طليتها نقض الحكم دون الاضافات الى موضوع  
الدعوى التي صدر عنها.

**1٧٢٢١ - طلب ما فوق الحق**

*Plus petit, Ultra petit* (F).  
هو الحكم ينير مطالب الجسم كان يحكم القاضي بشي لم  
يطلب منه او بشي يزيد عما طلبه منه.

**1٧٢٢٢ - طلب نقض الحكم**

*Pourvoi en cassation* (F). *Appeal for reversal of judgment* (E).  
هو الطلب بابطال حكم، صدر من محكمة الدرجة  
الانتهائية، طعن فيه.

**1٧٢٢٣ - طلة**  
*Arôme agréable* (F).

*Agréable aroma* (E).  
الطلة : النيلة من الروائح. يقال رائحة طلة وخر طلة.

**1٧٢٢٤ - طلع**

هو السط الصمغي، يخرج من النضار يرعاها الايل. الواحدة  
طلمة.

**1٧٢٢٥ - طلع**  
*hodes* (S). *hode* (F).

جنس قراد من فصيلة الطليحات تترك القمم الذي يمتصه  
من الحيوان || اشهر انواعه طلع المواشي وطلع الكلاب.

**1٧٢٢٦ - طلع الكلاب \***  
*hodes ricinus* (S). *Tique des chiens, Pou des bois* (F).

نوع من الطلع المبط الصغير القد. الذكر منه بطول  
نحو ٢ مم. والانثى بطول نحو ٩ مم || يتطفل حل معظم  
الحيوانات الوحشية والداجمة اغصها الكلاب والحيوانات  
فيتمص دمها ويؤذيها.



طلع الكلاب



طلع المواشي



طليسة البصل



طليسة التوليب



طليسة الثوم

مئة: البيوض، الحلقة، النفاس، البقية، الفياتوريك،  
النمى.

## ١٧٣١٦ - مجلة الرئيسة الرئيسية\*

*Botrytis elliptica* (5).  
 فطر مجهرى يركب بعض انواع الزئبق فيسبب يباس  
 اوراقها بعد ان يوشم فصلها بقع حطبية لاقامية الشكل  
 والتجعب || يكافح باستعمال بيسلفيت الكلسيوم .

*Botrych fabae* (S). \* ١٧٣١٧ - طليعة القبول ٥ \*

فطر مجري ركب أوداق القبول وقد يصيب الإضرار  
والقرون || ظهوره الحاربي فقط منسوبة سمراء  
الزواي ركب النصل على صفحتي ثم تتسع فيلغ  
من ١٠ إلى ١٥ سم. بعد أن ينصرف لثنا إلى الرمادي  
الزواي تنطقه حالات متناهية سمراء اللواج || وهو على  
الفترون بقم يتصله أو متراكبة تغطي القشرة السنية  
الظهور وتدلها || يكافح عند ظهوره يستأهل احد  
الفاطير الجدي. وين التمشعن انتاج البذور الزراعية  
الثلاثية التي تقضي عليه لغو التربة من المائل.

۱۷۳۱۸ - طینة القنب ۵. *Botrytis infestans* (S).

فطر مجهري يركب سوق القنب عند شحمها وعلوها من الزهرة  
 فيلويها بسرة || مظهره الخارجي لشفة معراء عرضها  
 نحو ١٥ مم. تطوق الساق فتصطبها وتصب يباسها مع أوراقها  
 وازهارها || لا يستويثب المكافحة لانه عديم الثبات ،  
 قليل الانتشار.

*Botrytis trifolii* (5). - طسعة الفجل.

فطر بجھري برکب النفل في سوته واوراته الى مظهره الخارجى يقع صغيرة محترقة مستديرة سمراء اللون تملأ السوق والاوران فتسبب جفاف النبات .

١٧٣٧ - طائفة الودّاع \*

*Bostrychia pannonica* (S).  
فطر مجهرى يصيب الفرج وتزيد الولدي. مظهره  
الخارجي يقع لاقابيه الشكل والحجم تركب الاوراق  
والسوق والزيغات. تبرز على النصل بقع صغيرة حمراء  
اللون ثم تتسع وتتحرف نحو السرة يقابلها على الصفة  
السفلى بقع رمادية خفيفة لينة || يكافئ بمصباح  
يصلفيت الكلوروم المركز ١٪

*Botrytis cinerea* (S). - فطيرة رمادية - ١٧٣٢١

فطر مجهري عيم الانتشار يركب جميع المواد الثابتة المنحلة او السائبة الى الانحلال . كما يركب نباتات المصاري والمشاغل الكثيفة || مظهره الخارجي فواس خلى عنكبوتي اطعم اللون .

١٧٣٢٧ - طَلَسْمِيَّةٌ \* ، هُنْدِيَّةٌ زَرْقَاءُ

*Catananche coerulea* (S). *Catananche*, *Cupidone* bleue (F). *Blue cupidone*, *Blue succory* (E). *Rasselblume*, *Blue Rasselblume* (D). *Cupidonia*, *Belvvedere turchino*, *Madra d'amore* (I).

نبات عشبي بري، مصر سيناء من فصيلة المركبات،  
كان يستعمل في كتابة طلام الحب والبنفس. ساقه  
دقيقة فزاحة تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم. اوراقه خضراء  
مستطيلة، منطها قرصية الانشطار؛ طولها يراوح من  
٢٠ و ٣٠ سم. نصلها ثلاثي البزوق ثنائي او رباعي  
التصميم، غلى الصنفه السبل. ازهاره رومبي، غدي  
التجميع. ازهاره الى الزرقه || تنوره يستمر من تموز  
الى ايلول.

۱۷۳۲۳ - طَبَسْتَان ۵ .

Botrytidées (F). Botrytidae (E).  
عمارة فطور مجهرية من فصيلة الطحليات . اجنلها



طاسة الزنبي



طلعة الفول



مقالة المد



三、读



100

Tomocerus (5). طُمُور - 1734A

**Tomocère** (F). **Tomocerus** (E).

جنس حشرات قافزة دامة من فصيلة الطموريات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد  
المعتدلة الحرارة - اجسامها صغيرة عريضة طولها من 4  
الى 6 م . لها خطفي الخطين المماثلين المجاط . حراشفها  
الى السرة الناعقة اللغية الموحج . بطونها لاستساوية التراجت  
مبشرة الحلب الذي يكثر في الخضر في اشهر انواعه  
الطمور المجول (*Tomocerus vulgaris*) الذي يقع  
تحت الحجارة والاختباء وراء الاشجار اليابسة .

Tomoceridae (5). - طُمُت، بَات ٥

**Tomoceridae** (F). Tomoceridae (E).

فصلية حشرات قاذفة دامت من رتبة الكهديات . اجناسها  
واحدواها المروعة لاجل العمد المنتشرة في بعض اقطار البلاد  
المختلفة الحارة || اجسامها صغيرة ، عريضة ، طولها من  
٧ الى ٦ سم . ألوانها ملوكة ، كبريتي الخضاب السوي .  
رؤوسها مستقيمة . الحاكها وكثيرها نافذة . عينها زرقية  
قرونها الاستثنائية رباعية الفصل ، مستطيلة ، زرقية  
مدسية الكلاسيكية الاستثنائية المروحة القفزية  
نشطة وسليمة يتناسل حادة . سكانها مستطيلة مسنة  
يوسيد . قواها مختلفة الطول تنتهي باظفار حادة ||  
يحب احسانها للشمس .

Boue (F). ۱۷۳۵ - طبرستان

1994 (7)

١٧٣٥١ - طبعیاتی

وَالذِّنْبُ ، اَطْلَبُ .

Eau bourbeuse (F). طَبْعِيَّة ، طَبْعِيَّة - ١٧٣٥١

Muddy water (E). ماء غليظ من الماء الكدر .

James D. Thompson (B) 161<sup>st</sup> St. - 1890's

المطلوب هو العاري . وهو من الثبات ما كان سرحاً املأ

رعب هلیه .

١٧١٥ - طمم طعم وتطم الطائر : وقع على حصن .

© 1986 by John Wiley & Sons, Inc.

Answer: (B) Answer: (B)

**Alluvion (F). Alluvium (E).** الفيض - الفيض

لَا يَسْلُخُ قِطْعَةً مِنْ أَرْضِهِ بِضَيْفِهَا إِلَى مَا بَعْدَهَا فِي

سبله ای ال ما یقابلهما . و یستمر الطول ما کما یزید

پارٹیشن

١٧٣٣٨ - فلكي

الحصص الممنوعة من دوم أو من سقف

1991-1992 1992-1993 1993-1994

Tellus (S). - طيليس ، ديليس

جنس محار من الرخويات الصفحيات الحياشم . انواعه

عديدة جميعها سيوائية الاصفاد تعيش غارزة في رمال

١٧٣٤ - طليخيميات \*  
 Tellinidae (F), Tellinidae (E),  
 Tellinidae (S).  
 فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحية الخياشيم.  
 أجسامها وأصدانها المرفوعة عديدة بعضها في سميتحات  
 الاراضي البليستيرية والبعض الآخر حاصس. مولها يشغل  
 معظم مجار المائي بكتكائه المخاط القلبية \* اصدانها  
 متراوح بين المستديرة والمثلجية القلبية اثنان، جميعها  
 مستوية القد أو كبيرة. ألوانها جيلة الألوان الزاهرة. يكثر  
 النوع الاخر ويشققاته. اعراف اجسامها واسفها اللطيس  
 المثلثان.

1990-1991

100

Tomato (F). ۱۷۳۴۲ - طماطم

1/4 1/2 3/4 1 1 1/2 2 2 1/2 3 3 1/2 4 4 1/2 5 5 1/2 6 6 1/2 7 7 1/2 8 8 1/2 9 9 1/2 10 10 1/2 11 11 1/2 12 12 1/2 13 13 1/2 14 14 1/2 15 15 1/2 16 16 1/2 17 17 1/2 18 18 1/2 19 19 1/2 20 20 1/2 21 21 1/2 22 22 1/2 23 23 1/2 24 24 1/2 25 25 1/2 26 26 1/2 27 27 1/2 28 28 1/2 29 29 1/2 30 30 1/2 31 31 1/2 32 32 1/2 33 33 1/2 34 34 1/2 35 35 1/2 36 36 1/2 37 37 1/2 38 38 1/2 39 39 1/2 40 40 1/2 41 41 1/2 42 42 1/2 43 43 1/2 44 44 1/2 45 45 1/2 46 46 1/2 47 47 1/2 48 48 1/2 49 49 1/2 50 50 1/2 51 51 1/2 52 52 1/2 53 53 1/2 54 54 1/2 55 55 1/2 56 56 1/2 57 57 1/2 58 58 1/2 59 59 1/2 60 60 1/2 61 61 1/2 62 62 1/2 63 63 1/2 64 64 1/2 65 65 1/2 66 66 1/2 67 67 1/2 68 68 1/2 69 69 1/2 70 70 1/2 71 71 1/2 72 72 1/2 73 73 1/2 74 74 1/2 75 75 1/2 76 76 1/2 77 77 1/2 78 78 1/2 79 79 1/2 80 80 1/2 81 81 1/2 82 82 1/2 83 83 1/2 84 84 1/2 85 85 1/2 86 86 1/2 87 87 1/2 88 88 1/2 89 89 1/2 90 90 1/2 91 91 1/2 92 92 1/2 93 93 1/2 94 94 1/2 95 95 1/2 96 96 1/2 97 97 1/2 98 98 1/2 99 99 1/2 100 100 1/2 101 101 1/2 102 102 1/2 103 103 1/2 104 104 1/2 105 105 1/2 106 106 1/2 107 107 1/2 108 108 1/2 109 109 1/2 110 110 1/2 111 111 1/2 112 112 1/2 113 113 1/2 114 114 1/2 115 115 1/2 116 116 1/2 117 117 1/2 118 118 1/2 119 119 1/2 120 120 1/2 121 121 1/2 122 122 1/2 123 123 1/2 124 124 1/2 125 125 1/2 126 126 1/2 127 127 1/2 128 128 1/2 129 129 1/2 130 130 1/2 131 131 1/2 132 132 1/2 133 133 1/2 134 134 1/2 135 135 1/2 136 136 1/2 137 137 1/2 138 138 1/2 139 139 1/2 140 140 1/2 141 141 1/2 142 142 1/2 143 143 1/2 144 144 1/2 145 145 1/2 146 146 1/2 147 147 1/2 148 148 1/2 149 149 1/2 150 150 1/2 151 151 1/2 152 152 1/2 153 153 1/2 154 154 1/2 155 155 1/2 156 156 1/2 157 157 1/2 158 158 1/2 159 159 1/2 160 160 1/2 161 161 1/2 162 162 1/2 163 163 1/2 164 164 1/2 165 165 1/2 166 166 1/2 167 167 1/2 168 168 1/2 169 169 1/2 170 170 1/2 171 171 1/2 172 172 1/2 173 173 1/2 174 174 1/2 175 175 1/2 176 176 1/2 177 177 1/2 178 178 1/2 179 179 1/2 180 180 1/2 181 181 1/2 182 182 1/2 183 183 1/2 184 184 1/2 185 185 1/2 186 186 1/2 187 187 1/2 188 188 1/2 189 189 1/2 190 190 1/2 191 191 1/2 192 192 1/2 193 193 1/2 194 194 1/2 195 195 1/2 196 196 1/2 197 197 1/2 198 198 1/2 199 199 1/2 200 200 1/2 201 201 1/2 202 202 1/2 203 203 1/2 204 204 1/2 205 205 1/2 206 206 1/2 207 207 1/2 208 208 1/2 209 209 1/2 210 210 1/2 211 211 1/2 212 212 1/2 213 213 1/2 214 214 1/2 215 215 1/2 216 216 1/2 217 217 1/2 218 218 1/2 219 219 1/2 220 220 1/2 221 221 1/2 222 222 1/2 223 223 1/2 224 224 1/2 225 225 1/2 226 226 1/2 227 227 1/2 228 228 1/2 229 229 1/2 230 230 1/2 231 231 1/2 232 232 1/2 233 233 1/2 234 234 1/2 235 235 1/2 236 236 1/2 237 237 1/2 238 238 1/2 239 239 1/2 240 240 1/2 241 241 1/2 242 242 1/2 243 243 1/2 244 244 1/2 245 245 1/2 246 246 1/2 247 247 1/2 248 248 1/2 249 249 1/2 250 250 1/2 251 251 1/2 252 252 1/2 253 253 1/2 254 254 1/2 255 255 1/2 256 256 1/2 257 257 1/2 258 258 1/2 259 259 1/2 260 260 1/2 261 261 1/2 262 262 1/2 263 263 1/2 264 264 1/2 265 265 1/2 266 266 1/2 267 267 1/2 268 268 1/2 269 269 1/2 270 270 1/2 271 271 1/2 272 272 1/2 273 273 1/2 274 274 1/2 275 275 1/2 276 276 1/2 277 277 1/2 278 278 1/2 279 279 1/2 280 280 1/2 281 281 1/2 282 282 1/2 283 283 1/2 284 284 1/2 285 285 1/2 286 286 1/2 287 287 1/2 288 288 1/2 289 289 1/2 290 290 1/2 291 291 1/2 292 292 1/2 293 293 1/2 294 294 1/2 295 295 1/2 296 296 1/2 297 297 1/2 298 298 1/2 299 299 1/2 300 300 1/2 301 301 1/2 302 302 1/2 303 303 1/2 304 304 1/2 305 305 1/2 306 306 1/2 307 307 1/2 308 308 1/2 309 309 1/2 310 310 1/2 311 311 1/2 312 312 1/2 313 313 1/2 314 314 1/2 315 315 1/2 316 316 1/2 317 317 1/2 318 318 1/2 319 319 1/2 320 320 1/2 321 321 1/2 322 322 1/2 323 323 1/2 324 324 1/2 325 325 1/2 326 326 1/2 327 327 1/2 328 328 1/2 329 329 1/2 330 330 1/2 331 331 1/2 332 332 1/2 333 333 1/2 334 334 1/2 335 335 1/2 336 336 1/2 337 337 1/2 338 338 1/2 339 339 1/2 340 340 1/2 341 341 1/2 342 342 1/2 343 343 1/2 344 344 1/2 345 345 1/2 346 346 1/2 347 347 1/2 348 348 1/2 349 349 1/2 350 350 1/2 351 351 1/2 352 352 1/2 353 353 1/2 354 354 1/2 355 355 1/2 356 356 1/2 357 357 1/2 358 358 1/2 35

**Figure 1**

Figure 1 shows two bar charts side-by-side. The left chart displays the percentage of respondents who are members of various religious groups. The right chart displays the percentage of respondents who are members of various political parties.

**Religious Groups:**

Religious Group	Percentage (%)
Hindu	78
Muslim	16
Sikh	4
Buddhist	2
Jain	0

**Political Parties:**

Political Party	Percentage (%)
Congress	45
NDA	35
BJP	15
Others	5

Rhus à feuilles d'épine (F). ١٧٣٤٣ - طِمِغ

الموت ، اطلال

سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

Emilago - طمر

هو الفن في المطبوعة كدفع النلال والكلاء والمناقل

... ..

Enfouissement (F). ۱۷۳۴ - مٲ، دقٲ



ماليينس



طبر و قی میلاد



طعمسور



طنانة التربة



طنانة الحقائق



طنانة الحراج



طنانة القاع



طنانة حطرة



طنبرجية

Rejeton (F).

Shoot, Sprout, Offshoot (E).

الطنب ج أطباب : عروق تنشب من أروية الشجرة .

Tombereau (F). Tip-cart (E).

الطبر كالمصبة حربة للقل ذات دولابين .

Thunbergia (S).

Thunbergia (F). Black eyed susan (E). Thunbergia (D). Thunbergia (I).

جنس نباتات من فصيلة الانتشبات معقودة التفرير مل اسم الطبيب الرحالة السويدي « مئرج » . أنواعها ثمانية منها المشقة الحولية ومنها اليقية الملوقة المصرة . أوراقها متعابلة الأرتكاز ، قليلة أو سهمية لتصل . أزهارها كبيرة القد ، زاعية الألوان || أشهر أنواعها ما يتبع .

Thunbergia fragrans (S). Thunbergia odorifera (F).

جنية سبروية عارضة مصرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية الشكل متعابلة السنتين المصنف . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية يملوها في وسطها مزاج أسود تنحطه بقعة يضاء || أزهارها يستر من سحران أو ثشرين الأول .

Thunbergia slata (S). Thunbergia silae (F).

جنية سبروية عارضة مصرة تملو نحو ١٥٠ م . أوراقها سهمية الشكل متعابلة السنتين المصنف . أزهارها صفراء اللون أو برتقالية يملوها في وسطها مزاج أسود تنحطه بقعة يضاء || أزهارها يستر من سحران أو ثشرين الأول .

Thunbergia chrysops (S). Thunbergia dorée (F).

حقة سبروية حولية زينية تملو نحو ١٠٠ م . أوراقها لقية الشكل . كأس زهرتها سهمية السنج ، مقطوعة الطرف . ثنائياتها يلية مهدية ، ترويحها جبري الحية ، يتلاتها ذمية اللون ، أريجوانية المزاج يملوها طوق أزرق . أزهارها يستر من أيار الى أيلول .

Xiphydria (S). Xiphydrie (F).

جنس حشرات من فصيلة الخنبرويات . أنواعها مدينة منتشرة في جميع البلاد المعتدة . أجسامها اسطوانية الشكل طولها يراوح بين ١٠ و ١٦ م . ثنائياتها سوية الألوان يندب فيها الاسمر والحلي . قروبا الانتشارية حولية التركيب ، أقية الانتشاب . رواشتها شائعة كثيرة العروق . مرازات انثائها صغيرة القد ذرية || قروبا غاشية تركب جذوع الأشجار الحرجية المائلة انصهارا للث والحور والدرادر .

Xiphydriidae (S).

Xiphydriidae (F). Xiphydriidae (E).

فصيلة حشرات من غشائيات الجسم الأشرية . أجناسها وانواعها مدينة تتميز باستدارة رؤوسها واسطالة أمتائها وقصر الجوانب انثائها . قروبا غاشية تملو وتزدب جذوع اللث والبيولا والسيتيان والحور والدرادر .

Tanytus culiciformis (S).

حشرة من فصيلة المصطبات . جسمها قريب الشبه من البعوضة ، يطول نحو ٥ م . || قروبا الى الصلطة الاسراء يملوها ، عة الذكر ، سلطان اسروان في الصدر وسط

Cheval de race (F).

Botte de roseaux (F).

Bunch of reeds (E).

حزمة القصب . والقصب الواحدة طن .

Bombus (S).

Bourdon (F). Humble-bee (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة النمليات . أنواعها نحو ٢٠٠ موطنها العالم . تتميز بأجسامها الخطية الزهراء .

Bombus terrestris (S).

Bourdon tarrestre (F).

طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ م . رأسها أسود يملو تزيح اسمر وسط اسفر . قروبا سوداء . جوشها والمفصل الأول من يبطها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد اللامع . اما الرابع والخامس فالى البياض الاثير . قروباها سود . عرشها متوسط القد تقيم في التربة أو تحت الشيا . تسرح ابتداء من أواخر أيار .

Bombus hortorum (S).

Bourdon des jardins (F).

طولها نحو ٢٠ م . رأسها أسود يملو تزيح اسمر . جوشها وقروبا والمفصل الأول من يبطها الى الصفرة . مفصلها الثاني والثالث الى السواد . اما الرابع والخامس فالى البياض . قروباها سود . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من نيسان . تألف الحقائق والجنان القريبة من الاماكن الآهلة .

Bombus sylvarum (S).

Bourdon des bois (F).

طولها نحو ٢٠ م . جسمها كفيف الزغب الدقيق الطويل . ثوبها الى الصفرة الشفراء . قروباها جوية اللون . عرشها كثير العدد . تسرح ابتداء من أيار . تألف الحراج والغابات الكثيفة الظليلة .

Bombus lapidarius (S).

Bourdon des carrières (F).

طولها نحو ١٦ م . ثوبها الى السواد اللامع . مفصلها الثلاثة الطرفية الى الحمرة الصنائية . قروباها سمر يملوها زغب اسمر . عرشها متوسط القد تقيم بين الحجارة والصخور . تسرح ابتداء من أيار .

Bombus fragrans (S).

Bourdon parfumé (F).

طولها نحو ٢٠ م . رأسها ويبطها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قروباها سود يملوها زغب اشقر . عرشها قليل العدد تقيم في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من أيار .

Bombus terrestris (S).

Bourdon tarrestre (F).

طولها نحو ٢٠ م . رأسها ويبطها الى الصفرة . جوشها زيتوني . قروباها سود يملوها زغب اشقر . عرشها قليل العدد تقيم في صمغ الاشجار . تسرح ابتداء من أيار .

خاسيا الفصّل. جوشها اصفر من بطنها. بطنها يبيّض الشكل. مرزّتها مستقيمة. اجنتها حاملة اللون، مهدبة الاطراف. ثوبها الى البني الاشقر المواج || تربيتها منتشرة في اودية وامريكة.

١٧٢٨٨ - **طنجوشيات** (S). *Trichogrammidés* (F).

فصيلة حشرات من رتبة عشائيات الاجنحة المصنوعة. اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها نائمة تغطّل على مكن الحشرات من غثفل الفصائل || حشرتها شديدة الصغر طولها من ١ الى ٢ مم. اجسامها ديمية. جواشها اقصر من بطنها. قرونها الاستشعارية قصيرة، خماسية الفصّل او سباعيتها. ارسافها ثلاثية الفصّل. مرزّتها قصيرة، مستقيمة. اجنتها مهدبة الحنصار || اشهر انواعها الطفوش الشارد.

١٧٢٨٩ - **طنجاف** *Stetun*  
هو السديم ضرب من السحاب المرتفع.

١٧٣٩٠ - **طهر**، **طهره**، **لقاء** *Asepsis* (F).  
*Asepsis, Aseptic methods* (E).  
استخدام المواد البنية او الفاسدة التي تنقل الامراض.

١٧٣٩١ - **طهرج** (S). *Ithaginis* (E).

جنس طير من الدجائيات وفصيلة الطيوريات. انواعه المعروفة خمسة موطنها جبال الهند. لونها احيائي جامي. قربها الاغشاب والحبوب والجلداتر اعصها النحل || اجسامها متوسطة الطول من ٤ الى ٥ سم. اقواها الى الطحلة السراء المنطوية الماجات. رؤوسها صغيرة متوسية بفتاير لاقائية التنجيع والاستاطاة. صويتها مطوقة بالابيض. مثالبها قصيرة ورفلية. اعناقها طويلة. اذنانها متوسطة الطول، مقنطرة الاطراف || الانثى اصفر قدام الذكر واقنع لونها منه. تكثر الصومعيا في الارض. تعيش من ٧ الى ٩ بيضات تخصها نحو ثلاثة اسابيع بينما الذكر يلقن لها الفداء || تعتبر من الطرائد الفاخرة.

١٧٣٩٢ - **طهس** (F). *Endonastie* (F).  
الطهس الثضات الزئبد على السوق تسهيل لجرود الورقة من الورقة.

١٧٣٩٣ - **طهس** *Détariorat* (F).  
*To detariorat* (E).  
افسد العمل بسره تصروه.

١٧٣٩٤ - **طهس** *Frais* (F). *Fresh* (E).  
نمت وصفي يندل على طراوية الشيء كقشك زينة طهسة اي طازينة.

١٧٣٩٥ - **طهس** (S). *Milium nigricans* (S).  
*Mais de Guinée* (F). *African millet-grass* (E). *Echaz* *Flaccargas* (D). *Miglio nero* (I).

نبات عشبي زراعي حولي من التجليات. مهد البلاد الافريقية الحارة حيث تكثر زراعتها نظراً لاستعماله الغذاء والمالي. وهو قريب الشيء من القطن. اوراقه كبيرة القد، صلبة النصل، متقاربة الابعاد. حشوكه الزهري كبير الحجم. ثماره حبوب صغيرة مستديرة مغلقة فبره اللون.

سلط متدّنة في البطن. اما السلط المتدّنة في ثوب الانثى صفراء اللون || رأسها مستعرض. زبائنها وريشها عند الذكر، قلابيان عند الانثى. وريشها، عند الشقين، الى البيضاء الاخير المرقوش بالحنطي. قوامها الى الصفرة، مفاسلها سود || تظهر الحشرة الجملة من ايار الى تشرين الاول. تألف حشرات المنطق ويجاري الماء || يربتها مائية ثم قازية، وانجها ودائمة.

١٧٣٧٨ - **طنج** هو المور، الحلبه.

١٧٣٧٩ - **طنش** *Tanrac comusa* (F).  
حيوان لين حاشر يقى مذال، الحلبه.

١٧٣٨٠ - **طنز**  
لفظ غريب من السك (الحيد).

١٧٣٨١ - **طنطور الجندي**  
هو القنيفة الحبشية. الحلبه.

١٧٣٨٢ - **طنطين** *Tanghin, Tanghen* (F).  
مادة جبالية تستخرج من عصارة ساق الطنينة السامة او من لباب ثمارها.

١٧٣٨٣ - **طنينكة** (S). *Tanghinia* (S).  
*Tanghinie, Tanguin* (F).  
جنس اشجار برية وزينية من فصيلة الغليات انواعها المعروفة خمسة جميعها كبرية القند تملو من A الى ١٥ م. اخشابها صلبة متينة عطرية اللون. ثمارها نووية الشكل بنقية اللحم لونها يراوح من الاصفر الى الاحمر || اشهر انواعها الطنينة السامة.

١٧٣٨٤ - **طنينكة سامة**، **طنينكة مدسكرة** *Tanghinia venenifera* (S). *Tanghinia de Madagascar* (F).  
نوع من الطنينة يهي ثمرة جميلة الختام تملو نحو ١٠ اوتار. اوراقها سائبة الشكل، نصلها جلد الصلبة حاقب انضمار اطول المواج || يستخرج من لباب ثمارها وين صارة منها مادة جميلة شديدة القوي تثل القلب والجهاز العصبي || يقال ان يقر ملك مدسكرة امر عام ١٨٣٠ باستحار جميع ثمره الجزيرة وراقها وكان مدمع نحو ٦٠٠٠ فتمك حليم باجترار صارة الطنينة لسانه لتستريح البلاد من طفة الابهالة. وهكذا كان قاتوا جميعهم بيوم واحد.

١٧٣٨٥ - **طنف**، **طنف** *Auvent* (F).  
*Pant-roof, Porch-roof* (E).

الحيد من الجبل وما تشأ منه. والقرز الحائط وما اشرف غاربا عن البيت. والسقفة تشرع فوق باب الدار.

١٧٣٨٦ - **طنف** غير احمر يشبه السم (السان).

١٧٣٨٧ - **طنشوش شارد** (S).

*Trichogramma evanescens* (S).  
*Trichogramme errant* (F).

حشرة نائمة من فصيلة الطفوشيات. موطنها بعض مناطق البلاد المتصلة الحارة. تغطّل على مكن الحشرات ومنها الترميزات (الكوشيل) || جسمها صغير القند بطول نحو ١ مم. رأسها مستعرض الجرم. زبائنها قصيران، منفرجان،



طفوش شارد



طهرج



طهس





طوباب مهذب

كبيرة ، ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربها الاستعمارية صغيرة ونحيلة . اعطائها لثقة او ماسة . كولها مستطيلة الشكل ، مبررة الحلب . شيلاتها كبيرة . بطونها شبه اسطوانية . قوائمها نضيفة . اوبها كبيرة ، ابيض الاسود ثم الاسمر الحلي || يرقتها ونجحة او نائلة او غاحلة || اشهر اجناسها الطواسة والكردودة .

١٧٤٠٣ - طويكوك في الانثلة السوداء ، اطبا .

١٧٤٠٤ - طويكوكية التصرف (F). Disponibilités (F). Disposal (E). في القانون المدني صفة متعلقة بالاموال يجعلها قابلة للتسليك .

١٧٤٠٥ - طويكوك الساق ، طويكوكيات الساق

Echassiers (F). Wading-birds (E). ربة من الطيور تتميز باستطالة سيقانها واعناقها وبانقيادها . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع في مشرة فصائل : القشريات والقشليات والتطليات والحياريات وطيجات الارض والفرزقيات والكركيات والقشليات والتسميات والكتاتيات

١٧٤٠٦ - طويكوك القرون في القزليات ، اطبا .

١٧٤٠٧ - طويكوكية \* ، طويكوكية \* Tupala (S). Toupala, Cladobate (F).

جنس حيوانات لينة حاشرة من فصيلة الطويكيات . انواعه المعروفة مبع . اعطائها تمت من الحد الى الحد الصيفية والاثام ويبرز الاربعيل حتى صوته ، والقيلين . تألف القابات والاحراج . تسلك الاجمار بقة . تسرح في الثمار رتيبة في الليل ، قوما الحشرات والفوزغ والقرنثان والجرذان ... || اجسامها تعول من ٣٠ الى ٥٠ سم . بما فيه الاذنان التي تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها مستطيلة الاعظام ، غروبية الشكل . سبالها كبيرة . عيونها واذاها صغيرة . اذنانها مستطيلة جلة . اوبها تختلف مع الانواع . اناها رباعية الاطباع .

اعرف انواعه واشهرها الاربعة التالية :

طويكوكية اسمر حديدي \* Tupala ferruginea (S).

طويكوكية تانا - تانا \* Toupala ferrugineux (F).

طويكوكية تانا - تانا \* Tupala tana (S).

طويكوكية جاوا \* Toupala tana, Tana (F).

طويكوكية جاوا \* Tupala javanica (S).

طويكوكية نيكوبار \* Toupala de java (F).

طويكوكية نيكوبار \* Tupala nicobarica (S).

طويكوكية نيكوبار \* Toupala de Nicobar (F).

١٧٤٠٨ - طويكوكيات \* Tupalidae (S).

Tupalidae, Tupalidae (F). Tupalidae (E).

فصيلة حيوانات لينة حاشرة مسقلة . اجناسها وانواعها قليلة البدن . اعطائها المناطق الحارة والاستوائية من الحد والاثام ويبرز الاربعيل || جميع اجناسها مبررة ، مستطيلة الاجسام والاذنان ، قريبة لثية بالتسحاب . رؤوسها غروبية ، ذلقة الاعظام . آذانها صغيرة . قوائمها الخلفية اطول من الامامية || تألف القابات والحراج . تسلك الاجمار بقة . قوما الحشرات والقوديات والفوزغ والقرنثان || اعرف اجناسها واشهرها الطويكوكية .

١٧٣٩٦ - طوباب مهذب \*

Dolomedes fimbriatus (S). Dolomedes franqé (F). Long-legged spider (E). Gartenachspinne (D). نوع من العناكب القانصة الساعية ثنائية الروايا سلبية المشانق ينتمي الى فصيلة العنكبوتيات . جسمه متوسط القد بطول نحو ١٨ سم . عند الذكر ونحو ٢٤ سم . عند الانثى . صدراها اعليجلي الشكل ، اصعب اللون ، اغير التشوش عينا زيمتان ، شيفاه ضليخان ، عديا الغلاف . فكاه مستطيلان . جزامه قوية ، نضيفة ، مبررة الحلب . بطة مستطيلة الشكل البيضي ، حلي الاذن ، اسمر الحلي ، يملو تشوش ابيض واسود وحار مهذب الحبر || يال المنافع والاحوار . قوما الحشرات الحليانة . يسرح في التبار . عكبه كالجارب ونسجها تحت الحجارة في مكان قصه || ملجئه الحلياني لا يختلف من ملجين سائر العناكب .

١٧٣٩٧ - طوباب Fourrage débine (F).

اليسير من الكلاء . Straits fodder (E).

١٧٣٩٨ - طوباب

حشائش مرة كانت تأكلها اليهود في القصح . (السلان) .

١٧٣٩٩ - طوباب

Pimelopterus tahmal (S). Pimelode (F).

سمكة بحرية مأكولة من متنوعات الثنائات وفصيلة السلوريات . توجد في مطر البلاد الحارة . تتميز بزاية شكلها ، بقصر رأسها المقطوم ، بكثرة طبقاتها الفكية وباستطالة بطن حشائش الزمنية كما يبدو في الرسم . وهي عادمة الانسان ، خلية النظام الفكية .

١٧٤٠٠ - طوباب

Chaunilia (S). Chaunilia (F).

جنس حيوانات برية من الرغويات مديات الاربعيل وفصيلة الحارويات . انواعها المعاصرة المعروفة نحو ٢٠٠ متقرة في جميع الاصقاع الحارة والمعتلة الحارة || اصداها صغيرة القد وشبهية الشكل المستطيل . اطولها تراوح من ٨ الى ٢٠ سم . تعيش في المواق الرطبة وقرب المنافع ويجاري الماء . قوما المواد النباتية .

١٧٤٠١ - طوباب

Scatophaga (S). Scatophaga (F). Scatophaga (E).

جنس حشرات قانصة من فصيلة الطويكيات وربة ذوات الجنانين . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في مطر اقطار العالم || اجسامها هياض تطول من ١٢ الى ٢٢ سم . رؤوسها كبيرة . ميزنا ناضرة ، متباعدة عند الشقين . قربها الاستعمارية شديدة القصر لتتبي بسيلة دقيقة . اعطائها ضليخة ، ثائية . كولها بطونها متكافئة الحلب . رواشها ملية . قوائمها نضيفة ، مبررة الحلب . اوبها ملية ، اجسامها الحلي || الحشرة الجملانة قانصة . البرقة نائلة وواجبة .

١٧٤٠٢ - طويكيات \* Scatophagidae (S).

Scatophagidae (F). Scatophagidae (E).

فصيلة حشرات من ربة ذوات الجنانين . اجناسها وانواعها المعروفة كثيرة البدن ، منتشرة في مطر اصقاع العالم . جميعها من القباب المنافع الحام || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٤ سم . رؤوسها شبه مكوكة . ميزنا



طوباب



طوباب



طوباب

## Phase

١٧٤١٧ - طور - Brebis (F), Ewe (E).

١٧٤١٦ - طوبانة

هي النجدة . ج. طوبانات . ولا يقال لكيش طوبال .

## Disphase

١٧٤١٨ - طور انفصالي

١٧٤١٩ - طوبنة هي الاقنوص ، اظلمه .

Geopelia (S).

١٧٤١٩ - طوراني \* ، طوروي

Géopélie, Pigeon-épervier (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من فصيلة الحماميات . يتميز بصفرة ريشه وشكله واستطالة أظفره المتراصة الريش . قوته إلى الصخرة المخططة والمؤنثة بالأسود || موطنه الشرق يألف القتالي والحقل والمزرعة . اشرابه صغيرة . يروح عدد أفرادها بين ١٢ و ٤٠ . قوته الجيوب والبلور . يند في الجبال والادغال القليلة الارتفاع . انشاء تبيض بيشتين على مرتين في السنة .

١٧٤٢٠ - طورانية \*

Toranix gloriosa (S).

١٧٤٢٠ - طورانية \* Toranix glorieuse (F).  
دوية من التناكب الساعية القانصة ، ثنائية الرواية سداسية المشان تنتمي إلى فصيلة الجاهيات . موطنها بعض المناطق الاستوائية من العالم القديم . تسرح في النهار . قوتها الحشرات الصغيرة || جسمها صغير القند بطول نحو ١٥ سم . عند الذكر وهو ٢٠ سم . عند الانثى . صدرها مستدير الشكل ، سطلي اللون ، اسمر المزاج . جناحا زغبتيان . فكها صغيران . جرابها كبيرة ، كثيفة الحلب . يطها يضيء الشكل ، اسمر اللون منقط بالاحمر كالجملاز || لسمها مؤذية تسبب بعض السموم .

١٧٤٢١ - طوروي \*

Corythax, Turacus (S).

Toursaco (F), Turacus (E).

جنس طير من فصيلة الموزيات . اصله البلاد الافريقية الحارة . أنواعه المروقة قليلة العدد . جميعها آكلة . اجسامها تطول من ٤٣ الى ٤٧ سم . ألوانها جميلة الألوان القامعة . متغيرها صغيرة ، غريبة الشكل ، شاذة الخطم العليا المحفوفة الطفاف . رؤسها حشوة بفتاح غشوية الشكل || احرف انواعه واشهرها الطورق الازرقاني .

١٧٤٢٢ - طوروي أزرقاني \*

Corythax Buffoni, Turacus perris (S).

١٧٤٢٢ - طوروي أزرقاني \*  
Toursaco pourpre, T. bleu (F), Purple Turacus (E).  
نوع من الطيور . اصله تشتمل على مناطق افريقية الجنوبية . يألف الاجراع والقابيات والباحس حيث تكثر الثمار والحبوب البرية || جسمه بطول نحو ٤٧ سم . قوته إلى الحصار الازرقاني المزاج . جناحه مخططة بالاحمر الازرق والازرق والاحمر والاسود . ذنبه إلى الزرق العاقبة الخضراء المزاج . قزخته خضراء القانصة والزرق الاول ، ينفسجية الزرق الثاني ، حمراء الثالث والاربع || يند في تجاويف الاشجار القديمة المهم . انشاء تضع أربع بيضات تحضنها بمناوبة الذكر || قوته الثمار البرية والحبوب . يعيش في التجمع اما يربط في الموائل الظليلة . قوته في الاسر يرتكز على الثمار البانئة والرز المسلوخ والتجز المجل بماء السكر .

١٧٤٢٣ - طوس \*

Pulillation (F).

١٧٤٢٤ - طوس هو الجبان الحبيبي ، اظلمه .

١٧٤١١ - طوبين Talpa (S), Taupe (F), Mole (E).

١٧٤١١ - طوبين  
جنس حيوانات من آكلات الحشرات وفصيلة الطورينيات انواعه المروقة ١٠ موطنها العالم القديم . اشهرها العلويين الجلود او اظلمه الاروبي . جميعها جامة تعيش في انفاق ورداء تخدعها على احوال مختلفة تراوح بين ٣٠ و ٧٠ سم . اجسامها مكملة اسطوانية تطول من ١٢ الى ١٥ سم . رؤسها رشيقة تلتهب بفتافيس صفية . عينها خريزة صغيرة . اذانها المخاربية طامسة . اذانها جلع تطول نحو ٢ سم . ايها صغيرة مستعرجة خلمية الاصابع المهزجة بالانفار القوة المستطيلة الليرة . ارجلها صغيرة القند والاطراف || انثا تحمل مرة في العام وتضع من جبرين إلى خمسة جراء || يكثر العلويين من الحيوانات المؤذية لانه يقضم كل نبات يترى طريقه في التصري من الحشرات وهو يسرح اربع مرات في النهار عند الصباح وعند الساعة الثامنة وعند الظهر وعند الغروب || يكافح باستعمال الفم والفخار والمصايد والعظم للسم .

١٧٤١٢ - طوبين امريكي \*

Scalops parvus (S).

Scalope de Floride (F).

١٧٤١٢ - طوبين امريكي \*  
حيوان لبين ساحر جاس من فصيلة الطورينيات . اصله بعض مناطق الولايات المتحدة انحصار فلوريده والتكساس || جسمه صغير القند كرم بطول نحو ٢٠ سم . رأسه كبير الجرم مستطيل القند الذي يغير شكله الزبابية . عيانه غزيرتان . اذناه مساحتان ، طمستان . يدها قصيرتان غليظتان مغطيتا بالاصابع المهزجة بالظفر قوية . ذنبه شديد القصير عادم الور . قوته إلى السمرة المابقة باستثناء لة الرأس ومفك القوائم فانها إلى الدرة الصفراء || يعيش تحت الارض في انفاق تخدعها على احوال متغيرة تنور انحصارها ٤٥ سم . قوته الهدان واساريم الحشرات ويرقاتها وراذن النمل والشنق ... || الانثى تحمل مرة في العام وتضع من جبرين إلى ثلاثة جراء .

١٧٤١٣ - طوبينيات

Talpidae (S).

Talpidés (F), Talpidae (E).

١٧٤١٤ - طوبن Talpidae (S).

Tota (F), Grivet (E).

١٧٤١٥ - طوبن Talpidae (S).

Tota (F), Grivet (E).

١٧٤١٥ - طوبن Talpidae (S).

Talpidés (F), Talpidae (E).

١٧٤١٦ - طوبن Talpidae (S).

Talpidés (F), Talpidae (E).

١٧٤١٦ - طوبن Talpidae (S).

Talpidés (F), Talpidae (E).

١٧٤١٦ - طوبن Talpidae (S).

Talpidés (F), Talpidae (E).



طوبين امريكي



طوراني



طوبانية



طورق لارجواني

١٧٤٣٨ - طوقك

أرض مستديرة سهلة بين أرضين غلاظ .

١٧٤٣٩ - طوقريون ، طوقريون

Teucrium (S), Germandrée (F), Germander (E).  
جنس نباتات برية و زراعية تزيينية من فصيلة الشفويات  
أزواجه نحو ١٠٠ معظمها عشبي لكن معمر شائع الاستعمال  
الطبي . منافع عديدة يزيل السعال ويقي السعال . وهو  
مر الطم ، حار ومو ، يفر الصفراء ويقي الاصاب  
ويقي على الديدان || أوراثة متعاقبة مفرقة كثيرة  
التشريح . أزهاره ابيض غنطلة الالوان || أشهر أزواجه  
ما يلي .

١٧٤٤٠ - طوقريون أصفر ، عشب الطحال

Teucrium flavum (S), Germandrée flavescens, Pouillot jaune (F), Yellow germander (E), Gelber Gamander (D), Camendrio giallo, Querciola maggiore (I).

عشبة برية معمرة تملو نحو ٤٠ سم . ساقها فروصا  
متنصبة زياها العلما . أوراقها كبيرة مفرقة وسنة التصل  
الحمل البشرة حل صفحية . خلل أوراها وزنب خساء  
فروصا وساقها يبيض اللون ، صفر المراج . أزواجه  
روسية التجميع ، حامية الإزكاك ، صفراء اللون .  
أزهارها يستمر من حزيران الى آب || يقال انها تنفي  
أكثر حال الطحال .

١٧٤٤١ - طوقريون إكزيري ، بكلك العرف

Teucrium creticum (S), Germandrée crétoise, Pouillot de Crète (F), Cretan germander (E), Cretischer bergwandell, Ysop-Gamander (D), Camendrio di Crète, Querciola di Crète (I).

عشبة برية طيبة معمرة مهادا الشرق الأوسط . يقال انها  
من النباتات النافعة النافطة . تملو نحو ٨٠ سم . ساقها  
فروصا متنصبة . أوراها تطول نحو ٤ سم . وتعرض نحو  
٦ م . أزهارها بنفسجية اللون ، فردية أو ثلاثية التجميع .  
أزهارها يستمر من أيار الى تموز .

١٧٤٤٢ - طوقريون جبلي

Teucrium montanum (S), Germandrée de montagne, Pouillot de montagne, Thym blanc (F).

عشبة معمرة تملو من ١٠ الى ٢٥ سم . ساقها فروصا . فروصها  
غنطوية ، غنطية ، مستديرة الاعوجاج . أوراها لافقة ،  
ضيقة التصل ، خيراها الصفحة السفل . أزهارها يضاء  
اللون ويلوحا موانج اصفر || أزهارها يستمر من أيار الى  
آب .

١٧٤٤٣ - طوقريون شرقي

Teucrium orientale (S), Germandrée d'Orient (F).  
عشبة برية وتزيينية معمرة تملو من ٣٠ الى ٥٠ سم . ساقها  
فروصا متنصبة . أوراها غنطية التفريضي . تصلها يادت  
الحصار ، خلي البشرة . أزهارها متفوية التجميع ، زرقاء  
اللون || أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٧٤٤٤ - طوقريون كبير ، طوقريون ليبي

Teucrium fruticosum (S), Germandrée ligneuse (F).  
جنت تزيينية تملو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . فروصها  
نباتية متباعدة . أوراها ممتدة مستطيلة . تصلها بارز  
السوق والثرانين ، أزغب الصفحة السفلى . أزهارها  
كبيرة الله ، زرقاء اللون ، أزهارها يستمر من شباط الى  
حزيران || هي من النباتات المجردة التي ترعب في بعض  
الآربة للمدينة والمواقع الخاصة .

Châtré (F).

To castrate, To geld (E).

انزع الحصبين في ذكور الحيوان .

١٧٤٣٦ - طوشاء

Asandra, Anandraire (F).  
الطعام كل زهرة عاصمة الجهاز الذكري .

١٧٤٣٧ - طوشن ، مكشوش

Chapon (F).  
فرخ اللجاج الفضي . ج طوشن وسقايش .

١٧٤٣٨ - طوط

Epervier commun (F).  
هو الباشق المعروف ، اطليه .

١٧٤٣٩ - طوط

هو القطن او قطن البردي .

١٧٤٣٠ - طوطانيات

Toutiens (F).  
حماره من فصيلة ذبابيات الارض . اجناسها وانواعها  
مدينة جميعها من الفواضع الصغيرات الله . أثوابا منقطة  
مرقطة ، قطبا اهلجية الشكل . متاثيرها دقيقة نصفية  
التعبد . ارساغها غنطية || تألف مجاري الماء وضطوط  
البحار والواهار . قوتها الديدان والحشرات والرسويات  
والفقرليات || تدش في الاشجار وبين الاعشاب وعلى  
التراب . الاث تبيض نحو ، يضاء تحضها سحبا  
من ١٧ الى ١٩ يوم || أشهر اجناسها الطيطوي والقزاع  
والقنص .

١٧٤٣١ - طوطي

هي البهنا (من ابي حامد الغزالي).

١٧٤٣٧ - طوشي

Spontané (F), Spontaneous (E).  
نعت ترميني يطلق على كل نبات يتكاثر تلقائيا في تربة  
معينة والمقيم عمود .

١٧٤٣٣ - طوشية

Spontanéité (F).  
صفة ما هو تلقائي .

١٧٤٣٤ - طوطي

Fretin (F), Fret (E).  
اطار من حديد يطوق بعض الاشياء لمنع تصلعها . واطوق  
هو حاويل التخل الذي يستعمل في الصيد البيا .

١٧٤٣٥ - طوقان

le Toucan (F), the Toucan (E).  
الطوقان كوكبة نجم جنوبية الموضع تشبه بشكلها طائر  
الطوقان || عدد نجومها ١٤ جميعها من المرتبة الخامسة  
وما دونها .

١٧٤٣٦ - طوقان

Rhamphastos (S), Toucan (F).  
جنس طيور امريكية مستهجنة الشكل . موطنها البرازيل  
والغويان وبولارها . اجسامها كبيرة الله طولها يراوح بين  
٥٠ و ٧٠ سم . أثوابها غنطية يكثر فيها السواد اللامع .  
اعتناها وعاسرها يبيض . أذناها حور الالوانيك . متاثيرها  
خليلة الشكل ، كبيرة الحجم ، وردية اللون ، سود البهرة .  
تألف الذنابات وتدش في صلوح الاشجار . قوتها البار  
والحشرات والفروع .

١٧٤٣٧ - طوقانيات

Rhamphastidae (F), Rhamphastidae (E).  
فصيلة طير من المستنقعات . اجناسها وانواعها مدينة تميز  
بشكل متناقضا اللطيفة المصنوعة . اصطناعا البلاد الحارة  
والاستوائية . احرف اجناسها واشهرها الطوقان .



طوقان



طوقريون اصفر



طوقريون اكريني



طوقريون جبلي



طوقريون شرقي



طوقريون كبير

## ١٧٤٥١ - ملقون نكتات

Dendroplex picus (S).

Talipot-pic (F). Talipot-pic (E).

نوع من الطوب. طائر من فصيلة الطولييات. موطنه معظم المناطق القريبة من أمريكا الجنوبية. يألف الغابات والرياض حيث تكثر الديدان والاساريع والحشرات || جسمه مثلث القد بطول نحو ٢٢ سم. يتميز بمقناده الجالس كالحرية المستقلة الطرف. ثوبه الى القطعة السوداء يملؤها تجلجج معترض اسود في الجناح والذنب وريشة سوداء في الصدر. صدره وبطنه وزنكاه الى الشقعة السوداء. حلقه عينه الى الزرقاء. مقناده وساقاه الى السرة الباقية || يتسلق الاشجار من الصباح الى المساء وينكت القشور والقحاء في طلب الديدان والاساريع || يذلل منه في تجاريف الاشجار. الاثنى تقسم من يمشين الى ثلاث بياضات بحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

## ١٧٤٥٢ - ملقونيات

Dendrocolaptidae (S).

Dendrocolaptidae (F). Dendrocolaptidae (E).

فصيلة طير من الجوارثم المثلقات يقبضات المناظير. اجناسها وانواعها المعروفة نحو ٧٠ موطنها بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والرياض والاسراج الجبلية. قوتها الحشرات واساريعها || اعرف اجناسها واشهرها الطوب والقضاب.

## ١٧٤٥٣ - ملقونق ، طرقة

Torreya (S).

Torreya, Torreya (F).

جنس اشجار حرجية من الطقسيات. انواعه عديدة مهددا الشرق والبلاد الامريكية. اجناسها متوسطة القد دائمة الخضار. غراحيها متعاقبة ابيدة. اوراقها حرة ثنائية الصف. مثقبة ، احليلية، ذرية. تصلها جامد التسج. شائك القصة ، حايق الخضار، تحطط الصفحة السفلى. اشهر انواعه مايل.

## ١٧٤٥٤ - ملقونق جوزي القصر

Torreya nucifera (S). Torreya à noix (F).

شجرة سروية حرجية وزينية بطيئة النمو. مهددا اليابان تملن من ٧ الى ٢٠ م. غراحيها تدور خضراء اللون ثم تنحرف الى الجرداء. اوراقها شديدة الخضار النابك اللامع. مسام تصلها عند فركها نحر رمي المواد العنينة الكريكة الرائحة || ثمارها جوزية القد والشكل، لونها الى الأخضر المنش بالابيض تقطيه بعض الحلووط الحمر.

## ١٧٤٥٥ - ملقونق زربني الورق

Torreya taxifolia (S). Torreya à feuilles d'if (F).

شجرة حرجية جادسة مهددا اسراج فلوريدا من اعمال امريكا الشمالية. تملن من ٧ الى ١٠ امار. غراحيها شديدة الخضار. اوراقها زربية الشكل ، ابرية المقعدة، فواصة الرائحة الكريكة.

## ١٧٤٥٦ - ملقونق كبير

Torreya grandis (S).

Torreya grand (F).

شجرة سروية حرجية وزينية ، بطيئة النمو ، مهددا الصين. تملن من ٢٠ الى ٣٥ م. غراحيها فسقية اللون. اوراقها تطلو نحو ٤ م. تصلها لاح الصفحة السفلى المستقيمة اللون ، باعث السفلى المعتدلة الخضار ، ثمارها بيضنة الشكل، صفراء اللون تطلو نحو ٣ م. وتعرض نحو ٢.

## ١٧٤٥٥ - ملقونون كوربي \* ، ماروم ، صمتر

الحمر ، صمتر مسمخور

Teucrium marum (S). Germandrée ambrée, G. maritime, Marum, Thym aux chas, Herbe aux chas (F). Marum-germander, Cat thyma (E). Katzen-gamander, Katzenkrut (D). Camendrio maritimo, Maro (I).

بجلة برية طيبة ومصرة صغيرة القد ، ساقها فناء تملن نحو ٥٠ سم. اوراقها مثقبة بيضية الشكل تطلو نحو ١٠ سم. تعرض من ٢ الى ٥. تصلها رسيد العرق. خلي البشرة التينية اللون. ازهارها ابيلة الازكاز ، فردية او ثنائية التجميع. لونها الى الزرقاء الباهتة || ازهاره يستمر من ايار الى آب.

## ١٧٤٥٦ - ملقونون عذري \* ، عكمدادون

كمدادون

Teucrium Chamandrys (S). Germandrée officinale, G. petit-chêne, Petit-chêne (F). Common germander, Ground oak, Wall germander (E). Echter Gamander (D). Camendrio officinale, Germandrie, Querclois (I).

عشب طيبة مصرة تملن من ١٠ الى ٣٠ سم. ساقها خيالة مسطحة. اوراقها مفردة ومثلثة. تصلها خلي الصفحة السفلى. ازهارها فسية التجميع ، هامة الازكاز ، حراء اللون || ازهارها يستمر من ايار الى ايلول. مثلثها القلبية عديدة راجعها في مادة ملقونون.

## ١٧٤٥٧ - ملقون البتولا \*

Theda betula (S). فرائض من فصيلة القنليات طولها نحو ٣٨ م. ذكرها اسمر الجسم، اسهب الراوش الموجهة والمبقجة بالاحمر والاصفر والخلقي. انتاها كستنية الجسم والراوش يملونها في روثنها الايامين ببقية حراء صناعية || يسرح من آب الى ايلول. يرقه تركب اوراق البتولا.

## ١٧٤٥٨ - ملقون السينديان \*

Theda quercus (S).

فرائض من فصيلة القنليات طولها نحو ٣٤ م. ذكرها حنطي الجسم، اثير الصدر ، بنفسجي الراوش المثلثة بالاسمر. انتاها حنطية الجسم خراء الراوش المسجبة بالاسمر والمثلثة بالاحمر والاسود || يسرح من حزيران الى تموز. يرقه تركب اوراق السينديان.

## ١٧٤٥٩ - ملقون

قياس درجيات طول الامكة. عماده قوس خط الاستواء القاتم بين هاجرة الملق والمجرة الاصيلة.

## ١٧٤٥٠ - ملقون \* ، ابلو ساق

Himantopus (S).

Echasse (F). Stilt (E).

طائر من طول الساق القواطع. طوله نحو ٤٠ سم. مقناده جالس، مستطيل، اسود. ساقاه خادتا الطول جزويتا اللون. قنته وظهوره يسقط الى السواد اللامع يملونه موج اخضر. عنقه وصدره وبطنه وذنبه الى البياض التي يكتشفه موجا وردى || يرئاد الملقن والقطاير البحرية. قوته الحشرات والقشريات والرخويات والديدان || يقطن حته في المائعات بين الاحشاب يدبر اقصوصه في المواق التي تنمراها المياه. انتله تقسم من ٣ الى ٤ بيضات تحضنها وسدها نحو ١٧ يوما.



ملقونون كوربي



ملقونون عذري



ملقون البتولا



ملقون السينديان



ملقون



ملقون

وسيط اللبنيات . انواره المعروفة ٦٥ مظلمها من نباتات للناطق الاستوائية . بعضها يغل مأكلي الارواق والاخر صناعي يستخرج منه صباغات صفر ، او طوي يدخل في عدة تركيبات صقلية . اوراقه كبيرة لثمة . انواره فريدة التجميع ، محورية الزنكاز .

**١٧٤٦٢ - طَوَيْتَات** *Didipodées* (F).  
سبط من الاقتنيات اجناله وانواره عديدة جميعها من نباتات الناطق الاستوائية مظلمها اعشاب سولية وعشيرة صغوية . لثمة ، متدلة الارواق ، جملة الازهار قليلة العدد . لشهر اجناله الطويلة .

**١٧٤٦٣ - طَوَيْت** هي الاثيرة ، الحليج . ج. الحوا .

**١٧٤٦٤ - طويل الأرجل** *Macropoda* (F). *Macropodous* (E).  
نمت تعريف يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

**١٧٤٦٥ - طويل الأصابع** *Macrodistyle* (F). *Macrodistylus* (E).  
نمت تعريف يطلق على الحيوانات المستطيلة الاصابع .

**١٧٤٦٦ - طويل الذئب** *Macrocerus* (F). *Macrocerus* (E).  
نمت تعريف يوصف به كل فريدة او حشرة مستطيلة الذئب او السرك .

**١٧٤٦٧ - طويل الذئيل** *Macroure* (F). *Macrourous* (E).  
نمت تعريف يطلق على الحيوانات المستطيلة الذيل .

**١٧٤٦٨ - طويل الرأس** *Dolichocephale* (F). *Dolichocephalic* (E).  
من نموت تصنيف الشكل في الحيوانات اللاحية .

**١٧٤٦٩ - طويل الرنح** *Long-jointed* (F). *Long in the pastern* (E).  
هو في الخيل صفة الرنح الطويل الذي يقرب الحوض من الخضيس . وقد يتجر من عيوب جبال السبق .

**١٧٤٧٠ - طويل الزمان** *Macrochre* (F). *Macrochrous* (E).  
نمت تعريف يوصف به الحشرات المستطيلة الزمان .

**١٧٤٧١ - طويولات الأرجل** *Macropodidae* (S). *Macropodidae* (F). *Macropodidae* (E).  
فصيلة حيوانات من الجربيات . اشهر انواعها القنقر .

**١٧٤٧٢ - طويولات الريش** *Longipennis* (F). *Longipennates* (E).  
مرتبة من كثرات القدم تشل بعض الطيور المائية الكبيرة الجثة ، المستطيلة الريش والقوية الطيران كرجع الماء والقطرس والحرشة .

**١٧٤٧٣ - طويولات الساق** هي طوال الساق ، الحليج .

**١٧٤٧٤ - طويولات المنكار** *Longirostre*, *Longirostral* (F).  
نمت تعريف يطلق على الطيور المستطيلة المنكار .

**١٧٤٧٥ - طَوَيْت** ، **مُتَبَقَر** *Volati* (F). *Volatile* (E).

## ١٧٤٥٧ - طَوَيْت كَيْفُورِيَّة

*Torreya californica*, *T. myrsinica* (S). *Torreya californica* (F).  
شجرة سبروتية سرجية وتزيينية مهددا احراج كليفورنية من اممال امريكية الشمالية . تملو من ١٠ الى ١٤ م . خراصها بحجرة الخشار . اوراقها تقطع نحو ٧ سم . وتفرس نحو ٣ سم . نصلها جلد السنج ، اسود القصبة الاربعة الشاكلة . حاقب الخشار حل صفحته العليا ، بحري الصفحة السفلى ، انماذ الرائحة اللانسجية || ثمارها اسطوانية تقطع نحو ٥ سم . قطرها ٣ سم . ينما الى الخشار الزاهي تملو مشمة حطية تتخللها خطوط ارجوانية .

## ١٧٤٥٨ - طَوَيْتَة التَجِيلِيَّات \*

*Tholera capitis* (S). *Tholera capiteus* (F). *Tholera capitis* (E).  
حشرة متراكبة الحراشف والرتب من فصيلة النسيجات وربة حراشيات الاجنحة . موطنها بين من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها واسعة قوتها منفر الازهار . مرتها تميل على التجيليات || جسمها متوسط اللثمة يطلو نحو ١٨ سم . يستط نحو ٤١ سم . رأسها متدل الجرم ع كتي الين . صياها كيرتان . زباناها مشطيان عند الذكر ، غيطيان عند الانثى . حوتها كتي الين . بطنا حلي الين ، كتي الحلي || ورشها الاماميان الى الكتي الحلي المطول تملو زراكتي وضبوط متفرعة غصنها يراوح من الجوزي الى الحلي . ورشها الخلفيان الى الحلي الاثخن طمو موج ردي يسمر عند الاطراف || لها جيل واحد في الحلي . تقطر القراشة في حموز وثقي حتى ايلول . تسرح في اليل . تتاطل بعد ظهورها بنحو ستة اصابع وتتمك المنك للتحا مل الصفحات السفلى من نصال الازهار || الصلة تقطع نحو ٤٢ سم . جسمها اسطواني الشكل ، مشدود القشار . قوتها الى الصرة القاعة يعلوها موج اسمر وضط ينجي اسود وضطان جانبيين من كل جهة . رأسها جوي الين . منها الى الصرة . وادباي سوب || طور الاكمال يمتد نحو ثلاثة اصابع وينقضي في القربة ضمن جلباب من الين .

## ١٧٤٥٩ - طَوَيْس \*

*Thomomys* (S). *Thomomys* (F). *Thomomys* (E).  
جنس حيوانات لبونة فاضمة جاسة من فصيلة الجروسيات . انواعه المعروفة ٢٦ موطنها البلاد الامريكية . قوتها لمواد النباتية . تميل كالكلة تحت الارض في اتفاق مستطيلة متفرعة تنتهي باجاص قسيمة لا يقل عمقها من ١٥٠ سم . || اجسامها صغوية ، مكرومة ، تقطع من ١٣ الى ١٧ سم . واذنانها من ٥ الى ٦ سم . رؤوسها مستطيلة ، شبه مخروطية الشكل ، مغلفة المقاص . عينها خروزة شديدة الصر . اذانها لاطية . جرابها قصيرة . اصابعها نسيطة الاظافر المغوصة الحادة . اوتارها تراوح من الركة الباحة الى الطعلة الصمراء || انماها سداسية الاطباء ، تقص من مرتين الى ثلاث مرات في الحلي . تنابها من ٤ الى ٦ ادراس .

**١٧٤٦٠ - طُون** *Tonne* (F). *Tun* (E).  
وحدة وزنية قديما يساري ١٠٠٠ كيلوغرام .

**١٧٤٦١ - طَوَيْتَة** *Didipera* *bi-valvis* (S). *Didipera*, *Herbe dianthère* (F). *Balsam herb* (E). *Balsamkraut* (D). *Didipera* (I).  
جنس نباتات عشبية برية وزراعية من فصيلة الاقتيات



طويلة التجيليات



طويس

الاشي مكها في فصال الاوراق فينتف من يرقات دقيقة حراء الون كسروب التصال ويقيم فيها حتى الاكمال .

١٧٤٨٦ - **طيفار الشونان** \* ، **ميسيل الشونان** \*  
Mayetiola avenae (S). Cécidomyie de l'avoine (F).  
حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح من ٤ الى ٥ م . نوبا  
الى الزهرة ويلعها مولج جزوي || رقاتها تركب الشونان  
وتقتل فيه قبل البشار اللبيد في القمح والشيلم .

١٧٤٨٧ - **طيفار الصنوبر** \*  
Cécidomyie pini (S). Cécidomyie du pin (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول  
من ٢ الى ٣ م . رأسها مكور ، شديد السمرة . عيناها  
زيتانية . زباناها غيطلية ، مستطيلة . صدرها الى  
السمرة الجوزية المواج . بطنها الى السمرة الحماوي المواج .  
زغبها الى العرة النضية . وراثها قسطانيا الون . قواها  
مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط نيسان الى  
اواخر حزيران . تألف حراج الصنوبر . تمتع الاش  
مكها في القشور قرب التنبات التي يسيل منها الرايح .  
البرقة برقالية الون تمش على المواد الخشبية والراتنجية  
حتى الاكمال .

١٧٤٨٨ - **طيفار العوسج** \*  
Lasioptera rubi (S). Lasiptère des ronces, Cécidomyie des ronces (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر يطول  
من ٢ الى ٣ م . رأسها مفلطح . عيناها زيتانية . زباناها  
عيطيان . صدرها اصفر تعلو ثلاثة خطوط سود متعومة  
القاعدة . بطنها يرمي الشكل اخضر ، تعلو ستة خطوط  
مزعومة . رزها مستطيل . وراثها صيران ابيضان .  
قواها مستطيلة || تظهر الحشرة الجملانة من ايار الى  
تشرين الثاني . تألف المواق التي يكثر فيها العوسج ||  
تمتع الاش مكها على المسالج فينتف بعد عشرة ايام  
من يرقات بيضاء الون تبقى مجمعة حتى الاكمال تفرغ  
القشور وتعلها .

١٧٤٨٩ - **طيفار القمح** \*  
Mayetiola tritici, Contarinia tritici (S). Cécidomyie  
du blé (F). Wheat midge (E). Weizengalmücke (D).  
حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا من ٢ الى ٣ م .  
لونها الى الصفرة تمتع مكها حدة قاعدة سفا البر فينتف  
من يرقات تقضي عليه قبل تمام تكويته .

١٧٤٩٠ - **طيفار القنييط** \*  
Contarinia nasturtii, C. torquens (S). Cécidomyie  
du chou-fleur (F). Swede midge (E). Kohlgalmücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا لا يتجاوز ٢ م .  
نوبا فسفي الون . وراثها خلية . تركب القنييط في اول  
عده فتضع مكها على برعم القلب فينتف من يرقات  
تلتهم ثم تمرد الى الاوراق فتضك بها . اسيالها الحولية  
ثلاثة .

١٧٤٩١ - **طيفار الكرمية** \*  
Contarinia viticola (S). Cécidomyie de la vigne (F).  
Grape midge (E). Rebenblüten-galmücke (D).

حشرة من الطيفاريات صغيرة طويلا نحو ٣ م . نوبا  
اسمر الون يطو مولج اخضر . تمتع مكها على حشرات  
الكرمة (الحشرة هي الزمعة بعد الاكاف) فينتف من يرقات  
تقرض داخل الحشرات وتقضي عليها .

١٧٤٩٦ - **طيفار** \*  
Petrogonia (F). Petrogony (E).  
الطيامة نظرية بيولوجية فصولها ان كل جنس حيواني ير ،  
في تكويته الجنيني ، بمراحل نمازية متسلسلة الظواهر  
التبائية تقيد في نهاية المطاف الى الشكل المختار .

١٧٤٩٧ - **طيفار** \*  
Parfum (F). Parfume (E).  
كل ذي رائحة صطرة فواحة مستمدة من الطور والادهان .  
ج اطياب وطوب .

١٧٤٩٨ - **طيفار العرب** \* هو الاذخر ، اعطيه .

١٧٤٩٩ - **طيط** \*  
طائر من طول الساق يعرف بالي طيط ، اعطيه .

١٧٤٨٠ - **طيط متوج** \*  
Vannus huppé (F).  
واجس ابر طيط متوج .

١٧٤٨١ - **طيفار** \*  
Cécidomyie (S).  
جنس حشرات شارة من فصيلة الطيفاريات انولاه جديدة  
جميعها صغيرة اللد تمتع مكها على التبات فينتف من  
يرقات مؤذية تسبب الكثير من الاضرار || اشهر انولاه  
واشدا اذى ما يتبع .

١٧٤٨٢ - **طيفار الاجاص** \*  
Contarinia pyriovora (S). Cécidomyie des poires (F).  
Pear midge (E). Birnengalmücke (D).

حشرة من الطيفاريات طويلا يراوح بين ٣ و ٤ م . رأسها  
اسود . زباناها غيطلية حطية تتألف من ٢٩ فاصلة .  
جوشها اسود يشوبه مولج فضي . اربطها حطية زياه .  
انها تمتع مكها في زهرة الاجاص فينتف من يرقات تلم  
السمرة أثناء نموها فتسود وتمتص || اضراره قد تكون  
كثيرة في الانواع الباكورية . يكافح باستعمال احد  
الحواشير القمالة غير المركزة على التماس .

١٧٤٨٣ - **طيفار البنفسج** \*  
Perrisia affinis (S). Cécidomyie des violettes (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد ، حطية الون ، زياه  
الجسم . تركب اوراق البنفسج فتضها وتمنع مكها على  
صفحاتها السفلى فينتف من يرقات دقيقة غبراء الون  
تلتهم التصل فتؤدي لتنبات وتضع الازهار بعد ان تسبب  
قلها .

١٧٤٨٤ - **طيفار التفلب** \*  
Perrisia cenophila (S). Cécidomyie des feuilles de  
vigne (F).

حشرة من الطيفاريات صغيرة اللد سمراء الون تركب غلب  
الكرمة فتضع مكها في البروق فينتف من يرقات دقيقة  
نحيلة لونها الى الصفرة تمش تحت البشرة على حبيرات ونسج  
البروق .

١٧٤٨٥ - **طيفار السينديان** \*  
Lestremis leucophaea (S). Cécidomyie du chêne (F).

حشرة من فصيلة الطيفاريات . جسمها شديد الصغر ،  
يطول نحو ٢ م . نوبا الى السمرة الصفراء المواج .  
رأسها مكور . عيناها زيتانية . زباناها مستطيلة .  
ملاسه رباحية الاجزاء . قواها مستطيلة . وراثها  
صيران ، غضبان || تظهر الحشرة الجملانة من اواسط  
نيسان الى اواخر ايار . تألف حراج السينديان || تمتع



طيفار الاجاص



طيفار البنفسج



طيفار الشونان



طيفار القمح



طيفار القنييط



طيفار الكرمية

## ١٧٩٧ - طيشّار مُبيد \* ذُبَابَة هيس

*Mayetola destructor* (S). *Cécidomyia destructiva*, *Mouche de Hesse* (F). *Hessian fly* (E). *Hessen fliege* (D).

حشرة من الطياريات. طولهاراوح بين ٢ و ٤ م. ثوبها الى البطة السوداء. يطنها الى الحشرة. زباناها مركبة من ١٤ فاصلة || تركيب اللسان والظفار والقيصر: تظهر في نيسان ثم تنجح مكها في حلف الزرع فيقتل من يرقات دقيقة تلمن النصل وتتجه نحو الكمية حيث تختص التسع ويتسبب ذبول الحلف والسيال.

١٧٩٨ - طيشّار ورق الاجاص (S). *Perrisia pyri* (S). *Cécidomyie des feuilles de poirier* (F).

حشرة من الطياريات صغيرة اللقد طولها نحو ٣ م. ثوبها الى السرة الخفية. تظهر في اوائل الربيع فتتركب اوراق الاجاص وتنجح مكها على مسحاتها السفلى فيقتل من يرقات تتحرك حته اطراف النصل حيث تعيش حسل الحشرات النامية فضطها وتقتنها وتثقل عليها الكثر يولتي الجوري. لها جيلان في الحول الواحد.

١٧٩٩ - طيشّاريّات *Cecidomyiidae*, *Iconiidae* (S). *Cécidomyiidae*, *Iconiidae* (F). *Cecidomyiidae*, *Gall gnats* (E). *Gallmücken* (D).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها المعروفة زهاء ٣٠٠٠ صنفها صغيرة اللقد. اجسامها مستطيلة رقيقة. ارجلها نحيلة وطويلة. قرونها الاستشرية قلبية الشكل ملحية، طولها في الذكر يقتصر في الاناث. يرقاتها دقيقة، صغيرة، مدبة الاطراف. منسجها خاسل وبعضها طفيل او مفترس. تعيش حسل للتجليات والافليات والركبات وبعض الاشجار والنباتات الفطرية. تنفضي على النجس المجهرية ويتسبب الاضرار في غثفل الاجزاء التي تصيبها كالثبرام والازهار والثمار والاوراق والسوق والجذور.

## ١٧٩٥ - طيشّر ، طيشور ، اُطيشّر

*Oiseaux* (F). *Birds* (E).

مفرد الطير طائر. والطيور صف حيوانات من الفقاريات. انواعها المعروفة زهاء ٢٥٠٠٠ تقسم الى ثلاث فئات او شص: (١) الجولجيات (٢) القرواكض او العواوي (٣) عديمات افرش.

اما رتبة ولصائلها، حسب التصنيف الحديث، فهي موضوع الجدل التابع على الصفحة التالية.

## ١٧٩٦ - طيشّر ، تسر طائير

*Alstyr* (F).

*Alstyr* (E).

الطير او لئسر الطائر نجم ثير من كوكبة العقاب. مركزه في رأس العقاب قبالة النسر الواقع من كوكبة القيثارة. يبعد من الارض نحو ١٦ سنة ضوئية.

## ١٧٩٧ - طيشّر العراقيب

هو الشترق ، امله.

## ١٧٩٨ - طيشّر البكّل

هو الخلفاش ، امله.

## ١٧٩٩ - طيشّران

*Vol* (F). *Flock* (E).

انتقال الطير وبعض الحشرات التي تسير في الفضاء بواسطة اجتمعا.

## ١٧٥٠٠ - طيشّرَة \*

*Myripristis* (S). جنس اسماك بحرية من فصيلة السيفيات القاتكات انولاه المعروفة قليلة العدد موطنها بحار المناطق الحارة انصها البحر الاحمر والخليج. اجسامها صغيرة اللقد طولها يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم. انثيا جميلة الالوان الزاحية لها الاحمر والازرق والوردي والاشهب والفضي.

## ١٧٥٠١ - طيشّر يّات

*Ornithologie* (F).

*Ornithologie* (E).

الطيريات او علم الطير جزء من علم المولدة يبحث في الطيور.

## ١٧٥٠٢ - طيشس

*Myriades* (F). *Myriad* (E).

الطيس العدد الحائل بكثرة.

## ١٧٥٠٣ - طيشسيّ \*

*Thalassophile* (F).

*Thalassophile* (E).

نمت ترمي ي يطلق على كل حشرة تعيش بعض اذار حياتها في البحر او في الماء الاجاج.

## ١٧٥٠٤ - طيشسل \*

*Pruine* (F). *Bloom* (E).

مادة عضوية لزجة مستطقة ناعمة تكثر القبار تقش بشرة الثمار والفطور وما اشبه.

## ١٧٥٠٥ - طيشّرَة \*

*Tischeria* (S).

*Tischeria* (F). *Tischeria* (E).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة. اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة. تألف المراج التي يكثر فيها السديان || جسمها صغير ، نحيل ، شبه اسطواني الشكل . بسطها نحو ١٠ م. رأسها مستدل الجرم يكسو بعض السيف. عنانها صغيرتان ، بارزتان . خطها صغير . ملمسها قصيران ، زباناها غطيان ، مستطيلان . اجنتها خفيفة ، لامسارية الاحادب . بطنها نحيل ، كثيف الخمل . ثوبها الى السرة التنية المواج || سرقتها خاملة تعيش على اوراق النباتات الحرجية . انصها السديان والمخلل.

## ١٧٥٠٦ - طيشّرَة مُمَكِّسَة \*

*Tischeria complanata* (S).

حشرة من فصيلة الطيشريات ورتبة حرشيات الاجنحة . اصطلحنا على مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تألف حراج السديان واكزان والفلص والمخلل || جسمها صغير اللقد . بسطها نحو ٨ م. رأسها مستدل الجرم . عنانها صغيرتان ، بارزتان . خطها ويلاسها قصيرة . زباناها غطيان . اجنتها خفيفة ، مدبة الاطراف . بطنها مكثف الخمل . ثوبها الى البطة السوداء المواج || سرقتها صغيرة ، دقيقة ، رقالة . تلمن نصال الاوراق وتعيش بين البشريين .

## ١٧٥٠٧ - طيشّريّات \*

*Tischeriidae* (S).

*Tischeriidae* (F). *Tischeriidae* (E).

فصيلة حشرات غراشية من رتبة حرشيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض القاطم البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة قصبية . رؤوسها معتدلة الجرم . ناعقاتها منتشرة بمضائف حشرية . قرونها الاستشرية عيطية.



طيار سيّد



طيرة



طيشرة

الطير: شعيا ورتيا وصالها (حسب التصنيف الحديث)

[illegible]





طيطن منير



طيطري احر الساق



طيطري اخضر



طيطري البتايح



طيطري البياض



طيطري سلفاني

ونبه يبيض . اياهم وقوامه وكلامه سود الحمار . منقاره احر الانتشاب جزوي للمطاط . سيقانه الى الاحمر القريزي || سر به قليل البعد من ٦ الى ١٢ . يأنف اللتلق وضفاف المياه العذبة . ينش منه بين اشحاب اللتلق .

#### ١٧٥١٤ - طيطوي اخضر \* تستاك

*Totanus ochropus, Tringa ochropus* (S). Chevalier *cul-blanc* (F). Green sandpiper (E).

طائر من الطيطوي موطنه حوض البحر المتوسط . يحوي طائر من الطيطوي موطنه بلاد الشرق واروقه وافريقية الشمالية والشرقية || يأنف اللتلق وضفاف المياه العذبة . ينش منه بين الاشحاب قرب الماء || ثوبه متركب الالوان الزاهية انضر للوراج . فتنبكه ناصع البياض . منقاره اسمر . سيقانه الى الخضار الزيتوني .

#### ١٧٥١٥ - طيطوي البتايح \*

*Totanus stagnatilis, Tringa stagnatilis* (S). Chevalier *stagnatilis, C. à pieds vorts* (F). Marsh sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٤ سم . رأسه وعينه الى الابيض الرمادي يطول تنطيط اسود مستطيل . طوره الى الرمادي الاحمر تطول رقة سوداء . صدره وبطنه واظفكه الى البياض الناصع تنخله رقة برء . بيضة . اياهم وقوامه ميلة . منقاره اسود . سيقانه الى الخضار الزيتوني . سر به من ٢٠ الى ٥٠ . يأنف اللتلق وضفاف الانهر والبحيرات . يسبح ويبيض . ينش منه في اللتلق فوق القراب . الفصوصه مستطيل الشكل قليل البعد .

#### ١٧٥١٦ - طيطوي البياض \*

*Totanus glareola, Tringa glareola* (S). Chevalier *syvalin* (F). Wood sandpiper (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٢٢ سم . ثوبه متركب الالوان مرطب || يبيض لزواجا متفرقة يتجمع الى اسراب عند الزرع . يأنف اللتلق وضفاف الانهار والبحيرات . ينش منه في الخللج وفي الادلغال .

#### ١٧٥١٧ - طيطوي سلفاني \*

*Totanus griseus* (S). Chevalier *gris, C. aboyeur* (F). Greyshank (E).

طائر من الطيطوي طوله نحو ٣٠ سم . ثوبه متركب الالوان الزاهية . طوره اسود الريش . ريشه جزوي الحمار منق بالابيض . رأسه وعينه غططان بالابيض بطنه واظفكه يبيضان . ذنبه مشوح بالرمادي الاسمر . منقاره اسود . سيقانه الى السمرة الخضراء || سر به بعد من ١٢ الى ٢٠ . يأنف ضفاف الانهر والبحيرات . ينش منه في اشحاب اللتلق فوق القراب .

#### ١٧٥١٨ - طيطيات

*Teuthididae* (S). *Teuthididae* (F). *Teuthididae* (E).

فصيلة اسمك بحرية من كاملات العظم . اجناسها وانواعها للمروقة قليلة العدد جميعها من اسمك البحر الاحمر || اجناسها اهلجية الشكل . حشكية . وسيدة الزنقة الطورية . رؤوسها معتدلة الجرم . غطاطها صغيرة لاستنفة . استاتها صغيرة حادة وسيدة الصف في التكوين . اعرف اجناسها الطيط .

#### ١٧٥١٩ - طيطن \*

*Gasterophilus* (S). *Gasterophilus* (F). *Gasterophilus* (E).

جنس حشرات من فصيلة الطيطيات ودية ذوات الجناحين .

ملاسها بحيلة . مرافقها صفوة . بطونها كثيفة الحمل القصير . حلماتها مقنوقة . رواشها سنانية الشكل . بمرامزها تامة . غطاطها اكلفية وبامية للناصح || اساريمها لافحة . قربها خلجا الوؤن . عاداتها طيقة تنحور داخل نفق السرة . اشهر اجناسها الطيشر .

#### ١٧٥٠٨ - طيط \* Teuthis (F). Teuthis (E).

جنس اسمك بحرية من فصيلة الطيطيات . انواعها المروقة قليلة العدد اعطاتها البحر الاحمر || اجناسها اهلجية الشكل . معتدلة الشكل . تغفل من ١٨ الى ٢٦ سم . اوثوبها الى الخطة تنبر . وتزهر في النصف السفلي وتسر في النصف العلوي وتنصرف الى الرصاصي العاني في الرأس والظهر || لحومها متوسطة الصنف . مأكولة .

#### ١٧٥٠٩ - طيطان \* هو كرات البر . اظله .

#### ١٧٥١٠ - طيطن صغير \*

*Pteromalus puparum* (S). *Pteromale jouet* (F).

حشرة نافعة من فصيلة الطيطيات . موطنها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . تتغفل على البثوريات والكرنبيات والذهوريات || جسمها صغير القدر يطول نحو ١ سم . وثلاثه خطوط . رأسها مستعرض الشكل . زبانتها غطبان متفرجان . جبينها شبه اسطواني . بطنها يبغي الشكل . مقطوم القامة . مرزئها صغيرة مستقيمة . اجنحتها ودية تعلوها مشحة زرقاء خفيفة . ثوبها الى الخضار الالام الاسف المولج .

#### ١٧٥١١ - طيطيات

*Pteromalidae* (F). *Pteromalidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة اجناسها وانواعها المروقة نحو ٢٠٠٠ جميعها نائمة تتغفل على الحشرات المؤذية من مختلف الفصائل || حشرات صغيرة تغفل على ١ الى ٣ سم . اجناسها ودية . جوارشها اصغر من بطونها القروية المؤشر . قروية الاستشارية تنباينة الاشكال . مرزئها صغيرة مستقيمة . اوثوبها مختلفة الالوان يكثر فيها الاخضر || اشهر انواعها الطيلن الصغير والديراق الهم والنازول القصير الزوبان .

#### ١٧٥١٢ - طيطوي

*Totanus* (S). *Totanus* (F). *Totanus* (E).

جنس طير من عماره الطوطيات رفسيلة دجاسيات الارض . انواعه ١٥ جميعها من القواطع . اوثوبها مرقة . صدورها وبطونها يبيض . منقارها مستطيلة . شاذفة للمطاط . سيقانها دقيقة . اوسافها بحيلة || تألف اللتلق ويجاري الماء وضفاف الانهر والبحيرات . قربها الحشرات على اختلاف انواعها والشرانيف والاسماك الصغيرة . تدش اوكارها في القراب وبين الاشحاب وفي الاجبار . اناتها يبيض نحو ٣ يبيضات تحضها وسدحا نحو ٣ اسابيع || اعرف انواعها واشهرها ما يتبع .

#### ١٧٥١٣ - طيطوي احم الساق \*

*Totanus calidris, Tringa totanus* (S). Chevalier *gam-bette, C. à pieds rouges* (F). Common redshank (E).

طائر من الطيطوي . طوله نحو ٢٨ سم . ثوبه الى السمرة الرمادية الزرنيقة يطولها تنطيط اسود مستطيل . عتفه وبطنه

1٧٥٢٨ - طَيْهَشِيَّة Spectroscopie (F).  
Spectroscopy (E).  
علم يبحث في طيف النور وهو ما يسمح بجمع بمجموعة العناصر الكيماوية التي تتركب منها الشمس.

1٧٥٢٩ - طَيْهَشَان Chlamydospora  
هو الفثا الازويبي الشكل الذي يلحف ويخضن فونذات الفطور ج. طيلاس.

1٧٥٣٠ - طَيْهَشَانِي Pallél (F). Palléal (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى رداء الزخريعات وضدييات الازيل. كقولك التجويد الطيلساني والاحساس الطيلساني.

1٧٥٣١ - طَيْهَش هو بيشة الدين، اطلبها.

1٧٥٣٢ - طَيْهَش Argile (F). Clay, Argil (E).  
الطين اي الصلصال هو سيليكات الالومنيوم المالي يربط غالباً غاروطاً باكسيد الحديد واكسيد المنغنيز وفيرها. وهو اذا كثر في التراب صيره متدججاً صلباً. انواعه عديدة تختلف باختلاف مركباته ومقدار كل منها. وهو حل الزمان من الاحمر والاخضر والجلوي والاصفر.

1٧٥٣٣ - طَيْهَش وَحْلٌ، وَحْلٌ Boue (F).  
Diré, Siltme, Mud (E).  
تراب نام لرج يفسر الماء وقد يسمله على وجه الارض.

1٧٥٣٤ - طَيْهَش غَرَوِي Bol, Argile ocreuse (F).  
Bols (E).  
نوع من الصلصال الاحمر المغربي الشان النام.

1٧٥٣٥ - طَيْهَش غَرَوِي Argile colloïdale (F).  
Colloidal clay (E).  
نوع من الطين القزج النام السهل التشكيل.

1٧٥٣٦ - طَيْهَشِيَّة Tinantia (S). Tinantia (F).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة الوردانيات مقبودة التعريف على اسم العلامة الفرنسي طينان (١٨٠٣-١٨٥٢) || انواعها للمروعة قليلة العدد، جميعها سبروتية، مهددة امريكة الوسطى. سوطها غرامه لبدة تملو من ٥٠ الى ٦٠ سم. اوراقها ساقية تطوي نحو ٧ سم. وتعرض نحو ٣. تصهلها جادة الصلصة، خلي البشرة العليا، امط السفل. انزعافها عقديوي التجميع، تالهي الازنكار. ازهارها زرقاء اللون او بنفسجية || تنورها يستمر من نموز الى تشرين.

1٧٥٣٧ - طَيْهَش دَبَاغ Prionus coriarius (S).  
Prione tanneur (F). Prionus coriarius (E).

حشرة خالصة من فصيلة القرزيات ورتبة مفصليات الاجنحة. موطنها البلاد المعتدلة الحارة. تآلف الاحراج. خنافسها تعيش على غزوثها للمري. يرقاتها تعيش على المواد النباتية المنحلة في جلود ويطوع الاشجار اليابسة || جسمها كبير القد يطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. ثوبها ثنائي اللون، رأسها وزانها وكوسلها ويطها وبرازمها الى السواد اللعيمي. غلزارها الى السمرة الكستنية. رأسها كبير الجرم. عينها صغيرتان. زانهاا كيران. منطفان الى الوراء. مستطفان من الذكر و تهيان عند الاث. غلزارها مقطوع الخوض اللامع. غداها شديدا الصلابة. برداها كيرتا القد، حنطية اللون || جليها لثوي الحول.

انوامه المروعة قليلة العدد منتشرة في معظم انصار العالم || اجسامها متوصلة القد تطول من ١٢ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعرة. عينها كبيرة جاسطة، شياحدة عند الفتيقن. قرنها الاستشعارية شديدة التقعر تكتبي بنسيلة دقيقة. اخطاها ولامها صغيرة. كوسلها مكورة، كثيفة الخمل. بطونها يرمية متكاثفة الخمل. مرزاتها ذرية. رواشها كبيرة، مقيقة. قوامها فثية. طيارها سريع الحركة، بميد الفتيقن || الجملانة تسرح في كل مكان وتكتسب ذوات الحافر. البقرة تنقل باللمس الى افضيها فلم الخاطئة ثم الى المدة حيث تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث.

1٧٥٢٠ - طَيْهَشِيَّات Gasterophilidae (S).  
Gasterophilidae (F). Gasterophilidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها للمروعة متوصلة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم. تآلف الاساكن التي ترقادها الحفريات ان داجية أو متوصلة || اجسامها متوصلة القد، تطول من ١٠ الى ١٦ م. ورونها كبيرة، مستعرة. عينها كبيرة، جاسطة، شياحدة عند الفتيقن. قرنها الاستشعارية قصيرة. اخطاها ضامرة. ملاسها صغيرة. كوسلها مكورة، كثيفة الخمل التقعر. بطونها يرمية الشكل، متكاثفة الخمل. مرزاتها صلبة. رواشها قليلة التضييب. قوامها فثية. طيارها سريع الحركة شديد الفتيقن، بميد الاثي تهريق للمكن فردياً على ذوات الحافر. يرقاتها شبه اعليجية الشكل، مبططة، عشارية السكر. تعيش المرحلة الاولى من عمرها في افضي فلم الخاطئة ثم تنقل الى المدة تستقر حتى زين الاكمال حيث تخرج مع الروث || انهر اجناسها الطيطن.

1٧٥٢١ - طَيْهَش Humidifier (F). To damp (E).  
لين التي، بواسطة المطيح الذي يزين الرطوبة اللازمة.

1٧٥٢٢ - طَيْهَش Spectra (F).  
Spectre, Spectrum (E).

1٧٥٢٣ - طَيْهَش عَيْطِي Rale noire du spectre (F). Spectrum-line (E).

1٧٥٢٤ - طَيْهَش قَسِي، طَيْهَش النُور Spectre solaire (F). Solar spectre (E).  
مجسمة الاشعة الملونة الناتجة من تفكيك الضوء الشمسي.

1٧٥٢٥ - طَيْهَش صَوْتِي Spectre du son (F).  
Spectrum sound (E).

1٧٥٢٦ - طَيْهَش هَوْتِي Spectre de la lumière (F).  
Spectrum light (E).

1٧٥٢٧ - طَيْهَشُورُ Aegialitis (S). Aegialite (F).  
ماتر من طول الساق وفصيلة الزرقانيات. موطنه الشطوط البحرية وضفاف الانهر والبحيرات. قوقبه الحشرات والذعاصير ولقدبان والحوام. يمشي جماعات قليلة العدد || جسمه صغير القد، يطول نحو ٢٠ سم. ثوبه الملوي جبل الحلحة الخضراء اللؤلؤ. ثوبه السفلي الى البياض المائي. عتقه مطروق بالاسود. رأسه ميقج بالاسود والجلوي. جناحه ذلق الطرف يلحف اللب. ذنبه غزوي الشكل، صغير الجرم. سلقه خيلة قيمة سموا اللون.



طيطو



طيش دباغ

تكثر فيها الجفة الرية . روجها سفيرة ، مثاقيلها غليظة وصغيرة . سوافلها مستديرة . ارسافها قوية قصيرة . انثاها زاهية الالوان المتضادة || انثاها كثيرة العدد . اجناسها ١١ تنتمي الى عاريتين : الحبيليات والخريصات .  
١٧٥٤٢ - طيهوج راجع طير .



طيهوج ثياري

١٧٥٤٣ - طيهوج الفردوس  
Oiseaux de paradis (F). Birds of paradise (E).  
طيور من مختلف الاجناس والانواع تنتمي الى فصيلة الفردوسيات ورتبة الجوارح . وهي مشهورة بفرط نمو ارياشها الجميلة الالوان .

١٧٥٤٤ - طيهوج اهليكية ، طيهوج ذاكجثة  
Volailles (F). Poultry, Fowls (E).  
هي الطيور التي صار البادعا وتكسيها فاصبحت اليفة تربيش مع الانسان ولا تخشاه كالحمام والديج والجهنيات وبعض القبط والاوز والغنفر .

١٧٥٤٥ - طيهوج لا تحفن بيضها  
Oiseaux qui ne couvent pas (F).  
الطيور التي لا تحفن بيضها كثيرة العدد تجمعها شرة اجناس تنتمي الى اربع فصائل : قتيقيات ، الشبانيات الخريجات والكاروبيات .  
اما اجناسها فهي :

Indicateur (F).	الخريجة
Scythrops (F).	الشروب
Megapoda (F).	القشبان
Oxylophaga (F).	الصفص
Megaceryle (F).	الطيطاب
Eudynamis (F).	السنيس
Molothre (F).	الحناس
Cathartus (F).	النهيق
Coucou (F).	الوقواق
Lalpea (F).	البجوج



طيهوج كبير

١٧٥٤٦ - طيهوج هو عجل الجروب ، اطليه .  
١٧٥٤٧ - طيهوجي  
Oiseller (F). Bird-seller, Bird-fancier  
هو بائع الطيور .  
١٧٥٤٨ - طيهوجين  
Germandre (F).  
هو الطوريين ، اطليه .

١٧٥٤٩ - طيهوجين  
Aunée viqueuse (F).  
هو الطيطاب . اطليه .

تظهر الحشرة الجملانة في اواسط تموز وتعيش حتى اواسط آب . تنسج في الليل . تسافد بعد ظهورها باسموج . تروى المكان في شقوق الشب المطروح ارضاً || البرقة عند بلوغها الكمال تطول نحو ٦٠ سم . جسمها غليظ الجرم شبه اسطوانتي الشكل ، حنلي اللون ، اسم الرأس عادم الملب والرواجب || طور الاكمال الذي يستمر من ٤٥ الى ٥٥ يوما يتفشي في الثروة فمن صليحة من المواد الليفة واللصوية المسجونة بالريال .

١٧٥٤٨ - طيهوج ، غيريس  
Tétras (F). Grouse (E).  
جنس طير من عارة الخريصات وفصيلة الطيوريات له ثوبان القشيري والكثير || والطيروج يتميز بكبر الجفة وكثافة الريش . مثاقير غليظ الخطم الاعلى ، حاد الخلق ، اخفت البرية . ثوبه متراكب الالوان المتضادة المابقة للامعة . وهو يختلف بين الذكر والانثى || يأنف الاجراج الجبلية الكثيفة البهجة عن السران . قوته البرام والبار والحروب والديان والحشرات || اثناء تنش في القنوس تدبره بين الخننج والخنجر حيث تضع من ٨ الى ١٢ بيضة تحضنها وسدا نحو ٣ اسابيع .

١٧٥٤٩ - طيهوج ليكاري ، غيريس الشرق ، ديك التامول  
Tetrao tetrix, Lyrurus tetrix (S). Tétras lyre, Petit coq de bruyère, Tétras à queue fourchue, Coq des bouleaux (F).

طائر من الطيروج متوسط القد طول الذكر يراوح بين ٤٥ و ٦٥ سم . وطول الانثى ٤٠ الى ٤٥ . ثوبه متراكب الالوان يظلم فيه الازرق الاسقم للمرج والاسود الشديد اللمعة . اخفيكه مستدير الريش الجانبى على شكل قشارة . زيكاه يبيض الريش ويبرزه من مناكبه وابعده || موطنه فسح الارباء . يربض في المواقف الرملية الارتفاع . يكثر ويؤوده في الشرق .

١٧٥٤٠ - طيهوج كبير ، غيريس الجبل ، ديك الخننج  
Tetrao urogallus (S). Tétras urogalle, Grand coq de bruyère, Grand tétras (F). Capercaillie, Cock of the wood (E). Auerhuhn (D).

طائر من الطيروج . كبير الجفة ، طول يراوح بين ٧٠ و ١٠٠ سم . ثوبه متراكب الالوان المابقة للامعة . اخفيكه اسود اللون مستدير الشكل يتألف من ١٨ ريشة . الانثى اصفر حصان من الذكر ثوبا الى الصبغة الصفراء يملو التوشم الاسمر من الرأس الى الاقنص ومن الخلق الى الزنكي || موطنه شامخ الاطراف يمتد من الهند الى شمالي اوروبة . يأنف الاجراج الكثيفة اعصها اسراج الصنوبر .

١٧٥٤١ - طيهوجيات  
Tetraonidae (S). Tetraonidae (F). Tetraonidae (E).  
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات اطيورها مختلفة الاجسام

# ظ



ظبي



ظبي الثبت

١٧٥٥٥ - ظبياء

الظبياء كواكب .

Acacia mellifera (F).

١٧٥٥٦ - ظبئة

هي السبط الممل من الاشجار المغيرة الزهر التي يكثر وجودها في بعض سفاب جزيرة العرب .

Ajuster (F). To adjust (E).

١٧٥٥٧ - ظبط

Antilope (F). Antelope (E)

١٧٥٥٨ - ظبي \*

حيوان وسيد الجنس والفرع من ذوات الظلف المخبرات المخرجات القرون . وهو رقيق القوام ابيض القد ، يطول نحو ١٢٠ سم . ويصلو ٨٠ ، بينا ذنبه لا يتجاوز ١٦ سم . رأسه معتدل القد ، خطبه مستدير الطرف ، عيناه كبيرتان فرحان . اذناه جالستان محدبتان ، جمرانه دقيقة وقوية . ثوبه يختلف باختلاف الشق والزم . الذكور البالغة احيق ثوباً من الاثاث والذكور الفتية . قرون ذكورها مستقيمة ، متشاببة الخيد ، خماسية الدرة القرولية تطول نحو ٥٠ سم . اما الاثاث فجاء الرووس . ثنائية الاخلاف ، فردية الطل . ج ظباء .

Cephalopa (F).

١٧٥٥٩ - ظبي أزرق

هو الحليم ، اظلي .

Cervicapra (F).

١٧٥٦٠ - ظبي أسود

هو القنبر ، اظلي .

١٧٥٦١ - ظبي الثبت \* ، شيرو

Pantholops Hodgson (S). Pantholops de Hodgson, Chiru, Antelope tibétaine (F).

شيرو هو الاسم المشهور في بلاد التبت . حيوان لبون عظيم من الظباء . موطنه نجد التبت من ارتفاع ٤٠٠٠ الى

Ectoproctes (F).

Ectoprocta (E).

ظاهرات الشرج فئة من الحيوانات الطحلبية تتميز بنشوز الشرج خارج لطاق القراس .

١٧٥٥٠ - ظاهرات الشرج

١٧٥٥١ - ظاهرات المتك

Ectognathes, Ectotrophes (F).

رتبة سشرات دابة من طائفة هدية الاذئاب . تتميز بالظلاق متكها . قرونها الاستشعارية عديدة الفواصل غيبية الشكل . اجسامها مستطيلة يكثر فيها الشكل المردني . جميعها دالة هواكة ونسبها الناعلة والقارضة التي تلتص الكتب والنياب . اجناسها وانواعها زهاء ٣٥٠ تجمع الى فصيلتين : لشمسيات والظنوبيات .

١٧٥٥٢ - ظاهرات زوئية

Manifestations orageuses (F). Tempestuous manifestations (E).

هي العواجل الجوية التي تسبق او ترافق الزلازل والاعاصير كالرياح والقيار والسحب .

Phénomène (F).

١٧٥٥٣ - ظاهرة ، مكشع \*

Phenomenon (E).

هو كل تحول يحدث في حالة الجسم او في خصائصه . فان لم يكن مصحوباً بتغير في طبيعة مادته سمى ظاهرة حكمية (فيزيائية) . اما اذا اقترن بتغير في طبيعته فهو ظاهرة كيميائية .

Phénoménisme (F).

١٧٥٥٤ - ظاهرة

Phenomenism (E).

الظاهرةية وتسمى الحمولية والمنشعية ، ملحق فلسفي يقبل بان المعرفة محصورة في الظواهر او في الحوادث الحسية . وهو بذلك يتناقض الانتولوجية اي علم الكائنات ذلك لانه لا يبحث في الاسباب ركنة الانتولوجية .

Précaire (F).      ١٧٧٣ - ظَرْقِي ، وَثْقِي  
Precarious (E).      قابل الاستطال وانزال

Cloportes (F). قَلَرْمُوط - ١٧٥٧٤  
Wood-louse, Slater, Sow-bug (E).

دويية من التشريرات متساويات الارجل مشهورة باسم  
حمار قبان اطلبه .

Oniscidae (S). ١٧٥٧٥ - ظرموطيات  
Oniscidés, Cloportes (F). Wood lice, Sow bugs (E).  
Kellersasseln, Landasseln (D).

فضيلة دويبات من التشريعات متساويات الأرجل. اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة العدد. اوطنها البلاد الحارة والمعتدلة  
الحارة من العالمين للقديم والجديد || أشهر انواعها الظرموط  
المعروف بحمار قبان والدرمام والكرّيس .

Kokreuteria (S), Kokreuteria (E). \* 1961-1966

جنس نباتات مجرية من فصيلة البستديات. الفواحة عديدة  
مظلمها حرجبي وبري. جميعها الجدار وشجيرات سرسة.  
اوراقها مركبة متعاقبة مائلة. اثمارها مستقلة القملات،  
رهمية البلات، صفراء اللون، خشوية التصبغ،  
تاجية الاوتكاثر || اشهر انواعها مايلي.

١٧٥٧٧ - فَتَوَّ أَسْوَدَ هو البكف ، اطلبه .

١٧٥٧٨ - **ظرو ئىتائى الرش**  
*Koileuteria bipinnata*(S). *Koileuteria bipinnés*(F).  
 نوع من الظرو بجره كبريه القند طول نحو ٢٠ م. اصحابها  
 وانقادها فاقه. اوراقها تفلج نحو ٧٠ م. وريقاتها  
 شتائيه الرش. نصلها يضيى الشكل. عشاقى الخلفه  
 مالى البشرى ٥٠ م ٥٠ م ٥٠ م ٥٠ م ٥٠ م ٥٠ م  
 بن ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م ٢٠ م

۱۷۵۷۹ - طَرَوْ عُنْكُولِي  
Kozreuteria paniculata (S). Kozreuteria

نوع من الطرو يثمره سرورية تملو نحو ١٧ م. اخصان  
وانفانها سراكية . اورلفها كيرة الله ، وريقفها حديد  
وزرية التجميع ، نعلها ييفي الشكل ، بسن الحافة  
خلي الصلصة السفل يطلو نحو ٩ سم. ويبرسو نحو ١  
مثاليه الزهرية فاذة قطرها نحو ٤٠ سم. اظفاره مثقو  
بحرسها النعل || اذراره يستمر من سزان الى تموز

*Colreuteria apiculata* (S). ١٧٥٨ - قزوين علي  
*Colreuteria apiculata* (F).

نوع من الطرو حجرة سبروتية صغيرة القند تملأ نحو  
 اطار. انتادما وانها زهاء الماء. اوراتها صغيرة  
 وريقها اعليجية الشكل، خفيفة وصغيرة، تصلها خ  
 البشرة على صفحاته || شاكيله الزهرية كثيفة التجميع  
 ظرها نحو ٣٠ سم. ازهارها مشربة بجرها النحل || ازهار

elmithasporium (S). ۱۷۰۸۱ - ۵

جنس قطور مجهرية من الريديات وفضيلة الطليعات  
جره الكينية ملونة. متعصب حزمة التجميع. كذا  
طرية أو جانبية الأركان، يضيء أو اسطوانية الشكل  
مفورة، شقية الانقسام || أنحاده عديدة تضلل  
مختلف النباتات ، أحدها والشعر ما يتيم .

١٠٠٠ م. من سطح البحر . يألف السهل والادوية الرطبة  
البحرية . يحرس إلى الصباح من البحر إلى الغسق .  
الغوص الذي يجرى اليه في البحار حاضرة في الربل تحفه من  
الغوص . ملحة الحياتي ردي ، الذكور لا يقربون من الانثى  
الا في زمن البواق والساد ثم يفرقان . جسمه متوسط القد  
يقطر نحو ١٥ سم . ويرتفع نحو ٨٠ سم ، ١٨ خط  
عنه ١٠ خط في السطح كسر في الرأس والظهر  
وتدبش في البطن . شبيه السواد اللامع في اللون شائعة  
الغزل اسنادان ، شبيه السواد اللامع في اللون شائعة  
الغزل تقسم شاذي واحد في البطن المسطح .

1٧٥٦٢ - قبي الوغفر (F). *Oryzotragus sauteur* (F).  
حيوان لون غمر من الظباء يدعى قطار ، اطلقه .

١٧٥٦٣ - فلي شېخاره - *Antelope tchikara* (F).  
حيوان من الغناء يسمى شخارة ، اظها .

١٧٥٦٤ - ظبي حربي هو الأحمر ، اطلبه .

1766 - طبية  
انثى القطبي ج طباء و طبيات و اغلب . كنيها ام الخنف  
وام شادن وام الملا .

Vagin des solipèdes (F).      - ١٧٤٦٦  
Vagina of solipeds (E).

الحياه من كل ذي حائل (السان) ومنعرج الوادي والجرايب  
الصغير وربما كانت الضبوة لكيس اثنين مصطفة منها .

١٧٥٦٧ - ظيرة، ظريرة  
الحبيب الصبواني المحدث الاطراف ج. ظران وأخره.

١٧٥٦٨ - طغور هو التراب اليابس من شدة البرد.

Butte, Pierre saillante ١٧٥٦٩ - القرب  
ج. ظراب . ما لتأ من الحجارة .

ichthomyx (5). ظربان - ١٧٥٧. \* ظربان، ظربان.  
ictomyx (F). ictomyx (E).

حيوان من اللوامس صغير الجثة ، مجتصع الرأس ، أصفر  
الاذنين ، صمغاه يهويان ، أسود السرة ابيض البطن ،  
قصير القوائم ، متين الزانحة الكرسة . ج. ظري .

Mephitis (S). \* ظربان أمريكي  
Moufette, Mouffette (F). Shunk (E).

نوع من الطربان يعيش في اريكة يحل بالكر صلدان  
طربان الجزيرة ومنها الثلاثة التي ينشر منها الانسان والحويان  
وفتاته هذه مسددها جراب يحيط بقاعة الذهب تتجمع فيه  
مادة سائلة قذرة دهنية التركيب يستعملها الطربان قذرة  
عند الخوف والفرار من النفس . وهو يجمع الرأس .  
الخطير . مستعمل الذهب الكثر .

stunculus (S). <sup>١٧٠٧٧</sup> - طر فطره

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياطة  
وفسيلة الفلوكيات . أنواعها المعاصرة المروفة عديدة منتشرة  
في معظم بحار العالم || أصلاتها شبه مستورة الشكل  
متساوية المصارع الخدية ، الخدعة ، الملونة || تميز  
بين الصخور وفي الزمال البعيدة الغور .



عظم مان



ظہران امریکی



**خطوة**



عظرو

طولها ٧ سم. وعرضها ٣ سم. بيضا ينحرف لونها الى الجوزة يطوقه حار قائم || يسبب ذبول الارواق وقلة الانتاج. يكافح بتطهير البذار قبل زده.

**١٧٥٩٠ - ظُرَيْرُكِلْ \***  
Zorilla (S). Zorilla (F). Skunk (E). Bandit (D).

جنس حيوانات ليلية ضاربة من فصيلة السرمويات انواعها للمروعة قليلة اسماؤها البلاد الافريقية بني قرية الشبه من الزرْب. اجسامها مستطيلة مستقيمة طولها براوح ٨٠ سم. ووزنها ٦٢ سم. ورواسها مخروطية القالب. فوائدها صغيرة. اذنانها جلقة طولها نحو ٢٥ سم. اذنيها الى الصهبة السوداء طولها ورواسها مخملية بالابيض والاسود. قوتها ابقار والجوز والبلور والوزغ والحيات وجميع الحشرات.

**١٧٥٩١ - ظُرَيْرُشِي \* ، ظُرَيْرُشِي \***

Zonotrichia albicollis (S). Chingolo à gorge blanche (F).

طائر من فصيلة الثرشوريات. موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية. يألف المزارع والاماكن الاطعمة كاللوري. نظامه الحياتي حامي || جسمه صغير يطول نحو ١٨ سم. ثوبه العلوي الى الكهبة الحمراء المواج يعلوها تسبيح اسود. رأسه مرقوش بالكسيتي والاسود. زوره ابيض. عرساه وصغته وصدره الى الوردية. حقة عينه كسيتية اللون. متفاده ووساه الى السمرة. جناحه مستدل احمر. ذنبه مستطيل الشكل، مغروس الطرف القليل الاستدارة || قوته البذور البرية والثمار العنينة. تتركبه مستحب الالاحان الطيفة || يطنش عنه في الاغصان والاشجار القريبة من سطح الارض. الاثني تبين من ٣ الى ٤ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوما.

**١٧٥٩٢ - ظُرَيْرُنْ اُدْهَسْ \***

Erythrosterne parva (S). Erythrosterne rougeatre (F).

طائر من الفصايرب الجواثم سنيات النقيذ فصيلة المنيابيات. اصطناعه تمتد من الهند الى اوروبا يحوي حبها وبجبالها ذهابا وايابا كل عام. يألف الادغال والنباتات. قوته الحشرات المنجية اغصها || جسمه صغير القد يطول نحو ١٢ سم. ثوبه يتقلب بين الاسود ويختلف بين الذكر والانثى. الذكر عند بلوغه الاثني يكون جوي الرأس والرداء والجناح والذنب وازرق احمر. احمر الزور اصفر الصدر، ابيض البطن. ثوب الانثى الى الشبه لالسمراء تقيق في الرأس والرداء وتبين وتغير في الصدر والبطن. يطنش عنه في الشجيرات المتوسطة الارتفاع بين الاغصان والفروع. الاثني تحضن بمناوبة الذكر من ٤ الى ٦ يبيضات. التريثم يستمر نحو ١٣ يوما.

**١٧٥٩٣ - ظُرَيْرُونْ \***  
Dromedary de somme (F). Dromedary de burden (E).

البعير يحمل ويحمل عليه. ج. ظن.

**١٧٥٩٤ - ظُفَّافْ \* ، عُرُفُو \***  
Eudytes (S). Gorfou (F). Gorfou (E).

جنس طير من عديات الريش، كفتيات القدم وفصيلة الطرسويات. انواعه المروعة قليلة العدد اسماها جمار القتب الجنوبي || اجسامها شبه مخروطية الشكل. حبها حبيط الملبوط. ورواسها صغيرة متوجة بكشاش ملونة. ساقها جنوبية اللون، عذدة الاثني اعليا البازرة السطام.

**١٧٥٩٢ - ظُرَيْرُ الثُّومِ \***

Helminthosporium alli (S).

فطر مجهرى يتطفل على فصوص الثوم فيصطبها || مظهره الخارجي يقع مستديرة او بيضية الشكل تركب فصوص الثوم في طولها الثشوي فتخرج الكشور المتحارة به ان تشبه بنخاعة مابية سوداء اللون تقيدها الى السطح. يكافح بتطهير القصص، قبل زرعها، بسائل الفروبول المخلول ٢/٢/١.

**١٧٥٩٣ - ظُرَيْرُ الخِيَارِ \***

Helminthosporium cucumerinum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق الخيار فيصطبها ويؤدي النبات || مظهره الخارجي يقع نسبية صفراء اللون قطرها نحو ١٥ م. تركب التصل على سفحه العليا يتأهلها على السفلى لطفة خلية رصاصية || يكافح بتطهير البذار قبل استعماله.

**١٧٥٩٤ - ظُرَيْرُ الشاي \***

Helminthosporium theae (S).

فطر مجهرى رمي يمتري جنيت الشاي الياصة فيركب على الجلود والقضبان ويتكاثر عليها.

**١٧٥٩٥ - ظُرَيْرُ الغُصْنِ \***

Helminthosporium gossypii (S).

فطر مجهرى يتطفل على بعض انواع القطن في ظروف خاصة قوامها استحكام الجفاف الجوي مغروبا بارتفاع الحرارة واستمرار الارتفاع مدة من الوقت || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة وديدة او قرنزية اللون تركب الارواق والكؤوس الزهرية || اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

**١٧٥٩٦ - ظُرَيْرُ المصان \***

Helminthosporium sacchari (S). Eye spot de la canna à sucre (F).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق المصان. مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة حمراء اللون، سوداء المحور، صفراء الحار تركب نصل الارواق الفتية على حدود زوايا الاخير. اضراره زهيدة لا تستوجب العناية.

**١٧٥٩٧ - ظُرَيْرُ المَلَطِ \***

Helminthosporium heveae (S).

فطر مجهرى يتطفل على الماط في طوره الثشوي. تركب الارواق فيرتفعها يقع صغيرة صفراء اللون تتحول تدريجيا الى بقع قديمة تشبه التصل دون ان تقوي النبات.

**١٧٥٩٨ - ظُرَيْرُ المُرْزِ \***

Helminthosporium musarum, H. torulosum (S).

فطر مجهرى يتطفل على اوراق ومزارع المرز || مظهره الخارجي يقع صغيرة مستديرة سوداء اللون تركب التصل بموازاة اعصابها ثم تتسع فيصفر لونها به ان تصعد بشرية البنية الرقيقة || يوحى على الثابر جفاف يحمل غمام كثيرة يقودها الى اسوداد القشرة ويضربها || يكافح باستعمال سائل بوردو المركب ٢/٢/١٠٠ الى ثلاث مرات. الاثني عند ظهور المرض على الارواق والثانية بعد ظهور الطرح والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع.

**١٧٥٩٩ - ظُرَيْرُ لَدِي \***

Helminthosporium turcium (S).

فطر مجهرى يتطفل على الذرة الصفراء وقد شوهد في ظروف خاصة على المنقة والشيطان والشعير والمصان والارز. مظهره الخارجي يقع قديمة الشكل تركب الصف في نصله وعنده. ثوبه ضيقة صفراء اللون ثم تستطيل وتوسع فينفج



ظُرَيْرُ المصان



ظُرَيْرُ لَدِي



ظُرَيْرُ



ظُرَيْرُشِي



ظُرَيْرُونْ اُدْهَسْ



ظُفَّافٌ

التياسح وفصيلة الكياميات. اصطناع تحت من البحر الاحمر الى المحيط الهندي || صفته صميكة ، غليظة ، ثنائية المصارع للاستهلاكية ، مجهزة ببضلة شديدة . جسمه صلب الجرم ، عديم الثنايب ، مستطيل الرجل || يعيش اصلاً بالصخور المنصورة .

١٧٦٠٧ - ظفيرة هي النسخ البري ، اطليه .

١٧٦٠٨ - ظفيرة \* Thelyphonus (S).

Thélyphose (F). موية سامة من الرتلات . مهددا البلاد المارة والاستوائية . تتميز باستقالة الذنب والجرايز || فورها الى الطحلة يفر في الرأس ويسمر في البطن وفي اللعاط . لسمتها سامة مؤذية || تسرح في الليل وتلوى الى جلود الارواح النخرة في الكبار ، قتها الحولم والجلدات .

١٧٦٠٩ - ظلّ Ombra (F). Darkness, Shade (E).

الظل هو نقيض النسخ وهو المنطقة المظلمة التي يكرها الجسم الذي يتعرض سير لشدّة النور .

١٧٦١٠ - ظلال

داه في قوائم الدابة لا من سير ولا من تعب .

١٧٦١١ - ظلع Défaut (F). Défaut (E).

١٧٦١٢ - ظلع Chaleurs des chiens (F).

هو ماعلة الكلاب . ويقال للكلبة المستعرة طاعمة . اما الكلب فظاع .

١٧٦١٣ - ظلف Ongle (F). Hoof (E).

ظفر كل حيوان يجتر كالبقرة واكشاة والظفر ... وهو كالحافر للفرس وكالكف للبعير .

١٧٦١٤ - ظليف Rocailleux (F).

Rocky, Pebbly, Flinty (E). لمت تمريني يعلق على كل سطح تكثر فيه الصخور لتناثرة .

١٧٦١٥ - ظلف الفرس

ظلف الفرس يجمر لير من كوكبة السجاجة .

١٧٦١٦ - ظلم Stuvia, Piqueria (S). Stévie (F).

جس نيات حشوية معمرة برة وزينية من سبط الفصليات وفصيلة المركبات . الزواله مديدة . اوراقه ثلاثية المروق . السلية منها الوسطى متعاقبة الى العليا فصائية . ازهاره رومبي . رويكاته مركبة من ثلاث او خمس اذوار متساوية . اشهر انواه الزينية ما يتبع .

١٧٦١٧ - ظلم أَرْجُونِي Stevia purpurea (S).

Stévie pourpre (F). عفة معمرة زينية جادة تملو نحو ٧٠ سم . ساقها فرعاء فارغة . اوراقها غنضة النصل ، حلقة البشرة . ازهارها حلقة التجميع ، ابيضات اللون || ازهاره يستمر من آب الى ايلول .

١٧٦١٨ - ظلم عُرْصُفِيّ الزَّوْج

Stavia ivaeolia (S). Stévie à feuilles d'Iva (F).

حبة معمرة زينية جادة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها

اصطناعا مستطيلة . اجنتها جذافية ، حشفية الریش . اذنانها جذاع كاسية . اقلوبها ملونة ، رؤوسها واصطناعا وظهورها واجنتها سود . صغورها ويطونا يبيض . كشائنها مذهبة اللون او رداية او ليلكية || قوتها الاصماك والتشرييات ويض الرضويات || ملحتها الحياتي جماعي . اسرارها او بالاحرى مستعمراتها تمد من ٢٠ الى ٣٠ ألف نمر .

١٧٥٩٥ - ظفر ، ظفر Ongie, Sabot (F).

Nail, Hoof, Claw (E). الظفر مادة قرنية تنبت في اطراف الاصابع . ج انظار واطافير .

١٧٥٩٦ - ظفر العنكب

ظفر العنكب ضرب من الكيات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٧ - ظفر القط Pied de chat

عشية برة معروفة برجل القط ، اطلبها .

١٧٥٩٨ - ظفر اللسر

ظفر اللسر ضرب من الكيات (محيط المحيط) .

١٧٥٩٩ - ظفراء هي النسخ البري ، اطليه .

١٧٦٠٠ - ظفيرة

لبات حريف ينفع القروح الحشوية والتآكل . (اللسان) .

١٧٦٠١ - ظفيرة التجوز Graine de cribule

هي ثمرة الحسك . اطلب حسك .

١٧٦٠٢ - ظفيرة الزلان

ظفيرة الزلان كواكب (محيط المحيط) .

١٧٦٠٣ - ظفوف \* Tornatella (S).

Tornatelle (F). Tornatella (E). جلس حيوانات بحرية من الرضويات ممديات الاريل وفصيلة الباغيات . انواه المعاصرة المرفوعة قليلة المد منتشرة في بعض بحار البلاد الحارة اخصها الهند والبحر الابيض المتوسط || اصدافها بيضية مستطيلة ، محزنة الاضباب ، مستطيلة الذبعية الاستوائية الرضابية . حيلة التبيج ، زاحية الالوان .

١٧٦٠٤ - ظفبات Myrianglucose (S).

Myrianglucose (F). Myrianglucose (E). عمارة طور مجهرية من فصيلة البقيات . اجناسها وانواعها مديدة . اجربها الزقية كروية الشكل سطحية الارتكاز . اذنانها ريمية . نكاتها اهلجية . غلاتها غشائية المادة ، نصفية ، مستعرضة || منها نوع واحد مؤذ يدمى الصب .

١٧٦٠٥ - ظفبتر ، زالدة Onglet (F). Mitro (E).

جزء الباق الملمعة الذي يترك ويتأ فوق الظلم ، وهو ايضا ما يترك من النسخ الملقم فوق آخر عين .

١٧٦٠٦ - ظفتر \* Cleidothaeus (S).

Cleidothère (F). Cleidothaeus (E).

حيوان بحري وسيد الجلس والتمن من الرضويات صفيليات



ظفوف



ظلم



ظفيرة

اصطابتها بعض مناطق البلاد الحارة والاستوائية من الماعلين القدم والجدي || اجسامها متوسطة القد تطول من ٣ الى ٤ سم. رؤوسها صغيرة. عينها جاحظة. قرونها الاستشعارية صغيرة الاطراف. تأثير الذكور مستطيلة شديدة. كراسلها كبيرة عجيبة. انجدها لائحة. اوزانها متباينة الاناث منها الاجر الاسفع المواج والاعصر والبسجي والقصي || تألف الحراج الجبلية ولا تقرب الصنوبريات. تعيش في جلود الاشجار النخرة. يرقاتها غاشية مخفية.

Collet de l'arbre (F).

Neck of the tree (E).

هو اصل الشجرة اري مركز اقتشاح الجلود على الجذع.

١٧٦٢٩ - ظلم

١٧٦٣٠ - ظنبار عشقاري النقط

Zonabris decimpunctata (S). Zonabris à 10 points (F).

Zonabris decimpunctata (E).

حشرة طيبة واثمة خاضعة واثمة من فصيلة الملويدات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها بعض اقالم حوض البحر الابيض المتوسط. غنائها تعيش على بتلات الاوراق وعلى التوتوي. يرقاتها تعيش في اول عودها على المواد المضوية ثم على ما تستطع اقتراسه من الحشرات الدنيا. الخفضاء التي تفرز عند لمسها مادة صفراء اللون كريمة الرائحة. تحوي في شواربها وفي جهازها الهضمي مادة نافذة تخرج بشرة الجلد وتثير الباء والايلاج || جسمها متوسط القد يطول من ١٢ الى ١٤ مم. قرونها اسود الرأس والاكوسيل والطين والبراز، اصفر الظهران المنقط بالاسود. رأسها صغير الجسم. زباناها صولجانيان. عينها صغيرتان. ظهرها منقط الاحديداب و مستطير الطرف الاحف. غنداه خاضعة المنقط السود || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اواسط ايار وتعيش حتى اوائل تموز. تسرح في النهار. تساقط بعد ظهورها بظلاله اسابيع وتتبع المكان تحت غلاف الاشجار وتقومها وتحت الجملانة || البرقة عند بلوغها الادراك التام تطول نحو ٢٠ مم. جسمها مبسط الشكل، سداسي القروايح، اغبر اللون. اسمر المواج، عتاي الرأس، ضلع انتائير || طول الاكمال الذي يستمر نحو ٤٥ يوما يتقضي في القوية.

Heteropatalia (S).

١٧٦٣١ - ظنبة

جنس فطور مجهرية من فصيلة الدلايمات. بكتيدات سطحية الاركاناز، كرشية الشكل، جلدية الجبل الاسود، كروية الانفلاق. بوفاته قوية الاحديداب، طيبة الاطراف، مؤثرة الانقسام، شافقة || اوزامه المكؤبة قليلة لغرضها ما يتبع.

١٧٦٣٢ - ظنبة الترنفل

Heteropatalia dianthi, H. valtellinensis (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق الترنفل فيعطلها ومنعها عن القيام بوظيفتها || ينمو على الازراق في اول عهده لطفاً مستطيلة محتلة اللون ثم غبراء تركب ساقه التصل الى كامل زامه الاعلى || وهو في طوره الثاني نقط سم تطول الطغ تقسب انتساع البشرة وانزعاج النسيج || يكالغ بنفسخ التثليل باسء الفواظير الخففة وذلك بعد انتساع الازراق الموسوية. ومن الضروري انتساع الازراق عند ظهور الطغ.

١٧٦٣٣ - ظنبة السيسم

Heteropatalia antirrhini (S).

فطر مجهرى يصيب اوراق السيسم فيعطلها بعد ان يقرح

فرواه زياء. اوراقها عرضية الشكل، مستطيلة التصل، دقيقة الزام الاخير. انجدها بيضاء اللون، خلية البشرة انزوارها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

Stevia eupatoria (S).

Stévie eupatoire (F).

حشة عمرة زيبية جاحدة تطول نحو ٦٠ سم. ساقها فرواه مرطاه. اوراقها سنائية التصل. سنة الزام الاخير. انزادها ودية اللون || انزادها يستمر من تموز الى تشرين الاول.

١٧٦٢٠ - ظلم مستن

Stevia serrata, Piqueria trinervis (S). Stévia dencolée (F).

حشة عمرة زيبية حمرية تطول نحو ٥٠ سم. ساقها وفروها خلية الساء. اوراقها متماثلة، نصلا ساني الشكل، مالى البشرة، سنن الحافة. انزادها حر. انزادها يستمر من تموز الى ايلول.

١٧٦٢١ - ظليبات

Solifuges (F).

رتبة من المنكبويات ترطب في الظل وتخشى الشمس.

١٧٦٢٢ - ظليل

Umbraticole (F).

نمت ترعفي يطلق على كل حشرة تعيش في الظل وعلى كل نبات ينمو في ظل غيره.

١٧٦٢٣ - ظليل

Pénombre (F).

Penumbra, Semi-darkness (E).

هو الظل الخفيف او شبه الظل الذي يحوق بالظل.

١٧٦٢٤ - ظلم، عشق، عشق

Autruche (mâle) (F). Ostrich (male) (E).

ذكر النامج اظلمة وظلان. يقال عار الظلم حراراً اذا صوت.

١٧٦٢٥ - ظلمع

شجرة على صورة اللبل. وهي ايضاً شجرة التين في لغة طيو. الراسدة ظلمة أو ظلمة. وينهم من قال شجرة الباق.

١٧٦٢٦ - ظلمعة ذهنية الورق

Castanopsis chrysophylla (S).

Castanopsis à feuilles dorées (F).

شجرة حمرية وفريضة من فصيلة السوليات. ساقها غليظة صلبة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. يحكلها دالح الثورن. اوراقها تطول من ٨ الى ١٨ سم. وترس من ٢ الى ٤ سم. نصلا جرداء لامعة، صفحتها العليا الى الخضار الزيتي صفحتها السفلى الى الصفار الذهبي. ثمارها قروية الشبه بالكستنة لكنها بطيئة النمو لا تنضج الا بعد مرور سنين كاملين.

١٧٦٢٧ - ظلميان

شجر ينبت بنجده يشبه القوط (السان) والقرظ هو السط البري.

١٧٦٢٨ - ظنابكة

Lamprina (S).

Lamprime (F). Lamprime (E).

جنس حشرات غاشية من عذبات الاجنحة صفيميات للقرون وظيفية المنظريات. انواعها المعروفة قليلة الممد



ظنبار عشقاري النقط



ظنبة الترنفل



ظنبة السيسم



تجمع المكان في لحاء سوق الأشجار يفتتح فيها ويجعلها ويصلها || أشهر أنواعها وأهمها انتشاراً قطعة المنزلة .

١٧٦١١ - **ثَنِيْبَة مُزَرَّكَة** *Emphytus cinctus* (S).  
*Emphyte cinct* (F).

نوع من الثنوب . ثوبها إلى السرة السوداء يطولها زئير أصفر || يرقاتها شديدة الأذى تعيش على سوق الثنات تستخرج اللحاء والشكير .



ثنوب اسطواني

١٧٦١٢ - **ثَنُوبُور** \* *Pleurodelus* (S).  
*Pleurodela* (F). *Pleurodelus* (E).

ظهور هو الاسم للفرني القليل . جنس حيوانات ضئيلة قاذبة من السرفويات وصيلة السمندليات . أنواعه المروفة قليلة العدد أصلاتها بعض مناطق إفريقية الشمالية أعصها القرب || أجسامها مستطيلة الشكل ، تطول من ٢٠ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقلطمة ، فيه مقطعية الإخطام . أذنيها سننة أطوار الثنبي قليل التشو . أذنيها مستطيلة ، رفيعة ، سننة الحار العلوي . أنثيا مزركة وستجة وبذجة || تألف اللاتق وكندران والأعوار . قنبا اللبدان والبلاصيط والحوم التي تغلف في وجه الماء .



ثنوب الغلاب

١٧٦١٣ - **ثَنُور** هو الجانب القصير من الريش .

١٧٦١٤ - **ظَهْرَاكَة** *Epithellum* (F). *Epithellum* (E).  
كل نسج مكون من حبيبات أو خلايا صليحية التجميع تكلف أو تبطن الأجزاء الحية .

١٧٦١٥ - **ظَهْرَاكِي** *Epithelial* (F). *Epithelial* (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالظاهرة .

١٧٦١٦ - **ظَهْر** *Dors* (F). *Back* (E).  
هو الجانب العلوي المقابل للبطن عند الحيوان يمتد من الحاركة إلى الكفيل .

١٧٦١٧ - **ظَهْر ، ظَهْرَان** *Elytra* (F). *Elytron* (E).  
الظفر هو الندة الخشبية للفرني التركيب الذي يلفح جناح الحشرة من غشيات الإجنطة . وهما ظفوران وظفوران وبها في المصص من اجنطة الجراد ما حفرته : وقاليلطان يقال لها الظفوران والرفيقان يقال لها الثنران .



ثنوب بحري

١٧٦١٨ - **ظَهْرُ الْأَسَد**  
ظهر الأسد يجتر من كوكبة الأسد الأصفر .

١٧٦١٩ - **ظَهْرَاكَة** *Tortus* (F). *Tortosa* (E).  
هي السلخانة ، أطباقا .

١٧٦٢٠ - **ظَهْرِي** *Dorsal*  
نمت وصفي يطلق على كل ما له صلة بظهر الحيوان .

١٧٦٢١ - **ظَهْرِيَّات ، ظَهْرِيَّات** *Ficolidae* (S). *Ficolidae* (F). *Mesembryanthemaceae* (F).  
*Ficolidae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أجسامها وأنواعها المروفة نداء ٨٠٠ مظهرها بري وبسها لحي وزراعي وربي . أعرف أجسامها الظهرية .



ظهور

١٧٦٢٢ - **ظَهْرِيَّة ، ظَهْرِيَّة** *Mesembryanthemum* (F). *Ficolide* (F).  
ج ظهائر . الاسم العلمي من اليوناني بمعنى زهرة مستصف

البار أي زهرة الظهر . جنس نباتات عشبية ليفية لحمية

نصلها || مظهر الخارجي يقع صخرة مستديرة ظاهرها نحو ٤ م . تركيب نصل الأوراق تنقضي على النجج المنحارة التي ليس وتنحت || يكافح عند ظهوره بانقطاع الأوراق الموصونة وينفخ الثنيل بأحد القرواير القعالة .

١٧٦٢٤ - **ظَنُوب** *Tibia* (F). *Tibia* (E).  
الظنوب عند الحشرات العضو المستقيم الكائن بين الفخذ والرسغ . ويعدى الساق .

١٧٦٢٥ - **ظَنُوب** *Machilis* (S). *Machile* (F).  
جنس حشرات دابة من فصيلة الظنوبيات . أنواعه ضئيلة جميعها خاضعة ودائمة تعيش على القبل ولحاء الأشجار للمقطوعة . أجسامها حشرية الجلد ، مغزلية لشكل تطول من ٧ إلى ١٦ م . | أعرف أنواعها وأهمها ما يلي :

١٧٦٢٦ - **ظَنُوبُ اسطواني** \* *Machilis cylindrica* (S). *Machile cylindrica* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ٨ و ١٢ م . جسمه اسطواني الشكل ، ثوبه إلى الأصبهة المابقة الخطية الملوح . يتكرر في البيض والأندال وسياجات الجنائن . يعيش على المواد العضوية السائرة إلى الإختلال وعلى لحاء النباتات اليابسة والمقطوعة .

١٧٦٢٧ - **ظَنُوبُ الغلاب** \* *Machilis polyode* (S). *Machile polyode* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ٩ و ١٢ م . ثوبه إلى الأصبهة يطولها موج أشع ويضع سمر جانبة . ملامحه وزبانه وقرواير وأسراكه مخزبة بالأبيض || يتكرر في الغابات والأحراج . يعيش على القبل وجميع المواد العضوية السائرة إلى الإختلال .

١٧٦٢٨ - **ظَنُوبُ بحري** \* *Machilis maritima*, *Petrobius maritimus* (S). *Machile maritima*, *Petrobius maritima* (F).  
نوع من الظنوب طوله يراوح بين ١٠ و ١٤ م . ثوبه إلى السمرة السفعاء الملوح ، زبانه وقرواير سوية اللون الخطي القامق . أسراكه مخزبة بالأبيض || يتكرر قرب الشواطئ البحرية وفي الجرف وعلى سفوف الأنهر .

١٧٦٢٩ - **ظَنُوبِيَّات** \* *Machilidae* (S). *Machilidae* (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ظاهرات المك . أجسامها وأزواجها عديدة تتميز بأجسامها المردنية الشكل . أنثاها وتكاثرها وبسها الكبيرة كوكبة اللد ، ثوبها ظفورية التركيب . جواشها عديدة . راجعها مستطيلة ، حلقاها مستعرضة . أطرافها الصربية ثلاثية الزوائد الذيلية ، مستطيلة الأطوار الدقيقة الذرية || أشهر أجسامها الاقتصادية الظنوب .

١٧٦٣٠ - **ظَنُف** *Emphytus* (S). *Emphytus* (F).  
الواحدة ظنفة . جنس حشرات مؤذية من فصيلة المشاريات ورتبة غشائيات الإجنطة الاسريات . أنواعها المروفة نحو ٣٠ منتشرة في الشرق الأوسط وأروبية وإفريقية الشمالية || أجسامها صغيرة مستطيلة تطول من ١٠ إلى ١٢ م . يسلها قزاح من ١٨ إلى ٢٠ م . أنثاها إلى المواد الختلف المماجات وسها الممضة والمزرة بالأبيض والأصفر || أنثاها أكبر قدماً من ذكورها وتكثر بمرزاتها المنشارية . أجسامها الحولية تلوح من اثنين إلى ثلاثة ||

نحو ٢٥ م. سطحها أخضر اللون ، اغبر المواج ، زهرتها  
هامية الارتكاز ، قرمزية اللون ، قطرها نحو ١٠ م.

### ١٧٦٦٠ - ظهوره تليسية

Mes. testiculare, Argyroderma roseum (S). Ficoide  
testiculare (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل حلالية الشكل او  
تليسية طويلا نحو ٥٠ م. عرضها ٣٥ ومماكبها ٢٥  
سطحها يجرى اللون مبهر الزغب . انزهارها وردية اللون .  
اريجوانية المواج . قطرها نحو ٢٥ م || انزهارها شوي .

### ١٧٦٦١ - ظهوره تشمينة

Mes. gaminum, Gibbacum gaminum (S). Ficoide  
jumelee (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها غروبية الشكل توامية  
التجميع تطلو نحو ١٥ م. انزهارها صغيرة القند ، قرمزية  
اللون || انزهارها يستمر من آذار الى ايار .

### ١٧٦٦٢ - ظهوره ثنائية اللون

Mes. bilobum, Derenbergia biloba (S). Ficoide bi-  
lobée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة تملو نحو ٤ م. تركب من  
قرص جلعي تملو ثلثتان مفلطحتان متسدتان القاعدة  
تتوسطها زهرة جملة ، كبيرة القند ، صفراء اللون . اما  
القلعة فخرية اللون ، ثنائية التجميع الطري || انزهارها  
تستمر طوال تشرين الاول والثاني .

### ١٧٦٦٣ - ظهوره حشيشية

Mes. calculus, Conophytum calculus (S). Ficoide-  
calicou (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة حشيشية الشكل سطحها  
مالس البشرة ، أخضر اللون ، احر المواج . طويلا نحو  
٣ م. تملوها زهرة صفراء اللون قطرها نحو ١٢ م.  
نفرتها تقوم من آب الى تشرين الاول .

### ١٧٦٦٤ - ظهوره عذرونية

Mes. turbiniforme, Lithops turbiniformis (S). Fi-  
colde en toupie (F).

نبته تريينية شاذلة . جلجها فتلة تملو وترفع نحو ٢٥ م.  
سطحها مالس البشرة ، احر اللون . حشايها اغشيش وبدي .  
نفرتها هامية الارتكاز، صفراء اللون ، قصيرة الاذن ،  
قطرها يراوح بين ٣٥ و ٤٠ م .

### ١٧٦٦٥ - ظهوره مخليية

Mes. velutinum, Gibbaea velutinum (S). Ficoide  
veloutée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها ناعشة ، مثلثة الشكل ،  
خلية النصل ، طويلا الاكبر نحو ٩ م. انزهارها مسطوية  
الاجن ، بيضاء اللون ، قطرها نحو ٥ م || انزهارها  
يستمر من آذار الى نيسان .

### ١٧٦٦٦ - ظهوره خيمية

Mes. umbellatum, Ruschia umbellata (S). Ficoide  
en ombelle (F).

جملة تريينية جاذلة تملو نحو ٩٠ م. اوراقها متقابلة ،  
متصالبة ، اصصية الشكل ، لولائية الزوايا ، تطلو نحو  
١٦ م. تصلها أخضر زاه || انزهارها خيمية التجميع ،  
بيضاء اللون ، صغيرة القند || انزهارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

برية وزراعية من فصيلة الظهريات . انزوا نحو ٣٠٠  
سطحها من النباتات الافريقية المنبت . اوراقها غريبة  
الاشكال المختلفة الحبة والقدر . انزواها كبيرة القند وردية  
اللون او مرجانية واريجوانية وصفراء || اكثرا من النباتات  
لعمرة وبضها يحول وسولي . اشهرها ما يتبع .

### ١٧٦٦٣ - ظهوره ٥

Anserina (S).  
Anserina (F). Anserina (E).

جلس حيوانات بحرية من العروجات مبدات الازبل  
وفصيلة الدلافين . انواعها الممارسة المعروفة قليلة العدد  
اعطانا البحر الابيض المتوسط والخليج الاطلسي || اصداها  
شبه وسمية الشكل مستعرضة الجناح الايمن الثنائي الزوائد  
الرقمية الشكل || اجسامها حلزونية ، رؤوسها مستطيلة ،  
مقطوعة ، ثنائية القراس المميبة . لياها مسطوية دقيقة .  
ارجلها بيضية التواء يملوا اسطاط قرينة المادة .

### ١٧٦٦٤ - ظهري

الظهي نبات شبه القبار او الكبر (محيط المحيط) .

### ١٧٦٦٥ - ظهوره ارجوانية

Mesembrian-  
thamum coccineum (S). Ficoide écarlate (F).

جملة تريينية فرعاء تملو نحو ٨٠ م. جلجها وفروصا  
دقيقة . اوراقها صغيرة القند ، تصلها الى الخضار الازرق  
اللامع . انزواها ارجوانية اللون قطرها نحو ٤ م.  
انزواها يستمر طوال الصيف .

### ١٧٦٦٦ - ظهوره ألوية

Mes. aloides,  
Nananthus aloides (S). Ficoide-Aloide (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل الوية الشكل ، وسمية  
التجميع ، سطحية الصفة ، غشراء اللون ، تطلو نحو  
٥ م. انزواها قصيرة الاذن ، صفراء اللون ، ارجوانية  
المواج ، قطرها نحو ٢٥ م. || انزواها يستمر من آب  
الى ايلول .

### ١٧٦٦٧ - ظهوره بترية

Mes. tigrinum,  
Foucarla tigrina (S). Ficoide-Tigre (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . اوراقها قتل وسمية بيضسة  
الشكل ، مسنة الحافة ، تصلها الى الخضار البشري  
يملو تجلج نبي يحته اطار احر . انزواها متوسطة الاذن ،  
كبيرة القند ، قطرها يراوح بين ٥ و ٧ م. لونها الى  
الاحمر المرجانية || انزواها يستمر من آب الى تشرين  
الاول .

### ١٧٦٦٨ - ظهوره بلورية ، حشيشة البيلور

Mes. crystallinum, Cryophytum crystallinum (S).  
Ficoide glaciale, F. cristalline, Herbe à la glace,  
Glaciale (F). Ice plant, Diamond ficolées (E). Eis-  
kraut-Mitagsblume (D). Cristallifolée, Diacloide,  
Erbs cristallina (I).

حشة برية وزراعية صنعتية يستخرج من عصارة اوراقها  
الملاح تقوية تدخل في صناعة البلور || اوراقها كبيرة  
القند ، ناعشة ، متصعبة للنصل الكثيف الحلييات البلورية .  
انزواها صغيرة القند ، بيضاء اللون ، خفيفة البات .  
انزواها يستمر من نموز الى آب .

### ١٧٦٦٩ - ظهوره بتييفية

Mes. oviforme, Oophytum oviforme (S). Ficoide  
ovoidée (F).

نبته تريينية شاذلة مقررة . جلجها فتلة بيضية الشكل تملو



ظهري بلورية

أسطوانية ، مقطوعة ، عادية الحب . أزهارها صغيرة القذ  
قصيرة الاذن ، أبوية الارنكاز ، يبيض اللون || تستعمل  
كالتسليك وفي مدة ليول تقييد المدة وصر الحقم .

### ١٧١٧٤ - زهرة قارية

Mes. murinum, Scaevola murinum (S). Ficoide  
souris (F).  
نبت زينة شاذلة مقررة . أزهارها قتل غارية الشكل  
مسنة الخمار ، رديانة اللون || زهرتها مسكة العرف ،  
مضادة القذ ، لنها الى الصفرة الباهتة || أزهارها صبي .

### ١٧١٧٥ - زهرة قنفذية

Mes. echinatum, Delosperma echinatum (S). Ficoide  
hérisson (F).  
بجلة زينة قنفذية الشكل تملو نحو ٣٠ سم . أزهارها  
أسطوانية تطول نحو ١٣ م . قواعدها مهدبة شائكة ،  
نصلها طليعية البشرة ، زبها الحليات || أزهارها فردية  
التجميع ، يبيض اللون ، صلبة القذ ، قصبة الاذن .  
أزهارها يستمر طوال السنة .

### ١٧١٧٦ - زهرة مضمرة

Mes. edule, Carpobrotus edulis (S). Ficoide-figue  
F. comestible, Figular des Hottentots (F). Hottentot  
fig, Sour fig (E). Hottentotzenfeige (D). Fico degli  
ottentotti (I).  
بجلة زراعية مأكولة الأثر ، تملو نحو ١٠٠ سم . قواعدها  
فردية . فروصها مسطحة مستطيلة غائرة . أزهارها متقابلة ،  
متشاككة ، أصبعية الشكل ، ثلاثية الزوايا . مسنة  
الخمار تطول من ٨ الى ١٢ سم . || أزهارها كبيرة القذ  
قطرها نحو ١٠ سم . لنها الى الصفار الباهت يملو موالج  
وردي . ساقها شفعية التجميع مدحما يراوح بين ١٢ و ١٤ .  
أزهارها جوزية الشكل ولقدها مأكولة سكرية الطعم .

### ١٧١٧٧ - زهرة مقطوعة

Mes. truncatellum, Conophytum truncatellum (S).  
Ficoide tronquée (F).  
نبت زينة شاذلة . بجلها قلة كروية الشكل مقطوعة  
القاعدة قطرها نحو ١٢ سم . سطحها اخضر اللون مزركش  
بالجلودي . زهرتها صفراء ، قطرها نحو ١٥ م . || أزهارها  
يلوم من آب الى تشرين الاول .

### ١٧١٧٨ - زهرة مشككدة

Mes. rostratum, Chiridopsis rostrata (S). Ficoide  
à bec (F).  
نبت زينة شاذلة مقررة . أزهارها قتل مقررة قذية  
التجميع ، لا تليافية الحقم ، حلقة الخمار ، البشري  
مهدبة الخمار . زهرتها فردية ، مسطحة الاذن ، كبيرة  
القذ صفراء اللون ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٠ سم .  
أزهارها رديي .

### ١٧١٧٩ - زهرة نسيكة

Mes. nobile, Pleiospilos nobile (S). Ficoide noble (F).  
نبت زينة شاذلة مقررة . أزهارها قتل فسية التجميع  
عززية الشكل . نصلها حلق الخمار البشري ، ابر  
الخمار ، يطول نحو ٥ سم . زهرتها مهدبة ، كبيرة القذ ،  
صفراء اللون ، قصيرة الاذن ، قطرها نحو ٥ سم .  
أزهارها غريبي .

### ١٧١٨٠ - طواجر

Météores (F). Meteors (E).  
جميع الحوادث الطليعية الجوية المرتبط زهرتها كالمسافة  
والبرق وقوس قزح والمطر والثلج والبرد الخ .

### ١٧١٦٧ - زهرة دجيرة

Mes. noctiflorum, Aridaria noctiflora (S). Ficoide  
nocturna (F).  
بجلة زينة فردية فراء تملو من ٥٠ الى ٨٠ سم . أزوارها  
أهلالية الشكل تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . نصلها الى  
الخضار البحري الاحمر الموالج || أزوارها دجيرة  
الانتيلاج ، يبيض اللون ، فواحة العرف البشري . قطرها  
يراوح بين ٢٠ و ٤٥ م || أزوارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

### ١٧١٦٨ - زهرة رؤسية

Mes. capitatum, Conicosia capitata (S). Ficoide à  
rosette, F. à fleurs capitées (F).  
بجلة زينة مسرة تملو نحو ٣٠ سم . أزوارها أصبعية  
الشكل ثلاثية الزوايا تطول من ١٢ الى ١٨ سم . نصلها  
الى الرتبة الضلابة . أزوارها رؤسية ، قطرها نحو ٥ سم .  
لونها الى الصفرة اللطيفة || أزوارها يستمر من عوز  
الى آب .

### ١٧١٦٩ - زهرة زعفرانية

Mes. croceum, Hymenocyclus croceus (S). Ficoide  
safranée (F).  
بجلة زينة تملو نحو ٦٠ سم . ساقها فراء متشعبة ، أزوارها  
متقابلة ، أصبعية الشكل ، ثلاثية الزوايا ، قصيرة القذ ،  
باهتة الخضار ، سمراء الخمار || أزوارها فردية التجميع  
قطرها نحو ٣ م . لنها الى الصفرة الزعفرانية || أزوارها  
يستمر طوال الخريف والشتاء .

### ١٧١٧٠ - زهرة شاككة

Mes. spinosum, Ebaranzia spinosa (S). Ficoide  
épineuse (F).  
بجلة زينة فردية فراء تملو نحو ٦٠ سم . بجلها وفروصها  
شاككة . أزوارها قتل صغيرة تطول نحو ٢ م . نصلها  
بحري اللون تملو رشفة سمراء || أزوارها صغيرة القذ ،  
وردية اللون ، صفراء الموالج || أزوارها رديي .

### ١٧١٧١ - زهرة مكبة

Mes. validum, Cephalophyllum dsaime (S). Ficoide  
robusta (F).  
بجلة زينة بجلها يطو من ٣٠ الى ٦٠ سم . أزوارها  
أسطوانية الشكل تطول من ٥ الى ٨ سم . لنها الى الخضار  
الزاهي تملو نشفة فسية دقيقة || أزوارها وردية اللون ،  
متوسطة الحجم ، دقيقة الاذن التي يراوح طولها بين ٥  
و ٨ م . || أزوارها يستمر من حزيران الى آب .

### ١٧١٧٢ - زهرة عطرية

Mes. fragrans, Gnotophyllum fragrans (S). Ficoide  
parfums (F).  
نبت زينة شاذلة مقررة . أزوارها قتل لا تليافية الحقم  
يصلب فيها الشكل اللثاني . طواجر يراوح بين ٥ و ٧ سم .  
عرضها من ٢ الى ٣ سم . وساقها نحو ١٢ م . زهرتها مهدبة ،  
قصيرة الاذن ، كبيرة القذ ، صلبة العرف ، قطرها  
يراوح من ٨ الى ١٢ سم .

### ١٧١٧٣ - زهرة عقدية \* ، مكبة ، عكسول

Mes. nodiflorum (S).  
مصري  
Ficoide à nœuds fleuris (F). Egyptian fig-marigold (E).  
Aegyptisches kalikraut (D). Erba del nodiflori (I).  
عشبة برية تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . منها البراب ،  
مهدبا شواطئ البحر المتوسط ، فروصها غائرة . أزوارها



زهرة مقدية

بعض مناطق أفريقية الجنوبية . سيقها جلمووية مدادة أو مكشكة فوصية الشكل . أوزانها سيقية اتصال ، مزدوجة التصليف . أزهارها سداسية البتلات الثلاثية متساوية الحجم ، ثلاثية الاسدية ، عديدة الألوان . تزهر أقرين في الحدائق والمراكن || أنوعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

#### ١٧٦٨٩ - فلوبرة نكاسية اللون

*Moraea bicolor* (S). *Moraea bicolore* (F).  
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يرتفع من ٣٠ إلى ٩٠ سم . أوزانها عديدة ، ضيقة اتصال ، جميلة الخضار الأس . أزهارها كبيرة القذ ، قطرها نحو ٥ سم . لونها أصفر وأبيض || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٧٦٩٠ - فلوبرة شراغية

*Moraea spathacea* (S). *Moraea à spathe* (F).  
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يرتفع من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . وقتها واحدة سيقية التصل البشري الخضر . أزهارها صفراء اللون . حطرية العرف || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

#### ١٧٦٩١ - فلوبرة طرويسية

*Moraea pavonia* (S). *Moraea peon* (F).  
نوع من الفلوبرة . جلمووها فوصي الشكل . شراغها يرتفع من ٣٥ إلى ٦٠ سم . وقتها واحدة سيقية التصل المزج . أزهارها حراء اللون يملوها عند قواعدها بتقريب أسود غضب بالأزرق والأخضر || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

#### ١٧٦٩٢ - فلوبرة مهدبة

*Moraea ambricia* (S). *Moraea frangée* (F).  
نوع من الفلوبرة . جلمووها مداد . شراغها يعلو من ٢٥ إلى ٤٥ سم . أوزانها عديدة ضيقة اتصال الجامعة المهدبة الخلف . أزهارها متدلة الخيم . قطرها نحو ٤ سم . لونها إلى البليكي الزاقي || تنورها يستمر طوال شهر أيار .

#### ١٧٦٩٣ - فلوبرة

دعامة تبنى إلى جانب حائط ليعم عليها .

#### ١٧٦٩٤ - فلوبرة

*Gymnosporangium* (S).  
جنس فلوبرة مجهرية من فصيلة السحاليات تتميز باستقلالها التطوري وبانتفاء البتلات المتحارة التي تصطب في كل طور . لين هي تتقلل حل الورديات في طورها الأبدى إذ بها تتقلل حل حريانات البور في طورها النهائي . طورها الفلوري لا نظامي الإعداد وقد يعلو عدة أسابيع . مطورها الخالص يقع مستدرة ثم شائلي لولية الشكل لا قياسية التصنيع غلامية للمادة المتخلطة . شبيها الفطري يعيش ويتكاثر حل خلايا السج النباتية || أنوعها المؤدية عديدة أشهرها اقتصادياً ما يلي :

#### ١٧٦٩٥ - فلوبرة الإجماع

*Gymnosporangium sabinae*, *Rostelia cancellata* (S). *Rouille grillagée du poirier* (F). *Pear rust* (E). *Birnenstecher* (D).

فطر مجهرى يصيب الإجماع والرمز والزرايب والأجل فيؤذي الأوراق والانتاد والآبار || مطهر الخاربي حل الأوراق ، في طوره الأبدى ، بقع مستدرة قطرها راوح

١٧٦٨١ - فلوب هو صلح التيس حة المياج .

#### ١٧٦٨٢ - فلوب

*Alstromeria* (S). *Alstromère* (F). *Alstromeria* (E).  
جنس نباتات عشبية سبروتية من فصيلة الفرجسيات . مهدا بعض مناطق أمريكا الجنوبية . سيقها موزة . أوزانها مسطيلة اتصال . أزهارها قمية الشكل ، متباعدة الايران الزاوية || تزهر أقرين في الحدائق وضمن البيت . ترب في الاتربة المنسوبة للتركيب التصري الفلوري المواد الغذائية الضوية والمعدنية || أنوعها المعروفة عديدة ، أشهرها التالية :

#### ١٧٦٨٣ - فلوب برتقالية

*Alstromeria aurantiaca* (S). *Alstromère orangée* (F).  
نوع من الفلوب منهاها الشبل واليربو . شراغها مصب يرتفع من ٦٠ إلى ١٢٠ سم . أوزانها مسطيلة اتصال الضيقة ، عابقة الخضر في الصفحات العليا ، بحريه في السفل ، تطول من ٧ إلى ١٠ سم . وتعرض نحو ١٥ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها يرتقالية اللون || تنورها يستمر من حزيران إلى آب .

#### ١٧٦٨٤ - فلوب حراء

*Alstromeria homantha* (S). *Alstromère rouge sang* (F).  
نوع من الفلوب . منهاها يمتد من الشبل إلى البرازيل . شراغها مصب يرتفع من ٩٠ إلى ٩٠ سم . أوزانها مسطيلة ، ضيقة ، تطول من ٨ إلى ١٢ سم . وتعرض من ١٢ إلى ٢٠ سم . نصالحا بحرية الخضر حل الصفحتين العليا والسفل . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها إلى الحيرة المابتة السعدا || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

#### ١٧٦٨٥ - فلوب وشيكة

*Alstromeria pulchella* (S). *Alstromère élégante* (F).  
نوع من الفلوب . منهاها بلاد المكسيك . شراغها مصب يرتفع من ٥٥ إلى ٩٠ سم . أوزانها مسطيلة الشكل تطول من ٨ إلى ٢٥ سم . وتعرض من ٢ إلى ٣ سم . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها ودية اللون يملوها بتقريب اخر يخالطه الأصفر || تنورها صهي .

#### ١٧٦٨٦ - فلوب مكشكة

*Alstromeria varicolor* (S). *Alstromère varicolore* (F).  
نوع من الفلوب . منهاها بلاد الشبل . شراغها مصب يعلو من ٢٥ إلى ٥٠ سم . أوزانها شبه نهطية الشكل مسطيلة القذ . أزهارها صيرالي التصنيع . أزهارها صفراء اللون يملوها تميز أربوبي يتخلله الأبيض والبرتقالي . وفي قمية الشكل ، تطول نحو ٣ سم . || تنورها يستمر من حزيران إلى تموز .

#### ١٧٦٨٧ - فلوب

الفلوري من البئر هي الضجة (التاج) .

#### ١٧٦٨٨ - فلوبرة

*Moraea* (S). *Morée* (F). *Moraea* (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السجونييات . مهدا



فلوب



فلوبرة الإجماع

الجزء تملأ شمع النصل ويعرقه على صفحته السفلى وتبقى على حالها الى ان يكتمل دورها الايدي الذي يطول بنفسه ايام ثم تدخل في طورها اللدائي فيبلغ طول حاملها نحو ١٥ سم وهو على الانثى واغصان الثآليل ينمو قريبا لونها الى السمره تطيب اللحاء والبشرة وتشوه الثآليل وتقلها . يكافئ كاسر طور النظرة .



نظرة التفاح



نظرة الزعرور

#### ١٧٦٩٩ - نظرة الورديات \*

*Gymnosporangium juniperi-virginianae*, *Rozella pyrata* (S), *Rouille des rosacées cultivées* (F).

نظر مجهرى واسع الانتشار خاصة في امريكا الشمالية حيث يتطفل على جميع نباتات الفصيلة الوردية || مظهره الخارجى على الفروع والانتاد يقع قريبا منقبة لا نظمية الترتيب تركيب اللحاء فضطبه وتلبس الثآليل واللباس . وهو على الاوراق يقع لا قيسية الشكل والحجم تركيب النصل على صفحته العليا بين المروق والنصل . تبدو صفراء اللون ثم تتحول الى الحصى وتطرح بالنصل فتضده وتتقده الى الانتفاخ على ذاته الى ان يذبل ويتس . يكافئ مكانسة نظرة الاجناس .

١٧٧٠٠ - ظليان بقية السمل في الخلية .

١٧٧٠١ - ظليان هو الملى الضيقة الورق ، اطليا .



نظرة الورديات

#### ١٧٧٠٢ - ظليكميات \*

*Gymnosporangium* (F), *Gymnosporangium* (E).

نظرة من الحيوانات الطليعية ظاهرات الشرج . فساكتها وانجاسها عديدة مظهرها مجرى وبعضها يعيش في الماء البذبة || انواعها عادمة البذبة . لوانها دائرية الانتشاب صنية الارتكاز .

#### ١٧٧٠٣ - ظليون \*

*Curculigo* (S).

*Charançon* (F), *Curculigo* (E).

جنس نباتات شجية معمرة دوفية الجلود من فصيلة النرجسيات . مظهرها بعض مناطق الشرق الاقصى انجاسها جليا . اوراقها كبيرة ، جلدية الانتشاب تطول من ٢٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ١٥ الى ١٨ سم . نصالها جملة الخضر اللامع . لوزارها صويالى تنجيم . انزاعها صفراء اللون او يضاء او ثنائية الخضر || انواعها المعروفة ثلاثة لا فارق بينها سوى لونها الانزاع وحجم الاوراق || تزود الزين في الخلدات فقط .



ظليون

بين ١٠ و ١٥ م . مبشرة ، لاقسية التنجيم ، حواء اللون ، يرتقالية الحافة تركيب النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة السفلى يقع بنفس الحجم لونها الى الصفار الداكن . ومنه اكبال هذا الطور الذي يبلغ تمامه نظرف سبعة ايام او ثمانية يتنقذ الطور الحصى الذي تبصر عنه الصائيل النولية الشكل الى تملأ البقع الحمر يندوم نحو ثلاثة ايام ثم يذبل بعد ان يتصلب لونه الى الجزرة فاسمره وبعد ان يفرح النسل المتنامة ويضي عليها || يكافئ باستمال سائل يورود المركز ٠,٠٦ ٪ . يضاف اليه كلس حراق يمدد ٠,٠٨ ٪ او سائل يورود المركز ٠,٠٦ ٪ . يضاف اليه ٠,٠٣ ٪ من سلفات الحفيد .

#### ١٧٦٩٦ - نظرة الايكيدنيا \*

*Gymnosporangium confusum*, *Rozella mespiti* (S), *Rouille du néflier* (F).

نظر مجهرى يتطفل على الايكيدنيا والبقيريل فيحطب الاوراق ويذوق الثآليل || مظهره الخارجى ، على الاوراق ، يقع مستدرة يرتقالية اللون سمر الخضر تملأ النصل على صفحته العليا تنجيمه وترفع البشرة فتضد ككل دامة اسطوانية طولها نحو ٥ م . تنجبر عنه ادراكها الى مدة قدد || وهو على الثآليل يقع قريبا منقبة لونها الى السمره العابقة تشوه الثآليل وتطليا يسه ان تمرق مير نموا . يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية عند الانزراع .

#### ١٧٦٩٧ - نظرة التفاح \*


*Gymnosporangium juniperinum*, *G. tremelloides*, *Rozella penicillata* (S), *Rouille griligée du pomier* (F), *Scam gall of mountain juniper* (E), *Apfelrost* (D).

نظر مجهرى يصيب التفاح والاجناس والبقيراء . مظهره الخارجى على الانتاد والانتان يقع قريبا لا قيسية الشكل تملأ اللحاء ترفع البشرة وتغيرها وتطليا || وهو على الاوراق يقع مستدرة لونها الى الجزرة تملأ النصل على صفحته السفلى تنجيمه وترفع البشرة الى قبي كالدامة الاسطوانية طولها يراوح بين ٤ و ٦ م . ثم تنجبر الى عدة قدد حلزونية الشكل || يكافئ باستمال السوائل السلفوكسية قبل الانزراع ومنه اكباله .

#### ١٧٦٩٨ - نظرة الزعرور \*

*Gymnosporangium clavariaeforme*, *Rozella lacesta* (S), *Rouille de l'aubépine* (F).

نظر مجهرى يتطفل على الزعرور وبقه يصيب الاجناس . مظهره الخارجى على الاوراق ، يقع مستدرة لونها الى



ع



عاجة

Eburna (S).

Eburne (F). Eburna (E).

جلس حيوانات بحرية مفرسة من الرخويات مديات الاصل  
وفصيلة الطحريات. انواعها المعروفة قليلة المدة منتشرة  
في بعض بحار البلاد الحارة || اصداؤها مسماكة مألوفة  
كالملح، لينة، بيضاء اللون، وردية الموضع، يملؤها  
تبيج جوي أو عثالي وفي قروية الشبه من البق، بطينة  
القاعدة والوسط، حلزونة القالب المذهب || شائعة الاستعمال  
الصناعي.

١٧٧١٢ - عاجة \*

Caducue (F).

Deciduous (E).

المائل اسم حال يطلق على النبات الذي تسقط اوراقه  
كل سنة || والمائل هو تلك الاوراق المنتشرة الساقطة.

١٧٧٠٥ - عاتق

العاتق : فرخ الطائر اذا طار واستقل وقيل العاتق فوق  
الناقص وهو الذي يتحسر من ريشه الاول وينت له  
ريش جلدي اي قروي.

١٧٧٠٦ - عاتق الثريا

Aelk

عاتق الثريا نجم لير من كوكبة سيانس.

١٧٧١٣ - عاجيز عن الوقاء، مخدّم، مغعير،

محلقي Insolvable (F). Insolvent (E).

هو من عاجز عن وفاء ديونه.

Ada (S). Ade (F).

١٧٧١٤ - عادآه

جنس نباتات عشبية إسمية معمرة من فصيلة السحليات.  
انواعها المعروفة قليلة جميعها برية ورّ ينية. اروساتها  
اسطوانية أو مخروطية، حشيتة، تطول نحو ١٠ سم. اوراقها  
من اثنين الى ثلاث وفي قروية الانشباب ضيقة النصل  
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم. وتعرض نحو ١٠ م. ازهارها  
عنقودية التجميع، ارجوانية اللون، سواد التجميع، تركيز  
على شراخ يملو من ٢٥ الى ٣٠ سم. ازهارها يستمر من  
شباط الى نيسان.

Aglypha (F).

١٧٧١٥ - عادّم الأعدود

نمت تمريني يطلق على كل حية غير سامة مألوفة الملائم  
العامة للتفديد.

Adactyle (F).

١٧٧١٦ - عادّم الأصابع

نمت تمريني يطلق على بعض القشريات عديمات الملاقط.

Damarieuse (F).

Beet thinner, Thinning machine, Gapper (E).

معمل ميكانيكي يقطع في سيرة ما زاد من النبات عن المعدل  
المفروب فيه. وهو يستعمل في الزراعات الكبيرة.

Infertile (F).

Infertile, Unfruitful (E).

١٧٧٠٨ - عاتكة

الشجرة التي لا تأتير.

Antimite, Micide (F).

Mite-Killer, Micide (E).

١٧٧٠٩ - عاتوك

كل مادة من شأنها ابعاد الميث او القضاء عليه تدعى  
عاتوكاً.

Rigole (F).

Trench, Channel, Duct (E).

١٧٧١٠ - عاتلور

جرى الماء حفر له في التربة. ج. عواتير.

Ivoire (F).

Ivory (E).

١٧٧١١ - عاج، صنجاج، مسك

انياب الفيلة او عظام اتيانها.

17731 - عاكسية ، قيرفيس Prêt (F). Loss (E).  
مقد يدفع به اللز إلى غيره متقلوا أو حيا أو شيئا ميتا  
بنحوه ليستسلمه زينا محبوا ثم يرد .

17732 - عاكسية الاستعمال Prêt à usage (F).  
Commodatus (E).

في دفع شيء إلى المستير ليستسلمه ثم يرد يمينه بلا  
مقابل .

17733 - عاكسية الاستهلاك

Prêt de consommation (F).  
توايها ان المير ينقل ملكية العين المارة إلى المستير  
ليستهلكها في منامه ويرد شلها في زمن معين .

17734 - عاكول Isolant (F).  
غير ناقل للكهرباء . Isolating (E).

17735 - عاكول Isolateur (F). Insulator (E).  
صفة للمواد أو الأشياء التي تتصل بخدمة عدم نقل الكهرباء .

17736 - عاكس Tris fort (F). Very strong (E).  
لعت تعريفي يطلق على أحد التبرج سورة .

17737 - عاكس Tinnunculus (S).  
Crécerelle (F). Kestrel (E).

جنس طير من عائلة الصقور وضيعة الصقريات . انواحه  
٢٠ جميعها صغيرة القد ، جميلة الشكل والجمال ، مستقيمة  
الاقوام . طولها يراوح بين ٢٢ و ٣٢ سم . قوتها أتم  
الريش . موطنها ذلقة . أذنانها طويلة . ارباعها دقيقة ،  
حريظة ، صفراء اللون . منابرها صغيرة ، سوداء اللون ،  
قوة البصر الحادة . يمشي في الأشجار الشائعة . اناله  
تضع وتضع من ٥ إلى ٧ بيضة . وهو من الجوارح  
الناقلة لأنه يقضي على منظر القوارض العذراء . انهم  
انواحه المسمى المعروف ولسوق الثوري والوبيق .

17738 - عاكس الدودي Tinnunculus sparverius (S). Crécerelle des moineaux (F). Windhover (E).

نوع من العاسوق وهو طائر خفيف الجناح ، حاد المزاج ،  
ثديده البلس . طوله نحو ٢٧ سم . قوته إلى الحرة النائية  
يبقى عنه الظهور ويصغر عنه البطن . ريشه أتم التزيين  
اللامع . يصيد الثوري والعصافير الصغيرة والقوارض  
والسلطان والخشرات . وهو من الطيور القاطنة التي تجوب  
الشرق والغرب .

17739 - عاكس معروف Tinnunculus alandicus (S). Crécerelle commune, Emouchet doré (E). Common windhover (E).

نوع من العاسوق وهو أكبرها حجواها شكلا وأمتها  
صيذا . قدره قدر الباق . طوله نحو ٢٢ سم . قوته إلى  
الحرة النائية المنفعة للمواج . وهو أتم الريش ، أسود  
الترتج السطيل . قوته القوارض والسلطان والقنذاع  
والخشرات .

17740 - عاكس ، عاكس ، عاكس Herboux, Herbu (F). Grassy, Herbous, Overgrown With herbs (E).  
ما كان كبير المشب .

17741 - عاكس Herbivorus (F). عاشيات Herbivorous (E).  
الحيروانات التي تأكل الاغشاب .

17717 - عاكس الرأس Acéphale (F).  
Acephalous (E).  
أسم يطلق على بعض الرغويات من صفحيات الهياشيم  
تتميز بانعدام الرأس .

17718 - عاكس العروق Enerve (F). Enervate (E).  
نعت تعريفي توصف به الارواك الخالية من العروق .

17719 - عاكس العنود Esode (E). Enod (E).  
نعت تعريفي يطلق على الاغشاب المأداة العنود .

17720 - عاكس الفك Agneche (F).  
Agnathous (E).  
هو من الحيوان من كان عديم الفك أو الفك الأسفل من  
الشفق . ومن الحشرات من كانت عديمة الفك .

17721 - عاكس المفاصل Inarticulé (F).  
Inarticulate, Jointless (E).  
اطبال لا مفصل .

17722 - عاكس الفك Agnathes (F).  
Agnatha (E).

فئة من الاسماك عديمة الفكوك ورتبة الزمائل . متجسراتها  
تدعى صفحيات الجلود . هيأكلها غضروفية لاطمية .  
غشائيتها جبيبة الشكل . الرتبة الوحيدة الممارسة تدعى  
حطليات الافواه . اعرف اسماكها الملوكي والمكسين .

17723 - عاكس Houtin (F). Haughey (E).  
هي الكوكبة التي تعرض على الفجرة . ج حواد .

17724 - عاكس Grimpance (F).  
Twining, Crooping (E).  
كل نبتة تتسلق غيرها .

17725 - عاكس Mycophagae (F).  
Mycetophagous (E).

لعت تعريفي يطلق على كل حشرة تعيش على الفطور .  
م. عاكس .

17726 - عاكس ، معركسة ، معركسة Liane (F). Liana (E).  
كل نبتة سائها طويلة قصفة لا تمكها من الانتصاب  
بدون عائل ترتكز عليه .

17727 - عاكس Adventicia (F). Adventitious (E).  
هو السحقاق نوع من البهيم ، اطله .

17728 - عاكس Adventicia (F). Adventitious (E).  
كل نبتة تنكسر مرصا وتلتقي مع غيرها من النباتات  
المزدهدة .

17729 - عاكس Traversa (F). Joint (E).  
كل غشبة جازنة تدعى عارضة .

17730 - عاكس ، عاكس Commodat (F).  
Free loan (E).

مقد يقرضه المير دفع شيء إلى المستير ليستسلمه زينا  
محبوا ثم يرد أو مثله بمقابل أو بلا مقابل .



عاسوق الثوري



عاسوق معروف

Tempête (F). Storm (E).

احتلال جوي عنيف القوة شديد الوقع بهيج الموارض الجوية ويثيرها .

Fistipare (F). Fissiparus (E).

عاشق

كل ما كان تسانله عضوة اي بالانقسام الى شطرين .  
ويعدى ايضاً مفعول .

Serpent véneux (F).

عاشقة

Venomous snakes (E).

حية خبيثة يموت الذي تلسه من ساعته .

Stérile (F).

عاقبر

Sterile, Barren (E).

ما كان لا يقبل الاخصاب .

عاقبر قرصاً \* ، عُرْدَةُ الْقَرْصِ

Anacyclus pyrethrum (S). Anacyclus pyrethre, A. pourpre (F). Pellitory of Spain, Alexander's foot (E). Alexanderfuss, Spichelwurz (D). Pilastro, Parietoria de Spagna (I).

نبات عشبي طبي حولي من فصيلة المركبات . ساقه تملو من ٣٠ الى ٩٠ سم . اوراقه كبيرة القند كثيرة التفريغ والتشريح . نصلها خلى البشرة . وريقاتها الزهرية كثيرة العدد . مستطيلة الاذن ، صفيرة القند . ثماره بزرر مجتمعة الغلاف ، هدية المادة ٤ جلوره واوراته واظهاره فواحة الحرف ، طعمها حريف لاذع ، وانفها بهيج الانف وقد تسبب العطاس . يستخرج منها مضغوط ناعم مادته القعالة القويديب يستعمل في القضاء على الحشرات . يستعمل في عدة تركيب طبية انحصها مبيحات الانسان .

عاقول ، حاج ، وتَحْسِيلُ الْعَصَمِ ، أَشْجَرُ حَارِ

Alhai mannifus, Al. maurum (E). Alhage, A. des Maures, Sainfoin agul (F). Camel thorn, Hébrav manna plant (E). Alhagistrach, Mannastrach (D). Lupinella alhai, Mannella di Perlis (I).

نبات عشبي ، لبني مخشوش معمر من فصيلة القرنيات . ساقه شاذكة فرما تملو نحو ١٠٠ سم . فروعه نحلة الشوك . اوراقه بسيطة كاملة مستطيلة ٥ وهو من النباتات التي تفرز المن ويقال ان من بني اسرائيل كان من فرزه لانه كثير الوجود في صحراء سيناء .

عاقول الفَرْكَل هو الشكاعة ، الحلبا .

Réflecteur (F). Reflector (E).

عاكس

جهاز يعكس النور او الحرارة .

Claviceps (S).

عاكوب

عنش تطور بجهريه من النساخيات وفصيلة السطويات . تتميز بعصاها التي تحيط الزونية وتنقسم فيها تشكلت اطراً جوليبي عيني السويين ٥ يولها عيطي الشكل متوازي الترتيب تحفصه تكات مستطيرة ٥ اوراقه عيطية منها واحد يركب النبات ويؤيدوه هو عاكوب الشيلم .

عاكوب الشيلم \*

Claviceps purpurea, Sclerodium clavus, Sphecilla segetum (S). Ergot du seigle (F). Ergot (E). Mutterkorn (D).

فطر جهري يركب الشيلم ويثيره من النباتات انحصها البيشة والنف والتغرول ولقد كليل والديس والديس وذيل الغار والزمير والشبير والشوفان والصوية والمكرش والذرع

١٧٧٤٢ - عاشق ومَشْقُوق اطلب غلدة كروية .

١٧٧٤٣ - عاشق \*

Triglochin (S). Triglochin, Trosart, Joncage, faux jonc (F). Arrow grass, Marsh arrow grass (E). Echter Dreisack (D). Triglochino, Gluncastrelle, Glunco falso (I).

جنس نباتات برية ، مروحية ، اسلية الشكل ، صمرة من فصيلة النساخيات . اوراقه عديدة مضطمة من نباتات الواقع الرطبة انحصا المنافع وريال الشوط الجيرة ونباتات الانهر واغوارها .

١٧٧٤٤ - عاشقيات

Triglochinaceae (S). Triglochinaceae (F). Triglochinaceae (E).

فصيلة نباتية من صميدات الفلقه . اجناسها وازواعها عديدة . جميعها اسلية الشكل والاوراق . اذفارها كية ، مرتفعات المبيض . اشهر اجناسها النائم .

١٧٧٤٥ - عاكوب \*

Herbicide (F). Herbicide, Weed-Killer (E).

كل مادة فاعلة تستعمل للقضاء على الاعشاب ج . عواشب .

١٧٧٤٦ - عاشيق \* ، عاشيق (F). عاشيق (S).

جنس حشرات غشبية من فصيلة اللزجنيات . انواعه المعروفة ١٤ معظمها من حشرات المالم القديم ٥ جميعها صميدة القند . اطوالها تراوح من ٤ الى ٨ سم . اطيافها متراكبة الاذن الزاوية ٥ سرعها نهاري . قوتها رقيق الازداد انحصا اذار الفصيلة الصميدانية ٥ اشهر انواعها العاشيق الازرق (Corynetes caeruleus) الذي يعيش في الحدائق ويسهل المائل حيث يفتقر . بعض الحشرات الفاضة .

١٧٧٤٧ - عاشيق لَزَق \*

Corynetes caeruleus (S).

Corynetes bleu (F). Corynetes caeruleus (E).

حشرة واحة غشبية قافصة من فصيلة اللزجنيات وريقة صميدات الاجنسة . يركبها غشبية قافصة تقترب الحشرات البرية والزرينية . يركبها غشبية قافصة تقترب الحشرات الغدنا ٥ جسمها صلب القند عيطول من ٤ الى ٥ سم . ثوبا الى التزقة . رأسها مستعرض الجرم . زباناها عيطيان ، مستطيلان . صماتها صميدتان بارزتان . ظهرها مستدير الطرف اللامع ، نحيل التجزيز النندي القاطب . ارساها خاسية المقل ٥ لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في التبار وتبيت في الليل ٥ البرقة عنه ادياها الكيال الجسودي تطول من ٨ الى ١٠ سم . جسمها مدوني الشكل ، مستطيل القدم والرأس ، مستطيل الطرف اللامع ، سداسي القرواب ، ضلع التاكثير . اسد القرن ، اسر الموج ، مبر الحلب ، اسد الحراس ٥ طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوماً يقتضي في شقوق الخشب او تحت القشور والانقاض .

١٧٧٤٨ - عاكس

Réfractaire (F). Refractory (E).

كل مادة تقاوم التحويلات للمائرية ولا تنصاع الى غططها الرئيسي . كالبطين الذي يصنع الحرارة فلا تصهره .

١٧٧٤٩ - عاصيرة \* ، مهترس

Fouloir (F). Bester (E).

آلة تستعمل لسحق اللآل واستخراج عصارها انحصا العنب .



عاشق



عاشيق لَزَق



عاقبر قرصا



عاكوب الشيلم



Pubis

١٧٧٧٥ - عَائِكَة

١٧٧٧٦ - عَائِكَة اصل الإذن. ج. حوانة .

Anthropoïde (F).

١٧٧٧٧ - عَائِكَة

الإنسان طائر يسمى الإديج ، اطلبه .

Démolisse de Numidie (F).

١٧٧٧٨ - عَائِكَة نميدك

طائر يسمى اديج نميدة ، اطلبه .

Pubien (F). Pubic (E).

١٧٧٧٩ - عَائِكَة

Infrimé (F). Infirmity (E).

١٧٧٨٠ - عَائِكَة

كل أثر يبقى في البدن عقب إصابة أو مرض . والمصابة قد تكون وقتية إذا كانت وشيكة التوالد أو دائمة .

Taxes (F). Taxus (E).

١٧٧٨١ - عَائِكَة أدات

هي الرسوم المفروضة على العقارات والبضائع . وأحياناً مائدة .

Rentabilité (F). Rentability (E).

١٧٧٨٢ - عَائِكَة

راجع إيراد .

Delphinium (S). Dauphinella (F).

١٧٧٨٣ - عَائِقُ

جنس نباتات حولية ومعملة ومعمرة من المربقيات ونباتية الشقيقيات . أزهاره المرفوعة نحو ٦٠ مظهوا بري وبعضها زراعي زرعياً . أولها متعاقبة ، منفعة ، مفصصة ومرفوعة . أنزهرها صنفوي أو سنبل التجميع . أنزهارها جميلة الشكل ، مختلفة الألوان || أشهر أنزهاره ما يلي .

١٧٧٨٤ - عَائِقُ الحَدَثُ كَقِي \* وجمل البُصْبُرة ، مَهْمَا زَاجَ

Delphinium ajacis (S). Dauphinella des jardins, Pied d'ajouette des jardins (F). Rocket larkspur (E). Gazantrittersporn (D). Calcestrippe dei giardini, Speronella (F).

نبات عشبي حولي زرعياً يعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم . ساقه فراء . أوراقه غليظة القشر . عقنوده الزهرية كبيرة القند ، لبد الأزهار . لون أزهاره يختلف باختلاف الصمم . يكثر فيه الأزرد والأبيض والبنفسجي والوردي والأحمر || أنزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .

١٧٧٨٥ - عَائِقُ الحَفْلُ كَل \* كُنْشُودَة مَكْبِكَة

Delphinium consolida (S). Dauphinella consoude, D. des blés, Consoude royale (F). Field larkspur, King's consoud (E). Feldtrittersporn, Hornkümmel (D). Consolida regale, Calcestrippe delle biade (F).

نبات عشبي حولي بري وزرعياً يعلو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . يحمله هربي الشكل . ساقه فراء . فروعه محمية بالمتاقيد الزهرية القليلة الكثافة . أزهاره زرقاء اللون ، أو بيضاء . أصراره الزراعية عديدة جنبا لكيسة الزهر والصغيرة القند والمدنية المستطيلة . جميعها طيبة تستعمل كمادة لبرق وطاردة للعدو ودائمة الجروح إلا أنها سامة للمادة الغذائية مما يجعلها من النباتات السامة المؤذية || أنزهاره يستمر طوال فصل الصيف .

١٧٧٨٦ - عَائِقُ الشَّرْقِي Delphinium orientale (S).

Dauphinelle d'Orléans (F). نبات عشبي حولي بري وزرعياً يعلو من ٤٠ إلى ٦٠ سم .



عائِقُ الحافِق



عائِقُ الحَفْلُ

والنزار والقطبان والقص والتبوير والتبيل والتبيل والمزمار والمخلص ، الخ . || مظهره الخارجي زراعي أسود ، شكله شكل الدائرة ، يدخل بوفرة مع الجذرة عند تقطيع الزهرة فيستقر في البيض حيث يمش ويشر طفيفاً فيجول الحية وما فيها إلى مادة سائلة سوداء اللون تحوي مع بوفه بعض الجواهر السامة والمواد التي تلوذ بها أعضاها الماكرون . يكتمل بتغذيف الدار من الحب المكروب وقد يتم ذلك إما بالتلف وإما بالتلف في الماء حيث يرتد الحب السليم ويظهر الحب المكروب . أو باستبدال أحد القواشير المظهر .

١٧٧٩٠ - عَاكِبُون ٥ ، إِدْعُون ، دَاكِبُون

Ergotisme

مادة شبه قلوية توجد في الحبوب الموهومة بفطر الماكروب .

Régne (F). Kingdom (E).

١٧٧٩١ - عَائِكَة العالم أو المملكة هو أول قسم في تصنيف الأحياء ، يقال عالم الحيوان وعالم النبات أو مملكة الحيوان ومملكة النبات . راجع تصنيف .

An (F). Year (E).

١٧٧٩٢ - عَام العام يدل يأتي على المصطلح الأربع الفاش والربع والصف والخريف يدل هذا فالعام اخص من السنة .

Gerbe (F). Sheaf, Bundle (E).

١٧٧٩٣ - عَائِكَة مجسمة من غبيل الحصيد .

Facteur (F). Factor (E).

١٧٧٩٤ - عَائِكَة كل عنصر آخر من مجموع عناصر الوحدة .

Ouvrier, Salaré (F).

١٧٧٩٥ - عَائِكَة

هو كل شخص مرتبط بمقد العمل أو مقد الاستعاضة فيعمل بيده عملاً صناعياً أو زراعياً .

Facteur premier (F).

١٧٧٩٦ - عَائِكَة أسامي

Prime factor (E).

Agent oxydant (F).

١٧٧٩٧ - عَائِكَة التأكسد

Oxidizing agent (E).

Facteur expérimental, Appliqué (F).

١٧٧٩٨ - عَائِكَة لتجريب

F. appliqué (F). Applied factor (E).

Facteur biotique (F).

١٧٧٩٩ - عَائِكَة حيوي

Biotic factor (E).

١٧٧٩٠ - عَائِكَة وسيط ، عَائِكَة مساعد ، وسيط

Agent catalytique, Catalyseur (F). Catalytic agent, Catalyst (E).

جسم يحدث التحليل باللامسة . اطلب مساحل .

Facteur commun (F).

١٧٧٩١ - عَائِكَة مشتركة

Common factor (E).

Amor (F).

١٧٧٩٢ - عَائِكَة

الأمور كوكب سيار يسمى الزامي ، اطلبه .

١٧٧٩٣ - عَائِكَة

ألفان كوكاب يبيض أسفل من السعد .

١٧٧٩٤ - عَائِكَة

Anesse (F). She-ase (E).

هي الإتان ، أنثى الحمار .

## ١٧٧٩٣ - عائق كشمير

*Delphinium cashmirianum* (S). *Dauphineelle du Cachemire* (F).

نبات عشبي معمر يصلو من ٣٠ إلى ٤٥ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه مستطرفة خاسية التفصيص، نصلها خلي البشرة، مسن الحافة. أزهاره كبيرة القدر، قباياها غريزة الشكل، حطية اللون. بتلاتها بتنجسية. عناقيدها صغيرة رجلة. أزهاره يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

## ١٧٧٩٤ - عائق ممسك

*Delphinium brunonianum* (S). *Dauphineelle musquée* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٣٠ سم. ساقه قليلة الفروع المنتصبة. أوراقه كلبية الشكل، ثلاثية أو خاسية التفصيص. أزهاره كبيرة القدر، زرقاء اللون، ارجوانية الختار، سواد القرقة، فواصة العرف المسكي المستحب. أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز.

**١٧٧٩٥ - عاكيل** *Plante hôte* (F). *Host-plants* (E). هو كل نبات يعيش عليه نبات طفيل.

**١٧٧٩٦ - عيب** *Lamper* (F). *To toss off* (E). اخذ الماء حيا من غير مص وهو ما يفعله الطائر. والعبء هو طريقة شرب الطير.

**١٧٧٩٧ - عيبالية** *Abetia* (S). *Abatia*, *Abetia* (F). *Abetia* (E).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة النضسيات. أنواعها المعروفة قليلة البلد اعطائها بعض المناطق الحارة من أمريكا الجنوبية. سيقانها منتصبة فراءه. أوراقها متعاقبة. أزهارها عقديية طرفي. أزهارها جميلة يكثر فيها اللون الوردي ثم الاصفر. بعض أنواعها تزدهي بزود في الحائل.

**١٧٧٩٨ - عياد الشمس، عيّن الشمس، دوار الشمس** *Heliannthus* (S). *Hélianthe*, *Soleil* (F).

جنس نباتات عشبية حولية أو معمرة من فصيلة المركبات الانبوية الزهر. انواعه المعروفة نحو ٥٠ سيقانها اسطوانية جالسة. أوراقها منتقة او لائفة، كاملة، كبيرة القدر. السفلية منها متعاقبة الاكثر اضا الوسطى والعالية فتناقية. أزهاره رؤسي التجميع، كبير الاقراص المستديرة التي تمل مع اتجاه الشمس. أزهارها انبوية، صغيرة، ليدة، سراسية، مستطيلة السنينات. بزورها وتدية الشكل، فضلة الحروف، دهنية الباب. أشهر أنواعها الزراعية ما يتبع.

## ١٧٧٩٩ - عياد الشمس الأزغب

*Heliannthus mollis* (S). *Hélianthe velu*, *Soleil velu* (F). نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقه غليظة، زياة، حادة الفروع. أوراقه لائفة متعاقبة، بيضية الشكل، نصلها كبير الصفعة المشعة ثلاث المروق البارزة، اطول اللون. قرصه الزهري متوسط القدر، قطره نحو ١٠ سم. لسينات أزهاره خلية البشرة لينا الى الصفار الكبريتي. أزهاره يستمر من تموز الى تشرين الاول.

ساقه فراء. هيكله هرمي الشكل. اولاته قوية للتشمير. عناقيد الزهرية صغيرة القدر. أزهاره بتنجسية اللون. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

**١٧٧٩٧ - عائق أنيق** *Delphinium speciosum* (S). *Dauphineelle élégante* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ٩٠ سم. ساقه موقفة قليلة الفروع. أوراقه خاسية التفصيص، مسنة الحافة نصلها خلي البشرة. أزهاره الى الزرقاة انبوية الالسة. عناقيد الزهرية صغيرة القدر رجلة. أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

**١٧٧٩٨ - عائق جبتي، زيبب بيري، عيشة** *Delphinium staphisagria* (S). *Dauphineelle staphisagria*, *Staphisagria*, *Herbe aux poux* (F). *Stavesacre*, *Lousewort* (E). *Scharfer rittersporn*, *Leuskraut* (D). *Calceatrippa staphisagria*, *Serfussaria*, *Tusano* (I).

نبات عشبي بري طبي يصلو نحو ٧٠ سم. ساقه فراء. فروعها منتصبة. أوراقه مقصصة وبشرة نصلها خلي البشرة مسن الحافة، بحري اللون. عناقيد الزهرية صغيرة القدر، ليدة. أزهاره وردية اللون. بزور حامزة العلم تستعمل كهيصة يسلطه وطاردة للبهان. لكنها خطيرة نظرا لما تحويه من مواد جسمية مؤذية. أزهاره يستمر طوال فصل الصيف.

**١٧٧٩٩ - عائق ذليل** *Delphinium zall* (S). *Dauphineelle zall* (F).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ١٥٠ إلى ١٥٠ سم. هيكله هرمي الشكل. ساقه فراء. فروعها منتصبة تشعب على ارتفاع ٣٠ أو ٤٠ سم. أوراقه خلية التفصيص التدي الشكل. أزهاره عناقيد كبيرة القدر كبريتية اللون. أزهاره يستمر من تموز الى آب.

## ١٧٧٩٠ - عائق مستعجلي

*Delphinium azureum* (S). *Dauphineelle azurée* (F). نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه وفروعها وأوراقه أزهاره خلية اللحاء والبشرة. أوراقه خلية أو سباعية التفصيص. أزهاره مستعجلية اللون. عناقيد الزهرية مستطيلة الشكل متدة الكثافة. أزهاره يستمر من حزيران الى تموز.

## ١٧٧٩١ - عائق كبير الزهر

*Delphinium grandiflorum* (S). *Dauphineelle à grande fleur*, *Pied d'aloette de Chine* (F). *Large flowered larkspur* (E). *Grossblütiger Rittersporn* (D). *Calceatrippa a fiori grandi* (I).

نبات عشبي ترابي معمر يصلو نحو ١٠٠ سم. ساقه فراء. فروعها متعاقبة، عاحية العناقيد الزهرية. ثدية التفصيص. أزهاره كبيرة القدر بيضاء اللون أو زرقاء أو حمراء. أزهاره يستمر من حزيران الى ايلول.

## ١٧٧٩٢ - عائق كَرْد بَنَلِي

*Delphinium cardinale* (S). *Dauphineelle cardinale* (F). نبات عشبي ترابي معمر يصلو من ٦٠ إلى ١٠٠ سم. ساقه موقفة حادة الفروع ثلاثية او رباعية المقان. أوراقه خاسية التفصيص والتشمير. سنيك الزهرية مستطيلة رجلة. أزهاره ارجوانية اللون صفراء التيجم. أزهاره يستمر من نيسان الى تموز.



عائق أنيق



عائق جبلي



عائق كبير الزهر

## ١٧٨٠٠ - عباد الشمس المكد \*

*Helianthus orgyalis*, *H. salicifolius* (S). *Hélianthe titan*, *Soleil de six pieds* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ثلاثة أمتار وقد يبلغ في غروف خاصة ستة أمتار. ساقه مرطبة مساه. أوراقه كثيرة البد، متناظرة الارتكاز || اقراصه الزهرية كثيرة البد، قطرها يراوح بين ٣ و ٧ سم. لسيات انزهاره سوية الصغار القام || انزهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول.



عباد الشمس الجبار

## ١٧٨٠٦ - عباد الشمس الضخام

*Helianthus laetiflorus* (S). *Hélianthe fastueux*, *Soleil fastueux* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه هدية الزغب الجامد. أوراقه سنانية الشكل، جامدة الصفة، نصلها عخن المس، ثلاثي الفروق، مسن الحافة، بحري الخصار، قرصه الزهري صاجي الشكل. قطره نحو ١٢ سم. لسيات انزهاره صفراء اللون، ودية اختار || انزهاره يستمر من آب الى ايلول.



عباد الشمس الشري

## ١٧٨٠٧ - عباد الشمس النيلي

هو طرفيل الصباغين، امليه.



عباد الشمس السقولي

## ١٧٨٠٨ - عباد الشمس عبق الورق

*Helianthus angustifolius* (S). *Hélianthe à feuilles étroites*, *Soleil à feuilles étroites* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. ساقه هدية الزغب. أوراقه متباينة الارتكاز. نصلها يطوي ٧ الى ١٨ سم. ويبرس من ٤ الى ٨ سم. وهو سيك الصفة الخشن || اقراصه الزهرية قليلة البد. قطرها يراوح من ٥ الى ٨ سم. لسيات انزهاره صفراء اللد، صفراء اللون || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



عباد الشمس القمي

## ١٧٨٠٩ - عباد الشمس كبير الورق

*Helianthus strumosus*, *Hélianthe* (S). *Hélianthe macrophylla*, *Soleil à grandes feuilles* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٢٠ الى ٢٢٠ سم. جلوه صفريه اصبحية الشكل. ساقه ثنائية او ثلاثية المبان، جامدة القروح، قليلة الزغب. أوراقه متناظرة، يدية مستطيلة، نصلها كبر اللد مغبر الصفة. قرصه صاجي الشكل، قطره نحو ٨ سم. لسيات انزهاره الى الصفار الباهت || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.



عباد الشمس المارد

## ١٧٨١٠ - عيار \*

*Tolypeus* (S).

*Apar*, *Tolypeus* (F).

جنس حيوانات لينة من فصيلة المرمعات. أنواعه المعروفة ثلاثة اصطناعيا بعض مناطق أمريكا الجنوبية. تألف الغابات والاحراج. ملجئها الحياتي فردي. تسرح في الليل وتبيت في النهار داخل اجسام تحفرها في التربة قرب جلوع الاشجار اجسامها صغيرة. رؤوسها غروبية. اقناملها مجهزة باسنان اطولية الشكل يراوح عددها من ٨ الى ٩ ازواج في كل فك. عيونها وباهتها صغيرة. اذنابها قصيرة مشعلة. قوائمها قصيرة. اظفارها قوية. دوسها مؤلفة من جين رأسي وجين منكمي تقصه من الجين الحوضي ثلاثة احزمة غضروفية متعاطلة متحركة تنقبض وتتمدد مع الحاجة بما يصل البكر يتحرك عندما يشاء || انثاه ثنائية الاطباء تضع في كل دوس من جرو ثلثة جراء || اما انواعه الثلاثة فهي التالية :



عباد الشمس كبير الورق

## ١٧٨٠٠ - عباد الشمس الجبار \*

*Helianthus giganteus* (S). *Hélianthe géant*, *Soleil géant* (F).

نبات زراعي معمر يصلو نحو ٣٠٠ سم. جلوه صفريه جزائية طويلة. ساقه ضخمة، مائلة للحاء، جامدة القروح. أوراقه كبيرة اللد، نصلها ساني الشكل، مسن الحافة، جامد الصفة المسكة || قرصه الزهري متوسط الحجم قطره نحو ٨ سم. لسيات انزهاره جامدة الصفار || انزهاره يستمر من آب الى تشرين الاول.

## ١٧٨٠١ - عباد الشمس السنوي \*، طرفنول

*Helianthus annuus* (S). *Hélianthe annuel*, *Tournesol*, *Grand Soleil* (F). *Golden flower* of Peru, *Sun-flower* (E). *Echte Sonnenblume* (D). *Elfanto del fioro grandi*, *Mirazole*, *Girasole*, *Tazza regia*, *Coppa di sole*, *Sole* (I).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة مؤبرة اللحاء تحمل في اعلاها بعض القروح البقية. أوراقه كبيرة اللد قليلة الشكل || نصلها عخن المس، حاتين الخصار البحري. قرصه الزهري الغريسي كبير اللد قطره يراوح بين ١٥ و ٥٠ سم. لسيات انزهاره صفراء اللون ذهنية المواج || انزهاره يستمر من تموز الى ايلول || وهو من النباتات المتنامية لثلاثة الزراعة والاستعمال. يزود هدية وطلية.

## ١٧٨٠٢ - عباد الشمس السقولي \*، طرفنول

كمتكر، ليفلسا دومي

*Helianthus tuberosus* (S). *Hélianthe tubéreux*, *Topinambour* (F). *Candopotosto*, *Jersalien artichoke* (E). *Knollensonnenblume* (D). *Elanto tuberoso*, *Tartufo bianco*, *T. del canna*, *Carciofo di terra* (I).

نبات سقولي زراعي معمر. جلوه سنزائية الشكل والقد، ساقه مستقيمة تدلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. أوراقه كبيرة اللد، مستطيلة المت، نصلها جامد الصفة الخشن، مسن الحافة، ثلاثي الفروق الرئيسية. قرصه الزهري متوسط اللد قطره نحو ٦ سم. لسيات انزهاره احمليجية الشكل، زاهية الصفار || انزهاره يستمر من ايلول الى تشرين. زراعته شائعة، صاقله مأكولة، يرغب في الارربة المتوسطة الانسجام والرطوبة.

## ١٧٨٠٣ - عباد الشمس الفضي \*

*Helianthus argophyllus* (S). *Hélianthe argenté*, *Soleil argenté*, *S. du Texas* (F).

نبات زراعي حولي يصلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. ساقه فرمها فرومها دقيقة، جامدة، زيا للحاء، أوراقه كبيرة اللد، يضيئة الشكل، ثلاثية الفروق || نصلها انغب البشرة فصي للمواج || اقراصه الزهرية كثيرة البد، صغيرة اللد، لسيات انزهاره مستطيلة الشكل، جميلة الصفار الزاهي، سطعية اختار || انزهاره يستمر من تموز الى ايلول.

## ١٧٨٠٤ - عباد الشمس القاسي

*Helianthus rigidus*, *H. scaberrimus* (S). *Hélianthe rigide*, *Soleil scabre* (F).

نبات زراعي معمر يصلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم. ساقه جامدة مستقيمة قلبية. أوراقه متناظرة، كبيرة اللد، يضيئة، لسنة. نصلها جامد الصفة المسكة الخشن. اقراصه الزهرية قليلة البد، محدلة اللد، قطرها يراوح بين ١٠ و ١٥ سم. لسيات انزهاره الى الصفرة الزاهية السوية. || انزهاره يستمر من آب الى ايلول.

## ١٧٨٢١ - عَيْدُ بُولُون \* Eupeimidas (S).

Eupeimidas (F). Eupeimidas (E).  
فضيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة الموصورة .  
اجسامها وانواعها المعروفة قليلة العدد . جميعها نائمة تتنقل  
على الحشرات الضاربة من نصفيات الاجنحة والضمديات  
والحرفشيات || حشرات صغيرة تطول من ٢ الى ٤ سم .  
اجسامها شبه اسطوانية . مرنّاتها سلبية ، مستقيمة . اذواها  
عديدة الاولان يكثر فيها الاسود القمعي . اجسامها شديدة  
القصر او لا يوجد لها || اشهر انوعها عيدول جيبي .

١٧٨٢٢ - عَيْدُ بِيحِي \* Abdimia abdimi (S).  
Sphénorhynque (F).

طائر من طول الساق وفضيلة القلقليات . اسلانه البلاد  
الافريقية يحبب بحيراتا وانهارها كل عام || ثوبه اسود  
اللون تملوه مابة ارجوانية في الرأس والظهر والصدر ومابة  
خضراء في الجناح والذنب . عيروه وزوره ويطهه وزمكته  
بيض . واسه تتوج الثفن بكشفة صغيرة من الريش الارجواني  
الاسود اللؤلؤ || يالف مجاري الماء . قوته الحشرات  
والزحافات والقترحات وبعض الاشباب المائية .

## ١٧٨٢٣ - عَيْدُ كَبْ هُو السَّاقِ الكاذب ، اطليه .

## ١٧٨٢٤ - عَيْدُ هُو المشب العبد وشب عبد هو الرقيق الرديء القصار .

١٧٨٢٥ - عَيْدُ هُو Epterus (S).  
Eptera (F). Epterus (E).

جنس حشرات مؤذية من لمحات الاجنح ديهيات القرون  
وضيلة الحشرات . انواعه المعروفة نحو ٤٠ عاقلها  
معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تعيش تحت  
قشور طلاء الانجار في اثناء لانظامية الخطوط تحلبها  
بالعسل والعرض || اجسامها صغيرة عمدة الظهر ، بيضه  
للشعر ، تطول من ٢ الى ٣ سم . اذواها لامعة يكثر فيها  
الاسود والكسني والماني . احادها مبهمة التخديط الطويل .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ هُو Jujubier des Iotophages (F).  
هو القصار ينبت ويعظم قرب شطوط الانهار .١٧٨٢٧ - عَيْدُ هُو Abralia (S).  
Abralia (F). Abralia (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات واسيات الارجل .  
انواعه المعروفة ثلاثة منها واحد يعيش في البحر الابيض  
المتوسط والثاني في المحيط الاطلسي والثالث في المحيط الهندي .  
جميعها تأكل الحادج والشرطوط . اجسامها شبه غروبية  
الشكل . ارجلها حاسنة ، معتدلة الطول ، مجهزة بكلايات  
تكتشف التفرام ويصنف من الهامس الطافية الارتيكار .

١٧٨٢٨ - عَيْدُ هُو Année conyze (F).  
هو القزوف ، اطليه .١٧٨٢٩ - عَيْدُ هُو Obsidienne, Obsidiane (F).  
Obsidian, Volcanic glass (E).

نوع من التلمسية البرتاني . جسم حجري شديد الصلابة  
مرجه الصخور النارية || يكثر وجوده عند فوهات  
البراكين القديمة والحديثة ، وفي بعض مناطق مصر وسناروا  
والمكسيك والبيرو .

## ١٧٨٢١ - سَبَّار بُولُون \* Tolypeustes tricornatus (S).

Apar de Bullon (F).  
موطنه البرازيل والفونان وبيليفيه . جسمه يطول نحو  
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ ٧ سم . قوامه خاسية  
الاصابع في الامامية والخلفية . دره عنبري اللون .

## ١٧٨٢٢ - سَبَّار مَحْرُوطِي الذَّكَب \* Tolypeustes conurus (S).

Apar à queue conique, Mataco (F).  
نوع من البسار موطنه بوليفيه وبعض مناطق الاربعين .  
جسمه يطول نحو ٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو  
٦ سم . قوامه الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون .  
اطلح المولج .

## ١٧٨٢٣ - سَبَّار مَوْرِي \* Tolypeustes Muriel (S). Apar de Muriel (F).

موطنه الشيل وبعض مناطق الاربعين . جسمه يطول نحو  
٤٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٥ سم . قوامه  
الامامية رباعية الاصابع . دره اسمر اللون اصفر المولج .

## ١٧٨٢٤ - عَيْدُ كَرَكَة جَبْرِيَّة Expression algébrique (F).

جلة حاسبة مردحا الجبر . Algebraical expression (E).

## ١٧٨٢٥ - عَيْدُ كَرَكَة Pimaria domestica (S). Picière domestique (F).

حشرة مذبذبة ناقصة من فصيلة الردييات ورتبة اختلافات  
الاجنحة . جسمها صغير لثدي يطول نحو ٩ سم . رأسها  
صغير ، بطولي الشكل . غطتها معتدل الطول . عيناها  
صغيراتان . زبائنها دقيقتان مستطيلتان . كوسلها وشي  
الشكل . الزوج الامامي من قوائمها مجهز قفص . للمدور  
يحمل متحسا حاداً || قوامها الى اعطلي الاسمر يطول مولج  
تني في الرأس والكامل || سرسها دجوي . قوتها الدم  
تنصه من العيوش اولاً ثم من كل حشرة تستطيع قصها .

١٧٨٢٦ - عَيْدُ هُو Eglantier (F). Briar, Dog-rose (E).  
هو الترسين ويعرف بالورد الجليل ، ينظف وينظف حتى  
تقطع منه العصي .

## ١٧٨٢٧ - عَيْدُ هُو القيب هو حب الكاكنج وشب الكلب وشجرة الردء من

اللسان . ويكثر من الاغلات من ابي حنيفة .

## ١٧٨٢٨ - عَيْدُ هُو القيد : نبات طيب الرائحة تكلف به الايل لانه ملينة

سنة (اللسان) .

## ١٧٨٢٩ - عَيْدُ كَالْأَرِي هو السجور ، اطليه .

## ١٧٨٣٠ - عَيْدُ بُولِي جَبْرِي \* Eupelmus Geer (S). Eupelma Geer (F).

حشرة مباشرة نائمة من فصيلة الميديليات . موطنها بعض  
مناطق البلاد الحارة والمتدرة نحو المعتدلة الحارة . تتنقل  
على الكثير من الحشرات اعصها المتوسيات ومنها متغذية  
الذئب || جسمها عديم الاجنح ، صغير لثدي يطول من ٢  
الى ٣ سم . جوشها غدد الجانبيين . يطها معتدل الحجم .  
مرزها جالس التصل الجامة ، معتدل الطول . قوامها الى  
السواد القمعي اللامع .



عَيْدُ بُولُون



عَيْدُول جَبْرِي



عَيْدُ بِيحِي



عَيْدُوس



عشيرة عث

١٧٨٣٦ - **عشيرة** *Osmanthe* (F).  
هي العنكبوت ، أظلم . أما البقية في وضع الأبرص صفلي  
للشباب .

١٧٨٣٧ - **عشيرة** *Griffe* (hoc) (F).  
*Root* (E).  
أول ما يبتدئ من أصول القلب ونحوه هو عرض رتم  
قبل أن يظهر حل سطح الجذبة . الواحدة مبقرة .

١٧٨٣٨ - **عشيرة** *Zabrus tenebrioides*, *Z. gibbus* (S). *Zabrus* des céréales, *Z. bossu*, *Z. des moissons* (F). *Corn ground beetle* (E). *Getreidelackfresser* (D).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبب الشكل ،  
طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م . ثوبها بني اللون ، أسود  
المزاج . تعيش تحت الحماير وبنيها . تسرح في الخليل  
تتركب الأزور وتقرض الحب قبل ادراكه . يرقاتها  
تقيم في التربة داخل اتفاق تحفرها قرب جلود الزروع ،  
تخرج منها في الليل لتفشي حل الاقارب للتانية .



عشيرة

١٧٨٣٩ - **عشيرة** *Ibacus* (S).  
*Ibacus* (F). *Ibacus* (E).

جنس حيوانات بحرية من القشرية مغاريات الأبريل  
طوال الليل فضيلة الكركليات . انزله المعروف حديد  
منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة . اجسامها مبطنة  
كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم . تتميز بصغر قوائمها  
وبدهونها القصيرة للمنسنة الطرف الاسامي . انزايها  
متباينة الايام يكثر فيها الاخضر ومغطاة . جميعها  
ماكولة متوسطة المصن .



عشيرة

١٧٨٤٠ - **عشيرة** *Amara seneca* (S).  
*Amara bronze* (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها لزدي الشكل ،  
محبوب السطح طولها نحو ٨ م . قوائمها انضغاطية  
يطول مزاج أسف . زياتها حر الجسم ، سود الطرف .  
قوائمها سود السيقان والانفذاذ ، حر الارباع . تركب  
التجليات على اختلاف اجسامها وانزايها . تعيش على  
الزروع قبل ادراكها . يرقاتها خافتة قليلة الاذى .



عشيرة اسف

١٧٨٤١ - **عشيرة** *Amara fulva* (S).  
*Amara rous* (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها محبب الشكل ،  
طولها يراوح من ٨ الى ١٠ م . ثوبها اصعب اللون ،  
اخضر المزاج . تركب الزراعات الخفيفة على اختلاف  
انزايها . قوائمها الارباع والبروز تقصصها وتطبعها . يرقاتها  
خافتة تعيش على مختلف اوراق النبات اغصانها التجليات  
والسليبات والركبات .



عشيرة اصعب

١٧٨٤٢ - **عشيرة** *Amara euryzona* (S). *Amara chateau* (F).

حشرة ضارة من البقويات . جسمها يعني الشكل يطول  
نحو ١٠ م . ثوبها كسني اللون اشقر المزاج . زياتها  
وقوائمها سود . تركب البقول والنباتات الخفيفة اغصانها  
السليبات . يرقاتها خافتة قليلة الاذى تكتفي بقضم  
امرات الاروان .



عشيرة كسني

١٧٨٤٣ - **عشيرة** *Pterostichidae* (S). *Pterostichidae* (F). *Pterostichidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة عثيات الاجنحة . اجناسها  
وانزايها كثيرة العدد . جميعها صغيرة لينة ، نمدة الاتحاد ،

١٧٨٣٠ - **عشيرة** *Agelena* (S). *Agelena* (F). *Agelena* (E).

جنس حناكب من فصيلة العنكبوتات . انزايها المعروفة  
كبيرة العدد ، منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة  
المراة . جميعها كبيرة القند . تعيش في البراري بين  
الاشباح والادغال . قوتها الذباب والحوام وبعض الحشرات  
الصغيرة . اشهر انزايها عشيرة عثية وعشيرة عثية .

١٧٨٣١ - **عشيرة** *Agelena labyrinthica* (S). *Agelena labyrinthica* (F). *Labyrinth-Spider* (E).

نوع من العنكبوتات موطنها البلاد المعتدلة الحارة . تألف  
البراري والحراج . قوتها كل ما خلق يراها من حشرات .  
جسمها يطول نحو ١٢ م . عند العنكبوت ونحو ١٦ م .  
عند العنكبوت . صغارها اعطليجي الشكل ، جزوي اللون  
يميل وقود عند الرأس ويغير مع اقترابه من البطن .  
يتبادل زياتان ، فوسها صغيران متعقدان . فكها  
ضليمان مقوسان . جبرامها مستطيلة . كثيفة الحب .  
بطنها يعني الشكل ينتهي بزالنتين فحيتين وهو الى السرة  
المخيلة يطولها تلميح احمر وسرته تنية . شها قسي  
الشكل ، كبير القند ، قصير العنق الاجوف ، طليق  
القاعدة المثبتة ببعض الحبوب . يياتها العنكبوت يستمر  
نحو خمسة اشهر تقريبا في عكدة صغيرة الشكل ، جامعة  
الحبك تحفرها تحت الحماير المرقمة من غير الله .

١٧٨٣٢ - **عشيرة** *Agelena elegans* (S). *Agelena elegans* (F). *Elegant-Spider* (E).

نوع من العنكبوتات . موطنها البلاد المعتدلة الحارة . تألف  
البراري . قوتها الحشرات الصغيرة اغصانها الذباب والحوام  
التي تعلق في شراكها بكثرة . جسمها صغير القند يطول  
نحو ٣ م . عند العنكبوت ونحو ٤ م . عند العنكبوت . صغارها  
قسي الشكل ، جزوي اللون . يتبادل زياتان . فوسها  
صغيران متعقدان . فكها مقوسان . جبرامها مستطيلة  
كثيفة الحب . بطنها يعني الشكل ينتهي بست زواكه  
نخلة . وهو اسير اللون ، اخضر المزاج يطول طوله اسود  
يحسن حسة خطوط متزمنة اثل اسودا منه . شها  
قسي الشكل ، كبير القند المستديرة ، طليق القاعدة  
المثبتة ببعض الحبوب ، حديد الشراك والمخيلة التي تملو  
من جميع الجهات . مكنتها بطولها الشكل تحبكه تحت  
الحماير او بينها في المراتع التي لا تخشى غير الله .

١٧٨٣٣ - **عشيرة** *Agelenidae* (S). *Agelenidae* (F). *Agelenidae* (E).

فصيلة من العناكب . اجناسها وانزايها كثيرة العدد .  
اعطائها معظم اصقاع العالم . تتميز بفصلها الاجسام ،  
بمطاطة الجرامز ، بالباح الشم وبكبر الاشاشن العليا .  
اشهر اجناسها العنكبوت ، والفلس المعروف بتكبيوت  
النازل ، والدية .

١٧٨٣٤ - **عشيرة** *Andeln* (F). *Swach, Windrow* (E).

البطة كية العشب التي يحصد الحاصد عند كل خطوة .  
اما اذا كانت من الزروع كالقنص والشمير فتضي فطما .

١٧٨٣٥ - **عشيرة** *Antelope melle* (F). *Antelope melle* (E).

هو الذكر القمل من البلاء .

يأتي زهرة سيدة بيضاء اللون ، صفراء المخرج ، فواحة العرف النطري || أزهاره يستمر من شباط إلى نيسان .

17852 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum pulchellum* (F).  
*Nivole gracile* (F).

أوراقه صفحية خفيفة النصل الفسفي اللون . ثمرانه الزهري يملأ نحو ٣٠ سم . زهرته صفيرة اللثة ، بيضاء اللون ، صفراء الحنجر ، خافتة العرف || أزهاره يستمر من أيار إلى حزيران .

17853 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum hiemale* (F).  
*Nivole d'hiver* (F).

أوراقه عيطية ، نحيلة ، زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٠ إلى ١٥ سم . ثمرانه ثنائي المصراع . أزهاره ثلاثية أو رباعية التجميع ، بيضاء اللون ، خضراء النشة . أزهاره يستمر من آذار إلى نيسان .

17854 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum aestivum* (F).  
*Nivole d'été* (F).

أوراقه صفحية الشكل جملة الخضار الزاهي . ثمرانه يملأ من ٢٠ إلى ٥٠ سم . يأتي بيضاء من الأزهار راجح معددا بين ٤ و ٨ وهي عاجية اللون خافتة العرف النطري . أزهاره يستمر من نيسان إلى أيار .

17855 - **عَبْرُوشِيَّ** (S). *Leucolum roseum* (F).  
*Nivole rose* (F).

نبته نحيلة زهقة . أوراقها دقيقة ، مستطيلة ، خالية النصل ، بحرية اللون . ثمرانها يملأ نحو ١٥ سم . ثمرانها ثنائي المصراع ، زهرتها وردية اللون ، وسيدة ، تطول نحو ١٠ سم || أزهارها يستمر من أيلول إلى تشرين الثاني .

17856 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictateur* (F). *Dictator* (E).

الجميل المطلق المصروف . ج عباطة .

17857 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Dictature* (F).  
*Dictatorship* (E).

الجملة الماطة المطلقة المصروف .

17858 - **عَبْرُوشِيَّ** (E). *Magnitude* (F). *Magnitude* (E).

تمير اصطلاحى يستعمل في قياس الضوء الفلكي وتحديد لمعان النجوم والكواكب .

17859 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Esclavisme* (F).  
*Pro-slavery* (E).

ملعن طبيعي حثه بعض أنواع النمل يرتكز على غزو قرى غيره من الأنواع وعلى سلب ما فيها من بيتين لا استغاثته واستعباده فيها بعد .

17860 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Esclavisme* (F).  
*Pro-slavery* (E).

المبور : الجملة من الفلم وقيل أصفر وقيل بعد الفلم ج حبار .

17861 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Apus* (F). *Apus* (E).

جلس دويبات مائفة مفترسة من القشريات غشويات الاطراف وقصيلة البصويات . أنواعها المرولة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المناطق والندارد والاهوار || أجسامها صغيرة شبه بيضوية الشكل ، مبطلة

لامسة الاطراف المختلفة الألوان . قرونها الاستشعارية زبام المفصل ، حلقة الاطراف . اسواق قوائم ذكورها الامامية ثلاثية النصل تحصل صفان من الحامض || رقاتها دقيقة ، صفيرة ، غيرة اللون ، سمره الرأس والملمب . امرضها وأضرها اقتصاديا البقوس .

17862 - **عَبْل** (F). *Grivet* (F).

هو الاقل المفصل ، اعطيه . وهو يجري في خالته وأوراقه الكثير من حامض التنيك لذلك يوقف الاسهال كما يصنع النمر وسيلفه أصفر قائم .

17863 - **عَبْلِيَّة** (F). *Aplidia* (F). *Aplidia* (E).

الواحدة عيطية . جلس حشرات غاشلة من غليات الاجنحة وقصيلة الجمليات صفحيات القرون . أنواعها المرفقة ست . اطرافها حوض البحر الابيض المتوسط || أجسامها شبه املحلية الشكل ، صغيرة اللثة ، تطول من ١٦ إلى ٢٠ سم . قرونها الاستشعارية صفحية ثلاثية اللون . رؤوسها وكواشها وبطنها احمر خضاباً من الخامد . ظواهرها لا يخلص كامل البطن || قوتها أوراق النباتات البحرية ولا تصف من للزراعة والبقلي .

17864 - **عَبْلِيَّة** (F). *Vitrina* (F). *Vitrina* (E).

جلس حيوانات برية من الرغويات مدهيات الاجل وقصيلة البزائيات . انواعها المرفقة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || تعيش في الموائع القرطية تحت الطحالب والجلدة وتحت جرز الحطب المقسورة بالثلج || اصداها صغيرة ، حلزونية ، رفيقة ، شفافة ، ملونة . أجسامها مستطيلة ، رباعية الالوان ، ملونة كالاصدا .

17865 - **عَبْلِيَّة** (F). *Vitrina* (F). *Vitrina* (E).

الجميل المطلق المصروف . ج عباطة .

17866 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Leucolum autumnale* (F). *Nivole d'automne* (F).

أوراقه خيطية نحيلة زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٥ إلى ٢٠ سم . ثمرانه سيد للمصراع . أزهاره صفيرة اللثة ، ثلاثية أو رباعية التجميع . بتلاتها وردية الناعمة والانتساب بيضاء الصفحة || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول ما يلي .

17867 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Leucolum autumnale* (F). *Nivole d'automne* (F).

أوراقه خيطية نحيلة زائجة الخضار . ثمرانه يملأ من ١٥ إلى ٢٠ سم . ثمرانه سيد للمصراع . أزهاره صفيرة اللثة ، ثلاثية أو رباعية التجميع . بتلاتها وردية الناعمة والانتساب بيضاء الصفحة || أزهاره يستمر طوال شهر تشرين الاول ما يلي .

17868 - **عَبْرُوشِيَّ** (F). *Leucolum vernum* (S). *Nivole printanière*, *Gréol blanc* (F). *Spring snow-flake* (E). *Frühlings-Knotenblume* (D). *Primstro*, *Campanello*, *Bulbo bianco* (I).

أوراقه صفحية منبسطة تعرض نحو ١٦ سم . نصلها جيل الخضار المائق . ثمرانه الزهري يملأ من ٢٠ إلى ٣٠ سم .



عَبْل



عَبْلِيَّة



عَبْرُوشِيَّ



عَبْرُوشِيَّ

Orgasme (F). عُقْر ، قُطْم ١٧٨٧٥  
Orgasm (E). المَسْتَرْ والقُطْمُ حالة الامتلاء التام التي تعقب التلحيج .

١٧٨٧٦ - عُقْرُب

هو سقاى حرته ، اطلبه . واحده عقره .

Genre spécifique (F). عُقْرُفَة ١٧٨٧٧  
Specific genus (E).

المسرة في تصنيف الاحياء هي الجنس الذي يشمل معظم الميزات العامة والخاصة للموصوفة .

١٧٨٧٨ - عُقْرُوف هو الذئب ، اطلبه .

١٧٨٧٩ - عُقْرُفَان ، عُقْرُسَان Gallus (S).  
Coqs (F). Cocks (E).

جنس طير من فصيلة التندريجات . ربع الحقة . قصير الاجنحة مستديرا . انفيه يتألف من ١٤ الى ١٨ ريشة منتفخة اقزام الاخير . رأسه منقوش برف لحسي ويجعل حل جانبي شقه رصتين لحيتين . منقار قوي القرنية ، مقوس الفك الاعلى . ساقه عفيه . ريشه اسطى او كاسي . غشاه خسة منها ثلاثة لامية دائمة واثنان خلفيان ، ويبدوها لا قياسي . دايرة قوية سادة الحروف || انماه خسة اشهرها العُقرُفان الداجن للمروف بالدياج بالاعلى .

١٧٨٨٠ - عُقْرُفَان بَنَكِيَّة \* Gallus Bankiva,  
G. ferrugineus (S). Coq de Bankiva (F).

طائر من العُقرُفان جميل الشكل ، طوله نحو ٦٠ سم . ثوبه مزيج الالوان الزاهية فيه الاسفر والبنجي والاسمر والاحمر والاريجاني والافضر الاصفر الملوح والاسود والاسمر والاففس . حره احمر اللون وريشاه كذلك || اثناء تدنق في القرية وترضع الحمصا بالقش والريش . تبيض من ٢٠ الى ٢٢ بيضة تحضنها بسدعا ثلاثة اسابيع . قوته الاشباح والحيوب والجار والخضر والخرشات . موطنه الهند الشمالية حتى ارتفاع ١٢٠٠ م . والسند وبورمه والهند الصينية والفيليبين .

١٧٨٨١ - عُقْرُفَان جَاوَه Gallus fuscatus (S).  
Coq de Java, C. tacheé (F).

نوع من العُقرُفان . طوله نحو ٦٥ سم . جميل الشكل حديد الالوان المزركبة الزاهية المنمقة ، يكثر في صدفه الاسود الاصفر الملوحي . حره الازرق الاشباح بنفسي القبة ، فكه الاعلى اسود اللون اما الاسفل فاصفر || موطنه جاوه .

١٧٨٨٢ - عُقْرُفَان دَاجِن \* ، عُقْرُسَان ، دَاجِج اُلهي

Coq domestique, Poule domestique (F). Domestic cock, Domestic hen (E).

نوع من العُقرُفان يعرف بالدياجج الاعلى . موطنه العالم . يقال انه يتصرف من عُقرُفان بَنَكِيَّة . حره السميتين قبل الميلاد بنحو ١٤٠٠ سنة . وحره البابليين به ذلك بنحو ٨٠٠ سنة ، لما اليونان ظم فلكرو الا في عهد اريستوتل وذلك نحو ٤٥٠ سنة قبل الميلاد || معروفه وبلااته عديدة لا تعد ، يقال انها تفوق الالف . فواريجها كثيرة منها الثوب والشكل والحجم والحر والفره وبعد انبيض وصفت اللحم والطاقة الاعائية والمناعة اللدائية ، الخ .

تلحفها جنات عديدة تلتف الطيور وتلتص بالرأس . ارجلها صخرية شديدة الصغر ، كثيرة البدن . اذانها طليقة ثنائية الحركة .

١٧٨٩٢ - عُورِيَّات \* Apusidae (S).  
Apusidae (F). Apusidae (E).

فصيلة دويبات مائية من القشريات عورِيَّيات الارطاف . اجناسها واذاها موصولة البدن ، منتشرة في معظم اقطار العالم . تعيش في المنطق والادوار حتى جفافها وتعود اليها عندما تعود المياه . سرعا يحتفظ بحيوته في الارض الجافة اكثر من ثلاث سنوات || اجناسها صغيرة القدر تلحفها جنات عديدة ملتصقة بالرأس . اقباليها الى الرعدة الحفرها الملوحي || جميعها مفترسة ، قوتها الحويثان والديدان التي تعيش في الماء || أشهر اجناسها الكويوس .

١٧٨٩٢ - عُورِيَّات Adenoma (S).  
Adénoma (F). Adenoma (E).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة الانتنيات . انواعها المعروفة قليلة البدن جميعها من ثورت افريقية الشرقية وسواحل الهند . تنبت في المواقع الرطبة || اوراقها متعاقبة ، صلبة القدر ، اذنية الاتصال الاهليجية الشكل ، حطرية العرف الشبيه بالشمع ، ازهارها وردية اللون ، عذقة العرف المتصبة . ازهارها سنبل التجميع .

١٧٨٩٤ - عُورِيَّفَان ، عُورِيَّفَان \* عُورِيَّفَان هو الشيطان ، اطلبه .

١٧٨٩٥ - عُورِيَّفَان اَبْنَسُ هو الشبح القمعي ، اطلبه .

١٧٨٩٦ - عُورِيَّفَان مَبْدُولُ هو الشولا ، اطلبه .

١٧٨٩٧ - عُورِيَّارَه هي اللد ، اطلبه .

١٧٨٩٨ - عُورِيَّة \* Abyss (S).  
Abyss (F). Abyss (E).  
البيلة حويل بحري من الحويثات وردية الماصات . يكثر وجوده في البحر الابيض المتوسط .

١٧٨٩٩ - عُورِيَّة اُزْرُق هو الشحية ، اطلبه .

١٧٨٩٠ - عُورِيَّات

الثاني والجار الثابتي واحد . راسع سمار الزرد .

١٧٨٩١ - عُورِيَّة السَمِيَّة Agnès, Appareux (F).  
Rigging, Apparatus, Gear (E).  
هي الادوات التي لا بد منها لصلاحية وتعتبر جزءا من السفينة في حالة البيع والارمن والحيز والتأمين .

١٧٨٩٢ - عُورِيَّة زَرْاعِي Masériel agricole (F).  
Agricultural material (E).  
هي الاجهزة الزراعية الثقيلة .

١٧٨٩٣ - عُورِيَّات الحائق من الخيل : التناجب ، مفردة حقيق || الحائق من الطير : الجوارح ، مفردة حقيق .

١٧٨٩٤ - عُورِيَّات Hyène mâle (F). Hyène male (E).  
الذكر من الضباع .



عُورُفَان بَنَكِيَّة



عُورُفَان دَاجِن

## ١٧٨٩٠ - عُنْم \* ، عُنْم ، زَيْتُون بَرِي

*Olea sylvestris*, *O. oleaster* (S). *Oleastre*, *Olivier sauvage* (F). *Wild olive tree* (E). *Wilder Ölbaum* (D). *Olivo salvatico* (I).

هو الزيتون البري شجرته تملو من ٥ الى ١٠ امتار . فروعه وإفاته شائكة . اوراقه معتقة سنائية . نصلها جامد اللسيح ، مذهب المقصبة ، يطول من ٥ الى ٨ سم . صفحته العليا بجمرة اللون والسفل خالية يطولها مواج فضي . أزهاره عطوي التجميع ، محوري الازدكار . أزهاره صغيرة غير بيضاء اللون ، غصنار المواج || ثماره بيضيه الشكل ، صغيرة القند ، قليلة اللب تدهى الزنج .

## ١٧٨٩١ - عُنُون

العتيد هو الجدي الذي استكرش وقيل هو الذي بلغ السفاد .

١٧٨٩٢ - عُنُونَة  
*Chamelle bonne laitière* (F). *She-Camel great deal of milk* (E).

الناقة الغزيرة الدر .

١٧٨٩٣ - عُنُونِي \*  
*Nova* (F). *Nova* (E).  
النبي كل نجم يشد غيبه لجمه ثم يجر . ج . حثات .

١٧٨٩٤ - عُنِين  
*Cheval pur sang* (F). *Blood-horse* (E).  
نعت تمرني يطلق على كل فرس كريم منسوب السلالة .

١٧٨٩٥ - عُنُون  
*Mites*  
كلمة شاملة تطلق على عدة حشرات من فصائل مختلفة يجمعها ما تلحق من اذى بالحيوان والطير والفراء والالبسة الصوفية والكتن ، الخ .

١٧٨٩٦ - عُنَان \*  
*Fumago vagans* (S). *Fumagine*, *Noir*, *Suie* (F). *Sooty mould* (E). *Russta* (D).  
وسم فطري يمد الى مختلف انواع العثان من فصيلة الفريسيات ورتبة الفريسيات . يصيب نوعي النبات فيركب الاذن والاوراق الفتية ويمتصها ويوشع لبد من السنام ينمها من القيام بوظيفتها || اضراره قليلة لانه محدود الانتشار يمتد بالبرتقال والزيتون والكرمة وبعض النباتات الصناعية كالتبغ .

١٧٨٩٧ - عُنَنَة  
*Dermestes*, *Attagenus* (S). *Dermeste* (F).

جنس حشرات مؤذية من فصيلة البشيات . انواعها كثيرة العدد ، جميعها صغرة القند باعثة الالوان . تميش على اضرار البساتين || رقاتها مؤذية تفسد الحبوب والالبسة والبط واللحم والصوف والريش والفراء واللحم المقددة ، الخ . اضرارها واضررها ما يتبع .

## ١٧٨٩٨ - عُنَّة الحُبوب \*

*Trogoderma granarium*, *T. versicolor* (S). *Trogoderma des grains* (F). *Khapra beetle* (E). *Khaprakifer* (D).

حشرة من البشيات طولها نحو ٣ م . ثوبها بني اللون ، رأسها وبرشها ورطبها سود . زبالها الى الحرة الاوروبية . رقتها حليلة الجسم ، دقيقة القند ، بنية الثوب الجذع بالايض . تركيب الحبوب المخزونة فتلتهمها وتلتفها .

## ١٧٨٩٣ - عُنْرَقَان سَرْتَدِب

*Gallus stanleyi*, *G. lineatus* (S). *Coq de Stanley*, *C. de Ceylan* (F).

نوع من العتقان ، ثوبه ثوب عتقان بكيفه الا انه اسفر البرق والورشتين حاد الصوت للسيل للقرقرة . موطنه سرتديب .

١٧٨٩٤ - عُنْرَقَان هِنْدِي \*  
*Gallus sonnerati* (S). *Coq de Sonnerat*, *C. sauvage de l'Inde*, *Katukoli* (F).

نوع من العتقان . موطنه الهند . طول نحو ٥٠ سم . ثوبه كثالب ، جسمه متراكب الالوان الكثيرة الزائجة غير انه يتركز على الالوان الاربعة . حرفه احر اللون وريشاته كذلك ، مقاربه وريشاته الى الصفرة || جسمه مع سائر انواع جسمه الاجنح الاقضية الاخصان .



عنيس

١٧٨٩٥ - عُنْرِيَس \*  
*Atherix* (S). *Athérice*, *Athérice* (F). *Atherix* (E).

جنس حشرات من فصيلة السليبيات ورتبة ذوات الجناحين انواعها المعروفة عشرة اعطائها تمتد من الصين الى اوروبا || اجسامها ممتصة القند ، تطول من ٨ الى ١٠ م . رؤوسها كبيرة . عريضا كبيرة ، فلقية عند التقين . قرنيها الاستشعارية صغيرة ونحيلة . اعطائها مستطيلة . ملابها صغيرة . كراسها كبيرة . بطونها مستطيلة . ظنايب قوامها الوسيط والمخلفة شائكة للناسخ اللدية . وراشها ملونة والظايب ايضا || تألف الملقح الرطبة وشفاف عياري الماء . جميعها قاصدة . يرقاها تميش في الماء على المواد الصوفية المنسلة .



ثم

١٧٨٩٦ - عُنْرِيَس \*  
*Campaphagus* (S). *Campaphage* (F). *Campaphagus* (E).

جنس طير من فصيلة الترسيات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ جميعها من اويده وضوارب العالم القديم . تألف النباتات والاحراج والحدائق || اجسامها صغيرة القند ، زائجة الالوان المستعيرة الاطراف . صغيرة المناظير اللدية . الظايب متباينة الالوان المتراكبة . رؤوسها مبلقة . صدورها وبعطوها محتلة تملوها رقة سمراء تنصر حتى الانقاذ || قوتها الحشرات الصغيرة والاساريع والديدان والذباب . تدن في الاجنح لقتل المعتلة الارتفاع البعيدة من السمك . تحسن نحو خمس يضياف ترعها الاثان بمناوبة الكدور نحو ١٥ يوما .



عثان

١٧٨٩٧ - عُنْرِيَسِيَات \*  
*Campaphagidae* (S). *Campaphagidae* (F). *Campaphagidae* (E).

فصيلة طير من الجوام مشروبات المناظير . اجسامها والظايب المعروفة عديدة لا تقل من تسعين . موطنها العالم القديم ، معظمها اسيري وبعضها اوروبي وافريقي . الانواع الاسيوية والادوية من الضوارب اما الافريقية قليلة || تألف النباتات والاحراج والحدائق . قوتها الحشرات واساريها والديدان والذباب || اجسامها تراوح بين الصغيرة والوسطى ، تتميز بمناظيرها الصغيرة اللدية وبانفها قرطاجية الريش || اشهر اجسامها الترس .

١٧٨٩٨ - عُنَنَة  
*Agamie* (F). *Agamy* (E).  
هو اندام الاضمار .

١٧٨٩٩ - عُنَنَة  
*Lever* (F). *Lever*, *Crow-bar* (E).  
هي الزائجة اي الخلل . ج . حل .



عنة الحبوب



١٣٧ - عثة السجاد \* *Anthrenus verbasci* (S).*Anthrène des tapis* (F). *Carpet beetle* (E).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها اسود اللون. عذماها مدبجتان يقع شرقية طلاء اللون. ريقها دقيقة قصيرة حلوية الجسم، سمراء اللون، سوداء الرأس والأرجل، يضاء للذب. تلحق السجاد وتآكل الأثاث الصفي.

١٣٨ - عثة الشمع \* *Dermestes lardarius* (S).*Dermeste du lard* (F). *Larder beetle* (E).

حشرة من العثيات طولها نحو ٩ م. ثوبها اسود اللون تملو شحمة خلية طلاء. تتركز في النصف الاول من العمدن || ريقها غبراء اللون تلمس الشمع والقراء وتآكل المواد الحيوانية.

١٣٩ - عثة البرك \* *Dermestes vulpinus* (S).*Dermeste renard* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٨ م. ثوبها اسود اللون، الفم الخواص الحلية. يطنها إلى السمرة يملو خط قاطب أحمر || ريقها سمراء اللون سوداء الرأس والفرج والأرجل. تركب القراء والجبن وتختلف المواد الحيوانية والنباتية.

١٤٠ - عثة الفرائين \* *Actagenes pelio* (S).*Actagene des pelledors* (F).

حشرة من العثيات طولها نحو ٤ م. ثوبها حشلي اللون. الفم المراج تحمل في كل من عذماها نقطة يضاء || ريقها ففراء اللون سمراء الرأس تحمل عند ذريها ضمة من الحلب الغويل. تركب وتقرض القراء والبسط واليابب الصفي.

١٤١ - عثة الكمون \* *Anthrenus pimpinellae* (S).*Anthrène des pimpinelles* (F).

حشرة من العثيات يضيئة الشكل طولها نحو ٣ م. ثوبها إلى السمرة تحمل في وسط عذماها جدة مسطرة يضاء اللون. تركب بيوم عام جميع اضرار نباتات فصيلة المركبات اعصها الكمون والأنيسون.

١٤٢ - عثة المتاحف \* *Anthrenus museorum* (S).

*Anchrène des musées* (F). حشرة من العثيات جسمها يضيي الشكل مبطط. طولها نحو ٣ م. ثوبها ابيض اللون. تعيش على اضرار نباتات الفصيلة الحمسية || ريقها صغيرة، دقيقة، غبراء اللون، مجذعة بطول حلوية حشلية، تقرض كل ما وصلت اليه من المواد الحيوانية المحفوظة كالخشب والجلود والحيوان.

١٤٣ - عثجول \* *Clavatus* (S).*Clavatus* (F). *Clavatus* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مدفقات الارجل وفصيلة للكريزيات. انواعها المعاصرة المروفة نحو ٢٠ منتشرة في بعض مناطق المحيط الاطلسي وشواطئ افريقية الشمالية || اصداها وشعبة الشكل تملوها بعض المتاحف الكبيرة المأددة. فروعها شبه فريضة الشكل. مدول الفوية مجهز بثلاث اسنان، السن الوسطى قصيرة اما الجانبيتان فكثيرتا القد مدببتا الاطراف.

١٤٤ - عثجول \* *Culture sèche* (F).*Dry-farming* (E).

المشر والرشي والبدي: ما سقته البساتين على الاجار والزرع. ومنه في حديث الاكاذب: ما كان يدر أو شرباً فيه لشمس.

## ١٣٧ - عثجول

هو الأطر من النباتات الزينية، اطاله.

## ١٣٨ - عثجول

غير نحو غير الريان في القدر وورقه احمر مثل ورق الحماض ريق عليه بطون المثنية ابل شيء ثم تفتح عليه الشمع بعد ذلك وله صالح جحر وله حب كحب الحماض. واسفة شربة (من اي حنيفة).

## ١٣٩ - عثجول

هو البقس الدائم الحفرة، اطاله. واسفة حقة.

## ١٣٩ - عثجول

*Panicule* (F). *Panicle* (E).

عقود من السيليات بسيطاً كان أو مركباً.

## ١٣٩ - عثجول

*Paniculé* (F). *Paniculate* (E).

نمت تعريفي يوصف به الازهار الذي شكله شكل الشكل.

## ١٣٩ - عثجول

*Bouture* (F). *Slip, Cutting* (E).

هو كل قصيب أو فند أو حقة الخ. صار قطعة وقصيرة للفرس.

## ١٣٩ - عثجول

*Bouture* (F).

*Propagation by slips, P. by cutting* (E).

حلية فرس المثالب بعد تأليبها.

## ١٣٩ - عثجول

*Schizophytes* (F).

المطويات فنة من النبات تتكاثر بالتجزئة أي بقطع جزء منها وفريه في التربة. يقال نبات مطوي.

## ١٣٩ - عثجول

فرع الجباري وطرخ الثبان.

## ١٣٩ - عثجول

الشيخ: القسم الثقيل من الابل.

## ١٣٩ - عثجول

*Dermestidae* (S).

*Dermestidae* (F). *Dermatidae* (E).

*Speckkäfer* (D).

فصيلة حشرات البث من رتبة مدفقات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة المدد جميعها صغيرة القند، زهاب الجسم، متراكبة الانواع المختلفة الزركفة. قرونها الاستشعارية صرطنائية الشكل. اوسافها حلوية الشكل || تركب الازهار ولحاء الاشجار وتختلف المواد الحيوانية. ريقها تعيش على المواد المضوية وبقايا الحيوان الجافة كالجلود والقراء والريش واللحوم المقددة، الخ.

## ١٣٩ - عثجول

*Densiflora* (F).

*Densiflorous* (E).

نمت تعريفي يطلق على كل نبات متراكب الازهار البلية.

## ١٣٩ - عثجول

*Ergot* (F). *Spur* (E).

دائرة الطائر آتي يقرب بها.

## ١٣٩ - عثجول

*Salario* (F).

*Salary, Hire* (E).

هي الاجرة التي يتقاضاها العامل لقاء لفسل الذي قام به.

## ١٣٩ - عثجول

المعجم الخفاش الضخم.



عثة السجاد



عثة الشمع



عثة الفرائين



عثة الفرائين



عثة المتاحف



عثجول

اجناسها وأنواعها المرفوعة عديدة معظمها من نمول المناطق الاستوائية والحارة || جميعها حرجية تألف العذابات والحدائق اجسامها كبيرة القند بمجهزة بمخاض حادة تهريق السم او تقلقه من بعد || بعض انواعها دجوي والبعض الآخر يسرح في النهار || اشهر اجناسها المعروف والكبار .

١٧٩٣٦ - **عَجَز**  
هي القناب الذهبية ، تأخذ السخلة لتطير بها . ج. عجزان .

١٧٩٣٧ - **عَجَز**  
Déficit (F). Deficit (E).  
هو مقدار النقص المحقق بعد اجراء كاسل الحساب .

١٧٩٣٨ - **عَجَز ، قِب**  
Sacrum  
عظم في آخر سلسلة الظهر .

١٧٩٣٩ - **عَجَز الاستغلال**  
Déficit d'exploitation (F). Working deficit (E).  
هو ما نقص من العمل بعد تقويم المستغل بالنسبة الى الكلفة .

١٧٩٤٠ - **عَجَز الأسد**  
عجز الاسد اربعة كواكب صغار اسفل من المراء .

١٧٩٤١ - **عَجَز حرثي**  
Sacro-iliac (F).  
Sacro-iliac (E).

١٧٩٤٢ - **عَجَز ذبلي**  
Sacro-caudal

١٧٩٤٣ - **عَجَز قرحي**  
Sacro-rectal  
ويسمى مستقي وهو يختص بالحي المستقيم .

١٧٩٤٤ - **عَجَز عصفري**  
Sacro-coccygien (F).  
Sacro-coccygeal (E).

١٧٩٤٥ - **عَجَز فقري**  
Sacro-vertébral (F).  
Sacro-vertebral (E).

١٧٩٤٦ - **عَجَز قطني**  
Sacro-lombaire (F).  
Sacro-lumbal (E).

١٧٩٤٧ - **عَجِف**  
Qui se prive de nourriture (F).  
نمت تمريني يطلق على كل فراشة او حشرة جلابة لا تفارق القوت . وهي ، غالباً ، تعيش من يوم الى اسبوع . م. عيفة .

١٧٩٤٨ - **عَجِفَاء**  
Terre aride (F).  
Barren ground (E).  
المجفأ والأرض المجفأ : التي لا خير فيها .

١٧٩٤٩ - **عَجِفَات**  
Entomophthoraceae (S).  
Entomophthoracées (F). Entomophthoraceae (E).  
فصيلة لطور مجهرية من مرتبة النطرييات ورتبة الليفيات .

١٧٩٥٠ - **عَجَل**  
Veau (F). Calf, Veal (E).  
ولد البقرة حتى السنة الثانية من عمره ثم يصبح جنداً .

١٧٩٥١ - **عَجَل البعير**  
هو الفقة حيوان مائي لبون ..

١٧٩٥٢ - **عَجَل حصي**  
Boufflon (F).  
Young bullock, Steer (E).  
هو المجل سلأ غصيتاء .

١٧٩٢٢ - **عجكان**  
Périnée (F). Perineum (E).  
المسافة الكائنة بين عضو التنازل والشرج .

١٧٩٢٣ - **عجكاني**  
Périnée (F). Perineal (E).

١٧٩٢٤ - **عجاية**  
Tendon  
العمامة . ج. عبي وصبايات وصبايا : اوتار قوائم الخيل والاول .

١٧٩٢٥ - **عجيب**  
هو جلاب انيل ، اطلبه .

١٧٩٢٦ - **عجيب ، عجيب**  
Racine de la queue (F).  
Origin of the tail (E).

المعيب : اصل الذنب وهو من كل دابة مسا اتم عليه الوركين من اصل الذنب المنزوي في مؤخر العنبر . وهو المعصم والمعيب . ج. اعصاب ومعيب .

١٧٩٢٧ - **عجند**  
Raisin sec (F). Raisins (E).  
البيد هو التزبيب او حب التزبيب .

١٧٩٢٨ - **عجير ، عكيد**  
Loupeux (F).  
Wenny, Knobby (E).  
من الثبات ما كان ذا عير او عقد .

١٧٩٢٩ - **عجيرة**  
Eclat de souche, Souche,  
Souquet (F). Shiver, Splinter, Ragstone (E).  
جزء من اروية الشجرة ، يحل برمة او بعض الجرام ، يقطع ويلتص .

١٧٩٣٠ - **عجيرة ، معجيرة**  
Défolié (F).  
Defoliate (E).  
شجر عجرد وبمعرد : حار من ولة .

١٧٩٣١ - **عجورم ، أشكل**  
Rhamnus pestiolaris (S).  
Nerprun pétiolé (F).

الأشكلة حيرة وأشكلة : شجرة برية ، حرجية ، جبلية من فصيلة النبقيات . اصنامها بعض جبال الشرق الادنى ومنها جرد لبنان || سلكها فرعاء كثيرة العقد الشائكة . فروصها متعاقبة ، متفرعة ، شائكة . اوراقها متعاقبة ، معتقة ، سنائية الاتصال الجمعدة ، شديدة الحفار ، متعاقبة العروق . ازهارها ضمية التجميع ، غشوية ، خاسية الاجزاء . ثمارها كروية لحمية ، سامقة المذاق ، جزوية اللون عند الادراك || ازهارها يسمر من ايار الى حزيران .

١٧٩٣٢ - **عجورم**  
دوية سلبة تكون في الشجر (اللبن) .

١٧٩٣٣ - **عجورمة**  
شجرة شائكة كثيرة العقد . ج. عيرم .

١٧٩٣٤ - **عجورم**  
Camponotus (S).  
Camponote (F).

جنس نمل كبير القند عديد الانواع يكثر ويهدد في اسراج البلاد الحارة . منه انواع تبنى قراها بالطين وفيها تسردب الخشب وتقتضه .

١٧٩٣٥ - **عجورميات**  
Camponotidae (S).  
Camponotidae (F).  
فصيلة حشرات من النمليات عشائرات الاجنحة المحمويات .



حبرون

١٧٩٦٢ - عَجُور \* ، عَيْدُ اللّاهِي

Cucumis chate (S), Concombre chaté, Abdellavi des Egyptiens (F), Chate of Egypt, Orange melon (E), Agyptische Melone, Orangen Melone (D), Clatze, Cocomero d'Egitto (I).

نوع من الفناء المأكول الثمار تكثر زراعت في البلاد الحارة انحصار مصر والسودان . يجود في الاربة البدائية المتروكة الانتماع وهو يرغب في الري لكث يخشى الرطوبة المتحمكة

١٧٩٦٣ - عَجُورُ الْفِرْيَاسِي

هو البياض الزراري ، اطبه .

١٧٩٦٤ - عَجِيج (F). Bauglement, Meuglement  
Bellowing (E). صوت البقر من ذكر واثق .

١٧٩٦٥ - عَدَدٌ ، عَدَدٌ (F). Dénombrement  
Enumeration (E). البعد والعدد هو الاصحاء التي لمشتلات مكان معين .

١٧٩٦٦ - عَدَاهُ ، وَكِر (F). Couraer  
Runner (E). كل من كان سريع العدو او اشترك في سباق الركض .

١٧٩٦٧ - عَدَاهُ الْفُطْ (F). Octodrome  
طائر من طواي الساق يدعى جيتوكس ، اطبه .

١٧٩٦٨ - عَدَابِي ، وَصَلُ التَّالِج (F). Tanguo, Tanque, Tangu (sable fin) (F). Slimy sand (E). رمل وصل والر القشار والشناسر المشدنية التيشلية . يستعمل في دمل الاربة القامدة الانتماع .

١٧٩٦٩ - عَدَاكُ (F). Effectif (F). Actual (E). هو مجموع الاجراء والمال والموردون الذين يقتضون ال فكرة ما او مصنع او مؤسسة ، الخ .

١٧٩٧٠ - عَدَادُ السَّرْعَةِ (F). Compteur de vitesse  
Quickness meter (E). آلة تستعمل في معرفة سرعة الشيء .

١٧٩٧١ - عَدَاكُ \* ، هِدَاكُ (F). Hydra (S). Hydra (F). Hydra (E).

جنس حيوانات مائية من العنديات اربعة عشرة امدود جميعها مفرقة تعيش لاصقة على النباتات البحرية . اجسامها مؤلفة من اثنيون عضوي دقيق طوله يراوح بين ٥٠ و ٥٠٠ سم ومن جناس خيطية تحمله شديدة الغلوط وظيفتها التقبض على الحيوانات الدنيا التي تمر في حياها .

١٧٩٧٢ - هَدَاكُ \* (F). Zoidiome  
Zoidiome (F). لغت تعريفية يطلق على كل نبات لا يتم تأييد ازغاف الا بواسطة الطير او الحشرات .

١٧٩٧٣ - هِدَاكُوت ، هِدَاكُوت (F). Hydrains (F). رتبة حيوانات مائية من المحفلات .

١٧٩٧٤ - هِدَاكُوتَا (F). Zoidigamin (F). Zoidigamy (E). اسم يطلق على التأييد الذي يحصل بواسطة الطير والحشرات .

Véle (F). She-veal (E).

ابنة البقرة حتى السنة الثانية من عمرها ويعدنا تصح جلدته .

١٧٩٤٤ - عَجَلَةٌ ، طَبِير (F). Charrette, Tomberau (F). Cart, Tip-cart (E). حربة النقل ذات دولابين .

١٧٩٥٥ - عَجَلَسُ \* (F). Hoplestachus (S).

سمكة بحرية وحيدة الجنس والنوع من فصيلة العنديات النالكات الزمانف . موطنها المتوسط والاقزم . تتميز بعينها الكبريتين المستديرتين وبزواية الانكسار الثالثة التي تملو كامل رأسها . طولها نحو ٢٥ سم . ثوبا الى السمرة الصفراء يعلوها مزاج بنفسجي . يعلها فصي اللون ، زعانفها وردية والزعفرية منها كبيرة القد فارقة .

١٧٩٥٦ - عَجَلَسُ الْمَتَوَسَّط (F). Hoplestachus mediterraneus (S).

Hoplestachus de la Méditerranée (F). Hoplestachus mediterraneus (E).

سمكة بحرية بيوض من فصيلة العنديات رتبة نالكات الزمانف . اصطناعها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي . تعتبر من املاك الثنائ . ملجئها الحياتي شرسني الى جسمها شبه بيضي الشكل ، متدل التليط ، طولها من ٢٠ الى ٢٥ سم . ثوبا الى الخضار الزرقبي يعلوها مزاج بنفسجي يميل في الظهر . يعلها فصي المزاج . زعانفها متراكبة الاخر والوردي . رأسها كبير الحجم ، اظفار الخيط ، تملو زعانف نائكة . شعها رصب الانفراج . فكها اسفلي يتقدم العلوي . اسناتها صغيرة ، منارحة ، حلية السطح . عينها كبيرتان ، مستديرتان ، نافذتان ، مملوكتان بالزوايق النائكة . زعانفها الظهرية واحدة ، مستطيلة الشكل . زعانفها القيلية كبيرة ، لائقة الى عيناها متوسط الصنف ، مأكولة .

١٧٩٥٧ - عَجَمَكَة (F). Noyau (F). Stone (E). القسم الداخلي من الثمرة صلب وقسا وسوى البزرة .

١٧٩٥٨ - عَجَمَكَة (F). نخلة تثبت من فؤدة .

١٧٩٥٩ - عَجَمَكِيَّات ، لَوْرِيَّات (F). Arbres à noyaux (F). Trees from stones (E). هي الاشجار الجمية البزور كالفراخ والخوخ والشمش والقرن ، الخ .

١٧٩٦٠ - عَجَمَن ، إِعْصِيَان (F). Péérinage (F). Kneading (E). عملية غلط العقيق بالماء ودعكه ليسير صعبا .

١٧٩٦١ - عَجَمَهْمُ \* ، أَبْرُ جَكَم (F). Rhynchope (S). Bec-en-ciseaux (F). Scissor-bill, Stimmer (E).

جنس طيور راسه مائنة من صليحيات الناقير كنفات الاقدام . انواحه حصة جميعها لقتل الكوب . تتميز بشكل منقريها التي تشبه جلي الحياض . رؤوسها صغيرة القد . اسناتها طويلة . اجنحتها مستطيلة ذائقة . اذنانها فارقة . موطنها البلاد الحارة . تأنف التسلط البحرية والحرية . ثوبا الحشرات والامساك . مسرحها دجوي يتعد من القرب الى الشروق الى انائها تثن في انحصار لغيرها على الرمل بين حصور الجرف والشرابي .



عجل



عجور



عجور



عدار

القدم || جسمها صلبية ، متوشط القد ، متكاثف الخمل .  
يصلها تراوح من ٤ الى ٦٠ م . الاذن اكبر قدماً من  
الذكر واهت ثوباً منه . رأسها مخروطي . مينها صغيرتان ،  
بارزتان . زباناتها شطيان مزدوجتان . خطها قصير .  
مسلها صغيران . اجنتها كبيرة ، ملونة وبسقة ||  
سرقها غاشلة تعيش على اوراق البتليات .

Adrastra (S). \* هَدْرِيَسَكَة \*  
Adrastra (F).

جنبة معمرة بيرية وزراعية تربيته من فصيلة الالانبات .  
مينها جزر الزرايع || سلقها تنسبة . فرومها نحيلة .  
اوراقها شتاقية ، سنانية النصال الجمادة المتوسطة القد .  
ازهارها فردية التنسج ، طرفي الاوتكاز . ازهارها كبيرة ،  
خماسية البتلات ، تبينة اللون يعلوها موانج ليلكي || تزرع  
في الحدائق في الموانج الجنوبية لانها تحشى صبح الشتاء .

Endromididae (S). \* هَدْرِيَسِيَّتَة \*  
Endromididae (F). Endromididae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حشرقيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها المعروفة قليلة المند جميعها شتالية الاصلان .  
مركزها التربيته يقرها من البتليات || اجسامها صلبة ،  
شبه اسطوانية الشكل ، ينفذها خل مستطيل ، يسلها  
تواضع من ٥٠ الى ٦٠ م . انثاها اكبر قدماً من ذكورها .  
رؤوسها مخروطية . عينها مرطاه . اعطافها قصيرة . ملاسها  
صغيرة . قرونها الاستشعارية شطية مزدوجة . اجنتها  
كبيرة ، حادة التهديب . الوانها متراكبة الالوان الجبلية .  
اسارمها شبه مرطاه ، تعيش على الانجبار . اكمال خادراتها  
ثم ضمن صلجة مستقلة || اشهر اجناسها المدرس .

Mules (F). Mule (E). \* هَدْس \*  
الهدس والهدس هو البيل وقد سموه بزمير . قال الشاعر :  
اذا حلت بذي من على حسن

١٧٩٨٨ - هَدْس \* ، بِسْن \*  
Ervm lens, Lens esculenta (S). Lentille (F). Lentil (E).  
Echte Linse (D). Lente, Lencichla (I).

نبات عشبي زراعي حولي من فصيلة القرنيات الفراشية .  
شروبه عديدة تختلف باختلاف مقدورها الانمائي والانتاجي  
وسرعة ادراكها والوان حيويها . القع . جميعها صغيرة  
القد ، جذورها سطحية ، سيقانها مضطمة لونها تلو من  
٢٠ الى ٤٠ م . اوراقها مركبة ، متساقية ، حنية  
الاطراف . وريقاتها صغيرة القد يفسية الشكل متعاقبة .  
ازهارها محورية الاوتكاز ، طويلة المانيق ، يضاء اللون ،  
زرقاء التبرج . ثمارها قرون صغيرة مغلطمة ، ماسة البشرة ،  
يوجد في داخل كل منها من الحبة الى الحبتين || وهو  
من البتليات الزراعية الشائعة الاستعمال بمجدي في جميع الاربية  
المخفية للمنتد الانساج التي لا تقتصر الى الكلس . موقعه  
في الثورة الزراعية يأتي في الاول ثم تليه الحبة او الصبر .  
والعس من البتليات المشهورة بفزارة موداسها اللذائية  
الثامنة . فهو يحوي نحو ٨٢ وحدة غذائية يمكن تحميدها  
كما يلي :

مولد هيدروكو بونية ٥٨ %  
مولد برونية ٢٢ %  
مولد دحية ٢ %

اما تين العيس فهو من انواع الكلاء الجيدة التي تتلفها  
المواشي بشوة .

Hydroides (F). هَدْرِيَّات ، هَدْرِيَّات \*  
طبقه حيوانات مائية من شعبة الهيفات تشمل ثلاث رتب :  
البدارات والمرجاتيات والجلجليات .

Génétique (F). Genetic (E). \* هَدَالَة \*  
علم يبحث في التمثل وروابطه واراسره عنه الحيوان  
والنبات .

١٧٩٧٧ - هَدَدَنَام ، هَدَدَصَحِيح ، هَدَدَكَمِيل \*  
Nombre entier, N. intégral (F). Integral number,  
Whole number (E).

١٧٩٧٨ - هَدَدَقَانُونِي ، نَصَاب \*  
Quorum  
هو المند الاقل المفروض ليكون اجتماع اعضاء الجمعية  
قانونياً .

١٧٩٧٩ - هَدَدَ كَسْرِي \*  
Nombre fractionnaire (F). Fractional number (E).

١٧٩٨٠ - هَدَدَ مَرْكَب \*  
Nombre composé (F). Composita number (E).

١٧٩٨١ - هَدَدِي \*  
Numéral, Numérique (F). Numeral, Numerical (E).  
دال على عدد او مخصص بالعدد .

١٧٩٨٢ - هَدَر \*  
Striga (S).  
Strige, Goutte de sang (F). Witch weed (E). Echte  
Witchweeder (D). Striga (I).

جنس نباتات عشبية بيرية مرموعة من فصيلة الخنازيريات  
مهدا البلاد الحارة تكثر في المروج وفي البور على السواء .  
يقال انها طيبة .

١٧٩٨٣ - هَدْرَكْس مَعْقَب \*  
Adrastra limbatas (S). Adrastra bandé (F).  
Adrastra limbatas (E).

حشرة غاشلة ناهمة من فصيلة السالويات ورتبة مدمدات  
الاجنحة . موطنها بعض اقالم البلاد المطلة الحارة من  
الشرق الاطل واروبه . تألف الموانج للرطبة والمروج وضفاف  
الاء والارواح المغلة . غنقتها تعيش على اوراق النبات .  
يرقاتها تعيش على المواد الضعوية وعلى جذور البتليات  
المسارة نحو الاخلال || جسمها صغير دقيق بطول من  
٦ الى ٦ م . ثوبها ثنائي اللون ، اسود الجسم ، كشي  
الظفران المصب بحداسه . رأسها صغير القد . زباناتها  
عظيمة . مينها صغيرتان . اربافها خلسة العقل ||  
الاذن ايز قدماً من الذكر واهت ثوباً منه وتقص زبانا  
واسمها يسلها || جيلها رباعي الخول . تظهر الحشرة  
الجبلية في اواخر شهر ايار وتبقى حتى اواخر تموز .  
تسرح في النهار وتبيت في الليل || زين الدساق يستمر  
طول شهر حزيران وترز المكن في الجباله وحت الليل  
ضمن انابيب سبحة الشكل || البرقة منه ادراكها الكمال  
الجمسوري قطلي نحو ١٢ م . ثوبها الى الصفار المانيق  
التناهي الموانج || طول الاكمال يستمر من ٤٥ الى ٥٥  
ويما ويتفشي في البرية .

١٧٩٨٤ - هَدْرِيَس \*  
Endromis (S).  
Endromis (F). Endromis (E).

حشرة من فصيلة المدرسيات ورتبة حشرقيات الاجنحة .  
اصلها تشمل كامل المنطقة اللبنانية وما يتأخها من العالم



عدراس مصب



عدريس



عدرية



عس

١٧٩٨٩ - عَدَمُ الْمَاء \* Irrévocabilité (F).

Irrevocability (E).

صفة تنبئ بها الحية بين الاحياء وقد لا تصح بدونها  
فمسلما انه يحظر على الزواج ان يحتفظ لنفسه مباشرة  
او مفادورة في عقد الحية بحق الاطلاق او التخليط .

١٨٠٠٢ - عَدَمُ الصَّحَّةِ Irrégularité (F).

Irregularity (E).

هو القصور الذي لا يصح للمرضع الا بدنه .

١٨٠٠٣ - عَدَمُ الْمَحْجُوزِيَّةِ ، عَدَمُ الْاِحْتِجَاج Inopposabilité (F).

Inopposability (E).

هو ان يستحيل على الخصم ان يبيع نفسه بحق له .

١٨٠٠٤ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّعْزِيلِ Incassabilité (F).

Untransferable (E).

صفة الاموال التي لا يمكن نقل ملكيتها الى الغير .

١٨٠٠٥ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّصَرُّفِ Inaliénabilité (F).

Inalienability (E).

صفة الاموال المينة التي لا يمكن نقلها او تملكها  
بعقود حقية جديدة كالارثاق والقرن ، الخ .

١٨٠٠٦ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ التَّقَادُّمِ Imprescriptibilité (F).

Imprescriptibility (E).

صفة تلازم حقاً او دعوى لا يستعملها مرور الزمن  
ككسارى الاحوال الشخصية والاملاك العامة .

١٨٠٠٧ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْحِزْمِ Insaisissabilité (F).

Unseizability (E).

صفة عين ثابتة او منقولة لا يستطيع الدائن مالهها ان  
يبيعها .

١٨٠٠٨ - عَدَمُ قَابِلِيَّةِ الْقِسْمِ Indivisibilité (F).

Indivisibility (E).

هي حالة ما تقسم قسمه مادياً او معنوياً . كالاقطار  
وسبق الارتفاق والالتزام ببيع ثمن حيوان حي معين .

١٨٠٠٩ - عُدْمُ Parcnoptère mâle (F).

Parcnopterus male (E).

الذكر من الغريم .

١٨٠١٠ - عُدْمُ Parcnoptère (F).

هو القنفذ ، اطليه .

١٨٠١١ - عُدْمُ أَخْضَرِ Grenouille verte (F).

هو الضفدع الاخضر ، اطليه .

١٨٠١٢ - عُدْمُ أَشْعَرِ Grenouille poilue (F).

هو الضفدع الاشعر ، اطليه .

١٨٠١٣ - عُدْمُ أَغْرَ Grenouille rousse (F).

هو الضفدع الاغر ، اطليه .

١٨٠١٤ - عُدْمُ الْحَقْلِ Grenouille oxyrhine (F).

هو الضفدع الحقل ، اطليه .

١٨٠١٥ - عُدْمُ جَبَّارِ Grenouille géante (F).

هو الضفدع الجبار ، اطليه .

١٨٠١٦ - عُدْمُ نَشِيطِ Grenouille agile (F).

هو الضفدع النشط ، اطليه .



عَسَمَ الْمَاء



عُدْمُ

Lemma (S). Lentille d'eau, Lentiole, Canifée, Canelle (F). Duck-weed, Water-lens, Water lentil (E). Kleine Wasserlinse (D). Lenticularia, Lente d'acqua, Erba antrina (I).

جنس نباتات شبيهة مائية من وحدات الفلقة ونباتات  
عسيمات الماء . تتميز بصغرها ودقة سوقها واستدارة اوراقها  
المدنية الشكل والقد التي تغلق على سطح الماء . ازهارها  
وحيدة المسكن ، ثلاثية التجميع يضمها ثمرات واحد  
يتألف من زمرتين ذكريتين وثمرات اثنتى واحدة .

١٧٩٩٠ - عُدْمُ مَرُ هو الاينوسارون ، اطليه .

١٧٩٩١ - عُدْمُ الْعَيْنِ Lentille de l'œil (F).

Eye lens (E).

١٧٩٩٢ - عُدْمُ سَيْفِ الْمَاء Lemnaceae (S).

Lemnaceae (F). Lemnaceae (E).

نباتات عسيمات الماء من وحدات الفلقة . اجناسها ١ وانواعها  
٢١ . جميعها من النباتات المائية والنباتات المنتشرة في جميع  
اسواق العالم .

١٧٩٩٣ - عِدْفُ Géniteur (femelle) (F).

Begetter (femala) (E).

هو في النبات ما صار تنبيغ ميسم زهره بمكبر زهرة  
اخرى مصغرا الاسم المختص .

١٧٩٩٤ - عِدْفُ Incompressibilité (F).

Incompressibility (E).

عدم القابلية لقصط والانصراف والكبس .

١٧٩٩٥ - عُدْمُ لُوبِ Adélops (S). Adélops (F).

حشرة كفية من عذبات الاجنحة ديوريات القرون . تألف  
الاجنية والكهون والواقع المظلمة في معظم اقطار البلاد  
الحارة والمعتدلة الحرارة . جسمها ابيضاجي الشكل يطبق  
من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السرة الثانية اللامع . زبانتها  
ديوريات مستطيلات . قوائمها نحيلة مستطيلة . قوتها المولود  
الغوية للنحلة تنلسها بزبانتها لانها كفة عادمة اليرس .

١٧٩٩٦ - عُدْمُ الْاِحْتِصَاصِ Incompétence (F).

Incompétence (E).

هو ان لا تكون لقاضي او المحكمة او لادنى السلطات  
العامة سلطة على اجبار عمل قانوني .

١٧٩٩٧ - عُدْمُ الْاِنْقِصَاصِ Asyzoie (F).

Asyzoie (E).

١٧٩٩٨ - عُدْمُ الْاَهْلِيَّةِ Incapacité (F).

Incapacity (E).

هو ان يحرم المرء إما من مباشرة حق او من تزويج  
حق له . لذلك تقسم عدم الاهلية الى :

عدم اهلية الاداء Incapacité d'exercice

عدم اهلية التزويج Incapacité de jouissance

١٧٩٩٩ - عُدْمُ التَّعَادُلِ Asymétrie (F).

Asymétrie (F). Asymmetry (E).

شذوذ غير مألوف في التناظر او التماثل .

١٨٠٠٠ - عُدْمُ التَّنْفِيطِ Inexécution (F).

Non-fulfilment (E).

هو ان لا يقوم المرء بأكمل ما التزم به او بضمه .

الزبان والدخان ولا تقع في الش الراسد أكثر من يضة .

### ١٨٠٢١ - عَدْن

Dérochement, Epiarrage, Epierrament (F). Scouring, Clearing land of stones (E).

رفع الحجارة أو اتلاعها من أرض الحقل .

١٨٠٢٢ - عَدْنٌ وَ صَغِيرٌ Adenium venustum (S). Adénie (D). Adénie (F). Adénie (E). جنبة برية ممررة من فصيلة العدنات ، أوراقها معتقة ، متعاقبة ، سنانية . نصلها جلدي الصفحة بحري اللون . ازهارها حنكولي تاجي . ازهارها خيرة اللون || منبتها البلاد الحارة ، تكثر في الجزيرة وهي من النباتات السامة .

١٨٠٢٣ - عَدُو Galop (F). Gallop (E). ركض الدابة السريع .

١٨٠٢٤ - عَدُوَّة Idotes (S). Idotée (F). Idotée (E). جنس دوبيات بحرية من فصيلة العدنات . أصلها بحار البلاد الحارة وأخصها البحر الأحمر والمحيط الهندي . تعيش بين النباتات البحرية قرب المباح والشطوط || أجسامها تساهية السكم متصلة التبطيط ، تقطع من ٣ إلى ٦ سم . مناطقها الخشبية ملحقة بصفاة تدعى تيدو كالهن المتصل . قرونها الاستشعارية مسطحة ، مدبة الأطراف . أرجلها سباحية الأزواج ، عصية المقاطع الدرية || أنثاها متراكبة الجذري والأحر والأصفر والأزرق والبنيجي .

١٨٠٢٥ - عَدُوبَات Idotidae (S). Idotidées (F). Idotidées (E).

فصيلة دوبيات بحرية من القشريات مساهرات الأرجل أجسامها وأرجلها المعروفة نحو ٤٠ متشرة في جميع بحار العالم باستثناء القطبية . تعيش بين النباتات البحرية القريبة من المباح والشطوط || أعرف أجسامها وأشهرها العدنة .

### ١٨٠٢٦ - عَدُوِي

Infection, Contagion, Contamination انتقال الجراثيم أو الميكروبات الطبية إلى جسم الحيوان السلم وأصابته بالمرض الذي تحدثه تلك الجراثيم أو الميكروبات . واسع إصابة .

١٨٠٢٧ - عَدِيد Multi, Poly (F). عديد

١٨٠٢٨ - عَدِيدُ الْأَرْجُلِ Polypode (F). Polypod (E). عديد الأرجل

١٨٠٢٩ - عَدِيدُ الْبُزُر Polysperme (F). عديد البزور

١٨٠٣٠ - عَدِيدُ الثُّغُور Polysperm (E). صفة بعض القشور التي تتميز فيها الأعضاء الثخيرة بوفرة البزور .

١٨٠٣١ - عَدِيدُ الصِّحَاف Polystomata (F). Polystomatous (E). عديد الصِّحَاف

١٨٠٣٢ - عَدِيدَاتُ الصِّحَاف Polylapophores (F). Polylapophora (E). شعبة من الرخويات الراباطيات . أنواعها المعروفة نحو ٦٠٠ ينتمي إليها على محور الشطوط || أشهر أنواعها الحيدبة والكتينون .

### ١٨٠١٧ - عَدُوبَات

Ranidae (S). Ranidés (F). Ranidae (E). فصيلة حيوانات درداء قازية من لة الحيديات ومرقبة السويبات وريقة التراوات أي عديبات القلب || أجسامها وأرجلها كثيرة العدد متشرة في جميع أصقاع العالم القديم والجديد || أجسامها متفردة القبة تتميز بمساواة سطح ضلبي قوسها الصدري في مركز تلاقيها ، ويجعل فقرة السبر من الترسبات المنظمة الجانية . فكوكها العليا مسنة . أصابع قوائمها الخلفية مفيدة بحطاب لاقامي الرسابة || أشهر أجسامها العدول أي الضفدع .

١٨٠١٨ - عَدُمُون Adimonia (S). Adimonia (F). Adimonia (E).

جنس حشرات غاضلة من مفصليات الأرجل وفصيلة النشاريات . أنوعها المعروفة نحو ٣٠ أصلها مناطق البلاد المعتدلة الحارة . تأليف الحرامي والحقل والنباتات المشية من الأوراق إلى الزواجر والجذوع والجذور || أجسامها متوسطة القد . أنثاها أكبر جرماً من ذكورها وتضع لوباً واسعاً طولاً إذ أنه لا يلبث كلال البين عند الاثبات . أنثاها متباينة الألوان يكثر فيها الأسود والاسمر القاتم والجذري السابق || أعرف أنوعها وأشهرها الاثنان التاليان :

### ١٨٠١٨ - عَدُمُونُ سُرُوي

Adimonia rustica (S). Adimonia rustica (F). ينتمي من الخنافس الخفيفة لانه يلبث الأوراق التي تلبس سطح التربة . لوبه إلى السرعة القامة ، أصغر المراج عند الذكر ، بأحد عند الأنثى .

### ١٨٠١٩ - عَدُمُونُ عَتِيد

Adimonia tenax (S). Adimonia obtusa (F). ينتمي من الخنافس الخفيفة لانه يلبث كل ما استطاع إليه سبيلاً من أجزاء النبات . ثوبه إلى الجذرة يزدهر عند الذكر ويهبط عند الأنثى .

١٨٠١٩ - عَدُمُونُ عَدِيد Eudynamis (S). Eudynamis (F). Eudynamis (E).

جنس طير من فصيلة القيتريويات . أنوعها المعروفة عشرة موطنها يمتد من إيران إلى الهند والصين واليابان || أجسامها رفيعة تقطع من ٣٥ إلى ٤٠ سم . أجسامها كبيرة ذلقة . أذناها مسطحة ، متعبرة الأطراف . مناقبها ضلبيّة معتققة الخاطم العليا الشاذة ، حالية السفلى . سيقانها معتققة تقطع . قوائمها مطيعة يختار ماسح اموط لا ريش فيه || قوائم الجراد والخشرات البرية والجزور || أعرف أنوعها وأشهرها العدنيس الشرقية .

### ١٨٠٢٠ - عَدُمُونُ شَرْقِيّ

Eudynamis orientalis (S). Eudynamis orientalis (F). سمى قولاً لأن صياحه يشبه القول . طائر من العدنيس . موطنه يمتد من الهند إلى إيران || جسمه وثيق القوام يطول نحو ٤٠ سم . ثوب الذكر إلى السواد الأخضر الملبس بالابيض . الساع . ثوب الأنثى إلى الخضار اللامع المرقش بالابيض . صدقة البين سوداء اللون عند الشفق || يألف الإخراج البهيمية الاثمار . قوته الخشرات والجراد والآبار البرية والبلور || طيراه سفيف وتصعد تبطيط . شوطه قصير المدى || أنثاه لا تمش بل تقع البيض في أعشاش



عدمون



عدمون شرقي



عدلونه

- 1٨٠٣٢ - عُدَيْمَة Lenticelle (F). Lenticel (E).  
 1٨٠٣٣ - عُدَيْمِي Lenticulaire (F). Lenticular (E).  
 1٨٠٣٤ - عُدَيْم الحَبَاة Abloue (F). Abiosis (E).  
 1٨٠٣٥ - عُدَيْم اخْتِلَافِي Abranchiate  
 1٨٠٣٦ - عُدَيْم الدَّم Essangus (F). Bloodless (E).  
 1٨٠٣٧ - عُدَيْم الرُّؤْس Acéphale (F). Acephalous (E).  
 1٨٠٣٨ - عُدَيْم الطَّعْم ، فَتَّ Insipide (F). Tasteless (E).  
 1٨٠٣٩ - عُدَيْم العَصْد Anélytre (F).  
 تمت تعريفه يطلق على كل حشرة جلادة عديمة اللحم.  
 1٨٠٤٠ - عُدَيْم الفِكر ، لا فِكرِي Invertébré (F). Invertebrate (E).  
 هي الحيوانات التي لا فقر لها . ولا فقرات هي :  
 الالوالي والاسفنجيات والهيووات والشوكيات والديدان  
 والرخويات والمفصليات .  
 1٨٠٤١ - عُدَيْم الفِلكة ، لا فِلكِي Acotyldéone (F). Acotyldoneus (E).  
 تمت تعريفه يوصف به النبات الذي لا غلقة في نتيجه .  
 1٨٠٤٢ - عُدَيْم الفُوهة Apomastome, Apomastostome (F).  
 1٨٠٤٣ - عُدَيْم المُعَلَّة ، لا يَتَكِي Apétale (F).  
 هو النبات الذي لا قاعلة في زهرته .  
 1٨٠٤٤ - عُدَيْم اللِّسان Aglossa  
 1٨٠٤٥ - عُدَيْم الوَن Achromatique (F).  
 Achromatic (E).  
 1٨٠٤٦ - عُدَيْم النَّمِيعة Aplanental  
 1٨٠٤٧ - عُدَيْمَات الِاعَادِيد Aglyphodontes  
 هيات خبيثة منها فصيلة النملين وفصيلة الالصليات .  
 1٨٠٤٨ - عُدَيْمَات الأَرْجُل Apodes, Gymnephones (F). Apodae, Footless (E).  
 رتيبة من السفنجيات .  
 1٨٠٤٩ - عُدَيْمَات الِامْدَاف Aplacophores (F). Aplacophora (E).  
 شعبة من الرخويات الراباطيات الالوالي . اجنسها وانواعها  
 المعروفة نحو ٢٥٠ .  
 1٨٠٥٠ - عُدَيْمَات الجِنَاح Aplanipteroides  
 طبقة حشرات من شعبة الهمدليات تشمل رتيبة واحدة  
 تدعى القذائيات . فصائلها عديدة ، اشهرها البرغوثيات  
 اما اجنسها وانواعها لكثيرة العدد جميعها من الحشرات  
 الناقبة الماصة الصغيرة القدر .  
 1٨٠٥١ - عُدَيْمَات الذَّكَب Anoures (F).  
 اطلب بر . Anorous (E).



ملطوط

- 1٨٠٥٢ - عُدَيْمَات الرِيَش Impennés (F).  
 Impennates (E).  
 فئة من البليز فصائلها قليلة العدد تتميز بأرياشها الخاصة  
 ويقتصر اجنسها الوصفية الشكل المستعالة الى التجديف  
 في الماء بدلاً من الطيران في الفضاء . أشهر اطيافها البطريرق  
 والطريرج .  
 1٨٠٥٣ - عُدَيْمَة التَّنْقُور Amécabole (F).  
 Ametabola (E).  
 1٨٠٥٤ - عُدَيْمَة التَّمَر Acarpe (F).  
 Acarpous, Barren (E).  
 تمت تعريفه يطلق على النباتات التي لا ثمر لها .  
 1٨٠٥٥ - عُدَيْمَة الجِنَاح Aptère (F). Aptera (E).  
 1٨٠٥٦ - عُدَيْمَة السَّاق Acaule (F).  
 Acaulous, Stemless (E).  
 تمت تعريفه يطلق على النباتات التي ليس لها سوق ظاهرة  
 او التي سوقها جلدة . اما عائدة السورق يتتألف تدعى الفر.  
 والتي ساقها قصيرة جداً فهي النجسة .  
 1٨٠٥٧ - عُدَيْم Cudrania (S). Cudrania (F).  
 جنس اشجار برية وزراعية من فصيلة التوتيات . اثنائه  
 قليلة العدد، منها الشرق . جميعها سرولية تملو من ٦  
 الى ١٢ م . سوقها لعماء فناء . اولفها عابلة ، متعاقبة ،  
 بيضيه او مفضضة التصل المالحس البشرة القشاك المتعصنة .  
 ازهارها ثنائية المسكن ، ثمارها حراء اللون .  
 1٨٠٥٨ - عُدَيْمَة Palourde (F). Clam (E).  
 كل صنفه مأكولة كالحمار والحيه وغيرها تدعى طينة .  
 1٨٠٥٩ - عُدْكَرِي ، عُدْكَرَة Adhars  
 القذاري او المبردة حنة كياكب في آخر الحيرة .  
 1٨٠٦٠ - عُدْكَم Cunonia (S). Cunonie, Cunone (F).  
 الفواصة عذامة . شجرة رحيمة الجنس واللونج من فصيلة  
 السفروسيات . ساقها ماله متعصنة لعماء تملو من ٣ الى  
 ١٢ م . اولفها مركبة متعاقبة ، وريقاتها سنانية الشكل  
 وريبة التجميع ، خاصة العدد او سباعية . نصلها جامد  
 القصصه ، منشاري الحافة . ازهارها عتقوي الشكل ،  
 ابيض الازتكاز . ازهارها خمسة البتلات ، عشارة الاعدية  
 لونها الى الالبيض المصح بالاصفر .  
 1٨٠٦١ - عُدَيْمَة Barbilion (F). Barbel (E).  
 طينة . ج. طبقات . زوائد خيطية لامة تكون في احد لكي  
 السكة او في كليها .  
 1٨٠٦٢ - عُدَيْمَة Dutcaquicols (F).  
 تمت تعريفه يطلق على كل حيوان اوليات يعيش في المياه  
 العذبة .  
 1٨٠٦٣ - عُدْوَ هو السكين الانفرز ، اطلبه .  
 1٨٠٦٤ - عُدْكَرَة Nympe (F). Nympha (E).  
 هي الحوراء ، اطلبها .  
 1٨٠٦٥ - عُدْكَوَل Cochylis  
 فراشة من فصيلة القناتلات وريبة حرشليات الالجنة ،

*Fritillaria lutea* (S). **١٨٠٧٤ - عَرَكَر أَصْفَر**  
*Fritillaria jauno* (F).  
 نوع من المرار. اوراقها العليا متعاقبة ، ضيقة ، سنائية .  
 شراخه يعلو من ١٥ الى ٣٠ سم. زهره وحيدة كبيرة  
 القذ. لونها الى الصفار الكبير يميلو تقطع بنفسجي .  
 ازهاره يستمر من نيسان الى ايار .

*Fritillaria persica* (S). **١٨٠٧٥ - عَرَكَر الْعَجَم**  
*Fritillaire de Perse* (F).  
 نوع من المرار دوصت غليظة متراكبة الاسقاط اللبدة .  
 شراخه يعلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقه صغيرة .  
 سنائية ، متعاقبة ، بحرية النصل ، تركب الشراخ بها .  
 ازهاره اعتقيدية التجميع ، صغيرة القذ ، عريفة الرائحة ،  
 لونها الى البنفسجي الازرق المواج || ازهاره يستمر  
 من نيسان الى ايار .

### ١٨٠٧٦ - عَرَكَر الْغَاب ، نُؤْيِبِ الْمُرُوج

*Fritillaria meleagris* (S). *Fritillaire pintade*, *Pintade*,  
*Damier*, *Tulipe des prés*, *Œuf de vanneau* (F). *Chack-*  
*ered lily*, *Checkered tulip* (E). *Echte Schachblume*  
 (D). *Fritillaria meleagro*, *Melesgride* (I).  
 نوع من المرار الجري اوراقه متعاقبة تطول من ٨ الى  
 ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. شراخه الزهري يعلو  
 من ٢٠ الى ٥٠ سم. ازهاره تطول من ٣ الى ٥ سم. لونها  
 الى الحمرة البنفسجية يعلوها تقطع ابيض . ضروره  
 الترييبنة مدينة فارها لون الزهر || يستمر في بصله  
 بعد سلقه ، مادة نشوية مأكولة تشبه البطاطا .

### ١٨٠٧٧ - عَرَكَر عَرِيضِ الْوَرَق

*Fritillaria laefolia* (S). *Fritillaire à feuilles larges* (F).  
 نوع من المرار اوراقه سنائية النصل مستعرضة . شراخه  
 يعلو من ٢٥ الى ٣٠ سم. زهرته كبيرة القذ وسيدة . لونها  
 الى الحمرة الخمرية الموجهة بالاصفر || ازهاره يستمر  
 من نيسان الى ايار .

*Fritillaire impériale* (F). **١٨٠٧٨ - عَرَكَر قَيْصَرِي**  
 نوع من المرار يعرف باكليل الملك ، الحلب .

*Fritillaria surea* (S). **١٨٠٧٩ - عَرَكَر مُدْهَب**  
*Fritillaria dorée* (F).

نوع من المرار اوراقه العليا متعاقبة او ضخمة التجميع ،  
 خطيئة النصل . شراخه يعلو من ١٥ الى ٢٠ سم. زهره  
 تطول نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاغصير المذهب المواج  
 يعلوه تقطع حنطي || ازهاره يستمر طويلا شهر نيسان .

*Ophidium barbatum* (S). **١٨٠٨٠ - عَرَكَسَة \***  
*Ophidie barbu*, *Donzelle* (F).

مكة بحرية يروض من فصيلة الجيريات شالكانت الزعانت.  
 اصلها بعض اقاليم البحر الابيض المتوسط والمحيط الاطلسي ||  
 جسمها نعلي الشكل ، معتدل التلطيط ، قارب الشبه  
 بالثقب ، يطول نحو ٢٥ سم. ثوبها الى المرجاني القضي  
 المواج يعلو في الظهر تمسح ازرع ويملو في الجانبين  
 تحفة زرقاء حمراء . رأسها ازرع الشكل ، ذات الحلق .  
 زعانفها الظهرية والذيلية والشربية متباعدة تشكل زعنفة  
 واحدة . زعنفتها الحوضية طامسة . فكها الاسفل يتأخر  
 عن الاعلى ويعمل اربع عذبات دقيقة مستطيلة || لحمها  
 متوسط الصنف ، مأكول .

طولها يراوح بين ١٤ و ١٦ م. وشتاها السيلاني الى  
 الحطلة الصغراء تمررها جدد سود . وشتاها السيلاني الى  
 الحطلة الغصية || رقاتها ثلث مرارة اللون ثم تتحول الى  
 الزردية وتنتهي بالاحمر ولذا يسمونها اللبدان الحمر . لها  
 جيلان في السنة . بيضها النثوي تقفيه كغادوة تحت  
 لحاء بعض الاشجار اغصنها الكرمية . تظهر القراشات في  
 الربيع وتضع مكنها حل البرام الزهرية والورقية فينقب  
 من رقات تركب تلك البرام || وفي جيلها الثاني الذي  
 يبعثها حادة في تحور تحت الاثبات مكنها على النار وينها  
 الضب فينقب من رقات دقيقة تشغل النار من حيث  
 نقلت قسطها وتقيم حتى تنسلخها الاخير ثم تتركها  
 وتنتج نحو اللحاء حيث تحشى وتصلو الى غادوات .

**١٨٠٦٦ - عِدْقِي، نُوْرَة** *Corymbe* (F). *Corymb* (E).  
 شكل من اشكال ازهار يكثر في الفصيلة الوردية  
 كازهار الاجاص والطلع .

**١٨٠٦٧ - عِدْقِيَّات** *Corymbilères* (F).  
*Corymbiferous* (E).

سبط من فصيلة المركبات الابوية الزهر . ومنتمى  
 توصف به النباتات الضيقة الازهار .

**١٨٠٦٨ - عِدْقِي** *Culture non irriguée* (F).  
*Dry-farming* (E).  
 كل نبات لا يسقى الا المطر . غلاظة زنة . الحطلة الزنة  
 هي الحطلة المروية .

**١٨٠٦٩ - عَرَ النَّخْل \*** *Graphiola phenicis* (S).  
*Graphiole des dattiers* (F).

وصم نظري سببه فطر مجعري من فصيلة المريات ودنية  
 الصمغيات || يصيب غصن النخل فينبو كانها جريه  
 لانه يزهرها ينشع صفة الشكل بنية اللون يعلوها عند  
 عورها الاصغر ، المنخفض الارتكاز ، غيط دقيق مركب  
 يحمل غيرات القنطر || يقال لنشع المصاصة هذا الجسم  
 ثقلة مرار || يكاثف باستمال بائل يورده المخلو من ٢  
 الى ٢,٥ ٪ .

**١٨٠٧٠ - عَرَاب**  
 « شجر يفتل من لحاء الحبال . الواحدة حراية . تأكله  
 القردة » (اللسان) .

**١٨٠٧١ - عَرَادَة** *Sauterelle femelle* (F).  
*Female locust* (E).  
 الجرادة الانثى .

**١٨٠٧٢ - عَرَكَر** *Cri de l'autruche mâle* (F).  
*Cry of the male ostrich* (E).  
 صوت الطير

**١٨٠٧٣ - عَرَكَر \*** ، **فِرِيْلِيْلَاوَرِيَا** ، **حَشِيْشَة الْحَجَل**  
*Fritillaria* (S). *Fritillaire* (F). *Fritillary* (E). *Schach-*  
*blume* (D). *Fritzellaria* (I).

جلس نباتات دوصية برية و تربيتية من فصيلة الزنبقيات.  
 ازهارها جرسية الشكل ، معتقة ، متدلية ، يجمعها شراخ  
 تكلمه منه من الازراق للسنه المتراكبة . انولمه المروفة  
 نحو ٣٠ . مصارة بصلها جحالية اللادة ، حازمة الطعم،  
 سهلة وقد تصعب سامة عند الاكثار منها || شهر ازهاره  
 ما يتبع .



مر النخل



مرار



عرانة



Agropyrum juncaum	نجير ، سيلين	١٨٠٨١ - عَرَاقَة ٥
Herniaria maritima	نومان بحري	Thlignotaxie, Thlignotropisme (F).
Kochia arenaria	هيشم الرمال	Thlignotaxy, Thlignotropism (E).

خاصة النباتات المتسلقة اذ تجملها تلتف بسوقها على ساندنها او تلتف بحولائها الحظرة او المحجمة .

## ٢ - نباتات الاثربة الرملية للباحية

Spergularia campestris	ايو غلام حقلي	Placier (F).
Arabis arenosa	ايرس دلي	Town traveller (E).
Agrostis alba	أدرا ابيض ، نجير ابيض	من عرض الشيء لتصريفه او يمه .
Vicia lachryroides	بالقة جلبانية	١٨٠٨٣ - عَرَاقَة ٥
Scleranthus annuus	حشيشة القتاويل الحولية	Oniscia (S).
Scleranthus perennis	حشيشة القتاويل الدمرة	Oniscie (F), Oniscia (E).
Rumex acetosella	حيشم النغم	جنس حيوانات بحرية من الرخويات مغطيات الارجل
Airs caryophylla	عُرطالية قُرظلية	وفصيلة الخوطيات . انواعه المعاصرة المعروفة ستة منتشرة
Airs praecox	عُرطالية مبكرة	في مجار البلاد الحارة    اصداها شبه يضيئة الشوزن ،
Draba verna	دراية ربيعية	لولبية التخديد التائش ، مستطيلة الانفلاق الطولي للقالب ،
Vulpia Myurus	ذيل الجرز	تعية الانقلاب المستندة الاطراف .



عَرَاقَة

## ١٨٠٨٤ - عَرَاقَة الأَثَرِيَّة

Ornithopus sativus	ريدان مرعوي	Détermination des sols d'après la végétation spontanée
Spergula arvensis	سبرغولة حقليّة	عَرَاقَة الاثربة اسلوب واقفي يقود الى معرفة نوعية الاثربة
Spergula vernalis	سبرغولة ربيعية	من نباتها الطويبة ذلك لان لكل تربة نبات تستقر فيها
Carex arenaria	سمادى الرمل	للقائيا . وقد وضعتنا في الجداول الثانية اهم هذه النباتات
Saxifraga tridactylis	سفرس ثلاثي الاصابع	الدلالية واشهرها :

## ١ - نباتات الاثربة الرملية الساحلية

Illecebrum verticillatum	شجير	١ - نباتات الاثربة الرملية الساحلية
Arrhenatherum elatius	شليم رفيع	أثل ، طرفاء (عدة انواع)
Selene conica	هلوك مخروطي الورقة	Tamarix
Eragrostis minor	عُزَع صغير	Statice maritime
Eragrostis pilosa	عُزَع حقلي	اريل احر
Eragrostis major	عُزَع كبير	Linaria arenaria
Armeria plantaginina	عيفقان لسوني	حباحب الرمال
Luzula	لزولة	Ammophila arenaria
Plantago arenaria	لسان الحمل الرمي	حشيشة الرمال
Plantago lagopus	لسان الحمل المقدي	Scirpus holoschenus
Helianthemum guttatum	مداخن لؤلؤي	سلال القدران
Herniaria glabra	نومان امرد	Lagurus ovatus
Herniaria hirsuta	نومان مزقير	ذيل الونب
Agrostis spica venti	هزنوس	Polypogon maritimum

## ٣ - نباتات الاثربة السبخة وتدعى بحجيرة او الف الملح

Artemisia maritima	أبست بحري	Crepis bulbosa
Silicornia	اشنان (جميع الانواع)	سرقة دونصية
Salsola kali	حرض	Honeckenya peploides
Aster tripolium	خرغام	سمرق بحري
Suaeda	دلوك (جميع الانواع)	Carex
Inula crithmoides	راسن بحري	سمادى (بعض انواع)
Atriplex halimus	سرق بحري	شعير الكتبان
Senecio crassifolia	شروقة لحية الورقة	Elymus arenarius
Glyceria maritima	عشبة المن البحرية	Eryngium maritimum
		شنداب بحري
		Mesembryanthemum nodiflorum
		ظهيرة مقدية
		Phleum arenarium
		عصوية الرمال
		Ephedra distachya
		عند البحر
		Gallium arenarium
		غالبون الرمال
		Cakile maritima
		فجيلة الشط
		Polygonum maritimum
		قردب الرمال
		Dianthus gallicus
		قرنفل الرمال
		Linum maritimum
		كتان بحري
		Calystegia soldanella
		لبلاب بحري
		Plantago coronopus
		لسان الحمل القثري
		Matthiola sinuata
		متيولا مقورة
		Malcolma
		سبلح (بعض الانواع)

<i>Orchis maculata</i>	مهلبلب أبيض	<i>Plantago maritima</i>	لسان الحمل البحري
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الأنواع)	<i>Plantago crassifolia</i>	لسان الحمل لحمي - الورق
<i>Quercus pedunculata</i>	سنتيان مزند ، دور	٥ - نبات الأثرية الصوانية ، بزلح	
<i>Ganista germanica</i>	شيزاء جرمانية		
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماعز	<i>Betula verrucosa</i>	بتولا ثؤلولية
<i>Potentilla tormentilla</i>	عرق انجبار	<i>Campanula persicifolia</i>	جريس دواقي - الورقة
<i>Fistuca arundinacea</i>	عكروش علباني	<i>Jasione montana</i>	جزيون أزرق
<i>Dianthus Armeria</i>	قرنفل اديريه	<i>Sedum Forsterianum</i>	حي - العالم القرينف
<i>clisium ferox</i>	قصصون شكنس	<i>Malva moschata</i>	عجبانة سكية ، صغر
<i>Erythraea pulchella</i>	قنطريون أبيض	<i>Erica cinerea</i>	خلنج ربادي
<i>Cerasus padus</i>	كرز عبقودي	<i>Erica scoparia</i>	خلنج سكسي
<i>Lobelia urens</i>	لوبيلية محرقه	<i>Erica ciliaris</i>	خلنج مهدب
<i>Lotus uliginosus</i>	لوتس	<i>Hypericum pulchrum</i>	داذي أبيض
<i>Molinia caerulea</i>	مولينيه ، غرطالية زرقاء	<i>Digitalis purpurea</i>	ديجيتال ابرجواني
<i>Scutellaria minor</i>	هربون صغير	<i>Pteridium aquilinum</i>	دشدار
<i>Ulex europaeus</i>	وزال كبير	<i>Ornithopus perpusillus</i>	ريبدان لزج
<i>Ulex nanus</i>	وزال مثنون	<i>Antennaria dioica</i>	ريبل القسط - الشامع

## ٦ - نبات الأثرية الكلسية

<i>Laburnum anagyroides</i>	ابنوس كاذب	<i>Senecio adonidifolius</i>	شروقة زرقية الورق
<i>Coronilla emerus</i>	امروس الزمارين	<i>Senecio viscosus</i>	شروقة لزجة
<i>Berberis vulgaris</i>	بربريس ، عيد الريح	<i>Genista tinctoria</i>	شيزاء الصباغين
<i>Buxus sempervirens</i>	بقس دائم الخضرة	<i>Potentilla argentea</i>	عشبة القوى القوية
<i>Asperula tinctoria</i>	جروية الصباغين	<i>Festuca heterophylla</i>	عكروش هاتك
<i>Ophrys</i>	حاجبية (جميع الأنواع)	<i>Veronica verna</i>	فيرونيكار ربيعية
<i>Lavandula latifolia</i>	غزالي ذكورية	<i>Veronica officinalis</i>	فيرونيكار مخزنية ، ليلاب المهبوس
<i>Lavandula officinalis</i>	غزالي مخزنية ، خيري البر	<i>Dianthus deltoideus</i>	قرنفل دالي
<i>Lactuca perennis</i>	غس الغالب	<i>Vaccinium Myrtillus</i>	قام آسي
<i>Rhamnus alaternus</i>	زفرين الجرد ، ثيق مترادف	<i>Gnaphalium sylvaticum</i>	كوسفية حرسية
<i>Hysopus officinalis</i>	زولفا	<i>Castanea sativa</i>	كستنة بلولة ، شاهبلوط
<i>Thymus serpyllum</i>	سعر الير ، زعر	<i>Nardus stricta</i>	ناردين المروج
<i>Thymus vulgaris</i>	سعر شامع	<i>Epilobium angustifolium</i>	ند - سنبل
<i>Quercus lanuginosa</i>	سنتيان اذيب	<i>Sarothamnus scoparius</i>	وزال الشيع
<i>Ononis natrix</i>	شبارق ، لتين القدماء	٥ - نبات الأثرية الطينية الرملية	
<i>Pulsatilla vulgaris</i>	شقيق النمان المبثول		
<i>Eryngium campestre</i>	شنداب حقلي	<i>Teucrium scorodonia</i>	اسقودين مائي ، ثوم الحية
<i>Lonicera xylosteum</i>	سرعية الجدي ، الدغلية	<i>Juncus squarrosus</i>	أسل خشن
<i>Vincetoxicum officinale</i>	صقلاب غزلي	<i>Betula pubescens</i>	بتولا زغبية
<i>Crucianella angustifolia</i>	صلبانة ضيقة الورق	<i>Viola canina</i>	بنفسج كلابي
<i>Catananthe caerulea</i>	طلسية ، عتباء زرقاء	<i>Peucedanum gallicum</i>	بوسيدان غالي
<i>Teucrium montanum</i>	طوقريون جبلي	<i>Campanula patula</i>	جريس عريش الورق
<i>Teucrium chamaedrys</i>	طوقريون غزلي	<i>Pedicularis sylvatica</i>	حشيشة القمل الحرسية
<i>Globularia</i>	عينون مبثول	<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتنتية
<i>Geranium sanguineum</i>	غرنيق دموي	<i>Scirpus compressus</i>	حلل ليد
<i>Calamagrostis argentea</i>	غر - ار قصي	<i>Aira caespitosa</i>	غرطالية التمسع
<i>Rubia peregrina</i>	قوة - مرحلة	<i>Hypericum humifusum</i>	داذي رطيب
<i>Veronica teucrium</i>	فيرونيكار انثي	<i>Scorzonera humilis</i>	ديج سفير

<i>Pastinaca sativa</i>	مبارون كبير	<i>Cornus mas</i>	قرنوس ذكر
<i>Lithospermum officinale</i>	شجبار غزني	<i>Cirsium acaule</i>	قصوان قريش
<i>Saponaria officinalis</i>	صابونية غزنية	<i>Brunella lyssofolia</i>	قلاع حسل الورق
<i>Potentilla reptans</i>	عشبة القوى المسلحة	<i>Brunella grandiflora</i>	قلاع كبير الزهر
<i>Potentilla anserina</i>	عشبة القوى الورقة	<i>Colutea arboreascons</i>	قصصور شائع
<i>Euphorbia helioscopia</i>	فريبون النجر	<i>Centaurea scabiosa</i>	قطريون اجرب
<i>Euphorbia verrucosa</i>	فريبون مثالي	<i>Andropogon ischaemum</i>	كتيبة
<i>Melampyrum arvense</i>	قرطب الزرع	<i>Carlina vulgaris</i>	كرلين شائع ، زند البید
<i>Erytraea centaureum</i>	قطريون صفير ، مرارة الحنش	<i>Linasyris vulgaris</i>	لنسير مبدول
<i>Allium ursinum</i>	كرات اللب	<i>Cerasus mahaleb</i>	محلپ
<i>Ononis campestris</i>	لئين الحقل	<i>Sorbus aria crantz</i>	مخلص
<i>Ononis spinosa</i>	لئين شائك	<i>Helianthemum vulgare</i>	مداين شائع
<i>Lychnis floe-cuculi</i>	لحنس وردي	<i>Melica dilatata</i>	مشرية مهدبة
<i>Anthyllis vulneraria</i>	لوتيا نافقة ، حشيشة الجرح	<i>Sedurela montana</i>	ندغ الجبل
<i>Lotus corniculatus</i>	لوطس قرني	<i>Hippocrepis comosa</i>	نمت الفم
<i>Fraxinus excelsior</i>	مرکان شامخ	<i>Sparcium junceum</i>	وزال الشرق
<i>Dipsacus fullonum</i>	مسط القرابي ، شوك الدراج	<i>Ligustrum vulgare</i>	ياسم معروف
<i>Rhamnus cathartica</i>	نبق سهول		
<i>Agrostis canina</i>	نجير كلي		
<i>Epilobium hirsutum</i>	ند غفائي		
<i>Mentha arvensis</i>	نمت صغري		
<i>Falsaria vulgaris</i>	ميردان شائع		

## ٧ - نبوت الاثرية الطينية الكلسية

<i>Cirsium luteolans</i>	أبو سلام ، عشرق
<i>Juncus glaucus</i>	أسل بحري اللون
<i>Aquilegia vulgaris</i>	أكيلاجيا عقابية
<i>Coronilla varia</i>	إمروس اوقش
<i>Sambucus ebulus</i>	بيلسان صفير ، حمان صفير
<i>Sonchus oleraceus</i>	تقاف معروف
<i>Bromus asper</i>	قرشول كبير
<i>Campanula trachelium</i>	جريس الست ، قفاز مريم
<i>Campanula glomerata</i>	جريس صمسي
<i>Lathyrus tuberosus</i>	جليان مدرن
<i>Tussilago farfara</i>	حشيشة السعال
<i>Bupleurum falcatum</i>	حليلاب منجلي
<i>Mercurialis perennis</i>	حليوب مسمر
<i>Androsaeum officinalis</i>	داذي غزني
<i>Daphne laureola</i>	دفنة عود النار
<i>Aegopodium podagraria</i>	رجبل للمزى ، حشيشة المزى
<i>Fagus sylvatica</i>	زان معروف
<i>Orchis mascula</i>	محلپ ذكر
<i>Orchis latifolia</i>	محلپ عريض الورق
<i>Orchis incarnata</i>	محلپ قريزي
<i>Stachys annua</i>	مطاقس حولي
<i>Stachys recta</i>	مطاقس سنيلي
<i>Carex sylvatica</i>	سمادي حرجي
<i>Carex pendula</i>	سمادي مدلي
<i>Tragopogon pratensis</i>	مسلخيل المارج
<i>Colchicum autumnale</i>	سورتجان الخريف
<i>Iris fastidissima</i>	سوسن متين ، قوسون

## ٨ - نبوت الاثرية المتقية

<i>Achillea ptarmica</i>	أخيلية بقلة الطاس
<i>Myosotis palustris</i>	أكان الفار المتقي
<i>Juncus</i>	أسل (بعض الانواع)
<i>Viburnum opulus</i>	اللوس تلجي
<i>Equisetum maximum</i>	اسوخ كبير
<i>Equisetum palustre</i>	اسوخ متقي
<i>Sanguisorba officinalis</i>	بلان غزني
<i>Gaum rivale</i>	جيم بري
<i>Pedicularis palustris</i>	حشيشة القمل المتقية
<i>Scirpus caespitosus</i>	حلل الحصر
<i>Populus tremula</i>	حور ريجراج
<i>Scrophularia aquatica</i>	خنأزيرية المتانق
<i>Scrophularia nodosa</i>	خنأزيرية عقدا
<i>Pulicaria vulgaris</i>	ومراخ شائع
<i>Stachys palustris</i>	مطاقس المتانق
<i>Carex</i>	سمادي (بعض الانواع)
<i>Symphytum officinale</i>	سمفون غزني
<i>Salix caprea</i>	صفصاف الماخر
<i>Cardamine pratensis</i>	مناب الماء
<i>Comarum palustre</i>	عشبة القوى المتقية
<i>Schaenus nigricans</i>	عين البقر
<i>Eupatorium cannabinum</i>	غفت ابن سينا
<i>Lythrum salicaria</i>	فرنكل مبدول

بیشة مقطوعة المتوسطة تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها  
خلى الصفحة السفلى || ازهار نوربها تمتد من ٣ الى ٥  
وي صيوانية التجميع بيضاء اللون || ازهارها يستمر  
من نيسان الى ايار .

#### ١٨٠٨٨ - عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق \*

*Spiraea hypericifolia* (S). Spirée à feuilles de millepertuis (F).

جنيته معمرة تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها كاملة ،  
مستطيلة ، مسنة الزام الاخير . نصلها انقب البشرة  
ثلاثي المروق او خلسيا || ازهار نوربها تمتد من ٥ الى ٧  
وي صيوانية التجميع ، بيضاء اللون || ازهارها يستمر  
من ايار الى حزيران .

*Spiraea douglasii* (S). عَرَاوَة دُوغلاس (F).  
*Spirée de Douglas* (F).

جنيته زينة تملو من ٨٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها سنانية  
مستطيلة . نصلها بطول نحو ٨ سم. وهو خلى الصفحة  
السفلى ، مشاري الحافة في زامه الاخير || ازهارها  
عنفودية التجميع ، وردية اللون القاني || ازهارها يستمر  
طوال الصيف .

*Spiraea pubescens* (S). عَرَاوَة زَبَاء (F).  
*Spirée pubescente* (F).

جنيته تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. فروها ارجوانية  
اوراقها اهلجية مقطوعة القاصدة . نصلها خلى الصفحة  
السفلى ، مسن الزايمان الاخيرين || ازهار نوربها متوسطة  
العدد ، ضمية التجميع ، لونها الى البياض الاصفر الموج .  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٩١ - عَرَاوَة صَفْصَافِيَّة الْوَرَق

*Spiraea salicifolia* (S). Spirée à feuille de saule (F).

جنيته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها سنانية تطول  
من ٤ الى ٨ سم. نصلها عابق الخضار مسن الحافة يستعمل  
في غش الشاي || ازهارها وردية اللون ، خشكوية التجميع ،  
هرمية الشكل ، خشكوية بطول من ١٠ الى ١٥ سم || ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز .

*Spiraea chinensis* (S). عَرَاوَة صَيْغِيَّة (F).  
*Spirée chinoise* (F).

جنيته تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها مستديرة  
مفصصة . نصلها خلى الصفحة السفلى الطموه اللون .  
ازهار نوربها حلقة الاضواء ، متوسطة العدد ، صيوانية  
التجميع ، لونها الى البياض الاصفر الموج || ازهارها  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٩٣ - عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة \*

*Spiraea filipendula* (S). Spirée filipendule, Filipendula (F). Common-dropwort, Italian may (E). Knollenstodesüss, Knolliges Mädesüss (D). Spiraea filipendula, Erba peperina (F).

جنيته برية طيبة تملو نحو ٦٠ سم. جلوهها عسقلية  
عقدية . اوراقها اهلجية ذرية . نصلها مشاري الحافة .  
ازهارها صغيرة القند بيضاء اللون خشكوية التجميع . ازهارها  
يستمر من حزيران الى تموز || عسلها سائمة الطعم ،  
طيبة وندرة البيل .

*Spiraea cantoniensis* (S). عَرَاوَة كَسْتُون (F).  
*Spirée de Canton* (F).

جنيته تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم. اوراقها ايديسة ، سنانية ،

*Veronica beccabunga*  
*Arundo phragmites*  
*Hydrocotyle vulgaris*  
*Cirsium palustre*  
*Cladium mariscus*  
*Alnus glutinosa*  
*Valeriana officinalis*  
*Mentha aquatica*

فبرونيكيا قرعة العين  
قصب ، يوس  
قصبة الماء الشائفة  
قصبان النلقع  
كلاديين متقي  
مفت غروي  
فاريين غزني  
نمغ الماء

#### ٩ - ثبوت الازهرة الطرية وهي معظمها نباتات ناقصة

*Arnica montana*  
*Carum verticillatum*  
*Andromeda polifolia*  
*Viola palustris*  
*Succisa perennis*  
*Erica tetralix*  
*Osmonda regalis*  
*Carex*  
*Salix repens*  
*Spaghnum*  
*Triglochin palustre*  
*Oxycoccus palustris*  
*Gentiana pneumonanthe*  
*Lobelia urens*  
*Menyanthes trifoliata*  
*Drosera rotundifolia*  
*Drosera longifolia*

ارنيكا جبلية ، زهرة الساس الجبلية  
اطريلال حائقي  
الندروبيده كتية الورق  
بنفسج متقي  
حصص مسمر  
غلنج ربابي ، الاهداب  
سرخس ملكي  
سحادي (بعض الانواع)  
سوسر مداد  
طحلب المتابع (جميع الانواع)  
عاشم متقي  
قام صلب  
كوشاد متقي  
لوبيلية حمرة  
نفل الماء  
نيسان مستطير الورق  
نيسان مستطيل الورق

*Spiraea* (S). Spirée (F).  
*Spiraea* (E).

١٨٠٨٥ - عَرَاوَة  
جلس نباتات برية وزينة وطيبة من فصيلة الورديات .  
انواعها كثيرة القند جميعها جنات وبينيات . اوراقها  
متعاقبة ، حاملة ، مختلفة الاشكال والاحجام . ازهارها  
معمرة القند ، لا قياسية الشكل والتجميع . اما الاغصانين  
في علم النبات فيقسمون انواع العراوة الى ثلاث فئات :  
- الفئة الاولى تشمل الانواع ذات الازهار الصيوانية  
والمعقودية غير المنشعب . - الفئة الثانية تشمل الانواع  
ذات الازهار الملقحي . - الفئة الثالثة تشمل الانواع ذات  
الازهار المفكوك والمعقودية المنشعب || اشهر اقواله  
الطبية والزرينية ما يلي .

*Spiraea cana* (S). عَرَاوَة بَيْضَاء (F).  
*Spirée blanche* (F).

جنيته تملو من ٢٠ الى ٩٠ سم. اوراقها اهلجية الشكل  
تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها مسن الزام الاخير ،  
خلى الصفحة السفلى البياض اللون || ازهار نوربها كثيرة  
العدد ، ضمية التجميع ، صغيرة القند ، بيضاء اللون ،  
غبراء الموج || ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٠٨٧ - عَرَاوَة حَوْشِيَّة الْوَرَق

*Spiraea prunifolia* (S). Spirée à feuilles de prunier (F).  
جنيته معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها



عَرَاوَة دَاذِيَّة الْوَرَق



عَرَاوَة عُسْقُولِيَّة

18102 - **عُرْوَةُ الْمَاءِ** *Naladacose* (S).  
*Naladacose* (F). *Naladacose* (E).  
 فصيلة نباتية من فصيلة الفلقية. اجناسها وانواعها نداء  
 ١٠٠ جميعا مائية. ازهارها وسيدة الشق || اشهر  
 اجناسها دروس الماء.



مرأوة لية النيس

18103 - **عُرْوَةُ النَّيْلِ**  
 هي التيلوز الايض، اطليه.

18104 - **عُرْبُ** *Cautrier* (F) *To cautieria* (E).  
 عُرْبُ النابية : ينمها حل اشجارها ثم كولها.

18105 - **عُرْوَةُ شَاحِكَةِ** *Voiture agricole* (F).  
*Farmer vehicle* (E).  
 حجلة كبيرة تستعمل في نقل الحاصل الزراعي وغيرها  
 من سائر الاشياء.

18106 - **عُرْبُج** *Chien de chasse* (F). *Pointier* (E).  
 هو الكشم أي كلب الصيد.

18107 - **عُرْبِيد** هو الاربد، اطليه.

18108 - **عُرْبُوب** هو سقا المسابين، اطليه.

18109 - **عُرْبُك** *Urbec* (F).  
 حشرة تدمي ولشيت الكربة، اطليها.



مرأوة ملكة المروج

18110 - **عُرْبُون**، **عُرْبُون** *Arrhes* (F).  
*Earnest*, *Deposit* (E).  
 هو مبلغ من التقد أو أي عين متغولة يدفعها احد طرفي  
 العقد إلى الآخر ساعدا للعقد.

18111 - **عُرْبُج**  
 المربج نوع من الكلاب الاسوية الضامرة الضمر.

18112 - **عُرْوَة** هي المرأة، اطليها.

18113 - **عُرْوَن** \*  
*Myricaria* (S).  
*Myricaire*, *Petit tamarisk* (F). *Small tamarisk* (E).  
*Rispelstrauch* (D). *Piccolo tamarisk* (I).

جلس جنبا برية وزيينية معمرة من فصيلة الالديات.  
 سوقها فراء مسطلة التقصان الجزرية  
 اللون. غراصيبها دقيقة تنمى بالنساق الزهرية || وهو

من النباتات السبروية التي تعيش في أي مكان كان حتى  
 بين الصخور || اعراف انواعها ما يلي.

18114 - **عُرْوَن جِرْمَانِي** *Myricaria germanica* (S).  
*Myricaire d'Allemagne* (F).

جنبة برية وزيينية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. غراصيبها  
 دقيقة تسك نحو ٣ سم. حثايقها الزهرية كبيرة رطلة.

انواعها صغيرة القد، ودية اللون، يضاء المروج.  
 ازهارها يستمر من ايار الى تموز.



عُرْوَن

18115 - **عُرْوَن دُورِي** *Myricaria dahurica* (S).  
*Myricaire de Daourie* (F).

جنبة برية وزيينية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم.  
 غراصيبها غليظة تسك نحو ٦ سم. حثايقها الزهرية كبيرة

القد، لينة. ازهارها صغيرة، ودية اللون، محزوية  
 القنابات الخفيفة || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

مسفة الزام الاخير || ازهار نوربًا قليلة العدد، صيرانية  
 التجميع، متوسطة القد، مَرَاكِيَة البتلات المكبية،  
 لونها اليباض الموحج بالأخضر || ازهارها يستمر  
 طوال شهر حزيران.

18095 - **عُرْوَةُ لِحْيَةِ النَّبِيِّ** \*، **دُكْنُ الْعُرْوِي**  
*Spiraea aruncus* (S). *Spirée de chèvre*, *Barbe de*  
*bouc* (F). *Goat's beard*, *Steeple weed* (E). *Wald-*  
*geissbart*, *Spiertande* (D). *Spiraea spigata*, *Barba di*  
*capra* (I).

جنبة برية طيبة تملو نحو ٨٠ سم. اوراقها يضيء مطبوعة  
 القاعدة تطول نحو ٤ سم. نصلها خاسي الفروق، خلي  
 الصفعة السفلى || ازهارها يضاء اللون، متكونة التجميع  
 شكل حثايق يشبه لية النيس || وهي من النباتات  
 الطيبة تدر البول وتفيد اوجاع المغاسل والالتهابات.

18096 - **عُرْوَةُ مُجَعَّدَة** *Spiraea bullata* (S).  
*Spirée à feuilles cloquées* (F).

جنبة تملو من ٢٠ الى ٥٠ سم. اوراقها يضيء  
 الشكل لا قياسية التسنين. نصلها مجعد الصفعة، خلي  
 البشرة، متواجج اللون || ازهارها ودية، صغيرة القد،  
 لينة التجميع، نوربًا خفيفة الشكل || ازهارها يستمر  
 طوال فصل الصيف.

18097 - **عُرْوَةُ مَرْيَانَة** *Spiraea bella* (S).  
*Spirée décorative* (F).

جنبة تملو من ٦٠ الى ١٠٠ سم. فروعها فائضة مطبوعة.  
 اوراقها سنائية الشكل، نصلها عابق اخضر ثنائي  
 التسنين || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، ودية اللون.  
 ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

18098 - **عُرْوَةُ مَلِكَةِ الْمُرُوجِ** \*  
*Spiraea ulmaria* (S). *Spirée ulmaire*, *Ulmair*, *Raines-*  
*des prés* (F). *Meadow-sweet*, *Queen of meadows*  
 (E). *Echos Mädesüss*, *Weissenkönigin* (D). *Ulmaria*  
*regina dei prati* (I).

جنبة برية طيبة تملو من ٢٥ الى ١٠٠ سم. اوراقها  
 مركبة. ورقها اهلبيعية سنائية. نصلها بارز المروق  
 والتسنين. ازهارها يضاء اللون. غصراء المواق، خفيفة  
 التجميع || وهي من النباتات التي تستدل في الطب التجانس.

نقيها يفيد الاستسقاء والالتهابات والحمايات والسعال.  
 ويستخرج من قضبانها اللقية عصارة لزجة صفراء اللون  
 تحوي الكثير من الحامض المرادي (acide spiréique).

18099 - **عُرْوَةُ ويلسن** *Spiraea Wilsoni* (S).  
*Spirée de Wilson* (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. فروعها زياء اللحاء.  
 اوراقها مشرمة، نصلها اغير اللون، خلي البشرة حل  
 صفحي || ازهار نوربًا خفيفة التجميع، قشرها نحو

٥ سم. لونها اليباض الاصفر الموحج || ازهارها  
 يستمر من حزيران الى تموز.

18100 - **عُرْوَةُ يَابَانِيَّة** *Spiraea nipponica* (S).  
*Spirée nipponne* (F).

جنبة تملو من ٢٠٠ الى ٢٥٠ سم. اوراقها يضيء  
 مطبوعة القاعدة، طرفها نحو ٢٠ سم عرضها ١٦. نصلها

خلي الصفعة السفلى للبراء الموحج || ازهار نوربًا كبيرة  
 العدد، غمية التجميع، صغيرة القد، مستطيلة البتلات،  
 يضاء اللون || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

18101 - **عُرْوَات** *Spirées* (F).  
 سبط من فصيلة الورديات، اشهر اجناسه المرأوة.

١٨١٢٥ - عُرْجُود *Rafie (F). Grape-stalk (E).*  
هو الشقيق من العنب وغيره بعد انتزاع حبه .

١٨١٢٦ - عُرْجُون *١٨١٢٦ - عُرْجُون*  
شرب من الكفاة قد شرب وهو طيب ما دام غصاً ، وهو كالقطر يابس وهو مستدير .

١٨١٢٧ - عُرْجُون *Rameau (F). Bough (E).*  
هو اللتد المحل قبل أن يكون غصناً . ج . عراجين .

١٨١٢٨ - عُرْجُونِي *Ramale (F). Ramal (E).*  
نمت تعريفي يطلق على كل ما ينشأ في العرجون من ابن وزمات .

١٨١٢٩ - عُرْدَ *١٨١٢٩ - عُرْدَ*  
حرد النبات ؛ طلع وانقص واشته .  
١٨١٣٠ - عُرْدُ *١٨١٣٠ - عُرْدُ*  
البرد ؛ الحار في قطع اللحم .

١٨١٣١ - عُرْدَاد *Eléphant de somme (F).*  
الرداد ؛ القيل العامل .  
*Elephant of burden (E).*

١٨١٣٢ - عُرْدَمِيَّة *Phallime (F). Phallim (E).*  
المرمية عبادة المردم عند الاقدمين كالسوريين والمصريين ولكنكمانيين والتبليقيين والاشوريين وهرم الجاهلية واليونان ..... طقوس وثنية قوامها إقامة الشعائر التعبدية امام نصب يبرز الى المردم لاله بمقدم محور الحياه في الكون .

١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصَّنَوْبَرِ الْبَرِّي *١٨١٣٣ - عُرْدُوسُ الصَّنَوْبَرِ الْبَرِّي*

*Aradus cinnamomeus (S).*  
*Arade du pin sylvestre (F).*  
حشرة محاصلة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير ، مسطحة ، يطول نحو ٤ م . عند الذكر ، ونحو ٦ م . عند الانثى || ثوبها الى الخشن الا انهم يعدونه مروج برارح من الشجيرة الى الليرة . رأسها مزخرف بتلوينات واطنان . غطتها ينتمن في اعمده لا يتجاوز الحلقة الصدرية الاولى . عيناها جانبيتان . زباناها معتدلا الغلاظة . كوسلها مقطوم القامة والمقدم . حجبها قليلة ، صغيرة . حنجرة الطهران مسنجة بالاخير . ظهراتها اسود العروق ، يلحم البطن دون الحثار . حثار ظهرها اسود التجديع . قوائمها صلبة || تألف للواقع التي يكثر فيها البرد . تعيش على الاهداب .

١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعُكْصِي *١٨١٣٤ - عُرْدُوسُ الْعُكْصِي*

*Aradus corticalis (S).*  
*Arade plat (F).*  
حشرة دامة من فصيلة المردوسيات ، جسمها صغير مسطح ، يطول نحو ٦ م . رأسها مزخرف . عنقها معتدل الطول . غطتها ينتمن في اعمده يمتد حتى الحلقة الصدرية الثانية . عيناها صغيرتان . زباناها معتدلا الغلاظة . حجبها صلبة . ظهراتها ادم الحنجرة ، لا يلحم كامل البطن || رأسها وزباناها الى الخشن الاسمر . كوسلها رصينتها الى الخشن المبيج والمخطط بالاسود . ظهرها اخر التبيج ، اسمر للتسبيج المتفرس . الصفحة السفلى الى السرة القاعة || تألف للفايات . تعيش تحت قشور الفصص والسديان قوتها المواد النباتية المنحلة .

١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات *١٨١٣٥ - عُرْدُوسِيَّات*

*Aradidae (S).*  
*Aradidae (F). Aradidae (E).*  
فصيلة حشرات من رتبة مخلفات الاجنحة وطبقة امصيات

١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجْتَنَح *١٨١١٦ - عُرْكُون ، جَوْزُ مُرْتَانِي ، جَوْزُ مُجْتَنَح*  
*Pterocarya (S). Pterocaryer (F).*  
جس اشجار سرجية وزينية من فصيلة الجوزيات مدها البلاد الاسيوية ، انواعها قليلة جميعها اشجار فرعاء ، دفلة ، كثيرة الجسم وراثة الفل . اوراقها صياغية عابرة مركبة ، وريقاتها من ١٥ الى ٢٥ مسنة الحافة تشبه لوراق المزان ولذا دعوا الجوز المراني . اما ثمارها فجوزية مجنحة ومذاقها ايضا ما جعل بعضهم يسميها الجوز المجنح . للثمرة صغيرة اللد ، غلافها الجليدي لاصق بالقشرة الخشبية ، لبانها حنكي اللون يعني الشكل لا يؤكل .

١٨١١٧ - عُرْكُونُ صِيصِي *Pterocaryasenoptera (S).*  
*Pterocaryer de Chine (F).*  
شجرة من المرتين تملو من ١٥ الى ٢٠ م . اوراقها طويلة المائلين ، وريقاتها لسنة طولى من ١٠ الى ١٢ سم . نصلها ازغب السطحين . ثمارها مجتمعة البتة ، اجنحتها صيقة مستطيلة || مدها الصين . اوراقها صياغية .

١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَق *١٨١١٨ - عُرْكُونُ مُرْتَانِي الْوَرَق*  
*Pterocarya fraxinifolia (S). Pterocaryer à feuilles de frêne (F).*  
شجرة من المرتين تملو من ١٢ الى ٢٠ م . اوراقها مستطيلة المائلين ، وريقاتها نحو ٩ سم . نصلها عايق الصفحة العليا يلمت السفلى . ثمارها مجتمعة البتة ، اجنحتها وافة المرش قليلة الطول || مدها الصين والقوقاس . تستعمل للزينة ، اوراقها صياغية .

١٨١١٩ - عُرْكُونُ يَابَانِي *Pterocarya rhoifolia (S).*  
*Pterocaryer du japon (F).*  
شجرة من المرتين تملو من ٢٠ الى ٣٠ م . اوراقها جلدية النصل الاصفر اللون ، صفحته العليا ملساء البشرة اما السفلى فزبدية . ثمارها مجتمعة الجوز الصغير . مدها اليابان وقد انتشرت زراعتها الزينية نظراً لقربها شكلها ولانصرار اوراقها .

١٨١٢٠ - عُرْكُونِيَّة *١٨١٢٠ - عُرْكُونِيَّة*  
*Arctobotrys intermedia (S).*  
*Arctobotrys à parfum (F).*  
لبات طيري سرجي ممر من فصيلة القشديات . منته بعض المناطق الحارة من البلاد الاسيوية اعصها اغتد وجاليا . ويؤرخ كتابات صناعي لاستثمار طهر || يستخرج من اثماره دهن طيري فاخر الصنف شائع الاستعمال في الهند وجنابا وصائر الاقطار الاسيوية .

١٨١٢١ - عُرْكُونِيَّة *١٨١٢١ - عُرْكُونِيَّة*  
*Artemia (S).*  
*Artémie (F). Artemia (E).*  
دوية من القشريات الدنية عيشويات الاطراف . تعيش في المناطق اللندران السيئة حيث الملوحة لا تقل عن ملوحة البحر وقد تفترها || جسمها ادم المائل . عيناها مزفتتان . زباناها مسطولين عند الذكر . ارجلها الصدرية صغيرة للشكل .

١٨١٢٢ - عُرْج *Boiserie (F). Halting, Limplig (E).*  
حطب يحل بواكم اللواب فلذا كان مقطعا اعتبر من الصيرب المبلطة لليع .

١٨١٢٣ - عُرْجَاك *١٨١٢٣ - عُرْجَاك*  
الرجل هي النسيج ، الطلها .

١٨١٢٤ - عُرْجَاك *١٨١٢٤ - عُرْجَاك*  
*Rameau tortueux (F).*  
*Tortuous bough (E).*  
هو اللتد العادم الاستقامة الكثير التاربيع واللفد .





عردیل اریه

Alardh

١٨١٤١ - عَرَصَبْ

العرش بمجموعه كواكب صنادق تقدم اليك الاخر.

١٨١٤٢ - عَرَصَبْ التُّرْبَا

بمجموعه كواكب بالقرب من الثريا.

١٨١٤٣ - عَرَصَبْ عُرْشَقْ هو ورد اشد، الخلبه.

١٨١٤٤ - عَرَصَبْ مُتَقَلِّبْ هـ

*Orsodacne variabilis* (S).

*Orsodacne variable* (F). *Orsodacne variabilis* (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها فصح الارياض بينه من الشرق الاقصى الى اوروبا واسريكة الشجالية. تألف اللوايح الي يكثر فيها الزهور والبرقوق والخلخول المزروعة. غناتها تمش على اوراق النباتات من تحتها الفصائل ونها البقول التي تغلفها على غيرها. يرقاتها التي تعيش في التربة، نحو اربع سنوت لا كلال دورتها الحياتية، تغتلك مجلور الزروع والبقول والنباتات الترتيبية والاشجار المثمرة وتقترب اسديع بعض الحشرات وكزيرة ذوات الاجنحين. جسمها متوسط القد، اهلليجي الشكل، يطلو من ١٢ الى ١٨ سم. ثوبا الى السرة المابقة يملوا زغب اخضر يصل الى القرن الى الرقة. رأسها مستعرض الشكل. عيناها غروطي. فكها غليمان زباناها غليمان. عليها صديرتان صاحتان. كرسها قليل الاسديع. ارساها خاضعة القتل، حمية الخالب. الاثني اربع قدامن الذكر واكد ثوبا به واقصر زبانا واضخم بطنها. جيلها رباعي الخول. تظهر الحشرة الجديدة في اواخر ايار ويثقي حتى اواخر تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسس على الارض بقة واذا وقعت على ظهرها تطفل لاستعادة وضعها الطبيعي.



عرصول



عرصد متقلب



عرصت بجدي



عرصت شرقي



عرصت شتقوره

١٨١٤٥ - عَرَصَبْ *Ajuga, Bugula* (S). *Bugle* (F).

جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة الشفويات. انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط. تتميز انواعها بفخامة سبلاتها المكشورة الشكل. بعض انواعها ينبت طبيعياً في الجرد القناتية.

١٨١٤٦ - عَرَصَبْ جَعْدِي

*Ajuga Iva* (S). *Ivette musquée, Iva, Petit-If* (F).

*Herb Ivy, Musky bugle* (E). *Ivygünsel* (D). *Bugula muschata, Erba Iva* (I).

عشبة معمرة تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها كاملة مستطيلة، سفة الحافة. ازهارها ارجوانية اللون، عتيقية التجميع. اوراقها وزاعرها وجميع اجزائها مكيبة المسطح الفلج. ازهارها يسر طول شهر نيسان.

١٨١٤٧ - عَرَصَبْ شَرْمِي

*Ajuga orientalis* (S). *Bugle d'Orient* (F).

عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. سيقانها مستطيلة الزغب الصوري الشكل. اوراقها بيضية لسة. ازهارها سبيلة التجميع، زرقاء اللون يملوا مواج ودي. تنابها مفصصة وسنة الحمار. ازهارها يسر من ايار الى حزيران.

١٨١٤٨ - عَرَصَبْ شَتَدْ كُورْ هـ

*Ajuga reptans* (S). *Bugle rampant* (F). *Bugle weed*

*Common bugle* (E). *Kriechender Günsel, Lorenzkraut* (D). *Bugula, Lorenzia, Soldola* (I).

عشبة معمرة غليظة الازوية. سيقانها جديرة بمادة تملوها

الجنات. اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة. اجناسها صغيرة، مبطنلة. رؤوسها مزخرفة. انطماها صغيرة، حضية. قرونها الاستشارية رباعية الفصل. قوايها صغيرة. ارساها ثنائية القتل. جميعها خاضعة او دامة تموش على اوراق النبات او على المواد النباتية المنحلة.

١٨١٣٦ - عُرْدِيلْ أُرْمِدْ هـ

*Adelocera murina* (S).

*Adelocera gris souris* (F). *Adelocera murina* (E).

حشرة خاضعة ومفترسة من فصيلة الساريليات ورتبة مفدمات الاجنحة. موطنها فصح الارياض بينه من الشرق الاقصى الى اوروبا واسريكة الشجالية. تألف البراري والمثلل والخلخول المزروعة. غناتها تمش على اوراق النبات من تحتها الفصائل ونها البقول التي تغلفها على غيرها. يرقاتها التي تعيش في التربة، نحو اربع سنوت لا كلال دورتها الحياتية، تغتلك مجلور الزروع والبقول والنباتات الترتيبية والاشجار المثمرة وتقترب اسديع بعض الحشرات وكزيرة ذوات الاجنحين. جسمها متوسط القد، اهلليجي الشكل، يطلو من ١٢ الى ١٨ سم. ثوبا الى السرة المابقة يملوا زغب اخضر يصل الى القرن الى الرقة. رأسها مستعرض الشكل. عيناها غروطي. فكها غليمان زباناها غليمان. عليها صديرتان صاحتان. كرسها قليل الاسديع. ارساها خاضعة القتل، حمية الخالب. الاثني اربع قدامن الذكر واكد ثوبا به واقصر زبانا واضخم بطنها. جيلها رباعي الخول. تظهر الحشرة الجديدة في اواخر ايار ويثقي حتى اواخر تموز. تسرح في النهار وتبيت في الليل. تسس على الارض بقة واذا وقعت على ظهرها تطفل لاستعادة وضعها الطبيعي.

١٨١٣٧ - عَرَصَبْ *Gastridium* (S). *Gastridie* (F).

جنس نباتات عشبية برية معروضة من فصيلة النجيليات. انواعها المعروفة قليلة منها بعض اصناف حوض البحر الابيض المتوسط. تتميز انواعها بفخامة سبلاتها المكشورة الشكل. بعض انواعها ينبت طبيعياً في الجرد القناتية.

١٨١٣٨ - عُرْشْ، عُرْشَقْ هو ابن عرس، الخلبه.

١٨١٣٩ - عُرْشُولْ

*Ortixelus Melifrani* (S).

*Ortixéle de Melifren* (F).

طائر وحيد الجنس والرتبة من فصيلة الزرقائيات. موطنه مناطق افريقية الاستوائية يجمو في طلب القوت. يألف غصاف بجاري الماء والبيحيرات والمستنقعات. قوت الحشرات والديدان وبعض الاشباب اللاتية. ملجته الحياتي جماعي. جسمه صير القد، رشيق القوام، منطلق الرأس. صير المنقاد للذب الطوف. جناحاه كيران لاسفان. ذنبه مستدير الطوف. ثوبه الى الشفة الموحدة بالابيض. رأسه كسني القرن. عيناه مكشطان. حمراه الى الابيض الحامي. منقاد ورساه الى السرة الخنطية. يثن انحوصه في التربة بين الاشباب الرقية. الاثني تحفن رسدا من ٤ الى ٥ بيضات. تربيعها يسر نحو ١٥ يوما. الذكر يزلن لها الغدا.

١٨١٤٠ - عُرْسِيَّات

هي فصيلة السوريات. اطلها.



عرصف شيا



عرصن



عرطس ملئس



عرطون

قصدان ترتفع من ١٥ إلى ٣٠ سم. أوراقها للقرصية مدبجة بالجزوي والاسفر الساعف الموج. ازهارها عتقودية التجميع زرقاء اللون || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

١٨١٤٩ - عُرْصَفٌ شَيْءٌ \*  
Ajuga chin (S). Bugle chin (F). Chia bugle (E). Chia Günsel (D). Ajuga chin, Bugula chin (I).

عشبة معمرة تملو من ١٥ إلى ٤٠ سم. أوراقها الجذعية السفلى مستطيلة. عتقودها الزهري يمتد على طول الساق. ازهارها زرقاء اللون. ثنائياتها صغيرة ثنية || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

١٨١٥٠ - عُرْصَفٌ صَوْبُورِيٌّ \* كَالْبَطْلُوسِ  
Ajuga Chamaecypariss (S). Bugle peti-pin, Chamé-pyris, Ivette (F). Ground pine, Yellow bugle (E). Gelber Günsel, Ackergesamander (D). Bugula ivretica, Campizlo (I).

عشبة حولية تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها ثلاثية للشرج المذهب. ازهارها صفراء اللون ستلية التجميع || ازهارها يستمر من نيسان الى تشرين الاول.

١٨١٥١ - عُرْصَفٌ صَوْبُورِيٌّ \*  
Ajuga pyramidalis (S). Bugle pyramidal (F).  
عشبة معمرة تملو نحو ٢٥ سم. ساقها مفصلة زياء اللحماء. أوراقها مستطيلة، نصلها متعرج الصفحة المابقة الحصار البحري. ازهارها عتقودية التجميع المحري الشكل، لونها الى الزرقاء البنفسجية || ازهارها يستمر من نيسان الى آب.

١٨١٥٢ - عُرْصَمٌ  
Streptosolen (S). Streptosolène (F).

جنس نباتات حشوية زرقانية معمرة من فصيلة الباذنجانيات. سوقها فروع تملو من ١٠٥ إلى ٣٥٠ سم. أوراقها ابيدة، كاملة، بيضية الشكل، نصلها غلي البشرة حل صفحتيه. ازهارها يرتقالية اللون، حلقية التجميع، تاجية الارتكاز. ثمارها جوزية القند، بيضية الشكل، مقطوعة القنب، لية السوف. يزورها حنسية صغيرة، وبقية، حنطية اللون || ازهارها يستمر طوال الربيع.

١٨١٥٣ - عُرْصَمٌ \*  
Siderodendron (F).  
جنس اشجار حرجية من فصيلة القويان، انواها قليلة العدد منها البلاد الحارة. سوقها فروع تملو من ١٢ الى ٢٥ م. ازهارها متقابلة اطيحية مستطيلة. ازهارها عتقودية التجميع، تاجية الارتكاز، ثمارها حنسية. اشكالها ناعمة الزرق، ثقيلة الوزن، شديدة الصلابة، خالية اللون، فاعرة الصنف، تستعمل في الصناعات الخشبية.

١٨١٥٤ - عُرْصَمٌ  
Lastuda  
اللسانة البكائنة بين مرقع معين وسط الاستواء.

١٨١٥٥ - عُرْصَمٌ  
Offer, Proposition (F). Offer, Proposal (E).  
هو طلب ابرام عقد يتفق مع الشروط المفروضة.

١٨١٥٦ - عُرْصَمِيٌّ  
Accidental, Fortuit (F). Incidental, Casual (E).

١٨١٥٧ - عُرْطُطٌ هو القطريون الكبير، الحليه.

١٨١٥٨ - عُرْطُطٌ  
Artanthe (F).  
نوع من التاتول. حبة معمرة من فصيلة الفلقليات  
أوراقها طيبة رائحة وبهم من يستعملها مضغاً. راجع  
تاتول غنيق الورق.

١٨١٥٩ - عُرْطُطِيَّتَا هو السكك، الحليه.

١٨١٦٠ - عُرْطُطُوسٌ مُتَقَشِّسٌ \*  
Athous haemorrhoidalis (S). Athous confus. Taupin confus (F). Athous obscurus (E).

حشرة مؤذية ناعمة مفترسة من فصيلة السوسيات ورتبة  
مخيدات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم  
الاصقاع الاروبية. تألف المهاجرات والحلقات المزدودة  
والادغال والاصراج. خنافسها تعيش على بقايا الاثمار  
وأوراق القراص والحرفش. يرقاتها مؤذية تقضم جلا  
التجليات والبقول والبطاطا والشهد وتقتصر كل ما  
تستطيع من الحشرات || جسمها متوسط القند يطول من ١١  
الى ١٤ م. ثوبها ملتبس اللون، اسود الرأس والكسول،  
احمر البطن، كشي الغفران، اسمر الجرايز. راسها  
صغير الجرم. زبائنها عتيبان، مستطيلان. عيناها  
صغيرتان بارزتان. ظهورها متعرج التميزير الفدي  
القلاب. ارسافها خالصة السفل تتميز باستطالة القلفة  
الاولى وبقصر الرابعة || الانثى تدعى عرطوسية وهي اميز  
قنداً من الذكر واكد ثوباً منه واقصر زبائناً || حبلها  
رباعي الحول. تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى  
تموز. تسرح في النهار وزييت في الليل || البرقة بطنية  
النمو تملك الكال الجسوري بمرر ثلاث سنوات فيصبح  
طولها نحو ٢٧ م. ثوبها الى الصفرة الصائبة يملوا  
مواج امفر.

١٨١٦١ - عُرْطُطُونٌ \*  
Orthonyx (S). Orthonyx (F). Orthonyx (E).

جنس طير من الجوارث رقيقات المنقار وفصيلة المانوريات.  
انواعه المعروفة اربعة موطنها استرالية وزيلندة الجديدة.  
تألف الاصراج والفايات العاتية الانحجار. ملجئها الحياتي  
زويبي. قوتها الحشرات والنمل والبار واليزور || اجسامها  
متوسطة القند، ريشة القروا تملو من ٢٤ الى ٣٢ سم.  
رؤوسها مستدلة الجرم. مناتيرها رقيقة صغيرة. اجنتها  
مستديرة. اذنانها مستطيلة، مقطوعة الاطراف. الثواب  
متباينة اللون تكثر فيها الكهية الخنطية الحلقية الموج والبردة  
السرا. جميعها مرقوشة الدراء والجناح والذنب || تدش  
اعشاشها في الادغال القليلة الارتفاع من سطح الارض.  
الاناث تحضن رسلها من بيضة الى يفتين بل مرتين  
او ثلاث مرات في الحول. الترخيم يستمر نحو ثلاثة  
اسابيع. الذكر تولى الحماية والذواء.

١٨١٦٢ - عُرْطُطِيلٌ \*  
Erotylus (S). Erotylus (F).  
جنس حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرن  
وفصيلة المريطليات. انواعه المعروفة نحو ٨٠ منتشرة في  
مظم مناطق البلاد الاستوائية || اجسامها فيه بيضية  
الشرنق، بحبة الصفحة العليا، تطول من ١٠ الى ١٥ م.  
الثواب ملونة، زاهية الخصب وسها المؤذرة والمجذبة والبيضة.  
تعيش على جميع انواع الفطور اغصها اللغية التركيب.



مستطيلة، رملية، متدلية. اهدابها فلسية، ذرية متقابلة. ثمارها جزوية اللون، عتية الشكل، قطرها نحو ١٠ م. اغشائها صناعية شائعة الاستعمال.

١٨١٦٩ - عَرَبُ رَقِيع (F). *Genévrier de Tauride*  
هو الزأب، اطلبه.

١٨١٧٠ - عَرَبُ سَيْنَة (F). *Genévrier rabine*  
هو الابل، اطلبه.

١٨١٧١ - عَرَبُ سُرُي \* و دَقْرَان

*Juniperus drupacea* (S). *Genévrier de Syrie*, *G. drupacé* (F). *Syrian juniper* (E). *Syrtscher Wacholder* (D). *Ginepro di Siria* (I).

شجرة وشية الشكل سبروتية مبلولة تملو من مترين إلى ٢٠ م. غرايبها وبناتها قصيرة مذاكية. اهدابها تطويل ١٢ إلى ٢٥ م. وتعرض من ٣ إلى ٥. نصلها بحري الصفحة العليا، أخضر القليل. ثمارها نوية الشكل قطرها نحو ١٥ م. لونها إلى الأرجواني اللامع المالح اللامع.

١٨١٧٢ - عَرَبُ سَالِيع \*

*Juniperus communis* (S). *Genévrier commun* (F). *Common Juniper* (E). *Wacholder*, *Mechandelbaum* (D). *Ginepro* (I).

جنية سبروتية ترطب في الأتربة الكلسية تملو من ١٠٠ إلى ٤٠٠ م. غرايبها قارئة. بناتها أسطوانية. اهدابها خيطية تطويل من ٨ إلى ١٥ م. ثمارها عتية الشكل ولقده تلبو متدلية ثم تزد مع الإزهار وهي تستعمل في تطهير حلة مستحضرات منها الكحولية كالجل والليتر وسها الكنسرو كالشوكروت.

١٨١٧٣ - عَرَبُ عَال

*Juniperus procera* (S). *Genévrier élevé*, *G. d'Afrique* (F). *Uganda juniper* (E). *Afrikanischer Wacholder* (D). *Ginepro abissino* (I).

شجرة سبروتية مهددة الحيفة وقد عت زراعها شطوط حوض البحر المتوسط. ساقها منتصبة فراء تملو من ٢٠ إلى ٢٥ م. غرايبها متدلية. بناتها رباعية المضلع. اهدابها صفية حامدة التسنين. ثمارها مستدرة صغرة قطرها نحو ٥ م. لونها إلى الخلفي الاصفر. اغشائها صناعية جيفة الصنف.

١٨١٧٤ - عَرَبُ فِيرَجِينَة

*Juniperus virginiana* (S). *Genévrier de Virginie*, *Cédro de Virginie*, *C. rouge* (F). *Red juniper* (E). *Virginischer Wacholder* (D).

شجرة سبروتية متدلة كثيرة اللقده تملو من ٢٠ إلى ٣٠ م. اغشائها ليفية الانتساب. غرايبها رملية. بناتها رباعية المضلع. اهدابها غرزوية الشكل لونها إلى الخضار الأزرق القمايق يفرح منها عت للسر عوف كره مسجن. ثمارها ييفية الشكل تطويل نحو ٧ م. وتعرض نحو ٥. لونها إلى البسجي المائم. اغشائها صناعية جيفة الصنف حراء اللون.

١٨١٧٥ - عَرَبُ فِينِي

*Juniperus phoenicea* (S). *Genévrier de Phénicie*, *Morven*, *Lydien*, *Sabine maritime* (F). *Phoenician juniper*, *Arabian juniper* (E). *Phönizischer Sadebaum*, *Rotfruchtiger Wacholder* (D). *Ginepro fico* (I).

شجرة سبروتية صغرة اللقده تملو من ٤ إلى ٨ أمتار.



عرب سوري



عرب سالي

١٨١٦٣ - عَرَبِيَّاتٌ \* *Erotylide* (S).

*Erotylides* (F). *Erotylides* (E).

فصيلة حشرات من غديات الاجنحة دبوسيات القرون. اجناسها وانواعها كثيرة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متباينة لقة والشكل، منها البيضاء والاهليجية والاسطوانية، تطول من ٤ إلى ١٦ م. انوثها جيلة الخصاب الزأبي الاسفع المالح. قوتها الاستشارية مؤلفة من ١١ فصلة، الفصل الثالث الاخير دبوسية الشكل. اربابها خامسة النقل. القلة الرابعة شديدة الصغر لكاد لا تظهر. اشهر اجناسها العرمول والعنخروت.

١٨١٦٤ - عَرَبُ سُرُي \* *Juniperus* (S).

*Genévrier*, *Genèvre* (F). *Juniper tree* (E). *Ge-meiner Wacholder* (D). *Ginepro* (I).

جنس نباتات حرجية وزيتونية من السرويات. انواعها عديدة، منها الاجمار والشجيرات والجنات، جميعها ابيدة. بناتها منتصبة لا شمية. اوراقها عتية غرزوية الشكل او سرشبية. ازهارها وسيدة المسكن. ثمارها عتية لقة والشكل، حلوة الحام، عطرية العرف يستخرج منها بالقطر بعد التخثير قندي مقوم ينشط الباه ويكر البول. اغشائها صلبة. عصارتها عتية بحورية سريفة الجفاف. اعرها واشهرها ما يتبع.

١٨١٦٥ - عَرَبُ الْبُخُور *Juniperus thurifera* (S).

*Genévrier à l'encens*, *G. porte-encens* (F). *Incense juniper* (E). *Weihrauchwacholder* (D).

شجرة سبروتية صغرة اللقده نحو ٥ أمتار. غرايبها منفردة الزوايا. بناتها أسطوانية، اهدابها فلسية ذرية متقابلة، لونها إلى الخضار البحري الاسفع المالح. ثمارها عتية قطرها نحو ١٠ م. لونها إلى الزرقة الختلية. يستخرج منها بالز مادة عطرية تستعمل استعمال البخور.

١٨١٦٦ - عَرَبُ السَّالَة (S). *Juniperus occidentalis*

*Genévrier d'Occident* (F). *Western juniper*, *Sierra juniper* (E).

شجرة سبروتية تنمش في جميع الأتربة والواقع تملو من ٣ إلى ٢٠ م. غرايبها جامدة منتصبة. بناتها أسطوانية. اهدابها ثلاثية الصنف، فلسية، ذرية، يفرح منها عت للسر عوف اغاذ وانثي الرائحة. ثمارها زرقاء اللون، عتية الشكل قطرها نحو ٨ م.

١٨١٦٧ - عَرَبُ الصَّيْن *Juniperus chinensis* (S).

*Genévrier de Chine* (F). *Chinese juniper* (E). *Chinesischer Wacholder* (D). *Ginepro chine* (I).

شجرة سبروتية كبيرة اللقده تملو من ١٥ إلى ٢٥ م. اسرارها عديدة، اشهرها المذبة والقضية. جميعها زيتونية سريفة النمو. غرايبها جالسة منفردة. بناتها أسطوانية منتصبة. اهدابها غرزوية ثلاثية التجميع تطويل من ٨ إلى ١٢ م. نصلها أخضر اللون، ابيض المختار. ثمارها تنسجبة اللون، طليقة البثرة، ييفية الشكل تطويل نحو ١٠ م. وتعرض نحو ٧.

١٨١٦٨ - عَرَبُ خَرَج *Juniperus flaccida* (S).

*Genévrier flasque*, *G. pleureur* (F). *Drooping juniper* (E). *Trauerwacholder* (D). *Ginepro piangente* (I).

شجرة منتصبة اللقده تملو من ٨ إلى ١٠ أمتار. غرايبها

ولا شك. وقال أبو حنيفة: إن العرقية أصلها واسع يأخذ قطعة من الأرض تنبت لها قصبان كثيرة بقدر الأصل وليس لها ورق له نكهة إنما هي عيدان دقاق وفي أطرافها زرع يظهر في رؤسها شيء كالشعر أصفر، وهو مثل قعدة الإنسان بيض إذا يبس وله ثمرة صفراء والأبل والقم تآكله ويلبها ويأبسا ويليه شديد الحمرية. فيقال كان غيته غرام عرقية. || والعرق جنس نباتات برية وتزيينة من فصيلة البرديات. أنواعه المعروفة لا تقل من ٢٥ جنسها جنبتات وبجيرات. أصلاتها بلاد الشرق وأروية. سيقانها قصيرة معطها حرياط وبعضها شائك. أوراقها بسيطة، كاملة، تصلحاً لمشاربة الحافة، جامدة النسيج، مزينة الصفحات السفلى. أزهارها عديدة الأضدية، صغيرة القد، مستديرة البتلات، نورية التجميع أو فردية. ثمارها نورية تحوي من ٢ إلى ٥ بذور. || أعرف أنواعه وأشهرها ما يتبع:

C. horizontalis	عرقية أفقية
C. frigida	عرقية الثلج
C. Zabeli	عرقية ذابل
C. tomentosa	عرقية زبده
C. melanocarpa	عرقية سوداء الثمر
C. salicifolia	عرقية سورية الورق
C. simoni	عرقية سيموني
C. microphylla	عرقية صغيرة الورق
C. racemifolia	عرقية عنقودية
C. multiflora	عرقية كثيرة الأزهر
C. lucida	عرقية لامعة
C. vulgaris	عرقية مبلولة
C. acuminata	عرقية مدببة
C. disticha	عرقية مزدوجة التصليف
C. rotundifolia	عرقية مستديرة الورق

١٨١٨٧ - **عُرْقُط** *Acacia orfex* (S).  
 ١٨١٨٨ - **عُرْقُط** *Acacia Froskoi* (F).  
 نوع من السنط وهو جنبة شائكة تملو من ٢٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروعه سريعة كثيفة منشعبة. أوراقه مركبة، وروقاتها بيضية صغيرة القد شاسية الخضار. أزهاره صفوية التجميع، وزهره صفراء اللون || أصلاته الجزيرة وسانت البلاد العربية. يصلح للزينة ولسياجات. الواحدة عرقطة.

١٨١٨٨ - **عُرْقُط**  
 «دوبية لا خير فيها تذكر لغرب أنها لا تبول إلا شرفت ببولها إلى صوب القبلة ولحبات تأكلها» المدبري.

١٨١٨٩ - **عُرْقُط** *Orphie* (F) *Garfish* (E).  
 سمكة بحرية تسمى عرقان، أصلها.

١٨١٩٠ - **عُرْق** *Arak*  
 شراب مسكر يصنع من كحول العنب مع الانيسون.

١٨١٩١ - **عُرْق** *Sueur, Transpiration* (F).  
*Sweat, Transpiring* (E).  
 سائل تنفسه مسام الجسم وتفرزه بعض الغدد الخاصة.

غراسيها متفرجة جامدة. بناتقها اسطوانية. أهدابها سداسية الصف، غرزبية الشكل، كثيفة التجميع، متراكبة. ثمارها عنية، قطرها نحو ١٥ مم. لونها اللحمية للسوية اللامعة || يستخرج منها بالخر أجود أصناف البخور العربي.

١٨١٩٦ - **عُرْقُ كَادِي**  
*Juniperus oxycedrus* (S). *Genévrier oxycedre, Oxycedre, Cade, Cadier* (F). *Prickly cedar, Sharp cedar* (S). *Zader Wacholder* (D). *Ginepro ost-cedro* (I).  
 شجرة سرورية مبلولة تملو من مترين إلى ثمانية أمتار. غراسيها منتصبة، بناتقها اسطوانية دقيقة. أهدابها عروية الارتكاز تطول نحو ١٦ مم. نصلها أخضر الصفحة العليا، أبيض السفلى التي يتوسطها خط أخضر. ثمارها جزوية اللون حصى الشكل ولقده || يستخرج من غصنها بالتقطير زيت الكاد وهو دهن أسود اللون شديد اللعالية يستعمل في معالجة الأمراض الجلدية.

١٨١٩٧ - **عُرْقُ كَادِي** *Genièvre* (F). *Juniper-berry* (E)  
 هي ثمرة المرمر

١٨١٩٨ - **عُرْق** *Odour* (F). *Odour* (E).  
 العرق: الرائحة أو غلبة أو ممتدة وأكثر استعماله في الطبية.

١٨١٩٩ - **عُرْق**، **عُكَاك** *Coutume* (F). *Custom* (E).  
 هي المبادئ القانونية المستمدة من التقاليد والعادات.

١٨١٨٠ - **عُرْق** *Criniera* (F). *Mane* (E).  
 جناح شعر الساق في الخيل والبغال والحمير.

١٨١٨١ - **عُرْق**  
 هو شجر الأترج. ج. عُرْق وأحرف.

١٨١٨٢ - **عُرْقُ الاسد** *Zosma*  
 عرق الاسد نجم ثير من كوكبة الاسد الأصفر. ويدعى شميرة الاسد والحزنة.

١٨١٨٣ - **عُرْقُ الدبلك**  
 صفة تزيينية تسمى صينة خلية، أصلها.

١٨١٨٤ - **عُرْقُك** هي الفصم المصطفة، أصلها.

١٨١٨٥ - **عُرْقُك** \* *Acrida* (F). *Acrida* (S).  
 حشرة كبيرة القد من فصيلة الجراديات. أصلها بلاد الحجاز. تألف المواقع الربلية حيث يكثُر الشب. الذكر منها يطول من ٣٠ إلى ٤٥ مم. والأنثى من ٥٥ إلى ٧٥ مم. رأسها مخروطي الشكل. زياتها صمغتها القلادة مستعانة الطرف. قوائمها مسطبة. ظهورها في الذكر يطول نحو ٤٠ مم. وفي الأنثى ٧٢. قوامها الل خضار الموش والمنش بالمنطلي.

١٨١٨٦ - **عُرْقُك** \* *Cotonéaster* (S). *Cotonéaster* (F). *Cotonéaster, Quince leaved medlar, Rockspray* (E). *Steinquitze, Quittenmispel, Zwergmispel* (D). *Cotogastro, Cotonastro* (I).  
 جاء في اللسان: «عرب من النبات سهل سريع الانقياد واسخه عرقية. وقيل هو من شجر الصيف وهو لين أخضر له ثمرة عسقاء كالحلك. وقال أبو زياد: العرق طيب الريح الخمر إلى الحفرة وله زهرة صفراء وليس له حب



عمر كادي



عرقان



عرق

ساقها فروعاً . أزهارها بيضاء اللون ، جميلة الشكل ، عتقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، منتصبة || أزهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عرق الدم

١٨٢٠٢ - عرق الذهب المخزني \*  
Uragoga ipecacuanha, Caphazis ipecacuanha, Psychotria ipecacuanha (S), Psychotrie ipecacuanha, Ipecacuanha, Ipeca du Brésil (F), Ipecacuanha (E), Ipecacuanhapflanze (D), Ipecacuanha (I).

نوع من عرق الذهب وهو عشبة ليفية صغيرة الغد تملو من ٣٠ إلى ٤٠ سم . أصلها البلاد الحارة الرطبة . يستخلص من جذورها العقيلة ، الحليمة ، البهية ، مادة قلوية صافية تحتوي نحو ٢٪ من عنصر الأمتين (Emetine) الشائع الاستعمال الطبي .

١٨٢٠٣ - عرق السوس هو السوس ، اطبله .



عرق الذهب

١٨٢٠٤ - عرق السوس البري هو الاسرافالوس عرق السوس ، اطبله .

١٨٢٠٥ - عرق الفجبل هو البغن الاحمر ، اطبله .

١٨٢٠٦ - عرق الفسا Nef sciatique (F), Ichiatic nerve (E).

١٨٢٠٧ - عرق إنجبار \*

Potentilla erecta, P. tormentilla, Tormentilla officinalis (S), Potentille tormentilla, Tormentilla officinale (F), Blood-root, Tormentil, Septfoil (E), Blutwurzfingerkraut (D), Potentilla tormentilla (I).  
نوع من عشبة القترى وهو نبات عشبي طلي مداد من فصيلة التيليكاتيك يكثر في الغابات والرمالي . جذابه غاية افنية الانتشاب . ساقه فروعاً . أزهاره زنادية فردية تاجية ، صفراء اللون .

١٨٢٠٨ - عرق مدتي هي هدابة للندبة ، اطبله .



عرق الذهب الهزني

١٨٢٠٩ - عرقكة ، عرقكة Collet (F), Neck, Rousse (E).  
أروسة الشجرة التي تتشعب منها الفروع .

١٨٢١٠ - عرقكة Filare (F), Filaria (E).  
هي الهداية ، اطبله . اما البرقة فهي تسمية الدكتور حبيب صندر .

١٨٢١١ - عرقكة هو الخفض ، اطبله .



عرق انجبار

١٨٢١٢ - عرقص \*  
Sciophila (S), Sciophila (F), Sciophila (E).

جنس حشرات من فصيلة القرمصيات ورتبة ذوات الجناحين . أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، جميلة ، تطلو من ٤ إلى ٦ م . رؤوسها صغيرة ، شبه موزانية الشكل . عيونها صغيرة ، متباعدة عن العينين . قرونها الاستيعادية عيطية مركبة من ١١ فصلة . ملساها رباعية العقول . مراشها فليمة . كاسلها بيضية . بطنها موزنية . أنوثها لينة . رؤاشها قسطانية التخصيب ، قوتوها الرطبي والغلفية مهدبة الطنائب ، مجهزة بمناس ذرية || تألف الثنابات والمناخ الرطبة . اسارها نجاية او عاردة تموش تحت لحاء الانجبار او عل الفطور .

١٨٢١٣ - عرقصون هو جلم الحيفة ، اطبله .

١٨١٩٢ - عرق ، ولين ، وريد ، ودج Veine (F), Vein (E).  
عضو وحياتي من اعضاء الجهاز الدوري في الجسم .

١٨١٩٣ - عرق Nerve (F), Nerve (E), Nerve (E).  
عضو وحياتي ثلثي من اعضاء الجهاز الدوري الثنائي مركزه الرئيسي في نصل الورقة ينشعب عن ضلعها .

١٨١٩٤ - عرق هو السلاة ، اطبله .

١٨١٩٥ - عرق أبيض Veine blanche (F), White veins (E).

رسم وشم الوباء الاقتصادية تسببه حشرات الترييس والفيزيد التي تركب اوراق التبغ تقطع الخشب وتنتص عصارة الخلايا واللبغ الناتج ولا تترك حل نتج اللصل بمحاذاة الفصم والفروع والثرايين سري اليافا علبية جامدة مبتورة لا مناعة عندها تحميها من عث الامراض الفطرية ولا طلة نشوية فيها تحميها من متابة نشاطها الحيوي || يتكاثر هذا الوبس بالقبض على الحشرة التي تسببه وذلك فور ظهورها على الاوراق . راجع ترييس التبغ .

١٨١٩٦ - عرق أبيض هو الجزر الأبيض ، اطبله .

١٨١٩٧ - عرق أكور هو عود لوج ، اطبله .

١٨١٩٨ - عرق الحلاوة هو الصابونية الخزنية ، اطبله .

١٨١٩٩ - عرق الدم \* ، دموية Sanguinalia canadensis (S), Sanguinalia du Canada (F), Blood-root, Red puccoon, Blood-wort (E), Kanadisches Blutkraut (D), Sanguinalia del Canada (I).

نبات شجيري جلدوموري ممر وسيد الجنس والنوع من فصيلة المشخاشيات . جذابه غليظة عقدية مادة غزيرة العصارة اللبكية الحمراء اللون . اوراقه فردية تلتصق وسيدة عند كل عقدة يطولها شراخ . وهي عميقة ، كفية ، خاسية او سداسية الفصوص المسننة الحافة ؛ تصلها الى الخصار البصري يطولو مواج اخر . شاربضة الزهرية تملو نحو ١٥ سم . وهي فردية الزهرة التي تتألف من ٨ الى ١٢ بتلة يفضية الشكل يفضاء اللون || أزهارها يستمر من نيسان الى ايار . وهو من النباتات الصناعية الطبية والثرينية وذلك لان صمارة اللبكية تتصلب في صباغ الالفة ولا يجمع اجزاه من الجذور الى الورقة والزهرة تتصلب طبيا كعوم او مخدر .

١٨٢٠٠ - عرق الذهب \*  
Psychotria (S), Psychotrie, Psychotrie (F), Psychotrie (E), Breckkraut, Breckpflanze (D), Psicotria (I).  
جنس نباتات برية من فصيلة القرويات أصلها البلاد الحارة . أنواعها عديدة جميعها جنبات وجينيات منتصبة السوق ، اوراقها متعاقبة معتقة كاسلة . أزهارها عتقودية التجميع او تاجية الارتكاز . ثمارها عشية جلدية يابسة . له نواتج مشهوران واحد طبي وآخر زراعي .

١٨٢٠١ - عرق الذهب الأبيض الزهر Psychotria leucocapala (S), Psychotrie leucocapala (F).

نوع من عرق الذهب وهو جنبية معمرة تملو نحو ١٥٠ سم .

فردية التجميع ، أبيلية الارتكاز || اعرف انواعه واشهرها المرقون الحزني .

### ١٨٢٢٢ - عَرَمَصٌ مَحْفَرِيٌّ \*

Euphrasia officinalis (S). Euphrasia, Euphrasia, Casselunettes, Luminet (F). Euphrasy, Common eye bright (E). Echter Augengrost (D). Eufrasia, Spezza occhiali, Luminella (I).

نوع من المرقون وهو نبات عشبي يري حولي شبه ظفيل لانه يركب بجذوره جنود النباتات الانسي || اقلبه حوس البحر المتوسط ، اوراقه صغيرة لثقة متعاقبة لصلها مشاربي الحافة منصف التسين . ازهاره وردية اللون . اوراقه وازهاره تنطق الورد وجع التهابات العين .

Jaune d'oeuf (F). **عَرَمَصٌ** هو صفار البيض .

Oufs de gangas (F). **عَرَمَصٌ** Eggs of the Pin-tailed grouse (E).

المرم : ييش القطا .

### ١٨٢٢٥ - عَرَمَصٌ ، قَارَصٌ ، اَمِير يَاسِر

Carissa (S). Carisse (F). Carandas plum (E). Carisse (D). Carissa (I).

جنية معمرة برية طيبة من سبط المرميات وفصيلة القديليات . اصطناعها الهند ويبيض مناطق افريقية الشرقية والجنوبية . ساقها فراء . فروصها سرعية شائكة . اوراقها سائفة متعاقبة . ازهارها حشوية التجميع ، محورية وتاجية الارتكاز ، بيضاء اللون || ازهارها ديمية يستمر من ايار الى تموز .

### ١٨٢٢٦ - عَرَمَاصٌ ، عَرَمَصٌ

طحلب كانه نسيج العنكبوت . واللفظ الاخضر الذي ينتفي الماء .

Georychus (S). Géoryque (F). **عَرَمَاصٌ** \*

جلس حيوان من فصيلة اللخديات . اولمائه ثمانية . اجسامها اسطوانية الشكل تطول من ١٥ الى ٢٥ سم . اوتارها الى السرة . وروصها مستديرة ، قفاهها مقطوعة ، قوتها خريزية . اذنانها لا قوية ، قوتها قصيرة . اظافيرها قوية ، اذنانها حصل شعر تملو جذاع || اناثها تضع من جبرون الى اربعة . تألف النيام والاراضي الرملية الشجرية . اجسامها متوسطة المق . انفاقها طويلة متعرجة كثيرة الفوه ، قوتها جلود ولها وشكير النبات .

Meule (F). Stack (E). **عَرَمَاصٌ** ، **عَرَمَاصٌ** الكس من الحصيد يرم ويحفظ رويلا يدرس .

Salpichroa (S). **عَرَمَاصٌ** Salpichroa, Œuf de coq (F).

جنس نباتات جينية معمرة من فصيلة الباذنجانيات . انواعه عديدة جميعها سرورية . سوقها فراء تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروصها سرعية . اوراقها اطلبية مستديرة القاعدة ، صغيرة لثقة ؛ لصلها ناعم السنج ، خل اللبس جميل الخضار . ازهارها محورية الارتكاز ، جليبية الشكل ، بيضاء اللون . ثمارها جوزية الشكل والقد ، لية السوداء ، فراء اللون .

### ١٨٢٢٧ - عَرَمَصٌ

المرمض : كل شجر لا يثمر ابداً .

Scrophillidae (S). **عَرَمَصِيَّاتٌ** \*

Scrophillidae (F). Scrophillidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المرموقة عديدة منتشرة في سلف اقطار العالم || اجسامها متفاوتة القد ، تطول من ٤ الى ١٦ سم . وروصها صغيرة ، شبه مزوانية الشكل . صيوتها صغيرة ، متتابعة عند التسين . قوتها الاستعمارية خيطة ، مركبة من ١١ صلة . مرادفها وبلاسها متدلة الطول . قوتها الخلفية مستقيمة الانحناء || تألف الرياض والغابات والحراج . يرقاسها تدبش على الاشجار النخرة وتحت القشور || اشهر اجناسها المرمض والميكوبية والية .

Oreolia cristata (S). **عَرَمَصٌ مَحْفَرٌ** \*

Oréolique huppé (F).

طائر وحيد الجنس والذعر من فصيلة المرمديات ورتبة الجروم سنات المنقار . يملك اذنايات والاحراج . ملجته انبساطي جاعي . جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات والثمار القبانة واليزور || جسمه صغير القد ، يطول نحو ٢٢ سم . ثوبه جميل الالوان المتداخلة . رأسه معتدل الجرم المنس الخصار الامس ، تملو ، عند الذكر ، قزعة شراعية الشكل حيلة اشجار اللهب . رفاقه وجناحه وذنبه الى الخصار الامس يملو مواج يراوح بين الشبهة والثرقة . زوره الى الياس العاجي . امل صدره الى الحرة الجوزية . يعل الى الصفرة يملو مواج يراوح بين الشبهة والخضرة || يطن عنه في الادخال المستعمية . الاثني تحسن بملاوة الذكر من ٤ الى ٦ بيضات .

Jarrez (F). Hough, Hock (E). **عَرَمُوبٌ** \*

عنس من امضاء القوام في الدواب وهو ما ضم ملش الساق والرفيف من مؤخرها .

Artab **عَرَمُوبٌ الرمي** \*

عَرَمُوبٌ الرمي كركب نثر من برج الرمي . مركزه على الساق اليسرى وهو الاوله من المرمدين .

١٨٢١٨ - **عَرَمُوبٌ القطا** \*

ساقها . وهو ما يبالغ به في القص يقال يوم اقصر من عَرَمُوبٌ القطا .

١٨٢١٩ - **عَرَمُوكَةٌ** \*

المرقوقة نجان متشعاع من كوكبة القوس الاعظم .

Duchesnea (S). Duchesnéa (F). **عَرَمُوكٌ** \*

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الورديات . انواعه قليلة العدد جميعا قريبة الشبه من الشبلك . سوقها مدادة تطول من ٢٥ الى ٥٠ سم . اوراقها متعقبة مستطيلة المائل ، لصلها مفصص الضفحة . ازهارها الى الصفرة اللحية . ثمارها جوزية التركيب ، شليكية لثقة والشكل ، حراء اللون ، مأكولة ، لكنها عادمة النكهة والرف .

Euphrasia (S). Euphrasia (F). **عَرَمُوكٌ** \*

جنس نباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الخنازيريات . انواعه نحو ٢٠ منظرها من اشباب المناطق الحارة . اوراقها صغيرة متعاقبة منفة الحافة . ازهارها



عَرَمَصٌ



عَرَمُون



عَرَمُون غُرَنِي



عَرَمَة



عرو



عرو النثم



عرون



عروسة



عروسة الترامس

١٨٢٤٠ - عُرُوشُ \*  
Epi de maïs (F).  
Maize head, Maize ear (E).  
عور اسطواني الشكل غليظ القدر تركز سوله على صفوف متناوبة حبوب القذرة الصفراء .

١٨٢٤١ - عُرُوشُ \*  
Cilo (S). عُرُوشُ الحوت \*  
Cilo (F). Cilo (E).  
جنس دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل وفضيلة المرصيات . انبواها المرفقة عشرة منتشرة في المحيط الاطلسي والمحيط الهندي والبحر الابيض المتوسط || ملجئها الحيائي بجاني . اسرايسا تند بضعة ملايين || اجسامها صغيرة عادمة اللثاف الصلبي شبه وشية الشكل تطول من ٢ الى ٤ سم . افواها حلقة بزرالده غروبية نابضة . زانفها زويية القصبة في الفت . انواها عديدة منها الازرق والبنيجي والجذوي والاحمر || الحيتان تتدح اسرايسا وتلقها بشرامة .

١٨٢٤٢ - عُرُوشِيَّات \*  
Clonides (S).  
Clidides, Clonidides (F). Clonidides (E).  
فضيلة دوبيات بحرية من الرخويات مجتمعات الازبل مريانات . اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم بحار العالم || تتميز باجسامها الصغيرة القشة وشية الشكل وبملامسها الهشة الاطراف وبخلها من اللثاف الصلبي || اشهر اجناسها المرصية .

١٨٢٤٣ - عُرُوشُوم \*  
Chamignon (F).  
Mushroom, Fungus (E).  
هو كل فطر تام الخلفة بين الساق والكمكة .

١٨٢٤٤ - عُرُوشَا \*  
Péroenne (F). Péroenne (E).  
صفة نباتات الحمر . وقد تتصلب بعض المسفرة الانضغار في النبات الذي لا ينضج للاصباح الزمني المويوت . ضحفا بالمشي الاول حولي . وبالشي الثاني حابل وناضف ونيفش .

١٨٢٤٥ - عُرُوشُ الماء \*  
Nafade, Nafade (F).  
Nafade, Water-nymph (E).  
جنس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . افواها المرفقة ١٠ جميعها من نباتات المياه العذبة . سوتها متشعبة قصفة . اوراقها رقيقة شائعة . انماها ثنائية الشكل ، ابطية الارتفاع ، فردية التجميع . الكثرية منها قوتها مدادة والاثوية مبيض || يبي من نباتات القمرودية في المساك الاستوائية لانها تدخل في فدا بعض الاصماك اعصها الشبوط .

١٨٢٤٦ - عُرُوشُ الثيل \*  
هو لولس الثيل ، اطليه .  
١٨٢٤٧ - عُرُوشَةُ البَحَر \*  
هو السحل المنطق ، اطليه .

١٨٢٤٨ - عُرُوشَةُ الْقَرَّاصِ \*  
Eurrhypare urtica (S). Eurrhypare de l'ortie,  
Teigne des orties (F). Eurrhypare urtica (E).  
حشرة مزوقة من فصيلة التاربات حرشيات الاجنسة . موطنها بعض اقاليم البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط ولروبية . فراشها واشعة قوتها رقيق الازداد . غاضقة تركب اوراق القراص والشعيرات اربعة والزراعية تقتل الازراق وتقم في داخلها || جسمها بطول ١٠ م ١٢ م . بطولها تراوح من ٣٠ الى ٢٤ م . رأسها صغير الحجم ، قصير الخلم . عينها زيتيان ، صغيرتان .

١٨٢٣١ - عُرُوشُ \*  
Rafle (F). Grape-stalk (E).  
المروش والممشوش هو المتدثر انتزع عنه .

١٨٢٣٢ - عُرُوشُوط \*  
Congre commun (F).  
سمكة بحرية تنس زرقية مبلولة ، اطلبها .

١٨٢٣٣ - عُرُوشِيَّات \*  
Carissées (F).  
سبط من فصيلة اللبليات يشمل بعض الاجناس والانواع جميعها جنبا وجنبايات فراء شائعة ، اشهرها الحمر .

١٨٢٣٤ - عُرُوشُ \*  
Forme cartilagineuse (F).  
شكل من الزبدات وهو انتفاخ عظمي قاسي يترى المنفعة الجائية من اطرة الحافر .

١٨٢٣٥ - عُرُوشُ \*  
سَلَّةُ زَرَاعِيَّةٌ \*  
Sennouan  
Onobrychis sativa (S). Sainfoin cultivé, Esparcette, Bourgogne (F). Sainfoin, Holy clover, French grass (E). Echte Esparcette, Hannekamm (D). Sannofino, Sedragola, Crocetta (I).  
نبات عشبي علني مسمر من فصيلة القرنيات القرانية . جلوده وندية قوية تنور في الارض من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . سوله مخنقة جولة تطول من ٥٠ الى ٧٥ سم . اوراقه متعاقبة مركبة ، وريقاتها بيضية الشكل كثيرة العدد . انجاده منبيلة التجميع ، محورية الارتفاع او تاجية ، مستطيلة الزناد ، ودية اللول ، مسنبة العرف ، مشرفة الرقيق يحرسها النحل . ثماره زور مفلحة خطية اللول ، بارزة الزراكتش ، عبيبة الاطراف ، لا تحافظ على طاقها الابتائية اكثر من سنتين || وهو من نباتات التي تجود في جميع الاثرية ولا تحصى سوى الرملة الماعدة الانساج .

علفه لغير الماشاة ، جيد الصنف ، يحسن اللحم ويزيد فيه نسبة البنية .  
١٨٢٣٦ - عُرُوشُ القَتَر \*  
سَلَّةُ عِرْفِ النديك ،  
سِنِ العَجُوز  
Onobrychis cristagalli (S). Sainfoin crête de coq, Hérisson (F). Cock's head, Medick vetch (E). Hahnenkamm (D). Cresta di gallo (I).  
نوع آخر من اللرن وهو من نباتات العلفية الحولية التي تنحش مرة واحدة . ساقها الظرية مدبرة قلند ، حولية الشكل ، مستطيلة الزناد ، يزود خلية اللول العباب ، كثيرة التماريع والزراكتش القاترة || يجود في جميع الاثرية ولا يحصى الزراعة العلية .

١٨٢٣٧ - عُرُوشُاس \*  
هو لولس التيل ، اطليه .  
١٨٢٣٨ - عُرُوشُاسِيَّات \*  
Cracidae (S).  
Cracidae (F). Cracidae (E).  
فصيلة طير من رتبة الدجاجيات ، اجناسها خمسة طيورها تنسوة الجثة ، مستطيلة الشكل ، قوية المتفاز الاجسن ، قزعية الرأس ، مسدرة الاجنسة ، مستطيلة الذيل . اجناسها المشهورة ثلاثة المتفاز والغزان واشكس .

١٨٢٣٩ - عُرُوشَا \*  
Tétozisme (F). Telocism (E).  
المرنة حالة الصلابة وسداها في العضو الفياح .

## ١٨٢٥٦ - عُرْيَانُ السَّيْحِ

Gymnogyne (F).  
Gymnogynous (E).  
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل زهرة عريانة للبيض .

## ١٨٢٥٧ - عُرْيَانَات

Pterotracheidae (S).  
Pterotrachidés (F). Pterotracheidae (E).  
فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مَيْمَةٌ ، اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || معظم انواعها عديم الصفات والقليل منها يحمل اصداغاً لتلصق الاشياء || اعرف اجناسها واشهرها المرينات والشفاة والفردولة والنبلية .

## ١٨٢٥٨ - عُرْيَانَاتُ الْأَسْكَان

Gymnodontes  
مربية اسماك من الطليات تنقص الى رتبة ملحويات الفك . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة تجمعها فصليات الفصحيات والفطقيات .

## ١٨٢٥٩ - عُرْيَانَاتُ الْبُور

Gymnospermes (F).  
Gymnosperms (E).  
اسم قلمي باديات الزهر في النبات .

## ١٨٢٦٠ - عُرْيَانَاتُ الْخَيْشُوم

Nudibranches (F).  
Nudibranchiotes (E).  
صف حيوانات من الرخويات المدلية .

## ١٨٢٦١ - عُرْيَانِيَّة

Pterotrachea (S).  
Pérottrachée, Firole (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مميزات الارجل وفصيلة المرينات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها بحار البلاد الحارة ، يكثر وجودها في بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || اجسامها عريانة مستطيلة حلزونية شفاة تنتهي باذناب متعاقبة الطول دقيقة الاطراف . زعانفها صغيرة وقرية التجميع . افواهها خطبية . خياشيمها قريبة الانقسام تلاصق القلوب في مجموعة واحدة مركزها تحت البطن .

## ١٨٢٦٢ - عُرْيَانِيَّة كَيْسُ الْبُرْق

Gymnosporange  
هي الفطور الطليقية التي لا ينفذ اكياس بعضها ششاء او لحاف .

## ١٨٢٦٣ - عُرْيَانِيَّة

Imperata (S). Impératè (F).  
جنس نباتات عشبية ، ميرة ، مرغوة ، من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع البلاد الحارة من العالم القديم || جميع انواعها عشبية . عصفها ضيق ، تنمو الطول . سنبليها مركبة ، صغيرة .

## ١٨٢٦٤ - عُرْيَانِيَّة

Ctenolabrus (S).  
Céanolabre (F). Ctenolabrus (E).  
جنس اسماك بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة الكيديات انواعها المعروفة قليلة . جميعها صغيرة القد . اعطائها بحار البلاد المعتدلة الحرارة والباردة . ومنها نوعان مسرحها البحر الابيض المتوسط .

## ١٨٢٦٥ - عُرْيَانِيَّة سَوْتِي

Ctenolabrus Iris (S).  
Céanolabre Iris (F). Ctenolabrus Iris (E).  
سمكة من العريس اعطائها بعض مناطق البحر الابيض

زبانها عجيلان . ملمسها دقيقان . مرفقها معتدل الجرم . جوشها ونبها الى اليمين المواجه || رواشتها الى اليمين المواجه يعطو تيجاج وزركشة متداخلة الاربعة والاصفر والاحمر القوي || لها جبل واحد في الحبل . تظهر القرفة في ابار وتبقى حتى آب . تسرح في النهار || الانثى تنح للمكن مباحداً على الصفحات العليا من مصال الارواق || الفطور الاسروي يستمر نحو ٢٨ يوماً ولسنة مت بلوغها الاذكاء تمام طول من ١٢ الى ١٤ م . جسمها اسطواني الشكل ، اغبر اللون ، اسمر المواجه ، تملوه ثلاثة صفوف قاذبة من الحبل القصير رأسها جوي اللون . رواجاها البطنية مجهزة بكلايب صغيرة حادة الاطراف || طول الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي ضمن صلجة متينة الحبل تسحبها السرعة بين طيات الارواق المفتوحة .

## ١٨٢٦٩ - عُرُوقُ الصَّبَاغِينَ \* ، عُرُوقُ صَفَر ، بَلَكَّةُ الْخَطَايِف ، مِيرَان

Chelidonium majus (S). Grande chélidoine, Eclairé, Herbe aux hirondelles (F). Celandine, Swallow-wort, Greater celandine (E). Gemeines Schellkraut, Schellkraut (D). Chelidonia majus, Celandine, Erba nocta (I).

نبات عشبي بري مدمر من فصيلة الخشخاشيات . اوراقه مركبة مفردة بحرية اللون . ازهاره كبيرة اللد ، طويلة الزناد ، لونها الى الصفار الزاهي || يكثر وجوده قرب البووت الربيعية وفي السياجات . صصارته لينة كايوية صفراء اللون تنقص على القليل . يهبط من اوراقه عند فركها رائحة لازمة تأخذ بالانف والحنق . ويستخرج منه صباغ اصفر مرغوب فيه .

## ١٨٢٥٠ - عُرْيَانَات

Graphiolaceae (S).  
Graphiolacées (F). Graphiolaceae (E).  
فصيلة الفطور العزمية من رتبة التعاليات . تتميز بعضها الرسيد الخلية ، اما بعضها فتتألف الجيلة شفي الانقسام .

## ١٨٢٥١ - عُرْيَانَات

Inerne (F). Thornless (E).  
نمت ترميفي توصف به الاحياء النباتية العادمة الشوك والرشب .

## ١٨٢٥٢ - عُرْيَانُ الْجَيْمِ

Gymnosome (F).  
Gymnosomate (E).  
نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل جسم عديم الكساء .

## ١٨٢٥٣ - عُرْيَانُ الْجِلْدِ

Gymnodermate.  
Gymnoderme (F). Gymnodermeus (E).  
نمت ترميفي يطلق في علم الاحياء على كل حيوان مكشوف الجلد .

## ١٨٢٥٤ - عُرْيَانُ اللَّذْيَلِ

Gymnure (F).  
نمت ترميفي يطلق في علم الحيوان على كل ذيل عديم الورب او الحلب او الحراشف .

## ١٨٢٥٥ - عُرْيَانُ السَّاقِ

Gymnocaulis (F).  
Gymnocaulous (E).  
نمت ترميفي يطلق في علم النبات على كل ساق عادمة الارواق .



هروق الصباغين

18771 - عُرَيْبَةٌ \* Anarrichus lupus (S).

Anarrichus, An. lup (F).

سمكة بحرية يعيش من شائكات الزعانف وصيلة الجفريات ملجأ المناطق الباردة والمعتدلة الحارة من المحيط الاطلسي. قلي تقرب من الجحاح. اسرابها متوسطة العدد || جسمها شبه اهليجي الشكل، كبير القدر، بطول نحو ١٤٠ سم. رأسها انطس. شفتها رطب الانفراج. اسنانها كبيرة بجادة الاطراف. عنانها صغيرتان ماصتان. جلدها عديم السطح يحجب السطح. زعنفتها الظهرية مستطيلة قاطبة. زعنفتها الذيلية صغيرة مدببة الطرف || ثوبها الى الخضر البحري القاتم يميلو تجلجج معرض اسر تشد سمرة في الرأس وأعلى الظهر || لحمها جيد الصنف ويطبخا مرغوب فيه.

18777 - عُرَيْن. Antre du lion (F). Lion's den (E).

الرين والعرين : مأوى الاسد.

18778 - عُرَافٌ \* Euphonia (S).

Euphonia (F). Euphonia (S).

جنس طير من فصيلة الترنيرات. انواعه المعروفة نحو ٢٤. جسمها من طيور امريكية الوسط والجنوبية. تألف القابات والحراج. نظامها الحيائي بحلي. اسرابها متطاوعة العدد || اجسامها صغيرة القدر، عذبة، بطول من ١٢ الى ١٦ سم. منقبتها خضوية صغيرة. اجنحتها معتدلة الحجم. انقائها متوسطة القدر، مقطوعة الاطراف. اسرافها دقيقة. اصابعها صغيرة. اولياها بجلة الاوران الساطعة يكثر فيها الازرق والاصفر || تميز بكرة قمرها المستعب الانعام. جميعها تعيش في الغار الشجر والبيادر. اخلاقتها رضية. معمر انواعها يألف القفص ويحب التقرب || تدفن احشائها في الاشجار الفتاة المعتدلة الارتفاع من سطح التربة. فانها تقص من ٤ الى ٥ يمشات تحضنها بتمارة الذكور نحو ١٤ يوما.

18779 - عُرَاقٌ \* Esacus (S). Esacus (F).

طائر من طوال الساق وفصيلة الزرقائيات. يتميز بفضته وبسرعة حده. موته مناطق الهند والافانك ويران. يألف المتاع والقيمان ويضاف اليهم وكثيرا قرول. ملجته الحيائي بحلي. جوامته قليلة العدد. قوته الحشرات والديدان والفاصيص || جسمه بطول نحو ٢٨ سم. يتميز بكبر مقفاده المركب من جزئين، جزء صغير يمتد من القاعقة حتى ثلثي المتفاد ويبرز قرني يكون الثلث الاخير. جناحه ذلي الطرف يلسف الذنب. ذنبه عرطلي الشكل، قصير. ثوبه العلوي الى الوردية السمر، يميلو مزاج اسمر. رأسه اشد سمرة من ردها. عنانها مقلتان بخط ابيض يمتد كالماجب حتى القفن. زورده واظفك الى القبرة. مدونه وبلته الى الشبهة. مقفاده وساقه الى الكهبة السمر.

18780 - عُرَاقَان Rectrices caudales (F).

Caudal tail-feathers (E).

المرالان : الريشان الثتان || طرف ذنب العقاب.

18781 - عُرَاقٌ هو الايروس البطر، اطله.

18782 - عُرَيْبَةٌ Ferme (F). Farm (E).

القرية كلمة مصرية ترادف مزرعة. والقرية هي كل ارض زراعية موصوفة المحفود يستثمرها صاحبها او يؤجرها بقدر.

المتموسط اخصها المناطق الثالية || جسمها صغير القدر بطول نحو ١٣ سم. ثوبها الى الحمر الزاهية. زعنفتها سود || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

18766 - عُرَيْشٌ صَخْرِيٌّ \* Ctenolabrus

rupestris (S). Ctenolabrus des rochers, Ronqué (F).

Ctenolabrus rupestris (E).

سمكة بحرية يعيش من الراس. اصلها من سطر التاليم البحر الابيض المتوسط. سرجهما حشاش الحادج والنتف || جسمها اهليجي الشكل. معتدل التبطيط، بطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى الصبهة الوردية يميلو مزاج اخضر ومشرع عسوط متطيلة قاطبة. رأسها عرطلي الشكل، مدبب انطس. فكها صغيران. شفتها قليل الانفراج. عنانها كبيرتان. زعنفتها الظهرية مستطيلة الشكل، لامتساوية الارتفاع. زعنفتها الذيلية مقطوعة الطرف || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

18767 - عُرَيْشٌ الْأُرْدَاقِي Platyphylle (F).

Platyphylous (E).

18768 - عُرَيْشٌ الْبِتَلَات Platyptéle (F).

Platypteleous (E).

18769 - عُرَيْشَات Plathelminthes, Plathodes.

Vers plats (F). Platyhelminthes (E).

شعبة الديدان الراض. تشمل ثلاث رتب: التريليات والمقننات والمهنزات.

18770 - عُرَيْبَةٌ، مَعْرُوش Pélicion (F).

Pesticion (E).

كتاب يرفع الى السلطات العامة يعرض فيه رأيا أو طلبا أو شكوى.

18771 - عُرَيْبَةٌ الْمَدَكَة Platygnathra (F).

جلس سحرات مفيدة من قشائيات الاجنحة تعيش يرقاتها حل اسارع بعض الحشرات المفرة قضيتها.

18772 - عُرَيْبَةٌ \* Testacelle (F). Snail-slug (E).

تدعي في لبنان و براك حيران و جنس دوبيات من فصيلة المريطيات. انواعها قليلة العدد، اصلها حوض البحر المتوسط. وهي من الدوبيات النافعة المفترسة التي تلهم الديدان على اختلاف انواعها.

18773 - عُرَيْبَتَان Testacellidae (S).

Testacellidae (E).

فصيلة دوبيات من الرضويات المدهيات الارجل الرئوية الشبثانية. اجسامها وانواعها عديدة. اشهرها المعربة.

18774 - عُرَيْبُ الْمُرُوج هو الساهر، اطله.

18775 - عُرَيْبَةٌ \* عُرَيْبَةٌ عُرَيْبَتَان

Platycerus (S). Platycère (F).

جنس سحرات كبيرة القدر من ممدات الاجنحة. انواعها عديدة، اصلها اسراج البلاد المعتدلة الحارة. اجسامها غليظة، قرونها الاستشادية صفحية الشكل، اولها الى السواد الباه الامنع اللوح || يرقاتها تتركب اوراق الاشجار الحرجية قضيتها.



عُرَيْش صَخْرِي



عُرَيْبَة



عُرَيْبَة



عُرَاق



عُرَاق



عُرَاق

يألف الثنايات ويقترّب من الاماكن الآهلة ولا يتعدى على الانسان. ملجته الحياقي زوجي || جسمه ابيض اللون ورشيها ، يطول نحو ١٧٠ سم. بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٩٠ سم. رأسه صغير الحجم. اخذاه صغيرتان ، صغيرتان. عيناها صغيرتان. سباله كثيفة مستطيلة. فترته قصيرة الثوب. ثوبه الى الكفة الحمراء المولج يمين في الظهر ويذو في الصدر والبطن. ويجعل غدة ادرية المركزة تفرز مادة كبريتية الرائحة. الانثى تضع ثوباً من الذكر || يتسلق الاشجار غنقة ويهدو على الارض بسرعة. قوته الطير والمناحر وكل ما استطاع اليه من الحيوان.

### ١٨٢٩٨ - عسّاكة كبيرة \*

*Leucospis gigas* (S). *Leucospis géant* (F). حشرة من العساكيات كبيرة القد. موطنها بعض اقطار البلاد الحارة والمشمخة نحو المعتدلة || جسمها مستطيل الشكل ، مثل الجوشن ، يطول نحو ١٥ سم. ثوبها الى السواد اللامع تملو خطوط عريضة صفراء كاربينية المواج رأسها شبه مخروطي الشكل. زباناها غطيان. قوائمها مستطيلة. سكتة الثنايب. اجنتها غشائية ، ضيقة ، قليلة المروق والاصاص. اشترها مستطيلة ، منثقة تستقر عند الاستراحة في اخدود يقطب الظهر حتى الجوشن || تنطفل على الزنايب والزرايط فترز اشترها في جهل الخشاء مها كان صلباً ومثنت المكن في البدا وعليها.

### ١٨٢٩٩ - عسّاكيات \*

*Leucospidae* (S). *Leucospidae* (F). فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة المحصورة. انواعها عديدة جميعها نافعة تنطفل على الحشرات الضارة من ذوات الجناحين || حشرات متوسطة القد وكبيرة تطول من ٧ الى ١٥ سم. اجسامها غشمة ملونة ، رؤوسها مخروطية. زباناها غطية. قوائمها طويلة. سكتة الثنايب. مرزاتها مستطيلة ، حادة منثقة نحو الظهر عند الاستراحة || اشهر انواعها العسّاكة الكبيرة.

### ١٨٣٠٠ - عسّاكة \* هي غشاية النحل ، اطلها .

### ١٨٣٠١ - عسّاكة \*

*Morphogenèse* (F). *Morphogenesis* (E). العسامة بمجموعة للنوايس التي تتحد وتتحكم شكل النج والاضياء في كل جسم حي منذ ابتداء تطويرة .

### ١٨٣٠٢ - عسّب \* هو الاربوس العطر ، اطلها .

### ١٨٣٠٣ - عسّب \*

*Sperme du chameau* (F). *Sperm of the camel* (E). شلخ النحل من الابل .

### ١٨٣٠٤ - عسّب \* عسّب \*

هو في النبات القدر الذي يتحمل بجميع صفات الضرب المثالية المطلوبة .

### ١٨٣٠٥ - عسبار \* ، عسبارة \*

*Proteles cristatus* (S). *Protète à crête*, *Loup fous-seur* (F). *Aard-wolf* (E).

حيوان من اللوامس ويحيه الجنس والذكور يشبه الضبع المخذعة لكنه اصغر منها جثة واثق ثوباً وأغش صوفاً . اعطاه البلاد الافريقية ، يسرح في الليل ، قوته الجيف وكل ما استطاع اليه سيلاً من صابر الحيوان والطير .

### ١٨٢٩٣ - عزّة - Bichette (F).

*Little hind*, *Young hind* (E). هي بنت الظبية حتى افرقتها عن امها .

### ١٨٢٩٤ - عزّور \* عزّور \*

الزور واليزور : هو ثمن الكلا به الحصيد . تقول : حل اخذت حيزر هذا الحصيد اي حل اخذت ثمن مرادها .

### ١٨٢٩٥ - عزّور \* Terno compacte (F).

*Compact soil* (E). التمز : الارض السليبة الرميّة السيل .

### ١٨٢٩٦ - عزّوف \* هو الحمام الطوراني ، اطلها .

### ١٨٢٩٧ - عزّوق \* Sarcage (F). Weeding (E).

سرح القشرة السطحية من القرية بالمزق الآلي او اليدوي وذلك لتنظيف التربة باقتلاع الاصشاب الضارة ولتخريب انابيب الاستلاب نمّاً لتيسر الماء .

### ١٨٢٩٨ - عزّوك \* Isolement (F).

*Separately*, *isolation* (E). فصل الحيوان المريض عن السليم .

### ١٨٢٩٩ - عزّوك من الروصاية Destitution de la tutele (F). Dismissal of the tute-lage (E).

تجريد الوصي من مهمة الروصاية التي استندت اليه .

### ١٨٢٩٠ - عزّومكة \* Energide (F). Energid (E).

الزومة محيط غليوي يشتمل على نواة ومنطقة زكينة تنتمل بتوجيهها .

### ١٨٢٩١ - عزّويل \* Pigeon mâle (F). Pigeon male (E).

الزويل واليزيل : الذكر من الحمام .

### ١٨٢٩٢ - عزّو \* Imputabilité (F). Imputability (E).

هو القول بان فلاناً فعل فلهة معينة مادياً وادبياً .

### ١٨٢٩٣ - عزّوق \* الزوق : حل القسق المادم للاب وهو دياح .

### ١٨٢٩٤ - عزّيب \* Dose

راجع شمة وجمرة .

### ١٨٢٩٥ - عزّيزاء \* هي الجشنة ، اطلها .

### ١٨٢٩٦ - عزّيم \* Azimus (S). Azime (F).

جنس نباتات برية وتزيينية معمرة من فصيلة الثنايات. انزاهه المعروفة عديدة منها المناطق الاستوائية من البلاد الاسيوية والافريقية || سيقانها سريعة او ملتفة . اوراقها منثقة ، متعاقبة . نساها اهلبيجية الشكل ، جميلة الخضار اللامس . انزهارها ابيض وهامس الارنكساز ، عشودي التجميع . انزاهها صغيرة يضاء اللون او وردية ، عطرية الدرف الخلات .

### ١٨٢٩٧ - عسّاس \* ، فوسّة \* Cryptoprocta ferox (S).

*Cryptoprocta féroce*, *Foussa* (F).

حيوان لاسم مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه جزيرة مفسكر . يعتبر اكبر ضواري الجزيرة . مسرعه دجوي .



عزيم



عسار



عسّاكة كبيرة



عسبار



١٨٣١٢ - **عُشْبُون** \* Phyllostachys (S).

Bambou (F), Bamboo (E).

جنس نباتات قصية بزية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وصليبة التبليات. أنواعه عديدة ترطب في الأربة القليلة الانتاج ، السيفة النور ، الضوية ، القالية ، القرطية . اشهرها ما يتبع .



صرب

١٨٣١٣ - **عُشْبُون أسود**

Phyllostachys nigra (S), Bamboo noir (F), Black bamboo (E), Japanese Blattsähre (D), Bambie nero (I).

نوع من العشون يطول من المترين الى السبعة امتار . سيقه بكاملها مع سلاسلها وصبرها الى السواد اللامع . اوراقه تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٣ سم . نصلها مائل الصفحة العليا ، ازغب السفلى ، مذهب الحافة . ينبت من النباتات البروية القليلة المتطلبات . يفضل الأربة الخفيفة الرطبة .

١٨٣١٤ - **عُشْبُون أصفر**

Phyllostachys aurea (S), Bambou doré, B. jaune (F), Yellow bamboo (E), Gelbe Blattsähre (D), Bambie giallo (I).

نوع من العشون يطول من ٤ الى ٥ امتار . سلاسله مقعرة قصيرة ، صبره بارزة مقعرة . انتاده عديدة ، دقيقة ، متشعبة . اوراقه تطول من ٧ الى ١٤ سم . نصلها مسن الحافة ، مائل الصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ينبت ويحيد في جميع الأربة .



صربوة مرققة

١٨٣١٥ - **عُشْبُون بنفسجية**

Phyllostachys violascens (S), Bambou violacé (F).

نوع من العشون يطول من الثلاثة الى الست امتار . سيقه بكاملها بنفسجية اللون . اوراقه تطول من ٥ الى ١٨ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها مسن الحافة || زواحه تطلب بعض العناية ، يرغب في الأربة المعتدلة الانتاج والرطوبة ، الرافرة المواد الضوية .

١٨٣١٦ - **عُشْبُون بيشي**

Phyllostachys ruscifolia (S), Bambou petit-houx (F).

نوع من العشون يطول من ٤٠ الى ٩٠ سم . سلاسله تنمو خضراء اللون ثم تصفر . اوراقه تطول من ٦ الى ١٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مستدير القاعدية ، ذات القصبة . وهو نبات سبروي يحيد في جميع الأربة القليلة والمتوسطة الانتاج .

١٨٣١٧ - **عُشْبُون زبرجدي**

Phyllostachys viridilutescens (S), Bambou vert glaucescent (F).

نوع من العشون . يطول من ٥ الى ٦ امتار . سلاسله متوسطة الطول ، خضراء اللون . صبره بارز أسود . اوراقه تطول من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض نحو ٢ سم . نصلها أخضر الصفحة العليا خلى السفلى || وهو نبات سبروي ، زواحه كثيرة الانتشار لكنه ينشئ الجفاف .



عشرون

١٨٣١٨ - **عُشْبُون كستيلون**

Phyllostachys castillonis (S), Bambou de Castillon (F).

نوع من العشون ، يطول من ٣ الى ٥ امتار . سلاسله متخلفة الخضرة والصفرة . اوراقه تطول من ٨ الى ١٤ سم . وتعرض نحو ٣ سم . نصلها منشدي الحافة يطول وتضع اصغر ودي || ينبت من النباتات البروية التي تحيد في جميع الأربة الممكن ردها .

١٨٣١٦ - **عُشْبَر ، عُشْبُون** Chien-loup (F).

Wolf-dog (E).

سلالة من الكلاب تتميز بسلطها وبقابليتها الى اقتباس ما يطلب منها .

١٨٣١٧ - **عُشْبَق** Pileostegia (S), Pileostégia (F).

جنس جنبات ترابية معمرة من فصيلة السبوسيات ، أنواعه قليلة العدد ، سيقها زرجونية تطول من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم . اوراقها كاملة ابيدة سنانية اتصال الجملد الصفعة وهي حاضرة مرة تدلوي بها الجملحات . ازهارها صيروانية التجميع ، يضاء اللون ، سلاسلها غيبية الشكل بارزة || ازهاره يستمر طوال الصيف .

١٨٣١٨ - **عُشْبَكَة** هو اللهب ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْد** هو البير ، اطلبه .١٨٣١٩ - **عُشْرَاب** \* Butalis grisola (S).

Butalis gris (F), Brown fly-catcher (E).

طائر من الصوارب من فصيلة المنابيات . موطنه جميع المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاقصى واروية . يألف جميع الاسماك القريبة من الماء || جسمه صغير القد يطول نحو ١٥ سم . ثوبه العلوي الى الرقبة . جبهته ورأسه مرقشان بالاسود . ويعمل في جناحه بعض التسنجج الابيض . ثوبه السفلي الى البياض الامير . منقه صدره وايضاه مرققة بالاسود . منقده وحفة صبه الى السواد الخالك . ساقه واصابعه الى السمرة السوداء . ثوب الاذن عادم التسنجج في الجناح || طيرانه خفيف الحركة رشيقا . وينتقل على الارض بلقاقة . قوته الحشرات من الذباب الى الفراش والياسيب ولا ينف عن التار السنية اليانعة || يدفن حبه بين الاضغان . الاثنى تضع في اوائل حزيران من ٤ الى ٥ بيضات متحصنا بجانبه الذكر نحو ١٤ يوما .

١٨٣١١ - **عُشْرُوبَة مَرَقَقَة** \*

Notodonta zizac (S), Notodonta zizac, Zizag, Bois veiné (F), Notodonta zizac (E).

حشرة من فصيلة الشرسليات وزنية حرشفات الاجنحة . موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط والاراضي واروية . فراشها واسمه قزبا رقيق الانتاج . سرقتها تعيش على اوراق الخور والصفصاف || جسمها معتدل القد يطول نحو ١٥ سم . بسطها نحو ٢٢ سم . رأسها صغير الجرم ، بني اللون . عيناها صغيرتان . زناناها مشطيان مزروجان عند الذكر ، مشطيان بسيطان عند الانثى . جنينها الى البني الخفي الموج بطنها الى البني الاصفر المالح . وراثتها الامامية الى الخفي المتطوالت السرة تملوه مشحبات بنية ونسوط وعروق سمراء اللون . وراثتها الخلفية الى البياض التي الموج . اهدابها جانبية || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز . تسرح في الليل . تعامل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع ويضع للكن مساعدا على الصفحات السفلى من نصال الاوراق || السرة تطول نحو ٣١ سم . جسمها مائل انتشار اكعب الابن اسود التحول . مستطيل الرأس ، مستضيق البطن حتى السكة السابعة ثم يضيق تدريجيا حتى الشرج الذي ينتهي بزاويتين صغيرتين || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي فسن صلبة تحميها السرة تحت القشور او في شقوق الحاء .

## ١٨٣١٩ - عَشْرُوسُ مَأْكُول

١٨٣٢٦ - عَشْرُود \* Asperococcus (S).

Aspérocoque (F). Asperococcus (E).  
جنس نباتات مجرية من أخشاب السمر. أنواعه الممرقة عديدة منتشرة في جميع بساتين البلاد المعتدلة الحارة || كلالها صغيرة وقصيرة. أوراقها قلبية، وحلابة التركيب. مزاجها الحار الحامض تحت امتداد النصال || تعيش على الصنوبر المنصورة.

١٨٣٢٧ - عَشْرُود \* عَشْرُود هو الدرة، الحلب.

١٨٣٢٨ - عَشْرُود Chapeau, Péridium (F).  
مستقلان الفطر: أحده رأسه. Pileus, Peridium (E).

١٨٣٢٩ - عَشْرُود Escallonia (S).

Escallonie (F). Escallonia (E).  
جنس شجيرات برية وزراعية تزيينية، من فصيلة السفريات. معها بلاد الشيلي. سيقانها ترفع من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها بيضاء متعاقبة، مسننة الخفاف. أزهارها لائحيات الشكل والتجميع. أزهارها ملونة || أنواعها الممرقة قليلة، أشهرها التالية.

١٨٣٣٠ - عَشْرُود Escallonia (S).

Escallonia (F). Escallonia (E).  
نوع من المسكولة. ساقها تملو من مترين إلى ثلاثة أمتار. أوراقها صغيرة تطلو نحو ٤ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها جلدية، جرداء، مسننة الخفاف، لامعة الخفاف. صفاتها السطلي مبرقة العدد الراتنجية. أزهارها بيضاء اللون، محورية الإزكاك، صغيرة القد، قطرها نحو ٨ مم. تنويرها صيفي.

١٨٣٣١ - عَشْرُود Escallonia (S).

Escallonia (F). Escallonia (E).  
نوع من المسكولة. ساقها تملو من متر إلى مترين. أوراقها أحليجية، مقنونة. نصالها خلية البشرة، عفرة. أزهارها صغيرة القد، وريدية اللون أو بيضاء، تتجمعا متعاقبة طرفية الإزكاك متدلية || تنويرها يستمر طوال شهر تموز.

١٨٣٣٢ - عَشْرُود Acronycta (S).

Acronycta (F). Acronycta (E).  
حشرة من فصيلة الشقيبات وريدية حشريات الراجعة. موطنها بعض اصقاع حوض البحر الأبيض المتوسط. فراشها واسعة قوتها رقيق الأظفار. سرقتها تعيش على أوراق الاجمار الوريفة || جسمها مستدل ألق يطول نحو ١٦ مم. يسطها نحو ٤٠ مم. رأسها كبير الجسم. عيناها كبيرتان. زباناها خيطيان مستطيلان. جرشها سحري اللون. يطها إلى الزرق تملوها خسة عسوط مبرزة سمها اللون || ورشاتها الامانيات إلى الزرق الباهتة يملوها تنقيط اسود ووردية حلالية الشكل. ورشاتها الخلفيان إلى الخفي الاصفر الملوخ || لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في آب. تشرح في الليل. تغافل بعد ظهورها بنحو أربعة أسابيع وتفتح الممكن لتطاع على الصفحات السفلى من نصال الأوراق || المرققة تطلو نحو ٣٠ مم. جسمها اسطواني الشكل، مالى

Phyllostachys mitis (S). Bambou comestible (F).  
نوع من العسوط، يملو من ٨ إلى ١٢ م. قطر ساقه يراوح من ٥ إلى ٧ سم. سلامياته مستطيلة صفراء اللون. أوراقه تطلو من ٨ إلى ٩ سم. وتعرض نحو ٢ سم. نصالها اخضر الصفحة العليا، ازرق السفلى. اماليجه القنية مأكولة تستعمل اصحاب الحليون || يرغب في الاربة الدبالية للموسم الانتاج والرطوبة.

١٨٣٣٠ - عَشْرُوسُ مَعْلَق

Phyllostachys narmorea (S). Bambou marbré (F).  
نوع من العسوط، يملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ م. سلامياته تنضجية مشوة بالرمادي. أوراقه تطلو من ٧ إلى ١٢ سم. وتعرض من ١ إلى ٢ سم. نصالها حارب الخضر يملو تنضج اغبر يالوت || يرغب في الاربة الرطبة او القليلة الانتاج القنية الرطبة.

١٨٣٣١ - عَشْرُوسُ Isotoma (S).

Isotoma (F). Isotoma (E).  
جنس حشرات قافزة دامت من فصيلة العسوطيات. أنواعه الممرقة قليلة العدد منتشرة في معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة || اجسامها صغيرة تطلو من ٢ إلى ٤ مم. ألوانها سوية اللون منها الاسود والافضر والاطحل. رؤوسها ضخمة. بطنها أحليجية الشكل، مبرقة الحلب. جهازها التنفزي نشيط || أشهر أنواعه العسوط (الافضر) Isotoma (vitrifica) الذي يكثر وجوده على الطحالب ونحسها.

١٨٣٣٢ - عَشْرُوسُ Isotomidae (S).

Isotomidae (F). Isotomidae (E).  
فصيلة حشرات قافزة، دامت وقافزة من رتبة الكهديات. اجسامها وأنواعها الممرقة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة تطلو من ١ إلى ٤ مم. رؤوسها شبه بيضة الشوزن. انفاها وتكثيرها لاطة. حيرتها رقيقة. قربها الاستشارية قصيرة، رباعية الفصل. صدورها ثلاثية الخلفات. تتميز بقصر مقدم الجوشن المدام الحلب. بطنها سداسية السكر مجهزة بجهاز قفزي نشيط. مكانتها ثنائية أو ثلاثية الانسان. قوتها قصيرة تنتهي باظفار مجنحة حادة || أشهر اجناسها العسوط.

١٨٣٣٣ - عَشْرُود Eschara (S).

Eschère (F). Eschara (E).  
جنس حيوانات طليعية من فصيلة المسقاريات. أنواعه الممرقة قليلة العدد منتشرة في أكثر مناطق البحر الأبيض المتوسط || مستعمراتها مغمورة قليلة الفور، من ٣٠ إلى ٥٠ م. تحت سطح الماء. جميعها متشعبة منتفخة المحيطات المائية الطبقات.

١٨٣٣٤ - عَشْرُود Escharidae (S).

Escharidés (F). Escharidae (E).  
فصيلة حيوانات طليعية مجرية اجناسها وأنواعها المماصرة قليلة العدد مملوها يعيش في بساتين البلاد المعتدلة الحارة || تتميز بفوطها الدائرية وياثكها القدية المنصورة.

١٨٣٣٥ - عَشْرُود Grappellotto, (S).

Grappillon (F). Small bunch of grape (E).  
عشيرة صغير منفردا كان أو متصلا بملاق غيره. ج صلاب.



عسوط



عشيرة راتنجية



عشيرة درامة

انهارها متعدية التجميع . عصارة ساقها تشفى من الجرب وتستعمل في تنظيف الآسنة الصلبة .

### ١٨٣٣٧ - عَصَلَجُ الْغَنَاقِي

*Leontice chrysogonum* (S). *Léontice chrysogone* (F). نوع من الصلج الطبي البري والبرزي . ساقه تظهر نحو ١٥ سم. أوراقه وريشة الشكل، وريقاتها احليجية ثلاثية او خاسية التفصيص ، تصالها بحري اللون . انهاره ال صفار الذهبي يحلها خراج دقيق مسط || انهاره يصل في أيار .



صفودة هزيلة

### ١٨٣٣٨ - عَصَلَجُ الْأَسَد \* ، رَاكَة الْأَسَد ، عَصِيْرَة الْفَكَر ، وَكُف

*Leontice leontopetalum* (S). *Léontice pied-de-lion*, *L. commun*, *Lioune* (F). *Lion's-foot*, *Lion's-turnip* (E). *Echte Löwenblatt*, *Löwentrappe* (D). *Leontice pied de lion* (I). نوع من الصلج وهو نبات عشبي طبي بري يصل نحو ١٥ سم. أوراقه مركبة ثنائية الثليلث . وريقاتها بيضية الشكل ، مقطوعة القاعدة ، مشرطة الطرف . انهاره صفر اللون . انهاره يحصل في أيار .

### ١٨٣٣٩ - عَصَلَجُ الْغَنَاقِي

*Leontice altaica* (S). *Léontice de l'Altaï* (F). نوع من الصلج البري والبرزي . ساقه موقفة ، تملو نحو ١٢ سم. أوراقه مركبة وريقاتها احسية الشكل ليا متساوية القد . انهاره كبريتية اللون كيفية التجميع . انهاره يستمر طوال شهر نيسان .



صلج الاسد

### ١٨٣٤٠ - عَصَلَجُ \* *Felis pardalis* (S). *Ocelot* (F). *Tiger-cat*, *Leopard-cat* (E).

حيوان لاح مفترس من فصيلة السنوريات . موطنه شاسع الاطراف يمتد من امريكا الشمالية الى المكسيك والبرازيل . يألف الاخراج . ملبته الحلياني زويبي || جسمه اخيف القوام رشيقيها بطول من ١٢٥ الى ١٥٠ سم. ما فيه اللذب الذي بطول من ٢٥ الى ٣٥ سم. رأسه مستد الجرم . اذناه صغيرتان ، مستقرتان . عيناه صليتان ، حادتان . ثوبه الى الصهوة الحمراء الحواج يطولها تنير اسود ورقشة سمراء وتتشيز حنطلي . ذنبه عشاري الاطواق السود || مسرعه دجوي يستمر من الغروب الى فحة الليل ومن الصبر العميق الى بزوغ الشمس . يتسلق الاجنبار بشفة السنور ويعود على الارض بسرعة الخيل . قوته الطير والابايل والقردة والحيتان والجوزان || عمل الاثي يقوم نحو ٧٥ يوما تقص في نهايته من جروين الى ثلاثة جراء بقى مع والديها نحو ستة اشهر .



سنان

### ١٨٣٤١ - عَصَلُوج *Brindille* (F). *Spig.*, *Twig* (E).

قصب دقيق قصير امس طوله من ٥ الى ٢٠ سم. ينهي غالبا برعمة او ببرام عمرة || والصلج في الفرف الحريبي هو القصب دقيق على الفس او الفت .

### ١٨٣٤٢ - عَصَلَكَات *Melanthaceae* (S). *Melanthaceae* (F).

فصيلة نباتية من مزدوجيات اللقطة مستقلة العائلات . اجنتها وانولها قليلة العدد جميعها عجيبرات وينبتات معمرة ابيدة الورق .

القتار . ثوبا الى الربة الخضراء تملوها سمة خطوط مزدوجة ، قاطبة ، جزوية . رأسها الى الجوزة القامة . مدنها ورواجها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صلوية تحببها السرعة بين لاه الاجنبار .

### ١٨٣٣٣ - سُقُودَة هَزِيلَة \* ، اَكْرُونِيْكَا هَزِيلَة \*

*Acronycta strigosa* (S). *Acronycta strigosa* (E). حشرة من فصيلة النكتيات ورتبة عرشيات الاجنحة . موطنها الاقاليم المحتلة الحارة من الشرق الاوسط والافد واربدة . فراشها جارسة قويا رقيق الاطار . سرقها تعيش على اوراق العرود والفرخ || جسمها صغير القد ، هزيل . بطول نحو ١٥ سم. يستلها نحو ٢٩ سم. رأسها مستد الجرم ثني اللون . عيناه كبرتان . زباناتها جوشيات . جوشها ويطها الى الثني الاكلت الحواج || رواشها عنه الشقين الى الثني الاكلت تملوها في الزوج الاسامي بقعة قاعدية صفراء واخرى حثارية سمراء وتخلج وتقطب وزرقة الى البني الاشقر . وتملوها في الزوج الخلفي نقطة قاعدية صفراء وبعض الزرقة السوداء . اهدنها الى الصصرة || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الفراشة في ايار وبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تعاطل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتنتج المكن لطعا على الصفحات السفلى من تصال الاوراق || السرعة بطول نحو ٢٢ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل ، مالمس القشار . ثوبا الى اصغلي الاسمر طوله اطواق بنية . رأسها شديد السرة اصفر الحواج . مدنها الى الثني . وراجها الى السرة القامة || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٣٠ يوما يتقضي ضمن صلوية مثبثة الحبلك تسبها السرعة بين لاه الاجنبار او تحت القشور الصلفة .

### ١٨٣٣٤ - عَصَلَسْ ، اُوي *Miel* (F). *Honey* (E).

مادة سكرية يصنعها النحل من رسيق ويضرب الانهار والبار والارواق ليصنعها ويحفظها في تخاريب سلسة خاصة ، يستطيعها من التجمع وينطلي بشفرة رقيقة شفافة شبيهة المادة تمنع عنها الفساد || اجود الصل طمعا وراحة ما كانت عنبه الصسر والخرام ويصا البان والوصج واللبون والبرن والخمخوق والتفل والسنت || اما حصوص تركيه المادي فهو :

فلوكوز وفليزوز	٧٠ ٪
سكاروز	٥ ٪
سياه	٢٢ ٪
موت وديسترين	٢ ٪
مولد صمغية ومعدنية	١ ٪

### ١٨٣٣٥ - عَصَلَج ، عَصَلَج ، نَاجِم *Scion* (F). *Shoot* (E).

الصلج هو القصب الثاني على الطعم قبل بلوغه الحيل . وقد يكون بريا فينسي اذ ذلك ناسجا . ج صاليج || ويقال صلبت الشجرة اذا اخربت عبالجها .

### ١٨٣٣٦ - عَصَلَج *Leontice* (S). *Léontice*, *Patte de lion* (F). *Leontice*, *Lion's-foot* (E).

*Löwenblatt*, *trapp* (D). *Leontice* (I). جنس نباتات عصفولية طية من فصيلة البرباريسيات . انهاره ٦ عساقها معمرة ، سوكها حولية ، أوراقها مركبة .

## ١٨٣٤٩ - حَمِيَّات \* Combrées (F).

سبط من فصيلة الأليليبات، أشهر نباتاته السهم.

## ١٨٣٥٠ - عَمِيْلِيَّات \* Osmylidæ (S).

Osmylidæ (F). Osmylidæ (E).

فصيلة حشرات من رتبة شافانث الأجنسة. أجناسها وأنواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم القطار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها متوسطة الحجم، تكثر فيها الامتدالة. بسطها تراوح من ٣٢ إلى ٤٨ سم. رؤوسها شبه اسطوانية الشكل. عيونها كبيرة جاحطة. قرونها الاستشعارية غشبية مسطيلة. أجناسها مزخرفة ومبججة بالأصفر وهي كبيرة، واحدة، شبه متساوية بين الزوجين. جلونتها الاستشعارية عند الراحة. بطونها شبه اسطوانية الشكل. أثوابها موزونة بالأصفر والأصفر والوردي والأخضر || تألف طبقات مجاري السام حيث تكثر الاحتباب || أنثاها تمتص المكان على نصال الأوراك. يرقاتها مفترمة، قاذبة توشش في البر وفي الماء || أشهر أجناسها السليل.

## ١٨٣٥١ - عَمِشَن \* Périthécæ (F). Perithécium (E).

هو خلاص الثمرة في الفطر وهو الثمرة الفطرية التي تحضن الاوراق. ج. إصان.

## ١٨٣٥٢ - عَسْبُ \* Cere (F). Beeswax (E).

١٨٣٥٣ - عَسْر \* Cere (F). Beeswax (E).

هو الشمع السلي.

## ١٨٣٥٤ - عَسُودَة \* Lepidodactylus (S).

Lépidodactyle (F).

جنس حطام من فصيلة السويديات. أنواعه ١٠. جميعها صغيرة القند، طولها يراوح من ٦ إلى ٧ سم. أثوابها بين الصفار والخضار تملؤها نمشة حمراء أو سوداء. ج. صايد.

## ١٨٣٥٥ - عَسُودَات \* Lepidæ (S).

Lépides (F). Lepidæ (E).

فصيلة حيوانات زسافة من رتبة الظفانيات. أجناسها وأنواعها عديدة. جميعها صغيرة القند، رباعية الأليل، خنثى الإصابع المبطنة. المصممة || أشهر أجناسها السويطة.

## ١٨٣٥٦ - عَسُوس \* Issus (S). Issa (F). Issus (E).

جنس حشرات ناسفة من فصيلة السوسيات. أنواعها المعروفة متوسطة العدد أصغلتها بعض مناطق البلاد الباردة ويعظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة القند، مستطيلة الرؤوس، ناشرة الجناح والعيون، صغيرة القرون الاستشعارية، مسطيلة القوائم المسننة الشائكة. أجناسها مستعرضة، مشبكة، لائحة، شفافة. ألوانها متباينة الألوان، تكثر فيها السمرة على اختلاف مابهاها التي تراوح من الشفافة إلى الحمرة الوردية والخضار الزيتي || قوتها اللع تمصه من الأوراك.

## ١٨٣٥٧ - عَسُوس السِنْدِيَّان \* Issus coleoptratus (S). Issa des chènes (F).

شجرة ناسفة من فصيلة السوسيات. جسمها صغير القند، يطول نحو ٧ م. || رأسها مستطيل، خطها ذرب.

## ١٨٣٤٣ - عَسَلِيَّة \* زَهْرَةُ الْعَسَل Melianthus (S).

Mélianthus (F). Mélianthus, Fleur de miel (F). Melianthus, Honey flower (E). Honigblume (D). Fior di miele, Melianta (I).

جنس ثمرات ونباتات طبية وزيينية من فصيلة السليبات. أنواعها قليلة العدد صغيرة القند. أوراقها متعاقبة مركبة وثرية التجميع. أزهارها غشوية لا تلبس الشكل، خنثىة أفضل الانتماءة، رباعية البتلات والأندية. أحادية البتلة. ثمارها جرداء مفصلة رباعية القرويات، وهي فواحة العرف الطوري، غزيرة الرسح السكري الأصفر اللون الذي يستمر من أبيض حلابات الأمراض الصدرية. اعرف أنواعها وأشهرها ما يتبع.

## ١٨٣٤٤ - عَسَلِيَّة صَغِيرَة Melianthus minor (S).

Mélianthus minora (F).

جنية سبروتية صغيرة تملو نحو ١٥٠ سم. ساقها جرداء أوراقها صغيرة القند. أذنياتها سائلة. وريقاتها ٧ أو ٩ وهي شقيقة النسل للمشاري الحافة. أزهارها غشوية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. لونها إلى السرة الخفيفة يلوها مزاج أسفح || أزهارها يستمر من آب إلى ايلول.

## ١٨٣٤٥ - عَسَلِيَّة مُسَدَّكَة Melianthus comosus (S).

Mélianthus chevelu (F).

جنية صغيرة القند تملو من ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. ساقها مسطحة. أوراقها صغيرة مستعرضة مهدلة. وريقاتها غشوية دقيقة. أزهارها غشوية التجميع، محورية الارتكاز، متدلية. بتلاتها برتقالية اللون، خضر القفاضة حر التجميع || أزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

## ١٨٣٤٦ - عَسَلِيَّة مُسَطَّيَّة Melianthus pectinatus (S).

Mélianthus pectiné (F).

جنية سبروتية تملو من ١٥٠ إلى ٣٠٠ سم. ساقها جرداء جالسة. أوراقها متوسطة القند. أذنياتها سائلة. وريقاتها سنانية النصل، خلية الصفحة السفلى قند من ١٣ إلى ٢١. أزهارها غشوية التجميع، تاجية الارتكاز، أرجوانية اللون || أزهارها يستمر من أواخر آب إلى أواخر تشرين الأول.

## ١٨٣٤٧ - عَسَلِيَّة هَرَمِيَّة Melianthus major (S).

Mélianthus majeure, M. pyramidalis, Pimprenelle d'Afrique (F).

جنية جالسة تملو من ١٠٠ إلى ٢٥٠ سم. ساقها جرداء متعرجة. أوراقها كبيرة. أذنياتها متدنية. وريقاتها لائحة قند ١١ أو ١٣ أو ١٥ نصلها مجري اللون بالغ التسنين. أزهارها غشوية التجميع، هرمية الشكل، تاجية الارتكاز، لونها إلى الحمرة الباقية || أزهارها يستمر طوال فصل الخريف.

## ١٨٣٤٨ - عَسَم \* Combretum (S).

Combret, Chigomier (F). Vegetable-glus plant (E). Langfaden (D). Combrete, Combrato (I).

جنس نباتات حرجية من السمييات وفصيلة الأليليبات. أنواعها نحو ٨٠ منها الأشجار والشجيرات والجنات. أطلابها البلاد الاستوائية. قفروها نحو بعض السواد الصمغية الراتنجية القابضة. بزورها دعنية يستخرج منها زيوت مأكولة.



عسلي



عس



عسود

اللون ، غبراء الجدار . تركيب الارواق في حورها الهائل الذي يستحق الارتباب ضبط التصل وتقلي السنف والانتاج دون ان تسي الى نحو القبات .

١٨٣٦٤ - عُثَيَّة - مُوَكِين - مُوَكِينَة

Nid (F), Nest (E).  
الشئ موضع حفن يشق الطائر يحسنه من دقائق الحطب ويختلف الحشائش واللياد فيذنه في الشجر . وان كان في جبل او عمارة فهو وكر وكن ، اما اذا كان في الارض فهو اخصوص وادي . ج عشاش وأعشاش وعشقة .



عصية البنج

١٨٣٦٥ - عُثَاوِي الْأَقْسَام  
Décatoine (F), Decatome (E).  
ما كان مقسوما الى عشرة اجزاء .

١٨٣٦٦ - عُثَاوِي الْأَوْجُه  
Décadétre (F), Decahedral, Decahedron (E).  
من الحاد ما كان عشاري الابهة او التواءد .

١٨٣٦٧ - عُثَاوِي الْفَصَل  
Décamère (F), Decamere (E).  
ما كان مركبا من عشر فصل .

١٨٣٦٨ - عُثَاوِيَات الْأَرْجُل  
Decapoda (S), Décapodes (F), Decapoda (E).  
اسم تعريفي يطلق على القشريات وعلى الرغويات الرأسيات الارجل الرباعيات الحيشوم .

١٨٣٦٩ - عُثَاوِيَّة الْمِدَكَات  
Décagyna (F), Decagin (E).  
من الازعاج ما كان وزيمها مؤلف من عشر مفاصل .

١٨٣٧٠ - عُثَاوِيَّة ، زُوغُونِيَّة  
Zoogonia (F), Zoogony (E).  
المشاة علم يسمي في تطور الحورن .

١٨٣٧١ - عُثَاوِيَّة : المشاة : اصل السلف .

١٨٣٧٢ - عُثَب  
Essarter (F), To clear, To grub (E).  
اقتلع الاشجار المفسدة من الرية .

١٨٣٧٣ - عُثَبِيَّة  
Herbe (F), Herb, Grass, Wort (E).  
المشقة ج . عشب وأعشاب . كل نبات رغو مومي الساق والارواق اللدورية .

١٨٣٧٤ - عُثَبِيَّة الْأَكْرِيضِي  
١٨٣٧٥ - عُثَبِيَّة الْأَبْرَاقِي  
١٨٣٧٦ - عُثَبِيَّة الْبَرَاكِيثِي  
١٨٣٧٧ - عُثَبِيَّة الْبَلُورِي  
١٨٣٧٨ - عُثَبِيَّة الْبَرَاكِيثِي



عصية مزوانية

١٨٣٧٩ - عُثَبِيَّة الْبَرَاكِيثِي  
١٨٣٨٠ - عُثَبِيَّة الْبَرَاكِيثِي

عصاها كبريتان . زوانها قصيران ، نحيلون . كوسلها مزواني صغير . حشبتها تماثل الكوسل شكلها وكذا . ظهرتها يرمي الشكل ، لاحت ، شارب . بطنها غروطي . قوامها مسنة الظنايب الخلفية || ثوبها الى الحطلي الاضخم يملو تنسج كسني في الرأس والكوسل والحلقة والظهوران والقوام . بطنها الى الحطلي الاسمر || تألف حراج السديان والتمس . قوامها نسج الارواق .

١٨٣٥٨ - عُصَيَات

Isidae (S), Isalids (F), Isidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة متجانسات الاجنحة وطبقة فضليات الجناح . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اصقاع العالم || اجسامها صغيرة ، لاقابية الشكل ، متصلة التصلب . رؤوسها غليظة ، مخرمة المقدم . اطرافها ذرية متصلة الطول . كوسلها صغيرة ، شبه هربية الشكل ، جالسة التواجد . اجنحتها مشبكة ، ملونة ، لاحقة . بطونها غروطية الشوزن او سنالية . قوامها قوية ، مستطيلة ، فضلية الظنايب الخلفية المسنة الخلفان الخارية || اشهر اجناسها الموس .

١٨٣٥٩ - عُصْف

Corad (F).  
نمت تعريفي توصف به البزوغ الشديدة السوية .

١٨٣٦٠ - عُصَيَات

Eurytomidae (S), Eurytomids (F), Eurytomidae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة غشائيات الاجنحة الصورة اجناسها وانواعها قليلة العدد منها النافعة التي تتطفل على الحشرات الضارة ومنها المانسة للزنية التي تتطفل على التيجليات || حشراتا صغيرة القند تطول من ٢ الى ٤ مم . اجسامها مستطيلة . بطنها ضامرة . مرزاتها فضية . زوانها الانيرة عثرانية الشكل || اشهر انواعها يصوم التيجليات .

١٨٣٦١ - عُصِيل

Verge de l'éléphant (F), Verge of the elephant (E).  
السول : قضيب القليل ج . عضل .

١٨٣٦٢ - عُصَيَّة الْبَنْج

Pseudomonas tabaci (S), Feu sauvage, Feu rouge, Rouille brune (F), Wild fire, Wild fener (E).  
وصم يكثير في فتاك سريع المبدؤ يترى البنج في الماشات وفي الحقل || الامال الواسم بكثيره في قضيبية اسطوانية دقيقة ، طولها يراوح من ١٤٠ الى ٢٨٠ ميكرون وعرضها من ٥٠ الى ٧٥ ميكرون تحمل في احد طرفها ثلاث حديدات سولية يراوح طولها من ٢٥٠ الى ٧٠٠ ميكرون || مظهره الخاريسي ، على اتصال الارواق ، يقع مستديرة لا قياسية الحجم تبسو صفراء اللون ثم تتحرف الى السرة وتنتهي باللباس || يكثف وقتا يتطير رية الماشات ويظهر البذار يحملوه القمل او الحقل ينزلات القفصة المركز ١ / ١٠٠ على ان لا تفوق مدة تقع البذار في الحقل ١٥ دقيقة .

١٨٣٦٣ - عُصَيَّة مُزَوَانِيَّة

Pseudomonas angulata (S), Maladie des taches anguleuses, Feu noir (F), Angular leaf spot, Black fire (E).  
وصم يكثيري شديد الريح قليل الانتشار يركب البنج في الحقل بعد دخوله في الدور الثاني من شامعه || مظهره الخاريسي يقع لا قياسية الحجم . مزوانية الشكل ، موداه

اللبن، خلية اللحم. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ايليجي الشكل، سنن الحافة، خلي البشرة على صفحتيه. ازهارها عابية اللون، ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

#### ١٨٣٩٥ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة \*

*Potentilla pulcherrima* (S). *Potentilla superba* (F). عشبة معمرة تطلو من ٣ الى ٥٠ سم. ساقها منتصب. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات. نصلها ابيض الصفرة السفل، اغضر العليا. ازهارها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ١٨٣٩٦ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصُّفْيَةِ \*

*Potentilla argrophylla* (S). *Potentilla argrophylla* (F). عشبة معمرة تطلو من ٢٠ الى ٤٠ سم. اوراقها السفل ثلاثية التركيب، ووريقاتها خلية البشرة، نضية اللون، ناعمة للمس. ازهارها صفراء اللون، قطرها يراوح من ٢ الى ٤ سم. || ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

#### ١٨٣٩٧ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَبِيرَةِ الزَّهَر

*Potentilla grandiflora* (S). *Potentilla à grandis fleur* (F). عشبة معمرة مبلولة تطلو من ١٥ الى ٤٠ سم. اوراقها مركبة ثلاثية. ووريقاتها مسنة الزام الثالث والرابع. ازهارها غنية التجميع، زنادها يحمل من زهرتين الى خمس كبيرة اللثة قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفرة المابقة الالامسة || ازهارها يستمر من تموز الى آب.

#### ١٨٣٩٨ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْكَلْبِيَّة

*Potentilla fruticosa* (S). *Potentilla frutescens* (F). عشبة لينة معمرة تطلو نحو ١٠٠ سم. ساقها خلية اللحم طحلاء اللون. اوراقها خاسية او سباعية الوريقات الالابيلية الشكل. نصلها خلي البشرة، ناعم للمس، ازهارها خضية اللون. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

#### ١٨٣٩٩ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُتَشَبِّهَةِ

*Potentilla ambigua* (S). *Potentilla ambigua* (F). عشبة معمرة متسيلة الساق. اوراقها ثلاثية التركيب جامدة التصل. ووريقاتها الوسطى مستطيلة مسنة الزام الاخير. ازهارها فردية، طويلة الزناد، صفراء اللون. ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

#### ١٨٤٠٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْمُتَشَبِّهَةِ

*Potentilla erecta* (S). *Potentilla dressée* (F). عشبة معمرة زبده تطلو من ٣٠ الى ٦٠ سم. ووريقاتها خاسية مستطيلة، نصلها جامدة الصفرة مزبر البشرة السفل. ازهارها الى الصفار الكبريتي الزاهي || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٨٤٠١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الرَّوْمِيَّة \*

*Potentilla anserina* (S). *Potentilla anserina*, *Herbe aux oies* (F). عشبة طيبة معمرة مبلولة ترطب في المراتع الغلظلية الرطبة. تطلو من ١٥ الى ٥٠ سم. ساقها منبسطة تفرش عند كل عقدة. اوراقها ثلاثية السفل المتقابل. ووريقاتها تعد من ١٥ الى ٢٥ نصلها خلي البشرة، غضي المواجه. ازهارها كبيرة اللثة قطرها نحو ٤ سم. لونها الى الصفار الكبريتي الباهت || ازهارها يستمر من ايار الى تموز.

#### ١٨٣٨١ - عُشْبَةُ الْجَلْدِيَّة

هي الشهيرة البلورية، اطباها.

#### ١٨٣٨٢ - عُشْبَةُ اخيلينيون

هي اخيلينيون، اطباها.

#### ١٨٣٨٣ - عُشْبَةُ الدَّابَّاحِين

هي الدربيل، اطباها.

#### ١٨٣٨٤ - عُشْبَةُ السَّعْ

نبات من القفة، اطباها كرد.

#### ١٨٣٨٥ - عُشْبَةُ الطَّحَل

هي الطحريقين الاسفر، اطباها.

#### ١٨٣٨٦ - عُشْبَةُ السَّلَق

هي الزنطيلة، اطباها.

#### ١٨٣٨٧ - عُشْبَةُ الْقَرَارَه

هي حشيشة القرقراء، اطباها.

#### ١٨٣٨٨ - عُشْبَةُ السَّمَل

هي المائق الجبل، اطباها.

#### ١٨٣٨٩ - عُشْبَةُ الْهَوَكَة

*Herbe aux décus* (F). عشبة يقال انها طيبة تدر البول، تدعى حشيشة القمر الحولية، اطباها.

#### ١٨٣٩٠ - عُشْبَةُ الْقَوَى ، بُونْتِيَلَا ، بُونْتِيَلِين

*Potentilla* (S). *Potentilla* (F). *Potentilla* (E). جنس نباتات عشبية طيبة مدادة معمرة من الفروليات. انواعه عديدة. اوراقها مركبة، ازهارها متبيلة الزناد، غظظة التجميع. مظهرها يري وتضبي وبضها طيب يستعمل في عدة مستحضرات وعلاجات مقوية || اصرف انواعها واشهرها ما يتبع.

#### ١٨٣٩١ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْاَبْيَكَة

*Potentilla speciosa* (S). *Potentilla élégante* (F). عشبة زلفية معمرة تطلو من ١٠ الى ٣٥ سم. اوراقها ثلاثية التركيب. ووريقاتها مزفيرة للتصل المسن الحافة، الاغضر الصفرة العليا، الحلي السفل النضية المواجه. ازهارها ثلاثية او خاسية التجميع، متوسطة اللثة، يضاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

#### ١٨٣٩٢ - عُشْبَةُ الْقَوَى الْيَهْدَاء \*

*Potentilla alba* (S). *Potentilla blanche* (F). عشبة معمرة جبلية مبلولة. ساقها غيلة تطلو نحو ٢٠ سم. اوراقها السفل خاسية او سباعية التركيب. ووريقاتها خلية التصل تمام المسن الحافة. ازهارها نورية التجميع، طويلة الزناد، بتلاتها يرتقالية القاعدة والوسط، حابية الاطراف || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار.

#### ١٨٣٩٣ - عُشْبَةُ الْقَوَى الدَّمَوِيَّة

*Potentilla acroanguinea* (S). *Potentilla rouge sang*, *P. sanguine* (F). عشبة معمرة زبذية لاعضاء تطلو من ١٠ الى ٦٠ سم. ازهارها مكبية دموية اللون كبيرة اللثة قطرها نحو ٤ سم. ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول.

#### ١٨٣٩٤ - عُشْبَةُ الْقَوَى الصَّخْرِيَّة \*

*Potentilla rupestris* (S). *Potentille des rochers* (F). عشبة معمرة مبلولة تطلو من ٣٠ الى ٥٠ سم. تربيد بين الصخور وعلى اطراف الاراضي الملاحية. ساقها جرد



عشبة القوي البيضاء



عشبة القوي الصفراء



عشبة القوي الناعمة



عشبة القوي النضية



عشبة القوي الرومية

## ١٨٤٠٢ - عُشْبَةُ الْمَسْك \* ، أَدُو كَسَا

*Adoxa moschatellina* (S). Adoxa, Herbe au musc, Moscatella (F). Hollow-root, Moschel, Musk-root (E). Echtes Biskankraut, Moschus-Kraut (D). Erba del muschio, Mucastella (I).

نبات عشبي طلي، جلومري، وحيد الجلس والفرع من فصيلة الفويات، وأوراقه قرصية الانتشاب، مركبة، مستطيلة الماعيل المنصبة، ثلاثية القنصوص، نصلها مفرد المنصبة الحولية البثرة. أزهاره نورية التجميع مستطيلة الزناد، خالية البتلات الوردية اللون || جلومه ولوراته وأزهاره فواحة الرائحة الطرية المسكية وهي طيبة جزيلة النفع مضادة للشيخ.

## ١٨٤٠٣ - عُشْبَةُ الْمَن \* ، غِيَّوَرِيَا

*Glyceria* (S). Glycérie (F). \* نباتات عشبية من فصيلة النجيليات. أزهاره نحر ٣٠ سوقها منصبة سبواه تنهي ببطا كل سبيلة. أوراقها صفية الشكل كآكارق المخططة. منها أنواع عطرية مزروعة غنية بالمواد النشوية ومنها أنواع منقوعة بالقه لادن المسال الذي يذوق سنانها عند انتصاف النهار في أحر أيام الصيف فيترك عليها مادة لزجة سكرية الهضم مأكولة.

## ١٨٤٠٤ - عُشْبَةُ الْهِنْدِيَّةِ فِي الْجَبَلِ الْعَلِيِّ ، اَطْلِبْ .

## ١٨٤٠٥ - عُشْبَةُ بَرِّيَّةٍ فِي الْأَرَالِيَةِ الْعَالِيَةِ ، اَطْلِبْ .

## ١٨٤٠٦ - عُشْبَةُ حَمْرَكَةٍ فِي أَبُو غلام ، اَطْلِبْ .

## ١٨٤٠٧ - عُشْبَةُ مَقْدَمَةٍ فِي الْقَيْسِيْنَ ، اَطْلِبْ .

## ١٨٤٠٨ - عُشْبَةُ هِنْدِيَّةٍ فِي الزَّيْتَانِ ، اَطْلِبْ .

## ١٨٤٠٩ - عُشْبِيٌّ ، حَشِيشِيٌّ

*Herbaceous* (F). *Herbaceous* (E).

تمت تسميته يطلق على النباتات ذات السوق اللينة التي تكون صلابها دين صلابة النباتات الخشبية.

## ١٨٤١٠ - عُشْبَةٌ

الشج : الشجرة النيقة القصبان المتفرقة .

## ١٨٤١١ - عُشْبَقَار \* ، اَسْتَارْتَا

*Asteris* (S). *Asteris, Astarté* (F). *Astarté* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم وفصيلة المشتريات. أزهارها المربعة ٢٠ منها النارية والماصرة . الماصرة منتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة ، يكثر لها الشكل السيلوي . مصاروبها متساوية الأطراف ، دقيقة التسنين الحادتي ، ويلجا تحزير طويي تحيل يستمر حتى الفقة . ماعيا ثنائية ، طليقة ، مستطيلة ، الأوباء زاهرة ، يكثر فيها الأحمر والوردي || تمشي عذوبة في الروال المعمرة باللاء.

## ١٨٤١٢ - عُشْبَقَارِيَّات \* ، اَسْتَارْتِيدَا

*Astartidés* (S). *Astartidés* (F). *Astartidés* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم . أحياها وأزهارها قليلة العدد ، منها النارية التي تمتد متحيراتها من الأراضي السيلورية إلى الثالثة ومنها الماصرة المنتشرة في جميع بحار البلاد القاروة || أصدانها صلبة ، صيرانية الشكل ، متساوية المصارع ، دقيقة التسنين الحادتي || أعراف أحياها وأزهارها المشتار.

## ١٨٤١٣ - عُشْبَرَكَةٌ \* ، دِيَانِلَلَا

*Dianella* (S). *Dianella* (F). *Dianella* (E).

جنس نباتات عشبية معمرة جادحة من فصيلة الزنجيليات . منها نباتية وبعض مناطق استرالية . أوربها راقية . أوراقها متعاقبة ، ثنائية الصف ، غيبطة الشكل ، أبيض ، داخلة الأعضار . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها متدة الحجم ، سداسية البتلات النبطية النجبة الشكل ، البتنية المروق . سداسية الاسدية المنصبة الأطراف || تزود للزيت . قروب في الأتربة الملوحة الاندماج للوراة العناصر الغذائية والمضوية || أشهر أنوارها المعروفة الأربعة التالية :

## ١٨٤١٤ - عُشْبَرَكَةٌ تَسْمَانِيَّةٌ \* ، دِيَانِلَلَا

*Dianella tasmanica* (S). *Dianella tasmanica* (F). نوع من العشبة . منها جزيرة تسمانية . طول من ١٢٠ إلى ١٥٠ سم . أوراقها طول من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . وتعرض من ٢٠ إلى ٢٥ سم . أزهارها حثولي التجميع ، كبير الله ، كثير الفروع والقص . أزهارها إلى الزرة الأزرقية . ثمارها حنينة ، زرقاء اللون ، متدلة || تنويرها صلي .

## ١٨٤١٥ - عُشْبَرَكَةٌ زَرْقَاء \* ، دِيَانِلَلَا

*Dianella caerulea* (S). *Dianella bleue* (F). نوع من العشبة . منها بعض مناطق استرالية . طول من ٥٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها كثيرة العدد . صفية الشكل ، طول من ٢٥ إلى ٣٠ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع قليل الانفرج . قصير القنوع . أزهارها إلى الزرة الماعية الجسلة . ثمارها ديبية متدلة || تنويرها يستمر من آذار إلى حزيران .

## ١٨٤١٦ - عُشْبَرَكَةٌ صَقِيلَةٌ الْوَرَق \* ، دِيَانِلَلَا

*Dianella laevis* (S). *Dianella à feuilles lisses* (F). نوع من العشبة . منها بعض مناطق استرالية . طول من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها صفية الشكل ، صقيلة المنصل ، شديدة الخصار ، طول من ٣٠ إلى ٤٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم . أزهارها حثولي التجميع ، حري الشكل . أزهارها إلى الزرة الساجنية . ثمارها حنينة ، ليلكية اللون ، متدلة || تنويرها ديبية .

## ١٨٤١٧ - عُشْبَرَكَةٌ مُنْقَعَةٌ الْوَرَق \* ، دِيَانِلَلَا

*Dianella revoluta* (S). *Dianella à feuilles enroulées* (F). نوع من العشبة . منها استرالية . طول من ٦٠ إلى ٩٠ سم . أوراقها صفية الشكل ، جامدة التسج ، مالة الخفاف ، ملقة ، طول من ٧٠ إلى ٨٠ سم . وتعرض من ٦ إلى ٨ سم . أزهارها حثولي التجميع . أزهارها إلى الزرة السيلورية . ثمارها حنينة زرقاء اللون || تنويرها يستمر من تموز إلى آب .

## ١٨٤١٨ - عُشْبَةٌ \* ، سِيْوَالِيَا

*Séquoia* (F). *Gang, Crew, Set* (E).

الشج ما يحل بالإنسان من طة سبها مرض أصابه أو علية جراحية أجريت له .

## ١٨٤١٩ - عُشْر \* ، دِيْمَا

*Dime* (F). *Tithe, Dime* (E). نوع من جزء من شجرة يقطع من انتاج الأرض ويذوق إلى ولي الأمر غريبة من الأرض .



عشبة المسك



عشبة المن



عشبة تسمانية

الزهرية رجلة مستطيلة || ازهارها يستمر من آب ال  
تشرين .

١٨٤٧٨ - **عُثْرَة مَبْدُولَة \*** ، **قُوس مَسْكَن**  
Hedera helix (S). Lierre commun (F). Hedera, common ivy (E). Gemeiner Efeu, Epheu (D). Edera, Ellera, Verna, Verola, Vite nera (I).

جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٢ الى ٣٠ م .  
اوراقها لا تليسه الشكل ينقلب لها الاطليسي . مالحق  
ازهارها واحدا خلية البشرة طملاء اللون . ثمارها نوية  
تجمل ال السرة المابقة || ازهارها يستمر من ايلول ال  
تشرين .

١٨٤٧٩ - **عُثْرُون** .  
Arbre sec (F). Dry tree (E).  
العثرون هو الشجرة اليابسة .

١٨٤٣٠ - **عُثْرِيَّات ٥** .  
Pyrénomycètes (F).  
فضيلة لطور مجهرية تنتمي ال مرتبة الفطريات ورتبة  
الزقيات تتميز بمق جانب من التكاثر او بالانقلاب بوع  
واحد من الزق وذلك بعد تمام ادراك . اما اصنافها  
بسيطة ولا تكون فردية او مركبة || اجناسها وانواعها  
عديدة يجسمها ثلاث عائل وهي السخاقيات والسنانقيات  
والباقيات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي**  
Cri de l'hyène (F).  
Cry of the hyena (E).  
العثري : صوت الضبع .

١٨٤٣٧ - **عُثْرِي** \*  
Agapornis (S).  
Agapornis, inséparable (F). Love-birds (E).  
طائر وصيد إجلس والتزوج من زنايف البهجات . موطنه  
يشمل جميع مناطق افريقية الوسطى وجزيرة مدغشكر ||  
يألف القفص لكنه لا يعيش الا ذكرا وانثى . تربيته  
منتشرة في جميع انصار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة لانه  
يشي البرد || جسمه صغير اللد ، ذلق القلب والجناح ،  
مستفاد عريض وقصير . لونه جميل الالوان المتراكبة فيه  
الاسمر والاخضر والاصفر والبنفسج والقرنبي والمفلوف  
والخمس والبنار الناصجة || الانثى تدين عشها في تجويف  
جبلع . حشيتها تزاوج من ٣ ال ٤ بيضات ترخها نحو  
١٥ بيضا .

١٨٤٣٣ - **عُصَا الذهب** هو قصب الذهب ، اطله .

١٨٤٣٤ - **عُصَا الزاي**  
Houtetia (F). Crook (E).  
مصا رأسها اجوف كالملقعة يستعملها الزاي لقلع الحجارة .

١٨٤٣٥ - **عُصَا الزاي**  
هي القرد نبات بري وتربي ، اطله .

١٨٤٣٦ - **عُصَا الزاي الزياء** هي الدار ، اطله .

١٨٤٣٧ - **عُصَا هِرْمِس** هي الحلوب ، اطله .

١٨٤٣٨ - **عُصَا عقوب** هو القربونه السبيلة ، اطله .

١٨٤٣٩ - **عُصَاب** ، **مُسَوَاك الزاوي** ، **شُطْرَج**  
Lepidium (S). Passerage (F). Dittender (E). Senf-  
kraut (D). Lepidlo, Peparella (I).  
جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة الصليبيات .

١٨٤٣٠ - **عُثْر**  
Calotropis (S).  
Calotropes, Calotropis (F). French cotton, Mular  
plant (E). Wehre mudarypflanz (D). Calocro (I).  
جنس نباتات برية طيبة من فصيلة الصقلابيات . انواعها  
عديدة منها الاشجار والشجيرات والجنات . لحاء جلورها  
مقوية ومرونة . اصلها الجزيرة وبعض المناطق الاسيوية  
والافريقية الحارة || جلد عته في القاموس : « العثر  
شجر فيه حراق لم يقتنع الناس في ايجده منه ويحش في  
الحقاد ويخرج من زهره ريشه سكر وفيه مرارة » . وقال  
ابو حنيفة : « العثر من الضياء وهو من كبار الشجر .  
وله صمغ حلو وهو عريض الورق صلبا في الساء وله  
سكر يخرج من شبيه وبواضع زهره » . وفي الصالح :  
« وعرته نفاضة كنفاعة القناد الاسفر » || الواحدة  
عثرة والجمع عثر وعثرات .

١٨٤٣١ - **عُثْرِي** يعرف باي سلام ، اطله .

١٨٤٣٢ - **عُثْرَكَة** .  
Préfoliation, Vernation (F).  
Vernation (E).  
هي الترتيب للتعمر اي انتظام الاوراق داخل البرمة  
الورقية .

١٨٤٣٣ - **عُثْرِيَّات ٥**  
Circosées (S).  
Circosées (F). Circosées (E).  
فضيلة نباتية ، كانوا يصورتها في التصنيف السابق  
كسبب من فصيلة الاعدريات ، وهي من ذوات الفلقتين  
عديدة القعالات . اجناسها اودية وانواعها نحو ٣٦ ||  
نباتاتها عشية ، منها الحولية والممررة والممررة ، اصلها  
بعض مناطق البلاد المعتدلة الحارة . اوراقها بسيطة ،  
متعاقبة او متناوبة . ازهارها خشوية رباعية الكثر .  
ازهارها سبيل التجميع ، تاجي الايتكاز .

١٨٤٣٤ - **عُثْرِي**  
Décimal (F). Decinal (E).  
لست تعري ي يطلق على الفليات والسابات المرتكزة على  
عشرة .

١٨٤٣٥ - **عُثْرَكَة**  
Hedera (S). Lierre (F). Ivy (E).  
جنس نباتات معمرة من فصيلة الاراليات . انواعها نحو  
٦٠ جميعها ليفة خشبية عارية اظفورية . معظمها بري  
وبعضها زراعي تربي . سيقانها تتساق بواسطة افطارها .  
اوراقها متعاقبة متعقة جالدية الصل ايده . ازهارها عشوية  
التجميع عويدي او ابلي الايتكاز . ازهارها صغيرة اللد  
بيضاء اللون || اوراقها طيبة ويستخرج من سيقانها عصارة  
صمغية مقوية وهيجية || اشهر انواعها التريينية ما لي .

١٨٤٣٦ - **عُثْرَكَة كَلَشِيد**  
Hedera colchica (S).  
Lierre de Colchide (F).  
جنية جادسة ليفة متسلقة تطول من ٥ الى ٢٥ م . اوراقها  
ثلاثية او خماسية التفصيص ، نصلها يطول نحو ١٢ سم .  
ويبرز نحو ١٠ مالحق ازهارها واحدا كثيفة الحرائش  
الاصفر اللون || ازهارها يستمر من تموز ال ايلول .

١٨٤٣٧ - **عُثْرَكَة كَنَارِيَة**  
Hedera canariensis (S). Lierre des Canaries (F).  
جنية سروية ليفة متسلقة تطول من ٣ الى ١٥ م .  
اوراقها ثلاثية او خماسية التفصيص ، كبيرة اللد ، تلبية  
الشكل تعرض من ١٥ الى ٢٠ سم . مالحق ازهارها واحدا  
سرخسية اللحاء ، نجمة الحرائش الطملاء اللون . عشيقها



عُثْرَة مَبْدُولَة



عُثْر





عُصَاب غُرَيْص الزَّرْف

1٨٤٤٧ - عُصَابَة مَعْدِيَّة  
Suc gastrique (F).  
Gastric juice (E).  
سائل حامضي التركيب ، يحوي بعض الصفات  
والكلوريدات القلوية والمضخات ، يفرزه غشاء المعدة ،  
يصلح خاصة لحضم المواد الآسية .

1٨٤٤٨ - عُصَابَة مِعْرِيَّة  
Suc intestinal (F).  
Intestinal juice (E).

سائل حامضي التركيب ويختلف متابة على المائدة  
في حضم الطعام واستخلاص موائه البنائية .

1٨٤٤٩ - عُصَابَة نَوِيَّة  
Suc nucléaire (F).  
Nuclear sap (E).

راجع سائل نووي .  
1٨٤٥٠ - عُصَابَة  
Balles, Ecales (F). Shell, Pod (E).  
هي مجسم الصفات والصفات التي تغسل من الحلب  
عند الدرس .

1٨٤٥١ - عُصَابَة  
Ospheya (S).  
Ospheya (F). Ospheya (E).

جنس حشرات من فصيلة التهرقيات ودية عذبات  
الاجنحة . انواعها المعروفة تسع منتشرة في جبال البلاد  
المعتلة الحرارة || اجسامها مستطيلة الشكل ، معتلة  
التيطيط ، تقطع من ٦ الى ٩ سم . رؤوسها صغيرة ،  
مستطيلة الاضلاع . عينها بارزة . تأثيرها متوسطة القته .  
ملاصها الذكية كبيرة . قرونها الاستعمارية غيبية ،  
سنة . كواسلها مقببة الشكل . بطونها مستديرة المخر .  
الحامدا تلصق البطن باستناده الطرف المستدير . قوائمها  
نظيفة . تتميز بانفذاق قوائمها الخلفية الثلاثة الفصاحة .  
اثولها ملونة || الحشرة الجملانة واسعة وشاحنة . اما  
البرقة فشكارة او فاجحة .



عُصَابَة مَوْجَة

1٨٤٥٢ - عَصَابِي  
Scaré pourpré (F).  
سكة بحرية تدعى دقة البحر ، عظمها .



عَصَابِي

1٨٤٥٣ - عَصَابِي  
Céblépyris (S).  
Céblépyris, Echenilleur (F). Céblépyris (E).

جنس طير من الجوارث وفضيلة المذبات . هذه بعض  
مناطق البلاد الانريزية . انواعه قليلة العدد . قوته الحشرات  
اعصها الاساريح والبرقات ولا يصف من القار التناسجة  
من برية وزراعية || جسمه متوسط القته . ذنبه رتاجي  
الريش المستطيل ، الفارق الطرف . بعض ارياش اثنيني  
جسامة التركيب مدنية الاطراف الشاككة || ثوبه متباين  
اللون . رأسه احمر . عساره الى السرة الباقية . سباله اسود .  
ظهور الى الربة الخلفية المواج . جناحاه الى السوداء الاسفم .  
صدره ويملك ويؤخر ظهور وقاعة ذنبه الى الربة الخلفية  
الموجة بالاسود || يدخن عشه في الاشجار القريبة . الاثنى  
تحسن نحو اربع بيضات ترعيها ينشر نحو ثلاثة اسابيع  
تقوم به الاثنى دون الذكر الذي يؤمن لها الطعام .



عَصَابِي

1٨٤٥٤ - عَصَابَة  
Immunologie (F).  
Immunology (E).

علم يبحث في مقاومة الجهاز العضوي الحي لتعديات  
الاورام المختلفة .

1٨٤٥٥ - عَصَابِي  
Immunologique (F).  
Immunologic (E).

نمت ترميزي يطلق على ما هو يخص بالصاعة .

انواعه نحو ٧٠ اصنافا جميع البلاد المعتلة الحرارة .  
جلودها رشيمة مدادة . سبها دقيقة منتصبة . اوراقها  
معتة و متناحية ، فصلها سبك الصفة ، سرح البشرة .  
انزعارها متكرري التجميع ، طرفي الاوتكار . انزعارها  
صغيرة القند يفضا اللون او صفراء . حملها غريزية .  
اشهر انواعه العصاب الغريص الورق .

1٨٤٥٦ - عُصَاب غُرَيْص الزَّرْف  
Lepidium latifolium (S). Grande passerage, Mou-  
tarde des anglais, Cresson à arges feuilles (F).  
Pepperwort, Green mustard (E). Pfefferkresse (D).  
Lepidio ibride, Erba mostarda (I).

نوع من العصاب وهو عشية برية طيبة مدمرة ملحولة في  
الاساكين الظليلة المشية . ساقها تلون من ٤٠ الى ١٢٠  
سم . اوراقها لظلية الشكل . انزعارها صفراء اللون . متناحية  
الطية كثيرة وهي مفادة لاداء الحفر ويقلل انها تنفي  
من الكلب .

1٨٤٥٧ - عُصَابَة ، حَوَقَت  
Heterodon (S).  
Hétéron (F). Heterodon (E).

جنس حيات بيوضة من فصيلة الحششيات عذبات الاغادي  
والسوم . انواعها المعروفة نحو عشرة . اصنافها بعض  
المناطق الحارة من المالكين القديم والجديد || جميعها صغير  
القند اطولها تراوح من ٤٥ الى ٥٥ سم . اثولها مبطقة او  
مبلتة او مجذعة بالاسود والجلوي والاحمر . رؤوسها شبه  
عمرطية الشكل ودية الخاطم . اذناها مسطحة الاطراف ||  
قوتها الحشرات والورديات والضفادع والظباء والقران  
والصافير ويضيها || اعرف انواعها والظهور العصابة  
المتوجة .

1٨٤٥٨ - عُصَابَة مَوْجَة ، حَوَقَت مَوْج  
Heterodon diadema (S). Hétéron diadème (F).

نوع من العصابة . موطنها بلاد الجزائر والمغرب . تألف  
البراري والادغال . قوتها الحشرات والورديات والضفادع  
والقران || جسمها يطول نحو ٥٥ سم . رأسها شبه عمرطية  
الشكل . ربيع الخلم . عينها صغيرتان ، ماحتان . ثوبها  
الى الصبغة يعلوها تمصيب اسود يمتد من الرأس الى طرف  
الذنب . عصبه رأسها تمتد الى الجبهة فتبدو كالتاج .  
يطها الى السرة الخلفية || تتميز من الحيات المفيدة  
الاراذلية .

1٨٤٥٩ - عَصَادَة ، قَرَابَة  
Consanguinité (F).  
Consanguinity (E).

طريقة اصطفاة خاصة باصلاح النسل او بتثبيت بعض  
الصفات الميزة قولها تساهل الاقارب المتشبه دون مراعاة  
درجات النجب .

1٨٤٤٤ - عُصَابَة  
Jus (F). Juice (E).

ما عصر من الماء ومخلط الاعضاء النباتية .

1٨٤٤٥ - عُصَابَة التَبِغ  
Jus de tabac (F).  
Juice of tobacco (E).

نقع اوراق التبغ وهو غني بمادة التوكينون المتمصر القلوي  
الساكن في التبغ . يشتمل في مكافئة الحشرات اعصها  
الارق .

1٨٤٤٦ - عُصَابَة خَلِيَوِيَّة  
Suc cellulaire (F).  
Cell-sap (E).

Plante volubile (F). **عَصْبِيَّة ، عَصْفِيَّة** - ١٨٤٧٣

Voluble plant, Twining plant (E).

كل نبات عارض يلتف على غيره .

١٨٤٧٤ - **عَصْبِيَّة السُّوس** هي الشَّم ، اطبخه .

١٨٤٧٥ - **عَصْبِيَّة الثَّلَب**

هي الميثاريقون المعروف ، اطبخه .

١٨٤٧٦ - **عَصْبِيَّات الجَنَاح** Neuroptera (S).

Névroptéroïdes, Névroptères (F). Neuroptera (E) Netzflügler (D).

طريقة حشرات من شعبة الحسدليات تشمل ثلاث رتب وهي سادات الاجنحة وشارفات الاجنحة وشبكيات الاجنحة . اما فصائلها وابناسها وانواعها فكبيرة العدد جميعها من الحشرات الثلاثة || تحليتها : حشرات تامة التطور مجتمعة ، اجنحتها غشائية مشابهة . رؤوسها وزناهما كبيرة للقد . استطاعها قارضة . ارساغها خاسية العقل . ملاسها الشعرية جذعة . رقائقها مفرطة قوة التأثير .

١٨٤٧٧ - **عَصْبِيَّة الأَجْنَحَة** Névroptère (F).

Neuropteral (E). هي كل حشرة تنتمي الى طبقة عصبيات الجناح .

١٨٤٧٨ - **عَصِيد** Sperme animal (F).

Animal sperm (E).

المعد هو الشلغ اي افراز اللقد للثناسلية عند ذكور الحيوان .

١٨٤٧٩ - **عَصْر ، عَصْرَة ، عَصْرَة**

Expression, Pressurage (F). Expression, Pressing (E). هو كبس الشيء لاستنزاف مصارته .

١٨٤٨٠ - **عَصْر** Epoque, Période (F).

Epoch, Period (E). أنه من الزمن .

١٨٤٨١ - **عَصْر الجليد** Période glaciaire (F).

Ice age (E).

١٨٤٨٢ - **عَصْر العَنَب** Foulage (F). Fulling (E).

بحق العنب واستخراج مصارته . ومنهم من قال هرس العنب .

١٨٤٨٣ - **عَصْر حَجَرِيّ** Age paléolithique,

A. de la pierre taillée (F). Palaeolithic age (E). هو للزود الطراني ، اطبخه .

١٨٤٨٤ - **عَصْفُوس ، عَصْفُوس** Coccys

طرف الثلب وقد شاع اسناده الى طرف آلة النغم . ج صاصص .

١٨٤٨٥ - **عَصْف ، قَرْف** Ecimage (F).

Topping, Pollarding (E).

اقتطاع بعض فتن النبات انصها للفن الهامة . وعندما تكون الناية من المصنف اقتطاع الاثمار فهو الخصى .

١٨٤٨٦ - **عَصْفَة** Pame (F). Blade (E).

ورقة الزرع وبظم النباتات التجيلية . ج صصف .

١٨٤٨٧ - **عَصْفَة الخَمَر** Bouquet (F). Aroma (E).

ريح الخمر . يقال ان الخمر صفة مستحبة .

١٨٤٥٦ - **عَصَب** Nerf (F). Nerve (E).

هو الوحدة التي يتكون منها الجهاز العصبي في الجسم الحيواني . وظيفته تنظيم وتكوير عمليات الجسم والسيطرة عليها واغضاضها الى مختلف اجساماته . ج اصصاب .

١٨٤٥٧ - **عَصَب** Nervure secondaire (F).

Secondary nerve (E).

هو في اوراق النباتات الوعاء التنسي الواصل ما بين الفرق والثريران . اما ترتيب اوعية الورقة فهو غلب وقرق وصب وشریان || والصعب في رولات بعض الحشرات يحبل المرتبة الثانية بعد الفرق .

١٨٤٥٨ - **عَصَب**

الصعب ضم اخر تراه في الاقح عند غلب الشمس . يقال صعب الاقح اي اخر .

١٨٤٥٩ - **عَصَب** راجع اسطرافالوس نلوس .

١٨٤٦٠ - **عَصَب** Bistournage (F). Castration (E).

طريقة في الحصاد تقتل فيها حيال الحصى ولا تسلفقتصر وتتلاني .

١٨٤٦١ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf ophtalmique (F).

Ophthalmic nerve (E). هو الصعب المختص بالصر .

١٨٤٦٢ - **عَصَب حَرَكِيّ** Nerf moteur (F).

Motor nerve (E). كل صعب اختصاصه الحركة .

١٨٤٦٣ - **عَصَب حِسِّيّ** Nerf sensorial (F).

Sensory nerve (E). هو الصعب الذي ينتمي الى جهاز الحس .

١٨٤٦٤ - **عَصَب حَنَجرِيّ** Nerf laryngé,

N. laryngien (F). Laryngeal nerve (E).

كل صعب نحاس بالحنجرة .

١٨٤٦٥ - **عَصَب رِئَوِيّ** Nerf pulmonaire (F).

Pulmonary nerve (E). الصعب المرتبط بالرئة .

١٨٤٦٦ - **عَصَب سَمْعِيّ** Nerf acoustique (F).

Acoustic nerve (E). الصعب الخاص بجهاز السمع .

١٨٤٦٧ - **عَصَب سَنَحِيّ ، عَصَب نُحْرُوِيّ**

Nerf alvéolaire (F). Alveolar nerve (E).

الصعب الخاص بنخاريب الانسان .

١٨٤٦٨ - **عَصَب شَمِيّ** Nerf olfactif (F).

Olfactory nerve (E). الصعب الخاص بجملة الشم .

١٨٤٦٩ - **عَصَب عَصْدِيّ** Nerf brachial (F).

Brachial nerve (E). الصعب الخاص باليد .

١٨٤٧٠ - **عَصَب قِحفليّ ، عَصَب مُخِيّ**

Nerf crânien (F). Cranial nerve (E).

الصعب الخاص بالجسم .

١٨٤٧١ - **عَصَب مُبْعد** Nerf abducteur (F).

Abducent nerve (E). كل صعب اختصاصه الابعاد .

١٨٤٧٢ - **عَصَب بَصَرِيّ** Nerf optique (F).

Optic nerve (E). الصعب المختص بالعين .

١٨٤٩٨ - عُصْفُورٌ هو نمرط الصباغين ، اطالبي .  
Uriner (F). To urinate (E).  
صسل الكلب والقطب والتعلب : بال .

١٨٥٠٠ - عُصْلٌ Rhododendron (S).  
Rhododendron (F). Rhododendron (E).  
Rosaubum (D). Rododendro (I).

جنس نباتات معمرة برية ويزرع من فصيلة الوردية.  
أنواعه المعروفة نحو ١٧٠ منها الأزهار والشيحيرات والجلبات.  
أوراقها مثقفة جلدية التصلب . أزهارها خماسية البتلات  
بارزة الاسدية الشفوية التجميع الكثرية العدد . واحدها  
صصلة || أشهر أنواعه الزينية ما يتبع .

١٨٥٠١ - عَصَلَةُ الْفَانِيَّةِ Rhododendron collectianum (S). Rosage de l'Afghanistan (F).

جنية سبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها وفروعها  
تشعبة قوية . أوراقها سنانة تطول من ٥ الى ٨ سم .  
نصلها خلي الصفحة السفلى المغطاة اللين . نوربها متفرعة  
الشكل عديدة الأزهار ، قطر الوحدة منها يراوح بين ٢  
و ٣ سم . بتلاتها خلية البشرة ، يبيض اللون . أوراقها  
سطرية الرائحة عند الفكر || أزهارها يستمر طوال شهر  
أيار .

١٨٥٠٢ - عَصَلَةُ الشَّرْقِ \* ، عَصَلَةُ شَيْخِي ، بِقَيْل Rhododendron ponticum (S). Rosage d'Orient (F).

جنية سبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . أوراقها  
سنانة ، خفيفة ، ذرية ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها أخضر  
اللون المايق اصفر المويج . نوربها تضم من ٣ الى ٥ أزهار  
قطر الوحدة منها يراوح بين ٦ و ١ سم . لونها الى  
البنيضجي يعلو توشم اسمر || أزهارها يستمر من أيار  
الى حزيران .

١٨٥٠٣ - عَصَلَةُ الْيَان Rhododendron yunnanense (S). Rosage du Yunnan (F).

جنية سبروتية متوسطة القند تملو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها  
أعليلجية الشكل خفيفة الزغام الاخضر اللذان المذهب ؛ نصلها  
يطول من ٦ الى ١٠ سم . تملو حلق من الحلب الجامد .  
نوربها تضم من ٥ الى ١٥ زهرة قطر الوحدة منها نحو  
٥ سم . لونها الى البياض الساطع تملو مشعة وريدة ورشة  
حرارة || أزهارها يستمر من أيار الى حزيران .

١٨٥٠٤ - عَصَلَةُ بَاهِرَةٍ Rhododendron fulgens (S). Rosage éclatant (F).

جنية سبروتية كبيرة القند تملو من ٣ الى ٦ أمتار . ساقها  
قرواء فناء . أوراقها بيضية الشكل ؛ نصلها يطول نحو  
١٢ سم . صلحت البلى أخضر اللون مالمه اما السفلى  
فحنطية غنية وقلية . نوربها تضم من ١٥ الى ٢٠ زهرة  
أروبانوية اللون ، زائجة المويج ، صغيرة القند || أزهارها  
يستمر طوال شهر أيار .

١٨٥٠٥ - عَصَلَةُ بَحْرِيَّةِ الْوَن Rhododendron hypoglucum (S). Rosage glauque (F).

جنية سبروتية جميلة الشكل تملو نحو ٣٠٠ سم . ساقها  
وفروعها قليلة الزغب . أوراقها أعليلجية تطول من ٥ الى  
٧ سم . نصلها جامد الصلصة ، اسمر البشرة ، بحري  
الخصفر . نوربها سبوانية الشكل تضم من ١٠ الى ١٦  
زهرة متوسطة القند لونها الى البياض المايحي تملو نمشة  
سمرارة || أزهارها يستمر طوال شهر أيار .



عصفرور الشوك الجبلي



عصفرور الشوك الصيني



عصلة الشرق

١٨٤٨٩ - عُصْفُورُ Oiseau (F). Bird (E).

قال حزة : سمى عصفورا لانه يصغر وير . والعصفر اسم  
شامل لجميع الطيور الصغيرة القند . الاثنى صفورة والجسج  
عصائير . قال الشاعر :

« كصفورة في كت مقل يسومها  
سبحان الردى والطفل يلهو ويلعب »

١٨٤٩٠ - عُصْفُورُ الْبَيْتِ Bec-que (F).  
اسم شائع يطلق على بعض العصائير من أكالات التين  
كأبي قلنسوة وغيره .

١٨٤٩١ - عُصْفُورُ الْجَنَّةِ هو الخفاف ، اطالبي .

١٨٤٩٢ - عُصْفُورُ الشَّوْكِ Prunella (S).  
Accenteur (F). Accentor (E).

جنس عصائير صغيرة القند من الجواثم . أنواعه قليلة العدد  
أقربها الى الصلصة تدبر وتسر وزهر وتنبق مع مختلف  
الانواع . اعناقها مشعة بالابيض . اجنسها موشة  
بالاسمر . مناقيرها دقيقة قوية . ارساغها حبيبية الجلد .  
قوتها الحشرات والهورام والبروز البرية || احرف انواعه  
واشهرها ما يلي .

١٨٤٩٣ - عُصْفُورُ الشَّوْكِ الْجَبَلِيِّ \* Prunella collaris (S). Accenteur alpin, Pagot (F).

طائر آبد طولوه نحو ١٨ سم . يتنمر بتجميع جناحه ويبايع  
عنه وطرف ذنبه . يألف الجبال . قوته الحشرات والهورام  
والسناكب والديدان والآبار النووية الحرجية ويزور البتات  
البرية اصحبها الشوك || يطن الى الارض وبين خثايف  
العصفور . الاثنى تضم من ٥ الى ٦ بيضات على مرتين  
في السنة تحضنها بتساربه الذكر من ١٣ الى ١٤ يوما .

١٨٤٩٤ - عُصْفُورُ الشَّوْكِ الصَّخِيرِ \* Prunella modularis (S). Accenteur moucheté, Ac. mouchet, Mouchet chanteur, Traina-bulison (F).

طائر آبد طولوه نحو ١٥ سم . ثوبه عادم البياض تملو  
مشعة صناعية وتوشم اسمر . يألف الحدائق والادغال  
والسباحيات واحراج الصنوبر والتنوب . قوته الحشرات  
على اختلافها والبروز البرية والزراعية || يطن في  
الادغال والأشجار الفتان . الاثنى تضع من ٥ الى ٦ بيضات  
على مرتين في السنة المرة الاولى في أيار والثانية في تموز .  
الحسن يدوم من ١٣ الى ١٤ يوما وقته يشترك فيه الذكر .

١٨٤٩٥ - عُصْفُورُ قَارِي Oiseau-souris (F).  
طائر يدعى الخنثور ، اطالبي .

١٨٤٩٦ - عُصْفُورُ مَائِي Oiseau-diamant (F).  
طائر من فصيلة الصرديات يدعى رنقش ، اطالبي .

١٨٤٩٧ - عُصْفُورُ Organe copulateur (F).  
Copulatory organ (E).  
شوار ذكر كل حشرة مجنحة واخصها الجراد .

١٨٤٩٨ - عَصَلٌ Scorpioide (F). Scorpoid (E).  
نمت تعريفي يطلق على ماكان شكله شكل ذنب العقرب  
بالانواء والتسمين .

من ٣ الى ٤ سم. صفحت العليا لمساء البشرة خضراء اللون .  
صفحت السفلى خلية ، فلسية ، خضراء المواجه . نوربًا خفيفة  
الشكل عديدة الاثمار المستمرة ، قطر الواحدة منها نحو  
١٢ سم. لونها الى الياض النحاس || ازهارها يستمر من  
حزيران الى تموز .

#### ١٨٥١٣ - عَصَلَة صَفْرَاء

*Rhododendron lutescens* (S). *Rosage jaunâtre* (F).  
جنية صبروتية القذ تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورفوها  
دقيقة اوراقها سنائية ذرية . نصلها يطول نحو ٦ سم.  
صفحت السفلى طلاء اللون ذهبي الحراشف المبشرة .  
نوربها تقسم من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو  
٤ سم. لونها الى الصفار الزاهي || ازهارها يستمر  
من شباط الى اذار .

#### ١٨٥١٤ - عَصَلَة صَوْبِيَّة الزَهَب

*Rhododendron lanatum* (S). *Rosage laineux* (F).  
شجيرة صبروتية تملو من ٢ الى ٦ اثمار . ساقها ورفوها  
وافئانها كثيفة الزغب المستطيل العمودي الشكل . اوراقها  
احليجية مقطوعة . نصلها يطول من ١٥ الى ٢٠ سم.  
وهو خالي البشرة على صفحته . نوربها تقسم من ٦ الى  
١٠ اثمار لونها الى الصفار الباهت تملو بمشة خراء .  
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٨٥١٥ - عَصَلَة عَطِرِيَّة

*Rhododendron fragrans* (S). *Rosage parfumé* (F).  
بجلة ممرعة تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم. ساقها ورفوها  
دقيقة . اوراقها صغيرة احليجية الشكل تطول نحو ٢٥ سم.  
نصلها اخضر الصفحة العليا ، اسمر السفلى الفلسية  
الحراشف . نوربها حلقة تقسم من ١٢ الى ١٥ زهرة ،  
قطر الواحدة منها نحو ١٢ سم . مزها مستحب الرائحة  
لونها الى الصفار الباهت || ازهارها يدم طوال شهر  
نيسان .

#### ١٨٥١٦ - عَصَلَة قَاصِرَة \*

*Rhododendron calophytum* (S). *Rosage superbe* (F).  
شجيرة صبروتية جميلة الشكل المزدني المقطوم . تملو من  
٨ الى ١٥ م . عروقها وافئانها مسرة . اوراقها سنائية  
تطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. نصلها ازغب الصفحة السفلى ،  
زغبه ليد التجسيم ، اصفر اللون . نوربها تقسم من  
٥ الى ٧ اثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٥ و ٦ سم.  
لونها الى الحمرة القاتية الزاهية || ازهارها يستمر طوال  
فصل الربيع .

#### ١٨٥١٧ - عَصَلَة كَرْوَلِينِيَّة

*Rhododendron carolinianum* (S). *Rosage de la Caroline* (F).  
جنية صبروتية متوسطة القذ تملو من ١٠ الى ١٥٠ سم.  
اوراقها غروبيلة الشكل قصيرة البقعة المنبهة . نصلها  
يطول من ٥ الى ٧ سم. صفحت السفلى خلية البشرة طلاء.  
اللون . نوربها تقسم من ٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة  
منها نحو ٤ سم. لونها الى الودي اللاح المواجه || ازهارها  
يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥١٨ - عَصَلَة كَلِفُورَنِيَّة

*Rhododendron californicum* (S). *Rosage de Californie* (F).  
جنية صبروتية تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم. اوراقها  
سنائية ، تطول من ٨ الى ١٥ سم. نصلها اطحل الصفحة

#### ١٨٥١٦ - عَصَلَة جَرَبِيَّة

*Rhododendron campanulatum* (S). *Rosage campanulé* (F).  
شجيرة جاحدة تملو من ٤ الى ٥ اثمار . اوراقها بيضية  
الشكل مستديرة الطرفين . نصلها يطول من ٨ الى ١٥ سم.  
وهو اخضر الصفحة العليا اطحل السفلى . نوربها كبيرة  
الثقة ، كثيرة الاثمار الجبرية . قطر الواحدة منها يراوح  
بين ٢ و ٤ سم. لونها الى الياض يطلو موجه ليكي  
وستار احمر || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٨٥١٧ - عَصَلَة خَمَلِيَّة

*Rhododendron villosum* (S). *Rosage velu* (F).  
شجيرة صبروتية صغيرة القذ تملو من ٥ الى ٦ اثمار. ساقها  
ورفوها مالة للحاء . افئانها وافئان اوراقها حلقة .  
اوراقها بيضية الشكل مقطوعة القفاحة ، مدهية القمة .  
نصلها خالي البشرة على صفحته طوله يراوح بين ٥ و  
٨ سم. نوربها تقسم من ٣ الى ٥ اثمار كبيرة القذ لونها  
الى الحمرة البنفسجية || ازهارها يستمر طوال الربيع .

#### ١٨٥١٨ - عَصَلَة ذَهَبِيَّة الزَهَر

*Rhododendron aureum* (S). *Rosage jaune d'or* (F).  
بجلة ممرعة تملو نحو ٥٠ سم. ساقها ورفوها دقيقة ،  
مرطاة للحاء . اوراقها سنائية الشكل تطول من ٦ الى  
١٠ سم. نصلها قلبي الصفحة السفلى . نوربها تقسم من  
٢ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة منها نحو ٢ سم. لونها الى  
الاحمر الذهبي الجليل || ازهارها ديمبي .

#### ١٨٥١٩ - عَصَلَة رَافِعَة

*Rhododendron maximum* (S). *Rosage élevé* (F).  
شجيرة صبروتية جميلة الشكل شاملة الاستعمال التريبي .  
تملو نحو خمسة اثمار . اوراقها خيفة ذرية تطول من ١٥  
الى ٢٠ سم. نصلها اخضر البشرة على صفحته . نوربها  
حلقة الشكل ، حلالية الزناد والمالقي والاعم ، مدهية  
الاثمار ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٤ و ٥ سم. لونها  
الى الودي يطلو توبخ اصفر ومشة خراء ومشة خضراء.  
ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

#### ١٨٥٢٠ - عَصَلَة زَيْتُونِيَّة الْوَرَق

*Rhododendron oleaeifolium* (S). *Rosage à feuilles d'olivier* (F).  
بجلة صبروتية متوسطة القذ تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم.  
اوراقها زيتونية الشكل تطول من ٣ الى ٤ سم. نصلها  
فضي اللون احمر الحار . نوربها تقسم بفس الاثمار  
الودي ، قطر الواحدة منها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم .  
ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

#### ١٨٥٢١ - عَصَلَة سَمِرْنُوف

*Rhododendron Smirnowi* (S). *Rosage de Smirnow* (F).  
جنية جاحدة تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم. اوراقها  
سنائية مدهية تطول من ٧ الى ١٢ سم. نصلها اصفر القلم ،  
غائر الحروق ، خالي الصفحة السفلى ، مالى العليا الزاهية  
الاحمر . نوربها تقسم من ٣ الى ٤ اثمار ، قطر الواحدة  
منها يراوح بين ٣٠ و ٨ سم . لونها الى الودي يطلو  
موجه ليكي || ازهارها يستمر طوال شهر حزيران .

#### ١٨٥٢٢ - عَصَلَة صَغِيرَة الزَهَر

*Rhododendron micranthum* (S). *Rosage à petites fleurs* (F).  
جنية صبروتية صغيرة القذ تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها  
ورفوها غليظة . اوراقها سنائية الشكل ، نصلها يطول



عَصَلَة فَاغِرَة

الشكل، ليد الارتكاز. تكثر في المروج وفي منظم الأراضي الرطبة من أقاليم البلاد المتحدة.

#### ١٨٥٢٦ - عَصَافَةُ الرُّوجِ \*



عصاة مشركة

*Phleum pratense* (S). *Piéole des prés*, *Massacca*, *Timothy* (F). *Cat's tail*, *Herd's grass*, *Timothy grass* (E). *Timotheeschryas*, *Timotheegrass* (D). *Codolina*, *Foco del prati*, *Erba di Timoteo* (I).

لشهر أنواع العسوية وأصبها علفاً وأولها إنتاجاً جيد في المراعي بالاشتراك مع الفحل ويختلف البتات القزنية. يرغب في الأقاليم المعتدلة والأترية الجنوبية الرطبة المعتدلة في الانسجام. تشبه الصفات تتعلم بالأوراق والقمم.

١٨٥٢٧ - عَصِيرٌ ، عَصِيرٌ ، *Juteux* (F). *Juicy* (E). كثير العصير أو الرب.

١٨٥٢٨ - عَصِيرٌ ، عَصِيرٌ ، *Moët* (F). *Musc* (E). سائل سكري يستخرج من بعض الفواكه كالعنب والفاكهة ، الخ.



عصاة الروج

١٨٥٢٩ - عَصِيرُ الْحَمِصِ ، *Verjus* (F). *Verjuice* (E). عصير حب الفول في طوره القشري المغمسي. يستعمل في تخميص الثمرات السكرية وفي صناعة الخلوص. وقد يضاف لك العسل لزيادة حلاوته فها لو دعت الحامية.

١٨٥٣٠ - عَصِيرُ الدُّبِّ ، هو القالب الفالح ، أطليه.

١٨٥٣١ - عَصِيرُ الدَّنِّ ، *Cuvée* (F). *Tubful* (E). هو ما يستخرج البذن من عصير.

١٨٥٣٢ - عَصَافٌ ، *Ligularia* (S). *Ligulaire* (F). جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة المريكبات. أنواعها كثيرة العدد ، منها منظم اصقاع العالم. سقفا فردية متضخمة تنقسم بالأزهار. أوراقها جلدية الانتصاب كبيرة للقد. أزهارها وريثي التركيب سبلي أو مفردية للتجميع. قنابات ثلاثية وسيدة الصف || يرغب في المواقع الرطبة والأترية المنخفضة التركيب الحكي || أعرف أنواعها وأشهرها ما يليج.



عصاف الحجاب

#### ١٨٥٣٣ - عَصَافُ الْحَجَابِ \*

*Ligularia divorum* (S). *Ligulaire des coqueux* (F). نوع من العصاف للممر. ساقه زياة مزخرفة تعلو نحو ١٠٠ سم. أوراقه شبه مستطيلة الشكل طولها نحو ٥٠ سم. وبزهرها ٤٥ سم. أزهارها حشركلي التجميع. وريثاته الزهرية كبيرة للقد حشلية الإقراص يرتقالية اللسان، قناتها براوح بين ٩ و ١٢ سم || تنوره يستمر من آب إلى أيلول.

#### ١٨٥٣٤ - عَصَافٌ بِحَرِّيٌّ ، *Ligularia glauca* (S). *Ligulaire glauque* (F).

نوع من العصاف للممر. ساقه سرسة تعلو نحو ١٥٠ سم. أوراقه قلبية الشكل تعلو ٥٠ إلى ٧٠ سم. نصلها باهت الحضار سميك الصفحة. أزهارها سبلي التجميع وريثاته الزهرية ذهبية اللون || تنوره يستمر طوال شهر تموز.



عصاف بحري اللون

١٨٥٣٥ - عَصَافٌ سِيرِيَّةٌ ، *Ligularia sibirica* (S). *Ligulaire de Sibérie* (F). نوع من العصاف للممر. ساقه سرسة تعلو ١٠٠ إلى ١٥٠ سم. أوراقه كبيرة للقد تعلو نحو ٤٠ سم.

السفل ، أخضر العليا ، مخزن السجج. نوريتها تنم من ٢ إلى ٧ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح من ٥ إلى ٦ سم. نوريتها إلى الإرجواني المنش بالقزوي || أزهارها يستمر طوال شهر أيار.

#### ١٨٥٣٩ - عَصَافَةُ مُسْتَدِيرَةِ الرُّوجِ

*Rhododendron rotundifolium* (S). *Rosage à feuilles rondes* (F). جنبة سبروتية تعلو نحو ثلاثة أمتار. أوراقها مستديرة الشكل قلبية القاعدة تعلو نحو ١٢ سم. وتعرض نحو ١١ نصلها بحري الصفحة السفلى ، أخضر العليا. نوريتها تنم من ٨ إلى ١٢ زهرة ، قطر الواحدة منها نحو ٤ سم. نوريتها إلى الوردية الزاهي || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ١٨٥٤٠ - عَصَافَةُ مُشْرَكَةٌ \*

*Rhododendron hirsutum* (S). *Rosage hérissé* (F). بحلة عسوية للقد تعلو من ٤٠ إلى ١٠٠ سم. مالها وفروعها دقيقة. أوراقها بيضيه الشكل ، مقعولة القاعدة ، مدببة المقصبة الشالكة. نصلها على البشرة تعلو من ١٥ إلى ٣٠ سم. لوله إلى الحضار الزاهي. نوريتها تنم بفسق الأزهار الصغيرة للقد الوردية اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران.

#### ١٨٥٤١ - عَصَافَةُ مُلْتَبِسةٌ

*Rhododendron ambiguum* (S). *Rosage ambigu* (F). جنبة سبروتية كبيرة للقد تعلو نحو ٣٠٠ سم. انتابها ضمية الانتساب. أوراقها أحليجية الشكل ، نصلها طول من ٥ إلى ٧ سم. بشرته بحلة الحضار اللامع تعلوها نمشة خضرة سمراء. نوريتها تنم من ٥ إلى ١٠ أزهار بحسية الشكل ، كبيرة للقد ، قطر الواحدة منها نحو ٥ سم. نوريتها إلى الصغار اللبوري || أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.

#### ١٨٥٤٢ - عَصَافَةُ مُشْتَرَكَةٌ

*Rhododendron insignis* (S). *Rosage remarquable* (F). بحلة كبيرة عمودية الشكل تعلو من مترين إلى ستة أمتار. أوراقها سنائية تعلو من ٨ إلى ١٢ سم. نصلها جميل الحضار اللامع البشرة. نوريتها تنم من ٨ إلى ١٠ أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم. نوريتها إلى البيضاء الموشج بالوردية || أزهارها يستمر طوال فصل الربيع.

#### ١٨٥٤٣ - عَصَافَةُ مُهْدَبَةٌ

*Rhododendron ciliatum* (S). *Rosage cillé* (F). بحلة كبيرة للقد سبروتية تعلو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أوراقها سنائية الشكل ، خفيفة النصل ، مدببة الزام الأخير ، طولها نحو ٥ سم. صفحتها العليا ناعمة البشرة الأخضر اللون. صفحتها السفلى غنية ، مبرقعة ، مهدبة ، طحله اللون. نوريتها تنم من زهرتين إلى ست أزهار ، قطر الواحدة منها براوح بين ٤ و ٥ سم || أزهارها يستمر طوال شهر نيسان.

١٨٥٤٤ - عَصَافٌ ، *Vent violent* (F). *Strong gale* (E). العصف والصفوف : الريح الشديدة.

#### ١٨٥٤٥ - عَصَافَةٌ ، ذَيْلُ الْفُلِّ

*Phleum* (S). *Piéole*, *Phéole* (F). *Cat's-tail grass* (E). جنس أعشاب مرعوية برية وزراعية من فصيلة النجيليات، أنواع المعروفة ١٠ بحجمها شتلية. سقفا دقيقة متضخمة. عصفها سنائي مستطيل. أزهارها سبلي التجميع ، اسطواني

ذهبتا الحلقة المطوقة بالابيض . زعنفتها الظهيرية مستطيلة قاطبة . زعنفتها الشرسية خط من المناخس اللدية . زعنفتها اللبالية حلالية الطرف || لحها متوسط الصنف ، مأكول .

#### 1٨٥٤٥ - عُصْبَاكَة ، أَلْبَيْدَاد Alidade

جهاز التشخيص يستعمل في الملساة وهو مركب من مسطرة لها مصوّتان شاقوليتان موجهتان بالتوازي مع حافة طرفها .

#### 1٨٥٤٦ - عُصْأَر Loranthus schimperii (S).

نوع من الحاصل يزرع للزّين . راجع حصال .

#### 1٨٥٤٧ - عُصَاة

النضار: كل شجر يعظم وله شوك . وما صغر من شجر الشوك فهو الغص . وما ليس بغصّ ولا عصاة من شجر الشوك ، فالشكامي والحلاوي والحاذي والكتب والساج . الواسعة عصاة وضّية .

#### 1٨٥٤٨ - عُصَاكَة Organisme (F).

هي الجهاز الضوئي الذي يميز الاجسام الحية من الجاهل .

#### 1٨٥٤٩ - عُصَايِي ، مُعَقِّي ، مُعَقُون

Organisé (F). Organie (E).

1٨٥٥٠ - عُصْبُ البشب : هو المبل عند طلوع قرنه .

#### 1٨٥٥١ - عُصْبَة \* ، عُصْبَةُ الْيَسْكَار

Silphium (S). Silphe, Plante au compas, Silphide, Silphie, Silphion (F). Compass plant, Bastard chrysanthemum, Polar plant (E). Geschlitzte Tassenpflanze (D). Silfo (I).

جنس نباتات جنية زينة ممرّة من فصيلة المركبات . انواعه ١٢ ، اصلها المالح . سيقانها دعامية صابرة وانجيبة . اوراقها ضيقة التجميع . ازهارها رؤسية كبيرة القذ صفراء اللون . زهورها مفلطحة ومجمدة || اعرف انواعه واشهرها ما يلي .

#### 1٨٥٥٢ - عُصْبَة ثَلَالِيَّة الْوَرَق

Silphium trifoliatum (S). Silphe à feuilles ternées (F).

جنية ممرّة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها اسطوانية تتميز بنفارة مادتها الراتنجية . اوراقها ضيقة ثلاثية التركيب ، مراءاة الشكل ، قليلة القواعد ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، طول نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسياتها الزهرية متوسطة المدد قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم ، لونها الى الصفرة || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الاول .

#### 1٨٥٥٣ - عُصْبَة رَاتِنْجِيَّة

Silphium terebinthaceum (S). Silphe térébinthacé (F).

جنية زينة ممرّة تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . ساقها تتميز بنفارة مادتها الراتنجية . اوراقها ضيقة التجميع ، بيضيه الشكل ، قليلة القواعد ، جلدية النصل ، مسنة الحافة ، طول نحو ٣٠ سم . وتقرض ١٥ سم . || رؤسياتها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة . ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

#### 1٨٥٥٤ - عُصْبَة مَحْرُوقَة

Silphium perfoliatum (S). Silphe perfolié (F).

جنية ممرّة تملو من ١٢٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها رباعية التضلع . اوراقها متقابلة مدعومة الاذنين التي تبدو مقعرة كالكتب توصلها الاثتان || رؤسياتها الزهرية عديدة ، قطرها يراوح بين ٥ و ٨ سم . لونها الى الصفرة الشاحبة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

وتقرض نحو ٣٠ . رؤسياته الزهرية ذهية اللون ، سليلية التركيب ، قطرها يراوح بين ٤ و ٥ سم . لسنتها ثنائية التفرع تبدو كأنها مزوجة || تنوره يستمر من تموز الى آب .

#### 1٨٥٣٦ - عُصْبَيْف كَبِير الْوَرَق

Ligularia macrophylla (S). Ligulaire à grandes feuilles (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه زياه تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه اعليجية الشكل طول من ٤٠ الى ٥٥ سم . نصلها الى الخضار الازرق المالح . ازهاره سليل التجميع ، رؤسياته الزهرية كبيرة القذ ، عطية الاقراص ، صفر السنتات || تنوره يستمر من تموز الى آب .

#### 1٨٥٣٧ - عُصْبَيْف يَابَانِي Ligularia japonica (S).

Ligulaire du Japon (F).

نوع من العصيف الممر . ساقه سرط تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقه كبيرة القذ سباحية او تساعية التفرع . نصلها طابق اخضر سيك الصفرة . ازهاره عشوي التجميع . رؤسياته الزهرية صفر الاقراص ، حر السنتات ، كبيرة القذ ، قطرها نحو ٩ سم || تنوره يستمر طول فصل الصيف .

#### 1٨٥٣٨ - عُصْبَيْفَة Glume (F). Husk, Chaff (E).

قناة تحيط ببنتيلة النجيليات وما عصيفتان لكل سنبلة .

#### 1٨٥٣٩ - عُصْبَيْفَرَة عَصِيْلَة في الجاه ، اعطبا .

Sclerospora (S).

جنس فطور مجهرية من عمارة السنتات ونباتية السنتات . يتميز بقصر خيوطه البنية وقلة تشعبها وكبر بيضياتها واستدارة مرافقها || انواعه الممرقة قليلة اشهرها عصيل النجيليات .

#### 1٨٥٤١ - عُصْبَيْف النجيليات \*

Sclerospora graminicola, S. macrospora (S).

فطر مجهرى من العصيل يتميز بلسودا يبيضاته الكبيرة الحجم التي يبلغ قطرها نحو ٦٠ مي . || يركب شرائف الحنطة والذرة وقد يتسدها الى الازرار . ظهوره الحادوي سقم واصفرار ثم تبقي اتصال وقد يؤدي الى الجسنة وانعاص الازرار .

#### 1٨٥٤٢ - عُصْبُ Feuilles des arbres (F). Leaves (E).

العصم : هو ورق الشجر .

#### 1٨٥٤٣ - عُصَا ، عَصِي Lotir (F).

To divide into lots (E).

قسم الارض الى عدة حصون .

#### 1٨٥٤٤ - عُصْبَايَة لِيْبِيَّة \*

Lapidopus argentatus (S).

Lépidope argenté, Argentin (F). Argentine (E).

سمكة بحرية مقعرة يعيش من فصيلة السيفيات شائعة الزمان . اصلها اقراط ونفاد البحر الابيض المتوسط || جسمها مستطيل الشكل ، مبط الجرم كمثل السيف يطول نحو ١٤٠ سم . لونها الى الازرق بعلها موج ودي وشفة فضية تتخللها نقط ذهية . رأسها وظهورها امبق عصافاً من ابطلها وبطنها || رأسها شبه اسفين الشكل مستطيل الطول . شفتها كبير . اسناتها كبيرة المدد منها الثابتة والمسرعة والذرية والمنعقة || عيناها كيرتان



عصيل النجيليات



عصاة فضية



عصبة

وفلسطين . يكثر قرب الحقول المزروعة والبراريات . ياتمس قوته في النهار . جمره دهاليز قسيمة عديدة الانفاق يحزن فيها ما استطاع من حبوب .

## Muscle

**عَصَلَة ١٨٥٦٦ -** جسمه نسيج عضوية ليفية تتميز بنفاستها الانقباضية والانتفاضية . تقسم عضلات الجسم الحوياني التي يبرف عنها بالجهاز العضلي الى ثلاثة اقسام : قسم العضلات الارادية او العضلات الخشطة التي يسيطر عليها الجهاز العصبي فتنتفخ وتنبسط وبذلك الارادة . وقسم العضلات غير الارادية او العضلات اللسائية اي غير الخشطة وهي التي لا تأتمر بالأارادة كعضلات الجهاز الهضمي والأوعية الدموية . قسم قسم عضلات القلب وهي من العضلات الخشطة الارادية التي تتميز باستمرار الحركة طوال الحياة .



مضروط

Muscle extenseur (F).

Extensor muscle (E).

Muscle abdominal (F).

Abdominal muscle (E).

Muscle ailaire (F).

Alary muscle (E).

Muscle corrugateur, Sourcilier (F).

Corrugator muscle (E).

Muscle iliaque (F).

Iliacus muscle (E).

Muscle malarie (F).

Malaris muscle (E).

Muscle circulaire (F).

Circular muscle (E).

Muscle releveur (F).

Levator muscle (E).

Muscle anal (F).

Anal muscle (E).

Muscle pectoral (F).

Pectoral muscle (E).

Muscle temporal (F).

Temporal muscle (E).

Sphincter

عَصَلَة ١٨٥٧٨ - عَصَلَة عَامِرَة

عَصَلَة ١٨٥٧٩ - عَصَلَة مَذَاة ، عَصَلَة مُبَدَّاة

Muscle protractor (F).

Protractor muscle (E).

عَصَلَة ١٨٥٨٠ - عَصَلَة مُبَعَّدَة ، عَصَلَة قَابِجَة

Muscle abducteur (F).

Abductor muscle (E).

عَصَلَة ١٨٥٨١ - عَصَلَة مُخَطَّطَة

Muscle strié (F).

Striped muscle (E).

عَصَلَة ١٨٥٨٢ - عَصَلَة مَذَارِيَة ، عَصَلَة اللَّاحِظ

Muscle orbiculaire (F).

Orbicular muscle (E).

عَصَلَة ١٨٥٥٥ - عَصَلَة مُشَرَّمَة

Silphium laciniatum (S).

Silphe laciné (F).

جنية معمورة تعلو من متر الى مترين ساقها حلوية غشقة . اورثاتها لاشعة متعاقبة دائمة الاتجاه نحو الشباك . نصفاها مشرق الصفة ، تشريحه يبلغ الفصل ١١ ورويساتها الزهرية كبيرة القذ ، قطرها يراوح بين ٨ و ١٢ سم . لها الى الصغار الكبريتي الزاهي ١١ ازهارها يستمر من تموز الى ايلول .

عَصَلَة ١٨٥٥٦ -

هي الحصة او السهم او النصيب وهي القطعة من الشيء او الجزء منه : ج عضون .

عَصَلَة ١٨٥٥٧ -

Emondage (F).

Pruning, Lopping (E).

تقليم الفروع والاضبان الكبيرة التي تثبت على السوق .

عَصَلَة ١٨٥٥٨ -

Brs (F).

Arm (E).

من اعضاء قوائم الدواب الامامية . ج اعضاء وأضد .

عَصَلَة ١٨٥٥٩ - عَصَلَة زُنْدِي ، عَصَلَة مِرْقَلِي

Brachio-cubital, Huméro-cubital (F).

Humero-cubital (E).

عَصَلَة ١٨٥٦٠ - عَصَلَة كُغْبُرِي ، عَصَلَة كُغْبِي

Huméro-radial (F).

Humero-radial (E).

عَصَلَة ١٨٥٦١ - عَصَلَاتُ الْاَزْجَل

Brachiopoda (S).

Brachiopodes (F).

Brachiopodes (E).

شعبة من صف الشيا الهيداني .

عَصَلَة ١٨٥٦٢ - عَصْرَم

هو الخسفي اخضرى زهره قاني الحمرة تسود منه جملال الدواب اذا اكته .

عَصَلَة ١٨٥٦٣ - عَصْرُوط \*

Calotes (S).

Calote, Lézard-artequin (F).

جلس عظام من فصيلة الحرفذيات . اناؤه ٢٥ اطالها البلاد الحارة الاسيوية . تتميز باستطالة اذانها البتيفة وبقدورها على الاستطوان (الماتنة) ١١ تألف الاذغال والنايات والحراج . قوتها الحشرات .

عَصَلَة ١٨٥٦٤ - عَصْرُوطُ مِلَان \*

Calotes varicolor (S).

Calote varicolore, Lézard-artequin varicolore (F).

حيوان يبيض من الطاء وفصيلة الحرفذيات شارات الانسان ، مكسبات الالسة ، ورياضيات القوائم ، خناصات الاصابع ١١ جسمه يطول من ٢٧ الى ٤٠ سم . ثوبه الى الريدة الخشطة تلوها رشفة سمراء . قوتها جمدة بالاسمر . وهو كسائر انواع جنسه يتميز بالشوة لثانتي الحيط الذي يوجد فيه ١١ ياتلف الاذغال والحراج المبررة الانجار . يعيش ذكراً واثني من ارباسد الربيع حتى اواخر الخريف .

عَصَلَة ١٨٥٦٥ - عَصَل \*

Psammomys obesus (S).

Psammomys obesa (F).

حيوان لين قافص من فصيلة القاربات . وسيد الجنس والنوع . شكله شكل الجرذون ، طوله نحو ١٩ سم . وذنبه ١٤ ، ثوبه الى الريدة الصهباء . موطنه رمال مصر وسيناء



مضروط ملوان



مضل

البرية تستغرق ٢٤ ساعة و٥٠ دقيقة . اما دورته الفلكية حول الشمس تستغرق نحو ٨٨ يوماً || يقال ان حجمه لا يفوق بطن من جرم الارض وهو يرى دائماً مغشوراً بنور الشمس نظراً لقربه منها . ويقال انه لا يوجد حول سطحه غلاف جوي وان حرارته تبلغ نحو ٢٥٠° مع || اما المتجملون فيدعونه منافقاً لكونه مع السد سداً ومع الناس نحساً .

١٨٥٩٩ - عَطُوف هو التاردين الاقليبي ، اطلبه .

١٨٦٠٠ - عَطُوط \*  
Telophorus (S).  
Télophore (F). Telophorus (E).

طائر وحيد الجنس والنوع من الجوارثم مشروبات الخاتير وفضيلة الصرديات . اصطناع تمت من افريقية الجنوبية الى الاستوائية والشرقية . وهو من الضواري التي تجوب البلاد في طلب الرزق . ملجئه الحيائي زبجي الا في زمن التقطاع . قوته الحشرات والديدان الصغيرة والبروزر والثآليل جسمه متوسط القد يطول نحو ٢٢ سم . متقاده متدل الجرم . ضليح . جناحه متوسطا القد . ذنبه متدل الطول ، مستدير الطرف . ثوبه الملوي الى الخضار الالاس ، اطراف ابطاهه واطراف رقاله الى الحمرة الاريموانية . ثوبه السفلي ، من الفزور الى الافنيك ، احمر القين صناعي المربع . متقاده جريزي . ريشه واصابعه الى \*السرة القائمة || يدن عشه في الاشجار الرقيقة . الاثني تحسن من ٤ الى ٦ بيضات . التريشم يشمر نحو ١٥ يوماً تقوم بها الانثى دون الذكر الذي يتيقن لها الغذاء والحماية .

١٨٦٠١ - عَطُاسِي \*  
Faunistique (F). Faunistic (E).  
كل ما له صلة بالعلم وبالحيوانات الداجنة في كورة معينة .

١٨٦٠٢ - عَطُاس ، عَقُص  
Tanin (F). Tannin (E).  
مادة حامضة قابلة لتجيد في النسبة بعض النباتات . حصرها الفعالي يدعى الطان . والطان يختار من المغويات الطبية الصنية وهو يستعمل في الدبابة .

١٨٦٠٣ - عَطُوب هو القطع ، اطلبه .

١٨٦٠٤ - عَطُوب ، عَطُوب النلية الطويلة المتق .

١٨٦٠٥ - عَطُر  
Essence (F). Species, Attar (E).  
سائل طيار طيب الرائحة يكون بحالة شيفات في خلايا النبات او في قوتلها وبيورها الخاصة .

١٨٦٠٦ - عَطُر هو البهون المر ، اطلبه .

١٨٦٠٧ - عَطُر القنداح ، دهن القنداح ، نيرولي  
Nérôli (F). Neroli (E).

عطر يستعمل عليه من تقطير زهر التارنج الذي يدعى قنداحاً .

١٨٦٠٨ - عَطُر جَعْدِي  
هو الحيازة الجسدية ، اطلبها .

١٨٦٠٩ - عَطُوف  
Vipère (F). Viper (E).  
الانثى الكبيرة القد .

١٨٥٨٣ - عَصَلَة مَرْقَبَة ، عَصَلَة قَلِيلَة

Muscle adducteur (F). Adductor muscle (E).  
عضلة مرقبة مضموا الى محور الجسم .

١٨٥٨٤ - عَصَلَة مَقْتَصَة  
Muscle constricteur (F).  
Constrictor muscle (E).

١٨٥٨٥ - عَصَلَة مَسَاة  
Muscle lisse (F).  
Skin muscle (E).

هي العضلة غير العضلة التي لا تؤثر فيها الإرادة او الجهاز العصبي .

١٨٥٨٦ - عَصَلَة هُدَيْبِيَّة  
Muscle ciliaire (F).  
Ciliary muscle (E).

١٨٥٨٧ - عَصَمَكُورِي  
Micro-organisme (F).  
هو كل كائن حي متناهي الصغر . ويدعى قفطور ، اطلبه . اما كلمة عصمكري فن وضع المجمع العلمي في مصر . ج . عصمكريات .

١٨٥٨٨ - عَفُوف  
Organe (F). Organ (E).  
جزء من كائن مركب ، ويوجد له لازم او ضروري . ج . اعضاء .

١٨٥٨٩ - عَفُوف التَلَكُيخ ، عَفُوف  
Organe copulateur, O. de copulation (F). Copulatory organ (E).

١٨٥٩٠ - عَفُوف سُبَاكِي ، عَفُوف وِدَاكِي  
Organe carotide (F). Carotid organ (E).

١٨٥٩١ - عَفُوف شَمِي  
Organe olfactif (F).  
Olfactory organ (E).

١٨٥٩٢ - عَفُورَة  
Fissiparité (F). Fissiparism (E).  
المضوية والتضفية ، التناسل بالاتقسام الى شطرين كما هي الحال عند الاولاي والكثيريات .

١٨٥٩٣ - عَفُورِي  
Organique (F). Organic (E).  
نمت تعريف توصف به اعضاء والاجسام والمواد المضوية من اي فئة كانت .

١٨٥٩٤ - عَقِيد  
Effouillure (F).  
Stripping off the leaves (E).  
ما انتزع او اسقط من الورق .

١٨٥٩٥ - عَقِيدَة \*  
Palmette (F). Palm-shaped (E).  
شكل من اشكال تقلم الاشجار المشرفة .

١٨٥٩٦ - عَقْط  
Fente longitudinale (F).  
Longitudinal slit (E).  
العد : الشق طولاً . انعطاط الخشب : الشققة طولاً .

١٨٥٩٧ - عَقَار  
Strombus lantiginosus (S).  
نوع من الدلاء يكون منه انظار الطيب .

١٨٥٩٨ - عَقَارِد  
Mercure (F). Mercury (E).  
كوكب سيار من الخس ينتمي الى مجموعة النظام الشمسي وهو اقربها من الشمس . سرعة دورته الانتقالية في الفضاء تبلغ نحو ١٩٩٥٠٠ كيلومتر بالساعة . دورته المحورية



عَصِيد



عَطُوف



Tige volatile (F).  
Volatile stem (E).



عُطُوف نَتَاق

١٨٦١٥ - **عُطُوف نَتَاق** \* ، **بَحَاغ** ، **بَزَاقِي**  
Sapedon haemachata (S). Cobra cracheur,  
Haemachata, Serpent cracheur (F).

١٨٦١٦ - **عُطُوف نَتَاق** ، **حَاكِي** ، **لُزِيْبِي**  
Vrille (F).  
Yendril (E).  
ورقة تحولت الى حرق لين التركيب اسطوي الشكل،  
ستليل، يمكن النبات من التقلص والتقبض كما في الكرمه  
ونيريسا.



عُطُوب

١٨٦١٧ - **عُطُوفُور** \*.  
Aetophorus imperialis (S).  
Aetophore imperial (F).  
حشرة ذات من فصيلة السلكيات ورتبة مفدمات.  
الاجنحة. موطنها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحارة.  
تألف المقاصب والمناقص التي يكثر فيها الاصل لانها تعيش  
على المواد النباتية المتحللة تحت التقصيب والاصل المطروح  
ارضا || جسمها ستليل الشكل، مبطط الجسم، بطول  
نحو ١٢ سم. زياتها غيلاني. كولها منزلي الشكل.  
تواليا الى الصفرة الصنابية المواج بملها في ظهورها خمس  
نقط سود. ظهورها لا يلحف كامل الجسم.

١٨٦١٨ - **عُطُوفِي** ، **تَبَلَايِي**  
Hédéracé (F).  
Hederaceus (E).  
نمت تعريف توصف به السور النباتية اللدادة او اللسلفة  
الليلاية الشكل.



عُطُود

١٨٦١٩ - **عُطُود** راجع افسد.  
١٨٦٢٠ - **عُطُودِي** \*.  
Otolithus (S).  
Otolithe (F).  
جنس اسماك بحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة الباريات.  
انواعها المعروفة نحو عشرة. اصلها بحار البلاد الحارة ||  
جميعها كبيرة القد، مستطيلة للحد الاسفل، مقعرة  
الزعانف الظهرية الشائكة، عمودية التليل || التواليا الى  
الجلوة يطولها موج اخضر يثير عنه البطن ويسمر في  
الظلم || لحونها جيدة الصف مغروبو لها.

١٨٦٢١ - **عُطُودِي** \*.  
Faune (F). Fauna (E).  
انظم هي مجموعة حيوانات كورة او قطر او حبة  
جيولوجية.



عُطُودِي

١٨٦٢٢ - **عُطُودِي** \*.  
Faune abyssale (F).  
Abyssal fauna (E).  
مجموعة الحيوانات البحرية على اختلاف رتبها واصلها  
واجناسها التي تعيش في المناطق العميقة من البحر.

١٨٦٢٣ - **عُطُودِي** \*.  
Faune aquatique (F).  
Aquatic fauna (E).  
مجموعة الحيوانات المائية التي تعيش في منطقة بحرية عاصة  
او معينة.

١٨٦٢٤ - **عُطُودِي** \*.  
Faunisque, Faunique,  
Faunesque (F). Faunic (E).  
نمت تعريف يطلق على ما هو خاص بالضم.



عُطُودِي

١٨٦٢٥ - **عُطُودِي** \*.  
Milieu climatique naturel (F).  
Natural habitat (E).  
هي البيئة المناخية الطبيعية الخاصة بالحيوان او النبات  
ج اصلان.

١٨٦١٥ - **عُطُوف نَتَاق** \* ، **بَحَاغ** ، **بَزَاقِي**  
Sapedon haemachata (S). Cobra cracheur,  
Haemachata, Serpent cracheur (F).  
حبة سرودة سامة من العطوفات امانيات الاخايد مشهورة  
بقتل سمها مع العلم في وجه من تخبره مهاجرا || جسمها  
متوسط الشدة بطول نحو ٦٥ سم. تواليا الى الصفرة الحليقة  
المواج بملها من عنها الى طرف ذنها تجتمع جلوي  
معتريش وتضبط دقيقة متكررة ومتضاربة سواد العين.  
راسها لوزي الشكل. عنها مستطلة. عينها مستطيلة  
قرمزيتان. عدد اسناتها ٥٠ منها ٢٤ في الفك الاسفل  
و٢٦ في الاعلى من اصلها عقاقان امانيات دريتان  
لا متحركتان || بيئاتها الشتوية يستمر نحو حبة اشهر.  
تبلغ كامل نموها بمر ١٢ سنة وتعيش نحو ٩٥ سنة ||  
تعتبر من الثعابين الشديدة الاذى.

١٨٦١٦ - **عُطُودِي** \*.  
Ectropius (S).  
Ectrople (F). Ectroplus (E).  
جنس اسماك بحرية وبحرية من شاتكات الزعانف وفصيلة  
الباريات. انواعها المعروفة قليلة البد اصلها اغوار انهر  
الهند || اجسامها بيضية الشوزن، مبططة، متقشرة،  
تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل،  
مستطيلة الاطعام. عينها صغيرة نازحة. زعانفها الظهرية  
مستطيلة عشارية الاضمة والمناقص الحادة تقابلها الشرجية  
المائلة شكلا وقدا، الحوضية صغيرة مزوانية والبطنية  
كللك. الذيلية مستعرضة مقطعية || التواليا الى انصار  
البحري يملو تجتمع معتريش بنسجي اللون. ونها انواع  
مقروبو بالقضي واخرى قضي البطن || لحونها مأكولة  
مغروبو فيها.

١٨٦١٧ - **عُطُودِي** \*.  
Erythrurus (S).  
Erythrure (F).  
جنس صغائر صغيرة القد من الجروام مخروطيات الشاثير  
وفصيلة الزنبقيات. انواعها المعروفة ثلاثة موطنها جزر  
الزوايج. ملجها الحياتي جماعي اسرابها تمد اكثر من مة  
زوج || اجسامها مديرة مكنة قريبة الشبه بالنوري  
الا انها قصيرة الذئاب المقنونة || التواليا الى الكعبة بملها  
مواج اخضر او اشقر. بطونها الى القنرة. ونها نوع ثلاثي  
الالوان الزاخرة يكثر وجوده في غابات تيمور.

١٨٦١٨ - **عُطُودِي** \*.  
Chloranthe (F).  
جنس نباتات جينية وعشبية معمرة من فصيلة الطروديات.  
انواعها المعروفة عديدة اصلها بعض المناطق الاستوائية  
والحارة من القارة الاسيوية || اوراق زانها جميع الاتواح  
عطرية العرف المسحب. وبينهم من استعمل الاوراق  
استعمال التنوع والشاي.

١٨٦١٩ - **عُطُودِي** \*.  
Chloranthaceae (S).  
Chloranthacées (F). Chloranthaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلظن جذبات القمالات مرتفعات  
المحيط. اجناسها وانواعها عديدة فيها الاشجار والشجيرات  
والخشب والاشواب. اصلها المناطق الاستوائية والحارة  
من الهند الى جزر المحيط الهادي الى اسريكة الجنوبية ||  
اوراقها بسيطة متعاقبة. ازهارها سبيلة التسبيح. ثمارها  
لنوية، متدلية، صغيرة التيط المحفوف بطنية آمية  
متسكة || اشهر اجناسها الطرود والاسكرين.

مختلفة الأسياح والالوان ، تغلب فيها الاستطالة والاشكال المتسجمة والالوان الخضر النحاسية الالامه || جميعها مفيدة صغيرة قوتها الحشرات والحوام .

### ١٨٩٣٦ - عَظَامِيَةُ الحَيِطَان

Lézard des murailles (F).

هي حليمة الحيطان ، اطليبا .

Lézard vert (F).

### ١٨٩٣٧ - عَظَامِيَةُ خَضِرَاك

هي حليمة خضراء ، اطليبا .

Lézard agile (F).

### ١٨٩٣٨ - عَظَامِيَةُ رَشِيكَة

هي حليمة رشيقة ، اطليبا .

Lézard vivipare (F).

### ١٨٩٣٩ - عَظَامِيَةُ وَلَدُود

هي حليمة ولد ، اطليبا .

Azara microphilia (S).

### ١٨٩٤٠ - عَظِير

شجيرة برية وتربى بين من فصيلة النسيجات . مهدا بلاد الكليل ، ساقها غراما تقو من ٤ الى ٦ م . فروصها متعاقبة مزدوجة للتصنيف . اوراقها ابيدة متعاقبة معتقة صغيرة القد تقو من ٢٥ الى ٣٠ م . تصلها جامد الصفة ، رمي الشكل ، سنن الحافة . ازهارها عطرية العرف ، صغيرة القد خضراء اللون ، محورية الارتكاز . ثمارها غنية ، برتقالية اللون || تنورها يستمر من اواسط شباط الى اواخر آذار .

### ١٨٩٤١ - عَظَلَم

هو الوصمة ، ثبات عظمي من الصليبيات . وهو اسم عدة صيغيات ذرق انحصار الوصمة والثلث ...

### ١٨٩٤٢ - عَظَلَم

هو غرط الصفاين ، اطليبا .

Os (F). Bone (E).

### ١٨٩٤٣ - عَظَلَم

نسيج شام صلب يتكون منه الهيكل العظمي الحيواني وهو مركب من اربع طبقات : - (١) الطبقة الخارجية المرونة بالسماق وهو غشاء ليفي غالف - (٢) الطبقة القشرية الشديدة الصلابة - (٣) الطبقة الداخلية الهشة المعروفة بالانغسية - (٤) الخضاعة وهي المادة البنية التي تحمل عظام الطبقة الانغسية ومن اسمائها الرم والثلث . والنظام تتعمل في عدة صناعات اهمها صناعة الاسنة القصورية كما تدخل في غذاء الحيوان والطير .

Os spongieux (F).

### ١٨٩٤٤ - عَظَلَم اسفنجي

Spongy bone (E).

Fémur (F).

### ١٨٩٤٥ - عَظَلَم الفخذ

Femur, Thigh-bone (E).

اقوى عظام الجسم واسهلها ، يتألف من العظم الطويل يحده من طرفه الاصل الدور وتوابعه ومن طرفه الاصل نفو، اللقمة او القمتين .

Bréchet (F). Breast-bone (E).

### ١٨٩٤٦ - عَظَلَم القَص

هو الجوشور ، عظم صدر الطير .

Scapulum (F).

### ١٨٩٤٧ - عَظَلَم الكتف، عَظَلَم لَوَحي

Calcaneum (F).

### ١٨٩٤٨ - عَظَلَم الكَعْب ، عَظَلَم

Heel-bone (E).

### ١٨٩٢٦ - عَظُوز \*

Echusa (S).

Echusa (F). Echusa (E).

جنس دوبيات بحرية من قشريات عشاريات الابريل قصار الليل فضيلة اللباليات . انواعه المعروفة قليلة العدد ، اعطيا عبار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . جميعها ينج لا تقرب الشطوط الا في زين التمسرة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل ، متراكبة للتيات المدية الاطراف . تتميز بالانجاس القرمط المويدي بين قوائمها ، زويان كبيران مستطيلان ، وزويان صغيران . ملاصقها قصيرة ، شديدة القس . حيثما دوبيية . اولياها الى الخضر الازرق تقو ماجة حراء . قوائمها الكيرة ويلاصقها مطوقة بالاصفر والوردي .

Don (F).

### ١٨٩٢٧ - عَظِيَّة ، نَحَلَة

هي الحبة على اختلاف اشكالها . Gift, Donation (E).

Androcée (F). Andracium (E).

### ١٨٩٢٨ - عَظِيل

هو جهاز التذكير في النبات ، واسع جنس .

Filago (S).

Filago, Filago, Herbe à coton (F). Horsetail, Cotton rose cud-weed, Cud-weed (E). Schimmelkraut (D). Filago, Filonia, Camapicchio, Erbe da Cotone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات الشرويات . انواعه المعروفة لا تجوز الالبانية جميعها نباتات بحلية غرام . اوراقها عطرية . ازهارها زويية كثيفة التجميع يطولها عند الادراك زغب ابيض اللون يشبه لطف القطن . قالوا انها لا تقو من المنافع الطبية لكنهم اهلوا ذكرها .

١٨٩٣٠ - عَظَلَم

اسم تعريفي شامل يطلق على معظم الزسولات التي كلتني الى رتبة لطاليات .

Sauriens, Lacertilens (F).

### ١٨٩٣١ - عَظَلَمِيَّات

Saurians (E).

رتبة العظاء وهي حيوانات زحافة بيوضة عادمة الدم . مفترسة قوتها الحشرات والحوام . فصائلها ٢١ ، اجناسها وانواعها كثيرة العدد . جميعها صماء الاذن ، جيلوية الصدر ، رباعية القوائم او ثنائيتها او عادمها . اجسامها مستطيلة ، اطليبا حرشية ، اجناسها متحركة || اشهر فصائلها الجروديات والحرباويات والحزدييات والمنجيات والحزقيات والمستقرديات والسليبيات والسويديات والهيضيات والقافرات والقهرقيات والورليات والورقيات .

Carpe (F).

### ١٨٩٣٢ - عَظَلَم المِعَم

Carpus, Wrist (E).

Iles (F). Ila (E).

### ١٨٩٣٣ - عَظَلَم حَرَكِيَّة

١٨٩٣٤ - عَظَلَمَة

هو العظاء كركبة تجو شالية المخ مركزها بين كوكبي الدجاجة والرداء المسلة || جميعها قليلة العدد بعضها ملون لونها من المرتبة الرابعة .

١٨٩٣٥ - عَظَلَمَة \*

سَكَايَة ، سَكَايَة

Lacerta (S). Lézard (F). Lizard (E).

النظاية والسطامة والسطامة ج عطاء وطاليا وغطايات ، جنس حيوانات زحافة من فصيلة السقايات . انواعه عديدة



عظيل



عظاءة

Saurographie, Saurologie (F). - عَفَافَنَة ١٨٦٦٦

Saurology (E).

الطبعة علم يبحث في الطائيات على اختلاف فصائلها وأجناسها .

Saurographique, ١٨٦٦٧ - عَفَافَنِيَّة ٥

Saurologique (F). Saurologic (E).

نعت تعريفي يطلق على كل ما له صلة بالمعنة .

١٨٦٦٨ - عَفَاكِر

شجر يشند منه الزناد كاللرخ . قال أبو حنيفة : « أخيري بعض الإعراب أن العفار شبيه بشجرة التبرء ونورها أيضا كنورها وهو شجر حوكر . ولذلك جاد الزناد . واحدة عفاكة » .



عَفَاسْ أَيْضْ

Poudreuse (F). Powdery (E). ١٨٦٦٩ - عَفَاكِرَة

أداة خاصة تذر بولسها غثفل المساحق الخشورية والقاطورية المستعلة في مكائسة الحشرات والقطور والأصنام .

Noix (F). Walnut (E). ١٨٦٧٠ - عَفَاكِرَة

المفازة في الجوزة للأكلية . ج. عفاز .

Capsule de coton (F). ١٨٦٧١ - عَفَاكِرَة ، بَيْتَم

Nut of the cotton (E).

المفازة والكنية . ج. عفاز وكناج ، هي جرة القطن المروقة صامياً يجوز القطن أو لوز .

Traitement curatif (F). ١٨٦٧٢ - عَفَاسْ

Curative treatment (E).

العفاس ج . فماتات هي العلاجات الشافية في الحيوان والنبات .

Fuligula (S). ١٨٦٧٣ - عَفَاسْ

Fuligule, Nyroca, Canard plongeur (F). Nyroca (E). جنس طيور مائية من عمارة العفاسيات وفضيلة البطات . اقترانه عديدة جميعها من القواطع . أجسامها ربة قدرها قدر الريشة الصغيرة . منالتيها مبطلة مريضة القاعة . اقترانها بقاء اللون فيها الأبيض مع الرمادي مع الآخر والأزرق والبنفسجي والأسود . ذكورها أثير من أنثاها وأكبر حجماً منها . قنيتها الاسماك الصغيرة والقشريات وكل ما هو صغير في الماء تقتنيه بالفتس . وهي تغفل المياه البحرية على البنية || تدفن في الأسر والفتس على ضفاف البحيرات . أنثاها تضع من ٨ إلى ١٠ بيضات تحضنها وحدها من ٢٢ إلى ٢٣ يوماً .



عَفَاسْ أَيْضْ

Fuligula marila, Nyroca marila (S). Fuligule à collier, ١٨٦٧٤ - عَفَاسْ أَيْضْ ٥

F. milouina (F). Scamp (E).

نوع من العفاس طولها نحو ٥٠ سم . أخضر الرأس ، مطوق العنق ، أسود الجوزة والذنب ، أبيض البطن ، سحلي للفتاد ، أحر العين ، أصغر الرجل .

١٨٦٧٥ - عَفَاسْ أَيْضْ ٥ ، عَفَاسْ كَبِير

Cangula glaucion, C. hyemalis (S). Fuligule de milouen, Garrot vulgaire (F). Several duck (E).

نوع من العفاس يطول نحو ٦٥ سم . رأسه ورعقو ذو اللون . سائر جسمه الى البياض الناصع . منقاده أسود . يألف مياه المناطق الباردة والمستعلة .

Ischion (F). Ischium (E). ١٨٦٤٩ - عَظْمُ المَعْدَنَة

Vomer ١٨٦٥٠ - عَظْمُ المَيْكَمَة ، مَيْكَمَة

Os parietal (F). ١٨٦٥١ - عَظْمُ جِدَاكِرِي

Parietal bone (E).

Os cotyloide (F). ١٨٦٥٢ - عَظْمُ جَفِي

Cotyloid bone (E).

١٨٦٥٣ - عَظْمُ حَلَزُونِي ، عَظْمُ مَقْنُون

Os turbid (F). Turbinal bone (E).

١٨٦٥٤ - عَظْمُ زَوْرَكِي

Os scaphoide (F).

Scaphoid bone (E).

١٨٦٥٥ - عَظْمُ صُدْهِي

Temporal bone (E).

هو الجزء المحيط من عظم القفص .

١٨٦٥٦ - عَظْمُ طَوِيل ، مَشَاش

Diaphyse (F).

Diaphysis (E).

١٨٦٥٧ - عَظْمُ فُرَاكِي

Os coracoide (F).

Coracoid bone (E).

١٨٦٥٨ - عَظْمُ غَشَائِي

Os membraneux (F).

Membranous bone (E).

١٨٦٥٩ - عَظْمُ مَحْتَجَر

Osteolith (F).

Osteolith (E).

١٨٦٦٠ - عَظْمُ مَنَعَلِي

Ethmoide (F).

Ethmoid (E).

العظم المنعبل أو العظم القربالي أو العظم المنصوري هو ركيزة الأنف في الجمجمة .

١٨٦٦١ - عَظْمُ وَتَدِي

Os sphénoide (F).

Sphenoid bone (E).

١٨٦٦٢ - عَظْمِيَّة ، عَفَاسِي

Osseux (F).

Bony, Osseous (E).

نعت تعريفي يوصف به ما هو كالعظم طبيعة أو تركيباً أو شكلاً .

١٨٦٦٣ - عَظْمِيَّات ، كَمَامِلَات العَفَاسْ

Téléostéens (F). Téléostei (E).

صنيف من الاسماك يشتمل أكثرها . أجناسه وأنواعه عدة الا ان جميعها ثنائيات الفصائل وتنفصها خمس زغب ، هي : عصفليات الحياض ، شالكات الزماتف ، مفتحات الخائفة ، ملحميات الفك ، سلاوات .

١٨٦٦٤ - عَظْمِيَّات الرُّؤُوس

Osteoglossidae (F). Osteoglossidae (E).

فصيلة اسماك نهريه من كملات النظام تكتيز برؤوسها المنحنية بمصانع عظمية المادة . أجناسها وأنواعها ثلثة العدد منتشرة في بعض أنهر وبحيرات البلاد الاسيوية والافريقية والامريكية .

١٨٦٦٥ - عَظْمِيْن

Ostéine, Ostéine (F).

Ossein, Ossein (E).

العشاء الحلامي الموربد في العظم .

١٨٦٨٥ - عَفَّاصُ Bouchon (F). Stopper (E).  
حمام القارورة . عَفَّاصُ : سدا بالعفاس .

١٨٦٨٦ - عَفَّاسِيَّاتُ Paléodictyoptères (F).  
Paléodictyoptera (E).

طبقة حشرات من شعبة السرنجيات وطائفة المجتحات أصلاً .  
أنواعها وأجناسها وفصلاتها عديدة تنضم إلى ثلاث رتب  
السرماطيات والزهريات والقرشيات . جميعها من مخلوقات  
الزمنة النادرة . أحاديثها تتناول من أواسط إلى أواخر  
الابح الأول ، جميع حشراتنا كبيرة القصد وبعضها  
مستفهم .

١٨٦٨٧ - عَفَّالَةُ Epiphila (S).  
Epiphila (F). Epiphila (E).

جنس حشرات فراشية من فصيلة البشوريات ورتبة  
حرفشيات الاجنحة . أنواعها المعروفة متوسطة القصد اعطائها  
بعض جبال امريكا الجنوبية || فراشاتها واثمة قوتها  
رسق الاذعار البرية . اساريها خاضعة تعيش على اوراق  
النبات || اجسامها معتدلة القصد طولها من ١٦ الى ٢٠ سم .  
سبطها تراوح من ٤٨ الى ٦٠ سم . رؤسها صغيرة ،  
ملونة . عيونها نافذة ، كبيرة . قرونها الاستشعارية  
صولبانية . مراشفها دقيقة . جوافها وبطنها مزينة او  
خالية . جميعها ملونة . رواشها غصية متراكبة الاالوان .  
معظمها يجمع الزوج الاسامي المنطق بالابيض وبعضها  
يجمع الاسامي والخلفي || اعراف انواعها واكثرها انتشاراً  
المقاتلة المستعينة (Epiphila dilecta) .

١٨٦٨٨ - عَفَّانُ الرَّصْع Loque, Pourriture du couvain (F). Rag, Breeding-  
cells rot (E).

وصم جرثومي فتاك يصيب الملية يترى رصع النحل يفتقي  
عليه || يكافح لانتفاع اقسام الخنازيب المصابة وينقل  
النحل الى قدير او غلية نظيفة ويطهره .

١٨٦٨٩ - عَفَّةُ اللفة «مكة جرداء يضاء صغيرة مطبوعها كالراز» .

١٨٦٩٠ - عَفَجُ Duodenum  
الفتح : ما يتصل بالطعام اليه بعد المعدة ، وهو لسباع  
كلها بمنزلة المسارين لفوات الف والفتل التي تلوي  
اليها الكرش ما دفعت . ج افطاج وطعجة .

١٨٦٩١ - عَفْدُ ، لَيْهِيْدُ Lagopède (F).  
Lagopus (E).

جنس طير من عائلة الخرسيات وفصيلة الطيوريات .  
انواعها ١٤ معظمها قطبي يالغ اسراج الجبال العالية .  
ثوبها غطف الالوان . رأسها كاسي الريش . اجنحتها  
قصيرة شبه مستدرة . اذنيها قصير مستدير يتألف من  
١٤ ريشة . ارباضها كاسية من خالها . ج عفدان .  
اعرف انواعها وابهرها الثلاثة التالية .

١٨٦٩٢ - عَفْدُ أَبْكَمُ Lagopus mutus (S).  
Lagopède muet, L. des Alpes, L. ptarmigan (F).  
Ptarmigan, Willow grouse (E).  
طائر من القصد ، طوله نحو ٣٨ سم . ثوبه صديد الالوان ،  
دائم التغير ، يتبدل كل شهر ، تتلف فيه الصبهة والجفوة  
والبياض ، قوادمه واذنيكه وباطن سقطه سود || موطنه

١٨٦٩٦ - عَفَّاسُ أَشْهَبُ Nyroca ferina (S).  
Fuligule milouin (F). Pochard (E).  
نوع من العفاس يطول نحو ٤٧ سم . رأسه معتد الى الشبهة  
المائلة ، جنيحو وذنيه الى البراد القنسي ، سائر اشهب  
الجل . عيانه الى الحرة . متقاده حطلي .

١٨٦٩٧ - عَفَّاسُ مَتَوَجَّعُ ، وَتَسُ Netta rufina (S). Fuligule roussâtre, Brante rous-  
sâtre, Stiffleur huppé (F).

نوع من العفاس طوله نحو ٥٥ سم . رأسه اصهب اللون  
متوشش الريش . عنقه وجنيحو ويكه وذنيه الى البنفسجي  
اللامع . جناحاه الى العترة ، مناكبه ييض . عيانه  
وربلاه ومتقاده الى الحرة .

١٨٦٩٨ - عَفَّاسُ مَعْمَرِي Fuligula cristata, F. nyroca (S). Fuligule morillon,  
Sarcelle d'Egypte (F). Tufted duck (E).

نوع من العفاس طوله نحو ٤٢ سم . رأسه اخضر اللون  
اسمع للمواج . جسمه يراعي التوب . جنيحو الى البنفسجي  
اللامع . عيانه الى الحرة ، متقاده الحطلي ، ربلاه الى الحرة  
الحطلية .

١٨٦٩٩ - عَفَّاسِيَّاتُ Fuligillans (F).  
عاز طير العفاس من فصيلة البليات .

١٨٦٨٠ - عَفَّاشُ Ovaritis (S).  
جنس فلور مجهرية من الطليسات وفصيلة الطليسات .  
انواعه عديدة معظمها طفيل لا مؤذي . جرابه الكتيبي  
مجداني الشكل ، فهي التجميع . كتائده يضيئة او  
اهليجية . مشبهه علوي الانتساب يركب السرق والاوراق  
يفرقح التلج واليشرة .

١٨٦٨١ - عَفَّاشُ الْحَفَّاشُ ، عَفَّاشُ اوبليكا Ovaritis obliqua (S).

فلور مجهرية يصيب اوراق الحفاس فيلونها || مظهر  
الخارجي يقع مستديرة فسيمة قطرها من ٦ الى ١٥ سم .  
تركب نصل الاوراق على صفحتها العليا . تيفر سمراء  
اللون ، حراء الحالة ثم تنصرف الى السمرة الكالحة التي  
يصفها اليباس .

١٨٦٨٢ - عَفَّاشُ الْوَرُثُ ، عَفَّاشُ كَرَوِيْ Ovaritis asphaeroides (S).

فلور مجهرية يترى وريقات الوراث فيسبها || مظهر  
الخارجي يقع من تركب النصل على صفحته العليا قديب  
يباس البثرة يقابلها على الصفحة السفلى ندف غلي ،  
ايض للون تفرزه المسام المويومة .

١٨٦٨٣ - عَفَّاشُ الْبَيْمُونُ Ovaritis citri, O. Briosi (S).

فلور مجهرية يصيب ثمار البيمون الحامض في قشورها  
فيلونها || مظهر الخارجي يقع رباعية او يضاء اللون  
تركب قشرة البثرة قبل اكثال نموها فتشوها وتصلها .

١٨٦٨٤ - عَفَّاشُ التَّحْجِيلُ Ovaritis pulchella (S).  
فلور مجهرية يركب اوراق التحجيل على اختلاف انواعه .  
مظهر الخارجي يقع صئيرة ، مستديرة ، مبيضة ، غبراء  
اللون ، تملو النصل على صفحته العليا يقابلها على الصفحة  
السفلى ندف غلي اطبل للون .



عَفَّاسُ أَشْهَبُ



عَفَّاسُ مَتَوَجَّعُ



عَفَّاسُ مَعْمَرِي



عَفَّاشُ الْحَفَّاشُ



عَفَّاشُ الْبَيْمُونُ



عَفَّةُ



عُذَّةٌ أَبَكَمَ

الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || اجسامها شبه بيضية اللون ، طولها من ٥ الى ٨ سم . رؤوسها معتدلة الجرم ، قليلة التفريز ، يلمعها خلف الكويل . قرونها الاستشعارية عجيطة مركبة من ١١ فصلة . عيونها صغيرة ، ناشرة . ثآشيرها ضليقة . كولها مستقيمة ، معتدلة الاحدياب . احادها لائحة ، نخلة التحديد القاطب . قوائمها نطيقة . انوثها متباينة الخلفاء تكثر فيها الحوة ثم الصمعة فالعفرة || الحشرة الجملانة قاصصة ، سريعة الحركة ، تألف ضفاد بجاري الماء الطيب ، خاصة الضفاد الرملية حيث تنسج بسرعة . القيرة الناجمة وبهضها غاضل .

#### ١٨٧٠٠ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Omophronidae (S).

Omophronidae (F). Omophronidae (E).



عُذَّةٌ أبيض

فصيلة حشرات من رتبة عذبات الاجنحة - اجسامها وانوثها المحروقة عديدة منتشرة في معظم المنطقة الشمالية وفي افريقية والهند || اجسامها شبه بيضية اللون . رؤوسها صغيرة . قرونها الاستشعارية عجيطة ، مركبة من ١١ فصلة . مقدم جونها خلف ملغور اليريد . حلة البلورة مقوية . كولها شبه منقعة الشكل . مستقيمة القاصدة . احادها نخلة التحديد القاطب الذي يد ١٤ او ١٥ اغنوداً . قوائمها نخلة ، معتدلة الطول || مكها شبه اسطوانى الشكل ، تحته افرادها في التربة . يرقاتها سلمية القوائم . قوائمها سداسية القمل . سورياتها مرطاة تنحدر في التربة داخل رواق انثوي الشكل || تعيش على ضفاد بجاري الماء . سلط اجسامها غاضل وبهضها ملغور والقيرة كذلك لكنها لا تسرح في النهار || اشهر اجناسها المصنرون .

#### ١٨٧٠١ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Pulverulent (F). Pulverulent (E).

نبت وصي يدل على الرطب الخليل الذي يثني بعض الاصحاء الباتية والحويانية .



عُذَّةٌ

#### ١٨٧٠٢ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .



عُذَّةٌ

#### ١٨٧٠٣ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٤ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٥ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٦ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٧ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٨ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

#### ١٨٧٠٩ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Actinophrys (F).

Actinophrys (E).

جنس حشرات مجهرية بحرية من القشريات . تتميز بملها من الهيكل الصواني الذي تقوم قلمه حويصلة كروية نابضة تكتظها المناسق القارية .

الجبال العالية والقمم الرقيقة . قوته الاعتاش والجلبور والبرام والارواق والجار والحوب حل اختلافا || ينش في الخلق . اناء تبيض من ٨ الى ١٠ بيضات .

#### ١٨٦٩٣ - عُذَّةٌ أبيض ° Lagopus albus (S).

Lagopède blanc (F). White grouse (E).

طائر من العذ ، طوله نحو ٥٠ سم . ثوبه الى الياض الناصع ، اياهه وانثيك الى السمرة . اما ثوبه الصيفي الرسمي فالى الصبغة والصفرة والجولة ويلوه توضح اسمع ومواج اسفح || موطنه المناطق الشمالية . قوته المواد النباتية على اختلافها ويبيض الحشرات || اناء تبيض من ١٢ الى ١٥ بيضة تحضنها بتوايه الذكر في عش تدته في بعض الجنبات القناد دائما بانها الجنوب .

#### ١٨٦٩٤ - عُذَّةٌ إكوكسيَّة ° Lagopus sordicus (S).

Lagopède d'Ecosse (F). Red grouse (E).

طائر من العذ ، طوله نحو ٣٧ سم . ثوبه الشتوي والياض واحد . يكثر فيه الياض ، قوامه وياهه وانثيك الى السمرة القاسية || موطنه شمالي انكلترا ، يآلف المنطق والبيصيات ، قوته الاعتاش والارواق والبرام والجار والحوب || ينش عشه في الخلق ، اناء تبيض من ١٠ الى ١٢ بيضة .

#### ١٨٦٩٥ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Anchomenus (S).

Anchomène (F). Anchomenus (E).

جنس حشرات مجهرية للسرحة مقترنة نافعة من فصيلة الاجنحة وفصيلة السلوكيات . انواعها المحروقة عديدة منتشرة في معظم المناطق المعتدلة الحارة والمشرقة بحر الباردة || اجسامها صغيرة طولها من ١٢ الى ١٧ سم . انوثها مبظلمة مابقة الالوان السوية . يكثر لها الاسود والكشبي || يرقاتها مقترنة تقضي على الكثير من الحشرات الضارة .

#### ١٨٦٩٦ - عُذَّةٌ Sanglier (mâle) (F).

Wild boar (male) (E).

هو ذكر الخنزير الوحشي . ج حمار واحفار .

#### ١٨٦٩٧ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Camall (F).

Hood (E).

هي ريش عتق الديك وتقرن ايضاً بالبرائل .

#### ١٨٦٩٨ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Aphrophora corticea (S).

Aphrophore des écorces (F).

حشرة من فصيلة السرديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد وطولها من ١٠ الى ١٢ سم . || ثوبها متراكب الاسفر والخطي والاسود والالافير . رأسها حلالي الشكل ، اصفر اللون ، أسود الجبهة . عظمها لثاني الاجزاء اسود . عيناها كيرتان . زباناها قصيران . كولها مبعج بالاسمر والاسود . حبيبتها صغيرة . ظهورها كامل الحنجرة ، لاسف ، حنطى اللون ويلوه مبعج اصفر وزغاريف بنية وسود . رؤسها غشائيان . ينش الى الخنطى الاسمر . قوائمها مبلقة || مسرحتها سراج الصنوبر . تعيش بين القشور وتحتها . يرقاتها غاضلة تعيش على اوراق الاشجار .

#### ١٨٦٩٩ - عُذَّةٌ رُوبِيَّاتٌ ° Omophron (S).

Omophron (F). Omophron (E).

جنس حشرات نافعة من فصيلة المفرونيات ورتبة عذبات الاجنحة . انواعها المحروقة عديدة منتشرة في بعض المناطق



عُذَّةٌ

- 18710 - **عَفْثَة حَشَرِيَّة** (F). *Entomocécide*.  
بثرة تسببها الحشرات عند لسعها أوراق النبات.
- 18711 - **عَفْثَة سَلَكِيَّة** (F). *Nématocécide*.  
تفشم في لسع النبات سببه بعض الحشرات السلكية.
- 18712 - **عَفْثِيَّات** (F). *Gallicoles*.  
هي الآفات فصيلة حشرات من غشائيات الاجنحة.
- 18713 - **عَفْثِيَّة** ، **قِنْفِيَّة** (S). *Cynips*.  
جنس حشرات من فصيلة الآفات. راجع آفة.
- 18714 - **عَفْط** ، **عَفِيط** (F). *Ebroisement*.  
نثر الشاء بأنفها أو حشاش المازر. Snorting (E).
- 18715 - **عَفَن** ، **عَفْنَة** (F). *Chandraseure*, *Moissure* (F). Mustiness, Mouldiness (E).  
فساد من تربة أو طيرها يصيب المأكول والثمار والحقول والجوهر.
- 18716 - **عَفِن** ، **مُتَعَفِن** (F). *Chanci*, *Mold* (F). *Mouldy*, *Musty* (E).  
ما هو مصاب بالطن.
- 18717 - **عَفْثُوس الصَوْنَر** (S). *Aphanus pineti* (S). *Aphanus des pins* (F).  
حشرة غاشلة من فصيلة الطرائد ورتبة غشائيات الاجنحة. جسمها مستطيل الشكل ، بسيط ، يطول نحو 8 م. رأسها شبه مخروطي الشوذن ، أسود اللون. خطمها مستدل الطويل ، أسود. عندها خيثرتان. زباناها مستطيلتان. كسولها ملعب النصف الخلفي ، أسود النصف الامامي ، يطوي في كل من جانبيه نقطة سوداء تسمى القنطرة. حجبها مزراية ، سوداء ، يطويها خيطان طيعيان. بطنها أسود اللون ، أبيض الحمار. قشراتها أكبر. قوائمها مسنة الغنايب لا مسرها غايات الصنوبر. تتركب ازمار ولوراك النباتات البرية.
- 18718 - **عَفْثِيَّات** (F). *Mecorinodes*.  
فصيلة فطور مجهرية من رتبة النظيريات ورتبة البيضيات.
- 18719 - **عَفَر** (F). *Anon* (F). *Am's foal* (E).  
ولد الحمار والأثنى عفر. ج. عفاء.
- 18720 - **عَفْثُوس** (S). *Aphycus* (S). *Aphycus* (F). *Aphycus* (E).  
جنس حشرات نائمة من فصيلة الثرائيات ورتبة غشائيات الاجنحة المضمورة. انزاعه المروفة قليلة العدد موطنها بعض مناطق البلاد الحارة. جميعها تنطفل على الحشرات المؤذية من ذوات الجناحين والحرفنغيات و اجسامها مسطرة اتقد تطول نحو 1 م. رؤوسها نصف دائرية الشكل. قرونها الاستشعارية غريبة. جوفائها اسطوانية. بطونها قصيرة ، مخروطية المختر ، مهدبة التراج. مرزاتها قصيرة. اثوابها تزداح من الوردي الى البني. اجنتحها موهجة بالأزرق الفاتح.
- 18721 - **عَفْرُوتَة** (F). *Pourriture* (F). *Rot*, *Rottenness* (E).  
اسم شامل يطلق على عدة اوصام تصيب النبات بمختلف اعضاء سببها فطور مجهرية مختلفة.
- 18722 - **عَفِير** (S). *Amphicyllis* (F). *Amphicyllis* (E).  
جنس حشرات من فصيلة اليبديات ورتبة غشائيات الاجنحة. انزاعه المروفة قليلة العدد اصلاها معظم مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اجسامها صغيرة ، محدودة ، نصف كروية الشكل ، تطول نحو 2 م. رؤوسها مستعرضة. صونها قليلة البروز. تأشيرها بذكوكها قياسية ، ملاسها الفكية قصيرة. قرونها الاستشعارية صيغانية. كواسلها مستعرضة. الجحاده لافقة. قوائمها ذبيلة ، مهدبة. اثوابها لامة يكثر فيها الجروي والامود البنفسجي المواج والكتشي الاسفع تتعيش على الفطور وعلى الاغصان السائرة الى الانحلال.
- 18723 - **عَفِين** (F). *Ptomaline* (F). *Ptomain* (E).  
عنصر قلوي التركيب ينجم من انحلال المواد العضوية. ج. حشيتان.
- 18724 - **عَفِي** (F). *Jauge* (F). *Trench* (E).  
حفرة مستطيلة في الارض توضع فيها الفراس المقفولة من المشتل ريثما تدرس في مستورها.
- 18725 - **عَقَاب** (F). *HAigle* (F). *Aquila* (E).  
العقاب كوكبة نجم شمالية الميخ. مركزها بين كوكبة حور وسبة وكوكبة الدلجين. عدد نجومها 15 اشهرها «البشر» او «النسر الغائر» الذي يولجحه النسر الواقع من كوكبة القيثارة. نجم «الشاهين» و «ذئب العقاب» و «انور الظليين» في ذئب العقاب.
- 18726 - **عَقَاب** (S). *Aquila* (S). *Aigle* (F). *Eagle* (E).  
جنس طير من الكولاس وفضيلة السمقرليات يشغل اقل الجوارح واعتادوا واشدها بأساً وابيسها مزاجاً واحداً بصرأ وارسها طرائاً لانزاعه هدبية مجيها مسرولة ، قوية الخالب الحادة ، قصيرة الناصر ، بحجة البهائر اللرية. تصيد فريستها ولا تقع على الجيف الا اذا مضها الجوع. تدن اركانها في قم الجبال بين الصخور الناتئة او في قنات الانجهار البسقة. انائها تقع من وقتين الى اربع رنات تحضها وحدها نحو 6 اسابيع. قيل فيه: العقاب سبه الطيور والنسر حريقها. كنيته ابو الاشيم وابو الحجاج وابو حسان وابو الدهر وابو الحيم. والاثنى ام الحواح و ام الشمور وام طلبة وام لوح. من اسمائها: سهم لقرة وعقاف منرب في أشهر انواعه ما يتبع:



مثيل

### ١٨٧٣٨ - عقاب مُسَيَّرَة ، عقاب البادية ، خُصَّارِيَة

*Aquila pennata, A. minor, A. nipalensis* (S). *Algle botté, A. nain, A. des stappes* (F). *Steppe eagle, Booted eagle* (E).

طائر من العقاب الصغيرة لونه ، طوله نحو ٥٠ سم. وبسطه ١٢٠ وهو أسرع السطين للطير والقف ، ايض النكين والصعر والطين || اصطناع البؤلة الحارة والمعدلة يحويها باستمرار وهو لا يفرق الاسراج الكثيفة والبادية لكنه لا ينظم من ورود مجاري للذ || والعقاب المسيرة تألف الحيلة الجماعية سرها يراوح بين ثلاثة وتسعة ازواج . تصيد القوامش والبرقش والقرزور والواغ . اثناء تحضر مرة واحدة في السنة من وقتين الى ثلاث وقتان.



عقاب ذهنية

### ١٨٧٣٩ - عقاب مؤزَّرة

في السهول ، طائر من العقاب ، اظلم .

### ١٨٧٤٠ - عقابية • *Biogenèse* (F). *Biogenisis* (E).

نظرية بيولوجية تأسس النظرية القائلة بالتنازل الذاتي . عودها ان كل كائن حي يتولد من كائن حي آخر .

### ١٨٧٤١ - عقابدة • *Insolubilité* (F). *Insolubility* (E).

صفة الاشياء التي لا تنحل .

### ١٨٧٤٢ - عَقَار • هو اسمر ، اظلم .

### ١٨٧٤٣ - عَقَار • عَيْن ثَابِتَة

*Immeuble, Bien-fonds* (F). *Real, Real property, Estate* (E).

في مال لا يمكن نقله من مكانه بحكم طبيعته او بخصيصه والامكان الثابتة تصنف الى اربع فئات : || الاول : الاموال الثابتة بطبيعتها التي لا يمكن نقلها من مكانها بحكم طبيعتها كالاراض والشجر والمنازل || الثانية : الاموال الثابتة بالخصيص وهي بطبيعتها اعيان متحركة الا ان صاحبها الحقها بين ثابتة فأكسها لقوانين صفة الثبوت . الثالثة : الاموال الثابتة بالانقضاء او بالتصديق وهي حقوق تنصب حل من ثابتة غير حق الملكية || الرابعة : الاموال الثابتة بقرار المالك وهي حقوق متحركة يفرض عليها صاحبها صفة الثبوت مجازاً باقراره .

### ١٨٧٤٤ - عَقَار مُرْتَقِق • *Fonds dominant* (F).

المعار المرتفق او المنحصر هو الذي يتنفع من الارتفاق .

### ١٨٧٤٥ - عَقَار مُرْتَقِق بِهِ • *Fonds servant* (F).

المعار المرتفق به او الخادم هو الذي عليه حق ارتفاق لمعار آخر .

### ١٨٧٤٦ - عَقَار

المعار : عشية ترتفع قدر نصف القمامة وقره كاليندق وهو عضو البيت ولا يأكله شيء حتى انك ترى الكلب اذا لايه يموي ، ويسعى مفتر ناعمة . وتامة امرأة طبعته ربيد ان يقبح الخبيث بنائله فأكثه فقلها (السان) .

### ١٨٧٤٧ - عَقَارِي

*Foncier* (F). *Landed* (E). كل ما له صلة بالمعار كالمصرف العقاري والقصرية المقارية الخ .

### ١٨٧٣٠ - عقاب البادية

في العقاب المسيرة ، اظلم .

### ١٨٧٣١ - عقاب البحر

في الموريتانيا ، سمكة من الشفنيات ، اظلم .

### ١٨٧٣٢ - عقاب البحر الجفَّاعَة

*Mourine commune* (F).

في الموريتانية للملولة ، سمكة بحرية ، اظلم .

### ١٨٧٣٣ - عقاب الفصاة

في القسيطة الثالثة ، اظلم .

### ١٨٧٣٤ - عقاب ذهنية • ، عَجَزَة ، لَمَاعَة

*Aquila fulva, A. chrysaetos* (S). *Algle doré, A. royal, A. ferve* (F). *Golden eagle* (E).

طائر من العقاب وهو أجملها قدراً وأضخمها حجاً وأندما بأسا وبسطاً . طوله نحو ١٠٠ سم . وبسطه مقطوع نحو ٣٠٠ سم . لونه الى الصبغة الخطية يطولها توشح اسمر . رأسه مغطى ذهبيا الريش . اما باطن سبطه فذهبي البياض . زيكاه كدراء اللون . ذنبه الى الصبغة الاسراء يطولها تجميع متمرس || تألف الجبال الشاهقة للنبعة ، تثن وكها في صدره الصنوبر الثابتة او في امالي الاشجار الكبيرة الباسطة . اثناء تبيض مرة في السنة نحو ثلاث وقتان تحضها وحدها نحو ستة اسابيع || وهي تصيد كل ما دب وطار واستطاعت اليه سيك . وقد تفضل الشفولة والوجل والمعزاة والحمل ثم الثعلب والكلب والقرزور والسنور . لكنها لا تنف من البيل والارانب والسمور والقنصل والفاق والواغ والحمل الخ .

### ١٨٧٣٥ - عقاب رَحْمَاء • في الرخاء ، اظلم .

### ١٨٧٣٦ - عقاب سَعَعَاء • ، عَجَز الأَرَب

*Aquila clanga, A. naris* (S). *Algle criard* (F). *Spotted eagle, Rough-footed* (E).

نوع من العقاب كبير الجثة ، طوله نحو ٧٢ سم . وبسطه سبطه تفوق ٢٠٠ سم . ثوبه الى السرة الموحمة يطولها مولج اسمر يزدحم لثا ولسوداداً || اصطناع امال القدم وهي من الطيور الآتية التي لا تهجر حليا اثناء اشتداد الحر في ايام الصيف لتعود اليه منه قدوم الشتاء كما تألف مجاري الماء وترقب في الاماكن الرطبة || اثناء تحضر وقتين مرة واحدة في العام وحضها يفوق ستة اسابيع . وهي من الطيور الثالثة الواجب حمايتها لانها تقضي حل جميع القوامش والزناجات بما فيها الاناعي .

### ١٨٧٣٧ - عقاب قَيْصَرِيَّة • ، خَالِصَة ، خَطَايِيَة

ملكك المصنَّاع

*Aquila imperialis, A. heliaca* (S). *Aigle impérial* (F). *Imperial eagle* (E).

طائر من العقاب كبير الجثة ، طوله يراوح بين ٨٠ و ٩٠ سم . وبسطه سبطه من ٢٤٠ الى ٢٦٠ سم . ثوبه اصدا الصبغة ، اسفر المولج . ذنبه متجاسق الريش يطول توشح مريض لا يقاس الشكل والحجم || وهو من القوامش التي تجرب الماء . يألف الاسراج والسهول ولا يخش الاماكن الاكلة . يدفن وكنه في فنان الاشجار الرطبة او في صدوح الصنوبر النابتة . اثناء تحضر وسبعا مرة في العام من وقتين الى ثلاث وقتان || يصيد الارابل والياور والثعلب وكبير الطير ويقضي حل جميع القوامش من اي نوع كانت .



عقاب سَعَعَاء



عقاب قَيْصَرِيَّة

الشكل . أذنابها مجدانية . أثوابها مبقعة تكثر فيها الكلبة الصفراء يملؤها تنقيج أخضر بنفسجي المواج .

18754 - **عَقَان** ، **مَلَخ** (F). Dragon (F). Sucker (E).  
قضيبي ينمو من برعمة عرضية ناشقة على أرومة أو جذل بعض النباتات الملقحة .

18755 - **عَكِب** (F). Calcanéum (E).  
هو مؤشر القدم .

18756 - **عَقَب** (F). To vary or rotate (E).  
رتب الزراعات الحقلية على طريقة دورية تماثلية وفقاً للمراج خاص يعرف بالدورة الزراعية .

18757 - **عَقَبَان** (F). Algues, Aquilans (F).  
Eagles, Aquila (E).  
عارة طير من فصيلة الصقريات تشمل ثمانية أجناس وهي العقاب والبوهوك والنس و الترفيت والدلفون واليمق والبشيطه والسرلوف . جميعها كبيرة الجثة قوية المنسر الجالس الانتشاب الاسمين البهرة الشديدة الانشقاف الحادة الطرف .

18758 - **عَكِيي** (F). Calcanéen (F). Calcanéal (E).

18759 - **عَكِي** (F). Biogène (F). Biogen (E).  
لمت تعريفه يطلق على ما يحدث الحياة أو ينشأ الخصائص الحيوية وينبضها .

18760 - **عَقَمَة** ، **عَقِمَة** (F). Variété (F). Variety (E).  
هي القرب ، أطلبه .

18761 - **عَقْد** ، **قَوْس** (F). Cintre (F).  
Arch, Curve (E).  
هو القوس الخشبي الذي يستعمل لبناء المقعد عليه وهو البناء على شكل قوس .

18762 - **عَكِيد** (F). Trachelospermum (S).  
Trachelosperme (F).  
جنية عارضة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم . أوراقها متقابلمة معتقة ايضاً . نصلها يفيثي الشكل ذرب الزايم الاخير يطول نحو ٧ سم . ويبرش ٤ . وهي طيبة نائمة تلحم المرحاح بصرته ويدين زفل || ازهارها يفضا اللون ، عرقة الرائحة ، حلقية التجميع ، تاجية الارتكاز . ثمارها جراء اسطوانية الشكل تطول نحو ١٥ سم . زهورها مستتيلة القنطرة البورية || ازهارها يستمر من نيسان الى ايار .

18763 - **عَقْد** (F). Nouaison (F).  
راجع انتقاد - هو في النبات بدء تكوين البزرة بدء اتصال البويض البليضية أي بدء اخصابها .

18764 - **عَقْد** ، **عَمَل** ، **تَصَرَّف** (F). Acte (F). Deed (E).  
هو الابانة التي تنشأ آثاراً قانونية وقد صار تدوينها في وثيقة كتابية تثبت صحتها .

18765 - **عَقْد** (F). Contrat (F). Contract (E).  
المقد والاتفاق قد توافق الإرادة بين اثنين أو أكثر على انشاء التزامات فيما بينهم .

18768 - **عَقَاصَةُ الْعَنْبِ**

هي أدويس الكربة ، أطلها .

18769 - **عَقَاصَة** (F). Dent canine de la vipère (F).  
Canine tooth of the viper (E).

هي التيب المدية الطرف ، الانبوية أو المتحدة التي تستعملها الأفعى لبع السم . ج عقاف .

18770 - **عَقَاصَةُ الْوَرْد** (F). Argropyloca ochroleucana (S).  
Argropyloca du rosier, Tordeuse du rosier (F).  
Argropyloca ochroleucana (E).

حشرة من فصيلة الفانلات ورتبة حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الادنى الى اروبة . فراشها صفة تميش على غزونها الاماني . سرقتها خافضة تميش على اوراق الورد بعد ان غطقتها بوشاح من التواس . جسمها صغير القد بطول من ٧ الى ٨ سم . يستطاع قنارح من ٢٠ الى ٢٢ سم . رأسها معتدل الجرم ، صغير الخطم ، للشهب اللون ، سيوري المواج . عينها زرقانية ، صغريتان ، ناشرتان . زياتها غيطيان . ملاسها الفكية والقفوية صغيرة . مرشها جعدة . جوشها ويطها الى الشبهة . روشتها الاماميان الى السلطة الزائرة يملوها تجنح اشهب تكنته ماجة زرقاء . روشتها الخلفيان الى الشبهة السوداء احداها ماجة || لها جيلان في الحول . تظهر فراشة الجيل الاول في اواخر نيسان وفراشة الجيل الثاني في اواسط تموز . تسرح في الليل وتبيت في الكبار . والاني تلقي المكن مباحدا او لطفاً صغيرة وتربة المدد تطفله مادة خروية تنقبها على الصفحات العليا من نصال الازوار || المور البري يستر في الجيل الاول نحو ثمانية اسابيع ويستمر في الجيل الثاني نحو ١٧ اسبوعاً وينتضي على الازوار التي تنغصها السرقه وتميش في داخلها على الخشب والمصاره || السرقه عند الادراك تمام تطول نحو ٢٠ سم . جسمها شبه اسطواني الشكل ، مستفص الوسط ، اخضر اللون ، اصفر المواج ، يملو في كل سكة من سكم البطن طوق من الثمرى السيد الخشبة بالهلب . رأسها وذقنها الصدريه الى السرة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر في الجيل الاول نحو ١٥ يوماً ، يستمر في الجيل الثاني نحو ٢٠ اسبوعاً وينتضي ضمن وثقة مفتوحة كالبوق ، وشبكة بخبوط حريرية المادة .

18771 - **عَقَقَاق** ، **عَقَق** (F). Gestation (F).  
Pregnancy (E).  
المَعَقَّاق والمَعَقُّ : الحمل عند الحيوان عامة وعند ذوات الحافر خاصة . والحامل من ذوات الحافر تدعى المَعَقَّق ج عَقَق وعَقَقاق .

18772 - **عَقَقَالِيَر** (F). Drogues (F). Drugs (E).  
ما يتناول به من الادوية . وقال الجوهري : العقاقير اصول الادوية .

18773 - **عَقَقَام** (F). Platurus (S).  
Plature (F). Platurus (E).

جنس حيات خبيثة سامة من اساميات الاخاديد وفصيلة الهيدرويات . انواعه المعروفة قليلة المدد اصطلها بمجار البلاد الحارة اخصها البحر الاحمر والمحيط الهندي وبعض مناطق المحيط الهادي || اجسامها مبطلة مستطيلة ، تطول من ١٢٠ الى ١٤٠ سم . رؤوسها صغيرة شبه مخروطية



عَقَاصَةُ الْوَرْد



عَقَام



18779 - **عَقْدُ الْمُعَاوَضَةِ** (F). **Contrat à titre onéreux**

هو ما أخذ فيه كل من المتعاقدين مقابلًا لما أُعطى .

18780 - **عَقْدُ الرِّعْدِ ، مَتْرُوعُ الْعَقْدِ**

(F). **Avant-contrat** (E). **Advance contract** (E).

هو الاتفاق اللفظي المنبثق مع تعهيد المسؤولية المتقاة على تحقيق الاتفاق للقول .

18781 - **عَقْدُ الرُّكَالَةِ ، تَوْكِيلٌ ، وَكَالَةٌ**

(F). **Mandat** (E). **Mandat** (E).

عقد يُعْطَى به المرء غيره أن يدل به باسمه شيئاً له . أما صيغ الرُّكَالَةِ فمفيدة فيها الباعثة والحالصة والصريحة والتفريعية والتبائية .

18782 - **عَقْدُ بَيْعٍ تَامِيٍّ**

(F). **Contrat pignoratif** (E). **Pignorative contract** (E).

عقد القراض على شكل البيع بالوفاء ببيع به المقرض مقادراً إلى المقرض ولكنه يحفظ بمجازة المقار للبيع ويُدفع سنوياً المقرض فوائد قرضه .

18783 - **عَقْدُ تَبَادُلِيٍّ ، عَقْدُ مَلْزُومِ الطَّرِيقَيْنِ**

(F). **Contrat synallagmatique** (E). **Indented deed** (E).

هو الذي يلتزم فيه كل فريق من المتعاقدين نحو الفريق الآخر كعقد البيع فانه يتقابل فيه التزام البائع بنقل ملكية المبيع وتسليمه . والزام الشاري بدفع الثمن وتسليم المبيع .

18784 - **عَقْدُ تَبَرُّعٍ** (F). **Acte à titre gratuit**

على قضائي قوله تملك حق أو مال بلا بدل يؤخذ أو معاوضة تشترط .

18785 - **عَقْدُ تَعْيِيٍّ** (F). **Contrat accessoire**

(E). **Accessory contract** (E).

هو ما كان تابياً لقد أصلي قائم قبله كالكفالة والرهن .

18786 - **عَقْدُ تَحْفِظِيٍّ ، عَمَلٌ تَحْفِظِيٌّ**

(F). **Acta conservatoire** (E). **Conservative deed** (E).

عمل يراد به انقاذ مال من خطر ملحق .

18787 - **عَقْدُ تَرَافُضِيٍّ** (F). **Acte consensual**

(E). **Consent deed** (E).

هو العقد الذي يكفي لانقضاء الإيجاب والقبول بين المتعاقدين مهما كانت طريقة إجراءه .

18788 - **عَقْدُ تَوْكِيدٍ** (F). **Acta confirmatif**

(E). **Confirmative deed** (E).

عقد قانوني يُزِيلُ به عاقبة عيوباً كانت لصيقة بعقد سابق .

18789 - **عَقْدُ جَامِعٍ** (F). **Contrat collectif**

(E). **Collective contract** (E).

هو الذي ترتب فيه أفراد جماعة معينة بمجرد رضاه متوحد .

18790 - **عَقْدٌ حِكْمِيٌّ** (F). **Quasi-contrat**

(E). **Quasi contract, implied contract** (E).

العقد الحكمي أو شبه العقد تسمية تطلق على الالتزامات التي يتكبد صاحبها أعمالاً إرادية غرضية يفتقر منها تمهيدات الغير كالمضاربة ودفع غير المستحق ، الخ .

18791 - **عَقْدٌ عَلَى التَّخْفِيفِ**

(F). **Acte à titre particulier** (F).

هو تملك عين أو امتياز مملوكة أربابها .

18792 - **عَقْدٌ احْتِيَائِيٌّ** (F). **Contrat aléatoire**

(E). **Aléatory contract** (E).

ويدعى عقد المخاطرة أو عقد الفرو . عقد يشترط فيه المتعاقدين أو أحدهم سخطاً من الريح أو أمناً من الخسارة إذا وقع حادث غير مفسد الخسائر .

18793 - **عَقْدٌ إِدَارِيٌّ** (F). **Contrat administratif**

(E). **Administrative contract** (E).

هو كل عقد تنفذه الإدارة في سبيل إنجاز أعمال عامة أو خاصة مروها للخدمة العامة أو الخاصة .

18794 - **عَقْدٌ أَوْسَمِيٌّ** (F). **Contrat solennel**

(E). **Solemn contract** (E).

هو الذي لا يكفي لانقضاء الإقرار بالواجب بل لا يكون صحيحاً إذا لم تتيج في تكوينه مراسم خاصة حددها القانون .

18795 - **عَقْدٌ اسْتِثْنَائِيٌّ**

(F). **Fiducie**

عقد يلتزم به مشتري العقار ظاهراً بأن يرد له البائع شيئاً يليه له بالاتزامات التي قطبها على نفسه نحو .

18796 - **عَقْدٌ إِسْنَادِيٌّ** (F). **Acta attributif**

(E). **Attributive deed** (E).

هو عقد موضوعه نقل حق إلى شخص أو إسناده إليه .

18797 - **عَقْدٌ أَصْلِيٌّ** (F). **Contrat principal**

(E). **Principal contract** (E).

هو ما كان مستقلاً عن عقد آخر كالبيع والإيجار .

18798 - **عَقْدُ الإِدْخَانِ** (F). **Contrat d'adhésion**

(E). **Adhesion contract** (E).

هو عقد وضع شروطه الجبرية مقدماً أحد أطرافه ليشتمل بها مع كل من يرغب في التعامل معه .

18799 - **عَقْدُ التَّبَرُّعِ** (F). **Contrat à titre gratuit**

(E). **Gratuitous contract** (E).

عقد يولي به أحد الطرفين الطرف الآخر فائدة بلا عوض .

18800 - **عَقْدُ التَّرَافُضِيِّ** (F). **Contrat consensual**

(E). **Consensual contract** (E).

هو الذي يكفي لانقضاء الإقرار بالواجب .

18801 - **عَقْدُ الْجُرُورِ** (F). **Vipère commune**

(E). **Common viper** (E).

حيّة خبيثة سامة تسمى أنثى مذنوبة . أظلمها .

18802 - **عَقْدُ انْتِظَانٍ**

(F). **Acta expectantiae**

(E). **Expectantive deed** (E).

عقد انتظاني كوكب ثمر من الرضاء . اطلب رضاء .

18803 - **عَقْدُ الْعَمَلِ** (F). **Contrat de travail**

(E). **Labour contract** (E).

هو اتفاق الذي يرصد امرؤ به لشاغل وسماغة على خدمة امرئ آخر فيسمل تحت إشرافه مقابل جمل يلقى أجره . وهو في الفرق الشائع التناقد الذي يشمل مجموعته المامل لدى رب العمل .

18804 - **عَقْدُ الْعَمَلِ الْمُشْتَرَكِ**

(F). **Contrat collectif de travail**, **Convention collective de travail** (F). **Collective contract of labour** (E).

هو اتفاق جامع يرم بين رب العمل أو عمالته وبين عمال إحدى النقابات . موضوعه تنظيم شروط العمل التي تحمّر على أساسها العقد الفردية بين رب العمل وأعضاء هذه النقابات .

## ١٨٧٩٢ - عقد على الشئول

(F). Acte à titre universel

هو تلك نفس اموال شخص أو كلها بلا تعيين ولا تخصيص .

## ١٨٧٩٣ - عقد عيني

(F). Contrat réel

(E). Real contract

هو الذي لا يتمد إلا بتسليم المقيود عليه كالأدوية والنقود ورن الحياة .

## ١٨٧٩٤ - عقد غير مسمى

(F). Contrat innommé (F). Unnamed contract (E).

هو الذي لم يخصص القانون باسم معين بل أخضع لشروط واستكامه لقواعد العامة المقررة لجميع المقيود .

## ١٨٧٩٥ - عقد فوري

(F). Contrat instantané

(E). Instantaneous contract

هو الذي يكون تنفيذه فوراً بدأ به متى شاء ذلك المتعاقدان .

## ١٨٧٩٦ - عقد قضائي

(F). Contrat judiciaire

(E). Judiciary contract

هو الذي ينفذه الخصوم أمام القاضي خلال الدعوى ليفضوا به موضوعاً متنازعاً فيه .

## ١٨٧٩٧ - عقد متبادل

(F). Contrat commutatif

(E). Commutative contract

هو الذي يعيد المتعاقدان فيه معنى الزام كل منهم فيعرفه الحللي ما أعطى والأخذ ما أعطى أو تفرغاً .

## ١٨٧٩٨ - عقد مزدوج الأطراف

(F). Contrat bilatéral

(E). Bilateral contract

هو ما عقدته ماعدان بالرضا والاتفاق .

## ١٨٧٩٩ - عقد مسمى

(F). Contrat nommé

(E). Named contract

هو ما خصصه القانون باسم معين كالبيع والمقايضة والشركة والوديعة والمارية .

## ١٨٨٠٠ - عقد مكوكة

(F). Acte à titre onéreux

عقد لا يمد بكتابة على المقيود له إلا إذا قدم بدلاً عنها .

## ١٨٨٠١ - عقد متعبد

(F). Contrat successif

(E). Successive contract

هو الذي يشترق تنفيذه مدة من الزمن كالإجارة وعقد العمل والبيع بالتقسيط الخ .

## ١٨٨٠٢ - عقد متفرّد

(F). Contrat unilatéral

(E). Unilateral contract

هو الذي لا ينشأ التزامات إلا في جانب واحد . كالمارية فان حل المستير ان يردّها وليس حل المير اي الزام .

## ١٨٨٠٣ - عقد ناجز

(F). Contrat en mains

(E). Contract in hands

من عقد البيع التي لا يترتب فيها حل الشاري أي نفقة من تفقات التصريح ورسوم التسجيل ، بل تكون كلها حل البائع .

## ١٨٨٠٤ - عقد كاه

(F). Loupe, Nœud

(E). Wen, Knob, Knot

المقطة والبصرة تنوع غشحي في سوق بعض الانجبار .



عقرب اسود



عقرب اصفر



عقرب اكمه

## ١٨٨٠٦ - عقد عتاكريه، عقد ذريه

(F). في السلمة ، اطلبها .

## ١٨٨٠٧ - عقدية

بكتيرية مستديرة الشكل تعرف بالسلمية ، اطلبها .

## ١٨٨٠٨ - عقرب ، قنصل

(S). Scorpion (F). Scorpion (E).

العقرب الذكر والانثى حل السواء . ج عقارب . وعند التخصيص يقال للذكر عقربان وللائي عقرباء وعقربة || والعقرب جنس دويبات خبيثة سامة من فصيلة الشبهيات ورثة المبريات . انواعه عديدة مختلفة الاحجام والانلون . طولها يراوح بين ٢ و ١٥ سم . جميعها دويبة تسرح وتسي في الليل وتختبئ في النهار . تحمل في طرف ذنبها ابرة متنفقة ، سادة الحمة ، جوفاء . تتصل بها غدتان تفرزان مادة قلووية سامة . وهي تستعمل ابرتها للدفاع عن النفس أو لتخدير وقص فريستها من الطماء الصغيرة .

## ١٨٨٠٩ - عقرب اسود ، عقرب اصفر

(F). العقرب

(S). Euscorpion flavicauda (S).

(F). Scorpion noir, S. à queue jaune (F).

(E). Black scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . جسمه صغير القد ، اسود اللون ، اسير الذنب الخشن المواجه . بطنه مسكي التركيب مفلطح الشكل ينتهي بذنب معضل الشخانة ، سداسي السكم ، يحمل في اوله مبطان مفلغان الشوار الجنسي ويحمل في طرفه شولة متنفقة سادة جوفاء يستعملها في بث سمه . عينا مركبتان صغيرتان البصر لقصير البال . مقبناه الفكك كبير الجرم . مبطانه دقيقا الانسان التي يبلغ عددها عشرة ازواج عند الذكر و١٢ زوجاً عند الانثى || الذكر اصغر قدماً من الانثى ، يطول نحو ٣٥ سم . اما الانثى فتطول نحو ٤٥ سم . مسرحة دجوي . قوته الحشرات المختلفة الاجناس وكنها ويرقاتها || الانثى تساقط بصر ثلاث سنوات وتمشي نحو خمس سنوات . اما الذكر فيعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات المؤذية الفارة .

## ١٨٨١٠ - عقرب اصفر ، شيدع اصفر

(F). Buchus australis (S). Buchus jaune, Scorpion

(F). Yellow scorpion (E).

نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . موطنه البلاد الحارة والمعتدلة الحارة من العالم القديم || جسمه كبير القد ، اصفر اللون الباهت . بطنه مفلطح ينتهي بذنب مبسط سداسي السكم . شوكه قوية متنفقة جوفاء سادة الحمة . لثنته مؤلة . سمه شديد الاذى || عينا مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات . مقبناه الفكك مسنن الحلقة للامثلة . مبطانه كثير الانسان التي تبطل عند الذكر ٣٠ زوجاً . وعند الانثى ٣٢ زوجاً || الذكر اصغر قدماً من الانثى ، يطول نحو ٦٥ سم . وتطول الانثى نحو ٨٠ سم . مسرحة دجوي . قوته كل ما داب واستطاع اليه سبلاً || الانثى وتضع شبيحة تمشي نحو ست سنوات وتساقط بصر سنتين . الذكر يعيش الى حين يحكم الانثى التي تقضي عليه || يعتبر من الدويبات الشديدة الاذى والضرر .

## ١٨٨١١ - عقرب اكمة ، رشك

(S). Bellisarius (S).

(F). Bellsar, Scorpion aveugle (F). Blind scorpion (E).

(F). نوع من العقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . موطنه

جميعها مفعولة : سوفها مدادة . اوراقها متعلقة كاملة .  
اندهارها فردية ، محورية ، مستطيلة الزوائد صفراء اللون .  
تمامها متفئة محددة وصحبة الطرف ، قلبية الشبه من ذنب  
المقرب وين اساراج بعض الحشرات || امروف انواعها  
للبلولة هي :

S. muricatus (S). Scorpione petite (F). عقربية صغيرة  
S. varicellatus (S).  
Scorpione grosse (F).  
S. sulcatus (S). Scorpione rayée (F). عقربية ملتمة ، ودة  
S. subvillous (S). عقربية وبرة ، سليفية  
Scorpione velus (F).



عقرب حنطي

١٨٨٢٠ - عُقْرَبْل  
Eléphant pleine (F).  
She elephant with young (E). أنثى الفيل الحامل

١٨٨٢١ - عُقْس  
Pterocéphale (S).

شجرة ممررة زياد من فصيلة البتسليات . ساقها فراء .  
فروعها غطاء ملونة . اوراقها متعلقة ، معتمة ، اجاسية  
الشكل . لصلها جامد النسيج ، لونه الى  
الخضار الاصفر . اندهارها محورية كبيرة اللثة ، اندها  
الى البتسليتي تملو شعبة ودية .

١٨٨٢٢ - عُقْمَة  
Pointe de la feuille (F).  
Point of the leaf (E). في طرف نصل الورقة للمب .

١٨٨٢٣ - عُقْمِيّ  
هو البيق ، اعليه .



عقربية

١٨٨٢٤ - عُقْمَقْ ، كُنْدُش  
Pica (S). Pie (F).  
Magpie (E). Estorn (D).

جنس طير من فصيلة القرابيات . اندها حنيفة ، اصنافها  
المال . اندها بقعاء . اندها طرية . امروها عتمة .  
قوتها الحشرات والجرب والنيار ويروض الصائير . وين  
طابعها اختلاط كل ما يهر نظرها . تألف الحادق  
والانبات القريبة من الممران . تقطن في الانجار الرمية .  
اندها تبقيش من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها رسعا نحو ٣  
اسباح || وده اعطفها في سبب تسميت عتقما فقال  
المجاسط لاته يبق قراعه كسائر القربان ويقل اشتقاق  
من صوته . قال الشاعر :

اذا ياربك الله في طائر فلا ياربك الله في العتق  
طويل الذناب قصير الجناح حي ما يجد غلفة يرق  
يقلب عينيه في رأسه كأنها قنطرة تريق

١٨٨٢٥ - عُقْمَقْ اَزْرَقْ \*

Pica cyaneus, Cyanopica cyaneus (S). Pie bleue (F).  
Blue magpie (E).

نوع من العتق طوله يراوح بين ٤٠ و ٤٥ سم . لونه  
ازرق اللون ابيض . رأسه الى السواد القاتم . رسعا الى  
السرة الخلفية . يألف الحدائق والنبات والاسراج .

١٨٨٢٦ - عُقْمَقْ مَعْرُوفْ \*

Pica caudata (S).  
Pie vulgaire, P. bavarde (F). Common magpie (E).  
نوع من العتق طوله نحو ٥٠ سم . لونه اسود اللون ابيض .  
سقاوه ورسعا الى السرة القاتمة . يألف الحدائق والنباتات  
القريبة من الممران . وهو مبهول في جميع بلاد الشرق  
الواسط ويشتير من الطيور المؤدية للفتنة .

١٨٨٢٧ - عُقْفُ

Orcha (S). Orche (F).  
الرسدة عتقاوه وهي جنبة صغيرة اللثة من فصيلة السنايات .



عتق ازرق



عتق معروف

البلاد الحارة من العالم القديم . يألف المغاور والكهوف  
والالاية القديمة . مسرعه دجوي . قوته الحشرات ويكسها  
والذباب والحمام تقوده اليها حاملة اللحم ثم السع || جسده  
صغير اللثة يطول عنه الذكر نحو ٢٥ سم . يطول عنه  
الانثى نحو ٣٠ سم . ثوبه الى السرة الخلفية . بقله مفلطح  
سكني التركيب ينتهي بذب سداسي السكني يحمل في طرفه  
شولة جوفاء حادة الحمة يستعملها في بث سم لتفتير  
فريسته والزيد من الحياة || عيناها مركبتان عادتا البصر  
لذلك يدعى العقرب الاكبر || الانثى تميش نحو خمس سنوات  
اما الذكر فيعيش الى حين يكوم الانثى التي تقفي عليه .

١٨٨٢٢ - عُقْرَبُ الْبَحْرِ

هو الجلاج ، من الاسماء البحرية ، اعليه .

١٨٨٢٣ - عُقْرَبُ الْمَاءِ  
هو سرطان البحر ، اعليه .

١٨٨٢٤ - عُقْرَبُ حَنْطِيّ \* ، شَبْدَعُ حَنْطِيّ

Buthus occitanus (S). Buthus brun, Scorpion  
brun (F). Brown scorpion (E).

نوع من المقرب ينتمي الى فصيلة الشبهيات . موطنه جميع  
المناطق الحارة من العالم القديم || جسده مستوط اللثة ،  
حنطي اللون ، مفلطح البطن . ذنبه مستدل الخيط ،  
سداسي السكني يحمل في طرفه شولة جوفاء حادة الحمة .  
عيناها مركبتان تبصران في جميع الاتجاهات لكنها ضعيفا  
البصر تقتصر المجال . مبطها الذكر مركبان من ١٨  
زويجا من الانسان . اما مبطها الانثى فن ٢٠ زويجا ||  
الذكر يطول نحو ٥٥ سم . والانثى من ٦٥ الى ٦٤ سم .  
مسرعه دجوي قوته الحشرات وكل ما دب || الانثى  
تميش نحو ست سنوات . اما الذكر فيعيش حتى القيام  
بمصلحة الكوم || يعتبر من اللويحات الشديدة الانثى  
والضرر .

١٨٨٢٥ - عُقْرَبَان

Scorpion (mâle) (F).  
Scorpion (male) (E).

ذكر المقارب يعيش الى حين يكوم الانثى حيث تقفي  
عليه .

١٨٨٢٦ - عُقْرَبِيَّات

Scorpionides  
رتبة دويبات خبيثة من التكبويات . ضالها سبع  
عائلة الاشكال والاجسام والالوان . اشهرها فصيلة  
الشبهيات التي تحوي المقارب .

١٨٨٢٧ - عُقْرَبِيَّاتُ الْمَاءِ

Nepidae (S).  
Népides (F). Nepidae, Water scorpions (E).  
Wasserskorpione (D).

فصيلة من بق الماء التابعة الى رتبة نصفية الاجنحة .

١٨٨٢٨ - عُقْرَبِيَّاتُ كَاذِبَةٌ

Pseudoscorpionides  
رتبة من التكبويات . اجناسها وانواعها عديدة تجتمع  
الى فصليتين . شتراتها عادية اللحم ، صغيرة اللثة ، مبططة  
الاجسام ، مستطيلة اللامس .

١٨٨٢٩ - عُقْرَبِيَّةُ \* ، ذَنْبُ الْعُقْرَبِ

Scorpiurus (S). Scorpione, Ornithopse, Chenille,  
Chenillette (F). Scorpion's tail, Casapillar plant (E).  
Raupenkraut, Raupenklee (D). Coda di scorpione (I).  
جنس نباتات عشبية برية مدادة من فصيلة القرنيات  
الفراشية . اندها عتفاوه مهدها حوض البحر المتوسط .

قوائمها نشطة . ثوبها الى البني الاسفع المروج || تألف الثعالب التي يكثر فيها الزئان والمليول . يرقها مراقبة تميش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة .

١٨٨٣٣ - عَقَقَانِيَّات ٥ Eucnemidae (S). Eucnemididae (E).

فصيلة حشرات من عُمَدِيَّات الاجنحة . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها صغيرة ، مستطيلة الشكل . متدلة التطبيع ، تطيل من ٤ الى ١٢ م. ورجوها مستعرضة التقف . عيونها بارزة . تأثيرها ودياسها نظامية . قرونها الاستشرارية متباينة الاشكال منها الخيطية والشطبية والمسننة والمنشارية ، جميعها مؤلفة من ١١ فصلة . كواسلها لاقامية ، يكثر فيها التريب . اتحادها لاشعة . قوائمها نشطة . ارساغها خاسية القفل . اولها ملونة || تألف الثعالب . مظهرها دجوي المسرح . جميعها خاسلة ودامنة . يرقاتها مراقبة تموش حيث تنقف على المواد النباتية المنحلة || أشهر اجناسها الميقتيد .

١٨٨٣٤ - عَقَوِيَّة Peine (F). Penalty (E). هي الاقتصاص من المجرم باسم المجتمع .

١٨٨٣٥ - عَقَوِيَّة Correa (S). Corréa (F). جلس نباتات برية ورتينينة من فصيلة السذابيات . انزاعه قليلة جميعها نجيرات صغيرة القند تملو من ١٠٠ الى ٣٠٥ م. سطوها فرعا زياه . اوراقها ابيدة متقنة متقابلة . نصلها اهلجيلي الشكل ، جامد النسيج ، خلي الصفعة السفل . انزاعها يبقية ، وديعية البتلات المنصعة ، ثمانية الاسدية . اولها زاهية بها الياض والوردي والفسفي والاحمر || انزاعها يستمر من نيسان الى تموز .

١٨٨٣٦ - عَقَوِيَّ Pleine (F). Full (E). العفوق هي الاثني الحامل من ذوات الحافز والظلف خاصة ج عَقَوِيَّات .

١٨٨٣٧ - عَقَبَان Or natif (F). Native gold (E). هو الذهب الصرف الطبيعي .

١٨٨٣٨ - عَقَبَب هو المرة الروداء ، اطلبها .

١٨٨٣٩ - عَقَبَد Insoluble تمت تمريني يطلو على كل مادة لا تلوو وصل كل عمل سحابي وما اشبه لا ينحل .

١٨٨٤٠ - عَقَبَد Plinthe (F). Plinth (E). سطح مربع في قاعدة حرد او في تاجه .

١٨٨٤١ - عَقَبَد هِنْدِي هو الكركم الهندي ، اطلبه .

١٨٨٤٢ - عَقَبَب هو السيرة الزياه ، اطلبها .

١٨٨٤٣ - عَقَقَانِيَّات ٥ Calotermitidae (S). Calotermitidae (E).

فصيلة حشرات قارضة دجوية من رتبة العققانيات . انواعها عديدة جميعها غليظة الرووس ، قوية المشافر ، عادمة اللون . قوتها المواد الخشوية والسيلولوزية . نياكها رداء

بائها فرعا تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ م. اوراقها لاشعة متقنة سنانية الشكل . نصلها بطول نحو ١٥ م. وهو جامد الصفعة ، خلي البثرة ، جنثيل البرف . انزاعها متفوي النسيج ، محوري الاوتكار . انزاعها صغيرة القند ، صفراء اللون . اوراقها غزيرة للمادة الجمالية القتالة تقتل القلة والبقرة . تؤذي الحمر ولا تفسر بالابل .

١٨٨٣٨ - عَقَقَانِيَّات ٥ ، ايزوثر ٥ Isoptera (S). Isoptera (E).

رتبة حشرات قارضة صغيرة الجسم ، مستطيلة الشكل ، غليظة الرأس ، قوية المشافر الحادة ، طويلة الاجنحة عند وجودها . نظامها الاجتماعي والاقتصادي نظام النمل . نياكها تحت الارض وقوتها وداخل الاشعاب . اشهر فصائلها : الارضيات والعققانيات .

١٨٨٣٩ - عَقَلَّة ، قَسَلَّة ، قَلَم ، عَقَب Bouture (F). Slip (E). قضيب او جزء من قضيب يفصل عن النبات ويفرس . والقفل تقع على اشكال خطفة اعصها :

عَقَلَّة برعية او زيمية Bouture à oeil (F). Slip for bud (E).

عَقَلَّة جذرية Bouture par racine (F). Slip by root (E).

عَقَلَّة جمروية Bouture de rhizome (F). Slip of rhizome (E).

عَقَلَّة ديبية Bouture à talon (F). Slip at butt (E).

عَقَلَّة لندية Bouture par rampeau (F). Slip by bough (E).

عَقَلَّة علية Bouture à crosse (F). Slip for cutting (E).

عَقَلَّة ورقية Bouture par feuilles (F). Slip from leaves (E).

١٨٨٣٠ - عَقَم ، عَقَر Stérilité (F). Sterility (E). البقم والققم : حال الاثني التي لا تحمل .

١٨٨٣١ - عَقَقَنْصَة ٥ Volucella (S). Volucella (F). جنس حشرات من فصيلة السريديات . الوامه عديدة . طوطا يراوح بين ١٢ و ١٨ م. تتميز بسمرة طرانيها وفسفران اوراقها المجددة واللديجة بالاسود والياض . يرقاتها قاسية الجلد ، كثيفة الهلب للسطل . مظهرها يمش على في ووسع الزناير . واثرها قاتل وما اشبه . اشهر انواعه :

عَقَقَنْصَة زياه ٥ V. bombylans (S).

عَقَقَنْصَة شحافة ٥ Volucelle bourdon (F).

عَقَقَنْصَة شحافة ٥ V. pellucens (S).

عَقَقَنْصَة شحافة ٥ Volucelle transparente (F).

عَقَقَنْصَة شحافة ٥ V. xomaris (S).

عَقَقَنْصَة شحافة ٥ Volucelle zonée (F).

١٨٨٣٢ - عَقَقِيد ٥ Eucnemis (S).

حشرة وجيلة الجلس والروع من فصيلة العققانيات ورتبة عُمَدِيَّات الاجنحة . اعضاءها بعض مناطق اوروبية الشمالية والوسطى وديال الشرق الاقصى || جسمها صغير القند ، مستطيل الشكل ، قريب اليه بالسائل . طولها نحو ٨ م. رأسها صغير . صيغها يارتزان . تأثيرها ودياسها الفكية مستقلة الجسم . زيانهاا مشطيان . كواسلها شبه مربع الشكل . غذائها لاشعنان يطولها تحفيد تحيل قاطب .



مقنصة زياه



مقنصة شحافة



مقنصة شحافة

## ١٨٨٥١ - عَفِيفَةٌ عَفِيفَةٌ

*Tradescantia pilosa* (S). *Ephémère veuve* (F).  
عشبة ترينينية معمرة تملو نحو ٥٠ سم. أزهارها شطبية  
فرداء. أوراقها لائقة متعاقبة. تصلها صني الشكل،  
خلي البشرة حل صفحته بطول نحو ٢٥ سم. ويعرض  
أزهارها نحو ٢ سم. أزهارها كثيرة العدد ليلكية اللون || أزهارها  
يستمر من حزيران إلى تشرين الثاني .



عَفِيفَةٌ

## ١٨٨٥٢ - عَفِيفَةٌ فَرَجِيَّة

*Tradescantia virginiana* (S). *Ephémère de Virginie* (F).  
عشبة سرطونية معمرة ساقها متعقبة فرداء تملو نحو ٦٠ سم.  
أوراقها لائقة متعاقبة : تصلها ضيق الصلصلة مدلب  
المقصعة بطول نحو ٣٠ سم. ويعرض من ٢٥ إلى ٣٠ سم.  
أزهارها جملة الشكل تعرض نحو ٣ سم. الوانها تختلف  
باعتلاف الضروب فيها الأزرق والبنفسجي والأبيض  
والوردي والاحمر || أزهارها يستمر من أيار إلى تشرين .

## ١٨٨٥٣ - عَفِيفَةٌ وَدِيَّة

*Tradescantia rosea* (S). *Ephémère rose* (F).  
عشبة سرطونية معمرة تملو نحو ٣٠ سم. أوراقها ضيقة  
التصل عددة تطول نحو ١٨ سم. يعرض من ٢ إلى ٣ سم.  
أزهارها وردية اللون مستطيلة الزناد || أزهارها يستمر  
من حزيران إلى تشرين الثاني .



عَفِيفَةٌ

١٨٨٥٤ - عَفِيفَةٌ  
*Génophère* (F).  
تختلف أشكال الانفعالات البنيية التي تملو حل عكر  
موصوف معين .

١٨٨٥٥ - عَفِيفَةٌ  
*Araignée* (mâle) (F).  
*Spider* (mâle) (E).  
ذكر النكبوت .

١٨٨٥٦ - عَفِيفَةٌ  
*Communitaria*,  
*Permutaria* (F). *Rotary converter*, *Rectifying*  
*commutator* (E).  
المكاس جهاز خاص يسمح بتحويل التيار الكهربائي  
من متواصل إلى تناوبي والمكس بالمكس .

١٨٨٥٧ - عَفِيفَةٌ، عَفِيفَةٌ  
*Tolle d'araignée* (F). *عَفِيفَةٌ*, *عَفِيفَةٌ*  
*Colweb*, *Spider-work* (E).  
النكاش والمكاش والمكاشة : بيت النكبوت .



عَفِيفَةٌ

١٨٨٥٨ - عَفِيفَةٌ  
*Orbicle*, *Orbitaire* (F).  
نمت ترميني يطلق حل النكاش التي تسج حكاها  
كالشعاع . نواسه سهل الانكشاف ، جيد الحانة ، شديد  
القة ، يستعمل في تعبد لقياس المجهرة .

١٨٨٥٩ - عَفِيفَةٌ  
*Cosmopolite* (F).  
*Cosmopolite*, *Cosmopolitan* (E).  
حفة المدينة الجملة من كل طوائف البشر وصفة من  
لحب جميع البلدان وأهلها ومن اعتبر العالم كوكبه أو  
من كان العالم كله كيمض الحيوان والمير والنبات .

١٨٨٦٠ - عَفِيفَةٌ  
هي الجنسة ، أطلها .

١٨٨٦١ - عَفِيفَةٌ  
*Pollen récolté* (F).  
جذرات الريح يحج بها التحل عمل اساقها وساقها  
وانفادها تجملها في الشهد .

وانفاد دهايز قنينا بالطين في التربة وعلها وروق الاخشاب  
التي تفرعها || تميش في النظام . نظمها الاجنسية  
والاقتصادية قريبة الشبه من نظم التحل والانس ، فيها الملكة  
البويض والذكر الكامل والجند والمال الحانث || لشهر  
انواعها :

عَفِيفَةٌ \*  
*Reticultermes lucifugus* (S).  
*Termite lucifuge* (F).

عَفِيفَةٌ اصفر العتق \*  
*Calotermes flavicollis* (S).  
*Termite à cou jaune* (F).

عَفِيفَةٌ اهر \*  
*Hodotermes ochraceus* (S).  
*Termite ocre* (F).

١٨٨٤٤ - عَفِيفَةٌ \*  
*Gryphaea* (S).  
*Gryphée* (F). *Gryphceae* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحيات الخياشيم  
وفصيلة الحاربات . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في البحر  
الايوني المتوسط وفي بعض مناطق الاطلسي || اصداها  
تصنف مستوية الشكل ، متعقبة القدم ، لاسنوية  
المصاريع ، كبيرة اليسارية صغيرة اليمينية || انواعها  
المأكلة عديدة اشهرها المعقبة المقرنة (*G. angulata*) .

١٨٨٤٥ - عَفِيفَةٌ، عَفِيفَةٌ  
*Agave*  
حجر كريم من مركبات المرو (الكوارتز) المختلطة ببعض  
الكسيد الحديدي التي تصبها بالوانها المتخلية القائمة بين  
الاصفر والاحمر .

١٨٨٤٦ - عَفِيفَةٌ يَمَان  
*Omyx*  
نوع من البق الجية الصفب يتميز بخطوطه المتوازية  
الترتيب المشتركة المركز .

١٨٨٤٧ - عَفِيفَةٌ \*  
*Commelinaceae*, *Commelynaceae* (F). *Commelin-*  
*naceae* (E).

هي فصيلة الزولانيات من وحيات الفلقة . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد . اصطلها البلاد الحارة والاستوائية .

١٨٨٤٨ - عَفِيفَةٌ \*  
*Tradescantia* (S). *Tradescantie*, *Ephémère* (F). *Com-*  
*mos spider-wort* (E). *Tagblume*, *Dreimasterblume*  
(D). *Efemaro* (I).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة النكاشيات. انواعها  
عديدة معظمها بر ي وبضها ترينيني . أزهارها حامية ثلاثية  
الفصل والبيتلان، سداسية الاعمدة ، خلية الاقدام || اشهر  
انواعها ما يلي .

## ١٨٨٤٩ - عَفِيفَةٌ الرِوِي

*Tradescantia fluminensis* (S). *Ephémère de Rio* (F).  
عشبة سرطونية ترينينية معمرة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها  
بيضية مستطيلة . تصلها عاقب الخضار حل صفحته البلياء،  
بنفسجي الصفحة السفلى . أزهارها كثيرة العدد ، يضاء  
اللون ، عصارتها قابلة الحطب || أزهارها يستمر طوال  
السنه .

١٨٨٥٠ - عَفِيفَةٌ يَتَفَهَرُ  
*Tradescantia albiflora* (S). *Ephémère à fleurs blan-*  
*ches* (F).

عشبة ترينينية مركنية معمرة . سوقها مسطحة تنثرش عند  
كل مقدة . أوراقها بيضية الشكل ، قلبية القاطعة ،  
مدنية المقصعة ، تصلها جميل الخضار الزلفي . أزهارها  
قليلة العدد يضاء اللون || أزهارها يستمر من أيار إلى  
تشرين الثاني .

## ١٨٨٦٧ - عَكْبَر مُقْتَدِد

*Microtus oeconomus* (S). *Campagnol économe* (F). نوع من العُكْبَر ، موطنه البلاد الروسية ، طوله نحو ١٢ سم. وذنبه ٤ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف ، اذناه مستديرتان صغيرتان . ظهره الى الصهبة السراة الباقية . ايلاده الى الصهبة الصفراء بطنه ابيض اشقر || يعيش جماعات كثيفة العدد وهو من العُكْبَر القاطنة التي تجوب البلاد في طلب الحبوب والقمح . جسره القشري رطب الجوانب يخرن فيه ما لا يقل من ٥ كيلو من الحبوب والحبوب .

## Arvicolinés (F).

## ١٨٨٦٨ - عَكْبَرِيَات

العُكْبَرِيَات او قُرَان الزرع عارة حيوانات لبونة قاضية من فصيلة القَارِيَات . اجناسها وانواعها عديدة موطنها العالم . جميعها صغيرة القند ، اجسامها ريمية . رؤوسها مخروطية غليظة . مقاضها مقطومة . آذانها مستديرة بارزة . اذنانها صغيرة كاسية || اعرف اجناسها العُكْبَر واللمين والسفة .

Balai de sorcière (F).  
Witches broom (E).

## ١٨٨٦٩ - عِكْد

قمة من الاذن الكثيفة التجميع تشبه المكسدة تسبها بعض تطور التفرعية . راجع تفرعية .

## Nid d'araignée (F).

## ١٨٨٧٠ - عِكْدِيَّة

المكسدة كشكاش ليد النواص ، جرابي الشكل ، ينسجه المنكبيوت حيث يقع للاستراحة فيه .

## Base du cœur (F).

## Base of the heart (E).

## ١٨٨٧١ - عِكْدَاة

هي قاعدة القلب .

## Génotype (F). Genotype (E). ١٨٨٧٢ - عِكْر

هو الذي يمثل نتيجة عمل الجين في التركيب الخلوي وهذا ما يحصل التركيب العكري مثلاً لخصوبة الصفات الوراثية .

## ١٨٨٧٣ - عِكْر \* كِمَاءُ الْمَاء \* قَسْطِلُ الْمَاء

*Traps* (S). *Macre*, *Châtaine d'eau*, *Truffe d'eau*, *Tribule*, *Cornuella*, *Echarbot* (F). *Water chestnut*, *Water caltrop* (E). *Echte Wassernuss* (D). *Tribolo aquosum*, *Castagna d'acqua* (I).

جنس نباتات عشبية ، صقلية ، مائية ، حولية من فصيلة الاغديات . انواعه الزراعية ثلاثة ، اوراقها كبيرة القند مستطيلة الزناد فصلها مبسي الشكل متشاري الحافة . ازهارها فردية محورية بيضاء اللون . ثمارها جوزية شاذكة ، متباينة الاشكال ، كستنية اللباب المأكول .

## ١٨٨٧٤ - عِكْر أَبُو شَوَكْتَيْن

*Traps bipinosus* (S). *Macre à deux épines*, *Singhara* (F).

نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الهند والهند الصينية . ثماره كنية الشكل ثنائية الفصل الجالسة الخشبية الحادة الشوكية . دقيق لباها يستعمل في تحضير بعض الحلويات .

## ١٨٨٧٥ - عِكْر أَبُو قَرْيَيْن \*

*Traps bicornis* (S). *Macra bicornis*, *Ling*, *Ling Kio* (F).

نوع من العكر الشري تكثر زراعته في الصين حيث يستعمل في معظم المأكول الصينية . ثمرته تشبه رأس الكباش بقرنيه للثقفين سجمها سجم الكستنة . لباها حيد الصف وذا ما يجمعها تحتل المركز الاول بين انواع العكر .

## ١٨٨٦٢ - عَكْبَر

*Microtus, Arvicola* (S). *Campagnol* (F). *Vole*, *Field-mouse* (E).

جنس حيوانات لبونة قاضية ، من العُكْبَرِيَات وفصيلة القَارِيَات . انواعه عديدة جميعها صغيرة القند تتميز بفرازة ثمرها . اناثها تقصم من ثلثت الى اربع مرات في السنة كل مرة من ٤ الى ٦ ادوارس تيسر وتكسي يد بعضها بلسون وتسرح في طلب قوتها بمرسة اسابيع || قوتها الحبوب والجلود ومضغ المواد النباتية انحصارها لاه الاشجار في الشتاء عند الانواع العادة الليات الشتوي .

## ١٨٨٦٣ - عَكْبَرُ امْسَمَر \*

*Microtus glareolus, Arvicola glareolus* (S). *Campagnol fauve*, *C. des grèves* (F).

نوع من العُكْبَر ، طوله نحو ١١ سم. وذنبه ٤ ، قوته الى الصحراء يقيم مع اقرباه من تيج الظهور وينصرف الى اليباض عند الصبر واليباض || يألف المزوج والحقول والارحاج والافخاف والحدائق . يعيش جماعات كثيفة العدد تلج بعض الاوليف || قوته الحبوب والثمار والجلود ولكنة والجلود واه الاشجار عند الجوع .

## ١٨٨٦٤ - عَكْبَرُ الْبَر \*

*Microtus terrestis, Arvicola terrestis* (S). *Campagnol terrestre* (F).

نوع من العُكْبَر ، موطنه الشرق الاوسط ، طوله نحو ١٨ سم. وذنبه ٧ ، جسمه اسطواني الشكل مقبضه مقطوم الطرف . اذناه مستديرتان كبيرتان . قوته الى الصهبة الباردة يقيم قليل مع اقرباه من الظهور ويبض عند اليباض . يألف الحقل والمراعي ومضغ الاثر ويجاري الماء . قوته المواد النباتية على اختلافها من الحبوب الى الثمار والجلود والقمح وكما القصب .

## ١٨٨٦٥ - عَكْبَرُ الْحَقْل \*

*Microtus arvalis, Arvicola arvalis* (S). *Campagnol des champs* (F).

نوع من العُكْبَر ، موطنه فسح الارياب يمتد من الشرق الاوسط الى اطراف اربعة وين البلاد المصرية حتى امالي السودان . جسمه اسطواني الشكل ، طوله يبلغ ١١ سم. وذنبه ٣ ، قوته الى الصهبة الصفراء ، بطنه الى اليباض البني . عذب جرمزه ابيض . مقبضه متدل القضيبي اذناه مستديرتان صغيرتان || يألف الحقل والمراعي والارحاج والحدائق ويجاري الماء والمستقعات . يعيش على السواحل البحرية وفي الجبال حتى ارتفاع ١٨٠٠ م . يركض بسرعة يحمي السير ويحسن السياسة لكنه اخفق التسلق عليه || قوته جميع المواد النباتية مما كان صعلها وروها .

## ١٨٨٦٦ - عَكْبَرُ قَلْزَب \*

*Microtus amphibius, Arvicola amphibius* (S). *Campagnol amphibie*, *C. aquatique* (F). *Water rat*, *Water vole* (E). *Wasserratte*, *Mollmaus* (D).

نوع من العُكْبَر ، طوله ١٦ سم. وذنبه ٨ ، جسمه ضم الحية . مقبضه ذاتي الشكل . اذناه كبيرتان . قوته الى الصهبة السراة يقيم مع اقرباه من تيج الظهور وينصرف الى التبرة عند الصبر والال اليباض عند اليباض ونحوالي الجرام . يألف ضفاف البحيرات والانهر ويجاري الماء . يسبح ويطنس ويسلق الاشجار . قوته الحبوب والجلود والخشرات والقشريات والاسماك الصغيرة .



عكبر امسر



عكبر الحقل



عكبر قازب



عكر ابو قريين



عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ



عُكْرُ احمر



عُكْرُ المروج



عُكْرُول مَلَوَق

الانسياب . تعيش في الماء ولا تطفو على سطحه إلا عند الحاجة إلى تجديد الهواء إلى جسمها كبير فقد يطول من ٣٠ إلى ٣٥ سم . ثوبها إلى السمرة القصية يبلغها مروج اخضر . كوسلها وظهورها مغطون بخمار اصفر . وأصبا مشعشع الشكل ، قصير السطح . فكاهها قوالب . حينها كبرتات زاهتا مضيئة ، مستطيلة . غلارها مستدير الطرف اللاتس . جرابها صفراء اللون تتميز بغير الزوج الخلفي المبط الساق والارياض المدة لتجديد . ارسافها خلسة القمل || الاشي اكبر قنما من الدكر وابت ثوبا منه وابلغ تحديدا في غصنها || لها جيل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الخريف . قوتها كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا التي تقتنصها في الماء || الاشي تجمع المكان في لبر على صفحات الاوراق التي تلبس التراب . ينفخ لكن يده متعنه بنحو ثلاثة اسابيع عن يرقات مدونة الشكل ، حمراء اللون ، سود قرؤوس ، كثيفة الخلف تسمى الى الماء بعد التفت يربون وهي كالحشرات الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحشرات الدنيا والاوالي .

18884 - **عُكْرُولِيَّات** (Dytiscidae).  
Dytiscidae (F). Dytiscidae, Predaceous diving beetles (E). Schwimmkäfer (D).

فصيلة حشرات قاذمة ، مائية من رتبة غدييات الانجسة . اجنسها وانواعها المروفة عديدة ، معظمها من حشرات مياه المناطق الحارة . تألف المئات والاعوام والبيمرات والانهير الرائدة المياه ولا تطفو على سطح الماء الا عند الحاجة لتجديد الهواء إلى اجسامها متفائلة فقد منها الصغيرة اللقطة التي تطول نحو ٢ سم . ونسها الكبيرة المستفضة التي تطول نحو ٤٠ سم . جسمها بيضية الشكل ، معتدلة الاحدياد . تتميز بجرابها الخلفية المبطلة الارياض المدة للسياحة . ارساف الجراب الامامية ، عند الذكور ، مجهزة بحاصم تحكها من التفت بظهور الاثبات عند الكوم . وهي لا تخرج من الماء الا في زمن التمكنة او عند الانتقال إلى مكان إلى مكان تقصر اذ ذاك في البيل || البرقة كالحشرة الجملانة تسبح وتطس وتقرس كل ما تفسر لها من الحيوانات الدنيا || اشهر اجنسها المكزول والذيقول والمندروس والفراس .

18886 - **عُكْس** - قَدْرِيَّعٌ وَ تَرَكِيدٌ  
Marcottage (F). Layering (E).  
احدى طرائق تكثير النبات تقوم بحمي الصن ودهنه في التربة دين فصله عن امه الى ان تبرز له جذور فيفصل ويفرس .

18887 - **عُكْسُ التَنَوُّجَةِ** (Denitrification).  
Denitrifying (E).  
تحويل يحصل في بعض الارية الرطبة بتأثير جراثيم خاصة تحول النترات الى نيتريت فامونيك فازوت وهو بذلك يكون عكس التربة ومنه ضرر كبير لان النترات القرب تفيض واسهل امتصاصا من النيتريت .

18887 - **عُكْسِين** (Invertin).  
Invertin (F). Invertin (E).  
خيرة العكس تمكس السكروز فيصير غلوكوزاً .

18888 - **هِكْم** (Envelope).  
Envelope (F). Envelope (E).  
العكم الغلاف . ج امكاه ومكاه .

18887 - **عُكْرُ أَبُو قُرُونٍ** (Trapa natans).  
Macro commune (F).

نوع من العكر الجليل يعيش في جميع مناطق البلاد الحارة والمتعددة . ثماره مأكولة تستعمل مسلوكة أو مشوية بني بصحم الكماء تحمل أربعة قرون متقابلة ذرية سادة شاذكة .

18887 - **عُكْرُش** (Festuca).  
Festuca (F). Festuca (F).  
جنس نباتات عشبية مرعوية حولية أو مدمرة من فصيلة النجيليات . انواعه زهاء ١٠٠ معظمها اعشاب كثلية تنمطها للماشية من الخيل الى الماعز . وقد قيل فيه :  
« اعلقت حمارك عكرشا حتى يحد ويكشا »

وهو من النباتات التي ترعب في الارية المنتجة الحافظة على رطوبتها || اشهر انواعها المرعوية التي تزرع في المروج والمراعي الثلاثة التالية :

عُكْرُش احمر (Festuca rubra).  
عُكْرُش المروج (Festuca pratensis).  
عُكْرُش المروج (Festuca des prés).  
عُكْرُش مستصحب (Festuca elatior).  
عُكْرُش غصاة (Festuca ovina).

18888 - **هِكْرُشَة** (Hase).  
Doe-rabbit (E).  
هي انثى الارانب .

18889 - **هِكْرُشِيَّات** (Festucaceae).  
Festucaceae (F). Festucaceae (E).  
سبط من النجيليات يشمل عدة اجناس وانواع ، اشهرها العكرش . معظمها نباتات عشبية برية وبعضها علمي ، يزرع في المراعي .

18880 - **هِكْرَمَة** (Pigeonne).  
هي الحامة ، أنى الحام . اما الاكبر فهو العرطل والمخليل .

18881 - **هِكْرِيَّز** (Aldryson).  
Aldryson (F). Aldryson (E).  
نبات عشبي ممر من فصيلة الخلدات . منه بعض الانام البحر الابيض المتوسط . ساقه فارقة خلية الماء ، تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . اوراقه متعنة ، متعالية ، كلوية الشكل ، جميلة الخضار الزاهي . ازهاره متقوية التجميع . ازهاره صفراء اللون .

18882 - **هِكْرِيَّسْ اَسْوَد** (Xylodora asar).  
Xylodora noir (F).

حشرة مدترمة من فصيلة القترسيات . جسمها شديد الاصفر يطول نحو ٣ سم . ثوبها إلى السمرة القطنانية ، يهت في البطن ويصق في الرأس والذكول والحجفة والخنجين || رأسها محرم . خطمها معتدل الحجم . حينها صفيرتان . كوسلها عموديب . حجبها حمرة . حجبها صفيرتان . روشناها اخراان . قواها دقيقة ، حمراء اللون || تألف حراج العسودر وتعيش بين القشور وتحتها . قوتها الحشرات والحولم .

18882 - **عُكْرُولُ مَطْرُوقٍ** (Dytiscus marginalis).  
Dytiscus marginé (F).  
Dytiscus marginalis (E).  
حشرة مائية قاذمة من فصيلة المكزوليات ورتبة غدييات الانجسة . تألف المئات والمندروس والمراعي المياه البليطة

Sarcoptes (S). Sarcopte (F). **عُكْسُ** ١٨٨٩أ - **عُكْسُ**  
Sarcoptes (E).

جنس حشرات جلدية من فصيلة الجربيات ورتبة القُرَدِيَّات  
انزاعه عديدة جسمها صغيرة القد، ذرية، مؤذية عابطة  
بعضها يحدث الجرب في الإنسان والحيوان || يكافح  
بإستعمال مركبات الكبريت .

١٨٨٩٩ - **عُكْسُ أَمْلَسُ** \* ، **جَرَبُ أَمْلَسُ**  
Sarcoptes laevis (S). Sarcopte lisse (F).  
نوع من الجرب يركب بصل أرياش الطير فيسبب قسوطها.

١٨٩٠٠ - **عُكْسُ قُمْلِي** \* ، **جَرَبُ قُمْلِي** ، **جَرَب**  
Sarcoptes scabiei (S). **نَاصِب**  
Sarcopte de la gale, Acara de la gale, Gale sèche (F).  
Iech-mite (E).

نوع من الجرب الشائع يتطفل على النحل والأبل والبق  
والنمل والماعز فيؤذيها في جلودها ويسبب لها الحكاك  
والقشر والشحار .

١٨٩٠١ - **عُكْسُ مُتَقَلِّبٌ** \* ، **جَرَبُ مُتَقَلِّبٌ**  
Sarcoptes mutans (S). Sarcopte changeant (F).  
نوع من الجرب يتطفل على أرساغ الطير اخضعها الداجنة  
فيؤذيها ويشوها .

١٨٩٠٢ - **عُكَاكِيَة**  
Empoquetouse (F).  
هي الصارة جهاز ميكانيكي يصم ويبلب الأشياء .

١٨٩٠٣ - **عُكَاكِيَة** \*  
Bionomie (F). Bionomics (E).  
علم البيئة الخارجية ويدعى تأثيرها في الكائنات الحية .

١٨٩٠٤ - **عِلَاج**  
Traitement (F). Treatment (E).  
هو الدواء المُستعمل في مكافحة مرض معين أو وسم مقدر .

١٨٩٠٥ - **عِلَاجَاتُ شَالِيَّةٌ** ، **أَدْوِيَة**  
Traitements curatifs (F). Curative treatments (E).  
هي الادوية الناجمة المستعملة للشفاء من علة بدت أو  
لقضاء على حشرة ظهرت . واجب عفا س .

١٨٩٠٦ - **عِلَاجَاتُ وَكَلِيَّةٌ**  
Traitements préventifs (F). Preventive treatments (E).  
هي الادوية التي يحسن استعمالها لوقاية من مرض يمتنى  
وقوعه أو لاجتناب وسم مرتقب .

١٨٩٠٧ - **عِلَاس** \*  
Chélat (F).  
الطلاس مركب عضوي يمكنه اختلاط مع المادان الثرية  
من تكوين تآلف عنصري يتقدم الانحطاط دون ان يقرض  
سير التشيل النهائي .

١٨٩٠٨ - **عِلَاسِي** \*  
Olace  
جنس اشجار حرجية وزراعية من فصيلة العلاسيات .  
انواعه المعروفة ٢٥ منها معظم المناطق الحارة والاستوائية  
من العالم القديم واسرائيلية || المهر انواعه علاس مرتدب  
(Olace de Ceylan) اوراقه مأكولة وتطبخ كالمكرفوف  
وفيهر .

١٨٩٠٩ - **عِلَاسِيَّات** \*  
Olaceaceae (S). Olacacées (F). Olacaceae (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة القنالات مرتفعات  
المبيض . اجناسها المعروفة ٢٦ اما انواعها فنحو ١٧٠ ||

١٨٨٨٩ - **عُكْسَةُ أَيْفَ** \* .

Mycetophila elegans (S). Mycetophilie élégant (F).  
حشرة لارؤية من فصيلة العكسيات . جسمها صغير القند  
يطول من ٢ الى ٦ سم . رأسها صغير . عيناها بارزتان .  
زباناها خيطيان . ثوربا الى الصفرة الصتائية . ودونها  
الى الصفار الباهت . قوائمها كبيرة . غنايبها مجهزة  
بمتناسخ حادة || مرتعها الغابات . الاثني اكبر ذكراً من  
الذكر ، تنجح مكبتها في سرق الفطور وفي نكاحه فينتف  
من يرقات تنميش على الفطور حتى طور الكمال .

١٨٨٩٠ - **عُكْسِيَّات** \*  
Mycetophilidae (S). Mycetophilidés (F).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها  
المعروفة متوسطة العدد . معظمها من علم الاقاليم المعتدلة  
المتحركة نحو البادية . مرتعها الغابات حيث تكثر الفطور ||  
اجسامها صغيرة . نحيلة . رؤوسها صغيرة مثنية . عيونها  
زمنية . قرونها الاستشعارية خيطية ، تعد من ١١ الى ١٧  
فصلة . اعطامها فجاية . قوائمها مستطيلة . غنايبها مجهزة  
بمتناسخ نشطة || يرتعها شبه استوائية الشكل ، يشاهد  
الذين . جميعها خاملة أو دامت . خادراتها طليقة لا تنمن  
في التربة لكنها تلتصق بشده رقيق .

١٨٨٩١ - **عُكْنَكَة** هي سوتيان الجبل ، اطبل .

١٨٨٩٢ - **عُكُوب** \*  
Gundella tournefortii (S). Gundéle, Gundélie, Accoub (F).  
نبات عشبي بري شوكي معمر ويصد الجلس والنزح  
من فصيلة المركبات . اصطناع بلاد الشرق الاوسط يكثر  
في المناطق البرية الجبلية . وهو بقلة نادرة لا تتحلل من  
بعض الفيتاتينات والمانسار المليفة . فلانها مأكولة تستعمل  
مطبوخة .

١٨٨٩٣ - **عُكُوزَة**  
Racine de la queue (F).  
اصل ذنب الدابة حيث حري من الشعر من مغرز الذنب .

١٨٨٩٤ - **عُكُوس** \*  
Ixa (S). Ixa (F). Ixa (E).  
جنس دويبات بحرية من القشريات حشاريات الاربل ،  
قصار الذيل وفصيلة القوسيات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد اصطناعا بحار البلاد الحارة || اجسامها صغيرة تطويل  
من ٢ الى ٣ سم . وتعرض من ٥ الى ٦ سم . تتميز  
بامتداداتها الجانبية الاسطوانية الشكل الهزلية الأطراف  
الدنية . ارجلها نحيلة مستطيلة . ملاصقتها حقيقة  
الأطراف || انزواها الى السمرة المتفاوتة الشدة والملاجات  
الحطية والزمنية .

١٨٨٩٥ - **عُكُوس** \*  
Achronique, Acronyque (F). Acronychal (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل نجم أو كوكب عندما يكون  
مركزه في الفضاء مائكا الشمس فيظهر عند غروبها  
ويختبئ عند شروقها .

١٨٨٩٦ - **عُكُيس** ، **دَرِيخَة** ، **رَكِيْدَة**  
Marcotte (F). Layer (E).  
النصن الذي يكسو أو يدرخ أو يرقه .

١٨٨٩٧ - **عُكُيسُ الكَرْمَة** ، **رَكِيْدَة الكَرْمَة**  
Provin (F). Layer of a vine (E).  
سرع الكرمه الذي صار تدريخه .



عُكْسَةُ أَيْفَ



عُكُوب



عُكُوس



عُلْ أَمْلَسُ



عُلْ قَلْ



١٨٩٢٠ - **عَلَش**

الطراد والائل والحاج والبيت والكوش جميعها من العَلَش .  
ج اعلاش (اللسان) .



علائش

١٨٩٢١ - **عَلَج**

Onagre gros et gros (F).  
هو الحمار الوحشي السمين القوي .

١٨٩٢٢ - **عَلَجَان \* ، عَلَج**

Arundinaria (S).  
Bambou (F). Bamboo (E).  
جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات  
وصيلة النجيليات . اولوه خضراء رطب في الاربة الرملية  
القبالية الرملية . اشهرها ما يلي .



علائش

١٨٩٢٣ - **عَلَجَان لَمَاع**

Arundinaria nitida (S).  
Bambou luisant (F).  
نوع من العليجان يطو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . سلاحيته  
الى الجذوة البنفسجية . صبره عليه الاقنان . اوراقه تطول  
من ٦ الى ٨ سم . نصلها مائل للبرشة جبل الخضار اقزامي  
اللاص || رطب في الاربة القليلة الاندماج الوفرة للمواد  
المضوية .

١٨٩٢٤ - **عَلَجَان مَشْبَك**

Arundinaria tessellata (S). Bambou à réseau (F).  
نوع من العليجان يطو من ٨٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه  
ذقنة اقزام الاخير تطول نحو ٤٥ سم . وتعرض نحو ١٠  
نصلها جبل الخضار يحيطه اطراف اصفر ويحمل حل صفحته  
السفل خطين اقزاميين متوازيين مع الصلغ || رطب في  
الاربة الرملية القبالية الرملية .



علائش

١٨٩٢٥ - **عَلَجَان مَوْشَح**

Arundinaria veitchi (S). Bambou penché (F).  
نوع من العليجان يطو من ٥٠ الى ٦٠ سم . سلاحيته  
اسطوانية . صبره محيطة مفتحة . اوراقه متعقبة تطول  
من ١٢ الى ١٥ سم . وتعرض نحو ٣ . نصلها اخضر الصفحة  
العليا احملي السفل يحيطه اطراف اصفر || رطب في الاربة  
الخفيفة القليلة الرملية .

١٨٩٢٦ - **عَلَجَان نَحْلِي**

Arundinaria palmata (S). Bambou-Palme (F).  
نوع من العليجان يطو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . سلاحيته  
اسطوانية . صبره محيطة مفتحة . اوراقه متعقبة تطول  
من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ١٠ الى ١٢ . نصلها اخضر  
الصفحة العلويا يجري السفل || رطب في الاربة الرملية  
القبالية الرملية .



عليجان

١٨٩٢٧ - **عَلَجَان وَشَح**

Arundinaria humilis (S). Bambou de fortune (F).  
نوع من العليجان يطو من ٣٠ الى ٤٠ سم . سلاحيته  
اسطوانية خضراء اللون . صبره دبينة . افناده قليلة . اوراقه  
مبشرة تطول من ١٠ الى ١٥ سم . نصلها مائل البرشة  
جبل الخضار || رطب في الاربة الرملية القليلة الاندماج  
الغنية بالمواد المضوية .



عليجوم

١٨٩٢٨ - **عُلُجُوم \* ، ضِفْدَع الجبل ، ضِفْدَع**

Bufo (S). Crapaud (F). Toad (E).  
جنس حيوانات دوداء صغيرة القذرة قاذرة من فصيلة  
النجيليات ورتبة عدييات الاقنان . اولوه نحو ٨٠  
منتشرة في جميع العالم تتميز من الضفادع العادية بقصر

جميعها اشجار وشجيرات . اصلها من بعض اصقاع البلاد  
الحارة والاستوائية من العالم القديم . سبطا رطبة ، قرماء .  
اوراقها متعاقبة ، كاملة . انزاعها متعقبة التصنع او  
فردية || اشهر اجناسها العلاس .

١٨٩١٠ - **عَلَاش \***

Sardinella surita (S).  
Alliche (F). Alliche (E).  
سكة بحرية قريبة الشبه بالسردين من فصيلة الصافييات .  
اصلها من بحار البلاد الاستوائية والحارة وبعض مناطق البحر  
الايض المتوسط . سرورها الافواض والتفاف والحيادح .  
سرهما كثير العدد كالسردين || جسمها احليبي الشكل  
يطول من ١٥ الى ٣٠ سم . فمها مائل ورفيق . زعنفتها  
الظهرية مقعرة الطرف واقرن من الرأس من زعنفة السردين .  
زعنفتها الذيلية فارقة مستطيلة الجناح . نوحا الى الرينة  
الزرقاء يملوها موج لضي يمين عند الظهر . يطن الى  
البياض القضي المائجة || لحمها مأكول متوسط الصنف .

١٨٩١١ - **عَلَاط**

Facs latérale de l'encolure (F).  
صفحة المتق في الباب والمراشي . والعلطان صفحتا  
المتق من الجانبين || بين الحامة طرفها في صفحي عتقها .  
ما اسفل علطيا || ويلاط الشمس هو الذي يراى كالفجر  
منها كانه غيب .

١٨٩١٢ - **عَلَاط**

الخط الدقيق . يقال اصلي الاربة بطلطها اي يخطها .

١٨٩١٣ - **عَلَاق**

Elyme des sables, Oyat (F).  
هو الهوس الكتيان ، اطلبه .

١٨٩١٤ - **عِلَالَة ، عَشَق ، ذُتْب**

Pétiole (F). Petiole (E).  
جزء دقيق من الورقة يحمل النصل فينبغ اليه بالنسخ الجليل  
ويقتل النسخ الكامل . وهو صلة الوصل بين الورقة والقصو  
النباتي الذي يرتكز عليه .

١٨٩١٥ - **عَلَاك**

هو الخيش ، اطلبه .

١٨٩١٦ - **عَلَام**

Amande du narprun (F).  
Buckthorn almond (E).

١٨٩١٧ - **عَلَام \***

Accipiter majus (S).  
Epervier majes. Grand épervier (F). Greater  
sparrow-hawk (E).  
طائر من البواشق ، طوله نحو ٤٠ سم . ويصطه ٨٥ سم .  
جسمه رقيق الخوام . ثوبه جل التوش . صدره ابيض الرقعة  
الفراء المظلمة بالاسود || خلفه خلق البواشق الا انه  
احمر مزاجا واخذ بطلما من سائر انواع جنسه . وهو من  
الفواشق التي تجرب العالم القديم ولا تقم في الشرق الاذف  
اكثر من خمسين يوما في السنة .

١٨٩١٨ - **عَلَاكَة**

هي السة ، اطلبه .

١٨٩١٩ - **عَلِب \***

Tragelaphus euryceros (S).  
Tragelapha euryceros, Bongo (F). Tragelaph,  
Bongo (E).  
نوع من الجليل وهو اكبرها قدا وقربا وانسبا قاليا واسمها  
انتشارا . ثوبه كيت اسمر يملو تجديد ابيض ورتقة صفراء  
كسائر انواع جنسه . الاكثر امين لونا من الاثني || اصلها  
فصيلة الارباء تمتد من بحيرة تشاد الى كيريه والفاين .

Bufonidae (S).

## ١٨٩٣٢ - عئجويئات

Bufonidae (F), Bufonidae (E).

فصيلة حيوانات من لمة الرئيات وربوية السمويات ورؤية البرمائيات أي، عديمات القلب || أجناسها المعروفة ثمانية وأولها ١٣٠ منها القاذرة والمائية والبرية الجلمة والشاحبة. أصابها خلع أصفر مع استثناء جزيرة سنغافورة وبعض جزر المحيط الهادي || جميعها عديمة الأسنان. السنبها الفيلينية الشكل، فقاها الانامية المتقدمة عادمة الضلع، أما التتو الضعيف الذي يمتد من قفلة الصدر ويغطي فئتين المتد. أصابع قوائمها الانامية طويلة. أما أصابع قوائمها الخلفية فبقيدة عظام لاقامي الذي لانه يختلف مع الأجناس والألوان || أعرف أجناسها وأشهرها العلجوم.

Ephedra (S), Ephèdre (F).

## ١٨٩٣٤ - عئد

جس نباتات معمرة برية من فصيلة العئديات. أنزاهه المعروفة ٢٠ جميعها جنات فراء عئدة، طول من ١٠٠ إلى ٤٠٠ سم. فروعه متعاقبة ثنائية أو ثلاثية الالتشاب. أوراقها صغيرة متعاقبة تركب القعد. أزهارها وريسة المسكن، الأكثرية منها فردية أو ثنائية التجميع، أسسا الانثوية فضلية. ثمارها عئية. مهدا شواطيء بحار البلاد الحارة والمتدلة. أعرفها وأهمها العئد المزروع السائبل.

## ١٨٩٣٥ - عئد مؤدوج السئابل \* عئب البحر

*Ephedra distachya* (S), *Ephèdre distique*, *Raisin de mer* (F), *Sand cherry*, *Ses grape* (E), *Gewöhnliches Meertrauben* (D), *Uva di mare* (I).

نوع من العئد، موطن شواطيء البحر المتوسط، جسته طول نحو ٢٥٠ سم. سئابل أزهار الانثوية مؤدوجة التجميع. ثماره عئية، صغيرة القد، حاضرة الطعم، مأكولة، لا تغلو من بعض النافع الطبية وتستخدم في عدة شرايات قئدية مقوية.

## ١٨٩٣٦ - عئدوس الزوال \* ٥

*Alydus calcaratus* (S), *Alyde des genêts* (F).

سفرة خافضة من فصيلة الكوربيات ورؤية مختلفات الاجسمة. جسها مسط، مئمر الملب بطول نحو ١٢ سم. رأسها شبه يئهي الشوزن، أسود اللون. خطميها متد الطولي. صئاه صغيرتان، نافرزان. زباناها مسطيلتان. كسلها مسطلي اللون، أسود الرباط بالراس. صئبتها صغيرة، مؤدوجة، شديدة السرة. ظهريها الى الخطي الاقير. بطها احمر، جؤوي الخثار المتشق بالخطي. الصفة السفلى من بطها الى السواد. قشرايا شفاف. قوائمها متكافئة الملب || مسرحها البراري. تركيب العئد من النبات اصعبا القريبات الفراقية ومنها الزوال.

Gnetaceae (S).

## ١٨٩٣٧ - عئديات

Gnétiacées (F), Gnetaceae (E).

فصيلة نباتية من ربيانات البؤور. أجناسها ثلاثة : العئد والبرجرج والمؤس.

Alliment (F), Food (E).

## ١٨٩٣٨ - عئس

هو الفئد، أعطيه.

قوائمها. اجسامها طول من ١٥ الى ٣٥ سم. تبلغ كامل نموها ونشائها بمرحس سنوات. أليها خططة، ثؤلوية الجلمة، تحمل بعض الند القاذرة. سئالها كرية الرائحة كارية تنفسها وترقيها دفعا عن النفس.

١٨٩٣٩ - عئجوم أخضر \* *Bufo viridis* (S), *Crapaud vert* (F), *Green toad* (E).

نوع من العلجوم القاذب. أصلانه جميع الاصقاع المتدلة الحارة من المال القديم || جسسه متوسط القد، بطول نحو ١١ سم. عئد الذكر ونحو ١٥ سم. عئد الانثى. جلده كثير التبول الصغيرة تتخللها بعض الند القاذرة. سئالها كرية الرائحة كاو بقله العلجوم دفعا عن النفس || رأسه قصير. عئاه كيرتان. فة واسع الشفق. فكاه عادت الأسنان. أصابع قوائمها الانامية طويلة. أما الخلفية فبقيدة عظام يكثف الزام الاال || ثوبه الى السرة الزينة المواج طولها رقيقة حراء ورسجة خضراء يطويها الاسود || مسرحه دجوي. قوته الحشرات وبأ استطاع من الزحافات || الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ١٢٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يئير من الحيوانات النافعة لانه يقضي على الكثير من الحشرات والجوارن والديهان.

١٨٩٣٠ - عئجوم البئر

*Boudrois* (F).

هو الكوكج، جنس اسماك بحرية. أعطيه.

١٨٩٣١ - عئجوم جئير \* *Bufo marinus* (S), *Agua*, *Bufo géant* (F), *Giant toad* (E).

نوع من العلجوم. أصلانه امريكة الجنوية والوسطى. جسسه كبير القد، بطول نحو ٢٥ سم. عئد الذكر ونحو ٣٥ سم. عئد الانثى. جلده متعل وتعلو غدد قاذرة، سئالها كرية الرائحة كاو. رأسه غليظ وقصير. عئاه كيرتان، جاسطتان. خطمه واسع الشفق، مقطوع الطول، معلو بمن عظمي المادة يئد من طرف الخط الى مستوى العين. فكاه عادت الأسنان. أصابع قائمته الخلفيتين مقيدة بحطاب يكثف الزام الاال || ثوبه الى السرة الخلفية معلو مواج أخضر ورقيقة سواد تتخللها الذرة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات. الانثى تقرأ من ١٥٠٠ الى ٢٠٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يئير بئيقه الفصاج الشبيه بمواء الكلب.

١٨٩٣٢ - عئجوم مئدول \* *Bufo bufo* (S), *Crapaud commun* (F), *Common Toad* (E).

نوع من العلجوم. أصلانه جميع اصقاع البلاد المتدلة الحارة من المال القديم || جسسه متوسط القد، بطول نحو ١٥ سم. عئد الذكر ونحو ١٤ سم. عئد الانثى. جلده كثير التبول يتخللها بعض الند القاذرة، سئالها كاو كرية الرائحة || رأسه قصير. عئاه كيرتان-جاسطتان. خطمه واسع الشفق. فكاه عادت الأسنان. أصابع الخلفية وائرة الخطاب. ثوبه الى الخضار الاسمر يطوي مواج زئبي ورقيقة كستبيسة || مسرحه دجوي. قوته الحشرات والزحافات والديهان || الانثى تقرأ من ٤٠٠٠ الى ٧٠٠٠ دحلة في حبال مستطيلة تلفها على النباتات المائية || يألف حياة الاسر ويئير بحاسة التوجه. يئير من الحيوانات النافعة.



علجوم أخضر



علجوم جئير



علجوم مئدول



عئد مؤدوج السئابل



علدوس الزوال

الاستعمارية خطية طويلة . مرزاتها قصيرة مدببة . رقاتها عادمة الأبريل البطنية ، مزدوجة التقويس الماكس الذي يشبه الكلاب .



علة الاجاص

١٨٩٤٥ - **عُكْسَال** \* (F). *Phalaropus* (S).  
طائر وحيد الجنس والنوع من حمارة البطاليات . طوله نحو ٢٢ سم . ظهره الى السمره الصهباء يعلوها مزاج اسود . راسه وصمرا الى السمره . زروه ابيض . عتقه وصدره الى الصهبه الرمادية . بطنه وخوابيه واثنيها يهض . جناحه ضيق ذئق ، اسود الظاهر ، ابيض الباطن . ابطاره وقوامه صفر الخمار . منقاره مستطيل احمر اللز . اسنانه قوية اصابعه مفصصة الخياط || الاثني اسنن قدام من الاكبر واقل طولنا . ثمن بين الاضباب قرب الماء . تبيض ٤ يبيضات تحضنها بمناوبة الذكر من ١٧ الى ١٩ يوما .



علة الزرع

١٨٩٤٦ - **عُكْسَالِيَات** (F). *Phalaropodini* (F).  
حمارة طير من فصيلة دجاجيات الارض القواطع . اجناسها وانواعها قليلة . اجسامها صغيرة القدر . مناثريها مستطيلة . اسنانهها قوية ، اسابعها مفصصة الخياط || رتادها خطوط الجدار وضفاف الجحيرات . تقضي نصف اوقاتها حائمة على سطح الماء ولتصنف الآخر في الاجواء وحل الحصى . قوتها القشرية والرخويات والخرافيت والاسماك الصغيرة والحرايز ويضض الاضباب || لها جيلسان : اللعالم والحطاف .



عسوط جلع

١٨٩٤٧ - **عُكْسَل** \* ، **عُكْسَلَة** (S). *Melanocorypha* (S). *Calandra* (F). *Calendra* (F).  
جنس طير من فصيلة القتريات . انواعه ٩ ، اطلسها البلاد الاسيوية والافريقية والارودية . جميعها غريبة الرأس ، مستطيلة الجناح ، قصيرة الذنب ، دقيقة الرسح ، قوية المنقار . انثياها الى الصهبه الخفيفة تعلوها ريشه صمره . تأثت الحقل المنزوية والمراعي والرباق . ثمن في المراعي وبين الزروع . انثياها تحضن وضعها من ٤ الى ٥ يبيضات || اعرف انواعها واشهرها :



ملال

ملال الحيشة  
M. albiterminata (S).  
Calandra d'Abysinie (F).  
ملال الهند  
M. maxima (S). Calandre de l'Inde (F).  
ملال روسيا  
M. tartarica (S). Calandre de Russie (F).  
ملال زنجي  
M. negra (S). Calandra nègre (F).  
ملال معروف  
M. calandra (S).  
Calandre commune (F).



ععل

١٨٩٤٨ - **عُكْسَان** (S). *Tapiscia* (S).  
جنس نباتات زربية مسرة من فصيلة النسيات . انواعه قليلة جميعها شجرية تملو من ٦ الى ٨ انتار . اولقاتها حاملة ، مركبة ، ورية . ورققاتها خاسية او سباحية البند . نصلها يبيضي الشكل ، ظلي القناعت يعلو من ٦ الى ١٣ سم . صفحته العليا غضراء اللون اما السفلى لصلها . ازهاره متكونة التجميع ، محورية الارتكاز ، صفراء اللون ، صغيرة القدر ، قواصة البرف الطري .

Alfener (F).

١٨٩٤٩ - **عُكْسَان**

١٨٩٢٩ - **عُكْسَس** \* ، **سِف** \* (S). *Cephus* (S). *Cephe* (F).  
الرأسية علة . جنس حشرات من فصيلة العليسات . انواعها عديدة . اجسامها نحلة مستطيلة . ورشاتها شفافة ، كثيرة المروق . قرونها الاستعمارية خطية ، رقاتها دقيقة الجسم كالأبنة الشكل ، عادمة الأبريل البطنية اعرف انواعها واعمرها علة الاجاص وعلة الزرع .

١٨٩٤٠ - **عُكْسَسَة الاجاص** \* ، **سِف** \* (S). *Janus compressus* (S). *Cèphe du poirier* (F). *Janus compressus* (S). *Bimrentriebwespe* (D).  
حشرة من العليسات ، طولها يراوح بين ٩ و ٨ سم . جسمها اسطواني الشكل . جوشها اسود اللون تعلوها مشعة صفراء . يعلوها الى الصفرة البرتقالية . تظهر في الربيع وتجمع مكانها في لحاء الاقنان يفتن في رقات تلمد الكثير والحشب فضله وتسبب ذبول التواهي وموتها .

١٨٩٤١ - **عُكْسَسَة الزروع** \* ، **سِفَة الزروع** \* (S). *Cephus pygmaeus* (S). *Cèphe du blé*, C. des chaumes (F). *Wheat stem sawfly* (E). *Getreidehalmwespe* (D).  
حشرة من العليسات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم . جسمها نحيل البنية ، اسطواني الشكل . ثوبها الى السمره ، يعلوها جلعج بالا صفر . تجمع مكانها في قصب الزروع فيقتف عن رقات تدمحل القصب وترعى لب الكمار فتضع اللعج من السنايل التي تبيض وتلوي || تكلف بتقلاص وسرق الجلمل لانها تبيت فيه ضمن فرائق صغيرة وشمة الشكل .

١٨٩٤٢ - **عُكْسَسَة** \* ، **مِيزَان الارتفاع** (F). *Altimètre* (F). *Altimeter* (E).  
جهاز يمين رماء الموضع بالنسبة الى سطح البحر اي ارتفاع المكان من مرمى مياه البحر .

١٨٩٤٣ - **عُكْسُوط مُجَدَّع** \* (S). *Chilochoorus* (S). *Chilochoorus bipustulatus* (F). *Chilochoorus bipustulatus* (E).

حشرة خاتلة آفة ناعمة من فصيلة الصمقيات ودية مندعات الاجنسة . تأثت غابات الصنوبر واخرابه . خناضها ويرقاتها تعيش على الارق الذي يركب الصنوبر || جسمها صغير القدر يعلو من ٤ الى ٥ سم . ثوبها الى السواد الباق . غمداتها ثلاث البقع الصنابية . واسها مستدل الجرم . عيناها كيرتان . زبائنها صقيا . فكها ضليمان . ظواهرها مستدير الاطراف اللامعة . غمداتها شديدة الصلابة كيثفت النمل . اوساها رباعية العلق || اجسامها الحولية ثلاثة . تخرج الحشرة الجملانة من ياتها الشتوي في نيسان . تسرح في الجدار رتيبت في الليل || البرقة سريعة النمو شبه اسطوانية الشكل تعلو عند الادراك اتمام نحو ٧ سم . ثوبها الى السمره النحسية يعلوها ظل اغبر || اما غنصها الجبل الثالث فانها تقضي فصل الشتاء مختفية تحت الحجارة ولا تخرج من مكانها الا عندما تدب الحرارة في اواسط شهر نيسان .

١٨٩٤٤ - **عُكْسِيَات** \* (S). *Cephidae* (S). *Céphidés* (F). *Cephidae*, *Stem sawflies* (E). *Halmwespen* (D).  
فصيلة حشرات من رتبة شحاتيات الاجنسة . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اجسامها نحلة مستطيلة ، قرونها

١٨٩٥ - علف

هو المادة أو المواد النفاثة التي تقدم الحيوان في سبيل حفظ حياته. ونمو جسمه وإنتاجه || يختلف الملف باختلاف نوعه وما يحويه من عناصر وبنود غذائية يمكن هضمها وتحويلها في الجسم || ولما كانت النفاة من الملف

## 44

۹- فی الکتاب

١٣٧١	٢٥٠٠	٢٥٠٨	٢٥١٦	٢٥٢٤	٢٥٣٢	٢٥٤٠	٢٥٤٨	٢٥٥٦	٢٥٦٤	٢٥٧٢	٢٥٨٠	٢٥٨٨	٢٥٩٦	٢٦٠٤	٢٦١٢	٢٦٢٠	٢٦٢٨	٢٦٣٦	٢٦٤٤	٢٦٥٢	٢٦٦٠	٢٦٦٨	٢٦٧٦	٢٦٨٤	٢٦٩٢	٢٧٠٠	٢٧٠٨	٢٧١٦	٢٧٢٤	٢٧٣٢	٢٧٤٠	٢٧٤٨	٢٧٥٦	٢٧٦٤	٢٧٧٢	٢٧٨٠	٢٧٨٨	٢٧٩٦	٢٨٠٤	٢٨١٢	٢٨٢٠	٢٨٢٨	٢٨٣٦	٢٨٤٤	٢٨٥٢	٢٨٦٠	٢٨٦٨	٢٨٧٦	٢٨٨٤	٢٨٩٢	٢٩٠٠	٢٩٠٨	٢٩١٦	٢٩٢٤	٢٩٣٢	٢٩٤٠	٢٩٤٨	٢٩٥٦	٢٩٦٤	٢٩٧٢	٢٩٨٠	٢٩٨٨	٢٩٩٦	٣٠٠٤	٣٠١٢	٣٠٢٠	٣٠٢٨	٣٠٣٦	٣٠٤٤	٣٠٥٢	٣٠٦٠	٣٠٦٨	٣٠٧٦	٣٠٨٤	٣٠٩٢	٣١٠٠	٣١٠٨	٣١١٦	٣١٢٤	٣١٣٢	٣١٤٠	٣١٤٨	٣١٥٦	٣١٦٤	٣١٧٢	٣١٨٠	٣١٨٨	٣١٩٦	٣٢٠٤	٣٢١٢	٣٢٢٠	٣٢٢٨	٣٢٣٦	٣٢٤٤	٣٢٥٢	٣٢٦٠	٣٢٦٨	٣٢٧٦	٣٢٨٤	٣٢٩٢	٣٣٠٠	٣٣٠٨	٣٣١٦	٣٣٢٤	٣٣٣٢	٣٣٤٠	٣٣٤٨	٣٣٥٦	٣٣٦٤	٣٣٧٢	٣٣٨٠	٣٣٨٨	٣٣٩٦	٣٤٠٤	٣٤١٢	٣٤٢٠	٣٤٢٨	٣٤٣٦	٣٤٤٤	٣٤٥٢	٣٤٦٠	٣٤٦٨	٣٤٧٦	٣٤٨٤	٣٤٩٢	٣٥٠٠	٣٥٠٨	٣٥١٦	٣٥٢٤	٣٥٣٢	٣٥٤٠	٣٥٤٨	٣٥٥٦	٣٥٦٤	٣٥٧٢	٣٥٨٠	٣٥٨٨	٣٥٩٦	٣٦٠٤	٣٦١٢	٣٦٢٠	٣٦٢٨	٣٦٣٦	٣٦٤٤	٣٦٥٢	٣٦٦٠	٣٦٦٨	٣٦٧٦	٣٦٨٤	٣٦٩٢	٣٧٠٠	٣٧٠٨	٣٧١٦	٣٧٢٤	٣٧٣٢	٣٧٤٠	٣٧٤٨	٣٧٥٦	٣٧٦٤	٣٧٧٢	٣٧٨٠	٣٧٨٨	٣٧٩٦	٣٨٠٤	٣٨١٢	٣٨٢٠	٣٨٢٨	٣٨٣٦	٣٨٤٤	٣٨٥٢	٣٨٦٠	٣٨٦٨	٣٨٧٦	٣٨٨٤	٣٨٩٢	٣٩٠٠	٣٩٠٨	٣٩١٦	٣٩٢٤	٣٩٣٢	٣٩٤٠	٣٩٤٨	٣٩٥٦	٣٩٦٤	٣٩٧٢	٣٩٨٠	٣٩٨٨	٣٩٩٦	٤٠٠٤	٤٠١٢	٤٠٢٠	٤٠٢٨	٤٠٣٦	٤٠٤٤	٤٠٥٢	٤٠٦٠	٤٠٦٨	٤٠٧٦	٤٠٨٤	٤٠٩٢	٤١٠٠	٤١٠٨	٤١١٦	٤١٢٤	٤١٣٢	٤١٤٠	٤١٤٨	٤١٥٦	٤١٦٤	٤١٧٢	٤١٨٠	٤١٨٨	٤١٩٦	٤٢٠٤	٤٢١٢	٤٢٢٠	٤٢٢٨	٤٢٣٦	٤٢٤٤	٤٢٥٢	٤٢٦٠	٤٢٦٨	٤٢٧٦	٤٢٨٤	٤٢٩٢	٤٣٠٠	٤٣٠٨	٤٣١٦	٤٣٢٤	٤٣٣٢	٤٣٤٠	٤٣٤٨	٤٣٥٦	٤٣٦٤	٤٣٧٢	٤٣٨٠	٤٣٨٨	٤٣٩٦	٤٤٠٤	٤٤١٢	٤٤٢٠	٤٤٢٨	٤٤٣٦	٤٤٤٤	٤٤٥٢	٤٤٦٠	٤٤٦٨	٤٤٧٦	٤٤٨٤	٤٤٩٢	٤٥٠٠	٤٥٠٨	٤٥١٦	٤٥٢٤	٤٥٣٢	٤٥٤٠	٤٥٤٨	٤٥٥٦	٤٥٦٤	٤٥٧٢	٤٥٨٠	٤٥٨٨	٤٥٩٦	٤٦٠٤	٤٦١٢	٤٦٢٠	٤٦٢٨	٤٦٣٦	٤٦٤٤	٤٦٥٢	٤٦٦٠	٤٦٦٨	٤٦٧٦	٤٦٨٤	٤٦٩٢	٤٧٠٠	٤٧٠٨	٤٧١٦	٤٧٢٤	٤٧٣٢	٤٧٤٠	٤٧٤٨	٤٧٥٦	٤٧٦٤	٤٧٧٢	٤٧٨٠	٤٧٨٨	٤٧٩٦	٤٨٠٤	٤٨١٢	٤٨٢٠	٤٨٢٨	٤٨٣٦	٤٨٤٤	٤٨٥٢	٤٨٦٠	٤٨٦٨	٤٨٧٦	٤٨٨٤	٤٨٩٢	٤٩٠٠	٤٩٠٨	٤٩١٦	٤٩٢٤	٤٩٣٢	٤٩٤٠	٤٩٤٨	٤٩٥٦	٤٩٦٤	٤٩٧٢	٤٩٨٠	٤٩٨٨	٤٩٩٦	٥٠٠٤	٥٠١٢	٥٠٢٠	٥٠٢٨	٥٠٣٦	٥٠٤٤	٥٠٥٢	٥٠٦٠	٥٠٦٨	٥٠٧٦	٥٠٨٤	٥٠٩٢	٥١٠٠	٥١٠٨	٥١١٦	٥١٢٤	٥١٣٢	٥١٤٠	٥١٤٨	٥١٥٦	٥١٦٤	٥١٧٢	٥١٨٠	٥١٨٨	٥١٩٦	٥٢٠٤	٥٢١٢	٥٢٢٠	٥٢٢٨	٥٢٣٦	٥٢٤٤	٥٢٥٢	٥٢٦٠	٥٢٦٨	٥٢٧٦	٥٢٨٤	٥٢٩٢	٥٣٠٠	٥٣٠٨	٥٣١٦	٥٣٢٤	٥٣٣٢	٥٣٤٠	٥٣٤٨	٥٣٥٦	٥٣٦٤	٥٣٧٢	٥٣٨٠	٥٣٨٨	٥٣٩٦	٥٤٠٤	٥٤١٢	٥٤٢٠	٥٤٢٨	٥٤٣٦	٥٤٤٤	٥٤٥٢	٥٤٦٠	٥٤٦٨	٥٤٧٦	٥٤٨٤	٥٤٩٢	٥٥٠٠	٥٥٠٨	٥٥١٦	٥٥٢٤	٥٥٣٢	٥٥٤٠	٥٥٤٨	٥٥٥٦	٥٥٦٤	٥٥٧٢	٥٥٨٠	٥٥٨٨	٥٥٩٦	٥٦٠٤	٥٦١٢	٥٦٢٠	٥٦٢٨	٥٦٣٦	٥٦٤٤	٥٦٥٢	٥٦٦٠	٥٦٦٨	٥٦٧٦	٥٦٨٤	٥٦٩٢	٥٧٠٠	٥٧٠٨	٥٧١٦	٥٧٢٤	٥٧٣٢	٥٧٤٠	٥٧٤٨	٥٧٥٦	٥٧٦٤	٥٧٧٢	٥٧٨٠	٥٧٨٨	٥٧٩٦	٥٨٠٤	٥٨١٢	٥٨٢٠	٥٨٢٨	٥٨٣٦	٥٨٤٤	٥٨٥٢	٥٨٦٠	٥٨٦٨	٥٨٧٦	٥٨٨٤	٥٨٩٢	٥٩٠٠	٥٩٠٨	٥٩١٦	٥٩٢٤	٥٩٣٢	٥٩٤٠	٥٩٤٨	٥٩٥٦	٥٩٦٤	٥٩٧٢	٥٩٨٠	٥٩٨٨	٥٩٩٦	٦٠٠٤	٦٠١٢	٦٠٢٠	٦٠٢٨	٦٠٣٦	٦٠٤٤	٦٠٥٢	٦٠٦٠	٦٠٦٨	٦٠٧٦	٦٠٨٤	٦٠٩٢	٦١٠٠	٦١٠٨	٦١١٦	٦١٢٤	٦١٣٢	٦١٤٠	٦١٤٨	٦١٥٦	٦١٦٤	٦١٧٢	٦١٨٠	٦١٨٨	٦١٩٦	٦٢٠٤	٦٢١٢	٦٢٢٠	٦٢٢٨	٦٢٣٦	٦٢٤٤	٦٢٥٢	٦٢٦٠	٦٢٦٨	٦٢٧٦	٦٢٨٤	٦٢٩٢	٦٣٠٠	٦٣٠٨	٦٣١٦	٦٣٢٤	٦٣٣٢	٦٣٤٠	٦٣٤٨	٦٣٥٦	٦٣٦٤	٦٣٧٢	٦٣٨٠	٦٣٨٨	٦٣٩٦	٦٤٠٤	٦٤١٢	٦٤٢٠	٦٤٢٨	٦٤٣٦	٦٤٤٤	٦٤٥٢	٦٤٦٠	٦٤٦٨	٦٤٧٦	٦٤٨٤	٦٤٩٢	٦٥٠٠	٦٥٠٨	٦٥١٦	٦٥٢٤	٦٥٣٢	٦٥٤٠	٦٥٤٨	٦٥٥٦	٦٥٦٤	٦٥٧٢	٦٥٨٠	٦٥٨٨	٦٥٩٦	٦٦٠٤	٦٦١٢	٦٦٢٠	٦٦٢٨	٦٦٣٦	٦٦٤٤	٦٦٥٢	٦٦٦٠	٦٦٦٨	٦٦٧٦	٦٦٨٤	٦٦٩٢	٦٧٠٠	٦٧٠٨	٦٧١٦	٦٧٢٤	٦٧٣٢	٦٧٤٠	٦٧٤٨	٦٧٥٦	٦٧٦٤	٦٧٧٢	٦٧٨٠	٦٧٨٨	٦٧٩٦	٦٨٠٤	٦٨١٢	٦٨٢٠	٦٨٢٨	٦٨٣٦	٦٨٤٤	٦٨٥٢	٦٨٦٠	٦٨٦٨	٦٨٧٦	٦٨٨٤	٦٨٩٢	٦٩٠٠	٦٩٠٨	٦٩١٦	٦٩٢٤	٦٩٣٢	٦٩٤٠	٦٩٤٨	٦٩٥٦	٦٩٦٤	٦٩٧٢	٦٩٨٠	٦٩٨٨	٦٩٩٦	٧٠٠٤	٧٠١٢	٧٠٢٠	٧٠٢٨	٧٠٣٦	٧٠٤٤	٧٠٥٢	٧٠٦٠	٧٠٦٨	٧٠٧٦	٧٠٨٤	٧٠٩٢	٧١٠٠	٧١٠٨	٧١١٦	٧١٢٤	٧١٣٢	٧١٤٠	٧١٤٨	٧١٥٦	٧١٦٤	٧١٧٢	٧١٨٠	٧١٨٨	٧١٩٦	٧٢٠٤	٧٢١٢	٧٢٢٠	٧٢٢٨	٧٢٣٦	٧٢٤٤	٧٢٥٢	٧٢٦٠	٧٢٦٨	٧٢٧٦	٧٢٨٤	٧٢٩٢	٧٣٠٠	٧٣٠٨	٧٣١٦	٧٣٢٤	٧٣٣٢	٧٣٤٠	٧٣٤٨	٧٣٥٦	٧٣٦٤	٧٣٧٢	٧٣٨٠	٧٣٨٨	٧٣٩٦	٧٤٠٤	٧٤١٢	٧٤٢٠	٧٤٢٨	٧٤٣٦	٧٤٤٤	٧٤٥٢	٧٤٦٠	٧٤٦٨	٧٤٧٦	٧٤٨٤	٧٤٩٢	٧٥٠٠	٧٥٠٨	٧٥١٦	٧٥٢٤	٧٥٣٢	٧٥٤٠	٧٥٤٨	٧٥٥٦	٧٥٦٤	٧٥٧٢	٧٥٨٠	٧٥٨٨	٧٥٩٦	٧٦٠٤	٧٦١٢	٧٦٢٠	٧٦٢٨	٧٦٣٦	٧٦٤٤	٧٦٥٢	٧٦٦٠	٧٦٦٨	٧٦٧٦	٧٦٨٤	٧٦٩٢	٧٧٠٠	٧٧٠٨	٧٧١٦	٧٧٢٤	٧٧٣٢	٧٧٤٠	٧٧٤٨	٧٧٥٦	٧٧٦٤	٧٧٧٢	٧٧٨٠	٧٧٨٨	٧٧٩٦	٧٨٠٤	٧٨١٢	٧٨٢٠	٧٨٢٨	٧٨٣٦	٧٨٤٤	٧٨٥٢	٧٨٦٠	٧٨٦٨	٧٨٧٦	٧٨٨٤	٧٨٩٢	٧٩٠٠	٧٩٠٨	٧٩١٦	٧٩٢٤	٧٩٣٢	٧٩٤٠	٧٩٤٨	٧٩٥٦	٧٩٦٤	٧٩٧٢	٧٩٨٠	٧٩٨٨	٧٩٩٦	٨٠٠٤	٨٠١٢	٨٠٢٠	٨٠٢٨	٨٠٣٦	٨٠٤٤	٨٠٥٢	٨٠٦٠	٨٠٦٨	٨٠٧٦	٨٠٨٤	٨٠٩٢	٨١٠٠	٨١٠٨	٨١١٦	٨١٢٤	٨١٣٢	٨١٤٠	٨١٤٨	٨١٥٦	٨١٦٤	٨١٧٢	٨١٨٠	٨١٨٨	٨١٩٦	٨٢٠٤	٨٢١٢	٨٢٢٠	٨٢٢٨	٨٢٣٦	٨٢٤٤	٨٢٥٢	٨٢٦٠	٨٢٦٨	٨٢٧٦	٨٢٨٤	٨٢٩٢	٨٣٠٠	٨٣٠٨	٨٣١٦	٨٣٢٤	٨٣٣٢	٨٣٤٠	٨٣٤٨	٨٣٥٦	٨٣٦٤	٨٣٧٢	٨٣٨٠	٨٣٨٨	٨٣٩٦	٨٤٠٤	٨٤١٢	٨٤٢٠	٨٤٢٨	٨٤٣٦	٨٤٤٤	٨٤٥٢	٨٤٦٠	٨٤٦٨	٨٤٧٦	٨٤٨٤	٨٤٩٢	٨٥٠٠	٨٥٠٨	٨٥١٦	٨٥٢٤	٨٥٣٢	٨٥٤٠	٨٥٤٨	٨٥٥٦	٨٥٦٤	٨٥٧٢	٨٥٨٠	٨٥٨٨	٨٥٩٦	٨٦٠٤	٨٦١٢	٨٦٢٠	٨٦٢٨	٨٦٣٦	٨٦٤٤	٨٦٥٢	٨٦٦٠	٨٦٦٨	٨٦٧٦	٨٦٨٤	٨٦٩٢	٨٧٠٠	٨٧٠٨	٨٧١٦	٨٧٢٤	٨٧٣٢	٨٧٤٠	٨٧٤٨	٨٧٥٦	٨٧٦٤	٨٧٧٢	٨٧٨٠	٨٧٨٨	٨٧٩٦	٨٨٠٤	٨٨١٢	٨٨٢٠	٨٨٢٨	٨٨٣٦	٨٨٤٤	٨٨٥٢	٨٨٦٠	٨٨٦٨	٨٨٧٦	٨٨٨٤	٨٨٩٢	٨٩٠٠	٨٩٠٨	٨٩١٦	٨٩٢٤	٨٩٣٢	٨٩٤٠	٨٩٤٨	٨٩٥٦	٨٩٦٤	٨٩٧٢	٨٩٨٠	٨٩٨٨	٨٩٩٦	٩٠٠٤	٩٠١٢	٩٠٢٠	٩٠٢٨	٩٠٣٦	٩٠٤٤	٩٠٥٢	٩٠٦٠	٩٠٦٨	٩٠٧٦	٩٠٨٤	٩٠٩٢	٩١٠٠	٩١٠٨	٩١١٦	٩١٢٤	٩١٣٢	٩١٤٠	٩١٤٨	٩١٥٦	٩١٦٤	٩١٧٢	٩١٨٠	٩١٨٨	٩١٩٦	٩٢٠٤	٩٢١٢	٩٢٢٠	٩٢٢٨	٩٢٣٦	٩٢٤٤	٩٢٥٢	٩٢٦٠	٩٢٦٨	٩٢٧٦	٩٢٨٤	٩٢٩٢	٩٣٠٠	٩٣٠٨	٩٣١٦	٩٣٢٤	٩٣٣٢	٩٣٤٠	٩٣٤٨	٩٣٥٦	٩٣٦٤	٩٣٧٢	٩٣٨٠	٩٣٨٨	٩٣٩٦	٩٤٠٤	٩٤١٢	٩٤٢٠	٩٤٢٨	٩٤٣٦	٩٤٤٤	٩٤٥٢	٩٤٦٠	٩٤٦٨	٩٤٧٦	٩٤٨٤	٩٤٩٢	٩٥٠٠	٩٥٠٨	٩٥١٦	٩٥٢٤	٩٥٣٢	٩٥٤٠	٩٥٤٨	٩٥٥٦	٩٥٦٤	٩٥٧٢	٩٥٨٠	٩٥٨٨	٩٥٩٦	٩٦٠٤	٩٦١٢	٩٦٢٠	٩٦٢٨	٩٦٣٦	٩٦٤٤	٩٦٥٢	٩٦٦٠	٩٦٦٨	٩٦٧٦	٩٦٨٤	٩٦٩٢	٩٧٠٠	٩٧٠٨	٩٧١٦	٩٧٢٤	٩٧٣٢	٩٧٤٠	٩٧٤٨	٩٧٥٦	٩٧٦٤	٩٧٧٢	٩٧٨٠	٩٧٨٨	٩٧٩٦	٩٨٠٤	٩٨١٢	٩٨٢٠	٩٨٢٨	٩٨٣٦	٩٨٤٤	٩٨٥٢	٩٨٦٠	٩٨٦٨	٩٨٧٦	٩٨٨٤	٩٨٩٢	٩٩٠٠	٩٩٠٨	٩٩١٦	٩٩٢٤	٩٩٣٢	٩٩٤٠	٩٩٤٨	٩٩٥٦	٩٩٦٤	٩٩٧٢	٩٩٨٠	٩٩٨٨	٩٩٩٦	١٠٠٠٤	١٠٠١٢	١٠٠٢٠	١٠٠٢٨	١٠٠٣٦	١٠٠٤٤	١٠٠٥٢	١٠٠٦٠	١٠٠٦٨	١٠٠٧٦	١٠٠٨٤	١٠٠
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-----



الثمة جزء من الغذاء المذكور نحوي ما قدره

مالية الغذاء	مصارف من المصارف التجارية - مصر												
	عناصر عام					عناصر منقمة					الحسن الذاتي	مردد أسية	القيمة الذاتية التيوية في مئة جزء
	مردد التيوية	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة	مردد مئة			
ويديان مرموي	٣,٤٧	٧,٠٠	١,٠٥	١٣,٥	١,٠٤	٤,٥٥	٠,٧	٩,٠٤	٦,٧	٠,٦٠	٢,٠٢	١٤,٥	
جلمان	٣,٥٠	١,٠٣	٢,٥٥	١٠,١	٨,٩٠	٧,٠٦	١,٢٧	١٠,٧	٤,٥	٠,٨٠	٥,٣	١٤,٨	
باتية	١,٨٥	٢,٤	٠,٨	٦,١	٥,٥	٢,٠	٠,٤	٢,٠	٢,٠	٠,٨	٦,٧		

٣ - في الثمن

١٨٩٠	٢٥٠	٠٢٤٩	١٥٦٦	١٩٩٣	٠٥٠	٢٥٤	٢٣٥٠	٣٨٩٢	١٥٠	٧٥٥	٨٥٥٧	ثمن المروج الكفيفة
٢٢٣٧	٢٣٢	٠٢٥٨	١٥٥٣	٢١٦١	٠٦٠	٤٦٦	٢٩٩٢	٢٩٧٧	٢٥٠	٩٢٢	٨٥٥٧	ثمن المروج المنصقة
٣١٠٠	٢٣٨	٠٢٦٧	١٥٥٠	٢٥٢٥	٠٨٤	٥٢٤	٢٦٣٣	٤١٥٤	٢٥٠	٩٧٧	٨٥٥٧	ثمن المروج الحسنة
٣٦٩٢	٥٠٠	٠٢٨٤	١٣٣٨	٢٧٥٩	١٥٣	٧٥٤	٢١٥٩	٤١٦١	٢٥٨	١١٥٧	٨٥٥٠	ثمن المروج الجيدة
٤٠٥٦	٦٥٠	٠٢٧٨	١٢٥٧	٣٠٠١	١٥٦	٩٢٤	١٩٥٣	٤٠٤٤	٢٥٠	١٣٥٥	٨٤٤٠	ثمن المروج القاصرة
٤٣٥٧	٥٥٠	٠٢٧٣	١٤٠٠	٢٦٤٤	١٥٦	٩٢٤	٢٢٥٥	٣٩٤٤	٢٥٠	١١٥٥	٨٥٥٢	بيع المرامي غير المروية
٢٣٥٧	٦٥٠	٠٢٧٧	١٢٥٢	٢٧٥٢	٢٥١	٧٥٤	١٥٧٧	٤٠٦١	٤٥٠	١٢٤٤	٨٥٥٠	بيع المرامي المروية
٣٨٥٠	٦٤٤	٠٢٧٤	١٥٥١	٢٢٧٠	٢٤١	٨٥٢	٢٢٦١	٣٩٧٧	٢٦٦	١٢٥١	٨٥٥٥	ثمن المناطق الجبلية
٣٤٥٧	٢٣٧	٠٢٩٩	١٥٥٨	٢٨٥٣	٠١٥	٢٦٥٧	٤٤٢٤	٤٤٢٤	٤٥٢	٩٢٢	٨٥٥٠	ثمن المرامي الترابية
٣٣٥٨	٥٥٤	٠٢٧٢	١٤٥٥	٢٥٥٤	١٥٢	٧٥٠	٢٢٢٣	٤٠٤٤	٢٥٥	١١٥٤	٨٥٥٠	بيع المرامي الترابية
٣٣٧٧	٤٥١	٠٢٦٩	١٥٥٣	٢٧٥٦	١٥٠	٥٥٠	٢٦٥٠	٤٣٢٢	٢٥١	٨٥٧	٨٥٥٠	ثمن الارباح
٣٠٦١	٣٥٠	٠٢٥٥	١٦٥٤	٢٤٦١	١٥٢	٤٣٢	٢٨٥٤	٤١٥٧	٢٥٧	٨٥١	٨٥٥٢	ثمن المرامي الماخلة
٢٠٠٩	٢٥٠	٠٢٥٢	١٥٥٠	٢١٦٨	٠٢٨	٢٥٨	٢٢٢٤	٢٧٢٢	٢٤٤	٧٥٦	٨٧٠٠	ثمن المرامي الخاضعة
٣٥٥٢	٤٥٨	٠٢٦٧	١٨٥١	٢٦٥٧	١٥٧	٥٦٦	٣٠٦١	٤٤٢٤	٢٤٤	٧٥٥	٨٨٥٥	ثمن الخراطا
٣٠٣٢	٤٥٨	٠٢٦٤	١٧٥٦	٢٢٥٤	٠٩٦	١٥١	٢٩٥٤	٣٨٥٥	٢٥٢	١٠٥٨	٨٦٦٠	ثمن الموي
٢٢٥٥	٢٣٢	٠٢٥٦	١٥٤٤	١٩٥٩	٠٥٨	٣٠٥٢	٣٢٦١	٤١٥٧	٢٥٧	١٠٢٢	٨٥٥٧	ثمن الزوان المسمر
٢١٠٠	٢٥٥	٠٢٥٥	١٥٥٦	١٧٥٥	٠٥٨	٥٦٦	٢٩٥٤	٣٢٥٦	٢٥٧	١١٥٢	٨٥٥٧	ثمن القيسر
٢٥٥٦	٤٥٩	٠٢٧٢	١٤٥٩	٢٦٦١	١٥٤	٧٥١	٢٢٢٩	٤٠٦١	٢٥٢	١١٥٢	٨٥٥٧	ثمن الزوان الايطالي
٣٢٦١	٦٤٢	٠٢٦٩	١٧٥١	٢٧٢٣	١٥٥	٧٢٢	٢٨٥٥	٣٩٥٠	٢٥٠	١٠٤٤	٨٥٥٧	ثمن التعليل
٢٩٥١	٢٣٢	٠٢٦٤	١٥٥١	٢٥٥٥	١٥٠	٤٥٠	٢٨٥٥	٤١٥١	٢٤٤	٨٥٥	٨٥٥٧	ثمن المصيبة
٢١٥٠	٥٥٠	٠٢٧٠	١١٢٣	٢٦٦٠	١٥٧	٨٥٥	٤٤٥٠	٣٧٥١	٢٤٩	١٢٣٥	٨٢٣٥	ثمن نفل المروج المنصق
٢١٥٥	٨٥١	٠٢٦٣	١١٢٣	٢١٦١	١٥١	١٢٥١	٢٣٥٠	٣١٥١	٢٤٩	١٢٦١	٨٤٥٠	ثمن الترسس قبل الانزعار
٢٢٤٤	٩٢٢	٠٢٥٧	١٢٥٢	١٨٥١	١٥٢	٩٢٧	٢٩٥٥	٢٩٥٢	٢٥٦	١٤٥٢	٨٢٣٥	ثمن الترسس أثناء الانزعار
٢٢٢٩	٧٥٨	٠٢٧٠	١٠٥٧	٢٥٢٢	٢٥١	١٠٢٩	٤٤٩٩	٣٤٥٠	٢٥٢	١٥٤١	٨٤٥٢	ثمن الترسس قبل الانزعار
٢١٦١	٧٥٥	٠٢٦٦	١١٥٨	٢٥٢٣	١٥٦	٩٦٦	٢٨٥٠	٣٢٥٥	٢٥٥			ثمن الترسس أثناء الانزعار
٢١٥٠	٨٥٦	٠٢٦٩	١٠٤٨	٢٢٣٢	١٥٦	١١٥٨	٢٢٢٢	٣٢٢٢	٢٥٤	١٥٤١	٨٤٤٠	ثمن الترسس
٢٢٢٠	٥٥١	٠٢٧٢	١١٥٢	٢٧٥١	١٥٥	٧٥٤	٢٢٥٥	٤١٥٧	٢٥٥	١٣٥٥	٨٥٥٥	ثمن القوس القلبي
٢٧٥٤	٥٥٥	٠٢٦٤	١٢٢٣	٢٢٢١	١٥٠	٨٥٣	٢٦٥٢	٣٥٥٥	٢٥٥	١٢٥٠	٨٢٣٢	ثمن النفل القلبي
٢٣٥٨	٨٨٢	٠٢٦٠	١٢٤٩	٢٠٢٢	١٥٢	١١٥٧	٢٠٢١	٢٨٥٩	٢٥٠	١٥٥٢	٨٢٣٢	ثمن النصف
٢٤٩٨	٥٥٦	٠٢٦٧	١٢٥١	٢٢٣٨	١٥٣	٨٥٣	٢٥٥٧	٣٤٥٥	٢٥١	١٣٣٦	٨٤٥٥	ثمن النفل القلبي
٢١٥٤	٩٢٢	٠٢٦٨	١٢٥٨	٢٠٠٩	٢٥٠	١١٥٤	٢٥٦٦	٣٢٢٢	٢٥١	١٥٥٢	٨٤٤٠	ثمن الريبين المروية
٢١٥٥	٤٤٤	٠٢٥٥	١٢٥٦	١٨٥١	١٥٦	٨٥٣	٢٥٠٢	٢٧٥٩	٢٥٨	١٦٥٧	٨٤٤٢	ثمن الحنفوق الابيض
٢٢٥١	٤٤٩	٠٢٧١	١١٥٨	٢٥٠٠	٢٥١	٨٥٥	٢٢٢١	٢٥٥٧	٢٥٦	١٤٤٩	٨٤٤٠	ثمن النفل الابيض
٢٢٢٦	١٢٠٠	٠٢٧١	١٢٥٨	١٨٥٦	١٥٧	١١٥٧	٢٢٢٢	٢٨٥٨	٢٥٨	٢١٦٨	٨٤٤٠	ثمن الجلبان قرب الانزعار
٢٢٣٨	٦٠٦	٠٢٦٦	١٢٥٦	٢٠٠٥	١٥٦	٩٤٤	٢٥٠٢	٢٤٥٨	٢٥٦	١٤٢٤	٨٢٣٢	ثمن الجلبان أثناء الانزعار
٢٧٥٤	١٠٠٨	٠٢٦٩	١٢٥٦	١٨٥٥	١٤٤	١٥٥١	٢٢٢٤	٢٨٥٥	٢٥٢	١٤٥٨	٨٢٣٢	ثمن الباقية قرب الانزعار
٢٢٥٩	٦٠٦	٠٢٦٥	١٢٥٨	١٩٥٧	١٥٥	٩٢٤	٢٥٥٥	٢٢٢٨	٢٥٠	١٤٢٢	٨٢٣٢	ثمن الباقية أثناء الانزعار
٢٢٢٨	٨٥٥	٠٢٦٩	١٢٤٤	٢٢٢١	١٥١	١٢٥٧	٢٦٥٠	٢٤٥٦	٢٥٢	١٢٣٨	٨٤٤٠	ثمن الترسس
٢٢٠٢	١٢٥٧	٠٢٧٢	١٢٥٥	٢٢٢٨	١٤٤	١١٥٩	٢٥٥٤	٢٨٥٩	٢٥٢	٢٢٥٥	٨٤٤٠	ثمن الكوسنة
٢٢٠٠	٨٥٥	٠٢٦٦	١٥٥٦	١٩٥١	١٥٧	١١٥٩	٢٩٥٥	٢٨٥٩	٢٥٢	١٧٥٢	٨٤٤٠	ثمن المصيبة
٢٢٣٠	٨٠٠	٠٢٦٩	١٢٢٢	٢٥٥٢	٠٩٦	١٢٥١	٢٥٠٢	٢٤٥٦	٢٥٠	١٧٢٢	٨٢٣٥	ثمن الترسس
٢٢٠٨	٦٠٢	٠٢٧٤	١٢٥٠	٢٢٥٢	١٥٢	٧٥٧	٢٢٥٨	٤١٥٨	٢٥٢	١٢٥١	٨٥٥٥	ثمن السبرغولة

## لغة جزء من العلماء المذكور بحري ما قلده

ماهية العلماء	عناصر عام								عناصر منهضة				الحق العلماني بالنسبة إلى العلماء	مصاد آسية منهضة في مكة جزء	العمدة العلمية منهضة في مكة جزء
	مرد جافة	مرد أزرق	مرد دخية	مرد غير الأزرق	مرد أزرق	مرد دخية	مرد غير الأزرق	مرد أزرق	مرد دخية	مرد غير الأزرق	مرد أزرق	مرد دخية			
نظم النظم	٨٦٠	١٠٥	٢١٠	٣٠٦	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
نظم السليم	٨٦٥	١٠٥	٢١٠	٣٠٦	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
نظم الخرد	٨٥٠	١١٠	٢٠٥	٣٠٠	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
نظم الزوال	٨٥٠	٩٠	٢٠٠	٣٠٠	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
نظم السفين	٨٥٠	٢٠٠	٢٠٠	٣٠٠	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق القرائن	٨٦٥	١٠٥	٢١٠	٣٠٦	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق سوق الجنبل	٨٩٤	١٢٥	٢٠٥	٣٠٥	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
شمن الطالما	٩٠٠	٩٤	٢٠٤	٣٠٤	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق الانجار المنيرة	٨٤٠	١٠٥	٢١٠	٣٠٦	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
(في الاواخر تموز)															
ورق الحور في تشرين الاول	٨٤٠	١٠٥	٢١٠	٣٠٦	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق الكرمية في الحريف	٨٨٠	١١٤	٢٠٧	٣٠٩	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق الاكاسيه في الحريف	٨٧٦	٩٨	٢٠٧	٣١٠	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
شمن الطوبى	٨٧٥	١٢٧	٢٠٢	٣٠٢	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢
ورق التبردار	٨٨٠	١٥٩	٢٠٩	٣٠٩	٦٠٢	١٠٠	٢٢٢	١٧٢	١٠٥	٢٢٢	١٧٢	٢٠٠	٢٧٢	٢٧٢	٢٧٢

## ٤ - في الفقه

٩٠٧	٢٠٧	٢٠٨	١١٨	٢٢٠	٢٠٠	٢٠٨	٤٤٠	٣١٨	١٠٤	٢٠٧	٨٥٧	٩٠٧	قش الخندروس
١٠٠	٢٠٧	٢٠٨	١١٨	٢٢٠	٢٠٠	٢٠٨	٤٤٠	٣١٨	١٠٤	٢٠٧	٨٥٧	٩٠٧	قش التبردار
١٠٧	٢٠٨	٢٠٩	١١٩	٢٢١	٢٠١	٢٠٩	٤٤١	٣١٩	١٠٥	٢٠٨	٨٥٨	٩٠٨	قش التبردار
١٧٠	٢٠٩	٢١٠	١٢٠	٢٢٢	٢٠٢	٢١٠	٤٤٢	٣٢٠	١٠٦	٢٠٩	٨٥٩	٩٠٩	قش التبردار
٢٢٣	٢١٠	٢١١	١٢١	٢٢٣	٢٠٣	٢١١	٤٤٣	٣٢١	١٠٧	٢١٠	٨٦٠	٩١٠	قش التبردار
٣٠٥	٢١١	٢١٢	١٢٢	٢٢٤	٢٠٤	٢١٢	٤٤٤	٣٢٢	١٠٨	٢١١	٨٦١	٩١١	قش التبردار
١٣٠	٢١٢	٢١٣	١٢٣	٢٢٥	٢٠٥	٢١٣	٤٤٥	٣٢٣	١٠٩	٢١٢	٨٦٢	٩١٢	قش التبردار
١٠٩	٢١٣	٢١٤	١٢٤	٢٢٦	٢٠٦	٢١٤	٤٤٦	٣٢٤	١١٠	٢١٣	٨٦٣	٩١٣	قش التبردار
٩٢	٢١٤	٢١٥	١٢٥	٢٢٧	٢٠٧	٢١٥	٤٤٧	٣٢٥	١١١	٢١٤	٨٦٤	٩١٤	قش التبردار
١٠٧	٢١٥	٢١٦	١٢٦	٢٢٨	٢٠٨	٢١٦	٤٤٨	٣٢٦	١١٢	٢١٥	٨٦٥	٩١٥	قش التبردار
٩٢	٢١٦	٢١٧	١٢٧	٢٢٩	٢٠٩	٢١٧	٤٤٩	٣٢٧	١١٣	٢١٦	٨٦٦	٩١٦	قش التبردار
١٠٧	٢١٧	٢١٨	١٢٨	٢٣٠	٢١٠	٢١٨	٤٥٠	٣٢٨	١١٤	٢١٧	٨٦٧	٩١٧	قش التبردار
٩٢	٢١٨	٢١٩	١٢٩	٢٣١	٢١١	٢١٩	٤٥١	٣٢٩	١١٥	٢١٨	٨٦٨	٩١٨	قش التبردار
١٠٧	٢١٩	٢٢٠	١٣٠	٢٣٢	٢١٢	٢٢٠	٤٥٢	٣٣٠	١١٦	٢١٩	٨٦٩	٩١٩	قش التبردار
٩٢	٢٢٠	٢٢١	١٣١	٢٣٣	٢١٣	٢٢١	٤٥٣	٣٣١	١١٧	٢٢٠	٨٧٠	٩٢٠	قش التبردار
١٠٧	٢٢١	٢٢٢	١٣٢	٢٣٤	٢١٤	٢٢٢	٤٥٤	٣٣٢	١١٨	٢٢١	٨٧١	٩٢١	قش التبردار
٩٢	٢٢٢	٢٢٣	١٣٣	٢٣٥	٢١٥	٢٢٣	٤٥٥	٣٣٣	١١٩	٢٢٢	٨٧٢	٩٢٢	قش التبردار
١٠٧	٢٢٣	٢٢٤	١٣٤	٢٣٦	٢١٦	٢٢٤	٤٥٦	٣٣٤	١٢٠	٢٢٣	٨٧٣	٩٢٣	قش التبردار
٩٢	٢٢٤	٢٢٥	١٣٥	٢٣٧	٢١٧	٢٢٥	٤٥٧	٣٣٥	١٢١	٢٢٤	٨٧٤	٩٢٤	قش التبردار
١٠٧	٢٢٥	٢٢٦	١٣٦	٢٣٨	٢١٨	٢٢٦	٤٥٨	٣٣٦	١٢٢	٢٢٥	٨٧٥	٩٢٥	قش التبردار
٩٢	٢٢٦	٢٢٧	١٣٧	٢٣٩	٢١٩	٢٢٧	٤٥٩	٣٣٧	١٢٣	٢٢٦	٨٧٦	٩٢٦	قش التبردار
١٠٧	٢٢٧	٢٢٨	١٣٨	٢٤٠	٢٢٠	٢٢٨	٤٦٠	٣٣٨	١٢٤	٢٢٧	٨٧٧	٩٢٧	قش التبردار
٩٢	٢٢٨	٢٢٩	١٣٩	٢٤١	٢٢١	٢٢٩	٤٦١	٣٣٩	١٢٥	٢٢٨	٨٧٨	٩٢٨	قش التبردار
١٠٧	٢٢٩	٢٣٠	١٤٠	٢٤٢	٢٢٢	٢٣٠	٤٦٢	٣٤٠	١٢٦	٢٢٩	٨٧٩	٩٢٩	قش التبردار
٩٢	٢٣٠	٢٣١	١٤١	٢٤٣	٢٢٣	٢٣١	٤٦٣	٣٤١	١٢٧	٢٣٠	٨٨٠	٩٣٠	قش التبردار

## ٥ - عصابة الحبوب

٤٠٧	١٠٧	٢٠٨	١١٨	٢٢٠	٢٠٠	٢٠٨	٤٤٠	٣١٨	١٠٤	٢٠٧	٨٥٧	٩٠٧	قش الخندروس
٢٢٨	١٠٨	٢٠٩	١١٩	٢٢١	٢٠١	٢٠٩	٤٤١	٣١٩	١٠٥	٢٠٨	٨٥٨	٩٠٨	قش التبردار
٤٠٥	١٠٩	٢١٠	١٢٠	٢٢٢	٢٠٢	٢١٠	٤٤٢	٣٢٠	١٠٦	٢٠٩	٨٥٩	٩٠٩	قش التبردار
٢٨٦	١١٠	٢١١	١٢١	٢٢٣	٢٠٣	٢١١	٤٤٣	٣٢١	١٠٧	٢١٠	٨٦٠	٩١٠	قش التبردار
١٩٤	١١١	٢١٢	١٢٢	٢٢٤	٢٠٤	٢١٢	٤٤٤	٣٢٢	١٠٨	٢١١	٨٦١	٩١١	قش التبردار
١٢١	١١٢	٢١٣	١٢٣	٢٢٥	٢٠٥	٢١٣	٤٤٥	٣٢٣	١٠٩	٢١٢	٨٦٢	٩١٢	قش التبردار

## المئة جزء من الغذاء المذكور تحوي ما قلده

ماحية الغذاء	عناصر عام										عناصر منضمة			الحقن الطبي النسبة الى النشا	مواد أخرى منهضة في مئة جزء	القيمة الطبيعية في مئة جزء
	مواد جلالة	مواد الزيتية	مواد دهنية	مواد غير الزيتية	سليلوز	مواد دهنية	مواد غير الزيتية	مخلاصات	سليلوز	مواد جلالة	مواد الزيتية					
الارز (الصلب)	٩٠٠٠	٣٠٧	١٤٤	٣٢٢٣	٣٨١	٢٠٤	١١٣٣	٠٠٩	٠٠٤	٠١٩	٠١	٢٠٥				
الشيلم	٨٠٤٧	٢٠٥	١٣٣	٢٩١١	٤٤١	١٠١	١١٣٣	٠٠٤	٠٠٤	٠١٧	٠١	٢٢٠				
الحنطة	٨٤٠٠	١٧٤	١٠٧	٣٧١١	٣٠٤	١٠١	١١٣٧	٠٠٥	١٤٦	٠٠٩	٠١	٢٤٣				
الفاصوليا واللوبيا	٨٥٠٠	١٠٠٧	٢٠٠	٣٢٢٥	٣٢٥	٠٠٢	٢١٠١	٠١٠	١٤٤	٠٠٣	٠١	٢١٨				
الحمص	٨٦٠٠	٩٠٨	١٠٢	٣٢٢٧	٣٢٧	٠٠٤	٢٠٠٢	٠٠٥	١٤٩	٠٠٥	٠١	٢٠١				
البنس	٨٥٠٠	١٨٠٣	١٠٨	٣٨٤٨	١٩٥	١٠١	٢٢٢٣	٠١٠	١٤٦	٠١٧	٠١	٣٠٣				
الترس	٨٥٠٠	٦٠٨	٠٠٧	٤٠٥١	٣٠١	٢٠٦	٢٠٣٣	٠٠٢	١٤٤	٠٠٤	٠١	١٤٤				
الاصحبه	٨٨٠٠	٦٠٣	٠١٥	٤٢٠١	٢٠١	٢٠٨	٢٠٠٧	٠٠٨	١٤٣	٠٠٧	٠١	٢٢٠				
الكافيه	٨٥٠٠	٢٠٢	٣١٨	٣٢٢٣	٣١٨	٠١	١٩٠١	٠١٠	١٣٩	٠٠٢	٠١	٢٠١				
القمح	٨٦٠٨	١٤٦	١٠١	٣٠٤٥	٤٣٥	٢٠١	١٣١٨	٠٠٥	١٣١	٠٠٩	٠١	١٧٨				
الكتان	٨٨٤٤	٢٠٥	٢٠٤	٣٥٠٠	٤٠٠٧	١٤٤	١٣٠٠	٠١٧	١٢٢	٠٠٦	٠١	١٧٧				
السج	٨٤٠٠	٢٠٥	١٠٦	٣٤٤٤	٣٧٤	١٠٥	١٦٠٦	٠١٧	١٤٣	٠٠٧	٠١	٢٠٧				

## ٩ - في الجوز والسائل

١٩٠٠	٠٠١	١٣٠٠	-	١٨٠٩	-	١٠١	٠٠٧	٢١٠٠	٠٠١	٢٠١	٢٥٠	بطاطا عادية
١٢٠٧	٠٠٢	١٠٠٠	-	١٢٠٥	-	٠٠٩	٠٠٦	١٣٠٩	٠٠١	١٠٦	١٧٠	بطاطا كثيرة الماء
١٩٠٨	٠٠٢	١٠٠٠	-	١٩٠٧	-	١٠١	٠٠٨	٢١٠٩	٠٠١	٢٠١	٢٦٠	بطاطا قليلة الماء
٢٤٠٨	٠٠٢	١٠٠٠	-	٢٤٠٦	-	١٠٣	٠٠٩	٢٧٠٣	٠٠٢	٢٠٥	٢٢٠	بطاطا شديدة الفقر بالماء
٣١٥٠	٠٠٢	١٠٠٠	-	٣١٣٣	-	٠٠٩	٠٠٨	٣٤٠٨	٠٠١	١٠٦	٣٨٤	بطاطا مجلدة
١٧٠٧	٠٠١	٠٩٠٥	-	١٨٠٤	٠٠١	١٠١	٠٠٧	٢١٠٧	٠٠٥	٢٠٢	٢٦٥	بطاطا مطبوخة
٦٨٠٨	٠٠٧	١٠٠٠	-	٦٨٠١	-	١٠٥	٢٠٣	٧٤٠١	٠٠٤	٢٠٤	٨٨٠	بطاطا مجففة
٦٠٧	٠٠٤	٠٩٠٠	٠٠٦	٦٠٥	-	١٠٢	٠٠٤	٧٠٢	٠٠١	٢٠٢	١٢٠	كزب
٨٠٧	٠٠٤	٨٠٧	٠٠٧	٨٠٩	٠٠١	٠٠٨	١٠٣	٠٠٢	٠٠٢	١٠٢	١٣٠	جزر
١١٠٦	٠٠٥	٨٠٦	٠٠٨	١٢٥٥	٠٠١	٠٠٩	١٠٣	٠٠٢	٠٠٢	١٠١	١٦٨	مسبارون كبير
٥٠٠	٠٠١	٠٧٤	٠٠٣	٦٠٤	-	٠٠٩	٠٠١	٠٠٧	٠٠١	١٠٢	١٥٥	شوندر علي كبير
٧٠٤	٠٠١	٠٧٠	٠٠٣	١٠١	-	٠٠٨	٠٠٦	٠٠١	٠٠١	١٠٢	١٣٥	شوندر علي صغير
٦٠٢	٠٠١	٠٧٢	٠٠٣	٨٠٣	-	٠٠٨	٠٠٩	٨٠٧	٠٠١	١٠٢	١٢٠	شوندر علي متوسط
٤٠٦	٠٠٢	٠٧٧	٠٠٣	٥٠٥	-	٠٠٨	٠٠٥	٠٠١	٠٠١	٠٠٩	٨٥	لفت اسود
١٦٠٤	٠٠٤	٠٩٢	٠٠٢	١٥٥٨	-	٠٠١	١٠٩	٠٠٢	٠٠١	٢٠٤	٢٠٤	طرطوف
١٥٠٨	٠٠٣	٠٧٥	٠٠٥	٢٠٣	-	٠٠٩	١٠٥	٢١٤	٠٠١	١٠٢	٢٥٠	شوندر سكري
٤٠٨	٠٠٣	٠٧٨	٠٠٤	٤٠٤	-	٠٠٨	١٠١	٥٠٩	٠٠٢	١٠٢	٩٠٢	لفت

## ٧ - في الحبوب والثمار

٧٤٠٢	٠٠١	١٣٠٠	٠٠١	٦٠٥٥	٢٠٠	٧٠٧	١٠٩	٧١٢	٢٠٨	٩٠٦	٨٨٠٩	ذرة
٥٢٠١	٧٠٢	٠٠٢	٦٠٨	٤٤٠١	٠٠١	٨٠٢	١٥٥	٥٢٠٢	١٠٤	١٠٩	٨٦٣	خنثري
٧٤٠٢	١٠٠٠	١٠٠٠	١٠٢	٦٠٠٠	١٠٩	١١٠١	٢٠٦	٦٥٠٢	٢٠٧	١٣٠٩	٨٦١	خنثري مقشور
٧٢٠٠	٦٠١	٠٩٩	١٠٢	٦٤٠٤	١٠٩	٦٠٦	٢٠٩	٦٧٠٨	٢٠١	٩٠٤	٨٥٠٧	شعير (معدل وسطى)
٧٥٠٨	٠٠٩	٠٩٩	١٠٢	٦٦٠٧	١٠٦	٦٠٣	٢٠٧	٧٠٠٢	١٠٨	٨٠٧	٨٥٠٧	شعير كبير الحب
٦٦٠٤	٦٠٥	٠٩٧	١٠٢	٥٦٠٧	٢٠٢	٧٠١	٦٠٥	٦٢٠٧	٢٠٥	١٠٠٢	٨٥٠٧	شعير مبسط الحب
٥٩٠٧	٧٠٢	٠٥٥	٢٠٦	٤٤٠٨	٤٠٠	٨٠٠	١٠٠٣	٥٨٠٢	٤٠٨	١٠٠٢	٨٦٠٧	خرطال (معدل وسطى)
٦٣٠٤	٠٠٤	٠٩٦	٢٠١	٥٠٠٦	٢٠٥	٦٠٢	٨٠١	٦٢٠٢	٤٠٢	٨٠٢	٨٦٠٧	خرطال مقل الحب
٥٤٠٨	٠٩٢	٠٢٣	٢٠٧	٣٧٠٠	٤٠٦	١٠٠٢	١٥٠٠	٤٢٠٩	١٢٠٧	١٢٠٧	٨٦٠٧	خرطال مبسط الحب
٥٩٠٧	٧٠٤	٠٥٥	٢٠٧	٤٤٠٨	٢٠١	٨٠٠	٨٠١	٦١٠١	٢٠٩	١٠٠٦	٨٧٠٥	دخن
٨١٥٠	٦٠١	١٣٠٠	١٠٢	٦٥٠٧	٢٠٩	٧٠١	٢٠٢	٦٦٠٢	٤٠٤	٩٠٩	٨٧٠٠	ذرة صفراء (معدل وسطى)
٨٢٠٠	٥٠٥	١٥٠٠	٠٠٧	٧٥٠٨	٠٠٢	٥٠٨	١٠٥	٧٨٠٠	٤٠٤	٧٠٧	٨٧٠٤	ارز مقشور
٧١٠٣	٨٠٧	٠٩٥	١٠٠	٦٢٠٩	١٠١	٩٠٦	١٠٩	٦٩٠٥	١٠٧	١٥٠	٨٦٠٦	شيلم (معدل وسطى)



## المحة جزء من الغذاء المذكور بحوي ما قدره

مادة الغذاء	عناصر خام							عناصر منمصة				الحقن الطبيقي بالسنة أو الإنشا	موايد أمية منمصة في مئة جزء	قيمة الغذاء الشهوة في مئة جزء	
	موايد جافة	موايد أنيقية	موايد دهنية	موايد علاصات	موايد غير أنيقيه	موايد علاصات	موايد غير أنيقيه	موايد جافة	موايد أنيقية	موايد دهنية	موايد علاصات				موايد غير أنيقيه
شليم مبتل الحب	٨٦,٦	٩,٢	١,٥	٧٢,٦	١,٦	٧,٧	٠,٩	١٦,٩	٠,٨	٠,٩٧	٧٢,٧	٧٣,٧			
شليم مبطل الحب	٨٦,٦	١٤,٥	٢,٣	٧٢,٦	٣,٧	١٢,٧	١,٥	٥٦,١	١,٩	٠,٩٢	٦٥,٨	٦٥,٨			
قمح (معدل وسطي)	٨٦,٦	١٢,١	١,٩	٧٩,٠	١,٩	١٠,٢	١,٢	٦٣,٥	٠,٩	٠,٩٥	٧١,٣	٧١,٣			
قمح مبتل الحب	٨٦,٦	١٠,٨	١,٧	٧٠,٩	١,٦	٨,٦	١,٠	٦٥,٦	٠,٨	٠,٩٧	٧٣,١	٧٣,١			
قمح مبطل الحب	٨٦,٦	١٤,٢	٢,٢	٦٢,٠	٣,٧	١٢,٥	١,٤	٥٦,٧	١,٩	٠,٩٢	٦٥,٨	٦٥,٨			
فول	٨٥,٧	٢,٥٤	١,٥	٤٨,٥	٧,١	٢٢,١	١,٢	٤٤,٤	١,٤	٠,٩٧	٦٣,٦	٦٦,٦			
حبص	٨٦,٠	٢٢,٥	١,٦	٢٢,٥	٤,٥	١٩,٤	١,٠	٤٩,٩	٢,٥	٠,٩٨	٥٨,٦	٥٨,٦			
عدس	٨٦,٠	٢,٥٥	١,٩	٥٢,٢	٣,٥	٢١,٩	١,٢	٤٨,٥	١,٨	٠,٩٩	٦٨,٥	٦٨,٥			
ترمس أصفر	٨٦,٠	٣٨,٣	٤,٦	٢٥,٢	١٤,١	٣٤,٤	٣,٨	٢١,٩	١,٢	٠,٩٤	٦٥,٢	٦٥,٢			
ترمس أزرق	٨٦,٠	٢,٩٥	١,٦	٣١,٢	١١,٢	٣١,٣	٠,٢	٣١,٢	١,٠	٠,٩٤	٧١,٠	٧١,٠			
ترمس أبيض	٨٦,٠	٢,٩٤	٧,٢	٣٤,٢	١٢,٢	٣١,٢	١,٦	٢٩,٤	١,١	٠,٩٤	٧١,٢	٧١,٢			
كرسة	٨٤,٠	٢٢,١	١,٥	٤٩,٣	٧,١	٢٠,٤	١,٢	٤٥,٨	١,٧	٠,٩٧	٦٦,٦	٦٦,٦			
ربيدان رمعي	٨٦,٠	٢,٩٤	٧,٧	٣٣,٢	٢,٠	١,٥	١,٥	٢١,٩	١,٢	٠,٩٨	٤٨,٩	٤٨,٩			
صوبية	٩٠,٠	٣٣,٢	١,٧٥	٣٠,٢	٤,٤	٣٥,٨	١,٥	٢٠,٨	١,٧	٠,٩٨	٨٣,٩	٨٣,٩			
باقية	٨٦,٧	٢,٦٠	١,٧	٤٩,٨	١,٠	٢٢,٩	١,٥	٤٥,٨	٣,٩	٠,٩٨	٦٩,٧	٦٩,٧			
بزر القطن	٩٠,٠	٢,١٢	٢,٥٥	١٩,٢	١,٩٣	٢٢,٤	١,٤	٢٢,٤	١,٤	٠,٩٤	٨٤,٩	٨٤,٩			
فستق سوداني	٩٢,٠	٢,٩٧	٤,٩٢	٢٩,٧	١,٠	٢٩,٧	١,٠	٤٦,٧	٢,٤	٠,٩٩	١٢,٤	١٢,٤			
قنب	٩١,١	١,٨٢	٣,٢٦	٢١,١	١,٥٠	٢١,٧	١,٦	٢٩,٣	١,٦	٠,٩٠	١٠,٤	١٠,٤			
لفسار	٩٢,٣	٢٢,٩	٢,٩٩	٢٢,٢	٨,٩	٢٦,٩	١,٩	١٦,٧	٤,٤	٠,٩٧	٩,٩٤	٩,٩٤			
كثبان	٩٢,٩	٢,٢٢	٣,٦٥	٢٢,٩	٥,٥	٢٤,٧	١,٩	١٨,٣	١,٨	٠,٩٩	١١,٩٢	١١,٩٢			
خشخاش	٩٢,٨	١,٩٩	٤,٣١	١٧,٤	٥,٥	١٤,٩	٤,٠	١٦,٠	١,٨	٠,٩٩	١٢,٧٦	١٢,٧٦			
جوز الهند	٩١,٦	٨,٥	٤,٨٨	٢٨,٨	٥,٨	٤٦,٥	٨,٠	٢٢,٥	٣,٥	٠,٩٩	١٤,٣٧	١٤,٣٧			
سلمج	٩٢,٧	١,٩٦	٤,٠٥	١٨,٠	٥,٩	٢٢,٨	١,٥	١٤,٤	١,٥	٠,٩٩	١٣,٠٣	١٣,٠٣			
سمسم	٩٤,٥	٢,٠٥	٤,٧٧	١٥,٠	٦,٣	٤٤,٤	٨,٤	٤٤,٤	١,٤	٠,٩٩	١٣,١٨	١٣,١٨			
طرنطين	٩٢,٥	١,٤٢	٢٢,٣	١٤,٥	٢٨,١	٣٠,٧	١,٦	١٠,٢	٩,٤	٠,٩٢	٩,٦٠	٩,٦٠			
لحم	٨٥,٩	١١,٣	٤,٥٤	٤,٥	٨,٥	٢٢,٣	١,٩	٢٢,٣	٣,٥	٠,٩٣	٥,٧٧	٥,٧٧			
بلوط غير مشقور	٥٠,٠	٢,٣	٢,٤	٣١,٣	٦,٨	٣٧,٧	١,٩	٣٢,٣	١,٤	٠,٩٥	٤,٠٤	٤,٠٤			
بلوط مجفف غير مشقور	٨٥,٠	٤,٧	٤,١	٦١,٦	١١,٦	٣,٣	٧,٠	٥٥,٥	٧,٠	٠,٩٥	٦٩,٠	٦٩,٠			
بلوط مشقور	٦٥,٠	٤,٩	٣,٥	٥٠,٠	٤,٥	٣,٩	٣,٩	٤٦,١	٢,٨	٠,٩٨	٥,٦٥	٥,٦٥			
بلوط مشقور ومجفف	٨٥,٠	٦,٥	٤,٦	١٨,٥	٩,٩	٥,٢	٤,٠	١٠,٣	٤,٨	٠,٩٨	٧٥,٥	٧٥,٥			
عزروب	٨٥,٠	٥,٨	١,٣	٦٩,٠	٦,٤	٤,٠	٠,٧	٦٥,٥	٢,٧	٠,٩٧	٧١,٧	٧١,٧			
يقطين	١١,٠	٠,٩	٠,٥	٦,٣	١,٧	٠,٧	١,٠	٥,٧	١,٠	١,٠٠	٧,٤	٧,٤			
شاهيلوط الحصان غير مشقور	٥٠,٨	٤,٥	٤,٠٥	٢,٥	٢,٦	١,٢	٣,٠	٣,٠	١,٢	٠,٩٩	٣,٤١	٣,٤١			
شاهيلوط الحصان غير مشقور ومجفف	٨١,٢	٦,٩	٤,٤	٥٢,٧	٤,٠	١,٤	٢,٠	٤٨,٤	١,٢	٠,٩٩	٥,٤٦	٥,٤٦			
شاهيلوط الحصان مشقور	٤٩,٠	٣,٩	٣,٠	٣٩,٢	١,٦	٢,٢	٢,٥	٣٨,٠	٠,٦	١,٠٠	٤,٤٢	٤,٤٢			
شاهيلوط الحصان مشقور ومجفف	٨٩,٥	٧,٢	٥,٤	٧١,٨	٢,٩	٤,٣	٤,٦	٦٦,٦	٤,٦	١,٠٠	٧,٨٣	٧,٨٣			
بزر شولدر طلي	٨٦,١	١١,٩	٤,٣	٢٨,٨	٣٣,٢	٧,٢	٣,٢	١٧,٨	١,٦	٠,٧٦	٣٠,٣	٣٠,٣			
بزر شولدر سكري	٩٠,٠	١٢,٣	٥,٥	٢٥,٥	٤,٠	٣,٣	١,٥	١٥,٠	١,٥	٠,٧٦	٢٨,١	٢٨,١			

## ٨ - في الحالة والسالة والا كسية

## ١ - الصناعات المطعنة

٢٥,٨	٤,٣	٠,٧٠	٩,٤	٢٠,٩	١,٢	٤,٨	٣٧,٦	٣,٤٢	١,٨	٨,٠	٨٤,٤
٥٥,٢	٩,٩	٠,٩٤	٢,٧	٣,٠	٣,٤	١١,٠	١١,٣	٥,٠	٤,٥	١٥,٢	٨٨,٠
٦٤,٩	٢٠,٦	٠,٩٨	١,٩	٣٠,٠	٦,٨	٢,٤	٣,٨٣	٨,٤	٣,١٨	٨,٥	٨٨,٠
٧٠,٣	٥,٩	١,٠٠	٤,٥	٦١,٧	٤,٠	٦,٨	٧٢,٦	١,٩	٨,٦	٨,٥	٨٥,٣
٥٠,٧	١٠,٣	٠,٩٥	٢,٥	٤,٤	٣,٥	١١,٨	١٠,٠	٥,٢٥	٤,٢	١٥,١	٨٧,٨

نخالة التضم المشقة  
نخالة التضم الناعمة  
دقيق التضم الخشن  
دقيق التضم الناعم  
نخالة المتدوس

## لغة جزء من الغذاء المذكور بحري ما قدره

مادة الغذاء	عناصر محام								عناصر نهضة				الحقن الطافي بالنسبة لل شفا	مادة آخرة نهضة لي	القيمة الطيفية الشعرية لي	مادة جزء
	معدل				معدل				معدل							
	معدل	الزيتية	معدل	خلاصات	معدل	الزيتية	معدل	خلاصات	معدل	الزيتية	معدل	خلاصات				
سنت الحمص	٨٨٠٠	٣٠٢	١٧٢	٢١٩	٤٤٧	٤٠٤	٠٥٠	١٦٠٦	٢٢٣	٠٧٠	٠٧٠	٠٧٠	٠٧٠	٠٧٠	٣٠٨	
نخالة الحمص	٨٨٣٣	١٦٨	١٧٧	٤٦٢	٢٠٠	٠٨٠	٠٨٠	٢٤٦٦	١٠٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٤٠٥	
دقيق الحمص	٨٦٠٥	٢٣٤	٢٠٠	٠١٠	٧٠٠	١٨٣	٠٨٠	١٨٣	٣٠٥	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٦٨٨	
قشور القسطنطيني	٨٩٠٩	٧٢٢	٢٠٩	١٨٥	٥٩٠	٢٠٦	٢٠٨	٧٢٢	٢٠٠	٠٠١	٠٠١	٠٠١	٠٠١	٠٠١	٠٠١	
نخالة القسطنطيني	٨٩٥٥	٢١٨	١٨٠	٢٤٧	١٩٥	١٦٣	١٦٣	١٦٣	٩٧	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٧٣٧	
نخالة الشعير	٨٩٥٥	١٤٨	٢٠٦	٤٧٦	٨٥	١٣٧	٢٧	٤٢٠	٢١	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٥٧٥	
دقيق الشعير	٨٦٨٨	١٢٣	١٦٦	٢٠٦	٦٥٤	٢٠٦	٢٠٦	١٠٢	٢٠٦	٠٩٩	٠٩٩	٠٩٩	٠٩٩	٠٩٩	٦٧٣	
عصارة الخربال	٨٦٠٠	١٠٩	٠٠٥	٤٥٨	٣٢٤	—	٠٢	١٦٥	١٠٧	٠٦٦	—	—	—	—	١٨٣	
دقيق الخربال الأخضر	٩٠٠٠	١١٧	٤٧٦	٥٢٤	١٥٠	٨٠٨	٢٠٨	٣٨٣	٧٥	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٥٥٩	
دقيق الخربال الناعم	٩٠٠٠	١٦٦	٢٠٦	٥٤٥	٧٥	١٦٦	٠٤١	٤٢٠	٢٧	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٠٩٧	٦٤٢	
نخالة الخربال	٩٠٠٤	٧٠٦	٢٠٧	٥٣٨	٢١٦	٢٠٨	١٥	٣٧٥	٨٠	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٤٥٣	
نخالة اللوز الصفراء	٨٧٥٥	٩٠٩	٢٠٦	٦١٥	٩٥	٢٠٦	٢٠٦	٣٧٥	٢٠٦	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٦٤٧	
دقيق اللوز	٨٧٤١	١٢٠	١٢٠	٤٥٢	٨٠	٢٠٨	٢٠٨	٣٦٢	٢٠٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٦٨٤	
دقيق الشيلم	٨٧٤١	١٤٥	٢٠٨	٦٣٥	٢٠٦	١١٠	٢٠٦	٦١٦	٢٠٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٧٧٥	
نخالة الشيلم	٨٧٥٥	١٦٧	٢٠٦	٨٠٠	٤٢	١٢٠	٢٠٦	٤٢٠	١٧	٠٧٩	٠٧٩	٠٧٩	٠٧٩	٠٧٩	٤٦٩	
دقيق الحنطة	٨٧٤١	١٤٣	٢٠٦	٢٢٩	٤٢	١٢٣	٢٠٦	٥٢٢	٢٠٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٧٣٠	
نخالة الحنطة الناعمة	٨٧٤٨	١٥٥	٢٠٨	٤٤٠	٨٠	١٢٩	٢٠٦	٤٠٥	٢٠٦	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٤٨٠	
نخالة الحنطة الخشنة	٨٧٤٨	١٤٣	٢٠٦	٥٢٢	١٠٢	١١٣	٢٠٦	٣٧٧	٢٠٦	٠٧٧	٠٧٧	٠٧٧	٠٧٧	٠٧٧	٤٢٦	

## ب - الصناعات الشعرية

سنت البطاطا الطرية	١٤٠٠	٠٠٦	—	١١٥	١٥٠	—	—	٨٠٨	٨٠٨	٠٢٢	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٨٠٦
سنت البطاطا الجافة	٨٦٠٠	٤٢٠	٠٠١	٦٨٢	٨٠٨	—	—	٥٢٥	١٠١	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٠٩٥	٥٠٩
ثقل اللوز الصفراء الطري	٢٤٨٨	٢٠٦	١٦٦	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	٢٠٨	١٥١	١٤١	٠٩٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	٢٠٢	١٩٥
ثقل اللوز الصفراء الجاف	٨٧٢٢	١٤٠	٠٧٧	٦١٣	٤٢٣	١٨٤	٢٠٦	٠٦٩	١٠٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٦٥٠
ثقل اللوز الصفراء	٩١٠٩	٢٣٧	٢٠٥	٥٦٨	٦٨	١٨٩	١٨٩	٤٧١	٢٥	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٦٣٨
سنت اللوز الطرية	٤٤٧٢	١٢٦	٢٠٦	٢٨٧	٢٠٦	١٢٢	٢٠٦	٢٦٠	٠٤	٠٩٢	٠٩٢	٠٩٢	٠٩٢	٠٩٢	٣٢٨
سنت اللوز الجافة	٨٦٠٠	٢٦٢	٢٠٦	٥٥٢	١٠١	٢١٥	٢٠٦	٠٣٣	٠٧	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٦١٤
ثقل الحنطة الطرية	١٥٠٤	٢٠٠	٠٩	١٠٥	١٠٥	١٠٥	١٠٥	٩٠	٠٨	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	١٠٧
ثقل الحنطة الجافة	٨٧١	٨٧	١٧	٧٤٦	٢٠٨	٦٧	٢٠٨	٦٥٧	٠٩	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٦٤٤
سنت الشونيز الطرية	٧٠٠	٠٠٦	—	٤٧	١٤	٠٣	—	٤٥	١٠	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٥٠
سنت الشونيز المصنوع	١٥٠٠	١٢٣	٠٠١	٩٠	٢٠٠	٧٧	٠٧	٨٥	٢٢	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	٠٩٤	١٠٦
سنت الشونيز الطسود	١٠٠٠	٢٠٢	٧٢	٢٠٢	٢٠٢	٥٠	٠١	٤٥	٢٠٢	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٦٥
سنت الشونيز الجاف	٨٨٨	٨٠١	٠٠٦	٥٨٥	١٧٦	١٠١	١٠١	٠٤٠	١٢٧	٠٧٨	٠٧٨	٠٧٨	٠٧٨	٠٧٨	٥١٩
دبس الحماض	٧٨١	١٠٥	—	٦٠٤	—	٤٥	—	٤٥	—	٨٧	—	—	—	—	٤٨٠
سنت سديس	٩٠٠٠	٨٧	٠٢٠	١٣٨	١٠٨	١٣٨	٠٢٠	٥٢٠	٨٧	٠٨١	٠٨١	٠٨١	٠٨١	٠٨١	٥٠٥
سنت سكرية	٩١٨	٦٧	٠٠٤	٦٨٩	١٢١	٢٠٤	—	٥٨٧	٨٧	٠٨٠	٠٨٠	٠٨٠	٠٨٠	٠٨٠	٥٥٢

## ج - الصناعات التصديرية

ثقل الجمة الطرية	٢٢٨٨	٥٠١	١٧٧	١٠٦	٥٠١	٢٠٧	١٥٠	٦٠٦	٢٠٠	٠٨٦	٠٨٦	٠٨٦	٠٨٦	٠٨٦	١٢٧
ثقل الجمة الجاف	٩٠٥٥	٢٠٠٦	٧٠٠	٤٢٢	١٥٩	٤٦٢	٤٦٢	٢٠٢	٢٠٢	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٤٨٤
ثقل التفاح الجاف	٩٢٢٢	١٩٥	٧٢٢	٤٨٢	١٤٦	٢٠٨	٢٠٨	٢٩٩	٧٠	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٠٨٤	٤٣٣
ثقل التفاح الجاف	٨٩١	١٥٢	٦٠٨	٣٩٧	٢١٠	٤٧	٤٧	٤٧	٢٠٦	٠٨٣	٠٨٣	٠٨٣	٠٨٣	٠٨٣	٢٨٧
سنت الخشخاش	٨٧٢٩	٤٩٢	٢٠٩	٢٠٤	٠٠١	٤٢٧	١٠١	٢٤٨	—	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	٦٥٠
ثقل البطاطا الطرية	٥٠٧	٢٠١	٠٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٢٠١	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٠٩٣	٢٠١
ثقل البطاطا الجاف	٩١٠٠	٢٤٢	٢٠٧	٤٠٨	٩٥	١٢٢	١٢٢	٢٠٢	٢٠٢	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٣١٢
ثقل اللوز الصفراء الطرية	٨٧	٢٠٠	٠٠٩	٤٥	٠٨	١٢	١٢	٣٢٢	٠٨	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٥٠٥
ثقل اللوز الصفراء الجاف	٩٠٠٠	٢٧١	١٢٦	٣٥٦	٩١	١٨٢	١٨٢	٢٠٢	٢٠٢	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٠٨٨	٦٠٦
ملح الحماض	٥٢٢٠	٦٥	١٢	٣٨١	٤٨	٢٠٢	٢٠٢	٣٣١	١٠١	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٠٩٠	٣٩٩
ملح جاف	٩٢٢٥	٩٥	٢٠٥	٦٩١	٩٠	٧٦	٧٦	١٠١	٤٥	٠٩٦	٠٩٦	٠٩٦	٠٩٦	٠٩٦	٧١٠



## ١٨٩٤٤ - عِلْمُ الْبَحَارِ ، عُضَامَةُ ٥

Océanographie (F). Oceanographie (E).  
علم يبحث في علم البحار ونبوتها وما هي عليه من مختلف الأحوال الطبيعية .

## ١٨٩٦٥ - عِلْمُ التَّارِيخِ الطَّبِيعِيِّ ، عِلْمُ التَّوَالِيدِ

Histoire naturelle (F). Natural history (E).  
علم يبحث في وصف الأسماء وتصنيفها .

## ١٨٩٦٦ - عِلْمُ التُّرْبَةِ ، أَغْرُولُوجِيَّة

Agrologie (F). Agrologie (E).  
دراسة التربة حكمياً وكيمياوياً وبيكانيكياً وبيولوجياً . وهو أيضاً دراسة الأثرية الزراعية وصلاتها بالزروع .

## ١٨٩٦٧ - عِلْمُ التَّصْنِيفِ

Taxonomie, Taxinomie (F). Taxonomy (E).  
هي للتدقيق ، الطبلى .

## ١٨٩٦٨ - عِلْمُ التَّحَايِجِ ، تَرَاتُولُوجِيَّة

Tératologie (F). Teratology (E).  
علم يبحث في أسباب غرائب المخلوقات ومن دواهيها . كالإندماج في الثوب والشملة في النبات والأغراب الخ .

## ١٨٩٦٩ - عِلْمُ التَّدْيِيَّاتِ

Mammalogie, Mammologie (F). Mammalogy (E).  
قسم من علم الحيوان يبحث في الثدييات دون غيرها .

## ١٨٩٧٠ - عِلْمُ الْحَشَرَاتِ ، أَنْثُوْمُولُوجِيَّة

Entomologie (F). Entomology (E).  
قسم من علم الحيوان يبحث في تصنيف الحشرات ونبوتها وأطوارها وطبائنها وأضرارها .

## ١٨٩٧١ - عِلْمُ الْحَفَرِيَّاتِ التَّدْيِيَّة

Paléontologie (F). Palaeontology (E).  
هو الإحاطة ، الطبلى .

## ١٨٩٧٢ - عِلْمُ الْحَيَّاتِ ، حَتَاة ٥

Ophlographie, Ophlogologie (F). Ophlography, Ophlogology (E).  
علم يبحث في وصف الحيات وتصنيفها .

## ١٨٩٧٣ - عِلْمُ الْحَيَّاتِ ، زُولُوجِيَّة

Zoologie (F). Zoology (E).  
فرع من التاريخ الطبيعي أو علم المواليد يبحث في الحيوان .

## ١٨٩٧٤ - عِلْمُ الْحَيَّاتِ الْفَرَاغِيَّة ، زُولُوجِيَّة

Zoologie agricole (F).  
Agricultural zoology (E).  
الدراسة المفصلة الوافية لجميع الحيوانات المفيدة والمضرة بالزراعة .

## ١٨٩٧٥ - عِلْمُ الْخَمَرِ ، صَهْبَةُ ٥

Oenologie (F).  
Oenology (E).  
دراسة كل ما يتعلق بالخمر كصنعها وتخليطها وحفظها وإمرارها الخ ...

## ١٨٩٧٦ - عِلْمُ الْخَيْلِ ، خَيْالَةُ ٥

Hippologie (F).  
Hippology (E).  
علم يبحث في الخيل يشمل كل ما ينص به من جميع الوجوه .

## ١٨٩٥١ - عُلْفٌ ، عُلْفٌ

العلف والعلف: جمر ياتي ورفه الكلب يتبع ويجفف ويطبخ به الدم عوضاً عن الخل (١ م).

## ١٨٩٥٢ - عُلْفَاسٌ ٥

Ablepharus (S).  
Abléphare (F). Ablepharous (E).  
جنس زحافات صغيرة من العظائيات وفصيلة السقنقوريات. انزاعها المبررة قليلة العدد أسلحتها المناطق الحارة من العالم القديم || أجسامها صغيرة ، مستدلة الخشاعة ، تقطع من ١٥ إلى ١٥ سم. رؤوسها شبه مخروطية الشكل. حوضها صغيرة عادمة الحواجب . أذنانها دقيقة || جميعها ناضجة ، قشياً اللبدان والحشرات .

## ١٨٩٥٣ - عُلْفَةٌ ٥

هي السفة ، الطبلى .

## ١٨٩٥٤ - عُلْفِيَّة ٥

هي ثغيل الحقل ، الطبلى .

## ١٨٩٥٥ - عُلْفٌ ٥

هو الجلع ، الطبلى .

## ١٨٩٥٦ - عُلْكَةٌ ٥

Hirudo (S).  
Sanguis (F). Leech (E).  
علقة ج علق: اسم شامل يطلق على اجناس وأنواع كثيرة من الملق الماسر . يعيش في الماء ، قوته الدم يمتصه شيئاً يستطع .

## ١٨٩٥٧ - عُلْكَةُ الْخَيْلِ ٥

Hæmopsis vorax (S).  
Sanguis du cheval, S. verte, Vorax (F).  
علقة صغيرة القند أسنينة الشكل غرضها المولج ، تعيش في الماء ولقوس وقد تركب الحيوان إذا اقرب منها وهي تؤذي الخيل إذا دخلت أنفها وطلقت في استنكها لذلك يحسن أنزاعها عند رؤيتها قبل تقلم شرها .

## ١٨٩٥٨ - عُلْكَةُ السَّمَكِ ٥

Sanguis piscicole (F).  
علقة صغيرة القند تحيلة الجسم تعيش على مختلف الأسماك البحرية والبرية تمتص الدم وقد تسبب الموت .

## ١٨٩٥٩ - عُلْكَةُ نَهْرِيَّة ٥

Auxostoma (F).  
علقة صغيرة القند أسنينة الشكل سمراء اللون ، تعيش في المياه العذبة تركب الأسماك والقشريات .

## ١٨٩٦٠ - عُلْكِي ٥

نبت قشبية مذاق صر وضها يتخذ من المكائس ويشرب طيبته لاستسقاء (اللبان) .

## ١٨٩٦١ - عُلْكِيَّات ٥

Hirudineæ (S).  
Hirudineæ (F). Hirudineæ (E).  
طائفة من الديدان الحلقية لها رؤبان الغرطوبيات والحشريات أكثرها من القوديات المائية ومنها الأرضية التي تعيش على الأجار . مهبط المناطق الاستوائية . تتميز بأجسامها المستطيلة الاسطوانية التي تبدو كأنها خالية من الرؤوس قشياً المواد الحيوانية . مظهرها ماسر يمتص الدم .

## ١٨٩٦٢ - عِلْمُ الْأَحْيَاءِ ، عِلْمُ الْحَيَاةِ

هي البيولوجية ، الطبلى .

## ١٨٩٦٣ - عِلْمُ الْأَصْدَافِ ، كَنْكَيُولُوجِيَّة

Conchyliologie (F). Conchology (E).  
علم يبحث في الأصداف والأغار وأشباهها .



علاس



ملقة



علقة الحيل



علقة نهريّة

والتماز والفيزيولوجية . وعلم النبات الخامس الذي يبحث في التحلية والتصنيف والجغرافية وتختلف العمليات والتأثيرات الزراعية والعلمية والصناعية .

#### ١٨٩١٢ - علم النبات البحرية ، فيكولوجية

Phycologie (F). Phycology (E).

#### ١٨٩٩٣ - علم الفسج ، إستولوجية ، تساجية

Histologie (F). Histology (E).

علم يبحث في التسج الضخمة والحلايا النشوية في الأحياء .

#### ١٨٩٩٤ - علم النواة ، كاريولوجية

Caryologie (F). Karyologie (E).

#### ١٨٩٩٥ - علم الهواء ، علم طبقات الهواء

Aéologie (F). Aerology (E).

#### ١٨٩٩٦ - علم أمراض الحيوان

Zoopathologie (F). Zoopathology (E).

#### ١٨٩٩٧ - علم حياة النبات ، فيتوبولوجية

Phytobiologie (F).

#### ١٨٩٩٨ - علم قوة السوائل

Hydrodynamique (F). Hydrodynamics (E).

هو علم قوة الموائع من مائية وبريها .

#### ١٨٩٩٩ - علم وصف النبات ، فيتوغرافية

Phytographie (F).

رابع نملة .

#### ١٩٠٠٠ - علمانية

Sécularisme (F).

العلمانية مذهب فلسفي إنكليزي ينفي الفكرة الدينية في المسير البشري .

#### ١٩٠٠١ - علمية

Scientisme (F). Scientism (E).

العلمية مذهب فلسفي يعلن التفوق المطلق العلم في كل شيء .

#### ١٩٠٠٢ - علمية

في المنطق . أما كلمة علمية فهي من وضع الأثير مصطلح الشهابي .

#### ١٩٠٠٣ - علمية

Hippotragus, Egcoceros (S).

Hippotragus, Egcoceros (F). Sable antelope (E).

جنس حيوانات لبونة بحيرة بادية الإخلاف من بقرة الوحش . أنطوط الحالية ثلاثة جميعها كبيرة القرد قرية

الشي من الارح . قربها طوية حديده كالكسوف العربية وهي في الذكور أكبر مما هي عليه في الاناث . اذناها كبيرة

مستطيلة . اذناها قصيرة أو متوسطة القرد . اعطائها البلاد الافريقية . تأوي القبانى والبروج والارحاج . تعيش

بهاجات متوسطة العدد اجلها براوح بين ١٠ و ٥٠ ، ولهاها طوب ذكر مانع رافقه من الذكور الى الحسة

ذكور يافقة لا تمحص بعد . اما الذكور المستقل عن القطعان وتجمع الى بعضها أو تعيش على انفراد .

#### ١٩٠٠٤ - علمية لزرق

Hippotragus leucophaeus (S). Hippotragus leucophaeus (F).

نوع من العلوب وهو اكبرها جنة وانسها قوفاً واجلها شكله يملو نحو ١٦٥ سم . ثوبه الى القردة الالسة . رأسه اسود الجبهة واليالة العريضة . محمره الى اليافض

١٨٩٧٧ - علم الدواجن ، دجاجة Zootchnie علم يبحث في أنسال وسلالات الدواجن ووسائل تربيتها وطرق استغلالها الخ...

#### ١٨٩٧٨ - علم الزراعة

Agromonie (F).

Agronomy (E).

هي العلوم الزراعية أو الأخرى هي دراسة قواعد الفنون الزراعية التي تسمح بتطبيق العلوم على الزراعة .

#### ١٨٩٧٩ - علم الزواحف ، زحفية

Erpétologie, Herpétologie (F). Herpetology (E).

علم يبحث في وصف الزواحف وتصنيفها وأحوالها الطبيعية .

#### ١٨٩٨٠ - علم الشرايين

Artériologie (F).

Arteriology (E).

#### ١٨٩٨١ - علم الصحة

Hygiène (F). Hygiene (E).

علم يبحث في حفظ الصحة ووقايتها .

#### ١٨٩٨٢ - علم الصخور ، صخرية

Péetrographie (F). Petrography (E).

علم يبحث في الصخور وتركيبها .

#### ١٨٩٨٣ - علم الصناعات الزراعية ، تكنولوجية

Technologie agricole (F).

Agricultural technology (E).

درس جميع الوسائل العلمية والعملية المختصة بالصناعات الزراعية كصناعة السكر والكمون والتبوت والخمر والخبز .

#### ١٨٩٨٤ - علم الطير ، طيرية

Ornithologie (F). Ornithology (E).

علم يبحث في الطير من جميع نواحيه العلمية والتأثيرية والاقتصادية .

#### ١٨٩٨٥ - علم الفلد

Adénologie (F).

Adenology (E).

#### ١٨٩٨٦ - علم الكائنات

Ontologie (F).

Ontology (E).

علم يبحث في الكائنات وماحياتها .

#### ١٨٩٨٧ - علم المعادن ، معدنية

Minéralogie (F). Mineralogy (E).

#### ١٨٩٨٨ - علم المتعولات

Métaphysique (F).

Metaphysics (E).

علم يبحث في اصول المبادئ وفي الملل المبرية الاول .

#### ١٨٩٨٩ - علم المفاصيل

Arthrologie (F).

Arthrology (E).

#### ١٨٩٩٠ - علم الميكروبات ، ميكروبيولوجية

Microbiologie (F). Microbiology (E).

علم يبحث في تصنيف الميكروبات ووصفها وخصائصها وبيئاتها واهوارها وكيفيةها .

#### ١٨٩٩١ - علم النبات ، بوتانيك ، فيتولوجية

Botanique, Phytologie (F). Botany, Phytology (E).

درس العلوم الطبيعية الذي يتناول النبات وهو قدام : علم النبات العام الذي يبحث في الفلزبة والايستولوجية

٣٠٠ منها الحولية والمولدة والمصرة . أصنافها نسبة الإرباء تشمل جميع الاسباع المتعددة الحرارة . معظمها بري وبعضها زينة وطي . سقيا فراءه . أرواقها كلسية ، متقلبة ، سائفة النصل . أزهارها مستطيلة الزناد ، لائساية التجميع والارتكاز || أشهر أنواعها ما يتبع .

### ١٩٠١٣ - عَلُوكُ أَحْمَر \* ، سِيلَان طَائِي ، صَمْنَع الدَّيَاب

Silene armeria (S). Silène à bouquet, Attrape-mouches (F). Common catchfly (E). Gartenleimkraut (D). Silene a mazzetti, Achiappa mosche (I). عشية حولية برية طيبة مبقولة . ساقها فراء تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم . أرواقها حاشية . نصلها يقني الشكل جامد الصفة ، عايق الخضار . أزهارها طليقة التجميع ، حمر البلات || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول .

### ١٩٠١٤ - عَلُوكُ أَخْضَرُ الزَّهَر \* ، سِيلَان أَخْضَرُ الزَّهَر

Silene viridiflora (S). Silène à fleurs vertes (F). عشية معمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم . ساقها عشية . أرواقها سائفة . أزهارها ابيلة الارتكاز . بتلاتها ثنائية التجميع خضراء اللون || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٩٠١٥ - عَلُوكُ بَحْرِي ، سِيلَان بَحْرِي

Silene maritima (S). Silène maritime (F). عشية برية معمرة تملو من ٢٠ إلى ٤٠ سم . مهدا شطوط المنسط ، ساقها ليفية فراء . أرواقها بيفية الشكل ، بحرية اللون ، أزهارها حشكرية التجميع . بتلاتها الى البيضاء الاصفر اللامع || أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول . يقال انها طيبة تنقي المدة والامعاء .

### ١٩٠١٦ - عَلُوكُ سَحْلَبِي \* ، سِيلَان سَحْلَبِي

Silene orchides, S. stoeas (S). Silène orchidées (F). عشية حولية تربيتية مهدا الشرق اليرسط . ساقها فراء زياه لزينة تملو من ١٥ إلى ٣٠ سم . أرواقها صافية الشكل ، شبيقة النصل الخليل البشرة . أزهارها ودية اللون . بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة الملقوة || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

### ١٩٠١٧ - عَلُوكُ شَفْطَل \* ، سِيلَان شَفْطَل

Silene schafsa, S. inflata (S). Silène schafsa, S. enflé, Behen blanc, Cornillef (F). Bladder campion, White bottle, White ben (E). Kropfleimkraut (D). Bubboline, Mazzettini, Strotoli (I). عشية ردية معمرة تملو من ٨ إلى ١٥ سم . ساقها وطرصها نخيلة . أرواقها بيفية الشكل طليل من ١٠ إلى ١٥ سم . أزهارها حراء اللون او بيفاء ، بتلاتها مقنطية الاطراف المسنة || أزهارها يستمر من آب إلى أيلول . وفي من النباتات الطبية . يقال انها تنقي المدة والامعاء .

### ١٩٠١٨ - عَلُوكُ هَدِيمُ السَّاق

هو حشيشة الدباب ، أطبا .

### ١٩٠١٩ - عَلُوكُ فَرَنْسِي \* ، سِيلَان الدُّبَاب ، لُسَيْعَة

Silene gallica (S). Silène de France, S. à cinq plaies (F). Little brown pigs, Small flowered catchfly (E). Französisches leimkraut (D). Silène cinq plaies, S. salvatico, Mazzettino (I).

نبات حشيشي طيب عو ، ساقه فراء زياه تملو من ٣٠

الايبر || موته احراج وبراعي الترانسفال . إجله قليل لمدد يراوح بين ٥ و ١٥ فرداً .

### ١٩٠٠٥ - عَلَبُ اسُود \* ، أَبُو عُرْفُ الاسُود Hippotragus niger, Egoceus niger (S). Hippotragus noir, Egoceus noir (F).

نوع من العلب كبير الجثة يعلو نحو ١٢٥ سم . قرنه بطول ١٠٠ سم . وهو غليظ الانتشاب ، ذيب الطرف ، حادي الجسم ، سالى الزنار الاخير . ثوبه الى السود اللامع . يطنه بصره وجليه ييش . موته فسح الارباء يتد من الجبقة الى الترانسفال . إجله يراوح بين ٢٠ و ٤٠ فرداً .

### ١٩٠٠٦ - عَلَبُ أَفْهَر \* ، أَبُو عُرْفُ الْأَفْهَر Hippotragus equinus, Egoceus equinus (S). Hippotragus chevalin, H. équin, Egoceus chevalin (F).

نوع من العلب كبير الجثة ، جسمه يعلو نحو ٢٢٦ سم . ويعلو نحو ١٥٠ . قرنه لا يفرق عن قرن العلب الاسود شيكاً . ثوبه الى القيرة السوداء ، يابض رأسه قليل الانتشار ، جبل المتخطط ، يكتنف العين من مقدمها ومؤخرها . موته فسح الارباء يتد من ضفاف بحيرة فيكتوريا . نيزار الى اطراف السنغال || إجله لا يقاسي المدة يتخلف باختلاف اصنافه وسلالته ، يراوح بين ١٠ و ٥٠ لقرأ .

### ١٩٠٠٧ - عَلَهَج Eomecon (S). Eomecone (F).

نبس نباتات عشية معمرة من فصيلة الحشائشيات . انواعه قليلة العدد ، سقيا فراء تملو من ٣٠ إلى ٧٠ سم . أرواقها قلبية الشكل ، مستديرة القامة . نصلها متصج الصفة ، مسن الحافة ، جبل الخضار الزاهي . أزهارها ابيلة وصاية الارتكاز ، قنطرها نحو ٥ سم . لون بتلاتها يتخلف باختلاف الانواع منها الابيض والوردي والبنفسجي والورج . اما اسديتها فضرر || أزهارها يستمر ثلاثة شهور تمتد من اواسط الصيف الى اواسط الخريف .

### ١٩٠٠٨ - عَلَهِيْز \* Phorophea (S). Phorophea (F).

جس حشرات ذرية من فصيلة الجربيات ودية القراديات انواعه عديدة تستغل حل الخلل ولقنم والابقار والارباب تسبب لها الجرب الرطب (Oale humide) الذي يكتلغ باستعمال بعض الادمان الكبريتية التركيب .

### ١٩٠٠٩ - عَلُو \* ، لِزْنَاع Hauteur (F).

المساق السويدية من القامة الى القمة .

### ١٩٠١٠ - عَلُوبُ هو سد الحصر ، اطبا .

### ١٩٠١١ - عَلُوكُ \* Desmodus (S). Desmoda (F).

Desmodus (E). جس غفافيش من فصيلة الورقيات . انواعه قليلة العدد . اجسامها صيرة طولها يراوح بين ٧٥ و ٨٠ سم . وبعضها من ٣٥٠ الى ٣٦٠ سم . فرائطها اسفينة قصيرة . ازوارها الى الرتبة العلولة الصناعية . جلودها خلية اللمس . موطنها ييم المكسيك والبرازيل والشيلى . تعيش منفردة . ذكورها تقرب انثاهى عند الكرم فقط . قوتها الدم تمصه ايما استطاعت . تألف الاشجار الحرجية وابقاب الصنوبر .

### ١٩٠١٢ - عَلُوكُ ، سِيلَان ، سِلْنُوس ، تَمَنُوكَة Silene (S). Silène (F). Campion, Catchfly (E). Leimkraut (D). Silene (I).

جس نباتات عشية من فصيلة القرنفليات ، انواعه زما



علب اسود



علب افير



علز



علوك احمر



علوك اخضر الزهر



علوك سحلبى



علوك شفعة

الى ٥٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل مستطيلة الزام الاخير  
نصلها خلى البشرة اللزجة. ازهارها صغيرة لثقة و رودية  
اللون. حلقية التجميع || ازهارها يستمر من تموز الى  
آب.

## ١٩٠٢٧ - عُكَّكٌ كِيدٌ

السُّلَيْسُ تَبْت يَزْكُم بِهِ وَيَضَفُ مِنْهُ الرِّقَ (المان).

## ١٩٠٢٨ - عُكَّكٌ كِيدٌ

Otolithe (F).

سكة بحرية تسمى حطايك، اطليا.

## ١٩٠٢٩ - عُكَّكٌ كِيدٌ

Parrotia (S). Parrotia (F).

جنس اشجار ونباتات برية و زينة من فصيلة المشرطات.  
انواعها المعروفة اربعة اوراقها مثاقية عابطة. ازهارها  
عقودية التجميع تاجي الازتكاز. ازهارها عادة البتلات  
سباعية الالدية و سبعة المياسم مزدوجة غريقات  
المبيض || اعرفها واشهرها البليط القاري.

## ١٩٠٣٠ - عُكَّكٌ كِيدٌ

Parrotia persica (S).

Parrotia de Persia (F).

نوع من البليط، مهدد بلاد ايران. شجرته تملو من ٦  
الى ١٢ م. اوراقها عابطة تشبه اوراق ازان تطلو من ٤  
الى ١٠ سم. نصلها جامد التسج خلى العروق. ازهارها  
تتفصية اللون يعلوها مواج زخرفي. ثنائياتها خلية.  
اسديتها الى الحرة القانية || ازهارها يستمر من نيسان  
الى ايار.

## ١٩٠٣١ - عُكَّكٌ كِيدٌ

هي القنبلة السوداء، اطليا.

## ١٩٠٣٢ - عُكَّكٌ كِيدٌ

Coupage (F). Cutting (E).

تينة الملف قبل تقديده الى الحوان بقه يكون اما يخلط  
الحبوب المحرقة مع الخلطة والكبس والتين الخ. او  
يقطع الاغصان والكلأ كالقصير والقص. او بتشفيخ  
الجذور والمسائل كالبزور والشلندر والبطاطا الخ.

## ١٩٠٣٣ - عُكَّكٌ كِيدٌ

هو الصوج، اطليا.

## ١٩٠٣٤ - عُكَّكٌ كِيدٌ

سبط من فصيلة الورديات يدعى المومبيات.

## ١٩٠٣٥ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

الهام السحاب المرتفع الكثيف.

## ١٩٠٣٦ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Amata phagen (S). Amata phagæ (F). Amata phagen (E).

حشرة من فصيلة الهيات و رتبة حرشفيات الاجنحة.  
موطنها بعض المناطق الحارة من الاقاليم المعتدلة الحرارة.  
فراشتها جارية قوتها رقيق الاذهار. مرتبها عابطة ناعمة  
تموش على اوراق النبات وله اشجار || جسمها متوسط  
القد يطلو نحو ١٤ م. يستط نحو ٣ م. راسها اسود.  
عينها كبرتان. زباناها خيطان. شفها مستطيل.  
جوشها ويعدا الى الكسني الاسود الخيط || وراثن للذكر  
الى الجارة لسماء الموج يتخللها في تزوج الاسامي رقة  
ومن سبقت ويخللها في تزوج الخلفي بقية يشه  
وتقتان || وراثن الاثني في الجوزي الكاهب للمواج  
العدم الرقة || لها جيل واحد في الحول. تظهر القرفة



عكك كيدي فرنسي



عكك كيدي



عُمَّاكَةُ فَيْجَه

## ١٩٠٣٧ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Silene compacta (S). Silène compacte (F).

حبة زينة حولية، مهدد الشرق الاوسط. ساقها فرما:  
تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل متدخنة  
الناطقة و ذوية الزام الاخير المذهب النعسة. نصلها  
جامد التسج، بحري اللون. ازهارها حامية الازتكاز، حلقية  
التجميع، لينة. بتلاتها فضية الشكل و رودية اللون.  
ازهارها يستمر من تموز الى آب.

## ١٩٠٣٨ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Silene hispida (S). Silène hispide (F).

حبة حولية يونانية المهد، ساقها فرما تملو من ١٥  
الى ٣٠ سم. اوراقها ثنائية التصل خلية البشرة. ازهارها  
عقودية التجميع ثنائية الانقسام و رودية اللون || ازهارها  
يستمر طوال فصل الربيع.

## ١٩٠٣٩ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Silene astaria (S). Silène Astérie (F).

حبة سبروتية معمرة، مهدد حطاب مغربية وهي من  
النباتات القائمة الاستعمال الزيني. ساقها قوية لزجة  
عامة الفروع تملو من ٩٠ الى ١٢٠ سم. اوراقها  
صفلية الشكل تطلو من ١٢ الى ١٥ سم. وتعرض من  
١٥ الى ٢٠ م. ازهارها ابروانية اللون، حلقية التجميع.  
ازهارها يستمر طوال شهر حزيران.

## ١٩٠٤٠ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Silene delicatula (S). Silène gracile (F).

حبة حولية دقيقة، مهدد الشرق الاوسط. ساقها نحلة  
فرما تملو من ١٥ الى ٣٠ سم. اوراقها صفلية الشكل  
دقيقة. ازهارها فردية التجميع يشبه اللون || ازهارها  
يستمر طوال فصل الصيف.

## ١٩٠٤١ - عُلُومُ زَرَّاعِيَّة

Sciences agronomiques (F). Agronomic sciences (E).

العلوم الزراعية دراسات شاملة تيمث في الاربعة والنباتات  
والحيوانات والحشرات والفطور والامراض الحيوانية والاصوام  
النباتية والكيمياء والفيزياء والاقتصاد والصناعات الزراعية  
و رتبة النجارب والابنية الريفية واستثمار التربة واستعمال  
المعدات الآلية الخ.

## ١٩٠٤٢ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Paraneoptera (S). Paraneoptères (F). Paraneoptera (E).

شعبة حشرات من طائفة الحنجمات أصلاً تشمل ثلاث  
طبقات وست رتبة والسديد من الفصائل || طبقاتها ترمز  
بالقليات و مدهيات الجناح ونصفيات الجناح. اما رتبها  
فهي القليات والفلديات والصفقيات و مدهيات الاجنحة  
وصحائسة الاجنحة ومختلفة الاجنحة.

## ١٩٠٤٣ - عُمَّاكَةُ فَيْجَه

Pyxide (F). Pyxidum (E).

ثمرة كالجوز او كالحنق تتفتح بالرش ينفصل جزواها  
الاعلى كانه غطاء حلبة.

الى ١٠٠ سم. اوراقها قرصية الالتشاب خفيفة ذرية  
تطول من ٦٠ الى ١٢٠ سم. وتعرض من ١ الى ٣ سم.  
نمائها استغنية الصفحة || ازهارها حامية الارتكاز  
مختلطة الالوان واشكال التجميع || اشهر انواعه الزينية  
الناز الصواني .

#### ١٩٠٩٣ - عَنَابٌ صِيَوَانِي \* Butomus umbellatus (S). Butome en ombelle, Jonc fleur (F). Flowering rush, Lily grass (E). Doldiger Wasserliesch, Blumen-Rohr (D). Butomo, Biedo, Giunco fiorito (I).

نوع من الناز وهو نبات عشقي سبوطي ممر. اوراقه  
تطول من ٨٠ الى ١٠٠ سم. وتعرض من ١٠ الى ١٢ سم.  
شراخه الزهري يطو نحو ٨٠ سم. ازهاره صيواني التجميع.  
ازهاره كثيرة العدد وريدي القصل والبتلات ، قطر الزهرة  
الواسعة نحو ٣ سم || ازهاره يشتر من حزيران  
الى آب .

#### ١٩٠٩٤ - عَنَابِيَّاتٌ Butomaceae (S). Butomacées (F). Butomaceae (E).

فصيلة نباتية من سيدات القلفة بلورها عادمة الاسين .  
اجناسها وانواعها قليلة العدد جميعها متغنية او مائية .  
اشهر اجناسها الناز.

#### ١٩٠٩٥ - حَنَابَسَةٌ \* Porthetis elephas (S). Porthète (F).

نوع من الجنابذ من مستقيات الاجنحة وفسيلة المراءيات.  
اصطفا جميع المناطق الحارة من العالم القديم || جسمها  
كبير القد يطول نحو ٤٥ سم. عند الذكر ، ويطول من  
٧٠ الى ٧٥ سم. عند الانثى . نوبها الى الكهبة السوداء .  
راسها كبير الحجم . زناها قلابها الشكل . كويلها  
مبين للعد وليف الحمار النجسي يشرف على قمة الرأس .  
قوائمها الحلقية كبيرة ، مستطيلة ، مفشارية القنابيب ،  
معدة لقتل || تجرب المراعي والمواقع الرطبة حيث تكثر  
الامشاب . ممرها نهاري . تظهر في حزيران وتبقى  
حتى اواخر آب .

#### ١٩٠٩٦ - حَنَابِسٌ Eléments (F). Elements (E).

الناصر هي المواد البسيطة التي يعتبرها العلم الحالي غير  
قابلة التجزئ . الايسط || يعرف منها نحو ٩٠ تقسم الى  
ثنتين : فئة الناصر الفلزية المعروفة بالمعادن وفئة الناصر  
اللافلزية .

#### ١٩٠٩٧ - حَنَابِسٌ غذائية Eléments nutritifs (F). Nutritive elements (E).

هي الناصر التي يتربك منها غذاء النبات والناصر  
الغذائية تقسم الى اربع فئات : - الاول : الناصر  
الرئيسية وهي الازوت ، فوسفور والبوتاس .  
الثانية : الناصر الاولية وهي الكالسيوم والمنجنيز والحديد  
والكبريت - الثالثة : الناصر الثانوية وهي الميديموم  
والسليسيوم والكلور - الرابعة : الناصر الثالثية وهي  
البورون والمنجنيز والنحاس والزنك والزرنيخ والرساس الخ .

#### ١٩٠٩٨ - حَنَاقٌ

النجم الحثالي ، اي الذي يلي الفلك ، من كوكبة بنات  
نمش الصغرى . والى جانبه قاذف صغير وزائيه ايضا حثاق  
والى جانبه الصليق وهو سهى والثالث الحور .

١٩٠٨١ - حَمِيسٌ Aphoticus (F). Aphotic (E).  
حميس م . حمية . تمت تعريفه يطلق في الجيولوجية ،  
على كل منطقة عادمة التنور كجبة البحر البعيدة التنور .

#### ١٩٠٨٢ - حَنَاقٌ طريق Zizyphus (F). Zizyphus (E). ١٩٠٨٣ - حَنَابٌ \* Zizyphus seiva, Z. vulgaris, Rhamnus zizyphus (S). Jujubier, Gingecoller (F). Jujube tree, Zizyphus, Indian jujube (E). Jujubebaum (D). Giuggiolo (I).

شجرة شرة شاككة من فصيلة التيقيات . اوراقها عابلة ،  
متعاقبة ، صغيرة ، بيضة ، لامعة ، مسنة . ازهارها صغيرة  
القد ، صفراء اللون ، عشوية التجميع . ثمارها زيتونية  
الشكل ورائحة ، لمساء البشرة ، عنابية اللون عند النضج ،  
مأكولة ، لها الى البياض الاصفر وهو كثير المنافع  
الصحية ويقيه الصدر .

#### ١٩٠٨٤ - حَنَابٌ يرثي هو الفضال ، اطلبه .

#### ١٩٠٨٥ - حَنَابَةٌ Jujube (F). ثمره الحناب وهي مأكولة جزيلة الطعم الصحي وتفيد الصدر .

١٩٠٨٦ - حَنَاقٌ المرمق \* Pissum quadrans (S).  
حشرة من الجنابذ ، طولها نحو ٣ سم . جسمها بسيط  
الشكل المستطيل . نوبها الى الخنثى الاخير . بطنها يندبها  
الى الحشرة || تظهر الحشرة الكاملة في نوبان فتكروم  
وتضع مكنها في ايار على مختلف اوراق السيقان وانحسا  
الشوشر فيقتل بعد مئته بامبوين || اجيالها الحولية  
تروح من اثنين الى ثلاثة . يرقاتها همة تنصص حصاد  
الاوراق فتضميها ويحسبها وقد تنخر الجلود لتصلها .

#### ١٩٠٨٧ - حَنَاقٌ الشوك \* Tingis ceratæ (S). Tingis des chardons (F).

حشرة من الجنابذ ، طولها يراوح من ٣ الى ٤ سم .  
نوبها حنثي اللون يطو تسليح وتكشط . منها اسود .  
تعيش على مختلف انواع الشوك ونباتات فصيلة المركبات .

#### ١٩٠٨٨ - حَنَاقٌ ملتحق Goldene maculé (F). حشرة من البيريات تدعى بيري ملتحق ، اطلبها .

#### ١٩٠٨٩ - حَنَاقِيَّاتٌ Tingidæ (S). Tingidae (F). Tingidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة نصفيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها كثيرة العدد . تتميز بصغر فعا وبروانها الفضية  
التركيب ، الشبكية الرؤل . ارساغها ثلاثية الفواصل .  
امثالها لا تفرق تنور في اعدادها عميقة || جميعها من  
الحشرات الخاملة تعيش على اوراق الثبات ويطوره .

#### ١٩٠٩٠ - حَنَاقٌ Cochér (la) (F). النزاز كوكبة مجرم شمالية الموضع تدعى ذو الاسمة ، اطلبها .

#### ١٩٠٩١ - حَنَاقٌ هو القلق الحشي ، اطلبه .

١٩٠٩٢ - حَنَابٌ Butomus (S). Butome (F).  
جنس نباتات ممره من فصيلة النمازيات . انواعه قليلة  
نحو خمسة : ثلاثة منها متغنية واثنان مائتان . جلورها  
جلومرية مدادة . سورها شمراعية متغنية تملو من ٥٠



حناب



حناب المرمق



حناب الشوك



حناب صيواني



حنامة



## ١١٠٩٩ - عَتَاق الأَرْض

عتاق الأرض نجم من كوكبة المرأة المسلسلة .

## ١١١٠٠ - عَتَاق الأرض \*

*Lynx caracal*, *L. melanotis* (S). *Lynx caracal*, *L. a. oreilles noires* (F). Caracal (E).

ومن اسمائه : اللغظ والنمجل وأخيل والفراتق . نوع من الفئس من فصيلة السنوريات ورتبة اللوامس . موطنه فصح الأرياء يمتد من تركيا إلى سورية والجزيرة والبراق وأيران والأفغان وألمند ومن الحيشة إلى أفريقية الشمالية . وهو كبير الجثة رقيق العظام ، طوله يراوح من ٧٠ إلى ٩٠ سم . ارتفاعه من ٤٥ إلى ٥٥ سم . أما ذنبه فين ٢٢ إلى ٣٥ سم || ثوبه يخطف باللبسة إلى البلاد التي يعيش فيها وهو دائماً سوي اللون المرقوش بالأخضر الاسمر والاسمر الجازري . بهله إلى البياض الاسفر . أذناه كبيرتان ذلعتان طولهما خمسة من الشعر الاسود المنقصب || يألف الكهوف والادغال وأحراج السنط والقصو .

## ١١١٠١ - عِنَاقِيَّةٌ في القنصاء ، اطلبه .

١١١٠٢ - عَنَاقِيك ، رُتَبَات . *Aranides* (F). *Aranida* (E).

رتبة من الشكبيوتيات فصائلها واجناسها كثيرة العدد ، أشهرها السناكب المرفقة .

## ١١١٠٣ - عَنَاقِيكٌ ذَيْبِيَّةٌ في الخندق ، اطلبه .

١١١٠٤ - عَنَاقِيكي ، عَنَكَبُوتِي . *Aranides* (F). *Cob-webby* (E). تمت وصفي يطلق على بعض اجزاء النبات التي تشبه السناكب أو شها .

١١١٠٥ - عِنَاق . *Râne* (F). *Rein* (E). هو سير اللجام .

## ١١١٠٦ - عَنَاقَة

*Impotence sexuelle* (F). *Sexual impotence* (E). خلل في الجهاز الجنسي يمنع الحيوان عن أداء فريضة الكوم الطبيعية . وفي كثيرة في الذكور قليلة في الاناث .

١١١٠٧ - عَنَاق . *Rabin* (F). *Grapes* (E). ثمر الكرمة . ج . أعقاب والواحدة عنة .

١١١٠٨ - عَنَاقُ البَحَر . هو السله المزدوج السنايل ، اطلبه .

١١١٠٩ - عَنَاقُ التَمَكَّة . *Raisin de table* (F). *Table grapes* (E).

هو العنب المأكول من أي شرب كان تمييزاً لأصناف الحور والكحول .

١١١١٠ - عَنَاقُ التَعَلُّبِ هو الفتاة ، اطلبه .

١١١١١ - عَنَاقُ الحَيَّةِ هو الفأثر السوداء ، اطلبه .

١١١١٢ - عَنَاقُ الدَّبِ هو البيران ، اطلبه .

١١١١٣ - عَنَاقُ الدَّيْبِ هو الربرق ، اطلبه .

١١١١٤ - عَنَاقُ الشَّطْرِ هو كركوب كير . اطلبه .

١١١١٥ - عَنَبُ الفُرْكَابِ هو الصخرية ، اطلبه .

١١١١٦ - عَنَبُ القَطَا

هو التوارية للكتدية ، اطلبه .

١١١١٧ - عَنَبُ الحِنْدِ هو البياض ، اطلبه .

١١١١٨ - عَنَبًا في الأتبع ، اطلبه .

١١١١٩ - عَنَبَسُ \* *Ambassis* (S).

*Ambasse* (F). *Ambassis* (E).

جنس اسماء بحرية من شالكات الزعانف وفصيلة القرعيات . أنواعه المرفقة ثلاثة ، أصلاتها أخوار مصبات الأنهر المحتية || أجسامها أحليجية الشكل ، صغيرة القد ، أطولها تراوح من ١٢ إلى ٢٢ سم . رؤوسها مقطوعة الاغصام ، كبيرة العين الجاحضة . زعانفها الظهرية شبه هرية الشكل . زعانفها الذيلية غاية . أنفها تراوح من الحطلة اللحية الموج إلى الحطلة الخفية || حولها فاعرة الصفن مرفوب فيها .

١١١٢٠ - عَنَبَر . *Ambre* (F). *Amber* (E).

مادة راتنجية بحرية صلبة تقع على عدة أشكال واللوان انصها الاصفر والأشهب .

١١١٢١ - عَنَبَر \* *Physeter* (S).

*Cachalot* (F). *Spermwhale* (E).

جنس حيوانات بحرية لبونة عظيمة الهامة من الحيات ذات الأسنان . أجسامها حادة المقع ، وشمية الشكل ، طولها يراوح بين ١٨ و ٣٠ م . رؤوسها ضخمة ، محيطها يراوح بين ٧ و ٩ أمتار . أسنانها كبيرة القد ، صفراء اللون . طول بدن الواحدة نحو ٢٤ م . وضع زرعيتها من ٥ إلى ٦ سم . أولادها إلى الحطلة الرصاصية الزرقاء اللون ، تتبع مع القراها من الفلهر وتبقى عند البطن . يألف مياه بحار المناطق الحارة والمعتدلة . يعيش بجماعات كبيرة ، سرها يمد من عشرة أزواج إلى مئة زوج .

١١١٢٢ - عَنَبَرٌ بُولِي هو حب السك ، اطلبه .

١١١٢٣ - عَنَبَرٌ دُمَاع \* *Liquidambar* (S).

*Liquidambar* (F). *Sweet-gum tree* (E). *Amberbaum* (D). *Liquidambar* (I).

جنس أشجار برية وزراعية من فصيلة القنليات . النوع قليلة ، سوقها جالسة منتصبة ضخمة . أوراقها حاملة ، كبيرة القد ، معتقة ، متعاقبة ، مدببة المنصوص . أزهارها وحيدة المسكن ، كثية التجميع . ثمرها جراد سباعية الاغنية ، يزورها صفة جمعة || يستخرج من خام سوقها ، بالخر ، مئة صخرة ذكية اللون ، طيبة ، حرة الاستعمال تلشت الشيق وتقوي الباء || أشهر أنواعه الثلاثة التالية .

١١١٢٤ - عَنَبَرٌ دُمَاعٌ أمريكي ، عَنَبَرَسَاكِلِ ،

شجرة الميعة . *Liquidambar styraciflua* (S).

*Liquidambar à styrax*, *Copaine d'Amérique* (F). *Storax*, *Satin walnut tree* (E). *Amerikanischer Amberbaum* (D). *Storax liquida* (I).

شجرة هرية الشكل تملو من ١٥ إلى ٤٠ م . أصلاتها البلاد الأمريكية . أوراقها خالية خضراء خلية الاغصاق . شاربها الزهرية صفراء اللون ، غصنها اللينج . ميعتها فاعرة الصفن شاملة الاستعمال .



عتاق الأرض



عناب



عناب



عنبر دماع

المروفة قليلة العدد اصطلاحاً بعض اصقاع المالن القديم والجديد . ترب في المواقف الرطبة انحصاراً حولاني المناطق ويجاري الماء || سيقاناً لينة أو خشوية ، منطبعة ، فراء اولقتها صغيرة ، متماعقة ، منطبعة ، منطبعة ، منطبعة ، رابعة اللون || انوارها مرطبة مستطيلة المالحق ، رابعة الاطراف ، يضاء اللون . ثمارها غنية ، مكورة ، حراء اللون ، حامزة الطعم قبل النضج التام || ثمارها الناعسة ترب .

#### ١٩١٣٣ - عَبُوت ٥ Tricholoma (S). Tricholome (F).

جلس بطور كاملة التركيب من لفصيلة الفاريقيات . انواعها المروفة زهاء ٤٥٠ . اصطلاحاً معظم اقاليم مناطق البلاد المختلفة الحارة . يذوقها ابيض اللون . اطراسها حادة الاطراف ، منطبعة لبد التجميع وبعضها قارق . تعيش على المواد النباتية المنحلة . معظم انواعها كامن الصنف .

#### ١٩١٣٤ - عَبُوت اَبْيَس ٥ Tricholoma album (S). Tricholome blanc (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في حراج الصنوبريات . ساقه منطبعة القاعدة ، فراء اللون . اروسه يضاء ، عاجية المالحق ، قطرها نحو ٩ سم . اطراسها متقاربة يضاء اللون .

#### ١٩١٣٥ - عَبُوت اَحْمَر لَامِع ٥ Tricholoma rutilans (S). Tricholome rutilant (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد على جلوع الاشجار النخرة . ساقه الى الخضرة الصفراء المالحق . اروسه حراء اللون يعلوها مالحق اسطع ، قطرها نحو ١٥ سم .

#### ١٩١٣٦ - عَبُوت جَبَّار ٥ Tricholoma colossus (S). Tricholome géant (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في الغابات . ساقه ضخمة ، سمراء اللون . اروسه كبيرة ، قطرها نحو ٢٠ سم . لونها الى الشقعة السمراء يعلوها مالحق اصفر .

#### ١٩١٣٧ - عَبُوت دَكْمِي ٥ Tricholoma columbetta (S). Tricholome petite colombe (F).

نوع من العنبوت المأكول . يوجد في الغابات ومراج السديان . ساقه يضاء تملوها ، عند قاعدتها . رقة غصراء . اروسه يضاء اللون او وردية ، قطرها نحو ٨ سم .

#### ١٩١٣٨ - عَبُوت رَكِيح السَّاق ٥ Tricholoma stricipes (S). Tricholome à pied étancé (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في المراعي والغابات . ساقه رقيقة متصببة لونها الى البياض الاخير . اروسه مظلمة الشكل ، قطرها نحو ٧ سم . لونها الى البياض المالحق .

#### ١٩١٣٩ - عَبُوت صَابُونِي الرَّابِعَة ٥ Tricholoma saponaceum (S). Tricholome à odeur de savon (F).

نوع من العنبوت الكامن الصنف . يوجد في الغابات والمراج . اروسه لاقباسة القطر ، مظلمة الشكل ، لونها الى الربعة الخضراء المالحق ، طعمه ورائحته كصابون .

#### ١٩١٢٥ - عَبُوت دَّمَاع شَرَقِي Liquidambar orientalis (S). Liquidambar oriental (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٢٥ مترًا . اصطلاحاً بلاد الشرق الاوسط . اولقتها خاملة التفصيص . فصوصها قلبية الشكل ، عادمة التنتين . نصلها مالى البشرة يصفر عند الاضواء دثن ان يكتنفه الاحرار المموذ . شباتها لزهرية يضاء اللون يعلوها مالحق اسفر || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .

#### ١٩١٢٦ - عَبُوت دَّمَاع فُرْمُوزَا Liquidambar formosana (S). Liquidambar de Formose (F).

شجرة كبيرة اللد تملو من ١٥ الى ٣٠ م . اصطلاحاً الصين واليابان . اولقتها ثلاثية او خنسية او سباعية التفصيص . فصوصها مستطيلة الحافة . اعناقها وروقتها خلية البشرة . شباتها لزهرية يضاء اللون يعلوها مالحق وردي || ميتها غزيرة للمادة متصلة الصنف .

#### ١٩١٢٧ - عَبُوت كَسْمِيرِي هُو التَّيْرِدَاءُ الطَّيَّا Succinea (S). Ambretta (F). Succines (E).

جنس حوانات قازية وبيرة من الرغويات مديات الاجل وفضيلة الحارويات . انواعها المروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم . بعضها قارب ويمش على النباتات المائية وبعضها بري ويمش بين الطحالب قرب صفات مجاري الماء || اصداؤها شبه يضيئة الشوزن ، صغيرة اللد ، رمية القوام ، دقيقة الاطراف الحارزة || تتميز بدم اصعاقها استقبام الاجسام .

#### ١٩١٢٩ - عَبُوت رِيَّات Physacérideres (S). Physacérideres (F). Physacérideres (E).

فصيلة حوانات بيرية لبونة من مرتبة مَحَلَّات الاسنان وردية الحارويات || اجناسها المروفة ستة منتشرة في جميع المناطق المختلفة الحارة . ملجها الحياتي جامي . اجسامها تزد من ١٠ انزاج الى ١٥٠ ذوباً || اجسامها ضخمة ، شبه وشية الشكل ، قطرها ٣ انصار الى ١٨ مترًا || اعرف اجناسها العنبر والاسطم والرمية .

#### ١٩١٣٠ - عَبُوت رِيَّان Ambréine (F). العنبرين مادة يضاء تستخرج من العنبر الاشهب ، عادمة الرائحة والطعم ، لا تلوذ في الماء ، تلوذ في الكحول والايتر .

#### ١٩١٣١ - عَبُوت رِيَّان Anableps (S). Anableps (F). Anableps (E).

جنس اسماك نهيرة سراسوة من مفتوحات اللسان ليات الزعانف وفضيلة البنيان . انولمه المروفة قليلة العدد اصطلاحاً احر امريكا الاستوائية . تعيش في المواقف التي يقل فيها انسياب الماء وتكثر فيها النباتات المائية . اجسامها شبه وشية الشكل تملو من ٢٠ الى ٢٥ سم . رؤوسها صغيرة وزعانفها كذلك باستثناء الخوضية والذيلية الكبيرة اللد السانية الشكل || ويتميز العنبرين ببيته الكبريتي المفسوتين ، اقنباً ، الى قسم علوي يشاهد ما يجري فوق سطح الماء ، وقسم سفلي يشاهد تحت سطح الماء .

#### ١٩١٣٢ - عَبُوت رِيَّان Oxyccocos (S). Oxyccocos (F). جنس نباتات ماددة مصررة من فصيلة الملتحيات . انواعها



عنبرة



عنبرين

عنبت  
احمر لامععنبت  
ابيضعنبت  
احمر لامععنبت  
جبارعنبت  
صابوني الرائحةعنبت  
ركيح الساق



عُثُوبُ قَارَسٍ عُثُوبُ مَلْعٍ

ويجدها في المنائق والنياحات || أجسامها متفائلة القد ،  
يكثر فيها الصفر . رؤوسها شبه مكورة . عيونها متفائلة  
عنه الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مستطيلة ،  
مركبة من ١٦ فصلة . مرافقها قصيرة ، ملاصقة مستطيلة ،  
رباعية العقلى . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل .  
روافقها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها مستطيلة ||  
يرقاتها ديدانية الشكل ، تعيش كامل طورها البرقي في المنائق  
الشجر اجناسها المتنبيل .

١٩١٤٦ - عُثُوبِيَّ . Baccifère (F). Bacciferous (E).  
كل نبات عذبة الشكل .

١٩١٤٧ - عُثُوبِيَّ . Ural  
نمت تفرعي يطلق على كل ما له صلة مباشرة بالنمب .

١٩١٤٨ - عُثُوبِيَّ . Bale (F). Berry (E).  
القشرة العنيفة كمرعة عذبة غير متفائلة لا نواة لها بل تحوى  
زرعة واحدة بذور كالمنية .

١٩١٤٩ - عُثُوبِيَّ . Impuissance (F). Impotence (E).  
عجز ذكر الحيوان من القيام بوظيفته التناسلية .

١٩١٥٠ - عُثُوبِيَّ . Stalle (F). Stall, Box (E).  
الحظيرة من خشب تملأ للحيول .

١٩١٥١ - عَتَادَةٌ . Entada (S).  
Entada (F). Entada (E).  
جس نباتات عميرة برية وتربطية من فصيلة القرنيات  
وسيط السطيات . أنوعها المعروفة مشرة منها الشجيرات  
والجنيات المتسلقة . منبثها الإصفاخ الحار . أرواقها  
مقابلة مركبة ريشية شعبة . أنظرها سنابل متناوبة  
مقروية التجميع ثابطة الارتكاز . أنظرها صيرة لفة  
متناوبة ، ليفة ، صفراء اللون . ثمارها بزرور طيبة مقيمة  
تلفها مادة خضابية لزجة تشمل في الهند لتنظيف شعر  
الرأس .



عتاده

١٩١٥٢ - عَشْتَرُ ، عَشْتَرُ . Asile (F). Robber-By (E).  
جس حشرات قاتصة مفترسة من فصيلة العنتريات .  
أنواعه عديدة مظهرها متوسط لفة جزيل النفع بقضي  
على الحشرات الضارة || أشهر أنواعها ما يتبع



عَتَرُ الشَّرَاطِيَّ عَتَرُ النَّفَاسِ

١٩١٥٣ - عَتَرُ الشَّرَاطِيَّ . Philoniscus albiceps (S).  
Asile des sables (F).  
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١١ و ١٤ م .  
نوعها حنطي اللون ، الجمل المروج . عيونها خضراء ،  
حلب جسمها وأرسلها بيض . تكثر في الأماكن القاحلة  
وفوق دبال الشَّرَاطِيَّ من أيار إلى أيلول . تقترس مسا  
استطاعت قصه من الحشرات .

١٩١٥٤ - عَشْتَرُ النَّفَاسِ . Machimus pyragra (S). Asile pyragra (F).  
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١٠ و ١٥ م .  
نوعها لال السرة . حلبها أبيض اللون . تكثر في الأماكن  
الطليقة . تقترس النفايس والباباب .



عَتَرُ النَّحْلِ

١٩١٥٥ - عَشْتَرُ النَّحْلِ . Dasypogon teutones (S).  
Asile teuton (F).  
حشرة من العنتريات ، طولها يراوح بين ١٢ و ١٦ م .  
جسمها أسود اللون ، جوفها أصفر . يكثر ويوجد في

١٩١٤٠ - عُثُوبُ قَارَسٍ . Tricholoma  
aquestre (S). Tricholome aqestre (F).  
نوع من العنثبات المأكول . يوجد في سراج العنثبات .  
أرسته إلى الصفار المنش بالأسمر ، قطرها نحو ٨ سم .  
أطرافها إلى الصفار اللامع .

١٩١٤١ - عُثُوبُ كَبْرِيَّيَّ الْقَيْنِ . Tricholoma  
sulfureum (S). Tricholome couleur de soufre  
نوع من العنثبات الكاكن الصف . يوجد في الغابات .  
أرسته كدريئة القين ، قطرها نحو ٤ سم . أطرافها  
متباضة . رائحة تشبه رائحة الفانز .

١٩١٤٢ - عُثُوبُ مَدْعٍ . Tricholoma  
portentousum (S). Tricholome prétentieux (F).  
نوع من العنثبات المأكول . يوجد في الغابات . أروسته  
إلى الريدة السراء بطولها مروج بنفسجي ، قطرها نحو  
٩ سم . أطرافها إلى الأبيض اللامع .

١٩١٤٣ - عُثُوبُ الْخَمَاحِ . Clyra seraphacidis (S).  
Clyre des sureaux (F). Clyra seraphacidis (E).  
حشرة وأشعة غاصلة من فصيلة النضاريات ورتبة مفيدات  
الاجنحة . تألف البراري والمواقع الرطبة ومضغات مجاري  
الماء . غنائقها تعيش على أثمار أشجار والصفصاف .  
يرقاتها تعيش على صفت التيجليات وأوراق الصفصاف  
والخان || جسمها صغير القد بطول من ٧ إلى ٩ م .  
يرتقي اللون أسود الرأس والتفتيح الكليل والتجذيع اللندي .  
أرأسها صغير الحجم . عيناها صغيرتان ، زباناها خيطان .  
ظهورها كثالي الصلطي ربابي النقط السود . غمادها متناوبة  
التسيز إلى التليق . أرسافها رباعية العقلى الظاهرة || لها  
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في أوائل  
حزيران ويقي حتى أواخر تموز . كسر في النهار ويبيت  
في الليل || البرقة عنه بطولها الإدراك الشام بطول نحو  
١٢ م . جسمها شبه أسطواني الشكل ، قليل التقويس ،  
سداسي الرأجب ، حنطي اللون ، أصفر المروج ، أسمر  
الرأس والرأجب || طور الاكمال الذي يتفقي في القرية  
يشتد نحو أربعة أسابيع .

١٩١٤٤ - عُثُوبِيَّ . Psychoptera (S).  
Psychoptère (F). Psychoptera (E).  
جس حشرات من فصيلة العنثبات ورتبة ذوات الجنحين .  
أنواعها المعروفة مشرة أطرافها بمس مناطق البلاد المعتدة  
الحارة والمنسرة نحو البرادة || أجسامها تطول من ٧ إلى  
١٢ م . رؤوسها مكورة . عيونها كبيرة ، مقاربة عنه  
الشقين . قرونها الاستشعارية خيطية ، مركبة من ١٦  
فصلة . مرافقها قصيرة . ملاصقة شديدة الطول ، رباعية  
العقل . كواسلها عمودية . بطونها مغنية الشكل .  
روافقها قسطانية الخصب ، مرقوفة . قوائمها بالفة الطول ||  
تألف المنائق ومضغات مجاري الماء ، قوتها رقيق الانزاع .  
يرقاتها دامتة تعيش كامل طورها البرقي في المنائق والامسال  
على المواد النباتية المنلحة .

١٩١٤٥ - عُثُوبِيَّاتٌ . Psychopteridae (S).  
Psychopteridés (F). Psychopteridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجنحين . اجناسها وأنواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . يكثر

١٩١٤٥ - عُثُوبِيَّاتٌ . Psychopteridae (S).  
Psychopteridés (F). Psychopteridae (E).  
فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجنحين . اجناسها وأنواعها  
المعروفة متوسطة العدد منتشرة في معظم اصقاع العالم . يكثر



متر زُبُورِي

ايار الى آب . تقترس معظم عشائيات الاجنحة اخصها النحل وهي بلك تختلف من ريفاتها النافسة .

### ١٩١٥٦ - عُنُقُر زُبُورِي \*

*Asilus crabroniformis* (F). *Asile frolon* (F).  
حشرة من العُنُقُرِيَّات ، طولها يراوح بين ١٦ و ٣٠ سم .  
نوعها الى الجُورَةِ السراء . رأسها اصفر . زيانها الى  
السود . ارجلها الى الصبغة الصنافية . مسرها الحقل  
والبساتين . تكثر من حزيران الى ايلول . تقترس الذباب .

### ١٩١٥٧ - عُنُقُرِيَّات

*Asilidae* (S). *Asilidae* (E). *Asilidae* (E).

فصيلة حشرات قانصة مقترسة من رتبة ذوات الجناحين .  
اجناسها وانواعها عديدة جميعها متوسطة الحجم ، قوية الاربيل  
الزبد ، مستطيلة البطن ، غليظة الصدر والرأس والمخالب ،  
قصيرة العظم ، قوية التأثير ، نشطة الحركة ، سريعة  
الطيران || مكثا ونشي الشكل ، اخير اللون ، تمتح  
بدون انتظام على الاشجار والاعشاب وشمال الزروع  
وانصاف الشجر واُزراقها وفي الزبل والبن || ريفاتها  
عاشية ، دامت به تكون واجبة تعيش في الرية  
تفضل الدبال والرمال ويكثر وجودها تحت الحطب اللدن .



عتيل

*Gonomothylus* (F). *Gonomothylus* (E).

تصاب فري ، ذكور اناثه ضيقة اما اناثه فتور .

### ١٩١٥٩ - عُنُقِيل \* ، نُهَيْد

*Trochus* (S). *Trochus, Topp-shell* (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات منطبات الاربيل  
وصيلة التثليات . انواعه المعاصرة المعروفة قليلة العدد  
أصلها بحار البلاد الحارة . تعيش على الصخور المعروفة  
قرب الشواطئ . اصداها غروطية كبيرة القشـ بحلة  
الغازية الخارجية ، ولؤلؤة المسحات الداخلية . اجناسها  
عزلة كبيرة . رؤوسها صغيرة ثنائية القواس المربعة .  
اربطها مهدبة الخمار . اصداها قرنية المادة || اصداها  
صناعية ولوحها مأكولة .



عتيل نقيط



عند

### ١٩١٦٠ - عُنُقِيلِيَّات ، نُهَيْدِيَّات

*Trochidae* (S). *Trochidae* (F). *Trochidae* (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات منطبات الاربيل  
اماميات الخياش . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد  
أصلها بحار البلاد الحارة || اصداها غروطية شبه حورية  
الشكل متباينة الاجسام والوانها الخارجية . صفاها  
الداخلية مائلة ناعمة ولؤلؤة اما الخارجية فخشنة || اعرف  
اجنسها واشهرها العنيل .



عند جميل



عُنُوس

### ١٩١٦١ - عُنُقُولِيَّات \*

*Anabacidae* (S). *Anabacidae* (F). *Anabacidae* (E).

فصيلة طير من الجوارث منيات المتأخر . اجناسها وانواعها  
المعروفة قليلة العدد شائعة الانتشار في معظم اقطار البلاد  
الاستوائية والحارة || اجسامها رفيقة ، متوسطة القد او  
صغيرة متقلدها مستطيلة قليلة التقوس . اذنانها مستطيلة  
وتاجية الرئال .

### ١٩١٦٢ - عُنُقِيل نَقِيط \*

*Melanotus robustus* (S). *Melanotus robustus* (F).

حشرة ناعمة مقترسة من فصيلة السالوات ورتبة ممدعات

الاجنحة . تألف الحقل المزروعة والادغال . عتافها  
تعيش على اوراق النباتات البرية . ريفاتها تركب جلود  
النباتات الحولية من الاعشاب البرية الى الدرة وديار  
الشس والباطا والشولنر والجزر ولا تمت من الحشرات  
الدنيا فتعترسها || جسمها متوسط القد يطول من ١٥ الى  
١٧ سم . قوسها الى الكسني اللامع . رأسها متوج بانوار  
حلاي الشكل . فكها كيران . زيانها عيطان . عيناها  
صغيرة . ظهورها بلخ التحزير الفضي . ارسافها خامية  
الشفل || جيلها رهاهي الحولي . تظهر الحشرة الجبلدة في  
اوائل ايار ويقتى حتى اواخر تموز . تسرح في الليل .  
تسافد في حزيران . اناثها قريرة انابيب المكن تحت حلاء  
الاجار او في سراديب الحشرات الخافضة او في الرية ||  
البرقة عند بلوغها الادراك اتمام تطول من ٢٥ الى ٣٠ سم .  
جسمها سلكي الشكل ، اصفر اللون امير الموج .

*Raisin sec* (F). *Raisin* (E). *عُنُجْد*

هو الزبيب وقيل الاسود من الزبيب .

*Euphorbia resinifera* (S). *Euphorbia à résine, E. résinifère* (F). *Euphorbium*

*gum-plant* (E). *Wolfsmilchgummi* (D). *Euforbo* (I).  
نوع من الفربيون وهو نبات لحمي برقي ممر يعلى من  
٢٥ الى ٣٠ سم . غرابيه سفلة ربابية الزوايا ، لونها  
الى الاخضر القاتم الاصلح الموج . لباته خيرة المادة  
الجالية الشديدة الفاعلية الشائعة الاستعمال الطبي .

### ١٩١٦٥ - عُنُجْد جَمِيل \* ، بَيْت النُقْمَل

*Euphorbia pulcherrima, Poinsettia pulcherrima* (S). *Euphorbe superba, E. écarlate, Fille de consul* (F). *Poinsettia, Easter flower, Flame-leaf* (E). *Weihnachtsstern* (D). *Poinsettia* (I).

نوع من الفربيون وهو جنبة زينة معمرة تاجو من ٦٠  
الى ١٢٠ سم . اوراقه حراء اللون غنية التجميع منقطة  
نصلا يضيي الشكل ، اذني القاعدة ، ذوب الزام الاخير .  
ازهاره نجمة الشكل ، كبيرة القد ، ارجوانية اللون || يتكاثر  
بالعتيل . يرب في المواعيد الدافئة وفي الارربة المتوسطة  
الانساج العميقة الدور .

### ١٩١٦٦ - عُنُقِيل ، عُنُجُول

جنس حشرات من فصيلة العنجيليات ، اطلب منجل .

*Courcier* (F). *Charger* (E). *عُنُجُوج*

الجواد الصبور الرائع من عيل الميدان .

*Gryllotalpa gryllotalpa, Gr. vulgaris* (S). *Courtillière*

*Taupe-grillon, Taupeette* (F). *Mole cricket* (E). *Maulwurfsgrille* (D).

حشرة دجوبة مقترسة من فصيلة الجديديات ورتبة مستطيات  
الاجنحة . طولها عند كمال بلوغها اي بعد انسلخها  
الخامس لا يقل عن ٥ سم . قوسها الى السرة الكستنية .  
ظهرها خلي النفاذ . طبها الى الجورة . رأسها غروطي  
الشكل ، شديد الانساق يرتكز على حلقة صدرية شبه  
اسطوانية . عيناها غروطية بارزتان . زيانها عيطان  
محينا الطرف . جوشها وظهورها مفلان بقشاه واق صلب .  
قوائمها ست . قامتها الى الامامتين مسلمات بمبروتين  
مستئين تحفر بها الرية || تألف الارربة الرية .

تعيش في دهايز ملحية تسربها في جميع الاجتماعات. حياتها طول من ٢٢ الى ٢٤ شهراً تمر في اثنائها خمس استلخات || قوتها البهائم والحشرات والجذور التي تبتلع طريقها || اغراضها كثيرة لانها لا تقتصر على الدورات والجذور التي تلتهمها بل تتغذى بل تتصلها الى جميع النشور التي تحلل تربتها قوتها وتعيشها || اثنائها اكبر قدماً من ذكورها وهي تمتع مكبتها الذي يراوح حده بين ٣٠٠ و ٥٠٠ في الربيع والخريف وفي اجساد حده في التربة في اعقاب تراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. مكبتها ابيض اللون الملبس الشكل بطول من ٢ الى ٣ سم. وهو يتغذى بعد ممتع بنحو ٣٠٠ ساعة || تكاثرها باستعمال اسد الحراشير الفعالة كالأ كروبيد وفيلوبليكات الباروم وغيرها.

#### ١٩١٦٩ - عنجل البطاطا \* ، لاشعة الخبيث

*Phthorimaea operculella* (S). Taigne de la pomme de terre, Mineuse des feuilles de tabac (F). Potato tuberworm (E). Kartoffelmotte (D).

فراشة صغيرة ابيض من فصيلة المنجوليات . طولها نحو ٨ سم . يستعملها تراوح بين ١٦ و ١٨ سم. وراشها خفيفة طلاء اللون ، وراشها الاماميان ميمتان بالاسمر والخلفيان بهديا الخمار || مكبتها ذري القند ، كروي الشكل ، اسمر اللون . رقتها خيرا الجسم ، وردية المواج ، طولها نحو ١٠ سم. خادتها بنية اللون تلصق فيلحة حورية النوس تقسم بين الارزاة الجافة المسالمة على التربة او في الخافان بين طيات الاكياس وطيا || اغراضها بالغة لان اجهالها المحلية عديدة تراوح بين ٦ و ٧ وأكثر ولان رقاتها تامة تركيب البطاطا والباذنجان والتين والبنجورة . اذما يتعدى من الورقة التي تلتهمها ويعد الى الساق التي تلتهمها وينتهي بالذرة التي تقترنها وتغسلها تعيش على ما تحووه من مواد نشوية || وتغلب اوراق التبغ لانها تلتهمها وتسرب نسيجها بين البشترين ليهو شاعلاً خالياً من المواد اللينة المذرة . تكاثره مند ظهورها باستعمال اسد الحراشير الفعالة المركزة على اليرودتين .

#### ١٩١٧٠ - عنجل الخبيث \* ، طيور ،

#### اللويس ، حنط الحنطة

*Strotocera carsealis* (S). Aleute des céréales (F).

Grain moth (E). Geceidemotte (D).

فراشة صغيرة القند من المنجوليات . طولها نحو ٦ سم . يستعملها تراوح بين ١٢ و ١٤ سم. جسمها وراشها الاماميان الى الطحلة الرماء تلجوها صفرة طويلا . وراشها الخلفيان الى السرة ، اعدادها رصاصية || مكبتها ذري القند ، بيضي الشكل ، يرتقالي اللون . رقتها خيرا الجسم طولها نحو ٥ سم. خادتها حنطة اللون تكن في النخيلة التي تنسجها داخل الحية || اغراضها محصورة بما تسبه اليرقة من صطب في الحبوب المخزونة لانها تنقبها وتعيش في داخلها على المواد النشوية .

#### ١٩١٧١ - عنجل القطن \* ، دودة قرنفلية

#### دودة القز القرنفلية

*Platyedra gossypiella*, *Gelechia gossypiella* (S). *Platyedra*, *Gelechia* du coton, Ver rose du cotonnier (F). Pink bollworm (E). Rotar kapselwurm, Baumwollmotte (D).

الحشرة الكاملة فراشة صغيرة القند من فصيلة المنجوليات . طولها يراوح بين ٧ و ٢ سم. يستعملها نحو ١٥ سم. جسمها

حنط حلق . وراشها الاماميان الى الصلبة الصنافية يطولها مند قاطعتها وفي طرفها تدبج اسمر يقل سمته مع ابتاده . وراشها الخلفيان الى الكهبة الرماء تلجوها مشقة فضية . اما الالاداب فرصافية اللون || مكبتها ذري القند ، بيضي الشكل ، للارز اللون عند وضعه ثم يبرق ويغمر ويستقر على الارز القرنفلي ، تنسج الاثني فرداً او مجموعاً على اي جزء من النبات || رقاتها تدريجياً الى ان تنشر على القرنفلي . رأسها كسني اللون دوقها الصبورية بنية زاهية اما الشورية لاصقة . طولها اخر القن جويي النج . مدنها اسمر حنط . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم || خادتها صفرة ، طولها نحو ٦ سم. فيها التي تطوى باية صفراء . صلبتها رقيقة ناعمة نسجها كالتولاس || رقاتها تركب القصيلة الخازية انصها القطن . تعيش في بدعدها على البرام الشورية تنسجها وتقات من محروياتها ثم تنابع عملها في الكتانج لتسهم اليرود ، في الطوايز النشوية الاولى ، قبل جها لباها ولا تنشر عن قرض القيل الجديد قبل اكمال نمو وصلاحته .

#### ١٩١٧٢ - عنجل القطن

*Gelechiidae* (S). *Gelechiidae* (F). *Gelechiidae* (E).

فصيلة حشرات مؤذية من رتبة شربليات الاجنسة . اجناسها وافولها زهاء ١٥٠٠ جميعها صغيرة الحجم . وراشها مستطيلة ملونة وبنية الأطراف . صلبها الخلفي ممدب الحافة . ملاصقها الشورية طوية ذرية ملتوية نحو العلاء . قروتها الاستطارية غريبة صلبة . مكبتها ذري القند ، لاقياسي الشكل والتجميع . رقاتها ملونة ، صفرة ، زاهية ، سرية الحركة ، غاصلة ، تركب الازداد والثار والحبوب

#### ١٩١٧٣ - عنجل

*Trachypetura* (S). *Trachypetura* (F). *Trachypetura* (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة البشريات انواعها المعروفة نحو ١٠ اسماها بحار البلاد الحارة من الماين القديم والجديد . اجسامها مدونة الشكل مسطحة . تنسج رقاتها المسطحة الانقباسية كما يبرق في الرم . اثراها ثنائية اللون يطولها تدبير جويي وهي فضية الشط الاصل عابجة الشط الاسفل

#### ١٩١٧٤ - عنجل القطن

*Tentoides*, *Trachypetridae* (S). *Tentoides*, *Trachypetridae* (F). *Tentoides*, *Trachypetridae* (E).

فصيلة اسماك بحرية من البشريات شائكات الزعنات . اجناسها وافولها المعروفة معطوة البند يكثر وجوها في بحار المناطق الاستوائية || اشهر اجناسها المنجبل وكشرايط والقوت

#### ١٩١٧٥ - عنجل

المنجبل حشر من اللصافير (بحر المحيط) .

#### ١٩١٧٦ - عنجل القطن \* ،

*Indris brevicaudata* (S). *Indris à queue courte* (F).

حيوان لبن وسيد الجنس والنوع من البشريات . موطن جزيرة مدغشكر . يألف الكنايات الرطبة . ملجته الحيواني جماعي . جماعته تد من حمة الى عشرة ازواج || جسمه اعيف الشكل يبرق نحو ١١٠ سم. وهو اكبر اجناس البشريات . شكله وانما قرب القبي بشكل الانسان . ثوبه



عنجل البطاطا



عنجل الحبوب



عنجل القطن



عنجل



عنجل

Bukkum-wood (E). Sapanbaum, Rotes Brasilienholz (D). Brasilletto dell'Indie (I).

نوع من العُتْدَم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو ٨ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، وريقاتها سنائية صغيرة. أزهارها عشوية التجميع، برتقالية اللون، غائقة البرق السطري. اشخاصا شديدة الصلابة، قوية المخلات، جيدة الصنف. خشبها أحمر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٥ - عُتْدَم قَلَح \*، أَطْمُوْد، بُنْدُقِي هِنْدِي

Cassipinia bonduc (S). Césalpinie bonduc, Bonduc, Chiquer, Chiquer, Chlot du Canada (F). Bonduc, Nicker tree, Gray bonduc (E). Nickerbaum, Gemeiner Schlüsselbaum (D). Bonduc, Niccheri, Occhio di gatto (I).

نوع من العُتْم شجرته سبروتية قليلة الشوك تملو من ٣ إلى ٥ أمتار. أوراقها مركبة، وريقاتها بيضيه النصل. أزهارها عشوية التجميع صغيرة القذ، صفراء اللون. ثمارها طيبة وصافية حواء الخشب، اشخاصا صلبة متينة جيدة الصنف.

١٩١٨٦ - عُتْدَم هِنْدِي \*

Cassipinia pulcherrima, Poinciana pulcherrima (S). Césalpinie superbe, Flamboyant, Palicouade magnifique (F). Indian flower-fence, Peacock flower (E). Paradisblume (D). Poinciana Indiana (I).

نوع من العُتْم الزينة. شجرته شائكة، رقيقة، تملو من ٣ إلى ٤ أمتار. أوراقها مركبة عابلة، وريقاتها احليجية صغيرة. أزهارها كبيرة القذ، حواء اللون، عطرية العروق، هريسة التجميع || أزهارها يستمر من حزيران إلى أيلول.

١٩١٨٧ - عُتْدَم مَيَات

Cassipinias (S). Césalpinies (F). Cassalpinias (E). بسيط من فصيلة القرنيات، أجناسه وأنواعه زهاء ٦٠. فيها الأشجار والشجيرات والجنيات البرية والصناعية. أشهر أجناسه العُتْم.

١٩١٨٨ - عُتْرُوسِ أَمَلْسِ \*، Anerus isavia (S). Anerus lisse (F).

حشرة دامت من فصيلة العروسيات. جسمها صغير بسيط. يطول نحو ٥ م. عند الذكر رفيع ٧ م. عند الأنثى || ثوبها إلى الجلود. ظهورها كامل الحنحية، بنفسجي اللون، أسود المواج، ورشها شفاهان. رأسها مكور. غطها صغير، طليق. عيناها صغيرتان، عنقها قصير. كوسلها مقطوم القنادة والطرف. حجبها نصف دائرية. ظهورها يلفظ البطن دون الحمار. حمار ظهرها يجمع بالأسود. قوائمها صغيرة || تألف البراري الغلة. تعيش تحت القشور وفي الجحالة من المواد النباتية المنسلة.

١٩١٨٩ - عُتْرُ، Chèvre, Capella (F). Capella (E).

النم نيم من كوكبية مسك الأعنة. مركزه على المرقق الأسير. يستمر من نجوم البعرة الأولى. يمد من الأرض نحو ٥٠ سنة ضوئية.

١٩١٩٠ - عُتْرُ، عُتْرُ \*، Chèvre (F). She-goat (E).

الأنثى من الماعز أو أثنى الكيس. ج. أمز وعوز ومنار.

١٩١٩١ - عُتْرُ، Ibis

هو الخاريس، اطليه.

الأسرة السوداء. رأسه وكشاه وظهوره وأعضاءه وفخذه إلى السواد القمعي. أذناه كبيرتان كاسيتان. جبهة وبعدها وصقة إلى الكهبة. بقاء وريلاه سود. ذنبه شديد التقصر، يطول نحو ٥ م. || الأثنى ثنائية الكندي، عجلها يولد نحو ١٤٥ بيضا تضم في تمامه جرأ واحدًا ترومه نحو ثلاث أشهر || قوته الجأ والتمتات والجلود يسى إليها في الأقل من القربوب إلى الفبر وبييت في التبار حل أنصاف الأشجار الرزمة الورقة النلل.

١٩١٧٧ - عُتْدَمَة، Bas ventre (F). Lower part of the abdomen (E).

المنطقة أسفل البطن.

١٩١٧٨ - عُتْدَمَة، Chant du rossignol (F).

نغريد العنديل.

١٩١٧٩ - عُتْدَم كَيْب \*، Luscinia megarhyncha (S). Rossignol chanteur (F). Nightingale (E).

طائر من أخزاز وطيولة الحفليات يتميز بحسن صوته وبقوة وسنسيم أنفاه. طوله نحو ١٥ م. ثوبه إلى السمرة الشفراء، ومن عند الرأس والظهر ويبيض عند البطن || يسى من القفاوع يحوب البلاد في طلب الرزق والمصيف والشتى. يأنف الحداق والفتات والادغال. قوته الحشرات والديدان والنمل || يسى في الموجع والجنيات التناة المشاكسة. أثناه تضم من ٥ إلى ٦ بيضات تحضنها بتناوبة الذكر من ١٣ إلى ١٤ بيضا.

١٩١٨٠ - عُتْدَم كَيْب الْيَابَان، Rossignol du japon (F).

طائر ياباني المهد جميل الثوب، يسى يُهْدَل، اطليه.

١٩١٨١ - عُتْدَم، Cassipinia (S). Césalpinie (F).

يسى فليات. برية وزراعية تربيتية من فصيلة القرنيات. أنواعه نحو ١٠ منها الأشجار والشجيرات والجنيات. اشخاصا ناعمة الرقة، صلبة العود، فاعرة الصنف، شائعة الاستعمال ويستخرج منها صبغات حمراء وصفراء فيها تصلح في تخفيف السموم والقطن || أشهر أنواعه مايتج.

١٩١٨٢ - عُتْدَم بَرَاكِيْلِي، عُتْدَم فَرْمَبُوك

Cassipinia echinata (S). Bois du Brésil, B. de Fernambouc (F). Brasil-wood, Brazilletto-wood, Lima-wood (E). Brasilienbaum, Brasilienholz (D). Brasile rosso, Legno del Brasile (I).

نوع من العُتْم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو سبعة أمتار. أوراقها مركبة عابلة. أزهارها إلى الصفرة. اشخاصا شديدة المخلات، فاعرة الصنف. خشبها أصفر اللون شائع الاستعمال.

١٩١٨٣ - عُتْدَم مَيَات \*، فُولَكَة

Cassipinia coriaria (S). Dividivi (F). Divi-divi tree, American sumach (E). Divi-divi-strauch (D). Sommaco d'America (I).

نوع من العُتْم، شجرته سبروتية شائكة تملو نحو ٥ أمتار. أوراقها مركبة عابلة. وريقاتها بيضيه الشكل صغيرة القذ. أزهارها متوسطة الحجم، عشوية التجميع. اشخاصا جيدة الصنف صناعية. غلاه سفيها وأعوها داغية وصافية.

١٩١٨٤ - عُتْدَم مَيَات \*، بِكَم هِنْدِي

Cassipinia sappan (S). Césalpinie sappan, Bois de sappan, Brésillet des Indes (F). Sapan-wood tree,



عنديل



عندم سباني



عندم صبان



عندم قارح



عندم هندي



عَرَبِي الْمَلِك



عَرَبِي



عَرَبِي



عَرَبِي



عَرَبِي

## ١٩٢٠٢ - عَنَصَرٌ مَكْرِي Micro-élément (F).

Micro-élément (E).

هو كل عنصر غذائي جزئي النسيب يسبب اعتلاله أو شذائه في التربة ما يدمره الجبن أو القرمز الذي تظهر حوارضه في النباتات والثمار.

## ١٩٢٠٣ - عَنَصَرَةٌ هي للملح اللهب ، المالح .

## ١٩٢٠٤ - عَنَصَرِي Rachal

نمت تعريفي توصف به الأجناس المتحدرة من أصل واحد.

## ١٩٢٠٥ - عَنَصَلٌ Scilla (F).

هو الاشكيل نبات موسمي طوي ، المالح .

## ١٩٢٠٦ - عَنَصَلٌ جَرَسِي Scilla d'automne (F).

هو اشكيل الخريف ، المالح .

## ١٩٢٠٧ - عَنَصَلٌ مَنَحَن Jacinthe sauvage (F).

هو اشكيل القباب ، المالح .

## ١٩٢٠٨ - عَنَصَلٌ تَجَسِي Jacinthe étoilée (F).

هو الاشكيل النجمي ، المالح .

## ١٩٢٠٩ - عَنَصَلٌ \* ، جَوَلَنُ الْمُرُوج Endymion (S).

Endymion (S). Endymion, Agraphide, Jacinthe des prés (F). Blue hyacinth (E).

نبات يصل من فصيلة الزنبقيات . مهد فابات البلاد المعتدلة الحارة من الشرق الأوسط وأروبة . أوراته مستطيلة مزيانة النصل الجميل الخضار . غمراته أروع الانتصاب ينتهي بشلة من الأزهار المتناوبة المحتبة الخريف ، الجيلة الشكل ، السداسية البتلات الزرق || تنموه ربيعي .

## ١٩٢١٠ - عَنَصِيْفٌ \* Felicia (S).

Félicie, Piquereux bleue (F). Blue daisy, Blue Marguerite (E). Felicia, Kapaster (D). Felicia (I). جنس نباتات برية وريضية من فصيلة المركبات . أنموه عذبة منها المشية واللبية وأخرية والمصرة . أوراقها لا قياسية الزركاز . أزهارها محتلة الألوان ينطق فيها الأزرق . سطوها نبات سبروتي ينش ويحد في جميع الأتربة || أشهر أنموه التريضية ما يلي .

## ١٩٢١١ - عَنَصِيْفٌ سَمَنَحِي Felicia collettii (S).

Félicie azurée (F). عذبة ليفة ممررة تطلو من ٦٠ الى ١٢٠ سم . أوراقها متعاقلة ، لاطئة ، بيضيه الشكل ؛ نصلها خالي البثرة ؛ ملتصق الاطراف . أزهارها حالية الزركاز ، فردية التجميع ، مستطيلة الزناد ، سمججبة اللون || أزهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

## ١٩٢١٢ - عَنَصِيْفٌ لَطِيْفٌ Felicia tenella (S).

Félicie délicate (F). عذبة ممررة تطلو نحو ٣٥ سم . أوراقها متعاقبة غشجية نصلها حاد السام ، خالي البثرة ؛ يلمت الخضار . أزهارها حالية الزركاز ، فردية التجميع ، لها بين الأزرق والبياني || أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

## ١٩١٩٢ - عَنَرٌ Cigogne noire (F).

هو اللقلق الاسود ، المالح .

## ١٩١٩٣ - عَنَرُ الْمَاءِ \* ، قَنَقَرٌ Balistes (S).

Baliste (F). Trigger-fish (E). جنس اسماك بحرية من رتبة ملحويات الفك . أنموه عديدة . اصطناعها جمار مناطق البلاد الحارة . جميعها من الاسماك المأكولة تتميز بشكلاها البيضاء المخططة الماعدة الاثاق . رؤسها مسطحة زعنفتان مهاذبة الشكل مدينة الطرف متشفر وتلتصق عند الحاجة .

## ١٩١٩٤ - عَنَرُ الْمَاءِ الْمَلُون Baliste caprique (F).

سمكة بحرية حمراء قَنَقَرُ المنطوط ، المالح .

## ١٩١٩٥ - عَنَرَبٌ ، عَنَرُبٌ هو سمك اللك ، المالح .

## ١٩١٩٦ - عَنَرَزُوتٌ Astragale (F).

هو الاسطرغالوس ، المالح .

## ١٩١٩٧ - عَنَرَزٌ \* Eragrostis (S).

Eragrostis (F). Love-grass, Tickle grass (E). Grasses Liebesgras (D). Eragrostis, Gramignone (I).

جنس نباتات عشبية برية من المركبات وفصيلة النجيليات أنموه عديدة نحو ٢٤٥ منتشرة في جميع اصقاع العالم . معظمها حولي وبضها ممر . يكثر ويوجد في المراعي الطوبية وفي الأراضي نخيلة . صفهاشويب النصل ، خيطي الزنم الاخضر . أزهارها عذوية متعصب . رعاها الماشية وتضمن عليها .

## ١٩١٩٨ - عَنَرِزَعَةٌ هي التفت القسي ، المالح .

## ١٩١٩٩ - عَنَسٌ \* Aquile sudaux, Uroetux sudaux (S).

Uraète, Uraète sudauleux (F). المنس ، جمه عناس وينس ، طائر وحيد الجنس والذرع من عمارة العتيان وفصيلة الصغريات . كبير الجثة طوله نحو ١٠٥ سم . ويسطه ٢٦٠ سم . منس قوي البرة الحادة . ذنبه زناخي الريش مقطوع الطرف . ثوبه من السرة الخفيفة تلوها مشقة من السبهة يتخللها ثوب من السرة الجهورية السوداء المالح . عيانه غمريريتا اللون . منس وعاليه صفر || عيشته جبابية ، سربه يعلو من روبيين الى خسة ازواج . يألف الجبال والسهول والاسراج . قوته كل ما استطاع اليه يسكن من الحيران والطير والزمامقات والاسماك . يربف في الثم والمنازل والظلال ولا ينف من الجيف || يلدن وركه في الانهار القريبة التالية . اناته تحضن رسلها رشتين كبيرتين طول الواحدة يراوح بين ٨ و ٩ سم . ويرضعها من ٦ الى ٧ سم . وهو من العتيان التي تألف حياة الاسر بسهولة .

## ١٩٢٠٠ - عَنَصٌ Myrobahn ailé (F).

هو الاطليح الجنب . من النباتات اللبية ، المالح .

## ١٩٢٠١ - عَنَصَرٌ Élément (F).

هو التتريف اليوناني لكل مادة بسيطة لم يستخلص منها حتى الآن ، مواد ايسط منها .

## ١٩٢٢٢ - عَنْقُودَانَةٌ كَثِيْمَةُ السَّيْبَةِ

*Liatris pycnostachya* (S). *Liatride à épi dense* (F).  
بجلة زرقانية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. أورقها السفلى  
خامسة أو سباعية المروق، طولها نحو ٣٠ سم. وتعرض  
١٥ سم. أورقها العليا خطية التصل الذرب الجماد. أزهارها  
روبيات صغيرة متتامة كثيفة تتجمع أرجوانية اللون.  
أزهارها يستمر من تموز إلى أيلول.

## ١٩٢٢٣ - عَنْقُودَانَةٌ تَجْيِلِيَّةُ الْأَوْرَاقِ

*Liatris graminifolia* (S). *Liatride à feuilles de graminée* (F).  
بجلة زرقانية تملو من ٤٠ إلى ٩٠ سم. أورقها تجيلية  
صغيفة الشكل، خفيفة النسل. أزهارها روبيات صغيرة  
متتامة، متجمعة، يضاء اللون أو حرجاء || أزهارها  
يستمر من آب إلى أيلول.

١٩٢٢٤ - عَنْقُودٌ \*  
*Lucanus* (S). *Lucane*,  
*Cerf-volant* (F). *Stag-beetle* (E). *Hirschkäfer* (D).  
ينقل للآكل عظماء والآنثى عنقابة، جلبى شحرات ثلثة  
من فصيلة المنظويات. الذكر أكبر قدماً من الأنثى وهو  
كبير الحجم، غليظ الرأس، عظم أكتافها، مستطيل  
الزبان، كسفي الاتحاد السفلي الموجب. أما الأنثى فصغيرة  
الحجم والرأس وتأثير. اتحادها إلى السمرة المابقة المادمة  
الموجب || البرقة غشاء اللون، عمودية الشكل، تمشي  
على جلوج الأشجار اليابسة.

## ١٩٢٢٥ - عَنْقُودٌ الصَّخْرَافُ \*

*Dorcas* (F). *Dorcas* (F).  
هو الدرقس، الحلب.

## ١٩٢٢٦ - عَنْقُودِيَّاتٌ \*

*Lucanidae* (S). *Lucanidae* (E).  
فصيلة شحرات ثلثة من رتبة عمديات الإجنسة. أجسامها  
وانواعها عديدة تمشي على جلوج الأشجار اليابسة تحت  
ظلها وفي محيط انتشار جلوجها. أكثرها صغيرة ومتوسطة  
القد وبعضها كبير جداً يراوح طول بين ٧٠ و ٨٠ سم.  
أنواعها مخططة الألوان يلب فيها الأسود والكسفي المايق.  
قرونها الاستشعارية ورقية الشكل، حشائية المفاسل.  
رؤوسها مستديرة، اتحادها سلبية، أجسامها قوية.  
ذكورها أكبر حجماً من أنثاهما وأضخم جثة وأغلظ أضواءً  
وتأثيراً.

## ١٩٢٢٧ - عَنْقُودَةٌ

*Interligne* (F). *Space-lins*, *Lead* (E).  
المنفة في المسافة بين غليظ التزرع.

## ١٩٢٢٨ - عَنْقُودَةٌ

*Turbine*  
دولاب مائي محرك محوره عمودي أو ممتد. والمنفة  
اشكال أهمها استمالاً:

*T. radiale* (F). *Radial T.* (E). عنفة شعاعية

*T. hydraulique* (F). *Hydraulic T.* (E). عنفة مائية

*T. axiale*, *T. parallèle* (F). عنفة محورية

*Axial T.*, *Parallel T.* (E).

*T. mixte* (F). *Mixed T.* (E). عنفة مختلطة

١٩٢٢٩ - عَنْقُودٌ هو عنق الارض.

## ١٩٢٣٠ - عَنْقُودٌ

*Cisse*  
هو السلق، الحلب.

## ١٩٢١٣ - عَنْقُودٌ مَحْتَكِيَسْ (S).

*Félicie reflexa* (F).  
عنفة مسمرة تملو من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. أورقها متعاقبة،

معتقة، بيضية الشكل، ذلقة الزايم الأخير. تصلها  
جميع السقم، مالى البشرة، معتق الطرف، يلمت  
الخطار البشري. أزهارها حامية الارتكاز، فردية تتجمع  
حراء اللون || أزهارها يستمر من شباط إلى أيلول.

## ١٩٢١٤ - عَنْقُودٌ هو السون البجلي، الحلب.

١٩٢١٥ - عَنْقُودٌ \*  
*Anthestia* (S). *Anthestie* (F).

جنس نباتات عشبية برية من فصيلة النجيليات. أنموه  
المعروفة قليلة المند أوطانها البلاد الحارة || والعنطس من  
النباتات الطويلة على الساحل اللياني. مثالبه عكوكية  
التجميع عطفية بقتيات دقيقة تحملها كالصفا.

١٩٢١٦ - عَنْقُودٌ بَلَّالٌ \*  
*Onitis bellai* (S). *Onitis bellai* (F).

حشرة جالسة نالمة من فصيلة الجمليات ورقية ملبفات  
الاجنسة. تألف المزارع والبساتين والبراري وكل مكان  
يكثر فيه الخشب والورث والصلح || جسمها متوسط القد  
يطول من ٢٠ إلى ٢٦ سم. لونها إلى السواد اللامع. رأسها  
يلسني الجسم، قصير الأتار والخط. زباناتها صغرية،  
صغرية الأطراف. حشاما صغريتان. ظهرها مضطوم  
الطرف، لا يلمس كامل البطن. غمداهما شديتان الصلابة،  
قليلتا التحريك || الأنثى أصغر قدماً من الذكر وأبهر ثوباً  
منه || لها جبل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة  
في احوال الربيع وتبقى حتى أواخر الصيف. سرسها  
دجوي || والبرقة منه ادراكها الكمال الجسوري تطول  
الشكل، فليح التكاثر، قصير الأرجاب، الحبر اللين، منقبي  
أسود الرأس || طوره الأكمال يستمر نحو أربعة أسابيع.

## ١٩٢١٧ - عَنْقُودٌ المنط: تلير النبات من الحرج.

١٩٢١٨ - عَنْقُودٌ  
*Sauterelle malle* (F). *He locust* (E).

المنط الذكر من الجراد. ج. عنقابة.

## ١٩٢١٩ - عَنْقُودٌ بيت المنكوب.

١٩٢٢٠ - عَنْقُودَانٌ  
*Liatris* (S). *Liatride* (F).

جنس نباتات عشبية سبروتية مسمرة من التفشيات ولصيلة  
المركبات. أنموه عديدة مظهرها بري وبعضها ترابي.  
جلوجها دوصية كروية. سوقها بسيطة جالسة. أورقها  
صغيفة الشكل متعاقبة. أزهارها سليل التجميع. بزورها  
قنزعية اللثة || أحرف أنموه وأشهرها ما يلي.

١٩٢٢١ - عَنْقُودَانَةٌ أَلِيَّةٌ  
*Liatris elegans* (S). *Liatride élégante* (F).

نوع من العنقودان وهي بجلة زرقانية تملو من ٦٠ إلى  
١٢٠ سم. أورقها مستطيلة التصل، خفيفة الصلابة  
الجمادة. روبياتاً أحليبية الشكل. أزهارها أرجوانية.  
أزهارها يستمر من آب إلى تشرين الأول.



عنقود بلال



عنقود ذكر



عنقود أنثى



١٩٢٣٣ - عُنُق ، عُنُق (F). Neck (F).

عنق وعنق. ج. عنق.

Encolure (F).

Neck and shoulders of a horse (F).

جزء من جسم الفرس يمتد من الراس الى الصدر والكتفين.

Pétiole (F). Petiole (E).

عُنُق

علاقة نصل الورقة.



عقيد السيلانيان

١٩٢٣٦ - عُنُق الحَبِيَّة

عنق الحبة نجم نير من كوكبة حور وسيمة. مركزه على عنق الحبة.

١٩٢٣٧ - عُنُق القَرَس

عنق القرس نجم نير من كوكبة نجوم القرس الاعظم.

١٩٢٣٨ - عُنُقَه

العنقاء كوكبة نجوم مقبها الجنوب.

١٩٢٣٩ - عُنُقَه مَغْرُوب هي القنص ، اطلبه.

١٩٢٤٠ - عُنُق ، عُنُق ، قاصدا مِهْرَابِيَّة

جنس نباتات عشية حريسية من القاصديات وضعية

القنريات الفرائشة. انواعه نحو ٢٥ مظهرها بري وبشها.

علي رزقي.

١٩٢٤١ - عُنُقَه

جنس اسماك بحرية من فصيلة العقيدات الشالكتات

الزواحف. انواعه المعروفة خمسة مظهرها يمار المناطق

الحارة. جميعها صغيرة القد ، اطلبية الشكل ، زائجة

الالوان الجليدية اللامعة. حيوتها كبيرة مستديرة ، زعانفها

الظهرية مسطيلة شائعة ، زعانفها الشرجية نازقة || يعتبر

من الاسماك البادية البهية.

١٩٢٤٢ - عُنُقَه

جنس حشرات من فصيلة العقيدات ودية ذوات الجناحين.

انواعه المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم اقطار البلاد

المعتلة الحرارة || اجسامها مستضفنية الشكل ، تغطي

منه الى ٧ م. رؤوسها صغيرة. حيوتها كبيرة ، متناصفة

عند الشقين. قرونها الاستعمارية قصيرة ، ثنائية العمل.

مراسفها ويلاسها شديدة السفر. كوشلها شبه مكورة.

شخباتها تلتصق الارزعة. بطنها انثائية الشكل.

مرزاتها صغيرة. رؤوسها مستعرجة. قوائمها معتلة الطول ||

تألف البرازي والمواقع الغللة. يرقاتها تنظف على بعض

انواع الناصب.

١٩٢٤٣ - عُنُقِيَّات

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجسامها وانواعها

المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد باستثناء

المناطق الباردة || اجسامها خيانية القصد ، مستضفنة

الشكل. رؤوسها صغيرة حيوتها كبيرة ، متقاربة عند

الشقين. قرونها الاستعمارية ثنائية او لائحية القصل ،

١٩٢٣٤ - عُنُقِيَّات السِيلَانِيَّان ، قُرْبِيَّة السِيلَانِيَّان

الجُرَارَاة ، بُمِيَكْسِيَّات السِيلَانِيَّان

الجُرَارَاة

Cnethocampa

processionea, Thaumetopoea processionea (S).

Processionnaire du chêne (F). Procession moth,

Oak processionary caterpillar (E). Eichen-Prozessions-

spanner (D).

حشرة من فصيلة الشرسليات ودية حشرقيات الاجنسة.

مظهرها يشمل معظم الاصقاع المعتلة الحرارة من العالم

القديم والجديد. فراشاتها صفيحة تميش على غزونها الاسمان.

سرقتها تميش على اوراق الشيلانيان || جسمها متوسط القد

يطول نحو ١٥ م. بطنها نحو ٣٠ م. رأسها حنطي اللون.

عينها صغيرتان. زباناتها مشطيات مزدوجتان عند الذكر،

مشطيات بسطبان عند الانثى. جوشنها حنطي اللون اسمر

المزاج بطنها اشبه الاني. احمر المزاج || رؤوسها

الاماميان الى الكهبة لتعلوها زركشة وضطوط مستعرضة الى

القبعة السراء. رؤوسها الخلفيان الى الشبهة التبراء تعلوها

مشعة مشطية خفيفة. اهدابها الى الحنطي الاكثف ||

لها جيل واحد في الحيل. تظهر الفرائشة في آب. تسرح

في الليل. تماثل بعد ظهورها بقعة قراوح من ٤ الى ١٦

ساعة. تمتع المكان صفيحة على لحاء الجفوع والافصان ||

السرة تطول نحو ٣٢ م. جسمها اسطواني الشكل. ثوبها

البلوي الى الشبهة الزرقاء المزاج. جانبها الى الشبهة التبراء

تعمل في كل سكة من سكةا البطنية ثلثة حراء تعلوها

قصة من الحلب السريع الانقسام يشري الجله اذا لاسه

ويحيه كالقراص. رأسها اسود || طور الاكمال الذي

يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن خلاف رقيق داخل

الجرب الجاهي الذي تاري اليه جميع اسارع المشيرة.

١٩٢٣٥ - عُنُقِيَّات السِيلَانِيَّان ، قُرْبِيَّة السِيلَانِيَّان

الجُرَارَاة ، بُمِيَكْسِيَّات السِيلَانِيَّان

Cnethocampa pityocampa, Thaumetopoea

pityocampa (S). Processionnaire du pin (F). Pine

processionary caterpillar, Procession moth (E).

Psilen-Processionspinner (D).

حشرة مبدولة من الشرسليات ودية حشرقيات الاجنسة.

مظهرها يمتد من الشرق الاسط الى اوروبا وافريقية الشمالية.

فراشاتها جارية قوتها يريق الاثمار. سرقتها تميش على

اهداب الصنوبر || جسمها متوسط القد يطول نحو ١٥ م.

بطنها نحو ٣٢ م. رأسها اكلس اللون. عينها محدثا

الحليم والكشور. زباناتها مشطيات عند الذكر عيطان

عند الانثى. جوشنها اكلس اللون ، اسمر التصبغ. بطنها

الى الشبهة الملوقة بالاسمر || رؤوسها الاماميان الى الكهبة

للدنة الملوقة بطلاقة ضطوط حنطية. رؤوسها الخلفيان الى

البياض الاخير تعلوها بقعة شهاب في حدود الزاوية الخارية

الشفل || لها جيل واحد في الحيل. تظهر الفرائشة في مطلع

حزيران. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنجر

اربعة اسابيع و تمتع المكان على البياض واصول الاحداثاب ||

السرة تطول من ٣٠ الى ٤٠ م. جسمها اسطواني الشكل ،

كثيف الحلب ، كسني اللون مبيج بالجفوي. رأسها

اسود. مدنها اسفر. ملها حنطي يشري الجله اذا لاسه.

والسرة قبل دخولها في طور الاكمال يبين تهرج غباء

المشيرة ويتبعن في الجلالة نحو اربعة اسابيع الى ان ينتهي

هذا الطور.



عُنُق



عُنُق

اربعها نائكة . اوراقها مركبة ، عابطة ، ورتبة التجميع . وريقاتها سباعية او تساعية العدد ، فصلها يضيء الشكل ، ذلك الزايم الاخير ، سنن الحافة ، عاتق الحصار على صفته العليا يمتد على السفلى . ازهارها متصصة متحولة للتجميع . ثمارها جرداء حواء اللون ، ثلاثية القلق .

Grappe, Racème (F).

١٩٢٥١ - عَفْشُود

Bunch, Racem (E).

شكل ازهار بسيط غير محنود تكون فيه الزهار ذاتا غير محنود على علاقات قصيرة متساوية الطول متمركزة على محور مشترك . مثاله عَفْشُود التنب والكشش .

Uviforme (F).

١٩٢٥٢ - عَفْشُودِي

Grape-shaped (E).

نمت ترميفي يطلق على ما كان شكله كعَفْشُود التنب .

Racémeux (F).

١٩٢٥٣ - عَفْشُودِي الشكل

Racemose (E).

ما كان ترتيبه او تجميعه شبيه بالمعقود .

Enicurus (S).

١٩٢٥٤ - عَفْشُور

Enicura (F). Enicurus (E).

جنس طير من الجوارم سنيات المناظير وفصيلة الليريات . انشور المعروفة نحو عشرة . اصلها تمتد من الهند الى ماليزيا وجاوا . تألف الغابات وصفان مجاري الماء . قوتها الحشرات والنباتات || اجسامها رفيقة مهادا تطول من ٢٠ الى ٢٧ سم . تتميز باذنانها المستطيلة القارئة . اوراقها مائلة بالاسود الاسم اللامع والابيض الناصع || تدنو امشاشها في الفاصح تقيها في صرور الصقور القرية من مجاري الماء . انثاها تحسن من ه الى ٧ بيضات على مرتين في الحبل . الذكور تناوب الاثان في الترخيم .

Spermophagus

١٩٢٥٥ - عَفْشُوس لاهم

sericeus (S). Spermophage soyeux (F).

Spermophagus sericeus (E).

حشرة واضحة حابية من فصيلة المندوسيات ورتبة مدمدات الاجنحة . تألف المناطق التي يكثر فيها الابلاب . خنافسها تمش على ازهار النباتات المختلفة الاجناس والفصائل . يترافها تمش ضمن كباير الابلاب || جسمها صغير القد يطول نحو ٢ سم . ثوبها الى السواد البوروي يطلو خل كثيف اذهب . رأسها مستدل الجرم . جنتها صغيراتان . زباناها صغيراتان . فكها ذريان . ظهراها لا يلفظ كامل السكة الشرجية . ارسافها رابعة المعقل الظاهرة || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في البهار . تساقد بعد ظهورها بنحو ١٠ يوما . تمتع الممكن ميحاذها على الكبار تلتفه مادة غروية لاصقة || البقرة عنه بلوغها الادراك التام تطول نحو ٤ سم . جسمها مقوس الشكل ، نودلي والرجاب ، حطلي اللون ، اغير المراج ، اسود الرأس || طول الاكادال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينقضي فمن صلبة تغلق عند انطلاق الحشرة الجملانة .

Aniloca (S).

١٩٢٥٦ - عَفْشُوس

Aniloca (F). Aniloca (E).

جنس دويبات بحرية من عشريات متقاربات اصيلات وفصيلة التريوسيات . انواعها المعروفة قليلة اعطاهن اليسر

بعضها مهذب الاطراف . ملاسها نحلة او شامرة . كولسلها شبه مكورة . شيفاتها منبسطة تلحف الازنة . بطنها انائية الشكل . وراشها صغيرة ، خفاقة || يرقاتها صغيرة ، وشمة الشكل ، مجرة بتأثير ثالثة تمكثها من الصقل على التناكب || اشهر اجنسلها المعتد .

Béryclides (F).

١٩٢٤٤ - عَفْشُودَات

Beryclidae (E).

فصيلة اسماك بحرية من شائكات الزمانف ، اجنسلها وانواعها عديدة موطنها بحار المناطق الحارة . جميعها صغيرة القد مأكلة تتميز بالوانها الزاوية الالوان ، بكبر عينا المستمرة . زباناتها الظهرية للامانة الشكل وزباناتها الشرجية القارئة || احرف اجنسلها واشهرها المعتد والسفوق والجليل والليوية .

Verge de l'âne (F).

١٩٢٤٥ - عَفْشُور

هو جردان الحار .

١٩٢٤٦ - عَفْشُورَة

انثى الباشق .

١٩٢٤٧ - عَفْشُورِيَة

Argonauta (S). Argonauta (F). Argonaut (E).

جنس حورلات حلاية رأسية الازيل من الاغشليات . انواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة . تتميز بالفلارتي الشكل التاسع الذي يبدو بين الذكور والاثان . ذكورها صغيرة القد اغشلية الشكل حادة الصفة قصيرة الملاصق بامتداده الراسي المستطيل . انثاها مستدرة الشكل نصفية للفلارتي الصفي التركيب الرقيق الصفة . اشهر انواعها المعروفة :

Argonauta argo (S).

عَفْشُورِيَة الخوص

Argonauta tuberculata (S).

عَفْشُورِيَة الخيط المندى

Empusa (S).

١٩٢٤٨ - عَفْشُوس

Empuse (F).

جنس حشرات من فصيلة السرغيات ورتبة مستنجات الاجنحة . انواعها عديدة معظمها من حشرات المناطق الحارة . اخلاقتها اخلاق الشرعيف اما اشكالها فغريبة .

١٩٢٤٩ - عَفْشُوب السندايان

Oncopeus lenio (S).

١٩٢٤٩ - عَفْشُوب السندايان

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنحة . جسمها صغير القد يطول من ٨ الى ١٠ سم . || ثوبا متباين الالوان بين التفتين . فهو عند الذكر اسود الرأس والكرول والحبيطة ، جلوي الظهران ، اسمر البطن والقوائم . وهو عند الاثان جلوي الرأس والكرول والحبيطة ، اخضر الظهران ، حطلي البطن والقوائم || رأسها مستعرض ، قليل التندو . جسمها مستدل الطول . عيناها كبيرتان . زباناها نحيلتان ، صغيراتان . كولسلها مستطيل الشكل . حبيتها كبيرة ، حمرة . ظهراها كامل الحنية ، لاصق وروشان غشائيات ، شفافان . قوائمها نسيقة ، كثيفة . اطلب الشالك || تألف اجمار السندايان والمفص ايها كانت . قوتها القس تحصد من الارواق .

Euscaphis (S). Euscaphis

١٩٢٥٠ - عَفْشُود

جنس نباتات معمرة من فصيلة النيمات . انواعها قليلة العدد معظمها بري وبعضها زرعني . جنتها وجبراتها تملو من ٢٠٠ الى ٦٠٠ سم . فروصها وانثاها غليظة ،



(ذكر) (انثى)  
عَفْشُورِيَة



عَفْشُور



عَفْشُور



عَفْشُوس ناعم



عَفْشُور

Analges (S).

Analge (F). Analges (E).

جنس حشرات جلدية من الحليمان وفصيلة الجربيات .  
أنواعها المروفة قليلة المدد جميعها صغيرة الحجم ، مؤذية .  
تنتقل على الكثير من الحليمر أعصها الجربيات .

١٩٢٦٧ - عَمَم هو الحاصل ، الحليمة .

١٩٢٦٨ - عَمَم أُرُوْبِي هو الباتية ، الحليمة .

١٩٢٦٩ - عَمَمَة *Palmetta, Cordon horizontal*  
هي شكل من أشكال العنكبوت الآتي يستعمل الحولة لبعض  
أنواع الأثمار للتمسك بالقوة الانتفاخ رغبة منهم في الحصول  
على ثمارها بأكورية .

١٩٢٧٠ - عَمَمِي *Vrilin (F). Bored (E).*

نمت وصفي ثباتي يدل على شكل خاص من الأنواع يشبه  
الحائق أو السطحة .

١٩٢٧١ - عَمَمِيَّات *Loranthaceae (S).**Loranthaceae (F). Loranthaceae (E).*

فصيلة نباتية من ذوات التلقين . أنواعها المروفة زهاء  
٥٠٠ تنتمي إلى سبطين : سبط الحشائيات الذي يتميز  
بازهاره الوردية الشق . وسبط البقيات الحشوي الزنار .  
جميع نباتاتها طفيلية تركب فروع وأصناف الأثمار للغلبة  
فيها مرافقها وتعيش على ما تنصه من النسج . سفيها  
مادة طفلة . أوراقها أبيض ، متعاقبة ، بيضية النصل  
الحلدي التسج . ثمارها صنية دقيقة الصير .

١٩٢٧٢ - عَمَمِيَّات *Staphylen (S). Staphylien (F).*

النسبة جميعها آفة . جنس نبات بري زرواوية تزينة  
من فصيلة المصليات . أنواعها عديدة . أوراقها مركبة متعاقبة  
مائلة ، أزهارها عقدية أو حشوية التجميع طويلة الزنار .  
ثمارها جرد كروية الشكل ، يزودها صنية صغيرة جامدة .  
يستخرج منها زيت للذ الطعم مأكول || أشهر أنواعها  
سما يتبع .

١٩٢٧٣ - عَمَمِيَّات الصين *Staphylen holocarpa (S).*  
*Staphylien de Chine, S. à capsule antière (F).*

شجرة جامدة ، تلوم من ٥ إلى ٧ متر . أوراقها مركبة  
ثلاثية . ورققاتها اعطيلية النصل ، تطلو من ٦ إلى ٩ سم .  
أزهارها عقدية متدلية يضاء اللون . ثمارها جرد اعطيلية  
الشكل مقنونة الطرف || أزهارها يستمر طوال شهر  
أيار .

١٩٢٧٤ - عَمَمِيَّات اليابان *Scaphylen bumida (S).*  
*Scaphylien du japon (F).*

جنية سبروية تلوو نحو ٢٠٠ سم . أوراقها مركبة  
ثلاثية ، ورققاتها اعطيلية النصل ، مسنة الحافة ،  
حشوية الإنسان . أزهارها عقدية التجميع متدلية .  
ثمارها جرد ثنائية الفلق المتعاقبة || أزهارها يستمر طوال  
شهر حزيران .

١٩٢٧٥ - عَمَمِيَّات بُولَنْدَر *Staphylen bolanderi (S).*  
*Staphylien de Bolander (F).*

شجرة سبروية تلوو من ٣٠٠ إلى ٥٠٠ سم . أوراقها  
مركبة ثلاثية . ورققاتها بيضية النصل ذلقة الزنار الأخير ،  
تطلو نحو ٦٥ سم . أزهارها عقدية ، متدلية ، وردية  
اللون ، خضراء النصل . ثمارها جرد متساوية الطرف  
والعرض || أزهارها يستمر طوال شهر أيار .

الايض المتوسط || اجسامها صغيرة لقة اعطيلية الشكل  
تطلو من ٥ إلى ١٢ مم . اجسامها مجوزة بمة ماسة ||  
تنتقل على الاسماك تختصق بها ولا تقاربها .

١٩٢٥٧ - عُنُقِيَّ *Collaire (F).**Pertaining of the neck (E).*

نمت لمريني يطلو على كل ما له صلة بالمتق .

١٩٢٥٨ - عُنُقِيَّ *Cervical*١٩٢٥٩ - عُنُقِيَّات *Araignée (F). Spider (E).*

جنس دويبات من رتبة العناكب أو الرتيلاوات . أنواعها  
عديدة متباينة الاجسام والاسهام والأشكال والألوان .  
ذكر العنكبوت يعض عنكبوت والانثى عنكبوت . ومن اسمائه  
العنكبوت والمكناكب والمكناج . ج عناكب وعنكبوتات ومكناج .  
وقد جاء ليدفع الزناب :

و فسان بيت العنكبوت ويصق

رفيع اذا لم تقص فيه الحوائج

١٩٢٦٠ - عُنُقِيَّات المنازل \* \* \* فُدَس

*Tegenaria domestica, T. parietalis (S). Tégénarie,*  
*Araignée domestique (F). House-spider (E).*  
*Winkelspinne (D).*

نوع من العنكبوت الملول بكث في المنازل الأكلة والحرة  
طوله نحو ٩ مم . ثوبه إلى الحولة الحشوية . يله إلى اليافس  
تطلو زواكل مابقة السرة . شمه التي الارتكاز ينسجه  
في الزوايا .

١٩٢٦١ - عُنُقِيَّات يَمِيَّ *Araignée labyrinth (F).*

رابع عيشية التيه .

١٩٢٦٢ - عُنُقِيَّات سَلَطَمُونِيَّ *Araignée crabe (F).*

رابع ذنوة الأثمار .

١٩٢٦٣ - عُنُقِيَّات *Arachnida (S).**Arachnida (F). Arachnida (E).*

صف حيوانات صغيرة دابة يشل العناكب والقارب  
والقمل والقراد ، الخ .

١٩٢٦٤ - عُنُقِيَّات *Adenostyles (F).*

جنس نباتات عشبية معمرة من سبط النفيثات وفصيلة  
المركبات . أنواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي ،  
تتميز بها الكبرة الحجم . سفيها تلوو من ٦٠ إلى  
١٢٠ سم . أوراقها مسطحة ، متعاقبة ، نصالها قليلة الشكل ،  
فضفاضة الصنفرة ، خلية البشرة . أزهارها عديدة الأروبيات ،  
وردية اللون . بلورها صغيرة لقة ، وتدنية الشكل ، قنطرة  
القصبة .

١٩٢٦٥ - عُنُقِيَّات \* \* \* *Inachus (S).**Inachus (F). Inachus (E).*

جنس دويبات بحرية من القشريات عشاريات الأبريل  
قصار الذيل وفصيلة المصليات . أنواعها المروفة قليلة العدد  
اسطها يحار البلاد المعتدلة الحرارة والمتفرقة نحو الباردة ||  
اشكالها كشكل بعض العناكب . دروعها محرمة ثمانية  
التشوير ، كيفة الحليمة البتق . مأكها مثقوبة قصيرة .  
أرجلها مسطحة . ملاطها فليضة . أنواعها إلى السرة  
المختلفة المايات .



عنكبوت المنازل



عنكبوت



عُثَي

بحري السفلى ، حثايقها نحاسية صفيرة اللد || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٧٨ - عُنْبِيَّة مَبْدَلَة

*Parthenocissus vitacea* (S). *Parthénocissée commune*, *Vigne vierge commune* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها نحاسية الوريقات . نصلها سنانية الشكل تطول من ٥ الى ١٢ سم . وتعرض من ٢ الى ٧ . حثايقها خضورية الالوان ، متقابلة مع الاوراق . ازهرارها مفترية . حبا اسود اللون ، ازرق المواج . ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٧٩ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Parthenocissus quinquefolia* (S). *Parthénocissée grimpance*, *Vigne vierge grimpance* (F).

جنبة عارضة مسلكة معمرة تطول من ١٠ الى ١٥ م . سرورها الحولية خضراء اللون . اوراقها باعثة الخضار ، خلة البشرة على سطحها . حوايقها ثنائية الصف ، سداسية او سباعية الخيوط المحضة . حثايقها طرفية كبيرة اللد || ازهرارها يستمر طوال شهر حزيران .

### ١٩٨٠ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Crotophaga* (S). *Ani* (F). جنس طير من المتسلقات وفضيلة التفويجات . انواعه المعروفة قليلة العدد موطنها يحد من امريكا الاستوائية الى الوسطي || ملجئها الحياتي جاعي اسرابها متفارقة العدد . تألف النابات والحياتي وتقرب من الاسماك المأخولة ولا يبتعد عن طعام البقر لانها تنظفها من دوي القرد والطح والتمر وغيرها من الحشرات الجلدية || قوتها جميع انواع الحشرات العذبة والحلينة . تتميز بخلقة المتفاد الذي لا يقل طوله عن طول الرأس . اجنحتها معتدلة الحجم . اذنانها مسطلة . ويضا لبه التجعب . اوضاعها نشطة . اصابعها قوية صمحت الاطراف || وين ميزانها ان الاثا تفرخ البيض في حاضن كبيرة تقيمه بالاشتراك مع الذكر في اعمالي الانجاب الناجمة . تاري من ٥ الى ١٥ اثنى || اهرف انولمه واشهره النومان التالان :

### ١٩٨١ - عُنْبِيَّة السَّامِيب \* عُنْبِيَّة صَغِيرَة

*Crotophaga minor* (S). *Ani des savanes* (F).

نوع من النيس قريب اليه بالحقن باستكانة المتفاد . موطنه امريكا الاستوائية . جسمه يطول نحو ٣٧ سم . وبسطه نحو ٥٠ سم . لونه الى الزرق العابقة البنفسجية المواج . متفاده وزقده وقامتاه الى السواد القاتم . حلقه حية شهيد اللون || سره كبير العدد . قوته الحشرات .

### ١٩٨٢ - عُنْبِيَّة الشُّوْرِي \* عُنْبِيَّة كَبِيرَة

*Crotophaga major* (S). *Ani des paléoviens* (F).

نوع من النيس كبير اللد موطنه امريكا الوسطي . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . بسطه نحو ٦٠ سم . لونه الى الزرق العابقة . صدره اخضر المواج . ذليه بنفسجي . متفاده وزقده وقامتاه الى السرة السوداء . حلقه عيه صفراء اللون || قوته الحشرات وبض الجار اليانة .

### ١٩٨٣ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Euonymus* (S). *Euonymus* (F).

جنس دوبيات بحرية من الملحيات وفضيلة النسيبات . انواعه المعروفة عديدة منتشرة في معظم مجار البلاد المعتدلة الحرارة || اجسامها دوبيية الشكل ، سلقية التركيب

*Staphylea colchica* (S). *Staphylire de Colchide* (F).

جنبة سبروتية تملو نحو ١٥٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية او نحاسية الوريقات . نصلها يضي الشكل ، ماس الصفحة ، جميل الخضار . ازهرارها عتقودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء مستطيلة || ازهرارها يستمر طوال الصيف .

### ١٩٨٤ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Staphylea pinnata* (S). *Staphylire penné*, *Patanotrier*, *Faux platanchier*, *Nex coq* (F). *Common bladder nut*, *Anthony nut* (E). *Echte Pimpernuss* (D). *Staphlodendro*, *Nesotagilano*, *Fussaria*, *Falso platanchio*, *Noce di St. Antonio* (I).

شجرة سبروتية مبدولة تملو من ١٥٠ الى ٥٠٠ سم . اوراقها مركبة نحاسية او سباعية الوريقات . نصلها يضي الشكل ، ضيق الزام الاخير ، سنن الحلقه ، يطول نحو ١٣ سم . ويعرض ٥ . ازهرارها عتقودية ، منتصب ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء متساوية الطول والعرض || ازهرارها يستمر من ايار الى حزيران .

### ١٩٨٥ - عُنْبِيَّة كَلْبِيَّة ، عُنْبِيَّة اَمْرِيكِيَّة

*Staphylea trifolia* (S). *Staphylire d'Amérique* (F). شجرة جادسة ، تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها مركبة ثلاثية . وريقاتها اهليجية النصل المستدير القاطعة ، للمشاري المغلة || ازهرارها عتقودية التجعب ، قصيرة اللد ، يفضاء اللون . ثمارها جرداء كروية مسطيلة . ازهرارها يستمر من نيسان الى ايار .

### ١٩٨٦ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Staphyleaceae* (S). *Staphyléacées* (F). *Staphyléacées* (E). فضيلة نباتية من ذوات الفلطين حليمة المتالات . اجنحتها وانولمها كثيرة العدد قريبة للشي من السبنتيات . ازهرارها خلية الاجزاء . ثمارها حية . يزورها نية الشكل صفيرة . اشهر اجناسها ثلاثة : النبة والقمقوت والمملنان .

### ١٩٨٧ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Parthenocissus* (S). *Parthénocissée* (F). حرة من الجفنة العلاء . انواعها المعروفة ثمانية . جميعها جنبت سبروتية عارضة . اوراقها كلفة ثلاثية او نحاسية التجعب الاسبي . تتميز بحولتها النحسية الاطراف وبارزها لالامد الحواطي || الواسلة منها عنية . اشهرها ما يتبع .

### ١٩٨٨ - عُنْبِيَّة الْيَاكَا

*Parthenocissus tricuspidata* (S). *Parthénocissée du Japon*, *Vigne vierge du Japon* (F).

جنبة عارضة معمرة تطول من ٥ الى ١٠ اطار . اوراقها كلفة عادية المتجعب ، تطول نحو ١٥ سم . نصلها يضي اصغر الصفحة البلبا للالسة اللامعة ، اثير السفلى العملية البارزة المروق ثم ينحرف الى الحرة التي تمة في الحريف . ازهرارها مفترية . حثايقها كبيرة اللد ، كثيرة الحب || ازهرارها يستمر من حزيران الى تموز .

### ١٩٨٩ - عُنْبِيَّة مَسْلُكَة

*Parthenocissus himalayana* (S). *Parthénocissée de l'Himalaya*, *Vigne vierge de l'Himalaya* (F).


جنبة عارضة معمرة تطول من ٣ الى ٦ اطار . وريقاتها ثلاثية اهليجية . الوسطي منها تطول نحو ١٢ سم . نصلها مدبب النمة ، بارز المروق ، جزوي الصفحة العليا ،



عُنْبِيَّة



عُنْبِيَّة الشُّوْرِي



عُنْبِيَّة

Echter Brandschopf, Hahnenkamm (D). Sclamito cressa di gallo, Fior di velluto (I).  
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلَمُ مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَم. أَوْرَاقُهَا كَبِيرَةٌ لَقَدْ أَحْلِيْلِيَّةِي الشَّكْل. نَصْلُهَا تَتَمَجَّجُ الصَّفْحَةُ ، غَالِثُ الْبُرُوقِ ، خَلِي الْبُشْرَةِ ، يَجْلِسُ الْخُضْرَاءُ الْهَادِي . سَبَلُهَا الْزَهْرِيَّةُ خَلِيَّةُ الْمَسِّ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلِ الَّذِي يَخْتَلِفُ بِإِنْخِلَاطِ الْأَصْرَامِ ، يَكْثُرُ فِيهَا الْهَرَبِيُّ وَصُورُ الْبَقْلِ وَالْبَيْتُكُورِيِّ . أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

Colonia argentea (S). **حَبَسَة لَهْبِيَّة** \*  
Cálisis argentea (F).  
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة هَرَبِيَّة الشَّكْلِ تَعْلَمُ مِنْ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَم. سَلَقُهَا مَرَامَةٌ مَشْجُمَةٌ . أَوْرَاقُهَا خَفِيفَةُ الْكَمَلِ ، خَلِيَّةُ الْبُشْرَةِ . أَنْزَعَارُهَا يَضَاهِي الْوَلَنَ ، سَبَلُهَا التَّجْمِيعُ ، غُرُوبِيَّةُ الشَّكْلِ . سَبَلُهَا تَطُولُ نَحْوَ ٨ سَم. ۥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

Aoûtment (F). Ripening (E). **حَبَسَة**  
غَايَةُ نَمُوِّ الْقَتْنِيَّةِ فِي الْكَرْمِ وَالْأَشْجَارِ .



مَهْنَةُ خَلِيَّة

١٩٢٩٩ - **عَوَّار ، وَاعِي الشَّعَاء**  
le Bouvier (F). Boctes, the Hardman (E).  
الْعَوَّارُ وَالْبَشَّارُ وَاعِي الشَّعَاء ثَلَاثَةُ أَسْمَاءٍ لَكَرْكِيَّةٍ شَبَالِيَّةٍ تَقَعُ بِالْقَرْبِ مِنَ الْقَنْطَرِ . مَرْكَزُهَا بَيْنَ الْعُلْوِ وَالْقَسْبَانِ . حُدُودُهَا اثْنَانِ وَخَمْسُونَ فِي الصُّورَةِ وَوَاحِدٌ عَاشِرٌ فِي وَجْهِ صَوْرَةِ رَجُلٍ يَدُهُ الْيَمْنَى مَعَا ۥ وَتَقْسِي الْعَرَبُ التَّجْمِيعَ الَّذِي عَلَى الرَّأْسِ الْفَنْطَرِيَّيْنِ . وَالَّذِي عَلَى الْمَتَكَيْنِ وَصَا الْقَصْبَاقِ . وَالَّذِي عَلَى يَدِهِ الْيَسْرَى وَعَلَى السَّاعِدِ مِنْ هَذِهِ الْيَدِ وَمَا حَوْلَ الْيَدِ مِنَ الْأَيْمَنِ وَوَلَدُ الْقَصْبَاقِ . وَهَكَذَا أَيْضًا الْإِزَارُ وَوَرَقُ الْإِزَارِ أَوْ الْمَلْزُورُ . وَالْخَارِجُ فِي الصُّورَةِ تَحْتِ أَحْمَرٍ نَوَّرٍ بَيْنَ قَلْبَيْهِ يَدَمِي وَالسَّكَّارُ الرَّابِعُ . وَالسَّكَّارُ يَحْسِي مَرْدُودًا حَاسِبًا السَّيَاءَ وَحَاسِبًا الشَّيْءَ لِأَنَّهُ يَرَى أَبَدًا فِي السَّيَاءِ لَا يَلْبِثُ تَحْتَ شُعَاعِ الشَّمْسِ ۥ وَالْعَوَّارُ أَيْضًا مَثَلُ مَنْ مَنَازِلُ الْقَمَرِ الشَّامِيَّةِ يَنْزِلُهَا الْقَمَرُ فِي الْيَلَةِ الثَّالِثَةِ حَشْرَةً . وَفِيهِ الْعَوَّارُ يَدَمِي فَرَحُ الْفَدْلِ الْمَلْزُورِ .

١٩٣٠٠ - **عَوَّار ، فَيْسَاح ، وَصَوْرَةُ**  
Jappement (F). **وَصَوْرَةُ**  
Yelping (E).  
صَوْتُ الْكَلْبِ وَالْقَلْبِ وَمَا أَشْبَهَ .

١٩٣٠١ - **عَوَّار** هِيَ الرُّوَاكُشُ أَسَدُ قَسَمِي الْعَالِي .  
١٩٣٠٢ - **هَوَاكُزُ تَنْسَلِيَّة**  
Conduits génitaux (F). **هَوَاكُزُ تَنْسَلِيَّة**  
Genital ducts (E). هِيَ الْمَسَالِكُ التَّنْسَلِيَّةُ فِي الْحَيَوَانِ .

١٩٣٠٣ - **عَوَّار ، مَعْلُوم**  
Avaries (F). **مَعْلُوم**  
Damage, Average (E).  
الْمَوَارِيثُ تَقْدِيرُهَا تَكُونُ عَاصِمَةً وَبَعِيَّةً وَمَشْرُوكَةً وَرَوَادُهَا مَعْلُومٌ بَعْضُ الْبَشَائِعِ إِثْنَانِ تَقْلِبُهَا بِحَرٍّ أَوْ بَرٍّ .

١٩٣٠٤ - **عَوَّار ، عَوَّارِي**  
الْبَوَارُ وَالْبَوَارِي : جَمْعُ فَيْسَاحٍ جَرُولُهَا قَتَشَاحٌ ثُمَّ تَيْسٌ ثُمَّ تَلْدِي ثُمَّ تَحْمَلُ فِي الْأَوْبَةِ إِلَى مَكَّةِ خُبْرَاقٍ وَجَنْدُهَا سَبَا غَالِقُ (الْهَادِي) .

١٩٣٠٥ - **عَوَّار** هِيَ سَمَاءَةُ الْعَرَبِ ، أَطْلُهَا .



مَهْنَةُ خَلِيَّة

سَمَطِيَّةٌ ، وَرُوسُهَا صَنِيعَةٌ ، خَاسِيَةُ الْوَلَسِ الْبَقِيَّةِ .  
أَوْرَاقُهَا تَقْسَمُ إِلَى الْإِلْوَانِ الْبَيْضِ ۥ أَشْهُرُ أَوْرَاقُهَا مَهْنَةُ الْهَيْطِ الْهَادِي الَّذِي يَبْلُغُ طَوْلُهَا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ مَهْنَةُ الْمَتَوَسِّطِ الَّذِي يَبْلُغُ طَوْلُهَا نَحْوَ ١٥٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٣ سَم. ثُمَّ الْقَبَسَةُ الْيَمْنَانِيَّةُ الَّتِي يَكْثُرُ جَمْعُهَا فِي الْبَحْرِ الْبَاسِطِ الْمَتَوَسِّطِ وَاقْتُلَا لَا يَتَجَلَّزُ طَوْلُهَا ٦٠ سَم. وَصَرَفُهَا ٢٥ سَم. ۥ

١٩٢٩٩ - **عَبَسِيَّة** \*  
Psyche (S).  
Psyché (F). Psycho (E).  
يَجْلِسُ حَيَوَانَاتُ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الرُّغُوبِيَّاتِ تَحْتِهَا الْإِبْرَصُ وَفَصِيلَةُ الْأَوْرِيْبِيَّاتِ . أَوْرَاقُهَا الْمَعْرُوفَةُ ثَلَاثَةُ أَطْلُهَا مَطْمُ الْمَنَاطِقِ الشَّامِيَّةِ مِنَ الْهَيْطِ الْإِطَالِي . أَسْرَابُهَا شَدِيدَةُ الْكَثَافَةِ وَافَرَةُ الْبَدَدِ ۥ أَصْدَاقُهَا خَشَّائِيَّةٌ ، شَقَاقِيَّةٌ ، جَرَابِيَّةُ الشَّكْلِ ، مَدْبِيَّةُ الْإِقْطَابِ ، مَقْصَاوِيَّةُ الْمَصَارِيحِ ، مَحْبَلَةُ التَّبْطِيطِ . أَجْسَامُهَا صَغِيرَةٌ ، تَنْبِيَّةُ الْوَلَنَ . زَمَانَتُهَا أَقْفِيَّةُ الْإِتْشَابِ ، مَهْدِيَّةُ رَاقِيَّةُ السُّطُوحِ الْمَسْطِيَّةِ ، مَقْطُوبَةُ الْأَطْرَافِ ، مَهْدِيَّةُ الْخِتَارِ .

١٩٢٩٠ - **عَبَسِيَّات** \*  
Eunicidae (S).  
Eunicidae (F). Eunicidae (E).  
فَصِيلَةُ دَوَابِّ بَحْرِيَّةٌ مِنَ الْخَلْقِيَّاتِ كَثَائِفَةٌ أَوْ الْجَوْلَاةِ . أَجْسَامُهَا وَأَوْرَاقُهَا الْمَعْرُوفَةُ كَثِيرَةٌ الْمَدَدُ مَشْتَرِكَةٌ فِي جَمِيعِ بَحَارِ الْعَالَمِ ۥ أَجْسَامُهَا حَلَقِيَّةٌ مَرْكَبَةٌ يَكْثُرُ فِيهَا التَّبْطِيطُ ، تَطُولُ مِنْ ٧ سَم. إِلَى ١٥٠ سَم. ۥ أَشْهُرُ أَجْسَامُهَا الْهَادِيَّةِ .

١٩٢٩١ - **عَبَسِيَّة** هِيَ الرُّجْبِيَّةُ ، أَطْلُهَا .  
١٩٢٩٢ - **عَبَسِيَّة** \*  
Uniola (S). Uniola (F).  
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْبِيَّةٍ ، بَرِيَّةٌ ، مَرْعَوِيَّةٌ ، حَوْلِيَّةٌ أَوْ مَعْرَمَةٌ مِنْ فَصِيلَةِ التَّجَلِّيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا الْمَعْرُوفَةُ سِتَّةٌ ، ثَلَاثَةٌ مِنْهَا أَسْيُوبِيَّةٌ مَتَبَيِّعَةٌ مِنْ إِبْرَاقِ إِلَى الْخُتْمِ فَالْصَنِينَ . وَثَلَاثَةٌ أَمْرِيْكِيَّةٌ مَتَبَيِّعَةٌ مِنْ الْأَرَبِيِّتَيْنِ إِلَى الْمَكْسِيكِ ۥ جَمِيعُهَا مَرْعَوِيَّةٌ شَكْلُهَا قَرِيبُ الشَّيْبِ بِالْمَكْرُوشِ .

١٩٢٩٣ - **هَيْدَان**  
Caution, Garantie (F).  
Security, Garantie (E).  
هُوَ الْكَفَالَةُ أَوْ الضَّمَانَةُ الَّتِي تَقْدَمُ تَنْقِيلاً لِّلْمَدَدِ .

١٩٢٩٤ - **مَهْنَةُ**  
Colonia (S). Cálisis (F).  
جَنْسُ نَبَاتَاتٍ مَشْبِيَّةٍ حَوْلِيَّةٌ تَرْبِيَّتِيَّةٌ مِنْ فَصِيلَةِ الْفَيْسَاحِيَّاتِ . أَنْوَاعُهَا قَلِيلَةٌ ، أَطْلُهَا الْبِلَادُ الْهَادِيَّةُ . أَوْرَاقُهَا مَسْقُودَةٌ مَتَابِقَةٌ ، أَنْزَعَارُهَا سَبَلِيَّةُ التَّجْمِيعِ ، لَبْدَةٌ ، مَرَامَةٌ ، لَا قِيَاسِيَّةَ الشَّكْلِ ۥ أَحْرَفُ أَنْوَاعُهَا وَاعِيَا مَالِي .

١٩٢٩٥ - **مَهْنَةُ جَوَاكُزُ ، مَهْنَةُ هَوَاكُزُ**  
Cálisis huttoni (S). Cálisis, de Java, C. de Hutton (F).  
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلَمُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَم. أَوْرَاقُهَا يَضَاهِي ذَلْفَةً ، نَصْلُهَا أَحْمَرُ الْوَلَنِ يَنْتَلِجُ مَرَاوِجَ لَزُوقٍ . سَبَلُهَا الْزَهْرِيَّةُ أَسْطَوْنِيَّةُ الشَّكْلِ لَبْدَةٌ . أَنْزَعَارُهَا حَرُّ الْقِتَاعَةِ ، يَبْشُرُ الْأَطْرَافَ ۥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

١٩٢٩٦ - **مَهْنَةُ خَبَسِيَّة** \*  
جَلْ **خَبَسِيَّة** \*  
Colonia cristata (S).  
Cálisis crête de coq, Crête de coq, Passe-va-lours (F). Cock's comb, Coxcomb, Woolflower (E).  
حَبَسَة سَبْرُوْتِيَّة تَعْلَمُ مِنْ ٣٠ إِلَى ٤٠ سَم. أَوْرَاقُهَا يَضَاهِي ذَلْفَةً ، نَصْلُهَا أَحْمَرُ الْوَلَنِ يَنْتَلِجُ مَرَاوِجَ لَزُوقٍ . سَبَلُهَا الْزَهْرِيَّةُ أَسْطَوْنِيَّةُ الشَّكْلِ لَبْدَةٌ . أَنْزَعَارُهَا حَرُّ الْقِتَاعَةِ ، يَبْشُرُ الْأَطْرَافَ ۥ أَنْزَعَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ حَزْرَيَّانَ إِلَى آبِ .

تميش حل الرمال فيها . قوتها الحويطات والخشرات والنباتات . تتميز بسرعة الانتقال والانتفاخ في الرمل || أشهر أجناسها الموير والجلبسيم .

#### ١٩٣٢١ - عَوَلَك السِنْدِيَان \* ، عَوَلَك شَرِيف \*

*Anthaxia nobilis* (S). *Anthaxie noble*, *Anthaxie des chènes* (F). *Anthaxia nobilis* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف جميع المواقع التي تكثر فيها الانجار . غناصها تميش حل يتنلات الازهار وعلى الاوراق الفتية . يرقاتها تسردب لحاء الافناد شكرها || جسمها صغير القليل من ٩ الى ١٥ مم . ثوبها الى الخضار الاسفع الجليل . الاثني اصفر قدأ من الذكر وتسمين باحمار الكوسل الذي تقطيه في وسطه من الرأس الى الجناحة جعدة شفرها عاقبة . رأسها مستدل الجرم يفرور بمطمة تحت الكوسل . عينها كبرتان . زباناها خيطيان . غدها قليتا التميز . ارساغها جاملتا القشار الصلب الذي لا يخرقه الدويوس . ارساغها خماسية المقل || جيلها الحولي واحد . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل نيسان وتبقى حتى اواسط تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || البرقة عند ادراكها التام تطول نحو ٢٥ مم . جسمها سكي التركيب ، مستطيل المقدم ، مستطيل المؤخر ، ثني الين ، كسني الرأس والشرج ، ضليح التأثير الفكي . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية منشعبة الى شطرين || طور الاكمال الذي ينتهي في آخر نلق تحفره البرقة ، يستمر نحو ١٥ يوما .

#### ١٩٣٢٢ - عَوَلَك لَمَاع \* ، عَوَلَك نِيدُلَا \* *Anthaxia nitidula* (S).

*Anthaxie luisante* (F). *Anthaxia nitidula* (E).

حشرة خاضعة غاشية من فصيلة التزنبقيات ورتبة سمندلات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . تألف الجناات والمخاات والبراري . غناصها تميش حل اوراق نباتات الفصيلة الوردية ، يرقاتها تسردب افناد واغصان الانجار الفصيلة ذاتها كانتفاح والاباص والمشمش والخوخ والزعرور والفوز والورد والشرين || جسمها صغير القليل من ٥ الى ٧ مم . ثوبها انضر الظفران ناري الكوسل والرأس ، اسمر البطن والجرايز والزياني . رأسها صغير الجرم يفرور بمطمة تحت الكوسل . عينها كبرتان . زباناها خيطيان || غلوانها ذلق المؤخر اللاحت المستدير الطرف غدها متشابها التميز . اللقيق . ارساغها خماسية المقل || الاثني اصفر قدأ من الذكر واجبت ثوبا متع وقصر زبانا || لها جيل واحد في الحيل . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل ايار وتبقى حتى اوائل تموز . تسرح في النهار وتبيت في الليل || تترك البرقة لكامل المجموعي في اواخر شهر كانون الاول . فيصبح طويلا عند ذاك نحو ١٢ مم . جسمها متناح الحيد . مستطيل المقدم ، كامن المؤخر المستطيل ، اخير الين ، احمر الرأس والشرج . وهي مرقالة تحمل عند مؤخر سكتها الحادية عشرة زائلة قرنية جزلة فاقرة الطرف || طور الاكمال يستمر نحو ١٥ يوما وينتهي فسن صليجة خاوية النشاء .

#### ١٩٣٢٣ - عُرُود أَحْمَر *Armérie* (F).

هو البيقان ، اعليه .

#### ١٩٣٠٦ - عَوَارِض جَوِّيَّة

*Perturbations atmosphériques* (S). *Atmospherical perturbations* (E).

اضطراب سير الحوادث الطبيعية الجوية بسبب بعض العوامل الطارئة الخلة .

#### ١٩٣٠٧ - عَوَالِيب

هي العنايات ، الحويطات التي تميش حل المشب .

#### ١٩٣٠٨ - عَوَاشِر

المواشر : قوام وريش الطائر وكذلك الاعشار .

#### ١٩٣٠٩ - عَوَامِة *Flotteur* (F). *Water-gauge* (E).

اسطوانة صغيرة من خشب السنديان توضع على المياه الجارية لقياس سرعتها نصيبها .

#### ١٩٣١٠ - عَوَامِل التَغَذِّيَّة

*Facteurs trophiques* (F). *Trophic factors* (E).

#### ١٩٣١١ - عَوَامِل تَنُوعِيَّة

*Facteurs ecologiques* (F). *Ecological factors* (E).

#### ١٩٣١٢ - عَوَامِل جَوِّيَّة ، عَوَامِل مَنَامِيَّة

*Facteurs climatiques* (F). *Climatic factors* (E).

#### ١٩٣١٣ - عَوَامِل مَاحِدَة

*Facteurs inhibiteurs* (F). *Inhibitory factors* (E).

#### ١٩٣١٤ - عَوَامِل مُحدِّدَة

*Facteurs limitateurs* (F). *Limiting factors* (E).

#### ١٩٣١٥ - عَوَالَة \* ، سَمْتَنُوس \*

*Sminthus* (S). *Sminthe* (F).

جنس حيوئات لبونة قافسة من فصيلة البريوميات . اولوه عديدة ، موطنها البلاد الاسوية والاروبية جميعها صغيرة . القند تطول من ٦ الى ٨ سم . واذاهاا كذلك . اوقاها الى الكمية تسمر وتبقى مع اقترابها على ثيج الظفر وتصر وتبيض عند البطن . اذاهاا حشرقية اطوالها تمد من ١٤٥ الى ١٧٥ . قوتها الاحشاب والجذور .

#### ١٩٣١٦ - عَوَالِدَة

*Sous-produits* (F).

*By-products* (E).

هي المواد الثانوية الممكن استعمالها او استخلاصها بعد تصنيع المواد الرئيسية . مفرها عاقلة .

#### ١٩٣١٧ - عَوَالِد

العوائل اربعة كواكب في وسطها كوكب يدعى الريح . والعوائل تنتمي الى كوكبة الثنين .

#### ١٩٣١٨ - عَوِيَّة

*Irvingie* (F).

هي الافرنجية ، شجرة من السروبيات ، اعليها .

#### ١٩٣١٩ - عَوِيَّر

*Léopardau* (E).

*Young leopard* (E).

جرو اللهد لا يزال برقة امه .

#### ١٩٣٢٠ - عَوِيَّرِيَّات

*Ocypodidae* (S).

*Ocypodidés* (F). *Ocypodidae* (E).

فصيلة دويبات بحرية من القشريات حشاريات الاربل ، قصيرات الليل ، لامسوايات للالاق || اجناسها وانواعها الحرة متوسطة البد . اصحابها ضبوط بحار البلاد الحارة .



عَوَانَة



عَوَلَك السِنْدِيَان



عَوَلَك لَمَاع

Wurz (D). Acoro, A. vero, Canna odorifera, Calam aromatico (I).

نبات عشبي جنموري معمر من فصيلة القنطاريات. جذاميره مدادة. ذكية الرائحة تستعمل في الطب وتدخل في تحضير بعض الطيوب. أوراقها صفية الشكل جامدة. النصل متعصبة. شراخيه ينشئ بصفة من الإزهار الخشوية. وهو من نباتات السطور القديمة التي ورد ذكرها في التوراة. يستعمل في معالجة الرمد والقرات العصرية. ويقال إن جلوره مقوية للأعصاب.

١٩٣٥ - عَوْدَلْ ، مُبَالِ

Métamère (F).

Metamere, Somite (E).

نمت تعريفي يطلق على بعض أعضاء الجسم المتساوية المتتابعة كما هي الحال في سحج المفصليات.

١٩٣٦ - عَوْدَكَة ، مُبَالِكَة

Métamérie (F).

Metamery (E).

صفة الأعضاء أو الأجزاء المتعددة.

١٩٣٧ - عَوْرَوْرْ هو إلقاء البري ، أظله .

١٩٣٨ - عَوْرْ

Carance (F). Deficiency (E).

شاقة أو عارض سبب نقص في تمثيل عنصر غذائي تقتصر إليه التربة أو يفترق إليه مظهر الحيوان.

١٩٣٩ - عَوْصَجْ ، عَلِيقْ ، بَاقْشْ ، شَوَكْل

Rubus (S). Ronce (F). Bramble (E).

جس نباتات دظلية برية وزراعية من سبط الوردليات وفصيلة الورديات. أولوه زهاء ٣٠٠ مشتركة في جميع أصقاع العالم. مظهرها بري وبهشاش زرامي. ثمارها شامبل مأكولة تسمى «المقنع» وله تربوب أو يستخرج منها بهن التعصير وتقطير تقاديد كحولية لليلة العلم. لشهر أولوه ما يتبع.

١٩٤٠ - عَوْصَجْ أَخَرُ الْمَتَبْ

Rubus phanicolatus (S). Ronce à poils rouges (F).

نبات دخل معمر ازنب الماء. أسجن الشوك. ساهه فرماه تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقه ثلاثية التخصيص، بصفة الشكل، خلية البشرة || أنفراره متعدي التجميع، ليد الإزهار الوردية اللون. ثماره ليلية العلم والمعرف بتقالية اللون.

١٩٤١ - عَوْصَجْ أَسْوَدْ

Bourgane (F).

هو لائق الأسود ، أظله .

١٩٤٢ - عَوْصَجْ أَصْفَرْ

Rubus xanthocarpus (S).

Ronce jaune (F).

نبات دخل سبروتي معمر أسجن الشوك. ساهه فرماه مدادة. أوراقه مركبة ثلاثية الورديات للسنة الحارة. أزهاره نورية التجميع ، بيهش اللون. ثماره سكرية العلم عادمة العرف ، صفراء اللون.

١٩٤٣ - عَوْصَجْ الشَّكَلْ

Rubus occidentalis (S).

Ronce d'Occident (F).

نبات دخل معمر أسجن الشوك. ساهه فرماه متعصبة السروع تملو نحو ٣٠٠ سم. أوراقه مركبة ثلاثية أو خمسية الورديات. نصلها منس الحافة ، أخضر الصفعة العليا ، أصلها السفلي الخلفية البشرة || أنفراره نوري التجميع . أزهاره متعصبة الأمن ، بيهش اللون. ثماره ال السوداء اللامع .



عود الأنبياء



عود الحية



عود الرج

١٩٣٤ - عَوْدُ الْأَنْبِيَاء \* ، هَبَالَكْ مَحْتَرَفِي

Guslacum officinale (S). Galac officinal, Bois de galac (F). Official guslacum gum tree, Lignum-vitse (E). Guajakbaum, Pockholzbaum (D). Guslaco officinale, Galsomino, Legno santo (I).

نوع من التانيك وهو شجرة متعصبة اللد من فصيلة القنطاريات. أصلها البلاد الأمريكية. أوراقها مركبة متقابلة. وريقاتها أبيضه ، شفعية ، بصفة النصل الجامدة الصفعة، المايك الخشاش . أزهارها أبيلية الإرتكاز ، نورية التجميع ، زرقاء اللون . ثمارها جلدية اللب . بزورها صفراء اللون ، دهنية اللباب || خشبها نام الزرقعة ، شديد الصلابة ، قليل الوزن ، فاعس الصنف وله يستخرج منه بالتقطير مادة راتنجية ، ورائحتها رائحة اللوز المر ، تستعمل في عدة مستحضرات طبية أعصها علاجات السفلس .

١٩٣٥ - عَوْدُ الْبَرَقْ هو التقطيل ، أظله .

١٩٣٦ - هَوْدُ الْحِجْهْ \*

Ophioxylon serpentium (S). Ophioxyle, Ophioxylon, Serpentina (F). Serpentina, Serpent wood (E). Mardervurzel, Schlangenholz (D). Serpentina, Legno serpentino (I).

جنية برية من فصيلة الفطريات ينبتها الهند . ساهها فرماه. أوراقها أبيضه ، متقابلة ، اهليلجية النصل ، معققة . أزهارها نورية التجميع ، تاجية الإرتكاز || يستخرج من حيداتها ويجلوها عصارة مضادة لم ألهات ويصالح التئال .

١٩٣٧ - عَوْدُ الْفَيْفِرْ

هو الزايرن اللبناني وهو يشبه اللبيق . أظله .

١٩٣٨ - عَوْدُ الرِيحْ هو البرباريس ، أظله .

١٩٣٩ - عَوْدُ الصَلْبِيبْ هو الفلوانيا ، أظله .

١٩٣٠ - عَوْدُ الطَّيْبْ هو الأندروج ، أظله .

١٩٣١ - عَوْدُ الْقَرَحْ

Anascyle pyrethra (F).

هو الماتر قرحا ، أظله .

١٩٣٢ - عَوْدُ الْمَاءْ هو صفصان الماء ، أظله .

١٩٣٣ - عَوْدُ التَّهْ ، عَوْدُ هِنْدِي ، أَغْلَاغُونْ

Excoecaria agallocha (S). Agalloche, Arbre aveuglant, Bois d'Alots, Bois de Calambac (F). Agallochum, Indian aloe tree, Calambac tree (E). Agallocha, Alderholzbaum (D). Agallocha, Calambucco, Falambo (I).

شجرة برية صابرة اللد من السوسيات تكثر في الحد الشرقية وسرنديب . تنبت عند مصب الأنهر وفي الإخوار التي تنمها المياه الحارة والبحرية . عصارتها حارة كارية نقطة منها تبيض اللبن وتطهها . خشبها راتنجي المادة مرغوب فيه . يستخرج منه أدهان عطرية كدغل في صناعة الطيوب وأخرى طبية تدغل في عدة مستحضرات وعلاجات. اشتعال خشبها ويعدانها عطري لية ، فواح الرائحة الذكية الانعسادة .

١٩٣٤ - عَوْدُ الْوَجْ \* ، عَرَقْ أَكْوَرْ ، وَجْ ،

قَعْبُ الذَّرِيَّةِ ، لِيَكْر

Acorus calamus, A. aromaticus (S). Acoro, A. vraí, Calamus, Roseau odorant (F). Sweet-flag, Sweet-sedge, Myrtle sedge (E). Echter-Kalamus, Acorus-

أزهاره يضاء اللون ، ثنائية التجميع أو فردية ، عوربة  
الارتكاز ، مستطيلة الاذن ، ثماره الى السواد البنيغسي .  
يزرع من اجل ثمره المستحب العلم الشائع الاستعمال .

Rubicole (F).

١٩٣٥٣ - عَوَسَجِي

تمت تعريفه يطلق على كل حشرة تعيش على العوسج .

Crécérille commune (F).

١٩٣٥٤ - عَوَسَق

هو الماسوق ، اطلبه .

Perotis chlorana (S). \* عَوَسَقِدْ أَصْفَر

Perotis jaune (F). Perotis chlorana (E).

حشرة خاضعة خاشية من فصيلة الزنتقيات . اطلابها  
معلم اصقاع الشرق الاوسط واروبة الجنوبية والغربية  
والغربية الشمالية . تألف البرادري والخرار والمواقع التي يكثر  
فيها الفلز والخرور . خنافسها تعيش على ما تنقصه من  
نصال الازراق . يرقاتها تعيش تحت القلف والعماء دون  
ان تتصل على الشكر ويهي ترطب في الفلز والخرور  
والخوخ || جسمها متوسط القد ، احليجي الشكل ، يطول  
من ١٥ الى ٢٠ سم . ثوبها الى الصفراء الخشن المراج .  
واسها صغير الحجم ، يفرج بطنه تحت الكبريل . زباناها  
عظيما ، منشورا الشكل . كسلها منحوبة الصلصة .  
الاقصى اكبر قدما من الاكبر والقصير زباناها وكذا ثوبا ||  
لا جيل واحد في الجيل . تظهر الحشرة الجملانة في ايار  
وتعيش حتى اوائل تموز . تساقط بعد ظهورها باسبوع .  
تسرح في النهار وتبيت في الليل || اليرقة تنسجور بطنها  
ويصلح طولها عند الادراك الثمار نحو ٢٤ سم . وهي مرقاة ،  
جسمها سمي الكريب ، مستطيل القدم ، كامن الخصر ،  
سحلي اللون ، اسمر الرأس والخرج . وين ميزانها انها  
تصل عند مؤخر سكتها الحادية عشر زائدة قرنية شبيهة  
بالملحة لتتصير بثلث اصابع || تتصلق اليرقة في طور  
الاكامل عند منتصف نيسان وتظهر الحشرة الجملانة في  
اوائل ايار .

١٩٣٥٦ - عَوَسَقِب ٥ ، تَبَكْج

جنس تطور مجهرية من السحليات وفصيلة المشويات .  
اصحابها مستديرة متخلفة السام الحماطة باطوار من الحلب  
الاسمر اللون . تكاثرت ضصوصة بتكاثر غيلية . وبها  
اصفر اللون شفي التركيب لتصلح وبيرة متمزعة || انواعها  
عديدة اشهرها ما يتبع .

١٩٣٥٧ - عَوَسَقِب الإِجَاص ٥ ، تَبَكْج الإِجَاص

Venturia pirina, Fuscladium pirinum, F. virescens,  
Megadadosporium pirinum, Cladosporium pyrom,  
C. dentriticum (S). Tavelure du poirier (F).  
Pear scab (E). Birnenschorf (D).

فطر مجهري شديد الاذى يصيب الاجاص في اوراقه  
وفناده وثماره || مظهره الخارجي يختلف باختلاف الجو  
للنضار . وهو في اليرقة يقع بمر لا قرابية الشكل والحجم  
تركب النصل على صفحته السفلى والعليا || وهو في  
الانثان والافناده والافناده يقع قرسية لا قرسية الشكل  
تتبلق البشرة والخررة والشكر || اما في الثمار فهو يقع  
تخلفة الاشكال لونها الى البصرة تركب البشرة تنسجور  
الى سفن لب صلب يتبع بيرة ويمتلئ البصرة فهيب  
تشققها || اثماره جسيمة لانه يطبق هيكل الشجرة  
بعد ان يسبب يباس الانثان والافناده ويعد ان يقتضي على

Framboisier (F).

١٩٣٤٤ - عَوَسَجَ إِيدَه

هو القرايبوز ، اطلبه .

١٩٣٤٥ - عَوَسَجَ لُحَاصِي الْوَرَق

Rubus malifolius (S). Ronce à feuilles de pommier (F).  
نبات دخل مصر شاك . ساقه فروعاً فله مستطيلة السروع ،  
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه بسيطة تقاسية الشكل  
تطو من ٦ الى ١٠ وقرص من ٢ الى ٤ || اثماره  
عقودي التجميع ، صغير القد ، عاسي الازهار البيض  
القصرية الاذن . ثماره الى الحرة البنيغسية .

Framboisier (F).

١٩٣٤٦ - عَوَسَجَ جَوِي

هو القرايبوز ، اطلبه .

Rubus spectabilis (S).

١٩٣٤٧ - عَوَسَجَ رَشِيْقِي

Ronce élégante (F).  
نبات دخل مصر شاك . ساقه متراكبة الفروع والانثان  
تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقه مركبة ثلاثية .  
وردياته سنائية مدنية ، نصلها خلي البشرة ، يسارز  
السروق || اثماره ثنائية التجميع أو فردية ، كبيرة  
القد ، جميلة الحرة الزاجية . ثماره صفر أو حر .

١٩٣٤٨ - عَوَسَجَ زَهْرَوِي الْوَرَق

Rubus crataegifolius (S). Ronce à feuilles d'ubépine (F).

نبات دخل مصر شاك . ساقه فروعاً فله تملو نحو ١٠٠  
سم . اوراقه زهرورية الشكل ، ثلاثية أو خاشية التجميع  
الاسماري || اثماره عقودي التجميع كثير الازهار  
الوردية المنسجة . ثماره برتقالية اللون مستحبة العلم .

١٩٣٤٩ - عَوَسَجَ شَاكِي

Rubus fruticosus (S). Ronce commune, R. sauvage,  
R. frutescent (F). Common bramble, Black-berry  
(E). Brombeerstrauch (D). Rovo, Rovo, Roveto (I).  
نبات دخل مصر شاك معمر مهبل يكثر في الاماكن الرطبة .  
ساقه فروعاً متدلية . اوراقه مركبة . صاليهه القنية  
الثانية طيبة قابضة . ثماره غولية مأكولة مستحبة العلم .

١٩٣٥٠ - عَوَسَجَ عَطِير

Rubus odoratus (S).  
Ronce odorante (F).  
نبات دخل عام الفلك مصر . ساقه فروعاً متعصبة تملو  
من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو خاشية النصوص  
نصلها يقرص من ١٠ الى ٣٠ سم . وهو خلي البشرة على  
صفحته || اثماره عقودي التجميع . عاتليه مستطيلة ،  
متشعبة ، كثير الثمر . اثماره كبيرة القند طرية البرف ،  
حرار اللون . ثماره سائرة العلم شديدة الحرة .

١٩٣٥١ - عَوَسَجَ لَدِيدِ الشَمَلِ

Rubus deliciosus (S). Ronce à mûres délicieuses (F).  
نبات دخل عام الفلك مصر . ساقه فروعاً  
متعصبة تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اوراقه ثلاثية أو  
خاشية النصوص . نصلها يقرص من ٦ الى ٧ سم . وهو  
خلي البشرة على صفحته . اثماره كبيرة القند ، يضاء  
اللون ، فردية التجميع ، مستطيلة الاذن الحرة . ثماره  
شولية بنسجية اللون لذينة العلم والبرف .

١٩٣٥٢ - عَوَسَجَ مَدَاك

Rubus procumbens (S).  
Ronce rampante (F).

نبات دخل سروي مصر . ساقه فروعاً ملففة . اوراقه  
ثلاثية أو خاشية التفريص ، غصراه البشرة الملامدة الحبل .



عوسج شاك



عوسج اسفر



عوسج الاجاص



التآثر || يكالغ باستعمال احد الادوية الفطورية واعضبا سائل بريدو على الوجه التالي : - ١) قبل الايلال بمعدل يراوح بين ١ و ٢ ٪ - ٢) بعد سقوط التوجعات الزهرية بالمسرع بمعدل ٠,٨ ٪ - ٣) بعد المكافئة السابقة بثلاثة اسابيع يضاف اليه ١ ٪ من الزرنيخات.

### ١٩٣٥٨ - عُوطِبُ النَّقَاح \*، تَبَعُ النَّقَاح

Venturia inaequalis, Venturia chlorospora, Venturia dendriticum, Napsicadum soraneri (S). Tavelure du pommier (F). Apple scab (E). Apfelschorf (D).

فطر مجهرى واسع الانتشار شديد الاذى يصيب التفاح في جميع اقسام الحواريات || مظهره الخاضع يخلط بالفسحة الى الغمر المتناثر، فهو على الورقة يقع سمر لا قلبية تركب شملغ التصل بمرققة في الصفة العليا || وهو في الاصلان والانتاد يقع قرصية لا قلبية الشكل تلمب القشرة والشكر اما في التآثر فهو يقع بقع مستديرة يملوها سفن ليه تراس مشقق صلب للمادة اضر الكون || اضران حسية لانه يطب هيكل الشجرة بهد ان يقتضي على ثامبا . يكالغ باستعمال احدى الادوية الفطورية القليلة المتصر التناسي .

### ١٩٣٥٩ - عُوطِبُ الْحَمْرُ \*، تَبَعُ الْحَمْرُ

Venturia populina, V. tremulae, Didymosphaeria populina, Pollich elegans, Napsicadum tremulae, Fusicadum radium, Stigmia radiosa (S). Tavelure du peuplier (F). Poplar scab (E).

فطر مجهرى يصيب الحمود فيفيذه. مظهره الخاضع يقع مفرقة الزوايا تركب الاوراق واللوي فيفيذ يسج التصل وتقدير الاوراق الى الاصيل الباكر ثم تلمب التواي قصبها وقد تسبب ياسها || يكالغ بقلع التواي الملويرة وسرقها مع الاوراق المسالطة .

### ١٩٣٦٠ - عُوطِبُ الدُّوسَر \*، تَبَعُ الدُّوسَر

Venturia graminicola (S). Tavelure du fromental (F). False oat scab (E).

فطر مجهرى تركب الدوسر فيفيذه . مظهره الخاضع يقع مستطيلة تركب الشرائف وقد تندهد الى السنايل وذلك في ظروف خاصة ووسائل جوية معينة || اضراره زهيدة ان انحصرت الاصابة بالشراف وحسبه اذا زلت بالسنايل . مكابته جيدة لكنها مكلفة . لذلك يحدد الاقلع من زرع الدوسر في تربة يكثر فيها العوطب .

### ١٩٣٦١ - عُوطِبُ الزُّعُرُور \*، تَبَعُ الزُّعُرُور

Venturia crataegi, V. chlorospora, Megaladosporium crataegi, Fusicadum crataegi (S). Tavelure du faubépin (F). Hawthorn scab (E).

فطر مجهرى يطب التآثر ويؤدي الاوراق || مظهره الخاضع يقع لا قلبية الشكل والمجم تلمب التآثر تلمبها وتركب نصل الاوراق على صفتها السفلى فتقذبا. اضراره محصورة على انتشاره على التآثر || يكالغ باستعمال احدى الادوية الفطورية .

### ١٩٣٦٢ - عُوطِبُ الصَّرْبَةِ \*، عُوطِبُ الصَّرْبَةِ

Venturia inaequalis cinerascens, V. aucupariae, Fusicadum orbiculatum (S). Tavelure du Sorbier (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار قليل الاذى يقدم من زين

الاصبال ولكنه لا يؤثر في ادراك الثمر || مظهره الخاضع يقع تظهر في الربيع على صفة التصل العليا عند انتكاب البروق ثم تمتد وتنتسج الى ان يستقر لها على السرة ويليه يياس السيج || اضراره عمودة الملوقة بسية لا تستجب للعناية .

### ١٩٣٦٣ - عُوطِبُ الصَّفَصَا \*، تَبَعُ الصَّفَصَا

Venturia chlorospora, Fusicadum salicarpium, Septogium salicarpium (S). Tavelure du saule (F). Willow scab (E).

فطر مجهرى يركب جميع انواع الصففاف فيفيذ الاوراق ويصطب الاقان || مظهره الخاضع يكون على شكلين : اما يقع صغيرة لها على السرة تركب نصل الاوراق الفتية على صفتها السفلى في اوائل الربيع ثم تمتد الى الاقان تلمبها وتصبب يياس نولها . ولما يقع سمر التآثر زام التصل الاخضر على صفتيه وجانبه الصلع ثم تنتشر على الصفة || يكالغ بقطع الاقان الملويرة وسرقها مع الاوراق .

### ١٩٣٦٤ - عُوطِبُ الْكَرْزِ \*، تَبَعُ الْكَرْزِ

Venturia cerasi, Asceroma cerasi, Fusicadum cerasi, Megaladosporium cerasi, Cladosporium cerasi, Acrosporium cerasi (S). Tavelure du cerisier (F). Cherry scab (E).

فطر مجهرى يصيب التآثر تلمبها ويصطب الاقان والاوراق فيفيذها || مظهره الخاضع يكون في التآثر قروح مبيضة نظرا من ١ الى ٢ سم . تلمب الى يقع سمر مهدبة الاوراق تتسع من كبر حجم الثمرة || وفي الاقان قروح صغيرة مرسوفة بدون انتظام تلمبها بسرة الى يقع طبل مرامسة قرصية || اما في الاوراق فانه يقع مهدبة تركب نصل الصفة السفلى || اضراره محصورة على انتشاره على التآثر || يكالغ كثير من العوطب .

### ١٩٣٦٥ - عُوطِبُ الْكُرْزِ \*، تَبَعُ الْكُرْزِ

Venturia fraxini, Fusicadum fraxini (S). Tavelure du frêne (F). Ash scab (E).

فطر مجهرى قليل الاذى يركب الاوراق فيصيب سقوها . مظهره الخاضع يقع صغيرة تلمب على الاوراق مفرقة الزوايا طلاء الكون ثم تتسع وتنتشر ويستقر لها على السرة قتبب جفاف السيج ويليه || اضراره عمودة لا تستلزم المكافئة .

### ١٩٣٦٦ - عُوطِبُ، عَيْقَلَة . Osmanthus (S).

Osmanthus (F). Devil wood (E). Amerikanischer Ölbaum (D). Osment (I).

جنس عجيرات ونباتات برية وزراعية من فصيلة القرطيات. انواعه المروية ٨ منها الشرق . اوراقها ابيدة ، متقنة ، متقابلة ، زيقوية الشكل او قيقية . نصلها جلدي الصفة جبل الخضار . ازهارها غبي التجميع ، عمودي الارتكاز . ازهارها رباعية القرطب ، ثنائية الالوان ، صغيرة القد ، يضاء اللون ، ذكية اللون المستحب . تستعمل في تلمير الشاي || اشهر انواعه الزراعية الصناعية ما يلي .

### ١٩٣٦٧ - عُوطِبُ أُسُود Osmanthus Delavayi (S).

Osmanthus du Père Delavay (F).

جنية سبريتية ذلة تلمن من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروها ورائحتها مراكية . اوراقها يضيئة الشكل تلمن نحو ٢ سم . نصلها جامد الصفة ، منشاري الحافة . زهرها مستطيلة الانبوب قصيرة الفلقة . ثمرتها زرقاء الكون ، سمر الملعج . ازهاره يستمر طوال شهر نيسان .



عوطب النقا



عوطب الحور



عوطب الزمرور



عوطب الكرز



عوطب الكرز على الثمرة

## ١٩٣٧٦ - عولط - Fuirens (S), Fuirène (F).

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة السديديات . انواعها المعروفة نحو ٤٢ مظهرها في نباتات البلاد الحساسة والامتدادية || يوجد فيها في لبنان العولب الازرق (Fuirens pubescent) منته بهش اشقة الصوب حيث لا تتطعم البروية . قصبة ساقه مستطيلة ، بسيطة ، عادية المقد ، زهاء البشرة .

## ١٩٣٧٧ - عولط الادغال -

Boarmia cinctaria (S).  
Boarmie bandée (F). Boarmia cinctaria (E).

حشرة من فصيلة الازديات حرشفيات الاجنحة . موطنها الاسواق الممتدة الحرارة من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق النباتات البقلة || جسمها متوسط القد بطول نحو ١٢ مم . بسيطها نحو ٢٨ مم . رأسها اقشع اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان مزدويان عند الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها وبقها الى الشبهة || روشانها الاماميان الى الشبهة السوداء المزاج يتوسطها بقعة بيضاء وتعلوها سريجة وزوطة كستنية . روشانها الخلفيان الى الشبهة الخطية تعلوها زركشة كستنية وتضيق اسم || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الفراشة في ايار وتبقى حتى تموز . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٢٦ مم . جسمها شبه اسطواني للشكل ، مالمس القشار . قويا الى الخضار البشري بطول خمسة خطوط قاطبة كستنية || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

## ١٩٣٧٨ - عولط الموسج -

Boarmia repandata (S).  
Boarmie recroussée (F). Boarmia repandata (E).

حشرة من الازديات حرشفيات الاجنحة . موطنها المناطق الممتدة الحرارة من سويس البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قويا رقيق الازهار . سرقتها تعيش على اوراق الموسج والبرسيم || جسمها متوسط القد ، اهيف ، بطول نحو ١٩ مم . بسيطها نحو ٤٨ مم . رأسها احمر اللون . عيناها كيرتان . زباناها شطيان عند الذكر ، عيناها عند الانثى . جوشها وبقها الى الخططة السوداء المزاج || روشانها ، عند الشقين ، الى الخططة الخطية يطولها في الزوج الامامي تضيق اسم ويتسلطو سريجة كستنية . ويعلوها في الزوج الخلفي تضيق اسم اريد وزوطة متدانية سمراء || لها جيل واحد في الحبل . تظهر الفراشة في حزيران وتبقى حتى آب . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتفتح المكن ميساجيا على الصفحات السفلى من نصال الازراق || السرعة تطول نحو ٣٨ مم . جسمها اسطواني للشكل ، مالمس القشار قويا بماتن البيئة التي تعيش فيها لذلك فهو يراوح بين الاخضر اللامع والاصفر الجوي المزاج تعلو ثلاثة خطوط قاطبة بيضاء شديدة السمر . رأسها جزوي اللون . رواجيا البنية الوسطى ماصة مما يجد بها الى التقير والشب عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في التربة ضمن جراب من الطين والبراز والريال .

## ١٩٣٧٨ - عولط بنهشي -

Osmanthus aquifolium (S). Osmante à feuilles de houx (F).  
شجرة سبروتية دقلة تعلو من ٣ الى ٦ امتار . فروجها وانفاتها متراكبة . اوراقها بيضية الشكل تطول نحو ٥ سم . نصلها جامد الصلصة يصل في كل شطر من شطريه ثلاثة اسنان او اربعة . جميعها غليظة للقاعدة مدبة الطرف . ازهارها خافتة العرف || ازهاره يستمر من حزيران الى تموز .



عوف بنهشي

## ١٩٣٧٩ - عولط عطر - Osmanthus fragrans (S).

Osmante odorant (F).  
شجيرة بحداسة تعلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . فروجها وانفاتها منسجمة الارتركار ، متدلة الكثافة . اوراقها زيتونية الشكل تطول من ١٢ الى ١٧ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ ، نصلها جامد الصلصة ، لاح البشرة ، حسن الحافة . زهرها قصيرة الازريب ، كثيرة الفلقة ، فواصة العرف المستحب الاخلاص || ازهاره يستمر من ايار الى تموز .



عولط

## ١٩٣٨٠ - عولط مستح - Osmanthus armatus (S).

Osmante armé (F).  
شجيرة سبروتية دقلة تعلو من ٣ الى ٥ امتار . اوراقها سنانية ذرية تطول نحو ١٢ سم . نصلها جامد الصلصة ، حسن الحافة ، شالك الاسنان والقصبة . ازهارها حرة مستطيلة المالبق ، متدلة || ازهاره يستمر من ايلول الى تشرين الاول .



عوكمة

## ١٩٣٧١ - عولط - Theropithèque géloée (F).

فرد من فصيلة الحبرسيات مشهور باسم جلادة . اطلية .

## ١٩٣٧٢ - عولط - Wahwitschie

جنس نباتات مسرة عارضة من فصيلة اللبديات . انواعها المعروفة ثلاثة اصلاتها البلاد الاستوائية . سرقها وفروجها عقداء . اوراقها متطابقة ، قديّة ، مستطيلة ، جامدة اتصل المالمس البشرة . ازهارها رسيمة المسكن . ثمارها حنينة . بزورها مأكلية . صدارة سورها لينة مرطبة . لحاء فروجها صناعية لتسجية .

## ١٩٣٧٣ - عولط - Microclima (F).

هو المناخ الموسمي وقد يختلف من المناخ القلبي . ويستر الموكل من البومل الرقسية في التوجيه الزراعي اثنائي وفي مكافئة الحشرات .



عولط الادغال

## ١٩٣٧٤ - عوكمة - Ctena (S).

Céna (F). Ctena (E).  
جنس عناكب صغيرة من فصيلة الدكيديات . انواعها المعروفة نحو ١٥ . اصلاتها البلاد الحارة والممتدة الحرارة . تعيش في الاودية والهايزن || اجسملها صغيرة القد . بطولها ثلثية الشكل . رؤوسها تركب صدورها وتقلدها قليلا . جرابها مستطيلة ، تحيلة الاطراف . اثوابا الى الصدرة المقلبة بالاحمر والاصفر . رؤوسها قوامية الاطواق السرد .



عولط الموسج

## ١٩٣٧٥ - عولط - Entrecien (F).

Entrecien (F). Keeping, Preservation (E).

القيام بالمحافظة على سلامة الشيء .

ظواهرها اصفر تملو رقعة كستية وتمشع بني. وشناها غشائيان. الصفة العليا من بطنها صفراء توسيطها بقعة سوداء. الصفة السفلى مرارة || تمشع في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٦ - *Serpent court* (F). *Short snake* (E). **عويج**. الحية القصيرة الخليفة

١٩٣٨٧ - *Synergie* (F). *Synergie* (E). **عومرة**. تاملون عدة اعضاء لقيام بوظيفة.



عولة خسير

١٩٣٨٨ - **عويجات**. *Notonectidae* (S). *Notonectidae* (F). *Notonectidae*, *Back swimmers* (E). *Rückenschwimmer* (D).

فصيلة حشرات مائية من رتبة غنظيات الاجنحة ولبقة تصفيات الجناح. اجناسها والوانها عديدة منتشرة في معظم اقطار العالم || اجسامها متوسطة القد او كبيرة ، قلب فيها الاستطالة. رؤوسها مستعرضة. اعطاشها صغيرة. عيونها كبيرة جاحقة. فرونها الامتصاصية صغيرة ، رباعية الفصل. كواسلها شبه متساوية الطول ولعروض. حناجرها مزوانية ، لاقامية الجسم. ظواهرها كالم الحبيسة الففروية. وراشها ، عند وجوها ، شفافة ، كبيرة. معدة السباحة باكتاف تقمية الاوتكار ، مهيبة. قوائمها المائية الزاكية. جميعها ترمح على ظهورها. قوتها كل ما تستطيع قصه من حشرات وسرديات وطوام.

١٩٣٨٩ - **عويج**. القلبية لتامة الخلق التي في حقورها غشيان سوداوان.



عوش

١٩٣٩٠ - **عويق**. *Scopus umbretta* (S). *Ombretta* (F). *Umbrette*, *Hammer-head* (E).

طائر من فصيلة القليقيات وحيد الجنس والنوع. اطلانه الاولاد الارافية || جسمه متوسط القد يطول نحو ٥٠ سم. رأسه كبير الجرم. متوج القفا بكفة صغيرة. متفاده غرزي الشكل ، غليظ القفص ، منتفج المقلط العلوي || يتميز بقصر عنقه الذي يبعده من سائر اجناس فصيلة || تويه الى السمره النابضة الجذوية المراج. بطنه اقل سمره من ظهره. مناكب جناحيه والحوالي والاباهر والكل شديدة السمره الجذوية السفاه. ذنبه قصير القد ، مستعرض الشكل. حذقة منه غرزية اللون. متفاده اسود. رجلاه الى السمره النابضة || يألف النياض ويجاري الماء والمتابع. قوته الامساك والحيات والورغ والسماء والبقادع وقرونويات والديدان || مسرعه من القجر الى الشروق ومن العصر الى الغسق || يدن عنقه في السط. اثناء تقص اربع فيضات تحضنها بمنارة الاكر نحو ثلاثة اسابيع ، تقف الجلابيط عادمة الزغب وتبقى في العش بعده ابوها الى ان تكشي اي بحر خسة اسابيع.



عويسق

١٩٣٩١ - **عويقان**. النوبقان كوكبان الى جنب الفرديق على نسق طريقهما لما يلي القطب.

١٩٣٩٢ - **عويق**. *Tinnunculus cenchris* (S). *Crécairelle crécorine*, *Crécairelle*, *Créserine* (F). *Lesser kestrel* (E). طائر من العسقيات وهو نوع من الماوسق صغير القد

١٩٣٩٩ - **عويق**. *Diphyllia* (S). *Diphyllia* (F). جنس غنفاش من فصيلة الفوقيات. وحيد النوع. موطنه البرازيل. جسمه صغير القد ، أبيض. طوله نحو ٧٠ سم. بسطه ٣٠٠ سم. فوطسته اسفينة قصيرة. ثنائيا ثنائية مدبية حادة. تويه الى الصبغة الصفانية يطلو مراح اسفر. يعيش بجاهات قليلة العدد. قوته البند يمتصه ايها اسطاح. يألف الاجمار الحربية اللغة والقدور والكهوف.

١٩٣٨٠ - **عولكة خمير**. *Oourouparia Gambir* (S). *Oourouparia Gambir* (F).

خميرة حربية من فصيلة الفوقيات. منتجا يتد من الهند الى ماليزيا || ساقلها منتصبة فراع تملو نحو اربعة اشر. اوراقلها متقبلة ، معتقة. فصالحا اعطاشية الشكل ، مدببة الاطراف ، ناشرة الفضلوع والعروق. انفرادها رؤسي التبعج ، ابلي الاوتكار. انفرادها صغيرة مستطيلة الكتلوس ، خالصة البليات الصفراء ، غائقة العرف المانوس || يستخرج من مرقها بالخر صارة رائحية قابضة تستعمل استعمال الكافور.

١٩٣٨١ - **عولقيات**. *Vampyrellae* (S). *Vampyrellae* (F). *Vampyrellae* (E).

فصيلة تطور مجهرية من رتبة السرديات ورتبة البيضيات.

١٩٣٨٢ - **عويج**. *Cogia brevicapsa* (S). *Cogia à tête courte*, *Cachalot nain* (F).

نوع من العير وهو من الحيات الصغيرة القد ، طوله نحو ثلاثة اشر. تويه الى الزرقه السمره. موطنه المحيط الهادي واشيط الهندي والبحر الاحمر. سربه كثير البدد براوح بين ٥٠ و ١٥٠.

١٩٣٨٣ - **عويج بحيرية اللون**. *Notonecta glauca* (S). *Notonecta glauque* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٠ م. رأسها مستعرض ، بحري اللون. عضنها فسيط. عضنها كيرتان جاحضان. زباناها قصيران ، نجيلان. ظواهرها بحري اللون يطلو تمشج اسمر. وشناها غشائيان ، شفافان. بطنها اسود الصلصة العليا ، بحري السفلى. حمار بطنها متكاثل الملب || تعيش في المياه الراكدة. توجد في كل مكان.

١٩٣٨٤ - **عويج خضراء**. *Notonecta viridis* (S). *Notonecta vert* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٤ م. ثوبها اخضر اللون. رأسها مستعرض. عضنها قصير. عضنها كيرتان جاحضان. زباناها قصيران. حشفتها مزوانية سوداء. وشناها كيرتان غشائيان. حمار بطنها مرقش بالاسود || تعيش في المياه الراكدة.

١٩٣٨٥ - **عويج دكسة**. *Notonecta maculata* (S). *Notonecta maculé* (F).

حشرة مائية مفترسة من فصيلة المويبات. جسمها معتدل التبطيط يطول نحو ١٦ م. رأسها عريض ، اسفر اللون. عضنها قصير. عضنها كيرتان جاحضان. زباناها قصيران ، نجيلان. كيرتها اسفر اللون تملو تمشة سمره لاشاوية الكثافة. حشفتها مزوانية ، كستية اللون.

## ١٩٣٩٩ - عَوَيْتِيَّةٌ مَسْرُوكَةٌ

*Gibberella baccata*, *Calonectria varians*, *Fusarium fructigenum* (S).

فطر مجهرى يركب عدة أجسام مشعة وسريعية انحصارها اللينين الحامض واليوسني والكروم والذائق والتفاح والأجاص والزيتون والورد والسنب والصفصاف والصفراء والورد والخبان واليوكا || يصيب ثمار الكروم والذائق والتفاح والأجاص فيطعمها من البشيرة إلى البزرة المخالفة . مظهره الخارجى بقعة صفية سمراء اللون تتسع وتكون في الثوب . وهو في اللينين الحامض واليوسني يقع سم مسطيلة ، تركب الجذوع والسوق تنسب العصرم || وهو في الجزر والزيتون والورد يقع خضيرة مستديرة لونها إلى السوداء اللامع تنسب للدهاء وتقرحه || اغزاره منطوية بطروقة التربة وموزرة العوامل الجوية || يكافح كثيره من الفطور

١٩٤٠٠ - عَيْبَيبُ هو الانسداد ، اطله .

## ١٩٤٠١ - عَيْبَيبَكَة (F). Tide (E).

حركة دورية تأخذ مياه البحر فترتفع وتنخفض مرتان يومياً في أوقات شبه معينة لتتصهرو . استمرارها يدم ١٢ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة ، انقراض المياه وارتفاعها يدم ١٥ ساعة و٢٥ دقيقة .

## ١٩٤٠٢ - عَيْبَيبَكِي (F). Synodic (E)

نمت تعريفي يطلق على الدورة الكاملة التي تقوم بها الكواكب بالنسبة إلى الشمس . فالدورة القمر السابعية تستمر ٢٩ يوماً و١٢ ساعة و١٢ دقيقة من الدورة الفلكية .

## ١٩٤٠٤ - عَيْبَيبَكَة هِلَالِيَّةٌ

*Substitution alimentaire* (F). *Alimentary substitution* (E).

العبارة الغذائية أو عيابة الاغذية هي تبدل بعض الاكلات بغيرها بشرط أن تحوي الوحدات الغذائية نفسها .

## ١٩٤٠٥ - عَيْبَيبُ (F). Faut, Defect (E).

النعيب أو الوصمة في الشيء .

## ١٩٤٠٧ - عَيْبُيبُ الوَكْرُ (F). Tendon failli.

انقرب وتر الوظيف من العظمة في الجهة العليا الخلفية من الوظيف . وهو من عيوب الخيل .

## ١٩٤٠٨ - عَيْبَيبُ بَيْبَعِ الرَّدِّ ، عَيْبَيبُ مَيْبَعِ اللَبِيعِ

*Vice rédhibitoire* (F). *Redhibitory defect* (E).

عيب شئ يجعل البيع غير قابل للاستعمال أو يحد من

طوله نحو ٢٢ سم . لونه إلى الجوزة السوداء ، انحر الرش ، اغيب الفولاد والاباهر والكل || عيب الخناجر والملاء ، يكتر حيث يعل الجراد وقد يرافقه في رحاله .

## ١٩٣٩٣ - عَوَيْتِيَّاتٌ ، لُبُوثٌ عَفِيرِيْن

*Myrmecoleonidae* (S). *Myrmecoleonidae* (F). *Myrmecoleonidae* (E).

نصيلة حشرات من عصبيات الجنح . اجناسها وانواعها عديدة ، قربتها الانتشارية قصيرة مثلية . اناتها تتجمع مكانها في القباب والربل يخيف من حليص . خضرة الجفة ، قوية التأثير ، كثيفة الحلب ، تحفر في التربة ، حل برات للتدل ، حراً صغيرة قمية الشكل يسقط فيها النمل وتغرسه .

## ١٩٣٩٤ - عَوَيْتِيَّةٌ هي الحيوان الرتي ، اطله .

## ١٩٣٩٥ - عَوَيْتِيَّةٌ

*Gibberella* (S).

## ١٩٣٩٦ - عَوَيْتِيَّةٌ التُّوتُ

*Gibberella moricola*, *Fusarium lateritium*, *F. urticarum* (S).

فطر مجهرى يصيب افتاد التوت فيؤذيها . مظهره الخارجى يقع قرحة لا تلتئم لونها إلى الزرقة السوداء تلو قشور الفتاد تنسب ذليل الأوراق ثم يابسها ويابس التقصان والانتاد يدم اسرار خشبها || يكافح بقطع الاغصان المبرودة فور ظهور المرض ثم تطهيرها بأحد الفطوبر القاتل المركزة على التماس .

## ١٩٣٩٧ - عَوَيْتِيَّةٌ الرُّزْعُ

*Gibberella zana*, *G. subnietzi*, *Fusarium gramineum*, *F. roseum*, *F. rostratum* (S).

فطر مجهرى يصيب ٢٦ نوعاً من البات تنسب إلى عدة فصائل . انحصارها الحنطة والشيطان والشعر والأرز والذرة . كما انه يركب جذور البطاطا واللوبيا ويصيب مشاتل البنود ويؤذي الكتان والقنب والفجل وأنجار والفول . مظهره الخارجى مقيم على بالزروع وبالنباتات المائلة فيؤذي نموها او يموت وقد يصيب عدم الاسبال او الاسبال الابيض الخالي من الحلب || اغزاره منطوية بمى انتشاره الماتك إلى وطرية التربة وملوحة العوامل الجوية || يكافح بطهير البذار .

## ١٩٣٩٨ - عَوَيْتِيَّةٌ حَرَّارَةٌ

*Gibberella moniliformis*, *Ustilago tritici*, *Fusarium moniliforme* (S).

فطر مجهرى يركب عدة نباتات انحصارها قصب السكر والارز والذرة ولا يفسد من الحنطة والشيطان والشعر . مظهره الخارجى على قصب السكر خطوط حر تلو القصبة عند طرفها يتألفها يقع سم توشم نصل حصف الناي فتقوى . وهو على الارز يقع حر تركب قصب الساق في ايان عيبا تنسب نموها واسطعائها غير الطبيعية ثم يذوب قبل الاسبال او قبل الاضرار . وهو على الذرة يقع حنطة تركب الجذور فتضلل وتيبس اصفرار الارز او يذوبها || يكافح بطهير البذار وباحتجاب الموانع الرطبة والازرة المكتوية القوية الانعلاج .

استعماله فيجوز حيث الشاري فسح البيع وسالطه البائع بالتدريس || والمربوب التي يمتريها لثانين ميسرة لرد هي : القدام والنسقة وقائع الحنيرة للزبن والبررة والعرج القديم المتوار والوارد للمايد وباد الخنازير.

#### ١٩٤٠٩ - عَيْتُون \* (F). Altonia (S). Altonia (F).

جنية برفة وثريبتية من فصيلة السبديات. مهدبا بعض مناطق افريقية الجنوبية وقد انتشرت زراعتها التريبتية في معظم القطار البلاد المحلاة الحرارة || ساقها قصيرة قرمها اوراثها معتقة ، ضنية التجسيم ، ستانية النصال الفسيقة . ازهارها جميلة الشكل ، ليلكية اللون ، خاصة البليات ، كثيرة الاسدية ، عادمة العرف .

#### ١٩٤١٠ - عَيْتَام (F). Platane (F).

العياثم هو الدلب . واسدته عيشامة .

#### ١٩٤١١ - عَيْتُون \* (S). Clambus (S).

جنس حشرات من فصيلة العيشونات ودية لمعديات الاجنسة .

انواعها المعروفة ستة منتشرة في بعض مناطق البلاد المحلاة

الحارة || اجسامها شديدة الصغر لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذروها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية غريبة . كواسلها مستعرة . امحادها لاحسة قوائمها شديدة . اولياها وحيدة اللون السوي وهي الى القشرة او السمرة || تعيش حل المواد النباتية المختصرة وفي الاعشاب الكثرة وفي القروث والخثي .

#### ١٩٤١٢ - عَيْتُونِيَّات \* (S). Clambidae (S).

فصيلة حشرات من لمعديات الاجنسة . اجناسها وانواعها

المعروفة قليلة العدد ، منتشرة في جميع القطار العالم || اجسامها شديدة الصغر ، لا تتجاوز ١م . رؤوسها كبيرة . عيونها صغيرة ، بارزة . قاذروها وفكوكها نظامية . قربنها الاستعمارية سداسية الفصل . كواسلها قصيرة مستعرة . امحادها لاحسة . اوسافها وديعة البقل || تعيش في التدي البتالي وفي الاعشاب الكثرة وفي القروث والخثي وفي جميع المواد النباتية المختصرة || لشهر اجناسها العيشون .

#### ١٩٤١٣ - عَيْشُون \* (F). Scardinius erythrophthalmus (S). Red-eye (F).

سمكة من السبديات . تعيش في المياه العذبة لا تفرق متعها بين البسيرة والنهر والجور . اقلها البلاد الميادية والنسقة

الحارة || جسمها اعليجي الشكل ، مستطال التبطيط ، بطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . سفها مستدير كبير . يربوا الى الخضار الزرق المزاج يدي في الظهر ويزهر في الجالين . وينصرف الى القفي في البطن . رأسها مستطال الحجم ، قصير الخلف ، صغير الشفق . عيناها مستديرتان ، صغرتان ، جميلةا الحمرة القرمزية || زفافها ودية اللون حمراء المزاج ، الظهيرة وحيدة مزوانية الشكل ، تملو مؤخر الظهر . الذيلية غارقة || لحمها كامن النصف ، قل من يربب فيه .

#### ١٩٤١٥ - عَيْد \* (F). Ophiocten (F).

العيد : حجر جبل ينبت عينا غمر اللوام لمر لا ورق له ولا نور ، كثير اللحاء والمعد يفسد بلماحه المرح الطري فيلثم (اللسان) .

#### ١٩٤١٦ - عَيْدَان الحية (F). Ophiocten (F).

سبط من فصيلة العظليات . اشهر نباتات صود الحية .

#### ١٩٤١٧ - عَيْدَانكة (F). Ophiocten (F).

هي كل شجرة سلية قديمة لها عروق نافذة الى اللحاء (اللسان) .

#### ١٩٤١٨ - عَيْدَان صُود \* (S). Idus vulgaris (S).

سمكة نهريه يروض من مفتوحات اللانة وفصيلة السبليات .

اصطفاها معظم النهر وبحيرات الشرق الاذلي واروية || جسمها اعليجي الشكل ، بطول نحو ٣٠ سم . رأسها مستطال الجرم ، مخروطي الشكل ، قصير الخلف ، صغير الشفق . قوائمها الى الركبة السمراء السواء المألوة تشبه سمرة في الظهر وتنف في البطن . زفافها مستطال الاجسام ، الظهيرة واحدة شبه هربية الشكل . الذيلية غارقة || لحمها متوسط النصف ، مأكول .

#### ١٩٤١٩ - عَيْدَانُون \* (F). Iguana (S). Iguana (F). Iguana (S).

جنس حيوانات زسافة من فصيلة العيشونات . انواعها المعروفة اثنان يتمايزان بذكر الجفنة واصطافها التي تراوح بين ١٢٠ و ٢٠٠ سم . اصنافها وتيج ظهورها منقطه يجار من الحلب غصوري التركيب ، شطبي الشكل ، أسود اللون . اثنائها الى الزرق الخضراء يطولوا وتويع ويخضع وتبيع تراوح الوانها من الصفرة الى السود || وما من الحيوانات الخالصة الحاشرة التي تألف لغلاف الانهر ويجاري للحاء . تعيش حل الايجار . لحمها مأكولة ويروضها كذلك .

#### ١٩٤٢٠ - عَيْدَانُونِيَّات \* (S). Iguanidae (S).

فصيلة حيوانات زسافة من ربة العظليات السيميات

الاسنة ، الرباعيات القوائم ، المستطيلات الانذاب . اجناسها وانواعها كثيرة العدد . اصطافها البلاد الحارة . لشهر اجناسها العيشون .

#### ١٩٤٢١ - عَيْدَانكة \* (F). Isogamia (F). Isogamia (S).

العيدة احدى طرائق الانسان الشقي ؛ تتميز حدافيا بمساواة النامات الزوانية الذكرية والانثوية .

#### ١٩٤٢٢ - عَيْدَان \* (F). Isogamia (F).

هو للاذن الاكبري ، اطلبه .

#### ١٩٤٢٣ - عَيْتَر \* (F). Baudet (F). Ass (E).

هو الحمار اللسان للتعصب الصالح لقر حل الحجير واللاتن . ج امبار وعيار ويصور ويصوره .

#### ١٩٤٢٤ - عَيْشَر \* (F). Baudet (F).

العير : الايل . وقال ابو الهيثم : العير كل ما يتير عليه من الايل والحجير والبعال فهو عير .



عِيدَان



عِيدَانُون



عِيدَانُون



عِيدَانُون

cile (F). Jerusalem sage (E). Jerusalemssalbei (D).  
Salvia arborea, S. di Gerusalemme, Salvione (I).  
بججة سريوية معمرة تملو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. ساقها  
خشيشية. فروعها فرقة متبادعة كثيفة الزغب القطني  
الشكل واللون. اوراقها احليجية النسل، خلية البشرة  
ازهارها الى البياض الاخير. قناباتها مزينة بدماء اللون.  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز. يقال انها من  
النباتات الطبية النافعة.

19435 - **هَيْسْرَاةٌ مُدْهِبَةٌ** *Phlomis aurea* (S).  
*Phlomis dorée* (F).  
بججة سريوية معمرة مزينة بكثيفة الحبل الاصفر. تملو من  
٧٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها سنانية الشكل مقطوعة الطرف.  
ازهارها الى الصفار المذهب الموجج || ازهارها يستمر  
طوال فصل الصيف.

19436 - **هَيْسْرَاةٌ** *Dromadaires blanchâtres* (F).  
*Whitch dromedary* (E).  
البس : الايل البيض يتخالط بياضها شي من الشقرة.  
واحد احمس والاني عيسا.

19437 - **هَيْسْرَاةٌ** *Sauterelle femelle* (F).  
المَيْسْرَاة : الجرادة الاثني.

19438 - **هَيْسْرَاةٌ** *Arctostaphylos* (S).  
*Busserole, Bousserole* (F).  
جنس نباتات جنينية معمرة من فصيلة الخنثنيات. انواعه  
عديدة جميعها بري. سيقانها خفيفة نميلة مدادة. فروعها  
منسعبة. اوراقها كاملة صغيرة القدة معتقة مضطوبة القامة  
مسئلة النسل. ازهارها متفرقة التجميع. ثمارها حنينة  
للشكل حراء اللون او ميوهه || اشهر انواعه عيسران  
عنب الدب او عنب الدب.

19439 - **هَيْسْرَاةٌ عَيْسْبُ الدَّبِ\*** *Arctostaphylos uva-ursi* (S).  
*Busserole raisin d'ours, Raisin d'ours, Busserole (F). Bear-berry, Bear's grape, Uva-Ursi (E). Gemeine Bärentraube (D). Uva ursina, Eva ursina, Orsella (I).*

نوع من البسران ساقه مدادة. فروعها تملو نحو ٣٠ سم.  
اوراقها كاملة ابيدة. نصلها جامدة الصفعة مائل البشرة.  
ازهارها وردية اللون. عقيقها الزهري يضم من ٥ الى  
١٢ زهرة. ثمارها حنينة حراء اللون يقال ان الدبة تأكلها.

19440 - **هَيْسْرَاةٌ** هو الاشقيال النجسي، اطلبه.

19441 - **هَيْسْرَاةٌ زَبَائِعِي الْبَجَج\***

*Allonyx quadrimaculatus* (S). *Allonyx à 4 macules* (F). *Allonyx quadrimaculatus* (E).  
حشرة واسعة قانصة من فصيلة الزوسحات وردية ممدعات  
الاجنحة. موطنها بطن اقاليم حوض البحر الابيض  
المتوسط. خنافسها تعيش على رقيق ازهار النباتات الطرية  
التي تكثر في غابات الصنوبر واخرجه. يرقانها مقترنة  
تقضي على امرايح الحشرات الماشية التي تركب الصنوبر ||  
جسمها صغير القدة يطول من ٤ الى ٦ سم. لونها اسود  
الراس واليطن والظفران، اجر الكويل. غليظانها لثاني  
التبقيع القندي الابيض. زباناها صوياليان. عيناها  
بارزتان. ارسافها خاسية القتل. || الاثني امير قدأ من  
الذكر وابنت ثوباً منه واقصر زبانا || لها جبل واحد

19442 - **هَيْسْرَاةٌ**  
طائر كبيكة الحماة قصر الرجلين مسروبا اصفر المتقار  
اكمل العينين صافي اللون الى الخضرة اصفر البطن وما  
تحت جناحيه وباطن ذنبه كانه يرد شي. يزعمون انه  
يأكل التين والخبث. ج ميوه السراة (السان).

19443 - **هَيْسْرَاةٌ** هو سار قبان، اطلبه.

19444 - **هَيْسْرَاةٌ** *Irena* (S). *Irena* (F). *Irena* (E).  
جنس طير من الجوارح نبات للتاثير وفصيلة الاكروريات  
انواعه المروية ثلاثة اعطائها تمتد من الحد الى ماليزية  
والفلبين. تألف الاذغال والبراري. قوتها الحشرات  
والقوديات من المناكب الى المقارب والوزغ والظا  
الصنيرة || اجسامها ريمه تطول من ١٨ الى ٢٢ سم.  
متنقدها خفيفة. اجنتها معتدة الطول، ذلقة الاطراف.  
اذنابها مغلوقة. اثوابها تراوح من الرمكة السوداء الى السوداء  
للحمار || تدن اشعاشها في الاشجار المائقة عند اقتناص  
الافسان او الاثا. اناسها تحسن نحو اربع يمشات  
على مرتين في الحول. الاكرو توكين لها الحماة والنفاد.

19445 - **هَيْسْرَاةٌ، فُلُوسِي** *Phlomis* (S).  
*Phlomis* (F).

جنس نباتات برية وزيينية من فصيلة الشفويات. انواعه  
عديدة جميعها احشاب ونباتات. منها اقلع البحر المتوسط.  
اوراقها حنينة لينة. ازهارها خلفة الاوان لها الابيض  
والاحمر والوردي والاصفر || اعرف انواعها واشهرها مالي.

19446 - **هَيْسْرَاةٌ الْحَمَلِ** *Phlomis agraria* (S).  
*Phlomis des champs* (F).  
بججة معمرة مزينة تملو من ٣٠ الى ٤٠ سم. اوراقها بيضية  
الشكل، قلبية القامة. ازهارها ضية متبادعة كالمنقيد.  
عقنها تملو نحو عشر زهرات بنفسجية اللون. قناباتها  
فضل كروية غرضية الشكل || ازهارها يستمر من  
حزيران الى آب.

19447 - **هَيْسْرَاةٌ سَامِيَّةٌ** *Phlomis samis, Phlomis superba* (S). *Phlomis de Samos, Ph. superba* (F).

بججة زيينية معمرة تملو من ٦٠ الى ٩٠ سم. اوراقها  
بيضية الشكل، قلبية القامة. نصلها مائل البشرة  
خلى الصفعة السفل. ازهارها سلبية التجميع متبادعة  
الرصف. ثمارها صغراء اللون ثم تنصرف الى الحمرة.  
ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19448 - **هَيْسْرَاةٌ عَسْقُولِيَّةٌ** *Phlomis tuberosa* (S). *Phlomis tubéreuse* (F).

بججة سريوية زيينية معمرة تملو من ١٠٠ الى ١٧٠ سم.  
جلودها مسقولة كروية الشكل. اوراقها قلبية النسل.  
عقيقها الزهري يطول من ٦٠ الى ٨٠ سم. ضباهه الزهرية  
عديدة. الواحدة منها تجمع من ٢٠ الى ٤٠ زهرة، لونها  
الى الحمرة || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز.

19449 - **هَيْسْرَاةٌ لَرَجَكَةٌ** هي الاذبة، اطلبها.

19450 - **هَيْسْرَاةٌ مَحْشُونِيَّةٌ، فُلُوسِي**

*Phlomis fruticosa* (S). *Phlomis sous-ligneuse, Ph. de Palestine, Sauge on arbre, Bouillon blanc de Si-*



ميرن



عيسران عنب الدب



عيسوس زبائعي البجج

اجناسها وانواعها عديدة تكثر في البلاد الحارة والاستوائية.  
بجملتها قنصة. احرف انواعها واشهرها اليفيس .

### ١٩٤٤٨ - عَيْقُكَنْ \* ، عُوْدُ اَجْمَر ، اُزْمِيرَا

Armeria (S). Arméria, Armérie (F). Thrift, Pink (E).  
Granello (D). Armeria (I).  
جنس نباتات عشبية مسمرة برية طيبة وزراعية تزيينية  
من فصيلة الارصاسيات. انواعها عديدة بعضها شجراوية  
تحمل الازهار تملو من ١٠ الى ٦٠ سم. اوراقها مضيئة  
الشكل، مختلفة الاشجام ويعد السروق. ازهارها كثيرة  
الالوان فيها الالبيص والوردي والبيجي والاحمر والارنبوني  
والجلوي || ازهاره يستمر من الشهور الى الاربعة  
شهور.



عصم ثلاثي البقع

### ١٩٤٤٩ - عَيْقُكُ

Taxus  
وقد يأتي بمخاني مختلفة اعضها السمر والمذكر .

### ١٩٤٥٠ - عَيْكَة

Rivage (F). Bank, Side (E).  
التَيْكَةُ : ساحل البحر والشاطئ . وصفة النهر  
تسمى عيقة . ج عيقات .



عيس

### ١٩٤٥١ - عَيْكَة

هي الركمة اي ساحة المزروعة او المزرب وكل فناء من  
الارض احتجزت جوانبه الاربية .

### ١٩٤٥٢ - عَيْقُكَنْ

نبات كالرفيج له سفة سكتة القضاء (اللسان) .

### ١٩٤٥٣ - عَيْكَمْ ، عَيْكَمْ

Spermatophore (F). Spermatophore (E).  
ج عياكم . البركية حق صغير اشد لحياس الشكل قدس  
قدر بيرة الفيل او بيرة الكنان يطفل رتيبة من الشلق  
عند ذكور بعض الحيوانات الزاحفة والقزابة والعدنيات  
الرئوية والراسيات الاربلن الخ ...



ميفقان

### ١٩٤٥٤ - عَيْلَاء \*

Ilia (S). Hia (F). Hia (E).  
جنس دوبيات بحرية من القشريات عشاريات الاربل  
قصيرات اللبيل وضفيلة القشويات . انواعها المروقة قليلة  
العدد اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتلة الحارة || اجسامها  
صغيرة نصف كروية الشكل ، مخدبة الظهر ، منبسطة  
البطن ، مفرقة المقدم والعقب ، محرمة الانظام ، سادة  
التأثير ، قوائمها دقيقة مستقلة باستثناء الزوج الاساسي  
المستفخم ، الكثير الملاحظ المسنة لشغار الداعلية ||  
انواعها عديدة تكثر فيها الجلوة والجلوة البشجية والسمره  
الحديدية الموجب .



عيلاء

### ١٩٤٥٥ - عَيْلَام

Hyala (mala) (F).  
Hyala (male) (E).  
الصبح الذكر .

### ١٩٤٥٦ - عَيْلَمْ

العيلم اسم الضفدع ويكثر الكثرة الماء او للسمه . ج عيال .

### ١٩٤٥٧ - عَيْشُ

Cell (F). Eye (E).  
هي عضو البصر في الحيوان . تتكون من المقلة والجفون  
والجهاز العصبي والاعصاب البصرية .

في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اوائل شهر ايار  
وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في البهار وتبيت في  
الليل || البرقة التي تبلغ الكمال الجسدي يمر ستة اشهر  
تتمثل الى حورية في اوائل شهر نيسان . جسمها عند تمام  
ادراكها يطول من ٧ الى ٩ سم . وهو مردي الشكل ،  
مستطيل المقدم والراس ، مسطح الطرف اللذان ، سداسي  
الرواجب ، ضليح التأثير ، اسمر اللون ، اسود الراس .

### ١٩٤٥٨ - عَيْشُوم

Phellodendron (S).  
Phellodendro (F).  
جنس اشجار برية وزرنيحة من فصيلة الباليات . انواعها  
قليلة ، اعجازها سرسة ، تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها  
متشابهة مركبة ريشية حايلة . ازهارها حشركية التجميع ،  
طرنى الارتيكار . ازهارها صغيرة القد عطرية العرف عديدة  
الفصل والبتلات والاسدية .

### ١٩٤٥٩ - عَيْصُ

Broomallies (F).  
Bushes, Brushwood (E).  
الموج والنباتات الدفلة الشائكة التي تمش بين الاشجار  
الحرجية .

### ١٩٤٥٩ - عَيْصَمُ ثَلَاثِي البَقْع \*

Macroslagon tricuspidata (S). Macroslagon  
tricuspid (F). Macroslagon tricuspidata (E).  
حشرة واسعة شافرة من فصيلة الزناليات رتيبة مندشات  
الاجنحة . تألف جميع الاماكن التي تكثر فيها الازهار  
والزناوير والشفاوير . تنافسها تمش على ازهار الصوليوات  
والشفاويرات . يرقاتها تمش على جذب الزناوير من النسوة  
الى الشفور والهدور || جسمها صغير القد ، يطول من  
٧ الى ١٠ م . لونها متعادل الالوان اسها وكعيلها  
ويطها الى الحمرة الجاذبة . صدرها الى السرة السوداء  
خمدلها الى الحمرة الصائبة يعلوها ثلاث بقع سود . واسها  
صغير الحجم زيناها عيطوان . عيناها صغيرتان . لجمها  
مقلقان ، ريشتها شفافة ، بارزان تحت الظهران || لها  
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في اواخر  
ايار وتبقى حتى اواخر تموز . تسرح في البهار . تسافده  
في اوائل تموز . الانثى تهريق المكن مبياحيا قرب عشاريات  
الزناوير على النبات والحجارة والرربة || البرقة عند الادراك  
التام تطول نحو ١٦ م . جسمها بسيط الشكل ، سداسي  
الرواجب ، ضليح التأثير الفكية ، حشني اللون ، اسمر  
الراس والرواجب والشرج || طول الكمال الذي يستمر  
نحو ٣٥ يوما ينتفي في التربة تحت الجملانة .

### ١٩٤٥٥ - عَيْطَل

Liza (F). Smooth (E).  
الشجر البعل ما كانت لحاء سوكه واضعانه سرسة ناعمة  
البشرة .

### ١٩٤٤٦ - عَيْقَس \*

Belostoma (S).  
Belostoma (F).  
جنس حشرات قزابة من فصيلة البشيات . انواعها كثيرة  
قلية اعطائها البلاد الاستوائية . تمش في مائتها وانواعها .  
بجملها مفرقة كبيرة القد طويلا يراوح بين ٦ و ٨ سم ،  
قزبا الحيوانات الدنيا والحشرات المائية . لسها مخز عيقت .

### ١٩٤٤٧ - عَيْقَسِيَّات \*

Belostomatidae (S).  
Belostomatidae (F). Belostomatidae (E).  
فصيلة حشرات قزابة من نصفيات الاجنحة المختلفة .

١٩٤٧٨ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، مَسْرَطَةٌ

Echantillon (F). Sample (E).

Rhinopomes (S).

Rhinopomes (F).

جنس خفافيش من حارة الريمات . انواعه قليلة جميعها صغيرة القد . أوراقها من الريادي الاصل الى الكستاني الاسمر . رؤسها صغيرة ، اذنانها كبيرة ، فرائسها ذلقة ، زوائدها منحنية اسطوانية متراكبة . اذنانها مستطيلة دقيقة || موطأها فصح الاجزاء ينمت من الرقيقة الثابتة الى الشريفة ويحوض البحر الاخر وينتهي به لحنه . يكثر ويوجد في وادي النيل . تعيش منفردة او جماعات متوسطة العدد . تسرح في الليل . قوتها الحشرات حل اختلاطها . تألف الكهوف والمغاور وراقب الصخور وتجاوذاً لا تجار .

١٩٤٨٠ - عَيْنُون (F). Globularia (S).

جنس نباتات برية وتربينية معمرة من فصيلة البينونيات . انواعها المعروفة ١٢ لها الاشباب والجنبايات اللينة الحشوية . اوراقها بسيطة ، القرصية منها ضيقة التجميع والشراعية متعاقبة . ازهارها رؤسية كروية الشكل قريبة الشبه من اثمار المركبات . لها الى الزرقاء زهر ورقيق حسب الالوان || وهو من النباتات التي ترعب في الاراضي الصخرية وتجد في الارربة الكلسية .

١٩٤٨١ - عَيْنُون عَيْطَلِي الزَهْر

Globularia trichosantha (S). Globulaire à fleurs filiformes (F).

نوع من البينون وهو عشية برية وتربينية معمرة تملو نحو ٢٠ سم . اوراقها القرصية اطولجية الشكل ، وحيدة الشكل ، ثلاثية الايمان . اوراقها الشراعية سنائية التصل متعاقبة . ازهارها كبيرة القد مسطرة البتلات المحيطة بالتصميم .

١٩٤٨٢ - عَيْنُون عَيْطَر

Globularia alypum (S). Globulaire alype, Alype, Herbe terrible, Séné sauvage (F). Globularia, Alype globe daisy (E). Strauchartige Kugelblume (D). Globularia alypum, Erbe terrible (I).

نوع من البينون وهو عشب دالية معمرة تملو نحو ٦٠ سم . اوراقها ابيدة ، متعاقبة ، لمعية الشكل ، جامدة التصل . رؤسها الزهرية لاطعة ، حطرية العرف المستعجب . وهو من النباتات الطبية البديدة المتألف يوجد بين الصخور وفي المراتع القاحلة وادج السراخ واطراف الغابات .

١٩٤٨٣ - عَيْنُون عَيْطَل (S). Globularia nudicaulis (F).

Globulaire à hampes nues (F).

نوع من البينون وهو عشية جبليّة ، معمرة ، برية وتربينية تملو نحو ٣٠ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، كبيرة القد ، مقنطرة القاعدة ، عادية التبيين . شراؤها عيطلي اللسان . رؤسها الزهرية كبيرة القد ، قطرها يراوح بين ٢ و ٣ سم .

١٩٤٨٤ - عَيْنُون قَلْبِي الْوَرَق

Globularia cordifolia (S). Globulaire à feuilles en cœur (F).

نوع من البينون وهو عشية جبليّة معمرة برية وتربينية تملو نحو ١٥ سم . اوراقها قرصية ، ضيقة التجميع ، قليلة الشكل ، ثلاثية التبيين العلوي . شراؤها حادم الازراق ، أزغب اللسان . رؤسها الزهرية كثيرة العدد ، صغيرة القد ، قطرها نحو ١ سم .

١٩٤٥٨ - عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، عَيْنِيَّةٌ

Source (F). Spring (E). عَيْنٌ ، عَيْنِيَّةٌ ، عَيْنِيَّةٌ

منه يخرج من جوف الارض وتساب على سطحها .

١٩٤٥٩ - عَيْنٌ

والخامس من كل شيء . وقد شاع استعمال لفظة عين

للالة على الاموال الثابتة فقط .

١٩٤٦٠ - عَيْنٌ (F). Wild oaten (E). Boule sauvages

العين : بشر الوحش .

١٩٤٦١ - عَيْنٌ اَذْكِيَّةٌ

زعمة ثالوية تظهر في أبط الازدة .

١٩٤٦٢ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

فصة في اسفل سرح الكرة تفتتح وتقلع اذا جد .

١٩٤٦٣ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الادونيس القرمي ، اطلبه .

١٩٤٦٤ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

Schoenus (S). Echinops (D). Schoenus (F).

جنس نباتات عشية برية معمرة من فصيلة السعديات . انواعها عديدة بعضها متني وبسبها بيت في الاراضي الرملية . اوراقها صلبة الشكل جامدة التصل تشبه اوراق

الاسل .

١٩٤٦٥ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الادونيس الحربي ، اطلبه .

١٩٤٦٦ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو اتمان السباعين ، اطلبه .

١٩٤٦٧ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

عين الثور نيم نير من كوكبة برج الثور .

١٩٤٦٨ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الادونيس الصبي ، اطلبه .

١٩٤٦٩ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الادونيس القرمي ، اطلبه .

١٩٤٧٠ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو عباد الشمس ، اطلبه .

١٩٤٧١ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الجيرة ، اطلبها .

١٩٤٧٢ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو القفص نبات من السعديات ، اطلبه .

١٩٤٧٣ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو الايمان الاسفر ، اطلبه .

١٩٤٧٤ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

هو اذان الفأر ، اطلبه .

١٩٤٧٥ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

Opale, Œil de chat (F). Opal (E).

حجر كريم كثير الالوان . ويلى أيضاً حجر لبي .

١٩٤٧٦ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

Corps certain (F). Certain matter (E).

هي مادة الشيء التي تلمس وترى .

١٩٤٧٧ - عَيْنٌ اِيْمَانِيَّةٌ

Œil composé (F). Compound eye (E).



عين



جنبي خشيب. جميعا تريينة وأكثرها يستعمل لاستخراج المطر. طرعا دمن اصفر اللون ، فلع العرق الاخاذ يدخل في صناعة مطعم الحبوب || أشهر أنواعه الرئيسية التي تحدث منها جمع الفصوص المعروفة وبدا استجد من اسرام ، هي ما يتبع .



عين مبول

### ١٩٤٩٥ - عَيْنُ الْمَطَر ، عَطَر ، لَنْكِي

*Pelargonium capitatum* (S). *Pelargonium rostratum* (F). *Garranum rostratum* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة ومفرقة ، تصلها هلي البشرة ، وردي الرائحة عند اللمس . ازهارها نورية التجميع ، صفراء اللون ، وردية اللون ، ارجوانية التجميع ، فرائح الرائحة العطرية || ازهارها ربيعي . زراعتها صناعية يستخرج من ورقها وازهارها عطر الورود .

### ١٩٤٩٦ - عَيْنُ إِبِلْجِي أَوْزَق

*Pelargonium oblongatum* (S). *Pelargonium à feuilles oblongues* (F).

عشة نيمية ممررة صفولية الجشنة ، حاملة الساق ، مديدة القروخ تملو نحو ٣٠ سم. اوراقها اطيالية الشكل ، ذرية الزم الاخير || ازهارها ال البيضاء الاصفر يعلو تزيق اخر || ازهارها صيفي .

### ١٩٤٩٧ - عَيْنُ بَهِي

*Pelargonium fulgidum* (S). *Pelargonium declatant* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة ، ساقها لينة ناعية اسطوانية زباد اللحاء تملو نحو ٧٥ سم. اوراقها مفروقة ، خلية البشرة القفصية المواج . ازهارها نورية التجميع مستعرضة البتلات العادة التطريش والتكترم ، الارجوانية اللون . ازهارها يستمر طوال الصيف .



### ١٩٤٩٨ - عَيْنُ ثَنَكي الين

*Pelargonium bicolor* (S). *Pelargonium bicolor* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها مفروقة ، غرطية ، مسنة . ازهارها حاملة العرق الطري ثنائية اللون البنفسجي والاسمر الكسبي || ازهارها يستمر طوال شهر تموز .

عيون التجليات (١)

### ١٩٤٩٩ - عَيْنُ جَعْدِي

*Pelargonium crispum* (S). *Pelargonium crépu* (F).

عشة ممررة زباد اللحاء ، ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مفصصة متجمعة ، تصلها غشوراللمس فلع الرائحة التجماعية . ازهارها مسطلة الاذن والبتلات الوردية اللون ، الارجوانية التجميع || ازهارها يستمر طوال فصل الصيف .



عيون التجليات (٢)

### ١٩٥٠٠ - عَيْنُ حَبَاب

*Pelargonium gibbosum* (S). *Pelargonium gibbeux* (F).

عشة ممررة صفولية الجشنة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورديها غليظة العند . اوراقها بحرية اللون ، مفصصة ، غرطية القصوص . ازهارها ال الصفراء الخضراء المواج السوية اللون || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الاول .

### ١٩٥٠١ - عَيْنُ سَنَدِيَاكِي أَوْزَق

*Pelargonium quercifolium* (S). *Pelargonium à feuilles de chêne* (F).

عشة ممررة ذكية العرق . ساقها فرعاء منتصبة تملو نحو ١٠٠ سم. اوراقها مستطانية الشكل متجمعة الاطراف .

### ١٩٤٩٥ - عَيْنُ مَبُول \*

*Globularia vulgaris* (S). *Globulaire commune*, *G. vulgaris*, *Marguerite bleue* (F). *Blue daisy*, *Globe daisy* (E). *Kalk-Kugelblume*, *Blaue Kugelblume* (D). *Margherita azzurra*, *Vedoville turchina*, *Morine* (I). نوع من البنزين وهو عشة برية ممررة تملو نحو ٤٠ سم. اوراقها القرمزية خامة المروق ، لا قابلية التكرم . ازهارها الشراعية سائبة التصل ، عابكة الخمار . ازهارها متوسطة القد ، كثيرة العدد ، مشرة البتلات المقصصة . وهو نبات متغلة الماشي لفيدها ولا يتلو من بعض الخواص الطبية التي تنفع الصدر والحم .

### ١٩٤٩٦ - عَيْنُ ثَنَكي

*Globulariaceae* (S). *Globulariaceae* (F). *Globulariaceae* (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلتين متحدة الفعالات مرتجلة الميوس .

### ١٩٤٩٧ - عَيْنِي ، عَيْنِي

*Identique* (F). *Identical* (E).

*Spécimen* (F). *Specimen* (E).

### ١٩٤٩٨ - عَيْنِي ، عَيْنِي

*Gorilla* (F). *Gorilla* (male) (E).

هو ذكر النورلا اي الفول ، ج حايبر .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Chocard des Alpes* (F). الميوس م. عينة هو زمث الجرد ، طائر من الغربان ، اطلبه .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Eau douce* (F). *Fresh water*, *Soft water* (E).

يقال لعين المذبة من عَيْنِي ويقال لعين الماخلة من زَيْنِي || والعين هو الليل الذكر .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Epithel* (F). *Epithel* (E).

جس فلور مجهرية من السناخيات وفصيلة السناخيات كندبر يونية مهدبة تبتدئ رمية يضاه اللون ثم تجمد وتضفر وتضفر على الحفرة التاربية . اهداها اصاسها . يوطها عيطي شفاف لا يتلو من بعض النقط السمية للبرقة . ازهاره قليلة منها نزع واحد شار يلى عيوس التجليات .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Epithel* (F). *Epithel* (E).

جس فلور مجهرية من السناخيات وفصيلة السناخيات كندبر يونية مهدبة تبتدئ رمية يضاه اللون ثم تجمد وتضفر وتضفر على الحفرة التاربية . اهداها اصاسها . يوطها عيطي شفاف لا يتلو من بعض النقط السمية للبرقة . ازهاره قليلة منها نزع واحد شار يلى عيوس التجليات .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Epithel* (F). *Epithel* (E).

جس فلور مجهرية من السناخيات وفصيلة السناخيات كندبر يونية مهدبة تبتدئ رمية يضاه اللون ثم تجمد وتضفر وتضفر على الحفرة التاربية . اهداها اصاسها . يوطها عيطي شفاف لا يتلو من بعض النقط السمية للبرقة . ازهاره قليلة منها نزع واحد شار يلى عيوس التجليات .

### ١٩٤٩٩ - عَيْنِي

*Epithel* (F). *Epithel* (E).

جس نباتات عطره ممررة من فصيلة الفريزيات . انواعه نحو ١٥٠ وضروبه زباد ٥٠٠ مطمها ليني وبضها

نصلها خلى البشرة، حطري العرف الاخاذ المستحب .  
انزهارها صيوانية التجميع ، صغيرة القند ، متساوية البتلات  
الوردية اللون || انزهارها يستمر من الصيف الى الخريف .

#### ١٩٥٠٨ - عَيْتُونٌ قَدَفُ الْقَطَنِ

*Pelargonium tomentosum* (S). *Pelargonium tomentosum* (F).

عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو  
١٠٠ سم . اوراقها حلوة . نمتية العرف ، مستديرة الشكل ،  
متجمعة ، مبهمة التفصيص . نصلها خلى البشرة وهو ابيض  
الحمل الكثيف المستطيل . انزهارها الى اليباض الاغبر  
يملو تدرجاً وسطى قافاً الحمرة || انزهارها يستمر من  
نيسان الى حزيران .

#### ١٩٥٠٩ - عَيْتُونٌ

التيق ويصغى رقيب القُرْبِيَّةِ نيم من كركبة مملكة الامة .  
مركزه على المنكب الايسر . يتميز من نجوم العبرة الاولى  
يعد من الارض نحو ٤٥ سنة ضوئية .

*Hydrophasianus chirurgus* (S). \* *عَيْتُونٌ* . ١٩٥١٠  
*Hydrophaisan de Chine, Chirurgien, Pans* (F).

طائر وحيد الجنس والنوع من طوالب الساق وفصيلة التفلقيات  
اعطاه تحت من الهند الى الصين ويترى الزوايج وسرديب .  
يألف طصاف الجيرات والاحوار والمناقع . قوته الزغويات  
والبلابيط . جسمه كبير القند يطول نحو ٥٠ سم . عند  
الذكر نحو ٥٥ سم . عند الانثى . رأسه ويقدم عنقه وأعلى  
جوشه الى اليباض الناصع . مؤخر عنقه الى اليباض  
الاصفر يفصله عن يياض المقدم خط اسود . ظهره وذنبه  
الى السمرة الزرقاء المائلة بظلياً موجاً ارجوانى . جوشته  
الى السمرة السوداء . جناحاه الى اليباض العاجي باستثناء  
القوائم السود . حلقة حية حنطية . متقاسمه اوراق  
الانتشابه ، اخضر الملقط . رمداً الى الخضار البصري ||  
يفلن عنه في عقال الارز او حل اوراق النيلوفر وبغيرها  
من الاوراق التي تملأ سطح الماء . الانثى تضع من ٣  
الى ٤ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ثلاثة اسابيع .

*Ochne* (F). ١٩٥١١ - عَيْتُونُ التَّيْمَرِ

هو الحزبيل ، اطلبه .

#### ١٩٥١٢ - عَيْتُونٌ لُتَوِيَّةٌ ، عَيْتُونٌ عَرَكِيَّةٌ

*Sous-yeux* (F). *Sub-eyes* (E).  
زيمات تنمو حول الزيمة الاصيلة فتخلفها اذا تلفت .

*Ommatidie* (F). ١٩٥١٣ - عَيْتُونَةٌ  
*Ommatidium* (E).

العينية ، عند المفصليات ، هي العين الصغيرة البسيطة  
التي تألف من مجموعة العين المركبة .

انزهارها وردية اللون جميلة وديجة بالاحمر || انزهارها  
يستمر طوال فصل الصيف .

#### ١٩٥٠٢ - عَيْتُونٌ عَشِيٌّ

*Pelargonium peltatum* (S). *Pelargonium peltatum* (F).  
عشبة معمرة لينة الساق المارحة المشقة . فروعها مخلفة  
متدلية تطول نحو ١٠٠ سم . اوراقها خاسية التفصيص ،  
خالية البشرة . انزهارها كبيرة القند يفسله اللون او حمراء .  
انزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

#### ١٩٥٠٣ - عَيْتُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ

*Pelargonium grandiflorum* (S). *Pelargonium à grandes fleurs* (F).

عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ،  
عشبية ، جامدة ، تملأ نحو ٤٠ سم . اوراقها قلبية او  
كلوية الشكل ، خلية البشرة ، بحرية اللون . انزهارها  
كبيرة القند ، قطرها يراوح من ٧ الى ٨ سم . لونها الى  
اليباض المالح بالاحمر والبشبيسي || انزهارها يستمر  
طوال فصل الصيف .

#### ١٩٥٠٤ - عَيْتُونٌ مُجَدِّعٌ

*Pelargonium cordatum* (S). *Pelargonium cordé* (F).  
عشبة معمرة زباء اللحاء . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو  
٧٥ سم . اوراقها حادة العرف ، قلبية الشكل ، مسنة  
الحافة . نصلها ازغب البشرة ، اطول اللون . انزهارها  
كبيرة القند ، وردية اللون المالح بالاحمر || انزهارها  
يستمر طوال فصل الصيف .

#### ١٩٥٠٥ - عَيْتُونٌ مُخَطَّطٌ

*Pelargonium zonale* (S). *Pelargonium zoné* (F).  
عشبة معمرة مزفيرة اللحاء . ساقها منتصبية ، لينة ، جامدة ،  
تملأ نحو ١٠٠ سم . اوراقها سطحية التفصيص . نضوية  
الحط الاسمر الكسبي . انزهارها نورية التجميع ، ضيقة  
البتلات المستطيلة ، لوناً يراوح من اليباض الى الارجوانى  
والقرنيزي || انزهارها يستمر من الربيع الى الخريف .

#### ١٩٥٠٦ - عَيْتُونٌ مَشْرُومُ الْبِتَلَاتِ

*Pelargonium schizopetalum* (S). *Pelargonium à pétales déchiquetés* (F).

عشبة معمرة عشقوية الجمئة . ساقها لحية غليظة تملأ  
من ٣٥ الى ٥٥ سم . اوراقها مفصصة وشرة للتصل .  
انزهارها مسطحة الاذن ، مستعرضة البتلات المشروية .  
الصفراء اللون ، الحافة بالاحمر || انزهارها يستمر طوال  
فصل الصيف .

#### ١٩٥٠٧ - عَيْتُونٌ مَعْتَظَرٌ

*Pelargonium odoratissimum* (S). *Pelargonium très odorant* (F).

عشبة معمرة سرحة . ساقها فروعاً منتصبية ، تملأ نحو  
٥٠ سم . اوراقها مستديرة ، شبه قلبية ، مبهمة التفصيص .



عُيُونٌ عَشِيٌّ



عُيُونٌ كَبِيرُ الزَّهَرِ



عُيُونٌ مُخَطَّطٌ



عَيْقُ

# غ



غاب البحر



غادس

## ١٩٥١٩ - غادُس أسْمَر (S). Gadus aeglefinus (S).

Egle fin, Morue noire (F).  
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٤٠ و ٧٥ سم . اصطناعه شطوط بحار العالم القديم وهو لا يتنفس المياه الاقليمية لانه يعيش على اعماق يراوح بين ٢٠٠ و ٥٠٠ م .

## ١٩٥٢٠ - غادُس اطحل (S). Gadus hucus (S).

Gede tacud, Baraud, Godde, Mollet (F).  
نوع من الغادس المتوسط القد . طوله يراوح بين ٢٠ و ٥٠ سم . يتكاثر في البحر المتوسط . سره كبير العدد . يالغ المياه الاقليمية التي يراوح عمقها بين ١٠٠ و ٣٠٠ م .

## ١٩٥٢١ - غادُس العمق (S). Lota molva (S).

Morue barbus, M. longue, Molva (F).  
نوع من الغادس الكبير القد . طوله يراوح من ١٢٠ الى ١٥٠ سم . اصطناعه معظم بحار العالم . يالغ المياه البعيدة للذود التي يراوح بين ١٢٠٠ و ١٤٠٠ م .

## ١٩٥٢٢ - غادُس صغير (S). Gadus minutus (S).

Gade capelan, Capelan (F).  
نوع من الغادس صغير القد . طوله يراوح بين ١٥ و ٣٥ سم . سره كبير . العدد يحوي معظم البطار . يالغ المياه الاقليمية .

## ١٩٥٢٣ - غادُسيات ، غادُسيات (S). Gadidae (S).

Gadidae (S), Gadidae (F), Gadidae (E).  
فصيلة اسماك من المسارات . اجناسها وانواعها عديدة تتميز بمساقط اجسامها النحيلة الحوافش الرقيقة الناعمة . اصطناعها معظم بحار العالم . تألف الحياة المجامية . سرها يعد بعض ثنائ الأولف || اشهر اجناسها : الغادس والنبر والبقلة والنفلان واللط .

## ١٩٥١٤ - غاب البحر \* ، غابية (E). Millepora (S).

Millepora (S), Millepora (F), Millepora (E).  
جنس مديخ حدي من فصيلة الغابيات . انواعه المربعة قليلة العدد . اصطناعها بحار البلاد الحارة . جميعها قريبة الشبه من المرجان يتكاثر فيها اللزج الرخامي الاصفر المروج والاحمر الباهت والاصفر الحطلي .

## ١٩٥١٥ - غابية (E). Futale, Bois (F).

Forest of high trees (E).  
الغابية هي الاجرة او الحرجة التي سوكت اشجارها فبسقت وداحت وصارت صالحة للصناعة . ج غاب وقابات . وهي بمناها الشامل مجموعة نباتية تميزت ببيئتها ومختلف نباتاتها الطولية .

## ١٩٥١٦ - غابية (E). Forestier, Sylvicole (F).

Pertaining to forests, Living in woods (E).  
ما كان مختصاً بالغابات .

## ١٩٥١٧ - غابيات (S). Milleporidae (S).

Milleporidae (F), Milleporidae (E).  
فصيلة مديخ حديرة تعيش وتتكاثر في بحار البلاد الحارة . اشهر اجناسها غاب البحر .

## ١٩٥١٨ - غادُس \* ، غادُس ، غادُس (S). Gadus (S).

Gade, Morue (F), Cod, Codfish (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة الغادسيات . لحونها ما كولة ويستخرجون من اكبادها زيت السمك || انواعه عديدة تتميز باجسامها الاقليمية الشكل التي يراوح طولها من ١٥ الى ١٥٠ سم . فوكوها وسيدة القدية الطويلة . حيونها كثيرة جاسطة . اشهر انواعه ما يلي .

النبراء. وبعضها مسنج بضبوط قاطبة فخرية || هويا  
متوسطة الصنف = مأكولة.

## Ulmaceae

## ١٩٥٣١ - غارهاجيات

هي الاجريات ، اطليا .

## Lauraceae (S).

## Lauracées (F). Lauraceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة الثمرات . انواعها  
المعروفة زهاء ٩٠٠ تنتمي الى ٢٤ جنساً تنسب الى ثلاثة  
اسباط . جميعها اشجار ونباتات . اشخاصها صلبة صناعية .  
اوراقها ابيدة كاملة ، بسيطة ، متعاقبة ، معققة ، جامدة  
التصل . ازهارها عتقودية او عتقولة او حلقية التجميع ،  
محورية الاوتكاز . ثمارها زيتونية او نورية الشكل  
منها المأكولة والطبية والصناعية .

## Trigonellae (F).

## ١٩٥٣٣ - غاريقنا

هي الحلبة نبات عشبي من فصيلة القرنيات .

## Agaricus (S).

## Agaric (F). Agaric (E).

جنس ططور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات .  
انواعه زهاء ١٠٠٠ ، اصنافها العالم على اختلاف اقاليمه  
للمنتج من خط الاستواء الى القطبين الشمالي والجنوبي .  
يعيش على الزبل والعليل ويغثثل الاعضاء النباتية المنزلة  
وتشمل غدا السويق وثقله الجلود... منطها جناسي يؤدي  
ويجيت وبعضها ليل الطعم مأكلي || اشهر انواعه  
ما يتبع .

## ١٩٥٣٥ - غاريقون احيد

## Agaricus annularis (S). Agaric annulaire, Tête de méduse (F).

نوع من الفاريقون البري المؤذي الجمالي المادة القابلة  
يكثر في غابات واسراج جبال المناطق المعتدلة . يعيش  
ويتكاثر على اللحاء والاشعاب السائرة نحو الانحدار .

## ١٩٥٣٦ - غاريقون احمرش

## Agaricus colubrinus (S). Agaric couleuvré, Couleuvrée (F). Toadstool (E).

نوع من الفاريقون البري المأكول . يكثر في اسراج  
البلاد المعتدلة . يعيش على مخلف المواد النباتية المنسلة .

## ١٩٥٣٧ - غاريقون عسكي

## Armillaire de miel (F).

هو الطرخم ، اطليا .

## ١٩٥٣٨ - غاريقون قتال

## Agaricus necator (S).

## Agaric meurtrier, Morton (F).

نوع من الفاريقون البري الجمالي . مادته القابلة شديدة  
الاذى سمية . يعيش ويتكاثر على المواد المضوية المنسلة .

## ١٩٥٣٩ - غاريقون كبريتي

## Agaricus sulfureus (S). Agaric soufre (F).

نوع من الفاريقون البري الجمالي المؤذي . يكثر في  
الغابات الطليلة . يعيش على المواد المضوية المنسلة .  
لونه الى الصفار الكبريتي بين ويسود عند اكال نمو .

## ١٩٥٤٠ - غاريقون مخزلي

## Polyporus officinalis (S). Polypore officinal (F).

نظر من السميات ، يعيش على غدا سويق واغصان الاشجار  
الحرجية .

## Laurus nobilis (S).

١٩٥٢٤ - هكر \* وركند  
Laurier d'Apolon, L. franc, L. commun, L. des  
poètes, L. saucé (F). Laurel, Roman laurel, Sweet-  
bay (E). Edle lorbeer, Ehler lorbeerbaum (D).  
Alloro, Lauro franco, L. regio, L. poetico (I).

نوع اشجار برية وزيتينة من فصيلة الفاريات . ضروره  
مدينة . سويتا تملو من ١٠ الى ١٥ م . اوراقها ابيدة  
متعاقبة ، معققة ، متناوبة الشكل . تصلقات جاكه الصفحة  
الامعة ، عاين الخضار ، يطول من ٥ الى ١٤ سم . ويعرض  
من ٢ الى ٥ م . ازهارها صغيرة اللد ، خضقية اللون ،  
عتقولة التجميع ، محورية الاوتكاز . ثمارها زيتونية  
الشكل والحجم ، زرقاء اللون ، سواد المواج ، يستخرج  
منها زيت فاخر الصنف يدخل في صناعة الطوب .  
اوراقها فواحة العرف العطري وبني طيبة ، نقيها منه  
ومعشش اما كثره فمفيدة || وقد مثل النار دوراً مرموقاً  
في اثنان الثامر اذ كانت تضطر من اثنائه واوراه  
اكاليل الهيد الفزاة القاصين .

## Persae borbonica.

١٩٥٢٥ - هكر اجمر \*  
P. carolinensis (S). Laurier Bourbon, L. rouge,  
Persée de Caroline (F). Borbon laurel (E).

شجرة برية وزيتينة من فصيلة الفاريات . هيكلها جميل  
الشكل . ساقها تملو من ٨ الى ١٠ امتار . اوراقها اعليدية  
تطول من ١٥ الى ٢٠ سم . ويعرض من ٣ الى ٥ سم . تصلقاتها  
جامدة الصفحة اللامعة الشديدة الخضار الفواحة العرف  
المستحب . ازهارها جرسية الشكل ، عتقولة التجميع ،  
محورية الاوتكاز . نسيطة اللون ، ثلالية التركيب ، حلقية  
القفل والعتلات . ثمارها حمية الشكل ولقد ، زرقاء  
اللون ، سود المواج ، حمر الاذن || وهي من الاشجار  
السورية التي تجود في جميع الارضية البقية الدور ، للثوصلة  
الوطوية .

## ١٩٥٢٦ - هكر شيعي

## Rouge d'Orient (F).

هو صصلة الشرق ، حبة برية وزيتينة .

## Persae indica (S).

## ١٩٥٢٧ - هكر هندي

## Persée des Indes (F).

شجرة برية وزراعية من فصيلة الفاريات . اشعابها صلبة  
تصلح للصناعة . ساقها تملو من ٦ الى ٨ امتار . اوراقها  
بيضية مستطيلة ، تصلقاتها جامدة الصفحة ، جميل الخضار  
اللاس . ثمارها عناية الشكل واللقد ، مأكولة ، لليلة  
الطعم ، تنفع الصدر .

## ١٩٥٢٨ - هكر ورتي

## هو البصل ، اطليا .

## ١٩٥٢٩ - هكر ب

## Garrot (F). Withers (E).

عشر من جسم الحيوان يكون ما بين التمت والصورة في  
الحمل وما بين التمت والسائم في البير . وهو الذي يقلى  
عليه عظام البير اذا اوسل ليرعى حيث شاع . ج غراب .

## ١٩٥٣٠ - هكر ه

## Sillago (S).

## Sillago (F). Sillago (E).

جنس اسماء بحرية من شالكانت الزعانف وفصيلة التروغيات  
انولها المعروفة قليلة العدد اصنافها تمت من البير الاجر  
الى الخليج والهند الى اجسها مستطيلة الشكل  
كبيرة اللد ، تطول من ١٥ الى ٩٠ سم . وزونها صغيرة  
اسفينة الشكل . عيناها صغيرة مامحة . زعانفها الظهرية  
الاول شرعية الشكل تحمل شعماً بالغة الطول . زعانفها  
الذيلية مقعرة . اثنائها الى الشقيقة السمراء او الرمكة



غار



غار اجر



غاريقون اسيد



غاريقون اعرض



غار يقون قتال



غاريقون كبريتي



غاريقون مخزني

## ١٩٥٦ - غاريقون مريه \* ، طرثوث حلو

المالية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

*Agaricus edulis*, *A. campestris* (S). *Agaric comestible*, *A. champêtre*, *Champignon de couche* (F). *Field agaric*, *Mushroom* (E).

نوع من الفاريقون المأكول المشهور ، واسع الانتشار يزرع في الغامط . اسراره عديدة ، ألوانها مختلفة يكثر لها الاسفر والاسهل .

## ١٩٥٧ - غاريقونيات

*Agaricaceae* (S). *Agaricinae* (F). *Agaricaceae* (E).

فصيلة الطهور الفاريقونية من رتبة الثعالب . اجنتها وانواعها عديدة منها المأكولة كالغاريقون ومنها المؤذية زراعيها كالكرم والراسع والفسفة والكلوبية والكلتيوب || تتميز بكمال شكل ظهورها التي تتربك من قاعدة كروية تعلوها ساق اسطوانية تكلها ابرسة مستديرة . شبيها غرر اللادة ، ليد التجميع ، واقر الهيف ، يتكاثر ويعد طولا كاعطيان المغفولة تعلوها دامل صغيرة مدمية الشكل تؤلف نواة الفطر وقاعدة الزبكان .

## ١٩٥٨ - غاز

هو احدى حالات المادة الثلاث . تتميز الغازات من السوائل والاجسام الصلبة بقدرتها المطلقة على التمدد . وهي تثار بالضغط والحرارة ولكل منها وزن وكثافة .

## ١٩٥٩ - غاز الكربون

ومن اسماه غاز كربونك وسامس كربونك ، هو ثاني اكسيد الكربون ، اطلبه .

## ١٩٥٥ - غاسترولوب \* ، بطنية السنتك

*Gastrolobium* (S). *Gastrolobe* (F).

جنس نباتات جنينية سريرية معمرة من سبط البدلايات وفصيلة الثغريات الفرائية . انواعها الممرقة نحو ٣٠ منها استراليا . مظهرها بري وبشرها ترابي . حياكلها جيلة القلب . سوطها فرخ . اوراقها صغيرة مملقة متعاقبة . ازهارها متعقبة التجميع سفراء اللون او حمراء .

## ١٩٥٦ - غاسول \* هو إشنابو اساق ، اطلبه .

## ١٩٥٧ - غاسول التركيبي .

هو الظهرة البهرية ، اطلبه .

## ١٩٥٨ - غاسول زوي \* ، لنباتة شاككة

*Euphorbia spinosa*, *Tidymallus diffusus* (S). *Euphorbe épineux*, *Hippophaes des grecs* (F). *Hippophaeton* (E). *Pitula* (I).

جنبة برية طيبة من فصيلة البتويات ، صهارتها لبنة سائلة تمرط الشعر وتقطع الثوب . اصلها جبال حوض البحر المتوسط || ساقها خشوية فرخ . فروعها منتصب شاككة . اوراقها حاشنة ، رمية الشكل ، صغيرة اللد ، جامدة النصل . ازهارها فردية ، حامية ، فراء الين . يزورها مسطيلة ، مفلطحة ، متعيلة اللون ، ناعمة القشرة زائدة للنبدة .

## ١٩٥٩ - غاسول مصري

هو الظهرة البغدية ، اطلبه .

## ١٩٥٠ - غاسيف

*Chien de chasse* (F).

*Sporting dog* (E).

الغاسيف هو كلب الصيد من اي عرق كان . ج غصيف .

## ١٩٥١ - غاطية

المالية من الكرم طالت ساقها وصمت وانتشرت .

## ١٩٥٢ - غالكة

*Galathea* (S).

*Galathea* (F). *Galathea* (E).

جنس حيوانات مائية من الرضويات مسطبات الخياشيم والارجل بين فصيلة السيديات . انواعها الممرقة نحو ٧٠ بعضها نهري والآخر يعيش مع مصبات الانهر . يكثر ويوجد في القل والنبير || اصلها شبه قبة الشكل ، كبيرة اللد ، متساوية المصارع . ضاميا ثنائية ، طليقة ، صغيرة || لها كامة الصنف قل من يربط فيها .

## ١٩٥٣ - غالكة

*Aristolochia* (F).

هي الزولولة ، نبات يشبه المربون . ج غاغ .

## ١٩٥٤ - غاف

*Prosopeis* (S).

*Prosopeis*, *Prosope* (F). *Musquit bean*, *Sorow bean* (E). *Prosopeis*, *Ahranchelle* (D). *Prosopeis* (I).

جنس الشجار ونجيرات برية وزخنية من فصيلة الثغريات الفرائية . انواعها عديدة ، مهادا اللد . سوطها فرخ شاككة . اوراقها مركبة ، ريشية . وريقاتها لغمية سنائية . ازهارها سبلي التجميع ، عوروي الاذنك . ازهارها صغيرة اللد ، خافتة العرف ، متعيلة الاذنك . يزورها قرون رقيقة مسطيلة ، شبه مستديرة . يزورها بطنية مفلطحة .

## ١٩٥٥ - غالنت

*Agrimonia* (S). *Algremoine*, *Soubrette* (F). *Agrimonia*, *Cockle bur*, *Liverwort* (E). *Kleiner Odermennig*, *Laberkraut*, *Agrimonia* (D). *Agrimonia*, *Erba da sudata* (I).

جنس نباتات برية معمرة من سبط البليات مسطبة الزوديات . انواعها قليلة جميعها طيبة تفيد التهابات وشفاة العين || اشهرها الغانت البليات .

## ١٩٥٦ - غالنت غولاني

*Agrimonia eupatoria* (S). *Agrimonia eupatoria* (F).

نوع من الغالنت وهو نبات طبي بري معمر سليل . اوراقه ثنائية ، حركية ، وريجة التجميع . وريقاته بيضية الشكل ، نصلها بارز المورق ، سن الحافة . ازهاره سلبية ، حامية ، سفراء اللون ، تفيد شفاة العين والالتهابات اخصها التهاب الحنجرة .

## ١٩٥٧ - غالكة ، قاتل الماء ، غروب الماء

*Phalacrocorax* (S). *Cormoran* (F). *Cormorant* (E).

جنس طير من فصيلة البجيات ودية كليات القدم ، انواعه نحو ٤٠ منها الكبيرة الجثة والمتوسطة . طليط راوح من ٥٠ الى ١٠٠ سم . ألوانها عديدة الاذنك تكثر لها السمة الخضراء المارح . مناقبها جالسة مسطيلة محدبة الجهة المحدة || جميعها من طيور البلاد الباردة ولدتلة تعيش قرب الماء تألف الاسوار والقطوط العسرية . قوتها الاسماك الصغيرة . تدن بين المسور وفي الاجار . انبائها تنفع من ا الى ٥ يبيضات تخضبها بمناوبة اللدكور نحو ٤ اسابيع .

## ١٩٥٨ - غال \* ، ديك البحر

*Gallicthya* (S).

*Gal*, *Cocq de mer* (F). *Sea-cock* (E).

جنس اسماك بحرية من شاككات الزمائف وفصيلة الاسقمريات . انواعها الممرقة قليلة اللد ، اصلها بحار



غاريقون مريه



غاسترولوب



غاسول روسي



غالكة



غاف



غالنت غولاني



غال

الصفرة الزاوية . يكثر في المروج وفي المراعي الطبيعية . يقال انه يفيد الدود وينشط السن . وهو ينثر الحليب ويتعمل في الصناعات الصبغية . صباه احر اللون .

### ١٩٥٦٦ - غالليون صُنْبِيَّي

Galium cruciata (S). Gailliet croissette, Calille-lait croissette, Croissette (F). Crosswort bedstraw, Maywort (E). Kreuzabkraut (D). Prutimbrosa, Erba croce delle macchie (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه وفروعه واوراقه زباد . ازهاره صفراء اللون دقيقة الزناد . يتعمل في الصناعات الصبغية . صباه احر اللون .

### ١٩٥٦٧ - غامكة

Gamêta (F). Gamete (E).

هي الجسطة اي الحلية التناسلية البسيطة الجبلية .

### ١٩٥٦٨ - غاليط

Gadoue (F). Night-soil (E).

هو البراز او المادة من الاسمدة الضوية للتنشيط الخصبية .

متوسط ما يشمل من مواد رئيسية :

٩٠٪ ازوت .

٧٠٪ حافس فسفوري .

٢٥٪ بوتاس .

### ١٩٥٦٩ - غالكية

Téléologie (F). Teleology (E).

نظرية لسلفية ترتكز حل الغاية . وكل عمل سببه الهدف .

### ١٩٥٧٠ - غاياردية ، غاتير كشميري ، ناعورة

Gaillardia (S). Gaillardie, Gaillarde (F). Blanket flower (E). Malerblume, Kokardenblume, Burgunder (D). Galierdo (I).

جنس نباتات عشبية زرقونية مصرية من فصيلة المركبات

الاوربية الزهر . انواره وفروعه كثيرة العدد . اوراقها

متعاقبة صغيرة اللد متائلة النصل اللصيق . ازهارها متراكبة

الاربابي والاصفر . زراعتها الزرقونية شائعة ، تصلع في جميع

الارربة والمواقع .

### ١٩٥٧١ - غبادكة

Téphrosie toxique (F).

Fish poison plant (E). هي الحوراء المسكرة ، اطباها .

### ١٩٥٧٢ - غبارية

Mespilus pycnoloba (S).

Mespilus, Mespilier, Néflier des bois (F). Mespilus (E).

Mispel, Mispelbaum (D). Mespulo, Nespulo (I).

نوع من الاكيدنيا البيرية من فصيلة الورديات . اطباها

بعض جبال اليلد المتدلة الحاراة . يكثر ويندوها في

احراج الكريات وي هي شجرة شائكة تملو من ثمرين

الى ستة امتار . اوراقها عاتلة ، اهلجسية الشكل تطول

من ٨ الى ١٢ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ نصليا جامد

النسيج ، يارز البروق ، خلي البشرة على صفحت السفلى .

ازهارها كبيرة اللد ، صفر المأبر ، يفض البتلات . ثمارها

بنية اللون ، طسية اللعوق ، حازنة الطم ، تؤكل بمد

المزاراة .

### ١٩٥٧٣ - غباش

Photophobie (F).

Photophobia (E).

نمت تعريفه يطلق كل كل من يخشى النور .

### ١٩٥٧٤ - غباش

Opatrum (S). Opatra (F).

جنس خنافس صغيرة اللد من فصيلة البشيات . انواره

نحو ٣٠ طولا براوح بين ٥ و ٨ سم . ثوارها عاتقة يكثر

فيها الاسود والاصفر والاعشب . رفاقها طاملة ، غاشبة ،

النمط الحارة || اجسامها شبه مينية الشكل ، مبطة الجرم ، تطول من ٢٥ الى ٣٥ سم . وتعرض من ٢٥ الى ٢٥ سم . رؤوسها شبه يرمية الشكل ، ساحة الانطام ، صغيرة الاشداد . زعانفها الظهرية والشرعية متعاقبة متطابعا مع الزعانف الحوضية بعض الاالياف الحليطة المسطلة الضروفية المادة . زعانفها القلبية غائرة || لحريها كاعة الصنف ، قل من يقرب فيها || اعرف انواعها واشهرها النومان التاليان :

### ١٩٥٥٩ - فلال المتوسط

Gallichthys egypticus (S).

Gal de la mediterrannée (F).

طوله نحو ٢٥ سم . ثوبه الى الشبهة الفضية . يكثر ويجوده قرب الشطوط المصرية .

### ١٩٥٦٠ - فلال كبير

Gallichthys major (S).

Gal major (F).

طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه الى الشبهة الذهبية الموج . يكثر

ويجوده قرب الشطوط الهندية .

### ١٩٥٦١ - فلال

الفلال نبت . والفلال ارض مطعنة ذات حجر . ج غلان .

### ١٩٥٦٢ - غالليون

Galium (S).

Galiez, Calille-lait (F).

جنس نباتات عشبية برية حولية أو مصرية من فصيلة

الفرقيات . انواره المعروفة نحو ١٥٠ منها البالية والمرحوية

والصبغية . ساقها مصلمة رباعية . اوراقها غمية ،

متعاقبة ، صغيرة اللد ، فقيقة النصل ، مدبة المقصة .

ازهارها رباعية التركيب ، ابطية الاثكاز ، مسطيلة

الزناد ، يكثر فيها اللون الاصفر || اشهر انواعه ما يتبع .

### ١٩٥٦٣ - غالليون ابيض ، نصيقي ، حفيضة

Galium aparine (S). Gailliet aparine, Grataron, Apa-

rine, Rieble (F). Catch-weed, Cleavers, Goose grass

(E). Kiebelabkraut (D). Aparine, Asprella, Cappello

da signosi (I).

نوع من الفالليون البري الطبي . ساقه فرواه زباد . فروعه

دقيقة ، منتصبة ، لينة . اوراقها جامدة النصل ، حلية

البثرة . ازهاره يفسد اللون مسطيلة الزناد النحيل .

### ١٩٥٦٤ - غالليون المتعاقب

Galium palustre (S). Gailliet des marais, Calille-lait

des marais (F). Marsh bedstraw, Water bedstraw

(E). Sumpfakkraut (D). Stellina ruvida (I).

نوع من الفالليون المرصوي البري يقال انه ينثر الحليب .

يكثر في المتاعق ويوجد في المروج الرطبة ، رعاء اللماشية

بشوة فيسبها ويسمى درها .

### ١٩٥٦٥ - غالليون حقيقي ، غالليون اصفر ،

فلكة الابن

Galium verum (S).

Gailliet jaune, Calille-lait jaune (F). Cheese rennet,

Yellow bedstraw (E). Echte Labkraut (D). Gaglio

giallo, Erba zoffina, Erba nocca (I).

نوع من الفالليون البري المرصوي . ساقه فرواه . فروعه

نحيلة ومعددة . اوراقه فقيقة النصل الحدلي البشرة . ازهاره



فلال



فاليون ايش



فاليون المتاعق



فاليون حقيقي



فاليون صليبي



غارديه



غبارية

١٩٥٨ - غشيس، غشيس Goniosema (S).  
Goniosema (F), Goniosema (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة السلمونيات متفرجات الخانة.  
انواعه المعروفة قليلة العدد. اصطناعا جزر الفيليبين ||  
الشكل، فضية اللون او وردية || اصطناعا بحار البراد  
الحارة والمتحللة الحارة اعصها البحر الاحمر والخليج ||  
اشهر انواعها النمس القضي الذي يكثر في المتوسط.



غياش الكرمة

١٩٥٦ - غشيس، غشيس Tenebrio (S), Ténébrion (F).  
جنس حشرات خاضعة مؤذية من فصيلة الغشيات. انواعه  
نحو ٢٠ اشكالها واصحابها واؤها غفلة. تعيش على  
بعض المواد النباتية منها الحبوب والبقول والجلود || اعرف  
انواعه واضرها ما يلي.



غبر

١٩٥٨٧ - غشيس، غشيس Platycaulis gages (S).  
Ténébrion du tabac (F).  
نوع من البشعة يبي خنفساء فضية الشكل مقلعة طويلا  
نحو ١٠ م. ثوبها سوي السوداء فضي المراج الاربع.  
تركب شغل البشعة القوية تقترض السورق عند سطح الربة.  
تكاثرها يستعمل اسد الحواشير الفعالة تطيرا على الربة  
والنبات.



غبرور

١٩٥٨٨ - غشيس، غشيس Tribolium confusum (F).  
Tribolium confusum (F).  
حشرة من البشيات صغيرة القذ مقلعة. طويلا نحو ٤ م.  
لونها الى الكسبي البانيق يطول مواج احمر. تعيش على المواد  
المضوية في المظان وتخزن الحبوب والبقالة. رقتها دقيقة،  
غبراء، مستطيلة، حالية الجسم تعيش كاشطرة على الفتيق  
والحبوب المكسورة.



غبرون

١٩٥٨٩ - غشيس، غشيس Tenebrio molitor (S).  
Ténébrion meunier, Ver de farine (F), Mehlworm (E), Mehlkifer (D).  
خنفساء من البشيات، جسمها مستطيل الشكل مسطح، طويلا  
نحو ١٥ م. ثوبها الى البني الاسفع المراج. تعيش في  
المظان والافران. رقتها تسمى دودة الفتيق.



غشيس النبع

١٩٥٩٠ - غشيس، غشيس Pollucida (F), Pollucid (E).  
نمت تعريفي يطلق على كل ما هو نصف خفاف.



غشيس الفتيق

١٩٥٩١ - غشيس، غشيس Tenebrionidae (S).  
Ténébrionidae (F), Darkling beetles (E), Schwarzkäfer, Schattkäfer (D).  
فصيلة حشرات من رتبة غشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها  
زهاء ١٠٠٠٠ مظهرها من الحشرات غير المؤذية. اشكال  
خنافسها غفلة تكثر فيها الاستطالة ويحب البقي الاوسد.



غشيس المظان

١٩٥٩٢ - غشيات Tenebrionidae (S).  
Ténébrionidae (F), Darkling beetles (E), Schwarzkäfer, Schattkäfer (D).  
فصيلة حشرات من رتبة غشيات الاجنحة. اجناسها وانواعها  
زهاء ١٠٠٠٠ مظهرها من الحشرات غير المؤذية. اشكال  
خنافسها غفلة تكثر فيها الاستطالة ويحب البقي الاوسد.  
قربها الاستعمارية مركبة من ١١ فصلة. اراسع بزمزمها  
الاسمية والوسطى خمسية المقل اما الخلفية فرباعية || تألف  
الاماكن والمواقع المظلمة والاقية وما شبه. تعيش على  
بقايا المواد المضوية والنباتية. رقتها دودة الشكل تعيش  
في الربة على المواد النباتية والمضوية المتحللة او في  
دور الاغفل. اشهر اجناسها الازيدا والقباش والندبة  
والنفسا والافيتوفاغوس واللاشوس والميلازيا.

تعيش على جلود بعض النباتات البرية والزراعية اعصها  
الكرمة || اشهر انواعها غياش الكرمة.

### ١٩٥٧٥ - غشاش الكرمة \*

Opotrum sabulosum (S), Opstre sablonnier (F).  
نوع من الفباش طوله نحو ٨ م. ثوبه الى السوداء الداكن.  
يعيش في الربة الرطبة القليلة الانساج. يركب مع  
رقاته جلود الكرمة فيؤذيها.

١٩٥٧٦ - شبان، ريسان Scarus ghobban (S).  
Scar vort (F), Ghobban scar-fish (E).  
سمكة بحرية من بنات مسقار. توجد في المتوسط وفي بحار  
البلاد الحارة. ثوبها الى الربة الخضراء الزاوية. يقال  
انها لا تتوكل في زمن مرض المرجان لما قد يحويه لحمها  
من مواد سامة مؤذية.

١٩٥٧٧ - غشيب، غشيب، غشيب Panon (F).  
في جلدي تحت عتق البقرة.

١٩٥٧٨ - غشير \* Martangus (S).  
Merlan (F), Whiting (E).  
جنس اسماك بحرية من فصيلة النادسيات. انواعه المعروفة  
خسة تتميز باجسامها المستطيلة الشكل ويحرفها النجيلة  
الرقية. لحمها مأكولة. اكبادها وافر الماد الزيتية.  
جسمها من الاسماك المقترسة الية. تألف السمق وتعيش  
اسرابا وافر العدد || اشهر انواعها الثلاثة التالية.

١٩٥٧٩ - غشير المتوسط \* Martangus punctatus (S).  
Merlan pontassou, Pontassou (F), Pollack (E).  
نوع من الغبر يكثر في بحار البلاد الافريقية اعصها  
المتوسط والاطلس.

١٩٥٨٠ - غشير شائع \* Martangus vulgaris (S).  
Merlan commun (F), Common whiting (E).  
نوع من الغبر يوجد في معظم بحار العالم. يكثر في المحيط  
الاطلسي قرب الشواطئ الافريقية والاوربية.

١٩٥٨١ - غشير قشعي \* Martangus carbonarius (S).  
Merlan noir, Charbonnier (F), Coal-fish (E).  
نوع من الغبر يكثر في مياه بحار الشمال وفي البحر الاسود  
وفي المياه الاقليمية المنتجة من اليونان الى ليبيا.

١٩٥٨٢ - غشيرة \* في الارنتيوم، اطبل.

١٩٥٨٣ - غشيرة \* Endrepanis (S).  
Endrepanis (F).  
جنس طير من الجوام ريقات المناقير فضيلة المفترسات.

انواعه المعروفة قليلة العدد. اصطناعا جزر الفيليبين ||  
اجسامها صغيرة القذ، مستطيلة المتأدية الرقيقة، صغيرة  
الارصاغ الدقيقة والاذناب المستديرة الاطراف. اولياها  
تختلف بين الذكور والانات || اشهر انواعها واجلها  
غبرور صتير. ثوب الذكر الى الصفار المنحب.  
جناسه وذنبه الى البنفسجي. رأسه الى الخضراء الاسفع.  
قلته الى الحرة الابرجانية.

١٩٥٨٤ - غشيرة \* Exalte factoria (S).  
Caille naine (F), Dwarf quail (E).  
جنس طير من صابة الجحليات فضيلة الطيوريات.

انواعه المعروفة اربعة مظهرها مثل القاصي. تغني البانيق  
بشكلها وثوبها غير اشيا اصفر قذا وافتح ثوبا واقل طيرانا،  
تألف السهل والادغال وتدن في انصوص كالسبان.

## ١٩٦٠ - شَبْرَاءُ الْهِنْد (F). Sorbier des Indes

شجرة من الشبيرة مشهورة باسم عُشْبُ يَفْنَى ، الحلي .

## ١٩٦١ - شَبْرَاءُ اليابَان (S). Sorbus japonica

Sorbier du Japon (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية مهددة بالانقراض .  
تطول من ٥ إلى ١٥ م . أوراقها مفضضة ، بيضيه ، ذلقة ،  
تطوق من ٧ إلى ١٢ م . وتعرض من ٤ إلى ٨ م . فصوصها  
صغيرة ، ضيقة ، مسنة الحافة . تصلها خالي الصفعة  
الشغل ، كبير المروق التي يراوح عددها بين ١١ و ١٣  
زويماً || أثمارها بيض . ثمارها بيضية الشكل ، ارجوانية  
اللون ، منمشة بالانيش .

## ١٩٦٢ - شَبْرَاءُ امْرِيكَا (S). Sorbier americains

Sorbier d'Amérique (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية حرجية وريضية . أصلها  
بلاد امريكة الشمالية . تملو من ٤ إلى ١٠ أمتار . أوراقها  
مركبة وريضة التجميع . وريقتها اعليانية ذلقة تطول  
من ٢ إلى ١٠ م . وعددها يراوح بين ٩ و ١٧ .  
أثمارها كبيرة القذ ، غبراء اللون . ثمارها حامض الطعم .  
زاحية الحمرة الاربوانية ، كروية الشكل ، قطرها يراوح  
بين ٨ و ١٠ م .

## ١٩٦٣ - شَبْرَاءُ بَرِّيَّة \* ، شَبْرَاءُ مُنْهَضَة

Sorbus terminalis (S). Sorbier terminal, S. alster, Alster (F). Wild service tree, Chequer tree (E). Wilder Elsbeerbaum (D). Sorbezzolo, Ciavardello (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة حرجية سريرية شائعة تملو من  
١٠ إلى ٢٠ م . أوراقها مفضضة ، مائلة للبشرة ، عديدة  
المروق . فصوصها ضيقة لا متساوية السمك . عددها  
يراوح بين ٥ و ٩ || يتطاد أثمارها فائضة ، يدها  
اللون . ثمارها كروية ، مقطوعة الطرف ، حمراء اللون ،  
قطرها نحو ١٥ م .

## ١٩٦٤ - شَبْرَاءُ ذَرِيَّة

Sorbus cuspidata, Sorbus vestita (S). Sorbier cuspidé (F).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية وريضية ترطب  
في الموائل الباردة . تملو من ٣ إلى ٥ أمتار . ساقها  
واخضابها وأنانها والفنابا مزينة البهاء ، فنيها لبد التجميع  
قطني الشكل والون || أوراقها اعليانية ذرية تطول من  
١٠ إلى ٢٣ م . وتعرض من ٤ إلى ١١ م . تصلها خالي  
البشرة حل صفحتي . حثارة ثنائي القسطن ، حاد التجميع .  
ثمارها كروية الشكل ، مقطوعة القادة والطرف ، ارجوانية  
اللون ، صفراء الواج .

## ١٩٦٥ - شَبْرَاءُ سَوْدَاة الثَمَر

Sorbus melanocarpa (S). Sorbier à fruits noirs (F).

نوع من الشبيرة وهي جنبة عمرة برية وريضية تملو من  
١٠٠ إلى ١٥٠ م . أثمارها وأنانها زاه البهاء . أوراقها  
بيضية مستطيلة . تصلها جامد السجج ، مسن الحافة ،  
خالي الصفعة الشغل . ثمارها كروية الشكل مقطوعة  
الطرفين ، قطرها يراوح بين ١٠ و ١١ م . لونها ال  
السواد اللامع .

## ١٩٦٦ - عُشْبُ يَفْنَى \* ، رُوِيَاص

Goniosoma sphyraena, Argentina sphyraena (S). Goniosoma argentin, Argentine vulgaris (F). Common argentine, Silver-fish (E).

نوع من البقس . ممكة بحرية يعيش من السلمونيات  
أصلها سطر مناطق البحر الابيض المتوسط || سرسها  
الانحواط . لا تقرب من الشطوط والجنادج إلا في زين  
الفترة التي يند من اوائل شباط الى اواخر آذار || جسمها  
شبه دمي الشكل يميل من ١٥ الى ٢٠ سم . رأسها  
غروي القرون . لها واسع الشدق الذي ينتهي تحت العين .  
زمنها البالية غالية . سفها كبير القذ ، تلغض تحصر  
كل عام . ثوبا فني اللون يلبس كمرق القزل . ظهرها  
زني الخشاع || لها عيوط الصفب ، مأكول || تصاد  
من أجل الشنق الاثري الذي يملو جسمها وسانها لانه  
يدخل في صناعة تقليد القزل .



عُشْبُ يَفْنَى

## ١٩٦٧ - شَبْرَاءُ ، شَبْرَاءُ (E). Javelle (F). Loose shoot

نوع قبضات مجسمة من الزرع المحصد . والنبوط المكمنة  
بعض حلة ، راسها .

## ١٩٦٨ - شَبْرَاءُ ، شَبْرَاءُ (F). Fraude, Tromperie

Fraud, Cheat (E).

البن والبن : الخديعة في البيع والشراء .

## ١٩٦٩ - شَبْرَاءُ (S). Loechocarpus

Loechocarpa, Cubé (F).

جنس اشجار وجيرات برية وزراعية من فصيلة القرقيات  
الافريقية . منبها البلاد الحارة والاشترائية . يستخرج من  
جلودها مادة اروتونين التي تستعمل في اعادة الحشرات .

## ١٩٧٠ - شَبْرَاءُ ، شَبْرَاءُ (F). Sorbus (S). Sorbier

جنس اشجار وجيرات برية وزراعية من فصيلة الورديات  
انواعها عديدة مهددة الباء . أوراقها عابلة متعاقبة . أثمارها  
نورية التجميع . ثمارها تفاسية الشكل . صغيرة القذ ،  
مرجانية اللون ، حلزوة الطعم ، يستخرج منها يند التضمير  
والقطير مشروبات كحولية لا بأس بها || اما متوسط  
ما يحويه ثمارها من عناصر مفيدة فهو .

مواد ازوتية	٧ %
غلوكوز	١١ %
نضفات	١ %
حامض تفاسي	٠,٦٤ %
فيتامين ث	٢,٥ %

اغشائها عليه بامامة ، ناعة الرقعة تستعمل في صناعة  
التنزيل || اشرف اثمارها واشهرها ما يتبع .

## ١٩٧١ - شَبْرَاءُ الْحَبَالِين \* ، شَبْرَاءُ السَّمَر

Sorbus aucuparis (S). Sorbier des oiseaux, S. des oiseaux, S. sauvage, Cochéne (F). Mountain ash, Rowan (E). Gemeine Ebersche, Ebersche Vogelbeere (D). Sorbo salvatico, Sorbastrello, Timolna (I).

نوع من الشبيرة وهي شجرة سريرية برية شائعة تملو من  
١٢ الى ١٦ م . أثمارها وأنانها ولادها خلية . أوراقها  
مركبة وريضة التجميع ، وريقتها سنائية ، ذلقة ، مسنة الحافة .  
عددها يراوح بين ١١ و ١٧ || أثمارها كروية الرائحة .  
لثائية أو ربابية الاقلام . ثمارها ارجوانية كروية ، قطرها  
نحو ١٠ م .



غيراوا الحبالين



غيراوا برية





غيرة مبدولة



غيرة



غراف



غردة



غنيت

# ١٩٦١٤ - غنيتة \*

Fontinalis (S). Fontinale (F). Fontinalis (E).  
جنس طحالب من فصيلة الصرغيات . انواع المروقة قليلة العدد منها مجاري الماء والنامق في البلاد الممتدة الحرارة . جميعها من الطحالب الشطئية الممرودة . بعضها دقيقة كالسنة فغراء . اكياس بيضا تاجية الارتكاز .

## ١٩٦١٥ - شتال \* Escallure (F). Scalling (E).

انتقال القشور الاممي او الحرفشي الذي يلف الجسم عند بعض الحيوانات انحصا الفرحان .

## ١٩٦١٦ - شتراف \* Saurothera (S). Saurochère, Oiseau de pluie (F).

يدعونه طائر الغيث لانه ييش بقرب حلول المطر عندما يجهر البطاخ الى الغابات والاراج الغظيلة || جنس طير من فصيلة القيقويات . انواعه الممرقة ستة موطنها يمتد من الهند الى جزر الاكليل . ملجنا الحياتي جملي . جماعاتها قليلة العدد . قشرا الحشرات والديدان والثمار والبرور || اجسامها طولها من ٢ الى ٤٤ سم . بما فيه الذنب || رؤوسها مستدلة الحنجر . متفاديا مستطيلة . بيضاء الاخضر . اجسامها ذلقة . اذنانها بالغة الطول . مستدرة الاطراف . عجلية بخلة غطوط سود مستدرة يتاحها تيقع ابيض . انواها متراكبة الاذن فيها الاخضر والاصفر والاشقر والافبر والابيض والاسود || تثن احشائها في الاشجار القريبة . انبا تحسن من ٣ الى ٥ فيضات . القترن يستمر نحو ١٥ يوما تقوم به الاناث دون الذكور التي تكون لها القلاء .

## ١٩٦١٧ - شتركة \* Guettarda (S). Guettarde, Guettardie (F).

جنس طيور ونباتات برية طية من فصيلة القديرات . انواعها الممرقة ١٥ اصنافا بعض المناطق الاستوائية الاسوية والارامية || بعضها فغراء . اوراقها متطابقة . منقطة . اخضية . نصالها جامدة بيضه اللون او سناية . انزغراها محوري الارتكاز . انزغراها ثنائية او ثلاثية التجميع . انبوية الكأس . فاشرة البطلات . صطرية العرف . ثمارها نوية للغة . اشهر انواعها الثلاثة التالية :

## ١٩٦١٨ - شتركة انيقة \* G. formosa (S).

قشورها مطهرة تشمل لدل الجروح والقروح .

## ١٩٦١٩ - شتركة لتائية السكن \* G. dioca (S).

تقع قشورها دافع كسي .

## ١٩٦٢٠ - شتركة ملتصقة \* G. umbigua (S).

تقع قشورها مفر منشط .

## ١٩٦٢١ - غنيت \* Coroba cyanea (S).

Gu-guit bleu, Oiseau bleu (F). Gu-guit, Bluebird (E).

طائر من فصيلة اللغريات . موطنه بعض مناطق امريكة الجنوبية . يأنف الحياة الجماعية . ييش في الاراج ويسمر حل الابر التناسية في الجنان والحدائق || جسمه صغير الله . وثيق القوام . يطول نحو ١٢ سم . لونه جميل

# ١٩٦٠٦ - غيرة صوبانية Sorbus umbellata, Pirus meridionalis (S). Sorbier en ombelles (F).

نوع من الغيرة وهي شجرة سبوتية برية وتزيينة تملو من ٣ الى ٦ امار . هيكلها صوباني الشكل . اوراقها منقسمة مستعرضة طولها من ٥ الى ٧ سم . وتفرس من ٤ الى ٦ سم . تملوها خلى المنقسمة السفلى . حارة ثنائي التنين || ثمارها بيضه الشكل . اربوانية اللون .

## ١٩٦٠٧ - غيرة فنلندية Sorbus fenica (S). Sorbier finlandais (F).

نوع من النبراء وهي شجرة برية وتزيينة مدها غنيتة . ترب في الاقاليم الباردة . تملو من ٥ الى ١٢ م . اوراقها مركبة تملو من ٨ الى ١٦ سم . وتفرس من ٤ الى ٧ سم . نصلها عديد الفروع خلى البشرة . اريد الصفة السفلى . ثمارها مأكلة . قليلة الحوضمة . برفالية اللون . كروية الشكل . طولها يراوح بين ١٠ و ١٢ سم .

## ١٩٦٠٨ - غيرة مبدولة Sorbus domestica (S). Sorbier domestique, Cornier (F). Common service tree (E). Echar Spierling (D). Sorbo domestico, Sorbo gentile (I).

نوع من الغيرة وهي شجرة سبوتية برية مبدولة تملو من ٣ الى ١٢ م . براعمها لزينة . اوراقها مركبة وتزيينة التجميع وريقاتها سناية ذلقة طولها من ٤ الى ٥ سم . وتفرس من ١٥ الى ٢٠ سم . مدها يراوح بين ١٥ و ٢١ سم . نصلها يجر خلى البشرة ثم يفقد الحبل مع البسر || انزغراها غيرة اللون . خماسية الاكلام . ثمارها اجاصية الشكل مأكلة . طولها من ١٥ الى ٣٠ سم . لونها ابيض الصفرة يطولوا توشيح احمر ونفحة سمر .

## ١٩٦٠٩ - غيرة صخشية الورق Sorbus alnifolia (S). Sorbier à feuilles d'aune (F).

نوع من الغيرة وهي شجرة حرجية سبوتية مدها البان . تملو من ٥ الى ١٥ م . اوراقها بيضه ذلقة . تشبه اوراق الخش . طولها من ٦ الى ٨ سم . وتفرس من ٤ الى ٥ سم . نصلها احضر الصنحتين . سنن الخلفة . انزغراها ييش . ثمارها بيضه الشكل . اربوانية اللون صغر المولج . طولها نحو ١٢ سم .

## ١٩٦١٠ - غيرة البورغ Spore

هي البورغ . اطليه .

## ١٩٦١١ - غيرات Sporozeum (F). Sporozea (E).

هي البويات . اطليا .

## ١٩٦١٢ - غيرات بوطية Microsporidies

هي البويات الغظلية التي تيش حل الحشرات والقشريات .

## ١٩٦١٣ - غيتي Eremobium (S). Eremobia (F).

جنس نباتات عشية حولية برية من فصيلة الصليبات . انواعه الممرقة قليلة العدد . جميعها من ثبوت بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || بعضها قصيرة . فغراء . كلفة الزنب المستطيل . اوراقها متراكبة . غيقة النصال . شبه صفيحة الشكل || انزغراها صغيرة . ودية اللون . تنويرها ديبى .

الآرية الجسية وتُزَنّ فيها العسل والطلع || اجسامها قريبة الشبه بأجسام ذكور النحل. قوتها الاستعمارية مستطيلة. ظهورها وبطنها كثيفة الزغب. أظفارها تختلف مع اختلاف الأنواع.

### ١٩٦٢٨ - عُفْرِي

النثري والعفري من الزرد هو الذي تسميه السماء. ويسمى العفري.

### ١٩٦٢٩ - عُجُوم

Gobio (S).  
Goujon (F). Gudgeon (E).  
جنس سمك نهري من فصيلة الشبديات. أنواعه قليلة جميعها مهمة قوتها التبدان والسمانوس والشرابات وهي مستطيلة الشكل والمذاقات. أصلها بمحيطات البلاد الآسيوية والاروپية تنجهر الى الانهار في زين السرة وقد يكون ذلك في اواسط الربيع ثم تدمج اليها في اواخر الصيف || أشهر أنواعه العجوم الشائع.

Gobio fluviatilis (S).  
Gujon commun (F). Common gudgeon (E).  
نوع من العجوم وهو سمكة نهريّة طول نحو ١٢ سم. جسمها مستطيل الشكل، زعانفها كبيرة، عذنيها متدليتان. ثوبها الى الربة القضيّة، ظهرها متابع للتبدان الاصفر. ترطب في المياه العذبة الصافية. سرورها يتسمر من ايار الى اواخر تموز. تنحرج بانفائها فوق الصخور فتلتصق بها وتبقى الى ان يتم التفت وقد يكون ذلك بعد السرة باربعة او خمسة اسابيع. لحمها للذيد الطعم مرغوب فيه.

١٩٦٣١ - عُذْكَو \* عُذْرُ \* قُرْدُب المتابع،  
عصا الراعي الزياء  
Polygnum Iapathifolium (S). Renouée à feuilles de patience (F). Pale persicaria, Willow weed (E). Ampferknechtchen, Pfirsichäcker (D). Persicaria, Erba pepe (I).  
نوع من القردوب وهو نبات بري متقني ممر. ساقه فروعاً تملو من ٦٠ الى ١٢٠ سم. فروعها دقيقة زياء اللحم. اوراقه متناوبة حافضية الشكل طول من ٢ الى ٨ سم. نصلها خلى البشرة، اطبل الخضار. ازهاره سنبل التجميع. سناكه طول من ٨ الى ٨ سم. ازهاره وديّة اللون.

١٩٦٣٢ - عُذْكَو \*  
Aplisus (S). Apliste (F).  
سمكة بحرية من شاكيات الزمانات وفصيلة الطرنيحات. أصلها تقتل جمع يحار المناطق الاستوائية وألحانة || جسمها بطول من ٣ الى ٥٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها ماصحتان. شفتها متدل الرخابة. عذنيها صغيرتان. ثوبها الى الربة القضيّة المتناوبة الامحاجت السمر. الذيلية الظهرية كبيرة، مستطيلة، شاككة المناخس. الذيلية مستديرة الطرف. الشريية ثلاثية المناخس الحادة. الصدريّة مستطيلة كالجنح واما التناخس تسعين بها لقفز فوق الماء || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

١٩٦٣٣ - عُذْكَاف \* عُذْكَاف \* عُزْوَاب القيط  
Corvus frugilegus (S). Corbeau freux, C. chauve, Freux (F). Rook (E).  
غذاف وغذاف ج غذفان. طائر من الزربان متوسط الحجم طول نحو ٥٠ سم. ثوبه الى السود الاضعف المزاج، ريشه يلس بحجرة. منقاره ورجلاه الى الرمادي الاسمر || وهو

اللون الساطع. وذاؤه الى الزرقاء الجسيلة. جناحاه وذنبه واعل ظهوره الى السود الاسمر. عناق قوته وياهره الى الصفار الزاهر. منقاره دقيق مستطيل. حلقه صبه زرقاء اللون. جناحه ذات الطرف. ذنبه قصير الجرم، فارقة الطرف. ريشه دقيق الحبل اللون || طيرانه خفيف الحركة. قوته العسل والحشرات الصغيرة والبار الياينة || يذنب منه في الاجنار القنار الاربعة الفل. الانثى تضع ٤ او ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٥ يوماً.

### ١٩٦٢٢ - عُفِل

يقال ففل اخرج اذا كثر فيه الشجر وكثك الحديقة واري مكان كان.

### ١٩٦٢٣ - عُفْ

نبت يختص به ويؤكل في الجذب. صبه يشبه الجابروس. وهو من تجيل السباغ (السان).

### ١٩٦٢٤ - عُفْكَه

هو الحسا، اعليه.

### ١٩٦٢٥ - عُفْكَات \*

Capito (S).  
Capito (F). Capito (E).  
الاسم العلمي من اللاتيني يعني غليظ الرأس. جلس طير من فصيلة الكشائيات. انواعه المعروفة نحو ١٧ جميعها من محل امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة القد طول من ١٤ الى ١٧ سم. رؤسها غليظة. منقارها عذريّة الشكل. شليمة. سبالها كثيفة. تتميز بلبان الاوتاب بين الذكور والاناث. اوتاب الذكور متراكبة الاوتاب الجسيلة، يكثر فيها الاضمحمر في الاحمر والاصفر. الاناث عادمة الاحمر كيرة الاصفر والاعضر اجنتها صغيرة، ذلقة الاطراف. اذنانها مستطيلة || قوتها الحشرات على اختلاف فصائلها وانواعها || لثنت احشائها في تجلوف الاجنار وصندوقها. انثيا تبني من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوبة الذكر نحو ١٣ يوماً.

### ١٩٦٢٦ - عُفْكَائِيَات \*

Capitonidae (S).  
Capitonidae (F). Capitonidae (E).  
فصيلة طير من المتشقات. اجناسها وانواعها المعروفة مدينة منتشرة في معظم المناطق الاستوائية والحرارة من الملائين القديم والجديد || طيورها صغيرة القد او متوسطة، جملة الاولان المتناطقة والمراكية. تتميز بكثافة سبالها التي تمتد في بعض الاوتاب، حتى الزود. منقارها غليظة تشبه غرورية الشكل. اجنتها مستدلة الطول او قصيرة. اذنانها مقعولة او مستديرة. قوتها قصيرة، شديدة النشط || طيراتها قصير الشوط. تتساق الاجنار خفة اما انتقائاً على الارض فيطير || قدتن امشاشها اما في تجلوف الاجنار او في حاجر تحضرها في التربة || أشهر اجناسها الغنات والبريكان وقاطرطوف.

### ١٩٦٢٧ - عُفْكَوَة \*

Eucera (S).  
Eucera (F). Eucera (E).  
جنس حشرات جارية لاهقة من غشائيات الاجنحة الحمويات وفصيلة التورليات. انواعها المعروفة نحو ٦٠ منتشرة في جميع اصقاع البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. قوتها رقيق الازهار ويكويها. مليتها الحياتي جماعي، جامعاها قليلة العدد تختلف من ذكور واناث تملس سوية في سبل الحياة والبقاء. تنهي مشاغلها على الحيطان وتي



عُفَات



عُجُوم شائع



عُذْر



عُذْكَوَة



عُذْكَاف

١٩٦٥ - عُدَّة مَسْتَعْرِبَةٍ ، عُدَّة مَحْتَرِبَةٍ

Thymus (F). Thymus gland (E).

هي غدة المتة السفلى في الحيوان .

١٩٦٥١ - عُدَّة مِسْقَادِيَّة

Glande copulatrice (F).

Copulatory gland (E).

١٩٦٥٢ - عُدَّة مَسْرُجِيَّة

Glande anale (F).

Anal gland (E).

١٩٦٥٣ - عُدَّة مَشْعُرِيَّة

Bulbe pileux (F).

Hair-gland (E).

١٩٦٥٤ - عُدَّة مَصَيَّاه

Endocrine, Glande close (F).

Endocrine, Ductless gland (E).

١٩٦٥٥ - عُدَّة مَصَوَّبَرِيَّة

Apophyse (F).

Apophys (E).

هي التبرغوب ، اطليه .

١٩٦٥٦ - عُدَّة مَسْرُجِيَّة

هي بقعة الكلية .

١٩٦٥٧ - عُدَّة عَجَالِيَّة

Glande périnéale,

G. périnéenne (F). Perineal gland (E).

١٩٦٥٨ - عُدَّة قَلَوِيَّة

Glande alcaline (F).

Alkaline gland (E).

١٩٦٥٩ - عُدَّة كُنُتِيَّة

Glande conglobée (F).

Conglobate gland (E).

١٩٦٦٠ - عُدَّة كِلْسِيَّة

Glande calcifère (F).

Calciferous gland (E).

١٩٦٦١ - عُدَّة لَاحِقَةٍ

هي اللبنة الاضافية .

١٩٦٦٢ - عُدَّة لُعَابِيَّة ، لَوَزَةُ الرُّطَب

Glande salivare (F).

Salivary gland (E).

١٩٦٦٣ - عُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة ، عُدَّة لِيْمْفَاتِيَّة

Glande lymphatique (F).

Lymph gland, Lymphatic gland, Lymphaden (E).

١٩٦٦٤ - عُدَّة مَحْبِيَّة

Glande vitelline (F).

Vitelline gland (E).

١٩٦٦٥ - عُدَّة مَخْطَاطِيَّة

Glande muqueuse (F).

Mucous gland (E).

١٩٦٦٦ - عُدَّة مَرِيئِيَّة

Glande œsophagienne (F).

Esophageal gland (E)

Glande séreuse (F).

Serous gland (E).

Glande gastrique (F).

Gastric gland (E).

١٩٦٦٧ - عُدَّة مَصْلِيَّة

Glande pituitaire, Hypophyse (F).

Pituitary gland, Hypophys (E).

هي غدة قاعدة اللسان .

١٩٦٧٠ - عُدَّة نَسَالِيَّة

Glande du byssus (F).

Byssus gland (E).

١٩٦٧١ - عُدَّة نَكْفِيَّة

Glande parotide (F).

Parotid gland (E).

١٩٦٧٢ - عُدَّة هَضْمِيَّة

Glande digestive (F).

Digestive gland (E).

١٩٦٧٣ - عُدَّة د

الغدد هو طاعون الايل .

من القواقع يحوي الشرق الادنى واروية وافريقية الشمالية والشرقية . يأتلف الحقل والسهول المزروعة المبيسة بالاجمار . قوته الحشرات والديدان والحويوب . يكثر منه في الاجمار . اثناء قضم من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وسحما . يصير من البلوير الفارة لانه يلتهم البذار ويتقيى على الحب الناتش .

١٩٦٣٤ - عُدَّة كَالَمَة

Anisogamie (F).

Anisogamy (E).

الندافة احدى طرائق الانسال الثنائي و كنديز ، مضافاً ، بياضن التفامات الوراثية الذكرية والانثوية من حيث الشكل والحجم والرتول .

١٩٦٣٥ - عُدَّة

Glande (F). Gland (E).

عضو في الجسم يفرز مواد خاصة كالقلب والغدد والغرق والحليب الخ .

١٩٦٣٦ - عُدَّة اِصْطَالِيَّة ، عُدَّة لَاحِقَةٍ

Glande accessoire (F).

Accessory gland (E).

١٩٦٣٧ - عُدَّة الرِّحِيْق ، عُدَّة المَغْشَر

Nectaire (F).

Nectary, Honey-cup (E).

عضو غدي يتميز به بعض الازهار يفرز عصارة سكرية تسمى الرقيق او مغش الزهر يجربها النحل .

١٩٦٣٨ - عُدَّة العَرَق

Glande sudorifère,

G. sudoripare (F). Sudoriferous gland, Sudoriparous gland (E).

١٩٦٣٩ - عُدَّة اِنْتِجَامِيَّة

Glande lysigène (F).

Lysigenous gland (E).

١٩٦٤٠ - عُدَّة بَلْعَمِيَّة

هي اللبنة التناسلية .

١٩٦٤١ - عُدَّة مَتَسَلِيَّة

Gonade (F). Gonad (E).

Gonad (E).

١٩٦٤٢ - عُدَّة ثَوْبِيَّة

Glande moriforme (F).

Moriform gland (E).

١٩٦٤٣ - عُدَّة قَدِيَّة ، عُدَّة مَسْرُجِيَّة

Glande mammaire (F).

Mammary gland (E).

١٩٦٤٤ - عُدَّة مَحْمِيَّة

Glande acide (F).

Acid gland (E).

١٩٦٤٥ - عُدَّة دَبْرِيَّة

Glande uropygiale (F).

Uropygial gland (E).

١٩٦٤٦ - عُدَّة دَرَقِيَّة

Glande thyroïde (F).

Thyroid gland (E).

١٩٦٤٧ - عُدَّة دُهْنِيَّة

Glande sébacée (F).

Sebaceous gland (E).

١٩٦٤٨ - عُدَّة دَمَطِيَّة

Glande uropygiale (F).

Uropygial gland (E).

اللبنة السطوية غدة ، مركزها في الزئلك اي البطن ، تفرز مادة دهنية يستعملها الطائر في سفل ريشه . وتسمى أيضاً غدة دبورية .

١٩٦٤٩ - عُدَّة رَحِيْقِيَّة

Glande nectarifère (F).

Nectariferous gland (E).

انواعه عديدة . سيقها فراء . فروجها زباد اللحم . اوراقها مسنقة ، غمية ، ثلاثية التجميع . نصلها اهليلجي الشكل . مقعر الصفحة . انزهارها سبيل التجميع ، طرفي الزركاز . ازهارها عشوية ، صغيرة القد ، صفراء اللون ، خضر الملمع .

Scyllium (S). **عُقَاب** ١٩٦٨٨  
Roussette, Chien de mer (F). Dog-fish (E).  
جنس اسماك بحرية من القرشيات . انواعه المروفة قليلة . اجسامها مسطحة ريشية . جلودها غشيت مدنية الحراشف . لحوها مأكلة متصلة الصنف || اعرفها واشهرها الفراء النشفة والقراب المدبجة .

Scyllium catulus (S). **عُقَاب هُدْبَجَة** \* ١٩٦٨٩  
Roussette à grandes taches (F). Lesser spotted (E).  
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . طولها نحو ١٠٠ سم . ثوبها الى الصبغة الصفراء ، يملؤها تديج لا يقاسي الرقعة والقرن تكثر فيه الاستدارة والسواد البنفسجي المزاج .

Scyllium canalicul (S). **عُقَاب مُنْمَطَة** \* ١٩٦٩٠  
Roussette à petites taches (F).  
نوع من الفراء ، موطنها المتوسط والمحيط الاطلسي . طولها نحو ٨٠ سم . ثوبها الى الصبغة المنشفة بالكحج .

### ١٩٦٩١ - عُقَابِيَّات ، كَوْسَجِيَّات

Scyllorhinidae, Oractolobidae (S).  
Scyllorhinidae, Oractolobidae (F). Scyllorhinidae, Oractolobidae (E).

فصيلة اسماك مفترسة من رتبة الاضلاع . اجناسها المعروفة قليلة العدد منها البويض والسرايد . اعطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة || اجسامها مسطحة وشعية الشكل . اعطائها ذلقة شارب . اسنانها مشاربة حادة تقطع كل شيء . زعانفها كبيرة . تتميز بزعانفها الشيلية المثلثة الانعكاسية الجرم اذ يفوق حجم الفلقة العليا ضمت حجم الفلقة السفلى || اشهر اجناسها الفراء والكوسج .

la Corbeau (F). **عُقَاب** ، **عُصْبَاء** ، **يَسْمَانِي** ١٩٦٩٢  
Corvus (E).  
القراب والنباء الياباني اسمان لكوكبية جنوبية مركبةا غلبت الباطية على جنوب السبك الاوزل || عدد نجومها سبعة والعرب تسميها حلة « حبر الاسم » او « عرش السبك الاوزل » او « الأحال » . ومن هذه الكوكبية نجمان مزيجيان الاول منها يدعى « حباب » او « سبا » او « مقار » والقراب . والثاني يدعى « الجبلج » او « جناح القراب الامين » .

Corvus (S). **عُقَاب** ١٩٦٩٣  
Corbeau (F). Crow (E).

سبي غراباً لسواده . ج غرابان واغربة واغرب واغرب واغرب . كتيه ابو حاتم وابو جنداد وابو الجراح وابو سذر وابو زيدان وابو زاجر وابو الشؤم وابو غيث وابو القمقاع وابو المرقال . ويقال له ابن الارض وابن برع وابن دابة . جنس طير من فصيلة القرابيات ورتبة الجوارح . انواعه ١٠ منتشرة في جميع اقطار العالم . اشهرها القراب الاسم والابنم والاصم والاكمل والاورق والقراب والقراب والابنم معظمها من القواطع وبضها من الاوابد . قوتها الحشرات والديدان والحيوانات والاسماك والقرشيات وبادر الزروع والحبوب النافثة . تمن في الاجمار الليلية . انها تصنع من ٣ الى ٥ بيضات تحضنها وحدها .

١٩٦٩٤ - **عُدَّة تَسْلِيَّة ، عُدَّة شَقِيَّة**  
Glandes génitales, G. sexuelles (F). Genital glands, Sexual glands (E).  
هي الغدد التي تفرز المواد التناسلية من شلج وبيضات .

١٩٦٩٥ - **عُدْرَانِي ، عُدْرِي ، مَتَعِي**  
Palusce (F). Paludal (E).

نمت تعريف يطلق على كل نبات يعيش في البندان .

١٩٦٩٦ - **هَدَقَة**  
Testa  
الغلاف الخارجى البيضاء والبزرة .

١٩٦٩٧ - **هَدَقِي**  
Pluie (F). Rain (E).  
التدق هو المطر فاذا كثر قطره فهو غادق . وغدت الارض : اجلت بالندق فاعصبت .

١٩٦٩٨ - **هَدَقِي**  
Très fertile (F). Very fertile (E).  
نمت تعريف يدل على الفزارة .

١٩٦٩٩ - **هَدَقِي**  
Glandulaire, Adénoïde (F).  
Glandular, Adenoid (E).

١٩٦٨٠ - **هَدْرِي** \*  
Limnétique (F).  
Limnetic (E).

نمت تعريف يطلق على كل ما له صلة بالبندان والمنابع والاقوار والبيمرات . كقولك انبتت الهديرية .

١٩٦٨١ - **هَدَا**  
Urine du chameau  
الندا هو بول الجمل .

١٩٦٨٢ - **هَدَاك**  
Aliment  
هو ما به نجا الجسم والحفاظ عليه وهو جزء للامدة الغذائية الذي يتحول منه الحيوان ، في جهاز الهضم ، الى صالح ينقل الى الدم فيغذي الجسم . وهو من النباتات ما يتحول الى الفولة من نسع صاعد بلعل الى نسع سحوي كاسل . (راجع حلف) .

١٩٦٨٣ - **هَدَامَة**  
Brasénia (S). Brasénia (F).  
غداة ج خذم وخذام . نبات وسيد الجنس والنوع من فصيلة النيفرديات . اصلها منافع العالم القديم . ساقه فراء تكسها غشمة لزبية . اوراقه مسنقة ، سنائية تطول من ١٠ الى ١٠٠ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها ملس البشرة اللامعة - آخر الصفحة السفلى وسنار العليا . ازهارها صفيرة القد ، قطرها نحو ١٠ سم . ثوبها الى القبيص الاخضر || ازهارها يسمر من حمور الى اواخر الخريف .

١٩٦٨٤ - **هَدَدِي ، هَدَوِي**  
Festus  
الندي والفتوي : كل ما في بطون الحوامل اسمها الشاء .

١٩٦٨٥ - **هَدَر**  
Abecquer (F). To fond (E).  
غر هادار قرنه اي زقه . للفرار : اترق .

١٩٦٨٦ - **هَدَر**  
قال الانصاري : الفَرَّ طير سود يبيض الرووس من طير الماء . الواحدة غرة . الذكر والاني في ذلك سواء (ابن سيدة) . والفَرَّ الجمل هو الاختنورة ، الحليها .

١٩٦٨٧ - **هَدَرَام** \*  
Peperomita (S).  
Pépéromie (F). Pepper elder (E). Pfeffergesicht (D).  
Pope porporino (I).  
جنس نباتات حبيبية عشوية معمرة من فصيلة النفلديات .



غرَام



غرَام مدبجة



غرَام منشفة

١٩٧٠٤ - **غُرَابِيَّاتُ الْمَنَافِيرِ** (F). *Coracrodontes* (F).  
رَبِيَّةٌ مِنَ الطُّيُورِ الْجَوَائِمِ تُشَمَلُ بِمَعْنَى الْقَصَاصِ . اِشْتَرَاهَا  
لِقَرَابَاتِهَا وَالزُّرُورِيَّاتِ .



غُرَابِ أَبْعَ

١٩٧٠٥ - **غُرَامُكَ**  
الْقِرَادَةُ ج غُرَامٌ . غُرَابٌ مِنَ الْكَلَامَةِ (الْأَسَانِ) .

١٩٧٠٦ - **غُرُوكٌ ، قَدْرُوكٌ** (F). *Interligne* (F).  
*Space-line, Lead* (E).  
الْحَافِظَةُ بَيْنَ الرِّقَاقِ وَالرِّقَاقِ أَوْ بَيْنَ السَّرِيفِ وَالسَّرِيفِ  
أَوْ بَيْنَ الْخَطِّ وَالْخَطِّ فِي الْقُرْسِ لِلنَّصِّ الْمُسَطَّرِ .



غُرَابِ أَسَمِ

١٩٧٠٧ - **غُرُوكٌ** (F). *Etoile du matin* (F).  
*Morning star* (E).  
الْقَدَرُوكُ هُوَ نَجْمُ الصَّبَحِ لِأَنَّهُ يَبْرُقُ بِطَرَفِ النُّجُومِ .

١٩٧٠٨ - **غُرَابِيَّةٌ** (F). *Gratiola* (S). *Gratiola* (F).  
جَنَسٌ مِنْ نَبَاتَاتٍ عَشْبِيَّةٍ بِرَبْعَةِ مَسَرَّةٍ مِنْ صِلَةِ الْخَافِزِيَّاتِ .  
أَنْوَامُهَا نَحْوُ ٢٠ مُتَشَكِّتَةٌ فِي جَمِيعِ الْأَصْغَارِ الْمُتَدَلِّهِ الْخَرَابَةِ .  
أَوْرَاقُهَا مُتَقَابِلَةٌ حَامِصَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ أَوْ خَلْصِيَّةٌ لِمُرُوقِ الْهَلِيلِيَّةِ  
تُحْصَلُ السَّيْنُ الْخَافَةِ . أَنْبَارُهَا قَرِيبَةٌ أَبْيَضَةٌ ثَلَاثِيَّةٌ الْوَلَنُ  
يُغْلَبُ فِيهَا الْأَصْفَرُ وَالْوَدِيدِي فِي أَشْهُرِ أَنْوَامِهَا الْفَرَايِدُ  
الْحَزْنِيَّةِ .



غُرَابِ أَسَمِ

١٩٧٠٩ - **غُرَابِيَّةٌ مَعْرِيفِيَّةٌ** ، **عَقِيْقِيَّةٌ**  
**الْمَعْرِفَةِ** ، **عَشْبَةُ الْمَعْرِفَةِ**

*Gratiola officinalis* (S). *Gratiola officinale*, *Herbe*  
*au pauvre homme* (F). *Hedge hyssop*, *Poor-man's*  
*herb* (E). *Echta Gnadenkraut* (D). *Gratiola*, *Piccola*  
*digitalis* (I).

نَوْعٌ مِنَ الْفَرَايِدِ هُوَ نَبَاتٌ عَشْبِيٌّ يَرِي مَعْرُوفٌ جُلُومِيٌّ  
يُعْمَشُ فِي الشَّجَرِ وَفِي الْغُلَامِ الْمَاءِ يَحْمِلُ مِنْ ٢٠ إِلَى ٦٠ سَمًا .  
أَوْرَاقُهَا أَهْلِيَّةٌ خَفِيفَةٌ تُحْصَلُ . أَنْبَارُهَا أَبْيَضَةٌ مُنْقَطِعَةٌ ، صَفْرَاءُ  
الْبُيُوتِ ، وَرَبِيَّةٌ خَفِيفَةٌ فِي السَّيْنِ . يَسْتَعْمَلُ كَأَسَدٍ نَافِعٍ مَعَ الْعِلْمِ  
أَنَّهُ مِنَ النَّبَاتَاتِ السَّامَةِ الَّتِي تُوجِبُ الْمَوْتَ .



غُرَابِ الدَّرَجِ

١٩٧١٠ - **غُرَامٌ** (F). *Gramme* (F). *Gramme*, *Gram* (E).  
وَسَعْدَةٌ وَزْنِيَّةٌ ، الْأَوْنُ مِنْهَا يَسَاوِي كِيلُوغَرَامًا .



غُرَابِ لُبْنَانِي

١٩٧١١ - **غُرَامَةُ** (F). *Amende*, *Pénalité* (F).  
*Fine*, *Penalty* (E).  
جَزَاءٌ لِقَدْ يَفْرَضُ بِصَفَةِ عَقُوبَةٍ .

١٩٧١٢ - **غُرَامَةُ إِجْرَائِيَّةٌ** (F). *Amende de procédure* (F). *Fine of procedure* (E).  
نَوْعٌ مِنَ الْقَرَامَاتِ الْمَدِينَةِ تُفْرَضُ لِقَضَائِمِ مَعْرِ الْإِجْرَائَاتِ  
مَعْرِ مُنْتَظَمًا .

١٩٧١٣ - **غُرَامَةُ جِنَايَاتِيَّةٌ** (F). *Amende pénale* (F).  
*Penal fine* (E).  
عَقُوبَةٌ مَالِيَّةٌ تُكُونُ أَضَافِيَّةً فِي الْجُنَايَاتِ . وَأَصْلِيَّةً أَوْ أَضَافِيَّةً  
فِي الْجُنْحِ . وَدَائِمًا أَصْلِيَّةٌ فِي الْخَالَفَاتِ . وَهِيَ تَتَزَمُّ الْمَحْكُومَ  
عَلَيْهِ أَنْ يَدْفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَالِ إِلَى الْخِزَانَةِ الْمَالِيَّةِ .



غُرَابِيَّةٌ عَزْنِيَّةٌ

١٩٧١٤ - **غُرَامَةُ هَدَكِيَّةٌ** (F). *Amende civile* (F).  
*Civil fine* (E).  
هِيَ الْقَرَامَةُ الَّتِي تُحْكَمُ بِهَا لِمَنْ سَلَسَ الْحَاكِمُ الْمَدِينَةَ بِنَاءً عَلَى مَا  
نَصَّ عَلَيْهِ الْقَانُونُ الْمَدَنِي .

١٩٧١٤ - **غُرَابِ أَبْعَ** ، **غُرَابِ الْبَيْتِ** ، **قَلَقٌ**  
*Corvus corax* (S). *Corneille mantelée*, *C. candré*,  
*Corbeau mantelé* (F). *Hooded crow*, *Gray-back*  
*crow* (E). *Nebelkrähe* (D).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَرَابِطِ . جَسَدُهُ مُتَوَسِّطُ الْقَدِّ ، يَحْمِلُ  
نَحْوَ ٥٠ سَمًا . رَأْسُهُ وَصَدْرُهُ وَبَطْنُهُ وَخَدَايُهُ وَخَدَايُهُ وَرِجْلَاهُ  
أَلْوَنُ السُّودِ الْمَاقِظِ . تَطِيرُ وَبَطْنُهُ إِلَى الرُّبْعَةِ الْفَتْحَاءِ . سَرَبُهُ  
كَثِيرٌ الْعَدَدُ . يَأْكُلُ الْخَبْثَ وَالسَّهْلَ وَيُضَلِّفُ الْأَشْيَاءَ  
وَيُشَارِبُ الْبَحَارَ .

١٩٧١٥ - **غُرَابِ أَسَمِ** ، **غُرَابِ لُوثَمِي**  
*Corvus corax* (S). *Corbeau commun*, *Grand cor-*  
*beau* (F). *Common crow*, *Common raven* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ جَسَدُهُ كَبِيرُ الْقَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ  
٦٥ سَمًا . وَبَطْنُهُ نَحْوَ ١٠٠ سَمًا . لَوْنُهُ أَسَدُ الْوَلَنِ السُّوِّيِّ  
الْأَبْعَ . يَحْمِلُ حُلُوجَ مُتَنَادِلَةٍ أَكْثَرُهَا وَالْحَمْرُ فِي يَأْكُلُ  
الْأَحْرَاجَ وَالْجِبَالِ . يَعْشُ أَنْوَامًا جَارِئَةً مَعْرِهَا نَحْوَ مَا اسْتَعَادَ  
خَيْرَهَا . قُوَّةُ الْخَشَرَاتِ وَالْقَوِيَّاتِ وَالْقَلَامِ وَالْقُرْبَانِ وَالْقَضَاعِ  
وَيُضِلُّ الصَّائِرَ وَالْجَوَابِ وَالْبَذَارَ الْفَاتِلَ .

١٩٧١٦ - **غُرَابِ أَسَمِ**  
*Pyrrhocorax pyrrhocorax* (S). *Corbin crève* (F).  
*Carrion-crow* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَرَابِطِ مُتَوَسِّطُ الْجَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ ٤٢ سَمًا .  
لَوْنُهُ أَسَدُ الْوَلَنِ السُّوِّيِّ الْكَلَامِ . مَشَارِبُهُ وَرِجْلَاهُ إِلَى الْحَمْرِ ،  
يَأْكُلُ سَرَبَهُ الْجِبَالِ وَهُوَ حَزْبٌ الْجَوَابِ لِيْلِهِ : هُ الْفَزْ  
مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَحْمَرِ .

١٩٧١٧ - **غُرَابِ الرُّوْعِ** ، **غُرَابِ أَوْدِي** ، **شُوكَةُ**  
*Corvus monedula* (S). *Corbeau choucas*, *Chou-*  
*cas* (F). *Jackdaw* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْقَرَابِطِ صَغِيرُ الْجَدِّ طُولُهُ نَحْوَ ٣٦ سَمًا .  
رَأْسُهُ وَخَدَايُهُ وَبَطْنُهُ إِلَى السُّودِ الْقَلْبِيِّ الْإِبْعَ . عَقَبُهُ  
وَصَدْرُهُ وَبَطْنُهُ إِلَى الْكَبْكَبَةِ الْفَتْحَاءِ . يَعْشُ جَاهَاةً كَبِيرَةً .  
سَرَبُهُ كَثِيرٌ الْعَدَدُ . يَأْكُلُ الْأَحْرَاجَ الْمُبَشَّرَةَ الشَّجَرِ وَالْبُيُوتِ  
الْخَرِبَةَ وَالْمَوَاتِ الصَّخْرِيَّةِ . قُوَّةُ الْخَشَرَاتِ وَالْقَوِيَّاتِ وَالْجَوَابِ  
وَالْبَذَارَ الْفَاتِلَ .

١٩٧١٨ - **غُرَابِ الْقَبْرِ** هُوَ الْفَتْحَاءُ ، أَطْلَبُ .

١٩٧١٩ - **غُرَابِ الْبَيْتِ** هُوَ وَاقٌ الشَّجَرِ ، أَطْلَبُ .

١٩٧٢٠ - **غُرَابِ الْمَاءِ** هُوَ الْوَقْدُ وَالْمَاءُ .

١٩٧٢١ - **غُرَابِ لُبْنَانِي** ، **زُفْتُ**  
*Pyrrhocorax graculus* (S). *Corbin chocard* (F).  
*Chough* (E).

طَائِرٌ مِنَ الْقُرْبَانِ الْأَوْبَادِ صَغِيرُ الْجَدِّ ، طُولُهُ نَحْوَ ٤٠ سَمًا .  
قُوَّةُهُ أَسَدُ الْوَلَنِ يَحْمِلُ عَشْرَةَ وَرَقَةٍ . مَشَارِبُهُ إِلَى الْفَتْحَاءِ . يَأْكُلُ  
رِجْلَاهُ إِلَى الْحَمْرِ ، يَحْمِلُ الْبِلَادَ الْأَبْيَضَةَ وَيُجْلِبُهَا . يَأْكُلُ  
الْجِبَالِ فِي الصَّبَاحِ وَيَعْشُ عَلَى الشَّجَرِ فِي لَيْلَتِهِ . سَرَبُهُ  
مُتَوَسِّطُ الْعَدَدِ . قُوَّةُ الْخَشَرَاتِ وَالْقَوِيَّاتِ وَالْبَذَارَ وَالْجَوَابِ  
وَالْبَذَارَ الْفَاتِلَ .


١٩٧٢٢ - **غُرَابِيَّةٌ**  
*Consolida* (F). *Consolid* (E).

١٩٧٢٣ - **غُرَابِيَّاتٌ**  
*Corvidae* (S). *Corvidae* (E).

فَصِيلَةُ الْقُرْبَانِ مِنَ الْجَوَائِمِ الْقَرَابِيَةِ لِلنَّاتِقِ . فِيهَا الْقُرَابِ  
وَالْقُرَابِ وَالْقُرَابِ .



غريبوط الصنوبر



غريل



غرة



غرة جميلة

١٩٧١٥ - غرانيت (E). Granite (F). Granit

هو الأمل، صخر بلوري شديد الصلابة متجان اللون يتكون من الفلسبا والفلق والرو .

١٩٧١٦ - غرانتي ، ستاتي ، صواني (E). Granitic (F). Granitic

نمت ترميز يطلق على ما هو صواني التركيب .

١٩٧١٧ - غروب هو المحور القراري ، اطلبه .

١٩٧١٨ - غروب

الغرب : داء يصيب الشاة فينمط غرطوها ويسقط منه شعر العين (السان) .

١٩٧١٩ - غريمال (E). Sieve, Riddle (F). Crible

مسدة نقيع التواب .

١٩٧٢٠ - غريمالسي (F). Cribiforme (E). Cribiforme

تفرق الحبوب عن الفتك والاجرام الغريبة .

١٩٧٢١ - غريبكة (E). Sifting (F). Criblage

تفرق الحبوب عن الفتك والاجرام الغريبة .

١٩٧٢٢ - غروبوس (S). Cymothos

جنس دويبات بحرية من القشريات مساويات الارجل

وفصيلة المروسة ، انواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة والبحر الابيض المتوسط || اجسامها شبه مبطلة ، قروية الشبه بالهدية ، طولها من ٣ الى ٥ سم . منها انواع تصقل على الاسماك .

١٩٧٢٣ - غروبوسيات (S). Cymothoidae

فصيلة دويبات بحرية من القشريات مساويات الارجل .

اجناسها وانواعها عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها اهلجية مبطلة شبيهة باجسام الهدية طولها من ٥ الى ١٠ سم . اخطامها مجهزة بدهة ماسية || بعض اجناسها تصقل على الاسماك .

١٩٧٢٤ - غروبوط الحراج (E). Grypotes

حشرة من فصيلة الوزيديات ورتبة متجانسات الاجنسة .

جسمها صغير القدر قليل نحو ٥ م . || رأسها مستعرض قليل النتوء ، اسفر العين . خطها مثل الطول . عينها كبيرتان . زباناها قصيران ، نحيلان . كسلها ينفي الشكل ، اسفر العين اسفر اللوح . حفيفها مزوانية ، صفراء ، ظهرها كامل الخبيجة ، لاحف ، اخضر اللون ، بني الطرف . روثناها عشائيان ، شفافان . بطها الى الخلفي الاسمر . قوائمها كثيفة الهلب الشائك || تألف الحراج اخصها حراج الصنوبر .

١٩٧٢٥ - غروبوط الصنوبر (S). Grypotes puncticolis

حشرة من فصيلة الوزيديات صغيرة القدر ، طولها نحو ٤ م . جسمها متاني الشكل . زباناها خيطية مستطيلة . ثوبها الى الصفار الخلفي الناقص . مرتها الصنوبر على اختلاف انواعه ، يكثر وجودها من تجوز الى تشرين الاول . اضرارها زهيدة لا تستقيم للعتاية .

١٩٧٢٦ - غريب (S). Cancellaria

غريب من جنس الطلائف المشهور وهو ارق النبت واصله سواد .

١٩٧٢٧ - غريبيل (S). Cancellaria

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل وفصيلة الغريبليات . انواعها المروسة كثيرة العدد بعضها من متحجرات الاحقاب الثالثة والطيابية والبيض الاصفر الذي يتناثر اللة ماصر منتشر في جميع بحار البلاد الحارة || اصداها شبه بيضية الشكل او برجية ، ذلقة الاحقاب ، مفضضة الاريلة ، قروية القوقعة ، مشبكة الصفحات الخارجية المبهمة بالالوان العابقة .

١٩٧٢٨ - غريبليات (S). Cancellaridae

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل مشطيات الخياشيم . اجناسها وانواعها المروسة عديدة منتشرة في جميع بحار المناطق الحارة . جسمها زائفة تعيش على التنبوت البحرية || اصداها شبه بيضية الشكل ذلقة الاحقاب الهلزية ، صغيرة الؤلوس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الزروس ، ثنائية الؤلوس الشديدة الانفتاح ، صغيرة الارجل المزوانية الشكل || اعرف اجناسها الغريبيل .

١٩٧٢٩ - غرة \* ، صيسون (S). Sison amomum

عشبة برية من فصيلة الصيوليات . جذورها وتماها عطرة طيبة ، كانت ولا تزال تستعمل كقوية . منهاها بعض مناطق حوض البحر المتوسط . توجد بين الزروع وقرب السياجات ويجاري الماء || اوراقها متعاقبة ، مركبة . وريقاتها ودية التجسيم ، مفرصة التصل . ثمارها جراء عديدة مكورة الطرف .

١٩٧٣٠ - غرة (E). Coot (F). Foulque (S). Fulca

القرة والقرع ج غر . جنس طيور مائية من فصيلة الخفليات . انواعها ١٢ منتشرة في جميع اصقاع العالم . تتميز بمقاومتها القوية للمدبة الطرف . روثها مذبذبة اللمبة . اجناسها فارسة وقصيرة . اذنانها صغيرة مستديرة . اسرارها قوية . غالبا مستطيلة || اشهر انواعها القرة السوداء والقرة المتوجة .

١٩٧٣١ - غرة جميلة \* ، انثوسكريس (S). Anthocharis euphonia

الصليبيات (S). Anthocharis des crucifères

الصليبيات (S). Anthocharis euphonia

حشرة من فصيلة الكرنبيات ورتبة حرشفيات الاجنسة . موطنها معظم اصقاع حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها واضحة قتها رقيق الازهار . سرها تعيش على اوراق الصليبيات البرية والزراعية || جسمها مستطيل القد يطول نحو ١٤ م . بسلها نحو ٤٢ م . رأسها اريد . عينها كبيرتان . زباناها صولجانيان . جوشها الى الوحلة الرصاصية اللوح . بطها الى الاربعة السوداء || روثناها الاسمايان ، منه الذكر ، الى الصفرة يملها من الزام الثالث الى الطرف مشعة برتقالية نارية يطوقها اطار اسود .



عُرَّة سوداء

الناطق الحلاقة . أوراقها ابيضاء ، متعاقبة ، معتقة . نصلها جلد الصلصة وإزهارها . أزهارها فردية التجميع ، خضيلة الشكل ، يضاء اللون ، فواصة العرف الطري المستتب . ثمارها صافية ، غصائيا احر اللون لو اصفر في اشهر انوعها الزيتونية ما يلي :

#### ١٩٧٣٨ - عُرونية قُشْمَرَجِيَّة

*Gardenia thunbergia* (S). *Gardénia de Thunberg* (F).  
جنبة جاسدة ، مهدا بلاد افريقية الجنوبية . نصلها تملو نحو ٣٠٠ سم . أزوارها سائبة الشكل ، متعاقبة عايق الخضار اللامع . أزوارها طرفوة الاذنكاز . حلوة الرائحة ، ثمانية البتلات البيض ، نوحها اسطواني الانبوب ، خماسي او سداسي للتشريح الطري || أزوارها يستمر من كانون الثاني الى آذار .

#### ١٩٧٣٩ - عُرونية رُصْبَانِيَّة

*Gardenia rochmannii* (S). *Gardénia de Rochmann* (F).  
جنبة سريرية مهدا بلاد افريقية الجنوبية . ساقها تملو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . أزوارها احليجية الشكل ، نصلها فسفي الخضار الزاهي . أزوارها متوسطة القبة ، عطرية الرائحة المشبعة ، سداسية البتلات البيض || أزوارها يستمر طوال شهر تموز .



فربيل المنصف

#### ١٩٧٤٠ - عُرونية كَبِيرَةُ الزَّهَر \* ، عُرونية

*Gardenia jasminoides*, G. *florida* (S). *Gardénia à grandes fleurs* (F).  
جنبة سريرية شائعة الانتشار التريسي . مهدا الصين . تملو نحو ٢٠٠ سم . أزوارها احليجية تملو من ٧ الى ٩ سم . وتعرض من ٤ الى ٥ سم . نصلها جبل اخضر اللامع الزاهي . أزوارها فواصة العرف الطري ، تبهر يضاء اللون ثم تتسرف الى الصلوة وهي كبيرة الحجم قطرها نحو ١٠ سم || أزوارها يستمر من اوائل تموز الى اواخر آب .



عرونية كبيرة الزهر

#### ١٩٧٤١ - عُرونية مَجْدَرَكَة

*Gardenia radicans* (S). *Gardénia radicans* (F).  
مجلة صغيرة القبة شائعة الانتشار التريسي . مهدا اليابان . تملو نحو ٩٠ سم . ساقها مجذرة . أزوارها متنايلة لامة النصل . أزوارها فواصة العرف الطري . نوحها اسطوانية ، بتلاتها حاجية ، منها البسيطة ومنها المكبة || أزوارها يستمر من آذار الى حزيران .

*Gordonia* (S). *Gordonia* (F). *عُرونية*  
جنس نباتات معقودة تتميزت على اسم الشاغل الاذنكازي « غردون » وهي من فصيلة الكاسليات . انواعها المعروفة ١٠ مهدا الشرق والبلاد الامريكية . منها القوية والزرارية والتريزيتية . أزوارها ابيدة او مابلة ، متعاقبة ، معتقة ، جاسدة لتصل الجملدي . أزوارها فردية التجميع ، لا قياسية الاذنكاز ، يضاء اللون ، مستحبة القرف الطري || اشهر انواعها ما يلي :

#### ١٩٧٤٣ - عُرونية خَضِيلَةُ زَهَر \*

*Gordonia lasianthus* (S). *Gordonia à fleurs velues* (F).  
نوع من الترونديه وهي جنبة سريرية شائعة الانتشار التريسي تملو من ٢٠٠ الى ٤٠٠ سم . أزوارها ابيدة سائبة الشكل تملو من ٨ الى ١٣ سم . وتعرض من ٣ الى ٥ سم . نصلها مائل البشرة ، مشطاري الحافة ، باحت الخضار الفاتح . أزوارها يضاء اللون ، كبيرة القبة ، قطرها نحو ١٠ سم . بتلاتها خلية البشرة . حرفها ذكي الرائحة القرواسة || أزوارها يستمر من آب الى تشرين الثاني .



عرونية خضيلة زهر

ورما عند الاثنى الى اليباض الاخير الاصفر تملو في افرام الرابع شمس طلال يقابلها حلال صغير اسود . ووشها المثلقيان ، عند الشقين ، الى اليباض الاخير الاصفر المواج تملو رقة مملدة خفيفة وست تقط سود هاشية الاذنكاز || لها جبل واحد في الحبل . تظهر القراشة في نيسان . تسرح في النهار . تعالط بعد ظهورها ستة اسابيع وتصل للمك قطعاً مستطيلة على نصل الاوراق || السرة قطوع نحو ٣٤ سم . جسها اسطواني الجرم ، مائل التشاير ، يملو حل قصير . ثوبا الى الطلعة السريرية المواج يملو خطان جانبيان ابيضان وعشرة اطواق تحيط تنتهي عند اللب . اطواقها الى السرة السوداء . رأسها ومذبا ورواجها الى الريدة السوداء || طور الاكمال الذي يستمر نحو ٢٤ اسبوعاً يتقضي ضمن غشاء متين داخل لفافة من الاوراق المتعولة .

#### ١٩٧٣٢ - عُرونية صَوْدُكَة \*

*Folice stris* (S). *Fouque noire*, F. *morille*, *Macroule* (F). *Common oot* (E).  
طائر من القز ، موطنه فسبح الاجزاء يمتد من الشرق الى اربوة وافريقية . يعيش جهات كبيرة العدد . سريره يشمل عدة مشات . طوله جثة يراوح بين ٣ و ٤٥ سم . رأسه رفيع الى السواد الباق . ظهروه وجناحه وذنبه الى السواد الرصاصي المواج . بقلته وخوافيه الى السواد الازرق . جيته غبراء الدجج . متقار ودي اللون ، حياء قز يتان . ساقه ردايتان تملو حلقة مستعرفة جزوية اللون خضراء المواج || يائف التامق والبحيرات . قوته الحشرات والنباتات المائية . ينش في شق يقيم على سطح الماء بين القصب والدار والاسل وما اشبه . انتاء تقص من ٧ الى ١٥ بيضة تحضنها بعدها نحو ثلاثة اسابيع .

#### ١٩٧٣٣ - فربيل الصَّفَصَف \*

*Gracila minuta* (S). *Gracila de l'oier* (F).  
حشرة خالصة من فصيلة القزريات . طولها يراوح من ٤ الى ٦ سم . جسها مستطيل الشكل سوي اللون الاخر والامر المواج || تظهر الحشرة الجملدي في شهر تموز وتضع مكبا بعد التماثل ، في خلال شهر آب ، على مختلف البيدات المقطوعة من فضلي القديات وقروديات واعصها الصفصاف والكتكنا . يرتقي غبراء اللون سمراء الرأس تميل على نضبان ويبدان النباتات المذكورة تضلها وتمنع استعمالها الصناعي .

#### ١٩٧٣٤ - عُرونية كَبِيرَة

في الجبتم جنس اشجار من الكوزيات .

#### ١٩٧٣٥ - عُرونية

فرد الطائر او زرق : بلغ صوته وطرب به او معتدل

#### ١٩٧٣٦ - عُرونية كَبِيرَة

Pharmacologie (F).  
Pharmacology (E).  
علم اصول الادوية ونظريات قواعده وطرق استعمالها .

#### ١٩٧٣٧ - عُرونية ، عُرونية

*Gardénia* (S). *Gardénia*, *Gardénia*, *jardin du Cap* (F). *Cape-jasmine*, *Gardeni* (E). *Altgenreische gardenie* (D). *Gardénia* (I).  
جنس نباتات برية وتريزية من فصيلة القويبات . انواعها نحو ٤٠ منها الشجيرات والجنبات . جميعها من نباتات

اخضلة ، يكثر فيها الطيب الأصفر والسينات الوردية التي تكثر كأساس النوع || ازهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

### ١٩٧٥٠ - حُرْدُونِيَّة يَحْمُورِي

*Pyrethrum tchihatchewi* (S). *Pyréthre gezonnant* (F).  
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة عديمة الساق ، خلية الاحشاء تملو من ٥ الى ١٥ سم . اوراتها خيطية التفريص . رؤسائها الزهرية فردية التجميع تقدم على سترائح قرصي الانتداب || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

### ١٩٧٥١ - حُرْدُونِيَّة ٥

*Garidella* (S). *Garidelle* (F). *Garidella* (E).  
جنس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مغرية من فصيلة الفقيقيات . انواعها المرفوعة قليلة العدد منها يتد من الشرق الاوسط الى اوروبا || سيقانها عديمة الفروع او قليلتها تتنبت بالاشار . اوراتها متعاقبة ، مفصلة الى غرق خلية او شمعية . ازهارها حلخية التركيب . يتلأها كولية الشكل ، متصصة ، صفراء اللون || تنديدها ربيعي

### ١٩٧٥٢ - حُرْدُونِيَّة

*Gardénia* (F).  
هي القردونية ، اطليا .

### ١٩٧٥٣ - حُرْدُون

*Aldá* (F). *Chance* (E).  
هو احتمال حدوث شيء غير مضمون .

### ١٩٧٥٤ - حُرْدُون

هو القلم ، اطليه .

### ١٩٧٥٥ - حُرْدُون

هو القنداد ، اطليه .

### ١٩٧٥٦ - حُرْدُونِيَّة

*Equisetum* (S). *Equiseta* (F). *Horsetail* (E).  
هي الكنبات ينبت على شواطئ الانهار لا ورق له وهو فور اماسخ الزهرية ، الواحدة في جوف الاخرى فاذا اجتلبتها خرجت كأنها حشاس اخرج من مكلته .

### ١٩٧٥٧ - حُرْدُون

*Implant* (F).  
اسم يطلق على المنتجات القوية وعلى مركبات الهرمون التي تستعمل في التبييض الخلوي تحت الجلد .

### ١٩٧٥٨ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، حُرْدُون ، حُرْدُون ٥

*Gallietis barbara* (S). *Grisson talra*, *Huron*, *Hyrraz* (F).  
حيوان لاحم مفترس من فصيلة السورديات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى والبارزيل . يألف الاحراج والسحاب الزرقعة العشب . ملجئه الحيواني جامي . جماعته تعد من ٦ ازواج الى ١٢ زوجاً || جسمه ابيض الشكل مستطيل . طوله نحو ١١٥ سم . عا فيه اللب الذي يبلغ نحو ٥٠ سم . رأسه معتل الجرم والخط . عيانه واذناه صغيرتان مستديرتان . سباله معتل الكثافة والطول . قوامه قصير . براءته حادة الاطراف القليلة التجميع . غذاه للشرعية تفرز مادة دعنية سكية العرف . وبره نام وقصير . ثوبه الى الشبهة السرمل النسوية || الاثنى تقص من جردون الى ثلاثة اجزاء مرة واحدة في الحول || مسرحه دجوي . يتعدو بسرعة جازة ويتسلق الاجسام بشفة . قوته كل ما استطاع اليه سبيلا من الحيوان والطيور .

### ١٩٧٥٩ - حُرْدُونِيَّة زَيَاة

*Gordonia altamaha* (S). *Gordonia de l'Altamaha* (F).  
شجرة من القردونية تملو نحو ٥ امتار . مهدا البلاد الارمكية . اوراتها حاملة اهلجية الشكل ، مقنونة

التاحة ، طول من ١٠ الى ١٥ سم . وتفرس من ٣ الى ٥ سم . نصلها سنن الحلفة ، اذنب الصفحة السفلى ، يحمر في الحريف . ازهارها كبيرة القدة مستعرضة ، قطرها نحو ٨ سم . عرها بتقسيم الفراحة || ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين .

### ١٩٧٦٥ - حُرْدُونِيَّة محوَرِيَّة الزهر

*Gordonia axillaris*, *G. axemala* (S). *Gordonia à fleurs axillaires* (F).  
نوع من القردونية وهي جنية سرورية صغيرة القدة تملو نحو ١٠٠ سم . مهدا الصين . اوراتها ابيدة سنانية النصل . طول من ٨ الى ١٥ سم . ازهارها حاملة اللون ، كبيرة القدة ، محورية الارتكاز ، ذكية العرف || ازهارها يستمر طوال شهر تشرين الثاني .

### ١٩٧٦٦ - حُرْدُونِيَّة ٥ ، كالفورنيَّة ، حَشِيَّة

*Pyrethrum* (S). *Pyréthre* (F). *Pyrethrum*, *Fever-few* (E). *Bertrame*, *Bertramewurzel*, *Rota wucherblume* (D). *Piretro* (I).  
جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من فصيلة المركبات

الانجوية الزهر . ازهاره حديدية تشبه الاكوان منها الطبية والزيينة والشماعية التي يستخرج من زهورها بعد طعنها مسحوق جوالي المادة شديد الفاعلية يستعمل في القضاء على الحشرات . ومن قائل ان الانواع الطبية تستعمل في علاج بعض الحشرات اخصها الملوادة . جلورها غزيرة للمادة الفعالة ، شائعة الاستعمال الطبي || شهر انواعها ما يلي .

### ١٩٧٦٧ - حُرْدُونِيَّة قُرْدُونِيَّة

*Pyrethrum cinerariaefolium* (S). *Pyréthre à feuilles de cinéraire* (F).  
نوع من القردوب وهو عشبة معمرة تملو من ٣٠ الى ٧٠ سم . اوراتها كبيرة القدة ، قوية العرف ، ثلاثية التفريص

والصنن ، رباعية العروق المتوازية المخطوط . نصلها خلي الصفحة السفلى ، فصي اللون . رؤسائها الزهرية كبيرة القدة قطرها يراوح بين ٤ و ٦ سم . زودها كثيفة القند الدعنية يحمر منها مسحوق القردوب الذي يغسل في تركيب بعض الحواشير || ازهارها يستمر من تموز الى آب .

### ١٩٧٦٨ - حُرْدُونِيَّة مشكل

*Pyrethrum uliginosum* (S). *Pyréthre tardif* (F).  
نوع من القردوب وهو بجملة معمرة تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها قزواء فناء . اوراتها سنانية ذائقة طول من ٦ الى ٨ سم . نصلها لدن الصفحة للتشارية الحلفة . رؤسائها الزهرية صوانية التجميع ، كبيرة القدة ، قطرها يراوح بين ٤ و ٨ سم . ازهارها يستمر من ايلول الى تشرين الاول .

### ١٩٧٦٩ - حُرْدُونِيَّة وَدِي

*Pyrethrum roseum* (S). *Pyréthre rose* (F).  
نوع من القردوب وهو نبات عشبي معمر شائع الاستعمال

الترقيبي . خروبه ازهارية زهاء ٧٠٠ تملو من ٣ الى ٧٥ سم . اوراته لا تباينة للتفرص . نصلها ماس البشرة اخضر اللون . رؤسائها الزهرية عديدة الالوان المتباينة



قردوب



حُرْدُون





غرشاة

من الملب الغليظ الجامد تحبل مكان الرعة ويطوق من الریش للتشمت ركب قاعة البت. ثوبه الى السواد اللامع ، ويطو توشم ابيض مفبوب والحجم

١٩٧٦٧ - *Numida cristata* (S). *Numida huppés* (F). طائر من الغرغور . موطنه حوض الزبير ، يتميز ببقعته السوداء وبشبه الأريه الراسي اللامع القليل التشتم .

١٩٧٦٨ - *Numida metacris* (S). *Numida mitrés* (F). طائر من الغرغور يتميز برقه القوي اللحية الخوي الشكل . ثوبه الى السواد اللامع ابيض توشم ابيض ويكاد يكون تيقباً || موطنه افريقية الوسطى والشرقية .



غرشا افران

١٩٧٦٩ - *Numida metacris* (S). *Numida mitrés* (F). طائر من الغرغور البري والداجن . سلالاته مدينة لفرانزا القرب والحجم وكثرة البيض . منها الابيض والبيضي والاحمر والاسود والاربد والمزرق . جميعها سهلة التدجين والربية .

١٩٧٧٠ - *Numida vulturnus* (S). *Numida vultur* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٧١ - *Numididae* (S). *Numididae* (F). فصيلة طير وسينة الجلس من رتبة النجاسيات . طيورها ربة الجفة ، دقيقة البنت ، صغيرة الرأس النتج ، قوية المنقار الحاد الطرف ، صغيرة الجناح ولليل الكوز الساقط ، متحدة الريش الاطلس المدمج الصبيحة . سوي اللون الموشم || موطنها المغرب والجزر الجبلية كدفسكر ويطوما . تألف الغرغوب والفرج . اسرارها متوسطة البند . قوتها الجبوب والثار والتواهي والخمرات . يجدها الاشجار والصخور الثلاثة الغربية || انثاها تبيض نحو ١٢ بيضة تحضنها وسداها في انصوص رصمه بالحشيش والورد .

١٩٧٧٢ - *Gerrhonotus* (S). *Gerrhonotus* (F). جنس حذاء من فصيلة الجبروديات . انزوله المعروف نحو ١٠ ، طولها يراوح بين ٢٥ و ٣٠ سم . انثاها الى السرة يطوما تتجلى اسود ورفقة بيضاء || موطنها البلاد الحارة . تألف الاساكن الصخرية .

١٩٧٧٣ - *Gorgonia* (S). *Gorgonia* (F). جنس حويئات بحرية ركية راحة من فصيلة البورفويات || انزوله المعروف قليلة العدد لكنها منتشرة في سطح محار البلاد الحارة والمتحدة الحرارة || مستمراته قريبة لشبه

١٩٧٧٤ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٧٥ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٥٩ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٠ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦١ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٢ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٣ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٤ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٥ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٦ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٧ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .

١٩٧٦٨ - *Numida guineensis* (S). *Numida guineensis* (F). طائر من الغرغور ، حجمه حجوم النجاجة الكبيرة ، رأسه امط الجلد المصفر الارزق اللين ، يحمل عند فنته ردة من الریش الطويل الارزق المصفر بالابيض . ثوبه الى البنية الزرقاء يطو توشم ابيض || موطنه شمالي شرقي افريقية .



غرشون

ثمادها مختلفة الاشكال || اشهر انواعها غشب الانثياد  
وغشب القديسين والقرند والغلاب .

### ١٩٧٨٥ - هَرْقَل

غرقت البيشة : مدوت . وبالطبخ فسد ما في جوفه .

١٩٧٨٦ - **هَرْقَلَة** \*  
Garrulaxe (S). Garrulaxe (F). Garrulaxe (E).

طائر من فصيلة التيتليات لاقتات النمل وربة الجرائم .  
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى ادفى وافريقية الشرقية  
والجزيرية ، تجوها ذهاباً واياباً في سبيل المصيف والمشتى .  
تألف الاذنان والاحراج الميمنة الانجبار || جسمها متوسط  
القد يطول نحو ٢٠ سم . لونها العلوي الى الشقعة المرمجة  
بالاسمر . ولها متوج بكشة معتدلة الحجم ، عاجية اللون .  
عنقها وصدرها الى البياض العاجي . بطنها وزمكاها الى  
البياض الاخير . متقادح دقيق الحجم ، معتدل الطول ،  
شديد السرة . عنينا صغيرتان عسلتان . جناحها معتدل  
الطول ، ذلق الطوف . ذنبها مستدير الطوف . رسفاها  
دقيقان ، اصمرا || طيرانها خفيف الحركة ، بيه القوط .  
قبتها النمل والاساربع والادبان والثار المتنية || تدنن  
معها في الدغل الكثيف على ارتفاع متر او مترين من  
سطح الارض . الاثن تقسم من ٣ الى ٤ يبيضات تحضنها  
بمتابوة الذكر نحو ١٤ يوماً .

١٩٧٨٧ - **هَرْمِيس** \*  
Grammistas (S). Grammistas (F). Grammistas (E).

جنس اسمك بحرية من شاكيات الزمانف وقصبة الغريجات .  
انواعه المرفوعة قليلة العدد اصطناعها بعض بحار المناطق  
الحارة اصنعها البحر الاحمر والهند الهندي || اجسامها  
صغيرة القد ، اعلاجية الشكل ، معتدلة التيطيط ، تطول  
من ١٠ الى ٢٠ سم . اولياها تراوح من الرسكة الى الخضر  
الالامس ، يطولها تحطيط قاطب ثلاثي الخطوط الفضية  
او الذهبية . رؤوسها كبيرة . اخذاتها رسية الانفراج .  
حياتها جاحشة . زعمانها الظهيرة الاولى شاككة النحاس .  
زعمانها القليلة مستديرة الاطراف || لونها كاعنة الصفت  
قل من يرشب فيها .

١٩٧٨٨ - **هَرْقَن**  
Corbeau (mâle) (F). Crow (male) (E).

هو الزراب الاكر .

١٩٧٨٩ - **هَرْكَب** ، **هَرْكَب** \*  
Corbivaur, Corbeau-vautour (F). Corbivaur (E).

جنس طير من الجرائم سفيات المنابر وقصبة الغريجات .  
له نوعان ، الزراب الابيض النقي والزراب الهليلج المتقاد  
موطنها بعض المناطق الحارة من القارة الافريقية . يتميزان  
بكير الجسم وارتفاع القوائم وفلاحة المنقيد واسوداد الفؤن ||  
قوتها الجيف والظاء والورز والبرذوان والفكران والشفاوع  
والحشرات والديدان .

### ١٩٧٩٠ - هَرْكَب هَلِيظُ الْمُخْتَفِ

Corbivaur crassirostris (S).  
Corbivaur à gros bec, C. d'Abyssinie (F).  
Abyssinian corbivaur (E).

نوع من الزراب . اصطناعه فسيحة الارباء تمتد من سوس  
البحر الاحمر الى الكنتو . جسمه كبير القد يطول نحو  
٨٥ سم . بسطه لا يقل عن ١٥٠ سم . متقادح ضخم  
هليلج . فؤنه الى السواد القضي يطول سواج اخضر وزرق .

بمستمرات المرجان . لونه تراوح من الابيض النقي الى  
المرجاني الباهت ، ومن الابيض الاطلال الى الاخضر  
الالامس .

١٩٧٧٤ - **هَرْغُونِيَّات** \*  
Gorgonides (S). Gorgonides (F). Gorgonides (E).

فصيلة حويئات بحرية من الزماريات الملوينات . اجناسها  
وانواعها عديدة منتشرة في معظم بحار العالم || جميعها من  
الحويئات الركنية الرابضة على الصخور اعلمها صخور  
القلع || اشهر اجناسها القرفون .

١٩٧٧٥ - **هَرْف**  
Feuilles caduques (F). Deciduous leaves (E).

ورق الشجر حامة وورق الانجبار النقيضة خاصة .

١٩٧٧٦ - **هَرْف** شجر يدبغ به (اللسان) .

١٩٧٧٧ - **هَرْفَة التيجاركة**  
Chambre de Commerce (F). Chambre de Commerce (E).

منطقة مؤلفة من مثل التجار وارباب الصناعات تتعلق  
بسلهم لدى السلطات العامة وتجمع لهم المعلومات الدقيقة  
من التجارة والصناعة في الداخل والخارج .

١٩٧٧٨ - **هَرْفَة الزراعة**

Chambre d'Agriculture (F). Chamber of Agriculture (E).

غرفة الزراعة ، تدره تقسم بعض الزراع المستخين لخدمة  
المصالح الزراعية الوطنية . والفرق الزراعية تابعة الدولة  
ولها قوانين خاصة .

١٩٧٧٩ - **هَرْفَة المكاسعة**

Chambre de compensation (F). Clearing-house (E).  
هو مركز اجتماع يثل المصارف ومصارف المصارف لاجراء  
عمليات مقاضاة التحويلات والاوراق المالية .

١٩٧٨٠ - **هَرْفُو**  
Gorhou (F).

جنس طير من مديمات القرش ، كليات القدم ، مشهور  
باسم طقاف ، اعلمه .

١٩٧٨١ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفِي** ، **قَيْفَة**  
Chorlon (F). Chorlon (E).

هو غلاف البيشة الداخلي مركزه تحت القيش .

١٩٧٨٢ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفَاء** \*  
Blanc d'oeuf (F). White of egg (E). Blanc d'oeuf (E).

القرند : بياض البيض غرق المس .

١٩٧٨٣ - **هَرْفَاء** ، **هَرْفَاء** \*  
Nitraria (S). Nitraria (F). Nitre bush, Salicree (E). Salpeter-  
rausch (D). Nitraria (I).

جنس نباتات برية من فصيلة النترقيات . اصطناعه بعض  
المناطق الاسيرية والافريقية الشمالية والوسطى . انواعه  
شجيرات وجنبات شاككة او سرسة . اوراقها كاشمة متعاقبة  
جامدة التصل . ازهارها بيضاء اللون ، فردية او عكوكلية .  
ثمادها حنينة او نوية ، مديبة الطوف ، حر او سيد .

١٩٧٨٤ - **هَرْفَاء يَت** ، **قَيْفَة يَت**

Zygophyllaceae (S). Zygophyllaceae (F).  
Zygophyllaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين كثيرة القضاات . اجناسها  
وانواعها عديدة معظمها عشي وبعضها شجري وجبني .  
اوراقها لا تقيمية الترتيب والشكل فيها المتعاقبة والمتعاقبة  
ولها البسيطة والمركبة . ازهارها خماسية التركيب عتوية .



غرلة



هرمس



غراب هليلج للنقاد



غرناق عادي

قرواء خشوية الساق تلو من ٧٠ الى ١٠٠ سم. فروها طليقة النجس. اوراقتها متعاقبة ، لائفة ، صلبة . تصفها سناني الشكل ، حطب الصلبة ، جلمد النجس ، كتيها للمام وللد ، لونه الى الجند الاصفر || رؤيتها الزهرية مستدة الجسم ، قطرها نحو ٤ سم. قطرها لونات كبيرة مستطيلة صفراء اللون || يستخرج منها صارة تقيد ضيق التنفس والالتباس الرئوي .

1947V - غُرُوقَة

Ebourgeoisement (F).

Nipping of buds, Dis-budding (E).

تقليم او ازالة للفرانق والبرام العرضية الزائفة .

1947V - غُرُوقَة هو البرم ، اطيه .

1947V - غُرُوقَة ، جيرانيوم

Geranium (S). Géranium, Gérânier, Bec de cigogne (F). Geranium, Shepherd's needle, Crane's bill (E). Storchschnabel, Geranium (D). Geranio, Becco di cigogna, Becco di grus (I).

جنس نباتات عشية طرفة من فصيلة الغرنوقيات . انواعه عديدة منها البرية والعلوية والزراعية الزينة . ازهارها غشقة النجس والالوان لها الياض والوردي والاسمر والبنفسجي . تحملها تشبه منقار الغرورق او الرمو . اعرف انواعه واشهرها ما يلي



غرناقية خلية

1948 - غُرُوقَة أرمينية ، جيرانيوم أرميني

Geranium armenum (S). Géranium d'Arménie (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية صلبة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها زهاب الحاء ، فروها زهرية . اوراقتها خالية الاقسام . فصوها متعاقبة مستدة الحافة . ازهارها كبيرة القد ، قطرها نحو ٤ سم. بتلاتها بيضاء الشكل ، جزوية اللون ، بنفسجية اللون ، سود البقعة الوسطى || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرناق الجدار

1948 - غُرُوقَة أسمر ، جيرانيوم أسمر

Geranium phaeum (S). Géranium brun (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية صلبة صمرة متعاقبة . ساقها تلو نوع من ٤٠ الى ٦٠ سم. اوراقتها خالية او بيضاء الاقسام السنانة الشكل ، المسنة الاطراف . تصفها شديد الخشخاش . يملو بتقيج اسمر . ازهارها جزوية اللون او بنفسجية . ازهارها يستمر من ايار الى حزيران .

1948 - غُرُوقَة الجندكول ، جيرانيوم

Geranium rivulare (S).

Géranium des ruisseaux (E).

نوع من الغرنوق وهو عشية صلبة صمرة متعاقبة قرب في الارية الرملية . ساقها تلو نحو ٤٠ سم. اوراقتها بيضاء الاقسام المتعاقبة للتفصيص والتشريح . تصفها خلل البشرة ، جزوي اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تموز .



غرناق الروابي

1948 - غُرُوقَة الروابي ، جيرانيوم حصتي

Geranium collinum (S). Géranium des collines (F).

نوع من الغرنوق وهو عشية طرية صمرة تملو نحو ٧٠ سم. اوراقتها خالية الاقسام . تصفها خلل البشرة ، يلمت الخشخاش . ازهارها مهدبة البتلات لها الى الاربعة النجس النجس اللون || ازهارها يستمر طوال شهر ايار .

عنه ابيض القلق || طباعه وعاداته لا تختلف من طابع وعادات الغرب الا ان له اثبت طيرانا واطول شوطا . وهو صياح ، هم ، قدر || يثن وكته في الاذغال ويل الامحار المتصلة الانتفاع . وكته يرتكز على مدافنته متصانين وهو كالصاج قمترا . حياكه قمترا دقيقة متداخلة يملوها ثش ثام . اثاء تحضن رمدها ثلاث بيضات بيضا الذكر بلن لما الفداء .

Corbeau (F).

جنس طير من الغربان يدعى غرباب ، اطيه .

1947V - غُرُوقَة ، غُرُوقَة ، غُرُوقَة

Balaerica (S). Balaerique (F).

جنس طير من الكراكي ، موطنها البلاد الافريقية . انواها جملة الالوان الزاكية المتباينة . رؤيتها خلية الريش الاسود المنصب . تيجانها الفنية ذنية اللون . اعناقها وساقها طويلة . منازرها غرنوية الشكل ذلقة . اجنسها مستطيلة متفرجة الزوايا . اذناها قصيرة مقعطة . ارباعها دقيقة صردية || تألف صفات الانهر واليسيرات والاسراج المبعثرة الانجار . قوتها الحروب والبار والبرام والحشرات || تدن في افاحس تحضرها في البرية . اناتها لها حشختان في السة وفي كل حصة يهستان || ولها الجلس نوات لا غير الغرناق الطائوسي والفرناق العادي .

1947V - غُرُوقَة طائوسي ، غُرُوقَة طائوسي

Balaerica pavonina (S). Balaerique pavonine, Grupeau, Oiseau trompette (F).

طائر من الفرناق موطنه يمتد من جبال افريقية الوسطى الى خطوط المتوسط وجزر الباليار || طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته ذهبي اللون مستطيل الريش الجلي الخرزوي . عسره وقلته الى الحرة المرحانية . ثوبه الى الرندة ، يمتد ويسمر عنه . القطر ويبر عنه البطن . جناحه جلمعة بالياض والاسود . منقاره وساقه سود .

1948 - غُرُوقَة عادي ، غُرُوقَة عادي

Balaerica regulorum (S). Balaerique commune (F).

طائر من الفرناق اصطناعه فسيحة الارباع تمتد من افريقية الشرقية الى الجنوبية . طوله نحو ١٠٠ سم. تاج قلته اصفر اللون ، ملحب اللوح ، قصير الريش الشهي الجلس . عسره وقلته الى الحرة القرمزية . منقاره وساقه الى السمة . ثوبه الى الرندة الرصاصية . جناحه يمش القردام . ذلته اسود .

1948 - غُرُوقَة خلية ، غُرُوقَة خلية

Grindella (S).

Grindella, Chrysophthalme (F). Grindella (E).

جنس نباتات برية طرية طرية وزراعية زينة من الاسطوخودوس وفصيلة المركبات . انواعها المعروفة قليلة العدد منها الاعشاب الحولية والجنات الصمرة جميعها امريكية المنبت || اوراقتها متعاقبة . ازهارها رؤسية صفراء اللون قروية القبة بازهار دوار الشمس || اشهر انواعها واعرفها الغرنقية الضلعية .

1948 - غُرُوقَة خلية ، غُرُوقَة خلية

Grindella robusta (S). Grindella robusta (F).

نوع من الغرنقية البرية اللبية الصمرة . مهدبة جنس اصناف امريكية الشابة انحصا كلفونية والتكسان والمكسيك . تثبت طويلا في المنابع السنية || جنبتها

١٩٨١ - غُرْثُوقِ عَطِير \* ، جِيرَانِيُومِ عَطِير ،  
إِيزَرَةُ الرَّاهِب

*Geranium Robertianum* (S). Herbe à Robert, Aiguille, Géraniun de Robert (F). Adder's tongue, Herb Robert, Fox geranium (E). Ruprechtstorchschnabel, Robertskraut (D). Geranio Robertino Erba Roberta (I).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة برية طيبة خالصة الاستعمال تطلو من ٢٠ إلى ٦٠ سم. ساقها فراء مستطبة السلاحيات. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام. أزهارها لائحية الانقسام فيها الفردية والثنائية والثلاثية التجميع. لونها الالباض الاخير يملو توشيح ليكي || أزهارها وأوراقها ملونة بقال انها لا تخلو من بعض الخواص الطبية النافعة .

١٩٨١١ - غُرْثُوقِ لُفِي \* ، جِيرَانِيُومِ لُفِي

*Geranium argenteum* (S). Géraniun argenté (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة مستطبة . ساقها مثدنة تطلو من ٧ إلى ١٢ سم. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الإثنائية التتفرع . نصلها خلي البشرة ، ففي المروج ، أزهارها فردية التجميع ، غرطية البتلات الوردية اللون. أزهارها يستمر من تموز الى آب .

١٩٨١٢ - غُرْثُوقِ كَبِيرِ الزَّهَر ، جِيرَانِيُومِ كَبِيرِ الزَّهَر

*Geranium grandiflorum* (S). Géraniun à grandes fleurs (F).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة تحبلة أنساك متدلية الفروع تطلو من ٣٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها مستطيلة للمالحق اللدنية الماء ، نصلها خلي البشرة ، بحري اللون ، خالصة الأقسام اللانحائية التتبعين . أزهارها كبيرة القد ، متعادلة الفصل وبتلات . لونها ال اليبكي الوردى المروج . أزهارها يستمر من حزيران الى تموز .

١٩٨١٣ - غُرْثُوقِ مُلْتَمِخ \* ، جِيرَانِيُومِ مُلْتَمِخ

*Geranium maculatum* (S). Géraniun maculé (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة مستطبة . ساقها مضلعة تملو نحو ٤٠ سم. أوراقها ثلاثية أو خالصة الأقسام المسنة نصلها قليل الحمل ، شديد الحفرة . أزهارها منبسطة البتلات المستعرضة ، قطرها براوح بين ٣ و ٤ سم. لونها ال اليبكي الباهت || أزهارها يستمر من نيسان الى تموز .

١٩٨١٤ - غُرْثُوقِيَّات

*Geraniaceae* (S). *Geraniacées* (F). *Geraniaceae* (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة . موطنها بعض مناطق أمريكا الاستوائية . قوتها الحشرات حل اغتلات أنوعها وإشكالها وبعض الحار العناية البرية || أجسامها ريمة تطلي من ١٦ إلى ٢٢ سم. تتميز بكبر أذنابها المقطوعة الطرف . أجنتها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب . مثاقيعها شلبية ، مشرودة الأطراف . أثوابها متباينة الألوان تكثر والتجميع .

١٩٨١٥ - غُرْنِيس \*

*Agriornis* (S). *Agriornis* (F). *Agriornis* (E). جنس طير من الجاثم مشروبات الناقير وفصيلة الفصليات انواعها المعروفة خمسة . موطنها بعض مناطق أمريكا الاستوائية . قوتها الحشرات حل اغتلات أنوعها وإشكالها وبعض الحار العناية البرية || أجسامها ريمة تطلي من ١٦ إلى ٢٢ سم. تتميز بكبر أذنابها المقطوعة الطرف . أجنتها صغيرة ، ذلقة تلحف قاعدة اللب . مثاقيعها شلبية ، مشرودة الأطراف . أثوابها متباينة الألوان تكثر

١٩٨١٤ - غُرْثُوقِ العِزْهَل \* ، جِيرَانِيُومِ يَمَكِي  
إِيزَرَةُ الرَّاهِب

*Geranium columbinum* (S). *Geranium columbin*. Pied de pigeon (F). Long stalked crane's bill, Pigeon's foot crane's bill (E). Staltnorchschnabel (D). Becco di piccione, Geranio colombino (I).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة برية طيبة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم. ساقها فراء ، دقيقة ، مستطبة السلاحيات . أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام البعقة ، السفة الحافة ، المنطرية الارتكاز . نصلها حلق الحصار ، نام الحمل القصير . أزهارها فردية أو ثنائية التجميع . وردية اللون ليكية الملوخ || يقال انها لا تخلو من المنافع الطبية وقد تقيد الصدر .

١٩٨١٥ - غُرْثُوقِ المَرْجُج \* ، جِيرَانِيُومِ مَرْجِي

*Geranium pratense* (S). Géraniun des prés (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة برية وزيينية معمرة . ساقها مستطبة تطلو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . أوراقها سنائية الأقسام اللانحائية المد . نصلها خلي البشرة عابق الحصار البصري . أزهارها مستعرضة البتلات الكبيرة لون ال الزرة الأرجوانية التوشيح || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٨١٦ - غُرْثُوقِ دَمَوِي \* ، جِيرَانِيُومِ دَمَوِي

*Geranium sanguineum* (S). *Geranium sanguin* (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة متصبية تملو من ٢٠ الى ٦٠ سم. ساقها بزرعها طيبة الحماء . أوراقها سباعية الأقسام ، ثلاثية أو خالصة للتتفرع المستطيل . أزهارها فردية ، دقيقة الامن ، حشكية الفصل ، قلبية البتلات الحمر || أزهارها يستمر من حزيران الى ايلول .

١٩٨١٧ - غُرْثُوقِ رَسَادِي \* ، جِيرَانِيُومِ رَسَادِي

*Geranium cinereum* (S). Géraniun cendré (F). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة مستطبة . ساقها مثدنة تملو من ٨ الى ١٥ سم. أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الثلاثية القصوص . نصلها بحري اللون ، رابدة الزهب . أزهارها ثنائية التجميع ، بيضيه البتلات الحمر || أزهارها يستمر من حزيران الى آب .

١٩٨١٨ - غُرْثُوقِ شَقَارِيِ الْوَرَق \* ، غُرْثُوقِ شَقَارِيِ

*Geranium anemonifolium*, *G. tuberosum* (S). *Géraniun à feuilles d'anémone*, *G. tubéreux* (E). نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة صفولية الأروية . ساقها تملو نحو ٢٠ سم . أوراقها خالصة الأقسام تشبه أوراق الشقار . نصلها مائل البشرة عابق الحصار . أزهارها ثنائية التجميع ، مستطيلة للمالحق الحاملة الماء . بتلاتها كبيرة لقد حراء اللون .

١٩٨١٩ - غُرْثُوقِ عَرِيضِ الْبَتَلَات ، جِيرَانِيُومِ عَرِيضِ الْبَتَلَات

*Geranium platycpetalum*, *G. ibericum* (S). *Géraniun à larges pétales*, *G. d'Ibérie* (F).

نوع من الفُرُوق وهو عشبة معمرة متصبية تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم. ساقها بزرعها زباد الحماء . أوراقها خالصة أو سباعية الأقسام الإحليلية الشكل ، المنطرية الحافة . نصلها خلي البشرة ، بحري اللون . أزهارها صوبائية التجميع . بتلاتها مستعرضة ، مشرة الأطراف ، زرقاء اللون أو بنفسجية || أزهارها يستمر من أيار الى آب .



غرُثوق البرزحل



غرُثوق المروج



غرُثوق شقاري الورق



غرُثوق عطر



غرُثوق نفي



غرنوق ملتح



غريس



غرويل شائعة



غرياق



غريب



غريو

## ١٩٨٢٢ - غريب \* ، إكسور

bora (S). Isore, jassin sauvage (F). Wild jasmine (S). Isore (D). Isora, Gelsomino salvatica (I).  
جنس نباتات شجرية ونباتية من فصيلة النورات. أنواعه نحو ٢٠٠ أصلها من المناطق الاستوائية. بعضها بري وبسما زراعي زينة. أوراقها متفكة متعاقبة. انثرها حركلي التجميع. تاجي الإزهار، أزهارها صغيرة لده؟ حورية العرف، يضاء اللون أو حراء.

## ١٩٨٢٤ - غريب \* ، في الألبانيا ، ألبانيا .

Garrya (S). Garrya (F).  
جنس نباتات معمرة ثنائية من فصيلة القرانياث. أنواعها ثمانية. بعضها البلاد الأمريكية. جميعها نباتات صغيرة أو متوسطة القد. أوراقها أبيض متعاقبة. فصلها أحليجي الشكل. جلدي الصفحة، منخفض الحار ، حابس الخشار || أزهارها شرقية التجميع ، غصن اللون أو سفراء أو غراء .

١٩٨٢٦ - غريب \* ، غريب \* ، غريب \* ، غريب \*  
Meles (S). Blaireau (F). Badger (E). Dache (D).  
جنس حيوانات ليلية لاحة من فصيلة السبعيات ورتبة الواسم . أنواعه ستة تقريبا بين الكلب والسور. غلظها بين الدب والسور . أصلها أثناء القدم . جميعها قصيرة القوائم السعيد ، كازة الدم ، غراء الثوب ، ييض الحاسر تحيل على كل أيل من أيلها جده سواد . رؤوسها غرويلية الشكل . أصلها مستعيلة . أذنانها قصيرة .

١٩٨٢٧ - غريب \* ، غريب \* ، غريب \* ، غريب \*  
Instinct

١٩٨٢٨ - غريب \* ، غريب \* ، غريب \* ، غريب \*  
Instinct grégaire (F). Herd instinct, Gregarious instinct (E).  
في فرقة التجمهر في الحيوان والنبات .

١٩٨٢٩ - غريب \* ، غريب \*  
Plant (F).

كل نبات في تمكته جلور من انتشار الحياة .

١٩٨٣٠ - غريب \* ، غريب \*  
Pollen (F). Pollen (E).

الغريب والافريق واللقح والصلاب واسد . راجع صلح .

١٩٨٣١ - غريب \*  
Rosières de bambou (F). Reed-bed of bamboo (E).

أحة القريب طبيعية كانت أم صنية .

١٩٨٣٢ - غريب \*  
Dendrocalamus (S). Bambou (F). Bamboo (E).

جنس نباتات قصية برية وزراعية من عائلة الخيزرانيات وفصيلة النجيليات . أنواعه قليلة ترغب في الآرية الخفيفة الدبالية الرملية . أشهرها غريب حنون .

١٩٨٣٣ - غريب \*  
Dendrocalamus hemonis (S). Bambou de Hémon (F).

نوع من القريب ينمو من ٣ إلى ٥ متر . سلاحيات متوسطة الطول باعثة الخشار الخشن . أوراقها طولها من ٦ إلى ١٠ سم ، وتعرض نحو ٢ سم . نصلها لاسع الخشار عل صفحته || يرغب في الآرية الدبالية الخفيفة الرملية .

١٩٨٣٤ - غريب \*  
Grévilée (F).

في الثرويل ، ألبانيا .

فيها الكعبة والشحمة . جواثها منشدة دائما بالاسيد || تميز جماعات متوسطة العدد . تدثر أمشاشها في الأجبار المتوسطة الارتفاع . أنثا تحسن وسعدا من ٤ إلى ٥ ييضات مرتين في الحبل .

١٩٨١٦ - غريب \*  
Baldrierique (F).  
هو الثرواق ، ألبانيا .١٩٨١٧ - غريب \* ، غريب \*  
Grevillea (S). Grévilée (F). Silky oak (E). Grévilée, Seide nelche (D). Grevillea (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزيتية من فصيلة الفصيات أنواعها عديدة . أوراقها أبيض متعاقبة لا تلياس الشكل . أزهارها نواحية غلظية اللون أكثر قها الاصفر والاحمر . أزهارها سليل أو عتقولة التجميع ، عوري الإزهار . أشهر أنواعها ما يتبع .

١٩٨١٨ - غريب \* ، غريب \*  
Grevillea alpina (S). Grévilée alpina (F).

نوع من الثرويل وهي جنبة معمرة تعلمو من ١٠٠ إلى ١٢٠ سم . أوراقها سنائية التصل مقلوبة القاعد . أزهارها حر البتلات ، صفر الانابيب ، خلية البشرة ، عتقولة التجميع || أزهارها يستمر طوال شهر أيار .

١٩٨١٩ - غريب \* ، غريب \*  
Grevillea robusta (S). Grevillea géanta (F).

نوع من الثرويل وهي جنبة معمرة تعلمو نحو ٩٠ سم . أوراقها سرعسية الشكل طول نحو ٢٠ سم . نصلها خلي الصفحة السفل . أزهارها رتقالية اللون ، حر الموج ، عتقولة التجميع || أزهارها يستمر من أيار إلى حزيران .

١٩٨٢٠ - غريب \* ، غريب \*  
Grevillea juniperina (S). Grévilée-Génévrier (F).

نوع من الثرويل وهي جنبة معمرة تعلمو من ٣٠ إلى ٦٠ سم . فروصها زباد السماء . أوراقها حدية شاككة طول نحو ٢ سم . أزهارها صفر البتلات حر الانابيب ، صنية التجميع || أزهارها يستمر من حزيران إلى تموز .

١٩٨٢١ - غريب \* ، غريب \*  
Grevillea glabra (S). Grévilée glabre (F).

نوع من الثرويل وهي جنبة معمرة تعلمو من ١٥٠ إلى ٢٠٠ سم . ساقها وفروصها عادمة القرب والغسل . أوراقها بالغة القريب ، ثلاثية الفصوص المدية الشاككة الاطراف أزهارها صغيرة القد ، يضاء اللون ، عتقولة التجميع . أزهارها يستمر طوال شهر أيار .

١٩٨٢٢ - غريب \* ، سكاوة صغرية<sup>١</sup>  
Archibuteo (S). Bussage, Archibuteo, Buse pattue (F). Rough-legged buzzard (E).

جنس طير من عائلة السقاوت وصيلية الصقريات . أنواعه ثلاثة شديدة الشبه بالسقاوة إلا أنها أكبر جنة . طولها وأرجح بين ٨٠ و ٩٠ سم . مؤلفها كبيرة القد ، ذلقة الاطراف ، تلصت مغز الانذاب . أصلها مسرلة . الثوب إلى السمة الموشة بالابيض والافير والاسهب والاطسل . جميعها من القاطم التي تجوب البلاد المعتدلة الحرارة . تدثر في شقوق الصخور الرقيقة الشارفة الناتية من كل عراج . أنثا تحسن وسعدا من رتنتين إلى ثلاث رتنت . قوتها القرواص والمظاء والافاعي والخشرات عل اختلافها .

## ١٩٨٤٤ - غزان عَيْن الطاووس

**Gazania pavonia** (S). **Gazanie cell de peon** (F).  
نوع من الزئان الممر . ساقه خشبية فراء تملو نحو ٦٠ سم. فروصها كثيرة العدد ، قصيرة القد ، مبركة . أوراقها الجذرية والجدعية متوسطة الحجم ، ريشية التشرج . نصلها انضغاث اللون مبهر الزئب . رؤسها الزهرية متوسطة القد ، اقراصها يرتقاية اللون ، نارية الملمح . حناؤها شديد السواد اللامع || تنوره يستمر من حزيران الى آب.

## ١٩٨٤٥ - غزان قردي الزهرة

**Gazania uniflora** (S). **Gazanie uniflora** (F).  
نوع من الزئان الممر . ساقه خشبية متدلية الفروع . أوراقها احليجية مسطوية . نصلها مائل السفحة العليا ، خلي السفل الذرياق القرن . رؤسها الزهرية فردية التجميع كبريتية الصفار || تنوره يستمر من تموز الى آب.

## ١٩٨٤٦ - غزانة

**Gazza** (S). **Gazza** (F). **Gazza** (E).  
الاسم العلمي والفرنسي والانكليزي من العربي . جنس املاك بحرية من فصيلة الشبيبات شائكات الزعانف . انواعها المعروفة ثلاثة . اسطها البحر الاحمر والخليج العربي والخليج الهندي || اجسامها شبه بيضية الشكل ، متصلة التبطيط ، تطول من ٢٠ الى ٣٠ سم. الواجا السائلة الى الرتبة الفضية تنسق عند الظهر وتفسر عند البطن . رؤسها شبه اسفلية الشكل . احطها علوية الارتكاز متدعة . حنيها مستديرة ، كبيرة ، ماصة . زمانها الظهري والشرية مستطيلة متعاقبة . زمانها الذيلية لارقة || طويها جيدة الصنف مرغوب فيها .

## ١٩٨٤٧ - غزانة ، تشبيبات

**Erotisma** (F). **Erotism** (E).  
شوانية متطرة مشيرة . وقد تكون حالة مرضية .

## ١٩٨٤٨ - غزلي ، غلاهي ، تسبي

**Erotique** (F). **Erotic** (E).  
نعت تعريفي يطلق على كل ما له علاقة بالحلب العذري او الخلاهي او الجنسي .

## ١٩٨٤٩ - غزليل . هو ابرة المجوز ، اطليا .

## ١٩٨٥٠ - غساس

**Cudonia confusa** (S). **Cudonia confusa** (F).  
فطر كامن الصنف لامأكول من فصيلة الفشاريات ودية الزقيات . يكثر ويبدو في اخرج السنبور . يعيش على المواد النباتية المنسقة . نكته مجموعة من الورديات الصغيرة فطرها نحو ٣ سم. لونها الى الصفار الاسمر للملح . معها مصراحي الانطلاق . ساقه متدلة الانزقايع بسيطة الشكل يملوها اخنود ينبت من القاعدة الى الاربسة .

## ١٩٨٥١ - غسولة

**Gastrochaena** (S). **Gastrochène** (F). **Gastrochsena** (E).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات عديدة الاشام فضيلة المستقيبات . انواعها النابتة المتحجرة عديدة اما الحالية فنسور ٣٠ متشرة في معظم بحار العالم || وهي من المبريات التالقة تعيش ضمن انبوب صدي المادة ثققله المواد الكلسية .

## Boue (F). Mud (E).

هو اللين يجعله السيل يفتي على وجه الارض خشقاً رطباً كان او يابساً || وهو التفل في اسفل القادورة .

## ١٩٨٦ - غرين ، غرين ، طلي

**Alluvion, Limon** (F). **Alluvium, Silt, Ooze** (E).  
وطني اسماء التخالطة والطلح والفلح . والفرير ورايب من الاربة والبقايا الصوية مملأ المياه المكرة فرسبت .

## ١٩٨٧ - غريكات

**Garryaceae** (S). **Garryacées** (F). **Garryaceae** (E).  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين عديدة الفلالت . كانت في التصنيف السابق تتبع فصيلة القترانبات . اجناسها وانواعها قليلة العدد اسطها البلاد الامريكية || نباتاتها جنبات سبروتية معمرة ، تملو من مقيون الى اربعة اشعار . اوراقها ابيدة ، متعاقبة . نصلها جامدة حيلة الخضار الالسي . انفرارها شرطي التجميع . انفرارها ثنائية المسكن ، صيرة الجرم ، خضراء اللون . ثمارها فردية البزرة او ثنائيا || اشهر اجناسها القرية .

## ١٩٨٨ - غزول . هو قصب الرمل ، اطليا .

## ١٩٨٩ - غزال

**Gazelle** (F).  
اسم شامل يطلق على بعض الحيوانات من ذوات الاظلاف المحيطات القرن منها الطلي العربي والرثم والاريل والآدم الخ . ج غزلة وغزلان .

## ١٩٨٠ - غزال

**Bonita à ventre rayé** (F).  
سمكة بحرية قديمة . ويوت مشيرة البطن ، اطليا .

## ١٩٨١ - غزان

**Gazania** (S). **Gazanie** (F).  
جنس نباتات عشية من فصيلة المركبات . انواعها عديدة اسطها معظم اسواق العالم القديم . سويقها زهاب لانتظابية التفرع . اوراقها خلية لاقياسية التزييب منها الجذرية والجدعية المتعاقبة . رؤسها الزهرية كبيرة القد صفر اللونات . قنابات قلافاها ملتصقة ، عديدة الصفوف ، قمية الشكل . تخنيتها مرابطة . رؤسها ننائية الفلور المتتامة احرف الوانها واشهرها ما يتبع .

## ١٩٨٢ - غزان لكجي

**Gazania nives** (S). **Gazanie neigeuse** (F).  
نوع من الزئان الممر . ساقه خشبية فراء تملو من ٢٥ الى ٥٥ سم. اوراقها الجذرية والجدعية متوسطة القد مسطوية الشكل . نصلها اخضر السفحة العليا ، ابيض السفل بيانها كالتلح . رؤسها الزهرية كبيرة القد فطرها رايوح بين ٧ و ٩ سم. اقراصها الى الصفرة البرتقايلة الملمح . حناؤها اسمر اللون اسف || تنوره يستمر طوال فصل الصيف .

## ١٩٨٣ - غزان ريشي الورق

**Gazania pinnata** (S). **Gazanie pennée** (F).  
نوع من الزئان الممر . ساقه خشبية فراء . اوراقها الملحية متوسطة القد ريشية التشرج . اوراقها الجذرية كبيرة التصل للمهدب الاطراف المنطة . رؤسها الزهرية كثيرة العدد ، صيرة الحجم ، كبريتية الصفار . تنوره يستمر من حزيران الى آب .



غزان



غزة



غسل



هسته



عُشْبِيَّة



عُشْبِيَّة الْأَرْضِي شَوْكِي



عُشْبِيَّة الدُّوَل



عُشْبِيَّة الْجَنْجَل



عُشْبِيَّة الْحَمِيد



عُشْبِيَّة الدُّرَّة الصَّغِيرَة



عُشْبِيَّة السَّمُور

**19859 - عُشْبِيَّة الْجَنْجَل** \*  
*Hypena rostralis* (S).  
Noctuelle du houblon, Toupet (F).  
فراشة صغيرة لثقة طولها نحو ١٢ سم. ثوبها إلى الصهبة  
الضبابية والخطوط الصفراء المائلة. رواشتها مدهية الخواشوش الجاني.  
لها جيلان في الحول. رقتها تطول نحو ٢٢ سم. ثوبها إلى  
الخضرة يميلها لتسليج أسمر. وأنها أسود || تركيب  
الجنبيل فؤاذيه لثقة الأني.

**19860 - عُشْبِيَّة الْحَمِيد** \*  
*Agrotis segetum*,  
فراشة الحَمِيد

*Euxoa segetum* (S). Noctuelle des molsens (F).  
Turnip dart moth (E). Wintarsaatete (D).  
فراشة كبيرة لثقة سمراء اللون مدهية الرواشن طولها نحو ٢  
سم. ويصلها ٤ سم. رواشتها الامانيان إلى الصفراء الخفيف  
أما الخلفيان فالأبيض الباهض يتخلله عروق مائلة.  
جبلها يستمر نحو الستين. تمتع مكها ابتداء من اوتائل  
الربيع فينفض بعد اسبوعين || رقتها تطول نحو ٥ سم.  
وهي شبيهة اللون يميلها لوانج زيتوني وضمان اصفران قاطبان  
يتخللها في كل مفصل من مفصلها أربع نقط سود.  
تركب القنح والسلي والقدرة والتجليات المرصوة والبطاطا  
والشندر والكمرة والتبغ والمكفوف والجبل القح ...

**19861 - عُشْبِيَّة الدُّرَّة الصَّغِيرَة** \*  
**الدُّرَّة الصَّغِيرَة** ، دُرَّة الدُّرَّة

*Noctua Zeae*, *Leucanum Zeae* (S). Noctuelle du  
maïs (F).

فراشة متوسطة لثقة ثوبها إلى الصهبة الوردية المائل. أنثاها  
أكبر قدماً وأبيض ثوباً من ذكورها. لها جيلان في السنة.  
تظهر في حزيران وفي آب || رقتها سمراء اللون وردية  
المائل تطول نحو ٤ سم. تألف الموضع الربطة. تركيب الدرة  
وسائر التنبيلات المعلقة.

**19862 - عُشْبِيَّة السَّكَّت**

Noctuelle du seigle (F).

حشرة تدعى حنينة الشيلم ، أظلمها .

**19863 - عُشْبِيَّة السَّمُور** \*  
*Panolla piniperda*,  
*P. flammea* (S). Noctuelle du pin (F).

فراشة من النسيقيات صغيرة لثقة. ثوبها إلى الصهبة الخفيفة،  
تجيبها وزراكتها الروشية بحلة الشكل والانتظام.  
رقتها خضراء اللون غططة بالأبيض تركيب السَّمُور من  
حزيران إلى تموز فتلهم لورائه .

**19864 - عُشْبِيَّة النَّصَب**

*Sésamole* (F).

هي النسيقيات ، أظلمها .

**19865 - عُشْبِيَّة الصَّمَح** \*  
**فراشة الحنطة**

*Agrotis tritici*, *Euxoa tritici* (S). Noctuelle du blé  
(F). White-line dart moth (E).  
فراشة من النسيقيات صغيرة لثقة ثوبها إلى الوردية وروشتها  
الامانيان ميقبان بالأسمر. جبلها يستمر نحو الستين.  
تمتج مكها خلال شهر حزيران فينفض بعد اسبوعين.  
رقتها كبيرة لثقة تطول نحو ٥ سم. ثوبها إلى الصهبة  
الخضراء يميلها لوانج أخضر وضمان اصفران يتخللها في  
كل مفصل من مفصل جسمها أربع نقط سود || تركيب  
الحنطة والشيلم والقدرة وتختلف التنبيلات المرصوة  
والمكفوف والكمرة.

**19866 - عُشْبِيَّات** \*  
*Gastrochaenidae* (S).  
*Gastrochaenidae* (F). *Gastrochaenidae* (E).

فصيلة حشرات بحرية من الرنويات صليحيات الخواشوش .  
اجناسها وأنواعها الممارسة عديدة ، منتشرة في جميع بحار  
العالم . أما القارة في تنصيراتها الحقية التالية ||  
اشهر اجناسها المستقاة والرائقة والمنتسلة .

**19867 - عُشْبِيَّة** \*  
*Glycyphile* (S).  
*Glycyphile* (F).

جنس طير من الجولام ويقات المناخير فصيلة المفترقات .  
انواعه المعروفة ١٢ طولها يمتد من جزر الزوايج إلى  
أستراليا . مدجها الحياتي جامعي . قوتها الحشرات الصغيرة  
والذباب والحمام وحيث الاضرار || اجناسها صغيرة تطول  
من ١٢ إلى ١٥ سم. مناقيرها مقوية . اجناسها تلتحف  
الافئك . أنثاها غليظة ، طويلة ، مغطاة الاطراف .  
أولها ملونة بجلة الخضاب الزاهي || لكثن في الاضمار  
المعتلة الانفاخ . تحسن مزلان في الحول وفي كل مرة  
من ٤ إلى ٥ بيضات . الترخيم يستمر نحو ١٥ يوماً  
تقوم به الاثني بمناخه الذكر .

**19868 - عُشْبِيَّة** \*  
*Crépusculaire* (F).  
*Crepuscular* (E).

لتمت تعريفه يطلق على كل ما هو مخصص بالقمح .

**19869 - عُشْبِيَّات** ، **نُكَبَات**

*Noctuidae*, *Agrotidae* (S). *Noctuidae*, *Agroti-*  
*idae* (F). *Noctuidae*, *Agrotidae*, *Owlet moths*,  
*Cutworms* (E). *Eulen* (D).

فصيلة حشرات من غنطلات القرون وروية حوشفات  
الاجنحة . انواعها زهاء ٢٠٠٠٠ مظهرها دجوي وبعضها  
يسرح في الليل . اجناسها متوسطة لثقة . قوتها  
الاستغمارية مغطاة الشكل او غليظة || رقتها مائلة  
البشرة داكنة الاثوان . خادراتها تقم في التربة تلتحف  
بجلباب من الليل .

**19870 - عُشْبِيَّة** ، **نُكَبَات**

Noctuelle (F).  
Noctua (E)

اسم شامل يطلق على عدة حشرات افراشة من فصيلة  
النسيقيات || اشهر النسيقيات ما يتبع :

**19871 - عُشْبِيَّة الْأَرْضِي شَوْكِي** \*

*Gortyna ochracea* (S). Noctuelle de l'aristachot (F).  
فراشة صغيرة لثقة تطول نحو ٢ سم. ثوبها إلى الصهبة  
الذهبية . رواشتها مدهية الاطراف يميلها زراكتي  
وتجانبان متباينة الاوان || رقتها غراء اللون، سوداء  
الرأس تطول نحو ٤ سم. تركيب الأرضي شوكي والبطاطا  
قنطل السورق وتقصي عليها .

**19872 - عُشْبِيَّة الْبَقُول** \*

*Hadena oleraceae*,  
*Polia oleraceae* (S). Noctuelle potagère (F). *Bright-*  
*line brown-eye* (E). *Gamüsselle*, *Salatula* (D).  
فراشة صغيرة لثقة طولها القرب مدجبة الرواشن بالحنطي  
والأسمر . تظهر من حزيران إلى تموز . تمتج مكها على  
لصل الاوراق دون تميز بين الصفحة العليا او السفلى .  
ينفض المكن بعد عشرة ايام من رقات دقيقة سمراء اللون  
تتطور بسرعة من السخاخ إلى السخاخ حتى يبلغ طولها  
نحو ٥ سم . ويستمر ثوبها على الصهبة الخضراء الزرقية  
المائل || وهي في جميع اموارها البرقية لا تنفض عن انثام  
اوراق البقول على اختلاف انواعها وضماثلها .

الاقليمي الترتيب || ايجالها الحولية ثلاثة تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها غيرة اللون تطول من ٢٢ الى ٢٧ م. تركب البطاطا والجذر والملفوف والكرمة .

### ١٩٨٧٤ - عشية ملوكة

Noctuelle colorée (F).  
حشرة تلتصق ذبيلة دقيقة ، اطليها .

١٩٨٧٥ - **عسل**  
Pédiluve (F).  
القتل أو شغل القوام عمل تقرضه الطيارة البيطرية ، قواها شغل قوام الحويان بفض الحاصل الملهوة لاتخاذ الحصى القلاعية ويغيرها من الامراض .

### ١٩٨٧٦ - **عسلج**

نبات مثل القنفاء . ترتفع قدر الشبر . لها ورقة لزجة وزهرة كزهره المرو الجبلي (السان) .

### ١٩٨٧٧ - **عسوة \* ، غلاديشيا**

Gleditsia (S). Févier, Carouge à miel (F). Three thorned acacia (E). Gleditschbaum (D). Gledizia (I). جنس اشجار برية ويزينية من فصيلة القرنيات القراقية ، اوراقها المشرفة حسة جميعها ثالكة . سوكها متصبية . اوراقها متناحية ، مركبة ، ريشية . ازهارها عمودية الارتفاع . ثمارها قرنية خرونية خشيشة لا تخلو من السكر . يستخرج منها بعد التخمير والتقطير قندي كحول لا بأس فيه || اعرف انواع النسو واشهرها ما يلي .

### ١٩٨٧٨ - **عسوة المتناقع ، غلاديشيا المتناقع**

Gleditsia aquatica, G. monosperma (S). Févier des marécages (F).  
شجرة برية ويزينية ترطب في المستنقعات وسائر الاراضي الرطبة . ساقها تعلو من ٦ الى ١٢ م. شوكها دقيق الجسم ، مقطوع القامة . اوراقها مستطيلة . ورققاتها شقية براوح عددها بين ٢٠ و ٢٨ ، نصلها سناني الشكل مالم البشرة || قرنها بيضيه مبطلة تطول نحو ٤ سم . وتقرض ٢ سم . وهي وصيدة اليرقة دمعية الباب السكري . ازهارها يستمر من ايار الى سزيان .

### ١٩٨٧٩ - **عسوة اليابانيان ، غلاديشيا يابانية**

Gleditsia japonica, G. horrida (S). Févier du Japon (F).  
شجرة سبروتية تعلو من ٨ الى ٢٠ م. اشراكها متشعبة تطول من ٥ الى ١٠ سم . اوراقها مستطيلة . ورققاتها تدم من ١٦ الى ٢٠ نصلها اطليجي الشكل ، مقطوع القامة ، مالم البشرة بطول نحو ٥ سم . ويقرض نحو ٢ . قرنها كبيرة القند متبوعة تطول من ٢٠ الى ٥٠ سم . وتقرض نحو ٦ م. لبها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من سزيان الى تموز .

### ١٩٨٨٠ - **عسوة ثلاثية الشوك ، غلاديشيا ثلاثية الشوك**

Gleditsia tricantha (S).  
Févier à trois épines (F).  
شجرة سبروتية برية ويزينية تعلو من ١٠ الى ٤٠ م. ساقها متصبية . اشراكها ثلاثية التركيب سادة الحمة . اوراقها تطول من ١٤ الى ٢٠ سم . وقص من ١٦ الى ٢٤ وريفة نصلها مالم الصقمة عزز اثمار || قرنها صعبية الشكل تطول من ٢٠ الى ٤٠ سم . لبها غزير المادة السكرية || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

### ١٩٨٦٦ - **عشية الكلاء ، نليكية الكلاء**

Neuronia popularis, Epineuronia popularis, Heliophobus popularis (S). Noctuelle des fourrages (F).  
فراشة صغيرة القند حنطية اللون . وروشنا الاماميان الى السرة تمرنها عروق يعض . وروشنا الخلفيان الى التبرية الخنطية يحويها حمار مهدب الاطراف . مسرعا جري يستمر من تموز الى ايلول . الاثني تمتص مكثا على سوق واوراق الاصاب البرية فيقتف من رقات دقيقة سريعة التطور يبلغ طولها نحو ٤٥ م. في اقل من شهر . ثوبا الى السرة يميلوا من كلي جانبيها ثلاثة خطوط فاحلة صفراء اللون || تختفي في النهار تحت الحجارة وتسر في الليل . قوتها اوراق الاحشاب النجيلية ان برية او مروية وانحسا الذرة .

### ١٩٨٦٧ - **عشية الملفوف \* ، نليكية الكرنب دودة القلق**

Barathra brassicae, Mamestra brassicae (S). Noctuelle du chou, Brassicaria, Ver du coudr (F). Cabbage moth (E). Kohleule (D).  
فراشة صغيرة القند حنطية اللون . وروشنا متناخلة الاثاني مبقية ويزركشة . لها جيلات في الحولة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند تطول من ١٦ الى ١٨ م. تميش على اوراق الملفوف والنس والذرة والبقع وقد تقرض سوق شتول الملفوف نصطبا وتقتض اوراق التبغ فتشوها .

### ١٩٨٦٨ - **عشية حنكسك ، Noctuelle bois (F)**

حشرة قضي اخروفس احلس ، اطليها .

١٩٨٦٩ - **عشية رمدكاه ، Acronycta rumicida (S)**  
Noctuelle cendrée, Cendrée (F). Dark knot-grass moth (E). Ampferseule (D).  
فراشة صغيرة القند رمداء الثوب مبقية بالابيض . ايجالها الحولية ثلاثة . تظهر من ايار الى ايلول || يرتبها صغيرة القند ثوبا الى السرة العائقة ، طولها براوح بين ١٤ و ١٨ م || تركب الجنبيل والملفوف والاشياك .

### ١٩٨٧٠ - **عشية زنجية**

Noctuelle basanée (F).  
حشرة تلتصق اخروفس زنجي ، اطليها .

### ١٩٨٧١ - **عشية عجبية \* ، نليكية عجبية**

Agrota exclamatoria, Feltia exclamatoria (S). Noctuelle point d'exclamation, N. double tache, Double tache (F). Heart and dart moth (E). Kreuzkrautzackereule, Ausrufungszeichen (D).  
فراشة صغيرة القند حنطية اللون . وروشنا الاماميان الى الشقار الصاني يملوها بتيج ثنائي الشكل . ايجالها الحولية اربعة اوصخ || يرتبها كدواء اللون تطول من ١٦ الى ١٩ م. تركب القلق والسانت والشعير والذرة ويختطف النجيليات المروية والشعير والبطاطا والملفوف واللفت والكرمة والبقع .

### ١٩٨٧٢ - **عشية قلوقة ، Noctuelle ypsilon**

هي فراشة البودة القارضة ، اطليها .

### ١٩٨٧٣ - **عشية مصاحبة**

Tryphaena pronuba (S). Noctuelle pronubée, Flancée (F). Common yellow underwing moth (E). Heumittzerchen (D).  
فراشة صغيرة القند ، سمراء اللون ، فضية التيج النقي



عشية القلق



عشية الملفوف



عشية عجبية



عشية مصاحبة



عسوة



## ١٩٨٩٩ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ

Hyménoptères symphytes (F). Hymenoptera symphytes (E).

رتبة حشرات من طبقة عُشَائِيَّاتِ الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ٨٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام تراوح بين ٣ و ٤٠ م . جميعها كاملة الطور ، رباعية الأجنحة الثلاثية . عادمة الانفصال الحسري ، بطولها لائحة بحولائها . أعضائها قارضة أو لائحة . ممرات أنثى سننة كالنشارة تحترق أصلب الماء وهي تستعملها في الحفر والخز والروخ || أشهر فصائلها : العلبات والخطاريات والنظريبات .

## ١٩٩٠٠ - عُشَائِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ الْمُحْصَرَّةِ

Hyménoptères apocrites (F). Hymenoptera apocrites (E).

رتبة حشرات من طبقة عشائيات الجناح . أجناسها وأنواعها زهاء ١٢٠٠٠٠٠ أجناسها متباينة الأقسام والألوان . جميعها كاملة التطور . مصورها دقيقة واضحة منها الابنوبية الشكل والردنية . أجنحتها عشائية رباعية . أعضائها قارضة أو لائحة . أشر أنثى سننة كالنشارة تستعمل الحفر والخز والروخ || فصائلها كثيرة العدد ، أشهرها الأبريات والذخوريات والدلتيكات والزيروديات والنطليات والنطليات والصفريات والنمسيات .

## ١٩٩٠١ - عُشْمِيرَةٌ

Hyperparasite (F).

كل كائن مقلد يهش على مقلد آخر .

## ١٩٩٠٢ - عُشْمُوكَةٌ

ثمرة السدر . ج . شمر .

## ١٩٩٠٣ - عُصَبٌ

هو الاختصاب ، أطله .

## ١٩٩٠٤ - عُصْفَصٌ

Gallinosa (S). Gallinosa, Gallinogla (F).

جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة المركبات . أنواعها عديدة : جميعها برية . أوراقها متقابلة ، ناعما حادة أو زبابة . أزهارها حامية الإبتكار ، عديدة الألوان التي تختلف باختلاف الأنواع . وهو بجميع أنواعه من النباتات المرصوة لكنه يعتبر من الاشباه القليلة التي تستنزف الأرض وتؤدي الزرع والزعزعة .

## ١٩٩٠٥ - عُصْفَنٌ ، تَعَصْفَنٌ

Ebranchage (F). Pruning, Lopping, Trimming (E).

هو اقتلاع الأغصان وقد يكون السبب حث الشجرة على الارتفاع أو تغيير هيكلها أو تجديد شبابها .

## ١٩٩٠٦ - عُصْفَنٌ

Branche (F). Branch, Bough (E). عُصْفَنٌ

الغصن هو الفرع على الساق غلط أو دق .

## ١٩٩٠٧ - عُصْفَنٌ تَصْرِيٌّ

Branche frutière (F). Limb (E).

عصن يكون عادة أدق من الأغصان المألوفة الأخرى يحمل الكبر مباشرة .

## ١٩٩٠٨ - عُصْفَنَةٌ ، عُصْفَنٌ

Ramille (F). Twig (E). عُصْفَنَةٌ ، عُصْفَنٌ

الفصنة والنمسين هو ما استق من الأغصان بلغ الحول أو لم يبلغه .

## ١٩٨٨١ - عُصُولٌ

هو إثنان ابوساق ، أطله .

## ١٩٨٨٢ - عُصُولِيٌّ

نبت من السباغ (المان) .

## ١٩٨٨٣ - عُشٌّ

Falsification, Fraude (F). Falsification, Fraud (E).

خدع الشاري بتبديل ماعية المشتري أو تبديل صفاته . وفي القانون المدني هو الخداع المقرون بسوء نية للاضرار بالغير ككسب البادار والاسمعة والأدوية الخ ...

## ١٩٨٨٤ - عُشَاءٌ ، عُشَاءٌ

Tégument, Membrane (F). Membrane, Tégument (E).

ما يغطي أو يلف جسم الحيوان والنبات كالجلد والوبر والريش وأغشاف والماء .

## ١٩٨٨٥ - عُشَاءٌ جَرْئِيٌّ ، عُشَاءٌ رَحْمِيٌّ

Membrane germinale (S). Germinal membrane (E).

## ١٩٨٨٦ - عُشَاءٌ خَلَوِيٌّ

Membrane cellulaire (F). Cell membrane (E).

## ١٩٨٨٧ - عُشَاءٌ مَسْتَحْيٍ ، عُشَاءٌ تُخْرُوبِيٌّ

Membrane alvéolaire (F). Alveolar membrane (E).

## ١٩٨٨٨ - عُشَاءٌ عُضْلِيٌّ

Myolème, Sarcolemme (F). عُشَاءٌ عُضْلِيٌّ

كل غشاء يلف العضلات الرئيسية .

## ١٩٨٨٩ - عُشَاءٌ عُزْبِيٌّ

Membrane criblée (F). Sieve membrane (E).

## ١٩٨٩٠ - عُشَاءٌ عُطَائِيٌّ

Membrane recouvrante, M. tectoriale (F). Tectorial membrane (E).

## ١٩٨٩١ - عُشَاءٌ لَمِيزٌ

Membrane limitative (F). Limiting membrane (E).

## ١٩٨٩٢ - عُشَاءٌ مُعَاطِيٌّ

Muqueuse, Membrane muqueuse (F). Mucosa, Mucous (E).

مادة مخاطية تلتصق بغض أجزاء أعضاء الجسم الحيواني .

## ١٩٨٩٣ - عُشَاءٌ مُصْطَبِيٌّ

Membrane séreuse (F). Seros membrane (E).

## ١٩٨٩٤ - عُشَاءٌ نَاقِصٌ

Membrane caduque (F). Deciduous membrane, Decidua (E).

## ١٩٨٩٥ - عُشَاءٌ نَوَوِيٌّ

Membrane nucléaire (F). Nuclear membrane (E).

## ١٩٨٩٦ - عُشَائِيٌّ

Membraneux (F). Membranous (E).

## ١٩٨٩٧ - عُشَائِيَّاتٌ ، فَطُورٌ عُشَائِيَّةٌ

Hyménomycètes (F). Hymenomyces (E).

مجسومة من الفطور العفصية من ذوات اللقطة البورية .

## ١٩٨٩٨ - عُشَائِيَّاتُ الْجَنَاحِ

Hyménoptéroïdes (F). Hymenopteroides (E).

طبقة حشرات من شعبة الحسدليات وطائفة أجنحة أصلا . تشمل كل من رتبتي عشائية الأجنحة وعشائية الأجنحة المحصورة . أما أنواعها فنحو ٢٠٠٠٠٠ تنتمي في ٩٦ فصيلة .

ظهور اليوم باستعمال سائل يورود الحليل من ١ الى ١,٥ %

١٩٩١٥ - **عُصْبَاة**  
Tamaris de Syrie (F).  
هو الاثل السوري شجرته تملو نحو عشرة امتار اعتشباها صلبة مغروبة فيها . ج. خضا .

١٩٩١٦ - **عُصْبَار** ، **دَلْعَان** (F).  
Glaise, Argile verte (F).  
تراب حصالي لايب سحر شديد الانساج والصلابة لونه الى الخضار الداكن . يستعمل في صناعة الفخار والحلج .

١٩٩١٧ - **عُصْبَاكَة** (F).  
Paragénsie (F).  
النفخانة تهجين تكون فيه المحجن حقيرة ان تصالبت فيها بينها وتكون ثلثرة ليا نو تصالبت مع كل من اوروبا .

١٩٩١٨ - **عُصْبَاكَة** (F).  
Pléthore (F).  
النفخانة حي فرط النمو في النبات .

١٩٩١٩ - **عُصْبَاكِي** ، **دَلْعَاكِي** (F).  
Glaiseux (F).  
الذي يحتوي على النضار او الذي يشبه النضار او الدلغان .

١٩٩٢٠ - **عُصْبَاكِي**  
Clayey, Loamy (E).  
نوع من الجراد ويسمى الجراد المبارك (السان) .

١٩٩٢١ - **عُصْبَان** (F).  
Avortement (F).  
هو لثام الاثني الحامل ولدعا لغير تمام .

١٩٩٢٢ - **عُصْبَانَة** (F).  
Tunica (S).  
حشية برية معمرة من فصيلة القرنفليات . ساقها دقيقة فروعها تملو من ١٠ الى ٣٠ سم . اوراقها جذعية الانتشاج .

١٩٩٢٣ - **عُصْبَرْكَة** (F).  
Pelouse (F).  
كل ارض يشعلها العشب الاخضر ان طويها او مزودها . ج. خضاري .

١٩٩٢٤ - **عُصْبَرْكَة**  
Lawn, Greensward (E).  
مركب طبيعي يحوي بعض الطيور . للضمار كثيرة العدد لا يبالغ لذكرا جميعها انما تختص منها الفلمسية والميكس والنضار والكولان .

١٩٩٢٥ - **عُصْبَرْكَة**  
Silicate d'alumine (F).  
مركب طبيعي يحوي بعض الطيور . للضمار كثيرة العدد لا يبالغ لذكرا جميعها انما تختص منها الفلمسية والميكس والنضار والكولان .

١٩٩٢٦ - **عُصْرُوف**  
Cartilage (F).  
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة يضاء اللون تكثر كغصاة عند الحراف الطظام .

١٩٩٢٧ - **عُصْرُوفُ الْعَطَم**  
Cartilage, Gristle (E).  
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة يضاء اللون تكثر كغصاة عند الحراف الطظام .

١٩٩٢٨ - **عُصْرُوفُ الْعَطَم**  
Cartilage des os (F).  
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة يضاء اللون تكثر كغصاة عند الحراف الطظام .

١٩٩٢٩ - **عُصْرُوفُ الْعَطَم**  
Bone cartilage (E).  
مادة عضوية قوية مرنة مطاطة يضاء اللون تكثر كغصاة عند الحراف الطظام .

١٩٩٠٩ - **عُصْرُوبُ جَسُور** \*  
Tyrannus Intrepidus (S).  
طائر من القوط من فصيلة الطيوريات . موطنه بعض مناطق امريكا الجنوبية يرسل منها الى امريكا الشمالية في اواسط آذار ويصل اليها في اواسط ايلول . يالت غشاق البعيريات ويحاري الماء ويقترّب من الجنائن والحدائق والبساتين || جسمه متوسط القد بطول نحو ٢٠ سم .

ثوبه متباين الالوان المتداخلة . رأسه وظهوره الى الازرق الزرقاء المزاج . ذرو صقلا الى الياض الناطع . صدق وبطنه الى الازرق الشهباء . ويعلو في كل من صغفه شريط برتقالي يمتد من قاعدة الحنق الى الفلق . جناحا وذنبه الى الازرق السوداء المزاج . ذنبه مستدير الطرف .

رسمه واصابعه الى السرة || قوته الحشرات المخططة من الكبيرة الى الصغيرة والزيتون والنمل || يثنى حقه في الاجار الرقيقة على الاضغان المنسقة . الاثني تقع من اربع الى خمس بضات لونها الى الياض المرقوش بالاحمر والاسمر . الحلق يستمر نحو اسبوعين تقود به الاثني بجناوبة المذكر .

١٩٩١٠ - **عُصْرُوبَات** \*  
Tyrannidae (S).  
فصيلة طير من الجوارم نباتات المتأثير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طيور البلاد الامريكية اصحابها امريكية الجنوبية || اجسامها متوسطة القد .

منقارها بطول رؤوسها . اجنتها ذلقة . اذنانها قصيرة متباينة الاشكال . ارجلها دقيقة مستعدة لليل . اذنيها ملونة زاهية الخضاب || قوتها الحشرات وصل اختلاف فصائلها || اعرف انواعها وفهرها العصبوب الجسور .

١٩٩١١ - **عُصْبِين** \*  
Polychade (F).  
القصين من نباتات ما كانت اخصائه وفائدته اكثر من المانوف .

١٩٩١٢ - **عُصْبَانَة** ، **اَنْتُمْبُورِيوم** \*  
Entomosporium (S).  
جنس تطور مجهري من فصيلة المذكيات . يكتنفاته مغلفة ، سوداء اللون ، فريجة الانفلاق . جولا تحيل الحلقة ، غليظ القاعدة . ثغراته سبية لاسقة ، بويذاته ثنائية الخلية || اشهر انواعه القشاة اللاتخ .

١٩٩١٣ - **عُصْبَانَةُ الْحَلِج** \*  
Entomosporium thuenenii (S).  
آفة لنتل الكالهار يقع حل البسر فيمنح الاذراك ويصيب التيجش والنبات || يكافح عند ظهوره باستعمال سائل يورود الحليل من ٨ الى ١ % .

١٩٩١٤ - **عُصْبَانَةُ لَاتِخ** \*  
Entomosporium maculatum (S).  
فطر مجهري يصيب ورق الزعرور والارونة والشملة والاكنيتا . وقد يصيب في بعض ظروف غامضة الاضغان والجار غير المعرضة لاشعة الشمس || مظهره الخاربي يقع صغرة مستديرة مبررة على كامل فصل الاوراق ، تبعو بقية اللون ثم تحرق نحو السرة نصب البشرة والنجس المتحارة وتثل التبادل التنسي || يكافح عند



عُصْبُوبُ جُور



لُصَاء لَاتِخ



عُصْبَانَة

## ١٩٩٣٩ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ ، جُوتِيَّ البَيْدَاءِ

*Syrhaptus paradoxus* (F). *Syrhaptus paradoxus*,  
*Poule des stappes* (F). Black-bellied (E).

طائر من النصف طول نحو ٢٤ سم. يعيش أستراليا كبيرة  
تجوب نيازي آسية الشمالية وإكسلي. قَلْبًا حَلَقِيٌّ فِي سَمَاءِ لِبْنَانِ .

## ١٩٩٤٠ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ ، جُوتِيَّ التِّبْتِ

*Syrhaptus tibetanus* (S). *Syrhaptus du Thibet* (F).

طائر من النصف طول نحو ٢٢ سم. قُوَّةُ أَلِ البَيَاسِ .

أَسْرَابُهُ قَلِيلَةٌ أَلَمَدُ . مَوَلَدُهُ مَرْتَمَاتُ التَّيْبِ وَبِجَاهِهَا .



غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ

## ١٩٩٤١ - غُضَيِّفَاتُ

*Pteroclididae* (S). *Pteroclididae* (E).

فَصِيلَةٌ مِنَ الطَّيْرِ مِنْ رُبَّةِ الدَّجَاجِيَّاتِ تُعْرَفُ بِالْجَالُوتِ .

## ١٩٩٤٢ - غُضُنُ

*Tunika* (F). *Tunica* (E).

## ١٩٩٤٣ - غُضُنُ العَيْنِ

*Tunika de l'oeil* (F).

## ١٩٩٤٤ - غُضُنُ حَبَّتِي

*Tunika granuleuse* (F). *Granulosa tunica* (E).

## ١٩٩٤٥ - غُضُنُ عَكْرَجِي

*Tunika adventice* (F). *Adventice tunica* (E).

## ١٩٩٤٦ - غُضُنُ لَيْلِي

*Tunika fibreuse* (F). *Fibrosa tunica* (E).

## ١٩٩٤٧ - غُضُنُ مُتَرَسِّطٍ

*Tunika moyenne* (des artères) (F). *Media tunica* (E).

## ١٩٩٤٨ - غُضُنُ مُعَاطِي

*Tunika muqueuse* (F). *Mucosa tunica* (E).

## ١٩٩٤٩ - غُضُنُ مُتَعَطِفٍ ، غُضُنُ أَعْوَجٍ

*Pli déjeté* (F). *Asymmetrical fold* (E).

## ١٩٩٥٠ - غُضُرُوكَ ، غُضُرُوكَ

لَبَاتٌ يَشِبُّهُ الصَّغْدَةُ وَالْأَمَامُ . وَتَقِلُّ جُرْمَةً خَيْرًا تَطَرُّ . وَتَقِلُّ  
هُوَ لَبَاتٌ لَا يَمْتَدُّ عَلَيْهِ نَمْرُ (الْمَسَانِجُ) . غُضُرُوكَ وَغُضُرُوكَ .

## ١٩٩٥١ - غُضُرُوكَ

*Saccopteryx* (S). *Saccopteryx* (F).

يَسُومُ غُضُرُوكَ مِنْ عَارَةِ الرِّبَاسَاتِ مَوَلَدُهُ أَمْرِيكَانِيَّةٌ  
وَالْقُرْبَانِ . أَنْوَامُهُ قَلِيلَةٌ أَلَمَدُ تَتَبَيَّرُ بِشِجَارَةِ رُؤُوسِهَا وَبِقَعْرِ  
أَنْتَابِهَا لِلْمُتَفَضِّلِ || يَمِيشُ بِحُلَامَتِ كَثِيرَةٍ أَلَمَدُ . يَسْرَحُ  
طَوَالَ الْبَلَدِ . قُوَّةُ الْحَشَرَاتِ . يَأْكُلُ الْأَشْجَارَ الْحَرْمِيَّةَ .

لَا يَمِيشُ الْمَطَرُ .

## ١٩٩٥٢ - غُضَيِّفُ

*Pléthorique* (F). *Pléthoric* (E).

الْبَيَاتُ الْغَضِيْرُ مَا كَانَتْ أَغْضَاهُ غَضَةً وَلَوَارِقَهُ غُضْرَاهُ  
سَاحَتَهُ زَائِمَةً . وَهُوَ قَلْبًا زَيْفَرُ وَيَشْرِي .

## ١٩٩٥٣ - غُضَيِّفِي

وَلَهُ الْبَقَرَةُ الْغَرِيْبَةُ .

## ١٩٩٥٤ - غُضَيِّفُ

*Sistotrema confusum* (S). *Sistotrema confusum* (F).

فَطَرٌ مِنْ فَصِيلَةِ السَّحَابَاتِ . يَمِيشُ فِي غَابِيَاتِ الصَّغِيرِ .

يَمِيشُ بِمَجْمُوعَاتِ مَتَاسَةٍ عَلَى الْمَوَادِّ الدَّجَالِيَّةِ || سَافَهُ قَصِيرَةٌ  
حُزْنِيَّةٌ مَتَعَجَّةٌ الْفَرَقُورُ خَيْرًا الْوَيْدُ . نَكْتَةُ قَائِمَةٌ ، مُعَدَّةٌ  
الْجَوَانِبُ لِنَهْأِ إِلَى الصَّغِيرَةِ يَمِيشُ مَوَاجٍ أَسْمَرَ || حَبِيْبَةٌ  
جَامِدَةٌ الْمَكْسَرُ . يَمِيشُ الْوَيْدُ ، مَرَّةً الْمَلَكُ ، لَا تَزْكَلُ .

## ١٩٩٣٨ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ

*Cartilage cricoide* (F). *Cricoid cartilage* (E).

## ١٩٩٣٩ - غُضُرُوفٌ حَلَقِيَّةٌ

*Cartilage costal* (F). *Costal cartilage* (E).

## ١٩٩٣٠ - غُضُرُوفٌ لَيْلِيَّةٌ

*Fibrocartilage* (F). *Fibro-cartilage* (E).

## ١٩٩٣١ - غُضُرُوفٌ مُتَكَكَّسٌ

*Cartilage calcifié* (F). *Calcified cartilage* (E).

## ١٩٩٣٢ - غُضُرُوفِي

*Cartilagineux* (F). *Cartilaginous, Gristly* (E).

مَا كَانَتْ نَسَبُهُ غُضُرُوفِيَّةً أَلَمَدُ .

## ١٩٩٣٣ - غُضُرُوفِيَّاتُ الْإِزْعَافِ

*Chondropterygians* (F).

صَفٌّ أَسْمَاكَ كَبِيرَةٍ أَلَمَدُ كَالْحَمْرِ تَمِيزُ بِخُلُجٍ مِنَ الْهَيْكَلِ  
الْعَظْمِيِّ . جَانِبَاهُ وَسِلَاسُهُ الْفَقَارِيَّةُ غُضُرُوفِيَّةُ الْكَرْبِ .

فَصَالِهَا وَأَجْنَحَاهَا وَأَوْرَاقُهَا كَثِيرَةٌ أَلَمَدُ تَنْتَبِهُ إِلَى رُبَّتَيْنِ:  
السَّفْنِيَّاتِ وَكَامَلَاتِ الرُّؤُوسِ .

## ١٩٩٣٤ - غُضُرِيَّاتُ

*Alzooceae* (S). *Alzooceae* (F).

فَصِيلَةٌ لَبَاتِيَّةٌ مِنْ مَسْتَقَلَّاتِ الْقَمَلَاتِ . أَجْنَحُهَا وَأَوْرَاقُهَا  
عَدِيدَةٌ ، مَعْظَمُهَا بَرِي .

## ١٩٩٣٥ - غُضَيِّفُ

*Samyda* (S). *Samyda* (F).

جَنْسُ لَبَاتِيَّاتٍ بَرِيَّةٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْغُضَيِّفِيَّاتِ . أَنْوَامُهُ الْمَرْفُوعَةُ  
قَلِيلَةٌ أَلَمَدُ ، أَطْعَامُهَا الْمَنَاطِقُ الْحَارَّةُ مِنَ الْعَالَمَيْنِ الْقَدِيمِ  
وَالْجَدِيدِ . جَمِيعُهَا خَيْرِيَّاتٌ وَجَنَاتٌ مُتَعَدَّةٌ الْجَرْمِ . أَوْرَاقُهَا  
أَبْيَضَةٌ سَنَجِيَّةُ التَّصَالِ . أَزْجَاعُهَا طَرَفِيَّةُ الْإِنْكَتَازِ ، يَهْشَأُ  
الْوَيْدُ أَوْ وَرْدِي .

## ١٩٩٣٦ - غُضَيِّفِيَّاتُ

*Samydaceae* (F). *Samydaceae* (E).

فَصِيلَةٌ لَبَاتِيَّةٌ مِنْ مَسْتَقَلَّاتِ الْقَمَلَاتِ مَرْتَمَاتُ الْمَيْسِ .  
أَطْعَامُهَا الْبِلَادُ الْحَارَّةُ . أَجْنَحُهَا وَأَوْرَاقُهَا قَلِيلَةٌ أَلَمَدُ جَمِيعُهَا  
الْأَشْجَارُ وَخَيْرِيَّاتٌ مُتَعَبَّدَةٌ السُّوقِ . قَائِمَةٌ الْأَغْضَاةُ . أَوْرَاقُهَا  
أَبْيَضَةٌ ، مُتَعَبَّدَةٌ ، جَامِدَةٌ التَّصَالِ الْتَابِيَّةُ الْإِسْكَالُ ،  
مِشْرَعَةٌ الْغَدَدُ الْوَارِثِيَّةُ . أَزْجَاعُهَا مُسْتَعْبِدَةُ الْمَرْفِ عَدِيدَةٌ  
الْإِلَارَانُ ، يَكْتَرُ فِيهَا الْأَبْيَضُ ثُمَّ الْوَرْدِيُّ ثُمَّ الْأَسْفَرُ  
وَالْأَخْضَرُ .

## ١٩٩٣٧ - غُضُنُ

قَبْلُ فِي وَصْفِهِ : « جُرْمٌ بِالْمَتِّ كَالْتَحَلُّ سَوَادٌ خَيْرٌ أَنْ نَوَاهُ  
مَقْشَرٌ بِطَرِيقِ طَافٍ وَمِنْ أَسْفَلِهِ إِلَى أَعْلَاهُ صَفٌّ أَخْضَرُ . م .  
غُضُنُ . »

## ١٩٩٣٨ - غُضُنُ ، جُوتِي

*Syrhaptus* (S).

جَنْسُ طَيْرٍ مِنْ فَصِيلَةِ الْغُضَيِّفِيَّاتِ قَرِيبُ الشَّيْءِ مِنَ الْحَامِ .  
يَمِيزُ بِاسْتِطَالَةِ رِدْقَةِ قَوَادِمِ السَّقَطِ . وَرِيشَتَيْنِ مِنَ الْإِنْفِ .

قُوَّةُهُ إِلَى الْقَهْفَةِ الصَّغِيرَةِ تَمَلُّجًا رَقْشَةً سَمَاءَ مُتَرَسِّطَةٍ . رَاسُهُ  
إِلَى الْقَهْفَةِ السَّهْبَاءِ . حَبِيْبَةٌ مَكْمَلَةٌ بِالْجُلُودِ . سَافَهُ مَسْرُوعَةٌ  
سَحْبُ الْخَالِبِ || وَهُوَ شَدِيدُ الْفُطْرَانِ . يَطِيرُ مَسَافَاتَ ثَامِسَةٍ  
فِي طَلَبِ الرِّزْقِ وَالْمَاءِ . يَقِيمُ فِي الْغَيَافِ . قُوَّةُ الْجَوِيْبِ بِالْجَوْدِ  
عَلَى الْخُتْلُفِ . يَمِيشُ أَسْرَابًا كَبِيرَةً . مَتْنُهُ الْفُضُوفُ تَرْسَمُهُ  
الْإِنْفِ عَلَى الْأَرْضِ قَرِيبَ دَفْعَةٍ أَوْ حَوِيْمَةٍ تَتَبَيَّرُ فِيهِ أَرْبَعُ  
يَهْشَأُ صَغِيرَةٌ مَرْتَمَةٌ مَحْضَبًا ٢٤ وَبِيَا || لَهُ نَوَافِدُ مَعْرُوفَانِ  
غُضُنُ الْبَيَادِ وَغُضُنُ التَّيْبِ .



غُضُنُ

Argyronète (F).

١٩٩٦٢ - غُطْرُف

هي النسيبة للمالية، اطلمها .

Podicipidae (S).

١٩٩٦٣ - غُطْرُفِيَّات

Podicipidae (F). Podicipidae (E).

فصيلة طيور مائية من رتبة كفيّات القدم تتميز بأجسامها البيضية الشكل . امتنقا دقيقة مسطيلة ورؤوسها مدببة . أذيادها هريالة . أرساغها خفيفة . أصابعها غليظة أطرافها عريضة مبعدة . ريشها ناعم . حرري ، مصقول . أجنحتها قصيرة ذلقة . أذناها مشعرة وطلة . أشهر أجناسها الطاس .

Pterocles senegalensis (S). غُطْرُط

Pterocle du Sénégal (F). Singed sandgrouse (E). قال المصري : و ضرب من الطاس طير الطهور والبطون والأبدان سود بطون الإجنحة طول الإربل والاعتاق لطاف لا تتجسس أسراباً وأكثر ما تكون ثلاثاً أو اثنتين الواحدة غطاطة كذا قاله الجاهري وقال ابن سيده الغطاط القتا وقيل الطاس ضربان فالقصار الإربل السفر الاعتاق السود القوادم الصهب الخوازي هي الكديرة والجولوية والوطاوق الإربل البيض البطون الدبر الطهور البراسمة السبين هي الطاس . وقيل الغطاط ضرب من الطير ليس من الطاس .

Neotragus pygmaeus (S). غُطْرُف

Guevi (F). حيوان لبني وحيد الجنس والنوع من الغزلان . موطنه يمتد من ليبريه الى افنديه . يأكل الغابات . ملجته الحياني جاسي || جسمه صغير القد بطول نحو ٦٥ سم . ويرتفع نحو ٤٥ سم . قوائمه دقيقة . القفائمان الاسودتان أقصر من الخلفيتين . ثوبه الى الشحنة السوداء المروج . صدره وبطنه الى البياض الاخير . قرنا الذكر قصيرا دليقان . الاثنى جاء ثنائية الاخلاص || يعتبر من أسرع أنواع الغزلان وأفقرها .

Vipère tigrée (F). غُطْرُوب

الطرب حية خبيثة تدعى أفعى نمرة اطلمها .

Vipère noire (F). غُطْرُوب أَسْوَد

حية خبيثة تدعى أفعى سوداء . اطلمها .

١٩٩٦٨ - غُطْرُف الحَمْصِيَّات

Aleurotrachilus citri (S). Aleurodes des citrus (F). ويدهي ذبابة الملاح البيضاء . حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . حوريتها بيضية الشكل عمودية الظهر الاسود . حناص صفتها كثيف الاهداب الشمعية الأبيض . تركيب جميع أنواع الحمصيات تنفذيها لأنها تطال الأوراق بد أن تمص صارتها .

١٩٩٦٩ - غُطْرُف الرِّمَان

Siphonius granati (S). Aleurodes des granadiers (F). حشرة من الطفريات صغيرة القد طولها يراوح بين ١ و ٢ م . جسمها اسمر اللون ، أغير للمادة الشمية . تمتص مكها على الأوراق البيناتات الحشائفة ينقش من حوريات مغلطمة اللون الاسمر ، بيضية الشكل ، كثيفة الاهداب الشمية الأبيض || تركيب أوراق وفانان الريان والاجاص والسفرجل .

Plicatula (S).

١٩٩٥٥ - غُصَيَّة

Plicatule (F). Plicatula (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفيحات الخياشيم وقصبة القفاحات . أنواعها الماسرة المعروفة قليلة العدد منتشرة من المحيط الهندي الى اطراف المحيط الهادي || اصداها صغيرة الحجم ، مروحية الشكل ، متحفة القدم ، شمانية التخديذ . لامناوية المصاريع ، المصراع الانسي محذوب الصفة قليل التخديذ || تعيش لاصقة بالصخور البعيدة القور .

Ganga 'brûlé (F). غُصَيَّة

طائر من القتا يعرف بالغطاة المصراوية .

Podiceps (S). غُطْطَاس ، غُطْطَاس

Grèbe (F). Grèbe (E). جنس طيور مائية من فصيلة الغططاسيات . أوله نحو ٣٥ اطلمها العالم . جميعها من القواطع . تربط في الماء المدية . تتميز بإسعالها امتنقا . غطاطها جالسة . أجنحتها قصيرة ذلقة . يطي تحيد القدم والقص . قوتها الاسماك الصغيرة والقشريات والحشرات والقنفذ والنباتات المائية . تدن في القصب والقرزار والاسل حل ضفاف البحيرات والابار || أنثا تقنع من ٣ الى ٦ بيضات تحضنها بتناوبه الذكر مدة ثلاثة اشابيع . أشهر أنواعه الطاس الشرج والمطوق والآذن والصنبر .

Podiceps auritus (S). غُطْطَاس آذِن

Grèbe oreillard (F). طائر من الطاس متوسط الحجم طوله نحو ٣٥ سم . ثوبه متراكب الايلان الزاوية . غططه اسود الجسم ، أحر الملقط . اطمنه فسيحة الارباء تشمل معظم بحيرات الشرق واروبه التي يتفقد أكثرها في كل حبل .

١٩٩٥٩ - غُطْطَاس صَغِير

Podiceps minor, P. fluviatilis (S). Grèbe castagneux, Plongeur nain, P. des fleuves... (F).

طائر من الطاس صغير الحجم طوله نحو ٢٤ سم . ثوبه متباين الالوان الزاوية . ظهره الى السمرة يعلوها موج زخرفي . صدره الى الربعة السوداء المروج . بطنه اسهب اللون . حنقه الى الشفرة الكهنتية . زلفه أبيض . غططه اسفر الجسم ، اسود الملقط || اطمنه بحيرات ومنتاق وانهار العالم القديم يتفقد معظمها كل عام .

١٩٩٦٠ - غُطْطَاس مَشُوج

Podiceps cristatus (S). Grèbe huppé (F).

طائر من الطاس كبير الحجم طوله نحو ٥٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الالاسية . ظهره الى السمرة السوداء الملاج . رأسه مشوج القفن بقنصرين اقنفة الاوتكاز . محسره ومعه بيض اللون ، سود اختار الباعلي . شقر الاهداب الخارجية . زوره وبطنه وغوايته فضية اللون ، صناعية الرقعة . زلفه وصنابه حر . غططه اسفر الصفة البليا ، أحر السفل ، أبيض الملقط . قاتمته الى السمرة الخضراء . اطمنه العالم يحرب جميع البلاد مستقداً حيائها المدية .

١٩٩٦١ - غُطْطَاس مَطْرُوق

Podiceps nigricollis (S). Grèbe à cou noir (F).

طائر من الطاس متوسط الحجم طوله نحو ٣٢ سم . ثوبه متراكب الالوان الزاوية ، حنقه اسود . بطنه أبيض . وهو يجتنب المناطق الباردة ويحجب مياه البلاد الممتدة دون سواها .



غُصَيَّة



طاس مشوج



طاس



غُطْرُف الحَمْصِيَّات



غُطْرُف الرِّمَان



غُطُوف السَّيْدِيَّان



غُطُوف اللّ



غُطُوف القُطن



غُطُوف المُلْدُوف



غُطُوف النَمْع



غُفَّتْ إِبْن سَيْنَا

### ١٩٩٨٠ - غُطُوبِيَّة

Hydroble (F). تمت ترميزه يطلق على النباتات والحشرات التي تعيش في الماء.

### ١٩٩٨١ - غُطُوبِيَّة

Bifora (S). Bifore (F). جنس نباتات عشبية حولية بيرة من فصيلة الخيميات. أنواعها المروعة قليلة البعد منها ينبت في مناطق حوض البحر الأبيض المتوسط وبعض مناطق أمريكا الجنوبية. جميعها كزيرية الشكل، مسنجة الزخرفة. أزهارها صيوانية التجميع. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها شبه لبيبة الشكل، مسطحة الجرم، عذدة الوسط المنحرف. أعرف أنواعها وأشهرها التفصارة الحويصة.

### ١٩٩٨٢ - غُطُوبِيَّة

Bifora caucasicola (S). Bifora caucasicola (F). نوع من التفصارة، عشبية حولية بيرة. طويعة في بعض أصناف لبنان وسورية. ساقها لساء فراء. أوراقها مركبة، ريشية، ثنائية التفرع. أزهارها صيوانية. أزهارها بيضاء اللون. ثمارها معتدلة التبطيط قريبة الشبه بالخصي.

### ١٩٩٨٣ - غُفَّتْ

Eupatorium (S). Eupatoire (F). جنس نباتات معمرة من سبط الغنديات وفصيلة المركبات. أنواعها عديدة معظمها بري، وبعضها زراعي. ساقها خشوية. أوراقها لاقامية الانتظام والارتكاز منها البسيطة والمركبة ومنها المتعاقبة والمتناوبة. أزهارها رؤسية صغيرة لثقة. زهورها نخلة. يعلوها حطب مسنن. أعرف الأنواع وأشهرها ما يلي.

### ١٩٩٨٤ - غُفَّتْ إِبْن سَيْنَا \* عَذَّة البَنْت

Eupatorium cannabinum (S). Eupatoire d'Avicenne, E. chanvrine, Chanvre d'eau, Chanvrine, Herbe de Ste Cunegonde (F). Water hemp, Hemp agrimony, Hemp weed (E). Hanfzweed, Wasserhanf (D). Eupatoria d'Avicenna, Canapa acquatica (I).

بجلة برونية مملوءة معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. أوراقها مركبة ثلاثية أو خماسية الورديات المسطحة. نصلها أصصي الشكل، مسنن الحافة. أزهارها وردية اللون، خماسية أو سداسية الرؤيات الصغيرة. أزهارها يمتد من محور إلى الأعلى. وهي تتركب في المراتب الربية. كانت شائعة الاستعمال الطبي لقيمة الكليك وتستخدم في عدة علاجات لأمراض أخرى.

### ١٩٩٨٥ - غُفَّتْ أَرْجَوَانِي

Eupatorium purpureum (S). Eupatoire pourpre (F). جنبة برونية معمرة تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها لسطوانية سرسة. أوراقها السفلى خماسية بواحد بين ٣ و ٦. أوراقها العليا متعاقبة، جميعها مسنقة، سنائية. نصل الحشن اللبس. رؤياتها الزهرية حريصة التجميع، أرجوانية اللون. أزهارها يمتد من إبط إلى كثرين.

### ١٩٩٨٦ - غُفَّتْ أَسْمَر

Eupatorium strorubens (S). Eupatoire brune (F). جنبة برونية معمرة تملو نحو ١٠٠ سم. ساقها ورديتها زرقاء اللحاء، زغبية جزوي اللون. أوراقها مسنقة كبيرة لثقة تملو نحو ٣٠ سم. وتعرض من ١٦ إلى ٢٠ سم. نصلها

### ١٩٩٧٠ - غُطُوبِيَّة السَّيْدِيَّان \*

Aleurodes quercus (S). Aleurode des chênes (F). حشرة من الطفريات طلياً يراوح بين ١ و ٢ مم. لها إلى الصفار الباهت الشفاف المنش بالأسود. حورياتها مسنجة بنقط لامة متناوبة قاطية. وهي تركب أوراق السيتان فتؤذيها.

### ١٩٩٧١ - غُطُوبِيَّة القَلَّ \*

Dialeurodes kirkaldyi (S). Dialeurode (F). حشرة صغيرة من الطفريات طلياً يراوح بين ١ و ١.٥ مم. جسمها اسمر اللون. مكثها أخضر. حورياتها تركب الأوراق على صفحتها السفلى وهي صفراء اللون، خضراء اللون، يبيضه العداب الشمية اللقيقة القصيرة.

### ١٩٩٧٢ - غُطُوبِيَّة القُطن \*

Bemisia gossypiperda (S). Bemisia, Aleurode du coton (F). حشرة من الطفريات طلياً نحو ١ مم. لها إلى الصفرة الصبائية العاطية. حورياتها مسطوية الشكل، زيتية اللون، مدرة الخلف المنحرف. تركب أوراق القطن والبنندرة وأبدانها.

### ١٩٩٧٣ - غُطُوبِيَّة المُلْدُوف \*

Aleurodes brassicae (S). Aleurode du chou (F). Greenhouse white fly (E). حشرة من الطفريات طلياً يراوح بين ١ و ١.٥ مم. لها إلى الصفرة تملو رقيقة سوداء. حورياتها مسطوية الشكل، سمر اللون، حليية الخلف، تركب أوراق شتل المُلْدُوف في أول عهدا فتؤذيها لحد الانس.

### ١٩٩٧٤ - غُطُوبِيَّة التَمْع \*

Aleurodes menthae (S). Aleurode de la menthe (F). حشرة من الطفريات طلياً يراوح بين ١ و ١.٥ مم. اجتمعتها بحجة العروق الوسطى. حورياتها يضيبة الشكل، عذوبة اللحم القليل اللادة الشمية. العداب حثارتها حليية، ثنائية التجميع. تركب أوراق التمع فتؤذيها.

### ١٩٩٧٥ - غُطُوبِيَّةَات \*

Aleurodidae (S). Aleurodidae (F). فصيلة حشرات من رتبة حنجانسات الاجنحة. اجتمعتها وأنواعها عديدة جميعها صغيرة لثقة سريعة الطيران يتركب ويؤذيها في البلاد الزراعية. تتميز برونها للمسفرة حورياتها كبيرة. قرونها الاستشعارية مركبة من عدة فواصل تراوح بين ٤ و ٧. اغطلها بارزة مخفية. جوشها عريضة. بطيها اسطوانية. ارجلها مسطوية. اجتمعتها كبيرة، مسطوية الأطراف. اجسامها واجتمعتها مفاضة شمعية طليية الشكل يبيضه اللون. حورياتها مسطوية الجسم، يضيبة الشكل أو مستديرة. ظهورها موشمة بشده شمعي يخطف قدره باختلاف الاجناس.

### ١٩٩٧٦ - غُطُوبِيَّة فَرْخ البَايَز

Immerger (F). غُطُوبِيَّة غُطُوبِيَّة. انفس في الماء فغمره.

### ١٩٩٧٨ - غُطُوبِيَّة

الصلط. ج ضاغط. السائل الاناث.

### ١٩٩٧٩ - غُطُوبِيَّة

الطلو. الطلو. اللطو. اللطو.



٧ م. ثوبها خطي اللون ، اسمر المواج . ريقها تركب  
الصنوبر الممر تغترس الجلاء والشكير .  
Umbra (S). Umbra (F). **شَفْشَف** .  
Umbra, Mud-minnow (E).

جنس اسماك بحرية من مفتحات المثانة . اجسامها  
احليجية الشكل ، قصيرة ، مقبوة . زعانفها  
الظهيرية والشرجية كبيرة الحجم اما الصدرية والبطنية  
فصغيرة . فصوصها خشنة متراكبة . اثنيها الى السرة  
التيتراد بطولها يتبعج عاقل . اشهر انواعه المروقة اثنتان .  
Métal cru (F). Raw metal (E). **غُفْل** .  
Inertie (F). Inertia (E). **غُفْل** .  
٢٠٠٠٥ - **غُفْر** هو رجب الشمره ، اطلبه .

٢٠٠١٣ - **غُفْلَة المتاعف ، شَفْشَف المتاعف**  
Umbra crameri (S).  
سمكة من الغلاف تعيش في البحيرات والمتاعف والياه الزاكنة .  
طولها نحو ١٥ سم . ثوبها الى السرة الغبراء الباكنة .  
تتميز بكثرة تنسلها وقوة احتلالها لثقلات دجبات الحرارة .  
Melochria (S). **غُفُور** .  
Mélochrie (F). Melochria (E).

جنس نباتات عشبية متسلقة من فصيلة القرقيات . مهدا  
بعض المناطق الاسيوية والافريقية الحارة . حولتها طويلة  
لاشفعية . اوراقها كبيرة قلبية الشكل او احليجية .  
ازهارها وحيطة المسكن عتقطة الالوان . ثمارها بيضيه او  
مستديرة || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية .  
Umbra lilii (S). **شَفْشَف ليلي** .  
سمكة من الغلاف تعيش في بحيرات البلاد الباردة ، طولها نحو  
١٢ سم . ثوبها الى السرة الحليقة يبق عت الظهر .

٢٠٠١٥ - **غُفْلاديشيا**  
Févier (F).  
هي النسوة شجرة من القرقيات القرطانية ، اطلها .  
٢٠٠٠٧ - **غُفُور مُتَدَلِّي الثمار**

Melochria pendula (S).  
Mélochrie à fruits pendans (F).  
نوع من الفُور الممر . مهد بعض المناطق الاسيوية .  
ساقه متسلقة قصيرة . جنته مدلاة . اوراقه قلبية الشكل ،  
ثلثية او خماسية الفصوص المسنة الحار . ازهارها وسيدة  
المسكن ، المتكية منها ضمية التجميع ، المتكية فردية ،  
مستطيلة المالحق . لونها الى البياض الاخضر المواج .  
ثمارها بيضيه الشكل لونها الى الاخضر الاصفر ، طولها  
نحو ٢ سم . ورضها ١ سم .  
Glaucus (S). **غُفْلَة** .  
Glaucous (F). Glaucus (E).

٢٠٠١٦ - **غُفْلَة**  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدات الازبل  
غلفيات الخرافيم . الزواحه الممرقة مبدقة منتشرة في المحيط  
الاطلسي والبحر الابيض المتوسط || جميعها بية . اسرارها  
واقرة البند . اجسامها حراطة ، مسطيلة ، حلابة ،  
لتشي بالذباب دقيقة . رؤوسها رباعية القواس القروية  
الشكل . خياشيمها جانبية الاوتكار ، كلية ، رباعية  
الازواج المتقابلة . اثنيها جملة الالوان الزاهرة . يكثر  
فيها الازرق والاعضر والاسم والاعبر القلوي .

٢٠٠١٧ - **غُفْل**  
Tégument (F). Tegument (E).  
هو ما يغطي بعض الاضواء النباتية كالثشاء في الحيوان .  
٢٠٠١٨ - **غُفْل ، غُفْل ، قُفْر**  
Gaine (F).  
هو ما يلفظ الشيء . راسع هـ .  
Sheath, Ocra (E).  
٢٠٠١٩ - **غُفْل المُسَرَك ، جُفْ**  
Péricarpe (F).  
Pericarp (E).  
يتحرك غلاف الثمرة من ثلاثة اجزاء : الخارجي والمتوسط  
والداخلي . فالخارجي يدعى الحلة والمتوسط السيوك والداخلي  
الانتركرب .

٢٠٠٢٠ - **غُفْل الفُفُور**  
Périchondre (F).  
Perichondrium (E).  
٢٠٠٢١ - **غُفْل حَيَوِي**  
Biosphère (F).  
Biosphere (E).  
الغلاف الحيوي اسم يطلق على قشرة الارض السطحية  
حيث يعيش الانسان والحيوان والنبات .  
٢٠٠٢٢ - **غُفْل مائي**  
Hydrosphère (F).  
Hydrosphere (E).

٢٠٠٢٣ - **غُفْل مَحَرَم**  
Pericycle (F).  
Pericycle (E).  
اسم يطلق على التسج الحشوية ، ان في الساق ام في الجذر ،  
الكائنة بين الحزم القوامية والشكير .  
٢٠٠١٠ - **غُفْل**  
Inerta (F). Inert (E).  
٢٠٠١١ - **هَلْ ، اِعْتِيَاد ، اِعْتِيَاد**  
Invagination  
دخول جزء من تسج في تسج آخر . وهو ان سمل في  
المران كان متعلا .



غلاف

## ٢٠٢٤ - غُلُوقٌ يَكْبِسُ

Lithosphere (F).  
Lithosphere (E).٢٠٢٥ - غُلُوقٌ يَكْبِسُ  
جيشين صناعي صاف يستخرجون منه مادة قاسية كالقطن  
كبيرة الاسعمال الصناعي .

## ٢٠٢٦ - غُلُوقٌ

Gaduliculus (S). Gaduliculus (F).

٢٠٢٧ - غُلُوقٌ  
جيش اسماك بحرية من فصيلة الغاديسيات المسالوات . انواعه  
قليلة . اصلاها بجوار البلاد للتمتدة الحاررة انحصا شرقي  
وجنوبي المتوسط || اجسامها صغيرة القند ، اطليجية  
الشكل ، عديمة الزنماط ، سفلية الشفق ، كبيرة العين  
المستديرة البارزة || احرف انواعها واشهرها التلات القفي .

## ٢٠٢٧ - غُلُوقٌ لَفِيفِي

Gaduliculus argenteus (S).  
Gaduliculus argenteus (F).٢٠٢٨ - غُلُوقٌ  
سمكة من التلات اصلاها بعض مناطق البحر المتوسط . طولها  
يراجح بين ١٥ و ١٧ سم . ثوبها وردي اللون . بطها  
وصهرها الى القفص ، زعالتها ريادة || لحمها مستحب  
الطعم .

## ٢٠٢٨ - غُلُوقٌ

Galbulis (S).

Galbulis (F). Galbulis (E).

٢٠٢٩ - غُلُوقِيَّاتٌ  
فصيلة طير من الجوارثم وانها التناقد . اجناسها وانواعها  
المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الامريكية  
اشهر اجناسها الجفاري والغليول .

## ٢٠٢٩ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galbulidae (S).

Galbulidae (F). Galbulidae (E).

٢٠٣٠ - غُلُوقٌ لَفِيفِي  
فصيلة طير من الجوارثم وانها التناقد . اجناسها وانواعها  
المعروفة عديدة ، جميعها من طيور البلاد الامريكية  
اشهر اجناسها الجفاري والغليول .

## ٢٠٣٠ - غُلُوقٌ لَفِيفِي

Produit, Revenu (F).

Produit, Revenu, Income (E).

٢٠٣١ - غُلُوقِيَّاتٌ  
جيش نباتات زربية من فصيلة الزربية . مهدسا  
افريقية الجنوبية . انواعها المعروفة قليلة . هدفوسها  
مستديرة الشكل . ساقها اسطوانية تملو من ٨٠ الى ١٢٠  
سم . اوروقها قرصية الالتشاب ، صفية ، تطلو نحو  
٧٥ سم . وترو من ٥ الى ٧ سم . نصلا الى الحصار  
المابق الازرق الملوغ . اترامها عتقوي للجميع يطلو  
نحو ٣٠ سم . يحمل من ١٥ الى ٣٠ زرة قمية الشكل ،  
كبيرة القند ، يضاء اللون ، متدلية . تنورما يستمر من  
تموز الى ايلول .

## ٢٠٣٢ - غُلُوقٌ

Criblure (F). Siftings (E).

٢٠٣٣ - غُلُوقٌ  
ما يتغيه الغزال او يقيى به الغزالة من حبوب صغيرة  
وزرد خربية وارجام . والتلت يصلح طعاما لطيور  
الدواجن .

## ٢٠٢٣ - غُلُوقِيَّاتٌ

٢٠٢٤ - غُلُوقِيَّاتٌ  
شجرة مرة قيل تمجها يملك السباع (السان) .

## ٢٠٢٤ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galeruca (S). Galérucque (F).

٢٠٢٥ - غُلُوقِيَّاتٌ  
جيش حشرات من فصيلة النصاريات ورتبة مفدمات  
الاجنسة . انواعه عديدة جميعها صغيرة القند ، غيطية  
الزبان زاهية الالوان || رقاتها غاشقة تركب اوراق  
النبات فتخونها || اشهر انواعها ما يتبع .

## ٢٠٢٥ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galerucella luteosa (S). Galérucque de l'orme (F).

٢٠٢٦ - غُلُوقِيَّاتٌ  
حشرة من الغلوق جسمها اجيف الشكل يطلو نحو ٧ سم .  
ثوبها الى الصفار المختلي يعلو موج احمر . اجيالها  
الحولية اثنتان || رقاتها صغيرة القند تركب اوراق الدردار  
فتقرض التصل وتقضي عليه .

## ٢٠٢٦ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galerucella tenella (S). Galérucque du fraisier (F).

٢٠٢٧ - غُلُوقِيَّاتٌ  
حشرة من الغلوق جسمها يغيى الشكل يطلو نحو ٤ سم .  
ثوبها مختلي اللون ، اغبر الملوغ . جيلها الحولي واحد .  
رقاتها تركب اوراق الشيك فتلتهم التسج وتسف من  
العروق .

## ٢٠٢٧ - غُلُوقِيَّاتٌ

Agelastica alni (S). Galérucque de l'aune (F).

٢٠٢٨ - غُلُوقِيَّاتٌ  
حشرة من الغلوق طولها نحو ٦ سم . ثوبها الى الزرق  
البنفسجية . وسيدة الجبل الحولي . رقاتها صغيرة القند  
تميش بجمعة على اوراق اللغث فتلتهم الواحدة بسدة  
الاخرى الى ان يتم افسادها فتترك الارراق وتستقر  
في القرية حيث تمخل وتبيت .

## ٢٠٢٨ - غُلُوقِيَّاتٌ

Malacosoma lusitanica (S). Galérucque des narcisses (F).

٢٠٢٩ - غُلُوقِيَّاتٌ  
حشرة من الغلوق طولها نحو ٧ سم . ثوبها الى الصبغة  
الصناعية البرتقالية . تركب وكقوي ريام وانواعها التريجس  
والزريق وسائر النباتات السكرية || رقاتها تميش في  
القرية عادمة الاذى .

## ٢٠٢٩ - غُلُوقِيَّاتٌ

Gaulf (S). Gaulf (F).

٢٠٣٠ - غُلُوقِيَّاتٌ  
ساف من الطبقة الباشيرية يعرف بالالبقي ، اطلب .

## ٢٠٣٠ - غُلُوقِيَّاتٌ

Pivot (F). Tap-root (E).

٢٠٣١ - غُلُوقِيَّاتٌ  
الغلغل عرق الشجرة اذا آمن في الارض . ج غلاغل .  
راجم جنت .

## ٢٠٣١ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galago (F).

٢٠٣٢ - غُلُوقِيَّاتٌ  
حيوان لين من اليموريات يدعى دغفوس ، اطلب .

## ٢٠٣٢ - غُلُوقِيَّاتٌ

Galgulus (S). Galgulus (F).

٢٠٣٣ - غُلُوقِيَّاتٌ  
جيش حشرات دامت من لفصيلة الاجنسة المختلفة . انواعه  
المعروفة نحو عشرة تميش على شفاف المنافع ويجاري الماء  
غائرة في الاسمال والاسمال || اجسامها صغيرة القند ،

غلوق الدردار



غلوق الشيك



غلوق اللغث



غلوق التريجس



٢٠٠٥٤ - **غُلْدَه ٥٥**، **قَارِ الثَّيْل** *Golanda*  
جس دوبيات لبنة فاقمة من الجزيئات فضيلة الفأريات.  
انواعه قليلة مطبأ افرقية ولحد سردنيد . جميعها صغيرة  
القد . اوراقها الى السمة الممتدة بالاسفر والاسفر بطريا  
الى البياض الاقبر . صوفها خشن للمس || تألف  
الحقل والمراعي وزراعات الين . قوتها قليل وزيمات الين  
اوراقه وقد تهب الرز وتقرنه في اجسامها .



غلف

٢٠٠٥٥ - **غُلْنُوس** *Glinus (S).*  
*Gline (F).* *Glinus (E).*  
جس نباتات عشبية ، حولية ، برية ، مروجية من فصيلة  
المغريبات . انواعه المعروفة قليلة البند منبتها حوض  
البحر الابيض المتوسط || سقمها مستطيلة . اوراقها ملوقة  
او بيضيه مقلوبة . ازهارها ابيض الازكاز . ازهارها  
صفراء او بيضاء اللون . تنويرها صيني || اعرف انواعه  
غلنوس بشني وغلنوس دقتوني .

٢٠٠٥٦ - **غُلْنُوس بَشْنِي** *Glinus lotoides (S).* *Gline lotoides (F).*  
نوع من الغلنوس . ساقه مستطيلة ، منقحة ، مستقيمة .  
اوراقه شبه بيضيه التصل . ازهارها ابيض . ازهار بيضاء .  
تنويره صيني .

٢٠٠٥٧ - **غُلْنُوس دَقْتُونِي** *Glinus dictamnoides (S).* *Gline dictamnoides (F).*  
نوع من الغلنوس يربط في المراتع الرطبة . ساقه متعنية ،  
مستقيمة . اوراقه صغيرة التصل ، ملوقة . ازهاره صغيرة ،  
تينية اللون . تنويره صيني .



غلفه

٢٠٠٥٨ - **غُلْنُوم** *Aglaonema (S).*  
*Aglaonima (F).*  
جس نباتات معمرة برية وترينية من فصيلة القلقاسيات .  
انواعه المعروفة قليلة للبند اصطلها بعض مناطق الهند وبنزو  
الزنج || سقمها قصيرة . اوراقها متناوبة ، منقحة ،  
محفوظة الاضلاع ، سانية التصل المتقفة الاطراف .  
ازهارها محوري الانتشاب ، صبي التجميع . ازهارها  
صغيرة ، شبه انبوية الشكل . منها الاحمر والاسفر  
والوردي . اوراقها فواحة الحرف الطري المشعب ||  
تزرع في المراكز الترين .

٢٠٠٥٩ - **غُلُوْبُولِيْن** ، **غُلُوْبِيلِيْن** *Globeline (F).*  
*Globulin (E).*  
مادة آسية تكون في كريات الدم .

٢٠٠٦٠ - **غُلُوْتَامِيْن** *Glutamine (F).* *Glutamin (E).*  
مادة ازوتية تكون في بعض النباتات كالشوتدر .

٢٠٠٦١ - **غُلُوْتِيْن** *Glutan*  
هي المادة الازوتية في القيق ويتركب الغلوتون من الغلوتين  
والجليدين .

٢٠٠٦٢ - **غُلُوْتِيْنِيْن** *Gluténine (F).* *Glutenin (E).*  
مادة ازوتية ثانوية توجد في دقيق الحبوب .



غلوم

٢٠٠٦٣ - **غُلُوْدُس** *Glocodes*  
جس فلور مجهرية من فصيلة المدركيات . يتميز بخصايته  
المحيطة الشكل ، المبشرة او النسية التجميع ، السطحية  
الازكاز . انواعه التي هم الاقتصاد الزراعي قليلة اعرفها  
غلودس التفلح .

شبه بيضية الشوزن ، مبطلة الشكل . كثير بينها  
النافرة الكبيرة وبمسئلة قوائمها الخلفية التي تمكها من  
التفزر . اوراقها مزيج من الشقة والشبهة يملوها تجميع  
اسمر وشفة خضراء . قوائمها مطوقة بالاسفر .

٢٠٠٤٤ - **غُلُوْدِيَّات** *Galgulidae (S).*  
*Galgulidés (F).* *Galgulidae (E).*  
فصيلة حشرات من نصفية الاجنحة المختلفة . اجسامها  
وانواعها قليلة البند . اصطلها البلاد الحارة والمعتلة الحرارة  
من القارتين القديمة والجديدة || مطف انواعها يعيش قرب  
الماء او متنسأ في الاسفل والاسفل . بعضها خاضل  
والبعض الاخر دامن || اعرف اجسامها واشهرها القملول .

٢٠٠٤٥ - **غُلْب** ، **كَرَكُوْمَة** *Scapella, Caralluma (S).* *Scapella (F).* *Carrian flower (E).* *Asablum, Scapella (D).* *Scapella, Fior di rosopo (F).*  
جس نباتات برية وترينية من فصيلة الصقلابيات .  
انواعه نحو ٧٥ جميعها من نباتات المناطق الصحراوية  
يقال ان منها الاسلي كان يفس لياني افرقية الجنوبية .  
اوراقها سيقان لحية رباعية الاضلاع السلة . ازهارها  
لحية كبيرة لقد تلو الارواق .

٢٠٠٤٦ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** *Hyménium, Yolve (F).* *Hymenium, Skin (E).*  
غلاف بشري رقيق يحيط ببعض الفطور حتما تكون  
في طورها للتوري .

٢٠٠٤٧ - **غُلْبَل**  
لبت في الماء وقره هريض || وهو ورق الكرم ما دام  
حل مجره || وهو الطلح وكل خضرة حل رأس الماء .

٢٠٠٤٨ - **غُلْبَق** *Clé de voûte (F).*  
*Keystone of a vault (E).*  
حجر شبه عروطي الشكل يلقن به قوس البند .

٢٠٠٤٩ - **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** ، **غُلْبَة** *Vincetoxicum officinal (S).*  
*Vincetoxicum officinal, Asclapade officinale, Dompé-venin (F).* *Tamepsolon (E).* *Echte Schwalbenwurz (D).* *Vincetoxico, Bozoli (I).*  
جنية طبية معمرة من فصيلة الصقلابيات . ساقها متعنية  
غزرة الصصرة الجنية الطبية والمضادة السموم . اوراقها  
متقابلة ، كاملة ، احليجية . نصلها شديد الخضرة .  
ازهارها حلقة التجميع ، بيضاء اللون يملوها مزاج فتى .

٢٠٠٥٠ - **غُلْبَة الدَّهَب** هي الحبل ، الطلب .

٢٠٠٥١ - **غُلْبَكْتَاَز** ، **لَبَنَاز** *Galactase*  
خيرة لبنة تذيب الجبين في اللبن .

٢٠٠٥٢ - **غُلْبَكْتُوَز** *Galactosa*  
عرب من الفلوكروز يحصل من تحول البنوز .

٢٠٠٥٣ - **غُلْمَة** *Nymphomania (F).*  
*Nymphomania (E).*  
ازدياد شهوة الساد في اثاث الحيوانات . اسبابها حديثة  
منها حيوية ومها طارئة . فالاسباب الطبيعية تقود معظمها  
الى المقدم الدائم . اما الاسباب الطارئة فمقدمات . والاث  
في هذه الحالة تنهي مغلف . راجع اختلام .

Glycérine (F). **غَلِيمَرِين** ٢٠٠٧٦ -

Glycerin, Glycerium (E).

سائل متادل لا لون له يذوب في الماء ويحسّن من قسمة المواد الدخنية .

٢٠٠٧٧ - **غَلِيمَرِين** هي البلية ، اطلبها .

٢٠٠٧٨ - **غَلِيمَرِين غَسْلُولِيَّة** \*

Apios tuberosa (S). Glycine tubéreuse (F).

نبات عشبي حادس ممر من فصيلة القرنيات القراشية . جلوده مصقولة ، اجاسية الشكل ، مأكولة . ساقه مغطاة باريشة . طولها نحو ٤ أمتار . اوراقها مركبة . وريقاته وريّة التجسيم ، يضيئة الشكل ، مستطبة المعصية || ازهاره صطرية الرائحة ، حواء اللون ، ازهاره متناظرة محورية الانزكار .

Crassceps (F). **غَلِيظُ الرَّأْس** ٢٠٠٧٩ -

نمت تعريفها يطلق على كل حيوان او حشرة مستطبة الرأس .

Crassicole (F). **غَلِيظُ الْعُنُق** ٢٠٠٨٠ -

نمت تعريفها يطلق على كل حيوان مستطبة العنق .

Crassicorne (F). **غَلِيظُ الْقَرْن** ٢٠٠٨١ -

نمت تعريفها يطلق على كل حيوان مستطبة القرن .

Eudothèque (F). **غَلِيظَةُ** ٢٠٠٨٢ -

القائمة شفاء داخلى خلف نص المكت .

Glycoses ٢٠٠٨٣ - **غَلِيكُوز**

الغليكويز اي سكر النخب مادة يضاء سكرية قابلة للاختبار ككوك في البار والاسل ويضرها .

Pipe ٢٠٠٨٤ - **غَلِيظِين**

غليظين ج . غلاظين ، اداة تستعمل لتخمين التفت المفروم .

٢٠٠٨٥ - **غَمَّ ، غَمَل ، غَمَّاس**

Ensachage, Capuchonnage (F). Putting a hood (E). تغليف الاجزاء بالاكياس منعا لتجهتها . وتغليف الناحر لاصانتها . ويقال لليلود والبار الناجمة من هذه العملية بيلود او نمار مدفولة او مدفولة .

Plafond (F). Celling (E). **غَمَّاس** ٢٠٠٨٦ -

هو سقف البيت . ج . اغية واغلاء . ويقال غم البيت ويضميه . غطاء بالخشب والطين .

Colymbus (S). ٢٠٠٨٧ - **غَمَّاس**

Piongeon (F). Diver (E). جنس طيور مائية من كفتيات المقدم مولها بالبلاد الباردة تفرح منها في الشتاء نحو الاقاليم المعتدلة . انواعها المعروفة اربعة جميعها كبيرة القد ، مستطبة العنق ، جبالسة الجسم . اناذها واثقة . اجنتها صغيرة . اذناها جذعة . ارسافها صردية || تألف البعاب والبعبات والانهز على السوء . قتها الاسماك الصغيرة والقرشيات . تدفن في انفاسهم رتها على الشطوط وصفات الجيبرات واعواد الانهار . اناتها تنقع يضتين تحمضها بمنارة الاكوز ثلاثة اسابيع || اشهر انواعها غمام الحسن وغمام القطب .

٢٠٠٨٤ - **غَلِيدُوسُ النَّحَّاح** \* ، **بَلَطُشُ دُخَانِي** \*

Gloxides pontigna (S). Bloch fumoux, Maladie de la sule (F). Sooty blotch (E).

نطر مجهرى يركب اثناد ونمار النحاح والاجاس . مظهره الخارجى على الاقناب يقع للدخان حيث ولفاً ، لا تقياسية الشكل والحجم ، متناظرة الاتصال تسبب انضداد البيرة ويضف الاذى || وهو على البار يقع سمر لا تقياسية الشكل والحجم تركب البيرة تقطوعها دون ان تسلب الب . يتكاثر ويقتل في الاماكن الحارة المرتفعة للرطوبة القصية . يكاثف بمشاكل علول يورود المركز من ١٠ الى ١٠٠ ٪ بشرط ان تحصل المكاثفة في امان ظهور اللوس .

٢٠٠٨٥ - **غَلُوسِيَّة** اطلب هيدرات الكربون .

Gluadium ٢٠٠٦٦ - **غَلُوسِيوم**

هو البريليوم ، اطلبه .

Glouzon (F). **غَلُوشُن** ٢٠٠٦٧ -

هو القشر حيوان من السرمويات ، اطلبه .

٢٠٠٦٨ - **غَلُوسِيَّة** \* ، **سَلُغان**

Gloxinia (S). Gloxinie (F). Gloxinia (E). Gloxinien (D). Gloxinia, Ligaria (F).

جنس نباتات عشبية صطورية مسرة من فصيلة الجسنتريات . انواعها المعروفة ١٢ اما ضررها وبعثها فكثيرة البعد . جميعها زينة . سقها صطورية . اوراقها معتدلة متطابقة كثيرة القد . فصلها جيل الحصار ، خل البيرة ، بارز المروق والشارين . ازهارها فردية ، طويلة الزناد ، بوقية الشكل ، جيلة الالوان الزاهية .

٢٠٠٦٩ - **غَلُوكُوز** ، **سُكَّرُ الْعُنُق**

Glucose مادة سكرية يضاء قابلة للاختبار ككوك في البار والاسل ويضرها .

٢٠٠٧٠ - **غَلُوكُوزِيَّة** (F). Glucosid (E).

مركبات نباتية تحرق الكثير من الغلوكوز فيشتترج منها .

٢٠٠٧١ - **غَلُوم** \*

Galeomma (S). Galeomma (F). Galeomma (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم واصله اللطيفات . انواعها المعروفة متطوعة البعد منتشرة في سطر بحار العالم القديم احصاها البحر الابيض المتوسط || اجسامها مسطوقة باصداق شبه هورية الشكل تشبب في السفسور البحرية وتمتدق عليها .

٢٠٠٧٢ - **غَلُومِيَّات** \*

Galeommidae (S). Galeommidae (F). Galeommidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياشيم . اجسامها وانوامها المعروفة من غائرة ومماصرة كثيرة البعد منتشرة في الطبقة البسيانية وفي سطر بحار العالم . اصداقها صغيرة ، شبه مستطبة ، ثنائية المصارع عادمة التكتين || اشهر اجناسها الغلوم والسنبيل والمزارية ...

٢٠٠٧٣ - **غَلِيْدَايْن**

Gladiine (F). Gladin (E). مادة البويونية اي آسية كوك في الدقيق .

٢٠٠٧٤ - **غَلِيْدَان**

Ebullition

٢٠٠٧٥ - **غَلِيْسَرِيْد**

Glycerides (F). Glycerid (E). اسم شامل لاثباتات الغليسرين من زيتين وصرغرين وغلظين ويضرها بما يدخل في تركيب الادلان .



غلوس النحاح



غلوسينية



غلم



غلين صقولة



غامة الحُسن



غامة القطب



عُمر



عُمر



غمر



غمر

## ٢٠٠٩٨ - غَمْدِيَّةُ الْأَجْنَحَةِ، مُغَمَّدَةُ الْأَجْنَحَةِ

Coléoptères (F). Coleoptera (E).  
رَبَّةٌ حشرات من طبقة غمديات الجناح . أجناسها وأواعها  
زهاء ٣٠٠٠٠٠ متنترة في جميع أقطار العالم ، جميعها  
١٦ لة والمديد من الفصائل . جميع حشراتنا تأمة التطور  
قارضة ، بمنجته . أجناسها مؤلفة من زوجين الأزواج العلوي  
المزوي بالظهران وهو مركب من غميين قروين ولطغان  
الأزواج السفلي الثنائي التركيب الذي ينفق عنه الطيران .  
سقطها من الحشرات للقرصة وبعضها يفتني بالزباد

الضفوية || رطلها مغترسة أو عاتية ، سورياتها طرية  
الأيدي . لطفا مكونة من إفرزات خاصة تجمّع إليها بعض  
المواد الضفوية وعلاؤها || أشهر فصائلها ، الميود  
من أجناسها وأواعها في لبنان وشار البلاد العربية ، هي  
النالسة : الطيريشات ، الجليات ، التمنصقات ،  
الساليات ، السرفانيات ، السويات ، الظلاميات ،  
الناشيات ، السرفانيات ، القزنيات ، الكركشيات ،  
الككبيات ، المتصويات ، التصلصات ، التفرانيات ،  
والزنيات .

Eprouvette graduée (F).  
Graduated gauge (E). ج أحمار . ويرف أيضا بالناتل .

Chaos (F). Chaos (E).  
الغمر هو الخولة ، أطله .

٢٠١٠١ - غَمَرٌ ، قَطْلُوسٌ ، قُتْرِيصٌ  
Submersion هو الإسقام بالنمر أو القتلوس .

٢٠١٠٢ - غَمَرٌ ، هو الورس ، أطله .

٢٠١٠٣ - غَمَرٌ \*  
Zoetara (S). Zoetara (F).  
Eel grass, Turd grass, Grass warck (E). Zwergsagras (D). Zoetara, Alga del vetral (I).  
جلس نباتات مائية من فصيلة عرائس الماء . أنواعها المعروفة  
ثلاثة . سوطها مدادة . أوراقها عيوية مسطيلة ، قوامها  
مخدية . أطرافها عيوية ، جيوبها تفلح من سبائل مكونة  
من صف وأسد من الإزهار البسيطة .

٢٠١٠٤ - غَمَرُوسٌ \*  
Gammarus (S).  
Gammarus (F). Gammarus (E).  
جلس حوييات بحرية من القشريات العليا وضيفة  
القمرسويات . أنواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري وبعضها  
في بحار وأهـر البلاد الباردة || أجناسها مسيرة القند .  
أطولها قزاق من ٢ إلى ٣ م . زباناها مركبة ثلاثية  
الفصل . الأزواج الأول من قوائمها ملتصق بالراس وبنتهي  
بملاط فكية . الزوجان الثاني والثالث ينتهيان بكلمات  
قارضة . أثوابها شبيثة الألوان وبها الأبيض الشفاف .

٢٠١٠٥ - غَمَرُوسِيَّاتٌ \*  
Gammaridae (S).  
Gammaridae (F). Gammaridae (E).  
فصيلة حوييات مائية من القشريات العليا مزودجات الأرجل  
أجناسها وأواعها المعروفة كثيرة العدد بعضها بحري وبعضها  
الأخر يعيش في مياه البحيرات والأنهر . معظمها من البلاد  
الباردة || أجناسها شبيثة الاجسام يكثر لها الصدر .  
جميعها عاتية الصفات . عيبتها بسيطة . زباناها ثلاثية  
الفصل . الأزواج الأول من قوائمها الصدرية ينتهي بملاط  
فكية || أشهر أجناسها القمرسوس .

٢٠٠٩٨ - غَمَاةُ الْحُسْنِ \*  
Colymbus stellatus C. septentrionalis (S). Plongeon  
cas-marin (F). Red-throated diver (E).  
طائر من القياس كبير الجفـة طوله نحو ٧٠ سم . رأسه وفتحه  
الى الرقبة المخلد . ظهره الى السرة القاتمة وكذلك سائر  
صفته العليا من القطن الى الذنب . صدره وظهره وبطنه  
الى البياض الناصع . غنطه اسود اللون || يبحر في  
البرد من الشمال الى الجنوب نحو المتوسط وشاطئ الهند .

٢٠٠٩٩ - غَمَاةُ الْقُتْبِ \*  
Colymbus glacialis (S). Plongeon imbrin, P. glacial  
(F). Great northern diver (E).  
طائر من القياس كبير الجفـة طوله نحو ١٠٠ سم . رأسه  
ويظهر الى السواد القاتم . بطنه وصدره واسفل عنقه بياض .  
أبعاده جملعة وميتية بالاسود || يبحر في زين البرد من  
الشمال الى الجنوب نحو الشطوط الاروية .

٢٠٠٩٠ - غَمَالِجٌ  
نبات على شكل اللذان ينبت في الربيع .

٢٠٠٩١ - غَمَبَكُورٌ هو الأريان ، أطله .

٢٠٠٩٢ - غَمَبَرٌ ، قُمرُويّاتٌ رشيق  
Gnatophyllum elegans (S).  
Gnatophyllum elegant (F).  
حويان بحري من القشريات عشاريات الأرجل طول  
الذيل ينتمي الى فصيلة القزنيديات . أطلانه البحر  
الابيض المتوسط || جسمه ايطوليكي الشكل ، متطبق  
الذيل ، يطول نحو ٧ سم . متكه قصير القند ، مسنن  
الخطار . ثوبه الى القشقة المنقطة بالاصفر اللحي ||  
يعتبر من الانواع القانصة الصف المروغب فيها .

٢٠٠٩٣ - غَمَبِيرٌ \*  
Ourosparia gambir (S).  
Gambier (F).  
شجرة برية مسرة من فصيلة الفويات شبيها الملائير .  
يستخرج من أوراقها بدق قلعها بالماء وقلها مادة صغية  
رائحة تشبه الكافور لها استعمالها الطبي والصناعي .

٢٠٠٩٤ - غَمْدٌ ، قُمرُويّاتٌ \*  
Elytre (F). Elytron (E).  
نجد ج أعماد . والانحادي الاجنحة العليا عشاريات ربة  
غمديات الاجنحة وهي صلبة قزينة المادة ممهبا حفظ  
الاجنحة الزرققة المبرودة تحتها المعروفة بالرواش .

٢٠٠٩٥ - غَمْدٌ \*  
Gaine (F). Sheath, Ocrea (E).  
قاعدة مملأة القوة وهي تحيط بالساق قليلا أو كثيرا  
وقد تكون طويلة ناعية في التنبليات .

٢٠٠٩٦ - غَمْدٌ مَكَاكِي \*  
Etuil médullaire (F).  
Medullary sheath (E).  
٢٠٠٩٧ - غَمْدِيَّاتُ الْجَنَاحِ \*  
Coléoptéroïdes (F).  
Coléoptéroïdes (E).  
طبقة حشرات من شبة الحسدليات وثلاثة الاجنحة اصلا .  
تشمل ربة واحدة تسمى غمفة الاجنحة . شحرتها تعرف  
بالخفساء او الخنفساء . جميعها عتاض والمدراء لدى حورية  
جميعها حوريات .



فُشَس



فُشَس دِين



فُشَس لُج



فُشَس وُدي



فُشَس



فُشَس

٢٠١٠٦ - فُشَس \*  
Gamasus (S). Gamare (F).  
جنس قراد من فصيلة الفُشَيات . أنواعه عديدة جميعها  
عياء صغيرة القُدَّة ، طولها نحو مليمتر واحد . وهي من  
العثرات الثائثة قوتها المواد النضوية المنحلة || تتطفل  
على الحشرات اغصها تحميدة الجناح لتتغلبها من مكان  
الى آخر .

٢٠١٠٧ - فُشَيات \*  
Gamasidae (S). Gamasidae (F).  
فصيلة حشرات من القُراديات . اجناسها المعروفة اربعة  
اما انواعها فمعدية جميعها صغيرة القُدَّة ، طولها رايح  
من ١ الى ٢ سم . وهي عياء عادمة اللون . انواعها سوية  
الالوان المائلة الى تراوح من الاصفر القاتم الى الاسمر  
الجوي || تتطفل على الطير والحيوانات والحشرات .

٢٠١٠٨ - فُشَيد \*  
Gomphidius (S). Gomphide (F).  
جنس فطور من فصيلة السميات . انواعه المعروفة قليلة  
العدد اعطاهم القليم الصنوبريات في المناطق المعتدلة الحارة .  
يعيش على الجروح واللدال والمواد النباتية المنحلة . بعض  
انواعه مأكول والبعض الآخر كائن الصف غير مرغوب  
فيه || اشهر انواعه الثلاثة التالية :

٢٠١٠٩ - فُشَيد دِين \*  
Gomphidius glutinosus (S). Gomphide gluant  
نوع من الفُشَيد المأكول . يعيش في الموائل الرطبة . ساقه  
مستقيمة ، ديقة النشاء ، صفراء القسم السفلي غبراء  
الطوي . اروسه كبيرة القُدَّة ، شبه قلنسوة الشكل ، بعض  
قلعها نحو ١٢ سم . لونها الى الكستني البنفسجي المالح ||  
ليحيته جامدة ، لذينة الطعم ، مستحبة المذاق .

٢٠١١٠ - فُشَيد لُج \*  
Gomphidius viscidus (S). Gomphide visqueux (F).  
نوع من الفُشَيد الكامن الصف . يعيش في المراعي على  
النبال . ساقه معتدلة الثلاثة والارتفاع ، سمر اللون ،  
صفراء الموالج . اروسه لزجة ، قلنسوة الشكل ، قلعها  
نحو ٨ سم . لونها الى المغرة النحاسية الموالج . اطرافه الى  
للغرة الصفراء الموالج .

٢٠١١١ - فُشَيد وُدي \*  
Gomphidius roseus (S). Gomphide rose (F).  
نوع من الفُشَيد الكامن الصف . يعيش في اراج  
الصنوبر على المواد النباتية المنحلة . ساقه قصيرة مستقيمة  
العتق ، يضاء اللون ، فراء النشاء . اروسه ثلاثية الفلق  
قلعها نحو ٥ سم . لونها الى الودي اليكسي الموالج .  
الطرافه لينة ، لونها الى البياض الافر .

٢٠١١٢ - فُشَقي \*  
Rosae (F). Dew (E).  
الفن هو التدي . تحمت الارض وكها التدي فهي عمقة .  
وُشَقُ اللبابت هي او فسد من كثرة الانداه عليه . ولكن  
المكان الذي يركبه التدي .

٢٠١١٣ - فُشَل \*  
هو الفُشَمان عارض يصيب الزرع .

٢٠١١٤ - فُشَل \*  
Capechonnage (F).  
هو اثم ، واجبه .

٢٠١١٥ - فُشَلاس \*  
Crossarchus (S). Crossarque, Mangue (F).  
جنس حيوانات قرضابة من فصيلة الزباديات . انواعها  
المعروفة ستة موطنها بعض مناطق افريقية الشرقية والبالية  
والوسطى . تألف الرياش والغابات وفضاف مجاري الماء  
والقفر . ملينها الحيائي جامعي . جامعتها تد من ٢٠ الى  
٣٠٠ زوج واكثر || اجسامها صغيرة ، شوزها شوز  
النس ، اطولها ترازح من ٦٠ الى ٧٥ سم . بما فيه  
الذبل الذي يطول من ١٧ الى ٢٥ سم . رؤوسها مخروطية  
الشكل . عيونها واذانها صغيرة مستديرة . اعنتها معتدلة  
الطول . قوائمها قصيرة ، خاسية الاصابع . اوبارها قصيرة  
خشنة . خضابها اوبالها يختلف مع التروح تكثر فيه الكمية  
والشبهة والتلجيع المتروض || تعيش في اوجار تحطرها في  
الغرة او في الوبان المهجورة من النمل والارضة . قوتها  
الحيوان والحشرات والثمار والجوهر .  
اشهر انواعها المعروفة التالية :

فُشَلاس جَلَد \*  
Crossarchus fasciatus (S). Crossarque rayé (F).

فُشَلاس مَعْمِ \*  
Crossarchus obscurus (S). Crossarque obscur (F).

فُشَلاس شَمْسِي \*  
Crossarchus gambianus (S). Crossarque de Gambie (F).

فُشَلاس الصُوال \*  
Crossarchus somalicus (S). Crossarque de Somalie (F).

٢٠١١٦ - فُشَلُوج \*  
Dard (F). Dart, Sténg (E).  
ناية او اينة مشرة تكون في بعض الانجار اغصها التلغاح  
والاجاس . ج خاليج .

٢٠١١٧ - فُشَلُوط \*  
Megaspira (S). Mégaspire (F). Megaspira (E).  
جنس حيوانات برية من الرخويات مديبات الابريل  
وفصيلة الثاربات . انواعه الماصرة المعروفة قليلة العدد  
اعطاهم بعض مناطق امريكا الجنوبية اغصها البرازيل ||  
تعيش في الموائل الظليلة الرطبة وقرب مجاري الماء || اصداها  
اسطوانية ، بجرية الشكل ، مستطيلة ، مقاربة القربة .

٢٠١١٨ - فُشَلُول \*  
Acantholimon (S). Prickly thrift (E). Sachelgras-  
nelke (D). Acantholimon (I).  
ج. خماليل . جنس اشباب برية وزراعية مدرة من فصيلة  
الرباصيات . انواعه عديدة ، بعضها مرقعات حوض  
البهر المتوسط جميعها صغيرة القُدَّة ، مشدودة ، شائكة . اوراقها  
لا قياسية الشكل . انذارها سلبية التجميع || اشهر انواعه  
الثلاثة التالية .

٢٠١١٩ - فُشَلُول أُنِيَق \*  
Acantholimon venustum (S). Acantholimon  
dégant (F).  
نوع من الفُشَلُول وهو مجلة سريرية صغيرة القُدَّة ، تملو  
من ١٥ الى ٢٠ سم . اوراقها منبسطة الصفحة ، حشوية  
التصل . سبلتها تطول نحو ٨ سم . ازهارها ودية اللون  
متراكبة || ازهارها يستمر طوال الصيف . وهي من  
البقول القسمية ، تبكر في اول الربيع وتؤكل مطبوخة .

## ٢٠١٢٠ - غُملُول سَبْطِي

*Acantholimon glutaceum* (S). *Acantholimon en dpl* (F).

نوع من الغملول وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو الشوك تملو نحو ١٥ سم. أوراقها هندية الشكل خضراء اللون. سبلتها مسطيلة، أزهارها حر البتلات، بيض الكرويس، سود المروق. أزهارها يستمر طوال الصيف.

## ٢٠١٢١ - غُملُول شَكَلَك

*Acantholimon acarosum* (S). *Acantholimon aculaire* (F).

نوع من الغملول، وهو بجملة سريرية صغيرة اللقد، تملو من ٢٠ إلى ٣٠ سم. أوراقها ريجية الشكل تملو من ٥ إلى ٩ سم. وتعرض عنه قاعدتها نحو ٥ سم. أشواكها كثيرة. سبلاتها تملو من ١٠ إلى ٢٠ سم. أزهارها قزوية. أزهارها يستمر طوال الصيف.

## ٢٠١٢٢ - غُملُول حَمَمَن

*Goémon* (F). *Seaweed* (E).

هو سباد الألع، اطلبه.

## ٢٠١٢٤ - غُملُول حَمِيمَسَة

*Argyroneta* (S). *Argyroneta* (F).

جنس حناكب من فصيلة الغمليات. أنواعها المعروفة قليلة العدد جميعها مائية تعيش في البحيرات والأهوار والأبحر الرافدة المياه. ملاجئها حكاكيد من التماسك ريفية الشكل متينة الحيك تنبئها في الأعشاب المائية وتنقل إليها الهواء بواسطة الفتحات التي تجمعها بين حلب صدورها وبطنها كلما علت سطح الماء وفارقت. أجسامها صغيرة اللقد، فضية اللون، رصاصية الجرامز الكثيفة الحلب.

## ٢٠١٢٥ - غُملُول حَمِيمَسَة صَالِيَة

*Argyroneta aquatica* (S). *Argyroneta aquatilis* (F). *Water-spider* (E). *Wasserspinn* (D).

دوية من التناكب الساعية القانصة من فصيلة الغمليات. موطنها معظم مياه البلاد المعتدلة الحرارة. جسمها صغير اللقد يطول نحو ٩ سم. عند التكاثر ونحو ١٤ سم. عند التكاثر. صدرها أحمر اللون اسم الموج. صياها مركبتان زهرتان. ثيابها خضراء. فكها مستطيلان. جرابها دقيقة. كيفية الحلب. بطنها بيض الشكل، أخضر اللون، نضي الموج. قوتها الحشرات المائية لتغلقها عاتمة على سطح الماء أو فائصة فيه. تتمر نحو ثلاث سنوات وتساقد قبل نهاية أجلها بثلاثة أشهر. تعتبر من الدويات النافعة.

## ٢٠١٢٦ - غُملُول حَمِيمَسَات

*Argyronetidae* (S). *Argyronetidae* (F).

فصيلة من التناكب الساعية القانصة وراعيات الروايا والمشتان. أجسامها وأنواعها المعروفة قليلة العدد. جميعها صغيرة اللقد تتميز بأسبالة حلب جرابها الخلفية. أشهر أجناسها الندية.

## ٢٠١٢٧ - غُملُول حَمِيمَسَة

الغيمضاء إحدى الشريرين، من منازل القمر. اطلبه شمرى شامية.

## ٢٠١٢٨ - غُملُول حَمَمَن

يقال غن- الغمل إذا أدرك ثمره.

## ٢٠١٢٩ - غُنبَاط

*Pitta* (S). *Brevo* (F).

جنس طير من الغنبايات الجواثم مشروبات المنابر. أنواعها المعروفة خمسة أصنافها البلاد الآسيوية والأفريقية. جميعها صغيرة اللقد، قصيرة القالب، مسطيلة الساق. أوتارها مختلفة الألوان. جميعها مطوقة الحامس، منشفة الصدر وألوانها. قوتها الحشرات والجزور البرية. تدفن بين الأقدال في الغاميس قليلة السمك. حشباتها أزواج من ٥ إلى ٧ يبيضات طرفها الأتي بمثابة الذكر نحو ١٥ يوماً.

## ٢٠١٣٠ - غُنبَاط حَمِيمَسَات

*Pittidae* (S). *Pittidae* (F).

فصيلة طير من الجواثم لاقتات النمل وريقات المنابر. أجناسها وأنواعها المعروفة متوسطة العدد. موطنها البلاد الحارة المعتدلة نحو الاستوائية من العالم القديم. معظم طيورها صغير اللقد وبعضها متوسط ولكها جميعها مسطيلة الساق. تتميز بقلعة الطران وبرصة اللقد والرشاقة واللغة واللذع. تألف الإحراج النحلة وتعيش أحياناً صغيرة ثلثا يتجاوز عددها أربعة أزواج. قوتها الحشرات المختلفة أعصها النمل وبعض الجزور البرية. أعرف أجناسها وأشهرها النذاج.

## ٢٠١٣١ - غُنبَاط حَمِيمَسَات

*Berger* (F). *Shepherd* (E).

صاحب القمم وأصاحب.

## ٢٠١٣٣ - غُنبَاط حَمَمَن

الغنباط : صوت الذباب.

## ٢٠١٣٤ - غُنبَاط حَمِيمَسَات

*Blaps mucronata* (S). *Blaps, Scarabaeus punct, S. funebre* (F).

غنطاس من فصيلة الغنبايات، طولها يراوح بين ٢٠ و ٢٥ سم. قوتها إلى السواد الباقي القليل السودي. تعيش تحت الحجارة وفي الآنية والتعديلات المظلمة. راحتها مختلفة كرجية. قوتها المواد النباتية والعضوية المنطحة.

## ٢٠١٣٥ - غُنبَاط حَمِيمَسَات

*Rhinobatis* (S). *Rhinobate, Guitare, Violon de mer* (F). *Guitare* (E).

جنس اسماك بحرية ولوية من فصيلة الغنبايات. أنواعها المعروفة نحو ١٥ منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة. أجسامها كبيرة، ريشية الشكل، رؤوسها مستديرة، منطوقة مسطحة بالزوايا الصدوية، مخروطية الشكل. أفيانها سفلى الإرتكاز. لشدها كبيرة. أسنانها مسطحة، متكاثفة الرصف. أوتارها تنطف مع الأنواع، تكثر فيها الكهبة الزرقية الموج. زعانفها الذيلية غارقة، كبيرة القلق العليا، صغيرة السفلى. سرحتها أسلم البواج. ثلثا تشاهد قرب الجاذب والسطوط. أشهر أنواعها أكلاتة أكلية.

## ٢٠١٣٦ - غُنبَاط الجُزُر اليونانية

*Rhinobatis colossus* (S). *Rhinobate des Iles grecques* (F). *Rhinobatis colossus* (E).

نوع من الغنبايات. يتكرر في بحر اليونان والجزر. قوته القشريات والرخويات والشوكيات. جسمه وشي الشكل، يطول نحو ١٠٠ سم. رأسه مسطوح الجرم، مخروطي الشكل. عيناه مسطحتان. له سفلى الإرتكاز واسع الشدة. ثوبه إلى الكهبة الزرقية الموج رقيقة سمراء في الظهر ورشيح أبيض في البطن. لحمه كامن الصف، مأكول.



غُنبَاط



غُنبَاط



غُنبَاط الجُزُر اليونانية

او غيرها، وما تبقى فلوته يختلف مع النوع || يمشى اوراقاً كبيرة العدد قوته البلور والحروب احصاها شب الارز .

### ٢٠٦٤٧ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Podagrica fuscicornis* (S).

*Podagrica à antennes noires* (F).

حشرة غامضة من فصيلة النضاريات ورتبة غدييات الاجنحة . تألف البراري حيث تكثر نباتات الفصيلة الخبازية . غثاسها تعيش على بتلات الارز . يرقاها تلثم الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القدر بطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها ثنائي اللون . رأسها وكوسلها وظهرها وبرامزها الى الحمرة البرتقالية . ظهرها الى الزرقاء الصفراء ، قليل الاحتداد ، مستدير الطرف للاسف .

زبانها خيطيان اسودان || لها جيل واحد في الحول . تظهر الجملدة في ايار ويبقى حتى ايلول . تمتع الاثنى المكن زبناً تلتصقا بتصال الاوراق || البرقة تطول نحو ٧ سم . جسمها وشي الشكل ، سداسي الرواجب . ثوبها الى الصفرة القاتمة بعلوها غطان جانيبان اسودان . رأسها وشربها ورواجبها الى السمرة || طول الاكمال يستمر نحو اربعة اسابيع ويتقضي في التربة ضمن جراب من التراب والحواد الصخرية والنباتية .

### ٢٠٦٤٨ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Gnathocerus cornutus* (S).

*Gnathocère cornu* (F). *Gnathocerus cornutus* (S).

حشرة ناعمة ملوثة من فصيلة الغدييات ورتبة غدييات الاجنحة . موطنها يشمل جميع الاقطار المسكونة . تألف مخازن التيق والبقالة وبيوت السكن . غثاسها وبقاها تعيش على التيق وبركةا المصونة وعلى المراد السكرية والثمار المجففة || جسمها صغير القدر بطول من ٣ الى ٤ سم . ثوبها الى السمرة الكستنية الصنائية المواج ، ذكرورها مجهزة بزوائد رأسية فائقة تميزها عن الاناث وعن غيرها من الحشرات . رأسها مستقيم الهرم مجهز بقرنين متقابلين يكتنفان التأثير الفككية . عينها ناضرة . زباناها صولطانيان صيران ، فكها ذريان . ظهرها لا يلحف كامل السمكة لشربية . غدها متناهما تحزير القاطب والتعيط التيق || لها جيلان في الحول . تسرح في التراب وفي الليل || والبرقة : عند بلوغها الادراك التام ، تطير من ٦ الى ٧ سم . جسمها اسطواني الهرم . ثوبها الى الصفار الباهت . رأسها الى السمرة . سمكتها الشربية مجهزة بمرتين ذرين || طول الاكمال الذي يستمر من ١٤ الى ٣٠ يوما يتقضي طليقاً من كل غلاف .

*Hérissone* (F).

*She-hedgehog* (E).

*Lynx caracal* (F).

*Gongyle ocellé* (F).

### ٢٠٦٤٩ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

هي القنفذة اثنى القنفذ .

### ٢٠٦٥٠ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

هو عنق الارض ، الحلبه .

### ٢٠٦٥١ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

هو النمساة النرة ، الحلبه .

### ٢٠٦٥٢ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Hedychium* (S). *Hédychie* (F). *Ginger lily, Garland flower* (E). *Schöne krauzblume* (D). *Coronaria* (I). غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي هو الاسم الهندي لهذا النبات . جنس نباتات

### ٢٠٦٥٣ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Rhinobatis rhinobatis* (S). *Rhinobate de la Méditerranée* (F). *Rhinobatis rhinobatis* (E).

نوع من الغنابات . اصلها من مناطق حوض البحر الابيض المتوسط . مسرحه اساطير الهياج . قوته القنديات والربويات والقنويات || جسمه وشي الشكل بطول من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . رأسه مبسط الهرم ، مخروطي الشكل . عيناه مسطحتان . فم سفلي الاركانز ، واسع الشفق . اسنانه مسطحة ، متكافئة ، متراسة . زعنفته اللبالية فائقة ، كبيرة الفتحة العليا || ثوبه الى الكهية الزيتية المواج تملحا شحة سمراء في الظهر ، تلبية في البطن || لحمه كامن الصف ، مأكول .

### ٢٠٦٥٤ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Rhynchobatus djeddensis* (S). *Rhynchobate de Djedda* (F). *Rhynchobatis djeddensis* (E).

ممكة من الغنابات . اصلها البحر الاحمر والابح . مسرحها اساطير الهياج || جسمها شبه وشي الشكل ، مستعرض للقدم ، مستطوق للعرض ، بطول من مترين الى ثلاثة امتار . رأسها مبسط الهرم ، مخروطي الشكل . عيناه مسطحتان . فم سفلي الاركانز ، واسع الشفق . اسنانه مسطحة متراسة || ثوبها الى الربية السمراء بعلوها تبتجج اخضر في الظهر وفي الزانفان || لحمه كامن الصف ، مأكول .

### ٢٠٦٥٥ - غُثَبَاتُ اَسْوَد الزُّبَانِي \*

*Rhinobatidae* (S). *Rhinobatidae* (F). *Rhinobatidae* (E).

فصيلة اسماك بحرية ولوية من السنفيات ورتبة الاشفاق . اجناسها وانواعها المروفة نحو ٢٥ جمعا من اسماك بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحارة || اجسامها وشية الشكل لطول من ١٠٠ الى ٥٠٠ سم . رؤوسها منبسطة ، مخروطية الشكل ، مغطاة باكتاف فائقة ناعمة من تحتها بالزوائد الصخرية الرخبة . اقولها سفلية الاركانز ، واسعة الاشفاق . حوتها مسطحة صغيرة . اسنانه مسطحة ، متراسة ، كبيرة العدد . اسكانها الخشوية سفلية الاركانز كالاقلام . زعانفها اللبالية فائقة ، كبيرة الفتحة العليا || اعرف اجناسها واشهرها الغنابات .

*Rhamphocenus* (S).

*Rhamphocène* (F).

جنس طير من الجوانم وفصيلة البيرليات . انواعه المروفة ستة اسطانيات امريكية الاستوائية . ملجتها الجواني حامي الا في زمن القنصاد والحضارة . تألف القنابات . قوتها التمل والخرشات الصغيرة والذباب والحرل || اجسامها صغيرة . متناهما مسطحة . اقنابها مخروطية قصيرة . الثوب تراكية الاروان تكثر فيها الشقة والطلمة والشفية . ميونها مكملة حامرها مسطحة بالاسود . صدورها موجهة || تنش في الانجار التوسعة الانقراض . انثاها تنعم من ٤ الى ٥ بيضات على مرتين في الحول . الترحيم يستمر نحو ١٣ يوما تقوم به الاناث بتناوبة الذكور .

*Paddas, Munia* (S).

*Padda, Calfat* (F). *Paddas* (E).

جنس طير من الجوانم الخروطيات المتاخر . انولعه مدينة جميعها اسيرة فاخرية الاصطاف . الثوب متناهما الاروان المختلفة . رؤوسها سود . حامرها بيض . بطونها وردية



غنابات التوت



غنور



غنول



غثبات اسود الزباني



غثبات اسود الزباني



غثبات اسود الزباني



غندي

للقد يطول نحو ٢٤ سم. رأسه حنوج بقترعة مستطيلة الرئش المنطقت على القفص والعتق. منقاده مخززي الشكل ، قليل الاحديذاب . جناحاه مريضان قصيران . ذنبه مستدير الطرف . ساقاه مستطالان الارتقا . ثوبه الى الشبية القلوية المواج . قترعة حاصية اللون . جناحاه مريضان بالاسود . قوادمه بعلمة بالابيض . الاثني عادمة القترعة || يدلن اقصومه في القربة بين الحماش المنطقة . الاثني تحضن وسعها من ٣ الى ٥ يفضلت يينا الذكر بين لما الطاء .

٢٠١٥٥ - **عُفْرِيَات** \* Rhinocostidae (S). Rhinocostidae (F). Rhinocostidae (E).

فضيلة طير من طول الساق . اجناسها وانواعها المروفة قليلة العدد جميعها من طيور قلدونية الجديدة || اعرف اجناسها واشهرها الفلنوش .

٢٠١٥٦ - **عُفْرِيَات** \* Gnathocoris (S).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحشريرات ، انواعها المروفة قليلة العدد . جميعها صغيرة القدر فضيلة الشكل طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . اذواها الى السرة السوداء المواج || يرقاتها مفترسة تعيش على المزاليل لتلهم الحوام ويكن الحماش .

٢٠١٥٧ - **عُفْرِيَات** \* Gnathocoris (S). Gnathocoris (F). Gnathocoris (E).

جنس حشرات مفترسة من فصيلة الحشريرات ، انواعها المروفة قليلة العدد . جميعها صغيرة القدر فضيلة الشكل طولها يراوح بين ٣ و ٤ سم . اذواها الى السرة السوداء المواج || يرقاتها مفترسة تعيش على المزاليل لتلهم الحوام ويكن الحماش .

٢٠١٥٩ - **عُفْرِيَات** \* Gnathocoris (S). Gnathocoris (F). Gnathocoris (E).

هو الكرمية ، اطليا . ومنها الحمار والجلية .

٢٠١٦٠ - **عُفْرِيَات** \* Uropeltis grandis (S). Uropeltis grandis (F). Uropeltis grandis (E).

نوع من الضفادع ، حية يبيض جلد من فضيلة الضفاديات . موطنها جزيرة سيلان . طولها نحو ٦٠ سم . جسمها اسطواني الشكل ، جلد السيف . رأسها صغير . سطحها مخززي . عيناها صغيرتان . ذنبها مقطوع الطرف ، ازور الحلف يبدو كالحين . ثوبها الملوي الى الصفرة يميلو بتدريج لولبي اسمر . ابطاها ويديها الى الصفرة الباحية المنشعة بالابيض والاخير || تألف المروج والقبائل . قوما القادر والمظاء والتمايين الصغيرة والحشرات والنباتات .

٢٠١٦١ - **عُفْرِيَات** \* Uropeltidae (S). Uropeltidae (F). Uropeltidae (E).

فضيلة حيات يبروشة ، جلدة ، عادمة السموم ، لافونية . اجناسها المروفة سبعة ، اما انواعها حشر ٩٠ اعطياها تحت من الخلق الى الحد والبلد الصينية جزيرية سيلان ويجزو الزايج || اجسامها اسطوانية تطول من ٣٥ الى

جلودية مسرة من فصيلة الزنجيبليات . انواعها المروفة ٢٥ جميعها من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة . قرية الشب من القنا . اذواها سائمة متعاقبة . اذواها منبلي ، حايي ، كير القد || اذواها عديمة الاالوان ، انبوية النكس الاثنية انترضس يعلما تويع انبوي مستطيل ينهي بثلاث مسلمات ثنائية التخصيص . مايرها عديمة تملوها سات دقيقة || تجود في جميع الارابة القنية بالمواد الضموية لكنها تحضن المواق الباردة || اشهر انواعها ما يلي .

٢٠١٥٨ - **عُفْرِيَات** \* Hedychilum (S). Hedychilum (F). Hedychilum (E).

نبات ترابي يعلو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم . بما فيه السيلة الزهرية . اذواها فضيلة حزامية خلية التصل تطول نحو ٣ سم . وتعرض نحو ٢ || اذواها اسطوانية اللون ، شريفاتها صغيرة مستديرة ، قصومها خطية تطول نحو ٣ سم || اذواها يستمر من حزيران الى آب .

٢٠١٦٩ - **عُفْرِيَات** \* Hedychilum (S). Hedychilum (F). Hedychilum (E).

نبات ترابي يعلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . اذواها فضيلة مستطيلة مدنية الزام الاسمر . تصلها ماس البشرة يطول نحو ٥٠ سم || اذواها صفراء اللون شريفاتها مستطيلة ، مايرها وسامها حر || اذواها يستمر طوال فصل الصيف .

٢٠١٥٠ - **عُفْرِيَات** \* Hedychilum (S). Hedychilum (F). Hedychilum (E).

نبات ترابي يعلو من ٤٠ الى ٥٠ سم . ساقه دقيقة نميلة . اذواها سائلة التصل تطول من ١٢ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ٨ سم || سنبلة الزهرية متدلية تطول نحو ١٦ سم . لون اذواها الى الياض الموحج بالاحضر اذواها يندو طول شهر الجليل .

٢٠١٥١ - **عُفْرِيَات** \* Gondwana (F). Gondwana (E).

اسم يطلقه علماء الجغرافية والجيولوجية على قارة افريقية كانت في الازمنة السليقة تشمل القسم الاكبر من الهند وكامل جزيرة مدغشقر واستراليا فانشقت وانقسمت من بعدها في الابهاج الثاني واصبحت كما هي الآن .

٢٠١٥٢ - **عُفْرِيَات** \* Ctenodactylus (S). Ctenodactylus (F). Ctenodactylus (E).

حيوان لوبن قاضي وحيد الجنس والوتر من فصيلة الدلافينات . موطنه اطراف الصحراء الكبرى من الغرب والقبائل . جنته جنة الالب الصغير . يألف المناطق الصخرية القوية اذواها صغيرتان . ذليه جفحة كسبية . جزامه وديانة الاسباح انظره قوية ذرية . ثوبه الى اليردة السهباء بلكه ابيض || قوته الاضباب والجلور .

٢٠١٥٣ - **عُفْرِيَات** \* Gnela (S). Gnela (F). Gnela (E).

حشر متيلور ثورابي المصدر يكثر في الاراضي الاسلية .

٢٠١٥٤ - **عُفْرِيَات** \* Rhinocostus (S). Rhinocostus (F). Rhinocostus (E).

طائر وحيد الجنس والوتر من فصيلة الفلنوشيات . موطنه قلدونية الجديدة . تألف البراري والاحراج البشرة الانحمار . ملجته الحياتي جامي جماعته قليلة العدد . قوته الحشرات واللافونيات وبعض اثار النية والبرور || جسمه متوسط



فلنوش



نطشوس



غفلة

**٢٠١٦٧ - غُتُوج \* Melopeltacus undulatus (S).**  
**Melopelte, Perruche ondulée (F).** **Budgerigar (E).**  
 طائر وسيد الجنس والنوع من الببغاوات. موطنه بلاد  
 أستراليا. ريشه منتشرة في معظم انحاء العالم. يأنف  
 القمص لكنه لا يعيش منفرداً وأن عاش فلوحت عمود ||  
 جسمه صغير اللد مستطيل الذنب الفيلق. ثوبه جميل  
 الألوان، متركب الاخضر والاصفر والاحمر والبني  
 في لا ميل له يتحلى ارفع الاذواق || قوته اللدن  
 والقتيز والثار التناضجة والمفوف وأنس || الاثنى ثلث  
 عشها في تجويف جلع. حشفتها من ٤ الى ٦ بيضات  
 تستمر نحو ١٥ يوماً.

**٢٠١٦٨ - غُتُوجَة \* Melopeltis (S).**  
**Goniatites (F).** **Goniatites (E).**

جنس حيوانات من الرخويات رأسيات الاريل رباعيات  
 الخياشيم وصليبة الثنائيات. انواعها المعروفة نحو ٣٠٠  
 جميعها من المتحجرات. احاديها تستمر من الحية  
 الالفينية الى اواسر الكربونية || اصداها مكورة الشكل  
 او مبطنة. قرية الشبه بالثقبات.

**٢٠١٧٠ - غُتُوجِيَّات \* Goniatitidae (S).**  
**Goniatitidae (F).** **Goniatitidae (E).**  
 فصيلة من الرخويات رأسيات الاريل، رباعيات الخياشيم.  
 اجناسها وانواعها المعروفة عديدة، جميعها من متحجرات  
 الحقبة التيفينية والكربونية من الاباج الاول المعروف  
 بالقديم || اعراف اجناسها الثنائيات والتكليميت.

**٢٠١٧١ - غُتُوجِيَّة \* Gouania (S).** **Gousnie (F).**  
 سمكة بحرية من شالكات الزعانف وصليبة الشطاريات.  
 اعطائها بعض مناطق البحر الابيض المتوسط || جسمها  
 صغير اللد، يطول من ٤ الى ٦ سم. رأسها صغير  
 مستدير الخط المقعر. عينها ماحتان. زعانفها الظهرية  
 والشرجية خفيفة، مستطيلة. الثيلية صغيرة، مستديرة  
 الطرف. ثوبها الى الشقمة المنطقه بالاحمر || تتميز  
 بمحسنتها الطيانية الايليبسية الشكل التي تمكنها من  
 الالتصاق بالأسماك الصغيرة حيث تكمن واحدة تقوم  
 فرائسها.

**٢٠١٧٢ - غُتُوجِيَّات \* Cryptobranchidae (S).**  
**Cryptobranchidae (F).** **Cryptobranchidae (E).**  
 فصيلة حيوانات قلازية من صف السلفقيات ورتبة  
 السرفقيات. اجناسها وانواعها قليلة العدد منتشرة في معظم  
 انحاء العالم || جميعها ملققة الخياشيم، قاربة، تعيش  
 في البر والماء || اجسامها مستطيلة، رباعية القوائم  
 والاصابع، اسفلية الزروس، مستديرة الميرون الصغيرة.  
 امودها اعمد المستدل || قوتها اللدنان والحشرات  
 واللوبيات.

**٢٠١٧٣ - غُوارَكَة \* Paullinia cupana, P. sorbilis (S).**

**Paullinie, Guarana (F).** **Guarana (E).**  
 جنبة عمرة عاشره ملتفة من فصيلة البينديات. مهدها  
 بعض اصقاع امريكة الجنوبية انحصها البرازيل حيث  
 يدعيها « غواركة ». منها الطوري شغلان الامازون

٦٠ سم. رؤوسها صغيرة. اعطائها متباينة الاشكال،  
 منها المنطقية والمستديرة والمخروطية. ميونها صغيرة. فكوها  
 مستنة. اعطائها معدية. اقلها قصيرة. اقلها مرقوشة  
 متركبة الألوان || اشهر انواعها غنفر سيلان.

**٢٠١٦٢ - غُفُف \* Fieraster (S).**  
**Fieraster (F).** **Fieraster (E).**

المنطقية غفلة وغفل جنس اسماك بحرية من الملساوات  
 انواعها المعروفة قليلة العدد. اعطائها بعض مجار البلاد  
 الخاخرة والمتحدة الحرارة ومنها البحر الابيض المتوسط ||  
 اجسامها مبطنة مستطيلة كدية الشكل تطول من ١٠ الى  
 ١٥ سم. زعانفها الظهرية قليلة العرض، قاطبة، تمتد  
 من الخلق الى طرف الخيل. اقلها تختلف مع الانواع منها  
 الاصفر والاحمر والاصفر والاصفر والاصفر الباهت ||  
 تكمل على كواكب البحر وتقاتل البحر وتعيش في  
 اقلها الحفصية.

**٢٠١٦٣ - غُفُفُونِ الْقُف \* Gnophos obscurus (S).**

**Gnophos obscurus (F).** **Gnophos obscurus (E).**  
 حشرة من فصيلة الافرثيات ورتبة حشرقيات الاجنحة.  
 موطنها معظم الاصقاع المعتدلة الحرارة من الشرق الاوسط  
 والاندل وادوية. فرائسها جارية قوتها رقيق الازهار.  
 سرتها خافضة قوتها اوراق النبات || جسمها نحيل نصيف  
 يطول نحو ١٦ مم. بطنها نحو ٣٠ سم. رأسها اريد احمر.  
 عينها صغيرتان. زباناها غليظة. جوتها ويطها الى  
 الرتبة السراء المولج || ورشها الاماميان الى الرتبة  
 اعطائها تشبه الكعب وثلاثة عظمي مقعرة وسط متقطع  
 جميعها الى السرة. حادها الخارجي مغرض سباني الاسنان.  
 ورشها الخلفيان الى الرتبة اعطائها غطان مغرضان اسمران  
 وسط حادري شديد السرة. حادها الخارجي خامسي  
 القروض || لها جليل واحد في الخلق. تظهر القرائن في  
 حمور وثني حتى ايلال. تسرح من الصبر الى فحة الجبل.  
 تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتد المكان محادياً  
 حل الصفحات السفلى من نصال الاوراك || السرعة تطول  
 نحو ٢٤ مم. جسمها شبه مدققي الشكل. ثوبها يلائن  
 البيئة التي تعيش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاحمر  
 والاريد المرقوش بالاحمر تملو ثلاثة عظمي قاطبة. جميعها  
 الى الجوزة. رأسها اسود. راجعها البنية الوسطى ماحتة  
 مما يجعلها تنحوس منه الانتقال || طور الاكمال الذي  
 يستمر نحو ١٥ يوماً ينتهي في الاجلحة ضمن صلبة  
 مهدلة الشباك.

**٢٠١٦٤ - غُفُف \* Ovides (S).**

قال الجوهري: « الغفم اسم ملئت موضوع الجنس يقع  
 حل الاكوار والاثاث ». واقله لا واسد له من لفظه  
 والجمع اثمم واغامم وغفوم. اطلب شأن.

**٢٠١٦٥ - غُفُفِيَّات \* Ovides (S).**  
**Ovides (F).** **Ovides (E).**

فصيلة من مزدوجات الاصابع المقتربات يقسمونها الى قسمين  
 الفائية والمزلية.

**٢٠١٦٦ - غُفُفِيَّة \* Ganymede (F).** **Ganymede (E).**

اسد اثار المشتري. اكتشفه غاليله بتاريخ ٧ كانون  
 الثاني ١٦١٠ دورته الكوكبية حول المشتري تستمر ٤ أيام  
 و٤٢ دقيقة ٣٦ ثانية.



غنفر سيلم



غُتُوج



غُتُوجِيَّات



غُفُفِيَّة



بارزة العروق المتوازية . نصلها مالم بشرة الصفحة العليا ،  
خلل السفلى ، طري الرائحة ، يستعمل كالشاي وينشط  
الحضم || أنظرها يضاه اللون ، طرية العروق المستطب  
ثمادها اجناسية الشكل تنقل من ٣ الى ١٠ سم . لها اصفر  
اللون وقد يكون ابيض او وردي او برتقالي في بعض  
الضروب || غروبها مدنية . ثمارها مشطرة على السلس  
البستاني من صور الى طرابلس .



غواصة

#### ٢٠١٧٨ - غواصة نفاحية ، غواصة حمراء

*Psidium pomiferum*, *P. guayava pomifera* (S). *Goyavier* pomme, *G. rouge* (F). Apple shaped guava, Red guava (E). Apfeltragender Guava, Rote Guava (D). *Guayava rosso* (I).

نوع من الغواصة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٣ الى ٦ أمتار . تميز في غلاف الازرق الرملة والبيضاء . ثمارها نفاحية الشكل مأكلة لثقا اقل جودة وأخضر مادة وانتجية من الغواصة الاجناسية .

#### ٢٠١٧٩ - غواصة هـ

*Agave*

حشرة من الغواصات صغيرة اللد تنسل مع ريقاتها على دبا اللذاب . جسمها منزلي الشكل ، ازرق اللون عند الذكر ، اسود عند الانثى . رأسها مستطيل . زباناها دقيقتان صولجانان . اجنحتها شققة ، قليلة العروق والاعصاب ، تزينة اللون عند الذكر ، وردية عند الانثى . جوفها مسم . بطنها مستطيل مركب من سبع حلقات وربعات تنتهي بالزوائد التسالسية . اشربتها مستقيمة مدبة الوحش .



غواصة مقطع النشرة

#### ٢٠١٨٠ - غواصو

*Guano*

سماد ازرق في فسفوري حصل من تجميع وتراكم ملح الطيور البحرية رجمة من الزنق في بلاد الفيل وباريو وغيرها من بلدان امريكا الجنوبية . وهو من انشاد الاسمدة الازرقية وقد وجد حيزه الان بعد استنزاف منظم وكماه .

#### ٢٠١٨١ - غواصو اخفاش

*Guano de chauve-souris* (F). *Guano of flietarmouse* (E).

نوع من الغوانو يوجد في الفلور والكهوف ، يكثر في الجزائر والاندلس .

#### ٢٠١٨٢ - غواصو السمكة

*Guano de poisson* (F).

نوع من الغوانو يصنع بمعالجة بقايا الاسماك بالمخاض الكبريتي .



غواصة

#### ٢٠١٨٣ - غواصات

*Agaonidae* (S).

*Agaonidae* (F). *Agaonidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة شحاليات الاجنحة المحصورة . انواعها عديدة جميعها نافعة تنقل على بعض انواع النباتات اعصها اللين وصل بعض الحشرات الفاضلة من ذوات الجناتين || حشرات صغيرة اللد تنقل طولها يراوح من ١ الى ٥ ميليمتر . اجسامها رجمة . زباناها صغيرة دقيقة . اسرارها رباعية المقل . اثوابها متباينة الايلوان بين الذكور والاناث || أشهر انواعها الغواصة ذكازك التنين .

#### ٢٠١٨٤ - غواصو هـ ، مستكوب

*Mystacope* (S).

*Mystacope* (F).

خفاش وسيد الجنس والرقع من عمارة الحشرات . موطنه زيلته الجديدية يتميز بطول جسمه للسليطة التي تمككه

وقد انتشرت زراعيا في بعض المناطق الحارة الرطبة ||  
ساقها مستطيلة كثيرة الايلات المتينة . اوراقها متعاقبة ،  
مركبة ، وقرية التجميع . وريقاتها اعطليجية النصال  
الجامدة ، ناشرة الفسول والعروق . انظرها عتقوي  
التجميع ، عتقوي الايتكاز . انظرها يضاه اللون ،  
خداية التفصيل ، رداية الثلاث ، ثمانية الاسدية . ثمارها  
جرا عتقوي . ثلاثية الزوايا والسلف المستطيلة تحضن من  
٥ الى ٦ ثلث عبات فيه مكررة الشكل تنقل نحو  
١٥ سم . وطه العبات التي تحوي نحو ٥ ٪ من الكالكين  
تستعمل بالتجميع استعمال البين او لتحضير بعض  
انواع الشراب المشع الثلث الانتهاك في البرازيل .

#### ٢٠١٧٤ - غواص هـ

*Gnatus* (S).

*Gnatus* (F). *Gnatus* (E).

جنس حيوانات بحرية مفترسة من الرغويات واسيات  
الانيل . مزدوجات الخياشيم ، عشاريات الجرايم وفصيلة  
الودوسيات . انواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في البحار  
القطبية || اجسامها اسطوانية مستطيلة . زعانفها طرفية  
كافية الشكل . رؤوسها شبه مكررة . هوبها ماصة .  
جرايمها عجيبة متساوية الطول باستثناء الزوج القيق الذي  
يبلغ طوله نصف طول الجسم والاني ينتهي برعي سنانية  
الشكل تملوها الكلايب في اقزام الاول ، والهام في  
الزائين الثالث والاخير .

#### ٢٠١٧٥ - غواص

*Grèbe* (F). *Græbe* (E).

هو الطغاس من طير الماء وكيفية سيده انه يوصف في الماء  
منكبسا بوق شديفة ويمكث تحت الماء بعض الوقت ،  
نحو ٨ دقائق ، الى ان يرى شيئا من السمك فيأخذه  
غور ٥ يصاد به || قال بعضهم : رأيت غواصا خاص فقلع  
بسكة فله غراب عليها فأخذه من نفاس مرة اخرى  
وطلع بسكة اخرى فأخذه من الغراب ثم الثالثة كذلك  
فلما اشعل الغراب بالسكة وثب للنفاس فأخذ يرسل الغراب  
وفاه به تحت الماء حتى مات الغراب ثم خرج هو من  
الماء .

#### ٢٠١٧٦ - غواصة

*Psidium guayava* (S).

*Goyavier* (F). *Guava tree* (E). *Groaze gelbe* *Guayava* (D). *Guzajava*, *Paidio* (I).

جنس الشجار وجيترات مشرة برية وزراعية من فصيلة  
الاسيات . انواعها المعروفة نحو ١٠٠ مهها الاسلي امريكة  
الاسطوانية وجزر الانيل . اوراقها كاملة متعاقبة بارزة  
العروق . انظرها عتقوي الايتكاز ثنائية او ثلاثية  
التجميع . قصيرة الزناد ، خداية البيلات البيض . ثمارها  
نورية طرية راتنية مأكلة ورطب || تتكاثر بالبر  
والتقليل والقصير . الفرة الناجية من برة تضر بدورها  
في مستقرها بادر سنوات ويستمر نموها نحو ١٥  
سنة ثم يستمر صلاحها الى ان تبلغ ٢٥ سنة حيث ينتهي  
دور الانحطاط والقماعة || وفي ترب في الاربة  
المستقيمة الانحطاط ثنية بالناسر الثلاثية والبارد البديلة .  
أشهر انواعها الزراعية : الغواصة الاجناسية والنفاحية .

#### ٢٠١٧٧ - غواصة اجناسية ، غواصة بيضاء

*Psidium piriferum*, *P. guayava pirifera* (S). *Goyavier* *poire*, *G. blanc* (F). *Pear shaped guava*, *White guava* (E). *Blaufrüchtige Guava*, *Weisse Guava* (D). *Guajava* *blanco*, *Guayabo* (I).

نوع من الغواصة الزراعية المشعة . ثمرتها تملو من ٤ الى ٨ أمتار . فرصها رائحةها مفهمة . اوراقها سنانية الشكل



غور

من جمع جنسها في ثنائيا. يطير ويسير على الأرض ويسبق الإخبار بدون تردد || يعيش منفرداً. الذكر لا يقرب الانثى إلا عند الكرم. يسرح في اوائل وواخر الليل. قوته الحشرات. يألف تجاريف الاشجار وواقب الصغور واللغاور ولكثرون.

٢٠١٨٥ - **غُورِيَّة \***  
Scolopsis (S). Scolopsidae (F).

سمكة بحرية يمرض من شاكلات الزنائف وفضيلة الفرغيات. اعطائها تمتد من البحر الاحمر الى المحيط الهندي. قلا تقرب من الشطوط الرملية اما يكثر بجوها قرب المالحح || جسمها اعليها الشكل بطول نحو ٢٢ سم. رأسها حدير القند رسطها كذلك. عينها كيرتان، جاحطتان. زعنفتها الظهرية وحيدة، مستطيلة، متساوية الارتفاع. زعنفتها الخلفية فائقة. ثوبها الى اليركة القضيبة يبق في الظهر ويسير في الليل. ويصلها ثلاثة خطوط وريدية جانبية قاطعة وسط ابيض القلي السراير تمتد من مقدم العظم الى القاعدة الزعنفة الصدرية || لحمها متوسط الصنف، مأكول.

٢٠١٨٦ - **غُورَتَاوِيَّة**  
هو الرُّبَر : نبات من الخلنجيات، اطله.

٢٠١٨٧ - **غُورِيَّة ثَلَاثِيَّة النَطَط**

Limnobia tripunctata (S). Limnobia tripunctus (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات. جسمها صغير القند بطول من ٧ الى ١٠ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران. صدرها صناعي طعوب جعدة تقسية سمراء. بطها الى السرة الصناعية. روثهاا ثلاثيا النطط السمر || الانثى اكبر قدماً من الذكر. تروّز مكثها في التربة ليثقف عن يرقات تعيش على المواد النباتية المنحلة.

٢٠١٨٨ - **غُورِيَّة صَفْرَاء**  
Limnobia lutea (S). Limnobia lutea (F).

حشرة لافظية من فصيلة الغوريات. جسمها صغير القند بطول من ٦ الى ٩ سم. رأسها شبه مكور الشكل. زباناها عظيمان، اسمران. ثوبها الى الصفرة الصناعية المواج. روثهاا كيرتان غضبان بالاسفر والوردي والاعضر || مرقمتها المقلع الثلاثة والحدائق والبساتين || الانثى اكبر قدماً من الذكر. تروّز المكان في التربة ليثقف عن يرقات تعيش على المواد العضوية والنباتية.

٢٠١٨٩ - **غُورِيَّات \***  
Limnobiidae (S). Limnobiidae (F).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين. اجناسها وانواعها المبرقة عديدة، منظرها من علم الاثام الباردة تعيش على رحيق الازهار والفرزات الارزاق. يكثر بجوها في الغابات وقرب مجاري الماء || اجسامها غيلة. رؤوسها مكورة، صغيرة، قرونها الاستمدادية غليظة. قوائمها مستطيلة، قصيرة || يرقاتها خاضعة او داتنة او زائجة. جميعها تنفخ في التربة في زين الاكمال وتلتصق بصلية تفرز نواصها فعد خاصة في مقدم الجسم.

٢٠١٩٠ - **غُورِيل \***  
Aegothales (S). Aegothidae (F).

جنس طير من فصيلة البذرغوسيات. انواعها المبروقة خسة



غورل

موطنها بعض مناطق الشرق الاوسط والاهلي. تسرح في الليل وتبيت في التهار على الاشجار || اجسامها مستطيلة القند بطول من ٢٠ الى ٢٥ سم. رؤوسها مستعرضة مقلعة. عينها كبيرة. سالما كيفة. مناقبها غروبية الشكل، واسمة الاشداق. اعناقها قصيرة. اجنحتها متدلة الطول، ذلقة الاطراف. اخفافها مقلطية. الثوب الى الباردة تملوها رقة سمراء وتنسج اسود يمتد حتى الحواف الاجنحة || قوتها الحشرات وبعض الثمار والبذور || تدفن في تجاريف الاشجار. اناثها تبيض من ٤ الى ٥ بيضات تحضنها بمناوية الذكر نحو ١٧ يوماً.

٢٠١٩١ - **غُورِيَّة صَغِيرَة \***

Trachys minutus (S). Trachys menu (F). Trachys minutus (F).

حشرة خاضعة من فصيلة الزننجيات ورتبة مفدمات الاجنحة. تألف المواقف الرطبة وضفاف مجاري الماء. غناتهاا تعيش على اوراق الحور والصفصاف. يرقاتها مرقاة تلص اتصال الاوراق وتعيش في داخلها || جسمها صغير القند بطول نحو ٣ سم. ثوبها الى القسرة السوداء يملوها مواج يتنسجي. رأسها غروبي الشكل. عينها كيرتان جاحطتان. زباناها صغيران دقيقان. ظهرهاا غصصور الوص. مستدير الطرف للانسف. اوساهاا خاسية المقل || لها جيل واحد في الحول. تظهر الحشرة الجملانة في اوائل الربيع وتعيش حتى اواسط الصيف. تسرح في التهار. تساهل بعد ظهورها بثلاثة اسابيع. تروّز المكان في نصال الاوراق || المبرقة عند بلورها الاذراك اتمام تطول نحو ٥ سم. جسمها اسطواني الشكل، عامد الراس، قسبط التقدير الشفوية، تبي اللون || طور الاكمال الذي يستمر نحو ثلاثة اسابيع ينتهي في الجلالة ضمن صلبة خيارة النشاه المركب من مواد نباتية مسجولة بالاريا.

٢٠١٩٢ - **غُورِيَّة \***  
Godetia (S). Godétie (F).

جنس نباتات عشبية حولية سرؤوية مغالية من فصيلة الاسفريات. اوراقها متناوبة بسيطة. ازهارها عنقودية التجميع، رباعية القصل والبتلات، ثمانية الاسدية، غتلفة الاوالان || انواعها المبروقة قليلة العدد، اشهرها التالية :

٢٠١٩٣ - **غُورِيَّة كَبِيرَة الرُفَر \***

Godetia grandiflora (S). Godétie à grandes fleurs (F).

نوع من الغوسية. عشبة ثريضية سرؤوية مغالية هريمية الشكل. سقفا موقفة تملو نحو ٤٥ سم. اوراقها سنائية ضيقة. ازهارها سنبلية التجميع. ازهارها كبيرة القند، طورها من ٨ الى ١٠ سم. ثوبها الى الحسرة الصفراء المواج ومنها ضروب يبيض. ويرقوها باليليكي || تنويرها صيفي.

٢٠١٩٤ - **غُورِيَّة مُسْتَحَبَّة \***

Godetia amena (S). Godétie plaisante (F).

نوع من الغوسية. عشبة ثريضية سرؤوية مغالية. سقفا موقفة ترتفع من ٤٥ الى ٦٠ سم. اوراقها سنائية النصال، مسنة الحنار. ازهارها سنبلية التجميع. ازهارها عديدة الاوالان التي تخلف مع الضروب منها يليكي والاخر الحصري والوردي والابيض والورقوش بالابيضوال || تنويرها يستمر من حزيران الى تموز.



غوجمة صغيرة

۱۹۰۲ - ۲۰۲۰ هـ

Goodwin (5).

Goudenia (F). Goodenia (E).

جنس ثباتات عشبية برية حولية ومعمرة من فصيلة الفوذيات .  
أنواعه المعروفة نحو ٧٠ مهددا استوائية || جميعها عشبية .  
المعمرة منها مخشوشة الساق . أوراقها متعاقبة ، مستطيلة .  
معظم أنواعها علفية .

۱۹۶۰-۶۱ء کی دہائی

**Goodenitaceae (5)**

Goodeniaceae (F). Goodeniaceae (E).

[illegible]

٢٠١٧ - ٢٠١٨

**Bibos gaurus (S).**

Gaur, Boeuf gaur (F). Gaur, Indian bison (E)

نوع من ابقار الوحش ، موطنه يمتد من بورما الى شبه جزيرة ملقة . يعيش في الاحراج الغنية الكثيرة الشب . طوله يراوح بين ٣٠٠ و ٣٢٠ سم . وارتفاعه ١٨٠ الى ٢٠٠ سم . ثوبه الى السمرة العاقبة . قوامه يمش . حاروكه مستطيل دقيق بارز . اذنه لا يقياسي العدد راوس منه ٥ افراد الى ٢٥ فرداً .

## ٢٠١٩٨ - ٢٠١٩٨

*Oosphronemus olfax* (S).

Osphronème de la Sonde, Gourami (F).

وهوأي هو الاسم المألوف. سمكة متفحمة من شائكات  
والزئافان العمليات التجبية وعليلة الحساكات. اصطناعها  
المناطق واليهوار الكبيرة في ماليزيا وهولاء  
ومستوراء جسمها قلد يالوز ١٠٠ سم.  
ورأسها شبه غريلي الشكل، فمها الخشن الضخم. زعنفتها  
الظلفية كثة الناحس، مسطيلة الشكل، تفع الى  
الزوارا. زعنفتها الحوضيات صمراوات مجهزتان بمسكين  
مضغضيفين بالاعط الطويل. الشرجية مسطيلة، شائكة.  
اما الذيلية فلهي مرمية. توفوا الى السمرة الحمراء اللحية  
المزاج لميلها في ظهورها تجلجبع معترض أسود. مطها فصي  
اللون مغنط بالاسمر لها فاعر الصفب مرفوش في  
دفر كثة المسك.

۲۰۱۹-۲۰۲۰

Gaura (5)

Gaura, Gaure (F), Gaura (E)

جلس لنباتات عشبية وبجيلة، سولية وبحيرة وعمرة من فضلة الاندريات. انواعها المحروقة نحو ٢٠ مجيها امريكية الاذن. مظهرها بري وبضها ترقص في سواها منتصبة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. فرورها خفيفة الجالس. اوراقها خاتبة؛ السفل من ريشة غمره، الوصل اعلىهية حمرة واما العليا فنباتية الصماد الباقية انفسار. ازهارها مجمعة من مائل الطرية الانكزاد انضامها رامية البليات الانفسارية. اسنيتها ثلاثة او اربعة اقمرة اللون. ثمرها خفيف خريفي تفرص في التربة الخمسة الاندسامي تحوي التشتيل ما



نحوہ



طوری



ظهور فيرجية



مفتوح



ملفوظات



فہرست



عُثْبَة



غُشَّة مَرَسِيَّة (١)



غُشَّة مُطَاة (٢)



غُشَّة مُجْمَدَة (٣)



غُزْلَان



غُزْلَانَة



غُثُورَة

الزرقاء السوداء . سباله كثيفة مستطيلة سوداء اللون . متفاده ذوب الملقح المحبب ، واسع الشفق الرطب ، لونه الى الطلحة تلوينا مابية جراء . ساقه الى السرة الزيتية المالح || طيرانه غطيف الحركة ، متثل الشيط ، كثير التصليق || قوته الثَّار والبلور وبسبب الحشرات الكبيرة || عنه اخصوص يندبر اينا كان بين تخاليف حضور الكهوف والمغاور . الاثني تسع من يعضين الى اربع يعضات تحسبها بمنواله الذكر نحو ١٨ يوماً .

٢٠٢٠٦ - **غُثُورِيَّات** \* (S). *Scatarnithidae* (F). *Scatarnithidae* (E).

نفسيلة طير من الجرايم مشقوقات المناقير . اجناسها وانواعها المروعة قليلة العدد . موطنها بعض مناطق امريكا الوسطى || طيورها كبيرة القند تتميز بمناقيرها الفضية الشبه مشووية الشكل ، وباجنحتها المستطيلة || سرعتها دجوي يستمر من الغربوب الى الشجر . قوتها الثَّار والبلور || اعراف انواعها وبشرها النشاز .

٢٠٢٠٧ - **غُثُوب** \* (F). *Amblypygo, Phryna* (F).

جنس حناكب ولحمة من الزوطيات . تتميز بجملها من مؤخر الجوف وبطنها المركبة من ١١ سكة . اجسامها صغيرة ، مبطلة ، عادمة الحساسية ، تطلي نحو ٤٥ م . م . مجنتها يشمل معظم اقطار البلاد الحارة .

٢٠٢٠٨ - **غُثُفَة** \* (S). *Helvels phalloides, Morchella esculenta* (S). *Helvelle, Morilla, M. de moine* (F). *Morell, Bishop's mitra mushroom* (E). *Spelmorchel* (D). *Spugnola* (F).

جنس فطور مأكولة من فصيلة الفشاريات ورتبة الزوطيات . انواعها عديدة جميعها صالحة للاكل لكنها تختلف حسن بعضها بمقدار الطعم وبشكل الحجم .

٢٠٢٠٩ - **غُثُوط** \* (F). *Benthos* (E).

فوط ج افراط . اسم يطلق على الاحماق البحرية المختلفة الابداد وعلى الكائنات الحية الثابتة والمتحركة التي تعيش في هذا المحيط . فن الكائنات الثابتة تذكر الخليايات والاسفنجيات والفشوكيات والعلمليات ... ومن الكائنات المتحركة فخص بالذكر البهتان والمَشْفَرَات والصفيحيات الخياشيم والمدليات والنبهيات ...

٢٠٢١٠ - **غُثُوطِي** \* (F). *Benthique* (F). *Benthic* (E).

لعت تعريفية يطلق على الاحماق البحرية وعلى الكائنات الحية التي تعيش وتتكاثر في هذا المحيط .

٢٠٢١١ - **غُثُور** \* هو البليغ الخريف .

٢٠٢١٢ - **غُثُول** \* هو الثورول ، اطلبا .

٢٠٢١٣ - **غُزْلَان** \* ، **اَجِيرَكُوم** ، **قَتِيَة**

*Ageratum* (S). *Agérata, Ageratum, Céléstine* (F). *Goat weed, Bastard agrimony, Flores flower* (E). *Laberbalzam* (D). *Agerato, Celestina* (I). جنس نباتات عشبية حولية او معمرة من سبط البفنجيات وفضيلة المركبات . انواعها عديدة معظمها بري . سيقانها فراء . اوراقها السفلى والوسطى متعاقبة اما العليا فتضائية . ازهارها شكلوي التجميع ، هامي الارتكاز ، طويل الامة . يدوم من اول الصيف الى اواخر الخريف . ازهارها صغيرة

القد ، طويلة الزغب ، زرقاء اللون او بيضاء || يزور القزوين ، يتكاثر بالبلور والمقل . تلبز مشالته في اذار وفيما تنقل الشتول الى مستقرها في اواخر ايار فتضرس بعد قرف ورووس سيقانها . اما القمل فتضرس في اذار ولبسان . والنولان يرغب في الاثرية البليانية الجسية المعرصة للشمس . وهو لا يتطلب عناية خاصة وجل ما يجب الانتباه اليه هو مكافئة الارق عند ظهوره لانه يتعصن لسخ الاوراق ويؤذي النبات . يكالغ باستعمال مركبات النيكوتين وفيهرا من الحواشير القمالة .

٢٠٢١٤ - **غُزْلَان طَيَّاسِي** \* (S). *Ageratum conyzoides* (F).

*Agératum fausse-conyze* (F). نوع من الغزلان ، وهو عشبة ترينية حولية جادة . ساقها فراء ، حرمية الهيكل ، وقلدية الجمل . اوراقها بيضية التصل للمسح الحافة . ازهارها صغيرة القند ، زرقاء اللون || ازهارها يستمر من حزيران الى تشرين .

٢٠٢١٥ - **غُزْلَان فِرْدَوْسِي** \* (S). *Ageratum corymbosum, A. celestinum* (F).

*Agératum célestinum* (F). نوع من الغزلان ، وهو عشبة سبروتية ترينية تملو نحو ٨٠ سم . اوراقها منقطة . نصلها قلبي القاعة ، يغطي الصنفرة المائلة . ازهارها خلية البشرة ، زرقاء اللون . ازهارها يستمر من حزيران الى اواخر تشرين .

٢٠٢١٦ - **غُزْلَانَة** \* ، **وِغُون** \* (E). *Lama vicugna* (S). *Vigona* (F). *Vicuna* (E).

غُزْلَانَة هو الاسم الشائع في بوليفيا والبيرو . نوع من اللاما ، حيوان لين عاش من فصيلة الجمليات . موطنه جبال بوليفيا والبيرو من ارتفاع ٣٠٠٠ م . فصاعداً || جسمها رقيق القوام بطول نحو ٢٠٠ سم . ويرتفع نحو ١٠٠ سم . وبرها فاخر الصنف ، خالي الشنن || الاثن ثنائية الاخلاط . عضلها يدوم نحو ١٧٠ يوماً . الابدان من النولكا يستعمل لدر الخليلب ولنقل الاتقال .

٢٠٢١٧ - **غُثُورِيَّة** \* (S). *Gunnara* (F). *Gunnere* (F).

جنس نباتات عشبية دماعة مسرة دماعة من سبط من فصيلة الفونيريات . انواعها عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . اوراقها قرمزية الانتشاب ، منقطة ، كبيرة القند ، مفضضة ، قلبي القاعة نصلها بطول من ٣٠٠ الى ٣٠٠ سم . ازهارها صغيرة القند ، متبيلة التجميع ترتكز على شراخ يملو من ٦٠ الى ٤٠٠ سم || جميع انواعها دماعة خيرية النسخ . جلودها واوراقها مضادة للجراثيم . قشورها صلبة . صباغها اسود اللون .

٢٠٢١٨ - **غُثُورِيَّات** \* (S). *Gunneraceae* (F).

*Gunnéracées* (F). *Gunneraceae* (E). نفسيلة نباتية من ذوات الفلقنتين .

٢٠٢١٩ - **غُثَاب** ، **غُثَابِي** \* (F). *Contumace* (F).

*Contumacy, Default* (E). هي سالة المكلف بالمحضور امام المحكمة وقد تخلف اما جهوا او عمداً فاقصر في سالة اقيام وتسك عليه غيايباً .

٢٠٢٢٠ - **غُثَايَات** \* (F). *Pogonophora* (E).

الغيايات فئة حيوانات بحرية دودية الشكل كثيرة القوس .



عُكَّة باهت



عُكَّة سَوِيَّة الْوَن



عُكَّة الْمَرْسُوط

زبانها مستطيان قصيران. جشيتها مستطيل المخنر. بطنها اسطواني الشكل || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرائشة في ايار. تسرح في القفار. تماثل بعد ظهورها بمدة وسيرة فراوح من بين الى اربعة ايام. تمتع المكان مباحداً على سوق الثبات وفرويه || قشرة تقوّل نحو ١٢ م. جسمها اسطواني الشكل، اسمر اللون يميلو تقطع اسود ورفشة صفراء. رأسها كسني اللون. رواجبها الصدرية شديدة البنية شديدة القصر عجمية الأطراف. تلتحف بطنها باغشية غروية للمادة تملأ شكل القرباب لتلتصق بها فئات الصالح والارواق والقشور و طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٢ يوم ينتهي ضمن قارب السرة. الذكر يترك القرباب ويطير اما الانثى للمرأة فلا تخرج القرباب الا عند التماثل ولا تدنو اليه.

#### ٢٠٢٢٩ - عُكَّة الْفَيَات \* Psychidae (S).

Psychidae (F). Psychidae (E). فصيلة حشرات فراشية من رتبة حشرقيات الاجنحة. انواعها المعروفة نحو ٤٠٠ منتشرة في معظم اصقاع العالم. تسرح في القفار. طيراتها خفيفة الحركة، كثير المرقعة والحرم || اجسامها صغيرة. قصيرة. ذكورها جنسية انثاها مدار. عضيها جرداء. قوتها الاستعمارية مشطية مزدوجة. ملابسها شديدة القصر. مرافعها اربعة. حلماتها خير موسمية. بطنها كثيفة الخمل. ورأسها صغيرة. مستديرة الاطراف، قليلة الحرافش البشرة، سوية الاالوان. جرماتها تامة النسو، غنايتها الخلفية ثالثة للنحس أو رواجبها || اساميرها عرواطة اما يلفظ بطنها اغشية خالدة تخرج منها فئات الصالح والارواق وكل ما يلتصق بها || عاداتها طليقة تتصور ضمن غلات السرة || اشهر اجناتها العبدانة والكنكثرة.

#### ٢٠٢٣٠ - عُكَّة الْمَرْسُوط \* Gadus mediterraneus (F). Gade mediterranean (E).

Mediterranean gudgeon (E). سمكة بحرية يعيش من فصيلة الغاديات ورتبة للمساومات. اصطنها معظم اقالم البحر الابيض المتوسط وبعض مناطق المحيط الاطلسي || تتميز من الاسماك البنية. لا تقترب من الشطوط والحداد الا في زمن التسرة. لحجتها الحيائي كرسومي. اسرناها وافرّة البدن || جسمها اعطليجي الشكل، مستدل التغطيل يطلو من ٢٢ الى ٢٧ م. حراشها صغيرة رقيقة. ثوبها الى الريدة الرصاصية الغضبية المواج تبق في الظهر وتنبير وتبيض في البطن. زعانفها الى اخضر البشري. خطها الجانبي جاسي الامتداد الاقني || رأسها مخروطي الشكل، ذلق الخمل. فكها الاعلى يعمل في مقدمه جديتان دقيقتان. والفك الاسفل يعمل ملية واحدة عينها كيرتتان بارزتان، ابريزانتان، زعنفتها الظهرية واحدة، مستطيلة، رقيقة المقدم || لها عيوط الصف، مأكول.

#### ٢٠٢٣١ - عُكَّة الْفَيَات \* Libératès (F). Libératès (E).

التيقة العلاء بسخاء وبسيرة.

#### ٢٠٢٣٢ - عُكَّة الْفَيَات \* Parthénogenèse (F).

Parthénogenèse (E). التيلة وكعى ولادة الطنارى، فسح تناسلي تقوم به بعض طنارى الخشرات والطنويات الدنيا في زمن قنوم من حياتها اذ ان يوفضاتها تتصور وتقتف كال و انما كانت

#### ٢٠٢٣١ - عُكَّة \* هو غشب القنمين، اعطيه.

#### ٢٠٢٣٢ - عُكَّة عُقْرِي \* هو حيد الانبياء، اعطيه.

#### ٢٠٢٣٣ - عُكَّة \* Scarus stellatus (S).

Scarus stellatus (F). سمكة بحرية من بنات مصفار يقال ان لها يولي في بعض فصول السنة وذلك عندما ترى زيمات المرجان. وهي من اسماك المتوسط والخليج.

#### ٢٠٢٣٤ - عُكَّة باهت \* Polypterus diluta, Asphalin diluta (S).

Asphalin diluta (F). Polypterus diluter (E). حشرة من فصيلة الشربقيات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها معظم الاقاليم المعتدلة الحارة من الفرق الاوسط والاولد واروبه. فراشها جارية قوتها رقيق الازهار. سرقتها تمش على اوراق الشبان || جسمها صغير قصيف يطول نحو ١٢ م. بطنها نحو ٢٣ م. رأسها اسمر. زبانها كيرتتان. زبانها غصيان مستطيلان. جشيتها وربطها الى الحطلة الخطية المواج || ورشها الاماميان الى الحطلة الحطية تملؤها جدتان مترسختان بينتان وخسة خطوط متبرجة حطية. ورشها الخلفيان الى الحطلة التبراء البيضاء المواج. اهدابها الى الصبهة || لها جيل واحد في الجيل. تظهر الفرائشة في آب. تسرح من القرب الى فسة الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو ستة اسابيع وتمتع المكان مباحداً تحت القشور اوبين شرق الماء || السرة تطول من ٢٤ الى ٢٧ م. جسمها شبه اسطواني الشكل مستطيل الرأس والسمة الصدرية الاول. ثوبها الى الحطلة السوداء يعلوها خط بني قاطع اسود وخسة خطوط جانبية، نخيلة، مشرقة، صفراء اللون. رأسها يبيض الشكل، كسني اللون، مدبسا ورواجبها الى السرة || طور الاكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع ينتهي ضمن صلبة تحميها السرة بين شرق الماء.

#### ٢٠٢٣٥ - عُكَّة \* Plute abundantia (F).

Abundant rain (E). النيث : المطر الجود الكثير.

#### ٢٠٢٣٦ - عُكَّة عُقْرِي \* Orbicula (F). Orbicular (E).

نمت ترميضي يطلق عل ما هو موسمي في جميع اقطار العالم.

#### ٢٠٢٣٧ - عُكَّة كافي \* هو ولد الفب وهو اكبر من الحسل.

#### ٢٠٢٣٨ - عُكَّة كَاكَّة سَوِيَّة الْوَن \* Psyche unicolor (S). Psyché unicolore (F).

Psyche unicolor (E). حشرة من فصيلة البديديات ورتبة حشرقيات الاجنحة. موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبية وافريقية الشمالية. فراشها عجيبة تمش على مخزوبها الامدائي. حرقها خاضعة قوتها اوراق النباتات البرية الحولية والحموية || ذكورها مجتمعة انثاها مدار. جسم الذكر صغير قصيف يطول نحو ٦ م. بسطه نحو ١٩ م. رأسه الى الخلفي الاسمر. عيناه صغيرتان. زبانه مستطيلان مزدوجتان. جشيته وبطنه الى الخلفي الاسمر المواج. وراشته حطية اللون، صمراء المواج || الانثى ممررة تقوّل نحو ٩ م. ثوبها الى الخلفي تملوه رفشة سوداء. رأسها صغير الجرم. عينها صغيرتان.

Glaucomyidae (S). ۲۰۲۴۷ - غَیْشَرِیَّات

Glaucomyidae (S). Glaucomyidae (E).

فصيلة حيوانات مائية بحرية ونهرية من الرغويات  
صفيحية الخياشيم. أنواعها المعروفة نحو ۲۰  
جنس واحد || أعطائها مصبات أنهر الخند والعين واليزيا.  
تمشي منتفخة في الأسماك والريال. أجسامها صغيرة.  
اصداقها ثلاثية المصاريع، شبه أحليلية الشكل، عابقة  
اللون التي يكثر فيها الأخضر المتفاوت الماهات ||  
جلسها الوحيدة يدهي القنير.

۲۰۲۴۸ - غَیْش، نَقْصُ الْقِيَمَةِ

Moins-value (F). Inferior value (E).

هو انخفاض قيمة الشيء بين زيتين.

Tare (F). Waste, Damage (E). ۲۰۲۴۹ - غَیْش

خسوف اللواجن من خيل وبقر وغيرها كثيرة أهمها ما  
يمتري قوائم الخيل وسببه تمدد الغشاء الآسي في المفاصل.  
وهي حل نوسين:

Tares molles (F). Soft wastas (E). ۲۰۲۵۰ - غَیْشُ الْخَوْشَبِ

تخصل من تمدد الغشاء الآسي في المفاصل، منها غيش  
الحشوب والمرقوب.

Tares dures (F). Harsh wastas (E). ۲۰۲۵۱ - غَیْشُ الرُّكْبَةِ

تزيادات أو انتقارات تعود لذات السبب، منها الجرد  
والنخس والرنن والمش.

Molette (F). ۲۰۲۵۲ - غَیْشُ الْمِرْقِ

Wind-gall (E).

انتفاخ رخو مفصل أو وتر يسه للاجهاد.

Vessigon du genou (F). ۲۰۲۵۳ - غَیْشُ الْعُرْقُوبِ

Vessignon of the knee (E).  
ورم رخو مفصل أو وتر يحصل في بعض أنحاء الركبة.

Vessigon du jarret (F). ۲۰۲۵۴ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Vessignon of the hough (E).  
ورم رخو مفصل أو وتر يحصل في بعض أنحاء المرقوب.

Eponge (F). Heel (E). ۲۰۲۵۵ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

هو انتفاخ رأس المرقق عند الخيل.

۲۰۲۵۶ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

غابة تكثر فيها الرطوبة أو جداول الماء.

۲۰۲۵۷ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

هو الخغل، الحلق، الحلق.

۲۰۲۵۸ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

الغيطلة: البقرة الوحشية. وقيل البقرة مطلقاً تسمى  
غيطلة في زمن العرب. ج غياطل.

Bande d'oiseaux (F). ۲۰۲۵۹ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Flight, Flock (E).  
الغيف جماعة الطير. والرف كذلك والسرب أيضاً.

۲۰۲۶۰ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Fourré (F). Thick (E).  
شكل من أشكال المراج.

۲۰۲۶۱ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Coléoptile (F). Coleoptile (E).  
خند زبارة بعض بلور الاعشاب.

مركبة || من هذه الحشرات واللويبات تخص بالذكر  
النورات والانيات وبراغث الماء والآبروت والصفيات.

۲۰۲۶۲ - غَیْشُ جَكَايَز

Illicite (F).  
Ma la yizze القاذون.

۲۰۲۶۳ - غَیْشُ شَرْعِي

Illegitime (F).  
Ma كانت حالته غير شرعية.

۲۰۲۶۴ - غَیْشُ قَابِلُ الْإِنْفَالِ

Main mortable (F). Mort main (E).  
هي حالة الاموال الموقوفة التي لا تباع ولا توهب ولا يمكن  
انتقالها الى الورثة.

۲۰۲۶۵ - غَیْشُ مَعْمُوك

Inconverti (F).  
Unconverted (E).

۲۰۲۶۶ - غَیْشُ مَسْكُوي الْأَوْرَاقِ، لَا مَسْكُوي

Anisophylle (F).  
Anisophyllous (E).

۲۰۲۶۷ - غَیْشُ مَسْكُوي الْبَتَلَاتِ، لَا مَسْكُوي

Anisopétale (F).  
Anisopetalous (E).

۲۰۲۶۸ - غَیْشُ مَسْكُوي الْأَجْزَاءِ، لَا مَسْكُوي

Anisomère (F).  
Anisomeric (E).

۲۰۲۶۹ - غَیْشُ مُسْتَقِيم

Anisométrique (F).  
Anisometric (E).

۲۰۲۷۰ - غَیْشُ خَدُود

Indéfini (F). Indefinite (E).

۲۰۲۷۱ - غَیْشُ مُسْتَقِيم، غَیْشُ وَاجِب

Indu (F). Undue (E).  
هو دفع مبلغ لا يقابله التزام بقده يحل قانون حق  
استرداده.

۲۰۲۷۲ - غَیْشُ مَقْدَر

Indéterminé (F).  
Indeterminato (E).

۲۰۲۷۳ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Indigeste (F). Undigested (E).

۲۰۲۷۴ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Abrassus globosus (S).  
Abrée sphérique (F).

حشرة مألوفة من سمات الاجنحة، دبوسيات القرون،  
خماسيات الاجزاء. موطنها يمتد من الشرق الاقصى الى  
اروبه || جسمها صغير القد، نصف كروي الشكل،  
جذوي اللون، اسفح المراج. قرونها الاستشعارية خاسية  
القصل، دبوسية الأطراف || قوتها كل ما استطاعت  
نقصه من اللويبات الصغيرة والديدان.

۲۰۲۷۵ - غَیْشُ مَنَهَكَم، طَلْع

Glaucomya (S).  
Glaucomye (F). Glaucomya (E).

غيش هو الاسم الحديث. جنس حيوانات مائية من  
الرغويات صفيحات الخياشيم لفصيلة الغيشريات. أنواعها  
المعروفة نحو ۲۰ موطنها اخوار الانهر الحديثة والصينية

والماليزية.. تعيش منتفخة في الأسماك. جميعها صغيرة  
القد، تافهة العوم للأماكولة.



غيشة

٢٠٢٦٧ - هَيْتَرْدِيَّة الشَّاي \*  
Guignardia theae (S). Brown blight (E).

فطر مجهرى يركب أوراق الشاي فينذبا ، مظهره الخاربي يقع حطية اللون يابسة المحور الاطسل . وهي سريعة الانتشار والاذى فدا او ساجتها التولمل الجوية || لم تكافح حتى الآن عيوقا على اوراق الشاي من المواد المعدية .



فينذيه الشاي

٢٠٢٦٨ - هَيْتَرْدِيَّة العَرِيش \*  
Guignardia baccae, Physalospora baccae, P. reniformis, Phoma flaccida, Ph. reniformis, Ph. Cookai, Macrophoma flaccida (S). Excoriosis de la vigne (F).

فطر مجهرى واسع الانتشار يركب الجلفة بالمتعدد . مظهره الخاربي يقع صغيرة ييشية الشكل حطية اللون تنتشر على قشور الجلفة وجل التنب قرب اذراكه قشيب احرار البشرة ثم ييسها || يكافح باستعمال اسد الفوطير النعالة مل روتين او ثلاث رشات قبل حصرمة التنب .



فينذيه العريش

٢٠٢٦٩ - هَيْتَرْدِيَّة يَدَوَلِي \* ، بلاك روت الكرمة ، عيكن اسود  
Guignardia bidwellii, Sphaeria bidwellii, Physalospora bidwellii, Laetitia bidwellii, Phoma uvicola, Phyllosticta labruscae, P. ampelopsidis, Naemospora ampeliscida (S). Black-rot de la vigne, Pourriture noire de la vigne (F). Black-rot of grapes (E).

فطر مجهرى يصيب اوراق الكرمة وناليدها فينذبا ويمعنها || مظهره الخاربي بقعة او يقع بجزوة اللون حطية اللعاج شبه مستديرة الشكل تملر تصل الاوراق السفل ثم تمتد الى ما عليها وتركب البعائيه قرب حصرمتها قشيبها وتلونها || تتكاثر في ظروف طيمية معينة تمضها العويلمل الجوية للملانة || تكافح مثل اليليدير باستعمال ذات للفوطير .



فينذيه بدولي

٢٠٢٧٠ - هَيْتَب هَر العظيم ، ذكر التمام .  
Cnemidophorus (S). \* هَيْتَبُون \*  
Cnemidophorus (F). Cnemidophorus (E).

جنس حيوانات زحافة من الطاء وفضيلة التبيديات . اقوامه المعروفة قليلة العدد اصلاها بعض مناطق الجنوب الشرقي من امريكا الشمالية || تألف البراري والقميان . تتميز بسرعة الحركة والانتقال . قوتها الحشرات والديدان الطواجا وسيدة الالوان السوية . تكثر فيها الربة السمره والسمره .



هيون

Tortue (mâle) (F).

Turtle (male) (E).

التيلم : ذكر السلاحف ويدعى الايس واليلم ، ويقال لهاها اللابل .

٢٠٢٦٢ - هَيْتَم ، هَيْتَاب \*  
Nuage (F). Cloud (E).

التم او السحاب بخار ماء علا في الجو وتكاثف . ويكون عادة نتيجة التيارات الهوائية الصاعدة من الارض الى طبقات السكاك . وتعتبر اليوم من عوامل المانع الهامة لانها مصدر الامطار والثلوج وسبب الفسح والتغاضى الحارة || واليوم عديدة الاشكال ولكل منها اسم يميز خاص يدل على نوعها ويتوسط ارتفاعها القتريني من سطح الارض . امرؤها واشهرها ما يلي :

Nimbus

Cumulo-nimbus

Stratus

Cirro-stratus

Cumulus

Cirrus

Cirro-cumulus

Nuage artificiel (F).

Artificial cloud (E).

دخان كثيف يحصل من حرق بعض المواد المعدنية وغيرها يستعمل لمنع جله الريح عن بعض البناكات ، اعصها الاشجار المثمرة .

٢٠٢٦٤ - هَيْتَمَه \*  
النباه : الشجرة الخضراء الورق اللطفة الاخصان .

Fourré de bois (F). Wooded (E).

الربة هي الاجبة .

٢٠٢٦٦ - هَيْتَرْدِيَّة \*  
Guignardia (S).

جنس فطور مجهرية من السخاميات وفضيلة العشويات تتميز باصاها البسيطة المستديرة التي تفرز في نسج النبات المنار . نكاتها مديمة النكات ، بوضها شفاف وحيد الخلية || انواعه الاقتصادية الزراعية ثلاثة وهي .



prunier, Tordeuse verte du prunier (F).  
Argyroplaca pruniana (E).

حشرة مؤذية من فصيلة الفانلات حرشيات الاجنحة .  
موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا . فراشتها عجيقة .  
سرقها خاضعة تركب اوراق الخوخ والزيتون وفتلتها  
وتعيش عليها || جسمها صغير القند بطول من ٦ الى ٧ سم .  
يسقطها تراوح من ١٢ الى ١٤ م . رأسها مستدق الجرم  
اسمر اللون . عينها زيتان صغيرتان . زبابها خيطيان .  
ملابسها قصيرة . مرشها جذعة . جوشنها ويطنها الى  
الكهبة السراء المواجه || روشنها الاماميان الى الدبرة  
يملؤها تبييض وتوشم اسمر . روشنها الخلفيان الى الريدة  
السراء . احداها فحبة || الاثنى امير قدأ من الذكر  
واغلف بطناً منه واطول روشناً || لها جيل واحد في الحول .  
تسرح من الدروب الى فحمة الجبل ومن القجر الى الشرق ||  
الاثنى تلقي المكن ميحادي على الصفحات العليا من نصال  
الاوراق . الطور البري ينشر نحو عشرة اسابيع ويتقضي  
على اوراق الاشجار التي تقتلها السرعة وتعيش من غصنها  
وعلاياها . والسرقة عند بلوغها الادراك تطول نحو ١٦ م .  
جسمها مستدق المقدم والمؤخر ، اخضر اللون ، زيتي  
المزاج . يملو ثلاثة صفوف قاذبة من التلويح السمر المتحركة  
هللج دقيق || رأسها ودونها الصدرية الى السرة القاذبة .  
وراجها الى الخفسار الاضلح || طور الاكمال الذي  
يستمر نحو ٣٨ اسبوعاً يتقضي ضمن صلبة تنسجها  
السرقة بين شقوق السواء او تحت القشور الصلبة .

٢٠٢٧٧ - قاذبة الدراقين الشرقيّة \*  
Laspeyresia molesta, Cydia molesta (S). Tordeuse orientale du pacher (F). Oriental fruit-moth (E). Pfirsichtriebböhrer (D).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند ، بسطها تراوح  
من ١٢ الى ١٤ م . روشنها الاماميان الى الكهبة يملوها

Tortricidae (S). ٢٠٢٧٢ - قاذبات ٥  
Tortricidae (F). Tortricidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة حرشيات الاجنحة . اجناسها  
وانواعها تمتد نحو ١٥٠٠ جميعها صغيرة القند . رواشتها  
حمرية ، قاذبة الزوايا الخارجية . قرونها الاستشعارية عجيقة  
الشكل . اضلاعها ظاهرة . حوتيتها بارزة . اقواسها  
متراكبة الالوان المزركشة || يرقاتها قاذبة قاذبة تقضم  
البراعم والاوراق والافانان وتقرض السوق والتار والجروب .

٢٠٢٧٣ - قاذبة اليبس \*  
Evetria hercyniana (S). Tordeuse de l'épicéa (F).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند مخططه اللون  
بسطها تراوح بين ١٠ و ١٢ م . رواشتها مهدبة الختار ،  
غراء اللون ، مضيئة بالاسمر || يرقاتها دقيقة الجسم ،  
مستطبة اللون ، تركب بتاتق اليبس تتقضي عليها بده  
ان تغلفها بجيريتها الحمرية .

٢٠٢٧٤ - قاذبة الاجار الحرجية \*  
Cacaecia podana (S). Tordeuse des arbres forestiers (F).

حشرة من الفانلات . فراشتها صغيرة القند مستطبة الغروب.  
رواشها مضيئة بالاسمر || يرقاتها تركب غصن الاجار  
الحرجية وقد لا تنف من بعض الاجار المشرقة فتقتل  
الاوراق وتقتسلها وتقرض البراعم والافانان النامية .

٢٠٢٧٥ - قاذبة اجناتكن  
Tordeuse des vergers (F).

فراشة صغيرة تدعى بيروية ملوثة ، اطها .  
٢٠٢٧٦ - قاذبة الخوخ الحضرية \*  
Argyroplaca pruniana (S). Argyroplaca du



قاذلة الاجار الحرجية



قاذلة الخوخ الحضري



قاذلة الدراق الشرقية





فأثلة السرو



فأثلة السنايل



فأثلة السندبان



فأثلة العنب



فأثلة القزفل



فأثلة الكزرة (البقرة)



فأثلة الورد



فأثلة الورديات



فأثلة خضرار

تركب نواحي القزفل فثقلها وتقضمها وقد لا تنف من الورد والليلاب وغيرها .

٢٠٢٨٣ - فأثلة الكزرة \* ، *Sparganothis pilleriana*, *Tortrix pilleriana*, *Aenoph-thira pilleriana*, *Aenactra pilleriana* (S). Tordeuse de la vigne, *Pyrale de la vigne* (F). *Sparganothis pilleriana* (E). Springwurm, Springwurmwickler, Laubwurm (D).

حشرة من الفأثلات . فراثتها حطية اللون سواد الرأس . يسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثتها الإاميان إلى الصفرة تلوها زرققة حراء . وراثتها الخلفيان إلى الصعبة للذهي الملاج || وراثتها سيد الرووس ، خضر الظهور ، صفر الجوانب المقلقة بالايض مدبا اغبر اللون . ارجلها سمر || تركب يرانم الكزرة واورثها تفتل البرام وتقتل الاوراق وتقضمها . وقد تركب بعض النباتات الاخرى كالمران والقدار والصبوح والثيلك . لكنها لا تؤذي ايامها الكزرة .

٢٠٢٨٤ - فأثلة الورد \* ، *Tortrix bergmanniana* (S). Tordeuse du rosier (F). Bergmann moth (E).

حشرة من الفأثلات . فراثتها حطية اللون ، يسطها تراوح بين ١٢ و ١٥ م . وراثتها إلى الحارة يعلوا جميع اصفر || وراثتها خضرار اللون تركب الورد فثقل الاوراق وتقضمها مع العروق وتقضم البرام والنواحي .

٢٠٢٨٥ - فأثلة الورديات \* ، *Cacaecia rosana* (S). Tordeuse des rosacées, T. du poirier et du pommier (F). Rose twist moth (E). Heckenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراثتها سمر الجسم يسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثتها حطية اللون ، الامامية سها بجلة بثلاثة خطوط حر مفرقة || وراثتها إلى السرة الخضرار الملاج . وهي تقتل اوراق حطى اشجار القسيلة الوردية اعصها افتتاح والاباس والسفرجل والمغوخ والمشمش والورد ، لتقصط بشرة الاوراق وتغلاها وقد تفكك بالبرام وبالنار اللينة .

٢٠٢٨٦ - فأثلة خضرار \* ، *Argyroprocle variegans*, *Olethreutes variegans* (S). Tordeuse verte des arbres fruitiers (F). Bud moth (E). Grauer Knapenwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراثتها حطية اللون . يسطها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثتها الاميان إلى الصعبة البنية بالازرق . وراثتها الخلفيان إلى الريدة . اطرافها مهدية فضية || وراثتها خضرار اللون تركب الاشجار الشجرة اعصها تتلف فثقل الاوراق اللينة وتقضي عليها .

٢٠٢٨٧ - فأثلة \* ، *Hemerocallis* (S). *Hémérocalce* (F). Yellow day-lily (E). Heile Taglilie (D). Giglio dorato, Bellezza di un giorno (I).

جفت نباتات شتية جلمورية مسمرة من فصيلة الزنبقيات . اوراقها قرصية الانتساب ، ثنائية السط ، متعابلة . لصلها شقيق الصفحة مستطيلة || انوارها حالية كبيرة القد تركب على سرائر قوي نشيط || انيلها حطية جميعا زينة سريوية ترعب في الازرة الممتدة الانساج الخزيرة المادة البدالية || اشهرها ما يتبع .

تبيع ايض . وراثتها الخلفيان إلى الريدة || لها جيلان في السنة . وراثتها صغيرة نحيلة تركب النواحي وتؤذي على الشكل التالي : ينصر ضرر يقات الجبل الاول يقرض ولان الافان الثانية . اما القصر الناعم من رقات الجبل الثاني فينصر يقرض النار ويطها .

٢٠٢٨٨ - فأثلة السرو \* ، *Evetria buoliana* (S). Tordeuse des pousset du sapin (F). European pine shoot moth (E). Kiefertriebwickler (D).

حشرة من الفأثلات فراثتها صغيرة القد يسطها تراوح بين ١٧ و ٢٠ م . وراثتها إلى الحرة اللبقة تراوح بين بالفضي ، اهداب اطرافها الخارجية كثيفة التجميع فواد اللون . وراثتها مستتقة ، نحيلة ، بنية الثوب تقرض نباتي السرو والصنوبر تمش في داخلها فتسبب تحجيبها وقد تقهوها إلى اليابس .

٢٠٢٩٩ - فأثلة السنايل \* ، *Cnephias pyrophagana* (S). Tordeuse des épis (F). حشرة من الفأثلات . فراثتها صغيرة القد حطية الثوب . وراثتها إلى الصفرة يعلوا توضع اصفر || وراثتها خضرار اللون مسدقة ، تظل نحو ١٠ م . تركب سنايل القمح وتقتل على البر .

٢٠٢٨٠ - فأثلة السندبان \* ، *Tortrix viridana* (S). Tordeuse du chêne (F). Carnation tortrix (E). Grüner Eichenwickler (D).

حشرة من الفأثلات يسطها فراثتها تراوح بين ١٥ و ٢٥ م . وراثتها الاميان إلى الخضرار القاتع الاصفر الملاج وراثتها الخلفيان إلى الشبة البنداء || وراثتها تركب البرام ثم الاوراق فثقلها وتلتهمها . يكثر وجوها من سزبان إلى آب عبل السندبان والشرم والتبولا والحور الجرجار .

٢٠٢٨١ - فأثلة العنب \* ، *Clycia ambiguella*, *Cochylis ambiguella* (S). Cochylys de la vigne, Taïgne de la grappe, Ver coquin (F). Grappe berry moths (E). Traubenwickler, Gosseswurm, Henwurm, Saurenwurm (D).

حشرة من الفأثلات يسطها فراثتها تراوح بين ١٤ و ١٦ م . وراثتها مهدية الخار . لون الامامية سها إلى الريدة يعلوا ملوح اصفر ويجمع اسود . اما الخلفية فالى الريدة قسدية الملاج || وراثتها دقيقة ، تنف حطية اللون ثم تكلن بعد كل انسلخ إلى ان تستقر على الاحمر الساكن || لها جيلان في السنة تركب في جيلها الاول اثمار الكزرة قبل تايورها ويده . وتركب في جيلها الثاني حبوب العنب في تخلف اثمارها فتفرضها وتطها .

٢٠٢٨٢ - فأثلة القزفل \* ، *Tortrix prunabana*, *Cacaecia prunabana* (S). Tordeuse de l'aillet (F). Pink twist moth (E).

حشرة من الفأثلات يسطها فراثتها تراوح بين ١٥ و ٢٠ م . وراثتها خضرار اللون مهدية الخار الخارجي . وراثتها الاميان جمعا بالاسمر || مكها اللون شديد السمان تحمض الاثني لطح مستطيلة على القصر والاوراق فينف من رقات دقيقة نحيلة نوحا إلى الخضرة الاسمر .

Phacel. ٢٠٢٩٧ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ

الفَاوَرَةُ أو فَاوَرَةُ الْحَمَامَةِ نَجْمٌ فَاوَرٌ مَزْجُوجٌ مِنْ كَوَكِبَةِ الْحَمَامَةِ .

٢٠٢٩٨ - فَاوَرَةُ شَرِيفِيَّةٍ

Zenaidinae orientalis (S). Mélopée orientale (F).  
طَائِرٌ مِنَ الْفَاوَرَاتِ جَمِيلُ الشَّكْلِ حَسَنُ الْمَنْجَمِ وَالصَّوْتِ  
كَثِيْبَةٌ سَتُ الرُّوْمِ وَبَا كَرِيْمٌ . مَوْطَنُهُ الْمَغْنَبُ وَالْمَرْكَبُ وَبُورِيَّةُ  
وَالْأَنْصَابُ . طَوْلُهُ نَحْوُ ٢٣ سَمٌ . ثَوْبُهُ مَتْرَاكِبُ الْأَلْوَانِ  
فِيهِ الْأَصْفَرُ وَالْأَسَدُ وَهُوَ مَطْرُوقُ الْمَغْنَبِ ۥ قُوَّتُهُ الْحَبِيْبُ عَلَى  
اِسْتِثْنَائِهَا . يَنْشُئُ فِي الْأَدْعَالِ الْقَلِيْلَةَ الْارْتِفَاعِ اِنْتَاهُ تَبْيِضُ  
بَيْضَتَيْنِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فِي السَّنَةِ .

٢٠٢٩٩ - فَاوَرَةُ

ثَبِتَ طَيْبُ الرِّيحِ . قَالَ ابْنُ حَنْبَلٍ : هُوَ الْمَرْوُ الْعَرَبِيُّ  
الْوَرَقُ . وَقِيلَ : هُوَ الَّذِي خَرَجَتْ لَهُ جَانِحَتَانِ وَسَطُهُ كَانَهُ  
أَذْنَابُ الثَّعَالِبِ عَلَيْهِمَا نُورٌ أَحْمَرُ طَيْبُ الرِّيحِ . وَقِيلَ هُوَ  
رِيْحَانُ الشَّيْخِ ج . فَاوَرَةُ .

Potier (F). Potter (E).

٢٠٣٠٠ - فَاوَرَةُ

هُوَ مِنْ سَنِ الثَّلَاثِينَ وَعَمَلُهُ فَخَّارٌ .

Chamois (F).

٢٠٣٠١ - قَادِرٌ

هُوَ الْبَشَوُجُ جُ قَادِرٌ . وَقِيلَ الْقَادِرُ مِنَ الْوَسِيلِ الَّذِي قَدْ  
أَسْنَى وَهُوَ بِمِثْلَةِ الْقَارِحِ مِنَ الْخَيْلِ وَالْبَازِلِ مِنَ الْأَيْلِ وَالْبَقَرِ  
وَالْغَنَمِ .

٢٠٣٠٢ - قَادِمٌ هُوَ الشَّاقِلُ ج . فَوَادِمٌ .

Niveau (F). Level (E).

٢٠٣٠٣ - قَادِنٌ

هُوَ الرِّهْلَةُ أَيْ مِيزَانُ اِسْتِمَاءٍ .

Aulacode (F).

٢٠٣٠٤ - قَارِ الْبُيُوصِ

هُوَ الْقَبِيحُ ، أَطْلَبُ .

Golunda (F).

٢٠٣٠٥ - قَارِ الْبَيْتِ

هُوَ الْقَلْبَةُ ، أَطْلَبُ .

Puteis féclide (F).

٢٠٣٠٦ - قَارِ الْخَيْلِ

يَعْرِفُ بِأَبْنِ عَرَسٍ مَشْنُ ، أَطْلَبُ .

Ichneumon

٢٠٣٠٧ - قَارِ الْفِرْعَوْنِ

هُوَ النَّمْلُ الْمَصْرِيُّ ، أَطْلَبُ .

٢٠٣٠٨ - قَارِكَةُ ، قَارِكَةُ الْبَيْتِ

Mus musculus (S). Souris commune, S. domestique,  
S. ordinaire (F). House mouse (E). Hausmaus (D).  
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرُ الْقَدِّ . مَوْطَنُهُ الْعَالَمُ . ضَرْبُهُ عَدِيدَةٌ  
يُوجَدُ مِنْهَا فِي الصَّيْنِ وَبَعْضُهَا نَحْوُ ٣٠ ضَرْبًا ۥ جَسَدُهَا  
وَشِقِيُّهَا يَطْوِيْنَ مِنْ ٨ إِلَى ١٠ سَمٍ . وَذَنُّهَا كَثَلُكَ . ثَوْبُهَا  
الْمُشَاعِلُ إِلَى الرِّفْدَةِ الرِّصَاصِيَّةِ يَطْوِيْهَا مَوَاجٍ أَصْفَرٍ . ظَهْرُهَا  
أَحْمَرٌ مِنْ بَطْنِهَا الَّذِي يَمِيلُ إِلَى الصَّفَرِ . أَذْنَاهَا كَبِيرَتَانِ .  
حَرَافَتُهَا ذَنْبُهَا ثَلَاثُ ١٨٠ وَاطِلَاةُ الْاَنْثَى ١٠ ۥ تَأَلَّفَ  
الْبُيُوتُ وَتَتَنَبَّهُ عَلَى جَمِيعِ الْمَأْكَلِ وَالْحَبِيْبِ .

٢٠٣٠٩ - قَارِكَةُ أَرَبَةٍ ، سَقَطِيْمٌ

Mus arianus (S). Souris arienne (F). Arian mouse (E).  
نَوْعٌ مِنَ الْجُرَذِ صَغِيرَةُ الْقَدِّ مَوْطَنُهَا آسِيَةُ الْوَسْطَى حَتَّى الْعِرَاقِ .  
نُوجُهَا إِلَى الصَّهْبَةِ السَّمَرَاءِ يَطْوِيْهَا إِلَى الْبَيْضِ الْاَفْهَرِ . طَوْلُهَا

٢٠٢٨٨ - فَاوَرَةُ بُرْتَقَالِيَّةٍ

Hemerocallis aurantica (S). Hémerocallis orange (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنْ ٣٠ إِلَى ٥٠ سَمٍ . وَتَعْرِشُ  
مِنْ ١٢ إِلَى ١٦ سَمٍ . نَظْمُهَا أَخْضَرُ الْوَيْدِ عَلَى صَفْحَتَيْهِ .  
شُرَافُهَا الْزَهْرِيُّ يَطْوِيْ مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ  
نَحْوُ ٧ سَمٍ . وَبُيُوتُهَا الْوَيْدُ حَادَّةُ الْبَرْقِ ۥ أَزْهَارُهَا  
يَسْتَمِرُّ مِنْ عَمُودِ إِلَى الْبَلَوِ .

Hemerocallis flava (S). فَاوَرَةُ صَفْرَاءُ

Hémérocalle jaune, La jaune (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنْ ٤٠ إِلَى ٦٠ سَمٍ . وَتَعْرِشُ  
مِنْ ١٥ إِلَى ٢٠ سَمٍ . نَظْمُهَا جَمِيلُ الْخَضِرِ الزَّاهِي ۥ شُرَافُهَا  
يَطْوِيْ مِنْ ٦٠ إِلَى ١٠٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ مِنْ ٧ إِلَى ١٠  
سَمٍ . وَبُيُوتُهَا الصَّفَرُ الْكَبِيرِيُّ ، قُوَّةُهَا الْبَرْقُ الْمُسْتَمَبِ .  
أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ سَازِرَانِ إِلَى تَمُوزَ .

Hemerocallis fulva (S). فَاوَرَةُ صَبْغِيَّةٍ

Hémérocalle fulve (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا طَوِيلٌ مِنْ ٦٠ إِلَى ٨٠ سَمٍ . وَتَعْرِشُ  
نَحْوُ ٢٠ سَمٍ . نَظْمُهَا يَجْرِي الصَّفَرُ السَّالِقُ ، أَخْضَرُ الدُّنْيَا .  
شُرَافُهَا يَطْوِيْ مِنْ ١٠٠ إِلَى ١٢٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا طَوِيلٌ نَحْوُ  
١٠ سَمٍ . وَبُيُوتُهَا الصَّفَرُ الْوَيْدُ ، صَنِائِيَةُ الْمَوَاجِ ، حَادَّةُ  
الْبَرْقِ . أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ تَمُوزَ إِلَى آبِ .

٢٠٢٩١ - فَاوَرَةُ سَبِيلِيَّةٍ

Hemerocallis graminea, H. minor (S). Hémerocallis  
graminée (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفَاوَرَةِ أَوْ رَقَاتِهَا صَفِيَّةُ الشَّكْلِ طَوِيلٌ مِنْ ٣٥ إِلَى  
٥٠ سَمٍ . وَتَعْرِشُ مِنْ ٥ إِلَى ٨ سَمٍ . نَظْمُهَا إِلَى الْخَضِرِ  
الْبَاهِتِ ۥ شُرَافُهَا يَطْوِيْ مِنْ ٤٠ إِلَى ٥٠ سَمٍ . أَزْهَارُهَا  
طَوِيلٌ مِنْ ٦ إِلَى ١١ سَمٍ . وَبُيُوتُهَا الْوَيْدُ قُوَّةُهَا الْبَرْقِ  
السَّالِقُ ۥ أَزْهَارُهَا يَسْتَمِرُّ مِنْ أَبَرِ إِلَى حَزْرَتَانِ .

٢٠٢٩٢ - فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ ، فَاوَرَةُ

Facture (F). Invoice (E).  
الْفَاوَرَةُ أَوْ الْبَيَانُ بِالْأَلْمَانِ عِي رَقِيَّةٌ حَصَانِيَّةٌ مَسْرُودَةٌ  
فِيهَا بِالْمُفَصَّلِ بَيَانُ الْمِجْمَعَاتِ أَوْ خُطْبَةُ الْاَشْيَاءِ مَعَ اِتْمَانِهَا .

٢٠٢٩٣ - فَاوَرَةُ

الْفَاوَرَةُ الْحَامِلُ أَوْ الْفَاوَرَةُ الْحَامِلُ السَّيْنَةِ .

٢٠٢٩٤ - فَاوَرَةُ

Phelus (S). Phelo (F).  
جَنَسٌ ثَلَاثَاتُ مَعْرَةٍ مِنْ صَفِيَّةِ السَّحَابِيَّاتِ . اِنْثَاهُ الْمَعْرُوقَةُ  
قَلِيْلَةٌ ، مَعْدَا اِلْتِمَادُ بِلِيْزِيَا . سَقَطِيْمٌ سَرْعَةً مُتَصَبِّحَةٌ حَادَّةُ  
الْبَرْقِ ، تَطْوِيْ مِنْ ٨٠ إِلَى ١٢٠ سَمٍ . تَقْبِيْهَا بِالْمَرْوَةِ حَقْدِيَّةُ  
الْتَبْصِيْعِ . أَزْهَارُهَا كَبِيرَةٌ الْقَدِّ طَوِيلًا رَافِعٌ بَيْنَ ١٢ وَ  
١٥ سَمٍ . يَطْوِيْهَا بَيْضُ الصَّفَرِ الْخَارِجِيَّةِ حَرَّ الْبَاغِيَّةِ  
الَّتِي يَطْوِيْهَا زَاوِيْقٌ مُخْتَلِفَةُ الْأَلْوَانِ رَافِعٌ مِنَ الْاَفْهَرِ إِلَى  
الْأَصْفَرِ وَالْخَضِرِ . أَوْ رَقَاتِهَا فَاوَرَةٌ جَلِيَّةُ الْاِسْتِثْبَاتِ طَوِيلٌ  
مِنْ ٦٠ إِلَى ٩٠ سَمٍ .

٢٠٢٩٥ - فَاجِيْنٌ

Fagine (F). Fagine (E).  
مَادَّةٌ حَقِيْقَةٌ تَخْرُجُ بِالْمَطْبَعِ مِنْ ثَمَارِ شَجَرِ الزَّيْتَانِ .

٢٠٢٩٦ - فَاجِيْنَةُ

هِيَ الْمَجْتَبِاسَةُ ، أَطْلَبُ .



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ



فَاوَرَةُ أَرَبَةٍ



فأرة الاذغال



قاسيات البطيخ



قاسيات البوصير



قاسيات الشيلم



قاسيات القطن



قاسيات الملقوف

٢٠٣٢٢ - **قاس** Hache (F), Azn (E).  
أداة حادة لتصل يقطع بها القنصل والأشجار والحطب.

٢٠٣٢٤ - **قاس** Hédyasore (F).  
هو الأينوسارون ، اطليه .

٢٠٣٢٥ - **قاسخ ، قبطيل ، منق** Résolutoire (F).  
Cancelling, Abrogating (E).

٢٠٣٢٦ - **قاسرى** Bryone (F).  
هي القاشراء ، اطلبها .

٢٠٣٢٧ - **قاسى** Sécuriforme (F), Securiform (E).  
تمت تعريفى لوصف به الاشياء التي تشبه القاسى .

٢٠٣٢٨ - **قاسيكه ، قاسيه** Pentatome, Punaise (F), Bug (E).  
جلس حشرات من فصيلة القاسيات. انزاعه حديدية تتميز بأجسامها المثلثة بإحدة حديدية كرجية الزاحية . ألوانها مزرقرة وبزرقة . أرباعها لثائية الشكل . قرونها الاستشعارية لحسية القنصل ، جميعها مقلية تنصص حصاره التباتات التي تركبها || أعرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٠٣٢٩ - **قاسيات البطيخ** \*  
Aspongopus viduus alger (S), Punaise du pastèque (F).  
حشرة من القاسيات جسمها متوسط القند مقلط الشكل يعطون نحو ١٦ م . ويعرض نحو ٦ فواجا الى القرقة السراء المولج . قوامها المهادا الى الجولة || تركب اوراق ونواحي البطيخ وسائر النباتات القرصية باقار .

٢٠٣٣٠ - **قاسيات البوصير** \*  
Carpocoris verbescei (S), Punaise des molènes (F).  
حشرة من القاسيات طولها يراوح بين ١٢ و ١٤ م . فواجا الى الحرة الجلولية تعلوها الزغارف والزراراكس السود . أرباعها سود الفاصل حمر القفان || أعضائها فسيحة الاربعاء تركب البوصير وسائر نباتات الفصيلة الخنازيرية وبعض التباتات الصناعية ومنها تتبع الذي تنصص حصاره الطرفه الثانية وأوراقه القنية .

٢٠٣٣١ - **قاسيات الشيلم** \*  
Aelia scuminata (S), Punaise du seigle (F).  
حشرة من القاسيات صغيرة القند مقلطه الجسم طولها يراوح من ٨ الى ٩ م . ويعرضها م . فواجا حلي القرن الحقل المولج . ظهرها ثلاثي الخطوط القاطية الصفراء اللون . تركب الشيلم وبعض التباتات البرية .

٢٠٣٣٢ - **قاسيات القطن** \*  
Nezara viridula (S), Nézara verte, Punaise du coton (F).  
حشرة من القاسيات جسمها مقلط الشكل الأخضر اللون يعطون من ١٢ الى ١٦ م . ويعرض نحو ٩ م || أعضائها فسيحة الاربعاء تشمل جميع الابداء افارة والمثدلة || تركب القطن والبقول وبعض التباتات الصناعية كالنخ . تنصص حصاره النواحي والأوراق القنية .

٢٠٣٣٣ - **قاسيات الملقوف** \*  
Eurydema oleracea, Pentatoma oleracea (S), Pentatome du chou, Punaise du chou (F).  
حشرة من القاسيات صغيرة القند مقلطه الجسم طولها يراوح

نحو ١٠ سم . وذئبا ١٤ || تعيش في الحقل وقرب البيوت . قتها جميع المواد العضوية والنباتية .

٢٠٣٣٠ - **قارة الأذغال** \*  
Mus agrarius (S).  
Souris agriore (F), Agrarius mouse (E).  
نوع من الجرذ صغيرة القند موطنها الشرق الأوسط وأروبة. نوبها الى الصهبة الصناعية . تبع ظهرها اسود . بطنها وغوايا جريزها بيض . طولها نحو ١١ سم . وذئبا ٩ سم . اذناها مستدلتان. حارشت ذئبا تبلغ ١٢٠ ، أطباعها الاثني ٨ || تعيش بجماعات كثيرة العدد . تألف الاذغال وجرانها الحقل المزدودة . قتها الحبوب اعصها الحقة ثم لساقل والجذور والبصل والحشرات والديدان .

٢٠٣٣١ - **قارة البحر** Rat de mer (F).  
هو الراسون ، اطلبه .

٢٠٣٣٢ - **قارة الخرج** Mulot (F).  
هي الدئمة ، اطلبها .

٢٠٣٣٣ - **قارة الحصاد** Souris des moissons (F).  
هي الزبالة ، اطلبها .

٢٠٣٣٤ - **قارة المتحركة** Souris du désert (F).  
هي النصاص ، اطلبها .

٢٠٣٣٥ - **قارة القبط** في حكر الحقل ، اطلبه .

٢٠٣٣٦ - **قارة نحمة** Spalax  
هي الخلد ، اطلبه .

٢٠٣٣٧ - **قارو**  
هو الثور يجر كل شيء متفرد . والشجرة القارة هي المحتبة من ثيرها .

٢٠٣٣٨ - **قاروش** Agé (F), Agé (E).  
هو السنن من الجوران . كترك « أنها بقرة لا قاروش ولا بكر » أي لا سنة ولا قنية .

٢٠٣٣٩ - **قاروطان** القاروطان كركبان متباينان امام سرور نبات نعل .

٢٠٣٤٠ - **قاروط ، عبط** Gaele (F).  
مصا طويلة تستعمل لنقل ثمار الشجرة .

٢٠٣٤١ - **قارويات** Muridae (S).  
Muridae (F), Muridae (E).

فصيلة حيوانات لوبة قارضة من مرتبة قرقدنيات الثورب ورتبة القوام . اجناسها ٨٦ وأنواعها ٧٢٠ لما عمارتها فتلوات الجرديات والقناديات والفكريات . جميعها حيوانات صغيرة القند ، مدينة الزلقوم ، مستطيلة الذنب || موطنها العالم . تسرح في الليل . تركض على الارض ، تعوم في الماء وتنقل الاشجار . قتها ما استطاعت اليه ميلا من غطف المواد النباتية والعضوية الحيوانية . قنارها لا يقويه غصبي . انثاها تقف في الامم الوليد من ٢ الى خمس موات .

٢٠٣٤٢ - **قارو** نمل اسود فيه حرة .

٢٠٣٤٠ - **فَاشَرَا اَلرِّيْفِيَّةُ** (F). *Bryone africana*  
هي الخلدوس ، اطليه .

٢٠٣٤١ - **فَاشَرَا بَيْتَضَاءُ**، كَرْمَةٌ بَيْتَضَاءُ، حَاتِقُ الشَّعْرِ  
*Bryonia alba* (S).

*Bryone blanche*, *à monique* (F). *White bryony* (E). *Gemeine Zauurbe* (D). *Brionia blanca*, *Fescera* (I).  
نوع من الفاشرا المباشرة تكثر في الاسراج النضلة والمواقع الرطبة . ثمارها عنية بيضاء اللون . جذاميرها غليظة مستطيلة تستعمل في الطب يستخرج منها عصارة حارقة ، منهجة ، مهيجة ومغلفة . وهي سهل شديدة الفعل يستعمل في حالات الاستسقاء والصرع وفي المنص الناتج عن الديد وفي الحشيات الصفراوية . وقد قال فيه ابن البيطار ، انه يحرق الشعر من الجليد واما ثمره المتقوي فلدغ الجليد .

٢٠٣٤٢ - **فَاشَرَا حَبَشِيَّةُ** (F). *Bryonia abyssinica* (S). *Bryone d'Abyssinie* (F).  
نوع من الفاشرا موطنه الحبشة وهو نبات زراعي شائع الاستعمال . اوراقه كبيرة الحجم متشعبة . انماها خضراء اللون . ثماره عنية حامدة للنفخ . جلوره دوفضية الشكل ، جامدة اللب ، تؤكل بعد نقعها بالماء الساخن وتغيره مرتين او ثلاث مرات .

٢٠٣٤٣ - **فَاشَرَا اسْوَدَاءُ** ، هَنْتَبُ الحَبَشَةِ ، غَبِيظَةُ  
*Bryonia dioica* (S). *Bryone dioique*, *Vigne noire*, *Naveit du diable* (F). *White wild vine*, *Common bryony*, *Snake bryony* (E). *Rote Zauurbe* (D). *Barbone*, *Kaps del diavolo*, *R. di serpente* (I).  
نوع من الفاشرا انثالي المسكن يكثر قرب السياجات وفي المواقع الرطبة انحصا البرية || ثماره عنية بيضاء اللون غنية بالمادة الفعالة المرّة || جلوره غليظة مستطيلة المنحرف الطيبة انحصا ما لها صلة بالصدر كرات الجلب وما يليه .

٢٠٣٤٤ - **فَاشَرَا هِنْدِيَّةُ** (S). *Bryonia grandiflora* (S). *Bryone à grandes fleurs* (F).  
نوع من الفاشرا موطنه الهند . وهو نبات حولي زراعي . يعل . اوراقه كبيرة القذ مأكولة تستعمل استعمال الاسبانخ . اثماره جميلة الشكل حمراء اللون . جلوره دوفضية فزرية المادة الفشرية .

٢٠٣٤٥ - **فَاشَرَشِينُ** ، شَفِيْدَاكْرُ ، هَزَاكُ جَشَّانِ  
*Tamus* (S). *Tamier*, *Bryone douce*, *Racine vierge* (F). *Black bryony*, *Ladle's seal*, *Mandrake* (E). *Echte Scherwurz*, *Schwarzswurzel* (D). *Tameroo*, *Radice vergine*, *Brionia nera*, *Cerasiola*, *Vite nera* (I).  
جنس نباتات عشبية طيبة معمرة من فصيلة الدوديئوريات . انواعها قليلة العدد موطنها عارضة غرام تملون من ١٠٠ الى ٤٠٠ سم . اوراقها ثلجية الشكل منبهة الزام الاسير . ثمارها خضراء اللون . ثمارها حضية الشكل لائقة . جلورها سزائية غليظة سواء اللون . خصائصها الطبية كخصائص الفاشرا الا انها اصعب منها قليلا . اما الازراق فتشفي قروح الحيوان ويشادها ينفع التواء المسب .

٢٠٣٤٦ - **فَاشَرَشِينُ اَكْرِيتِي** (S). *Tamus cretica* (S). *Tamier de Crète* (F).  
نوع من الفاشرشين ، موطنه جزر البحر المتوسط ، يكثر في جزيرة اكرت || اوراقه ثلاثية التخصيم ، مستعمرته النضين الجابنيين ، مستطيلة الفص الوسطي . ناصلا لامة

بين ٦ و ٧ م . ثوبها اخضر اللون كثير الزواكش الحمر في الاثان والبيض في الاكرو || تركب معظم القبول انحصا الملفوف وقد لا تنف من الكرمية .

٢٠٣٤٧ - **فَاسِيَاءُ المَلْفُوفِ الحَمْرَاءُ** \*  
*Eurymorus ornatus*, *Pentastoma ornatus* (S). *Punaise rouge du chou*, *Eurydème ornée* (F).  
حشرة من الفاسياء صغيرة القذ مبطلة الجسم طولها يراوح بين ٨ و ١٠ م . ثوبها تركيب التوازيق والزواكش الحمر والوسد . انهما مستعرض الشكل ، احمر اللون ، احمر المختار ، جوشها الى الحشرة تملو عثر نقط سود . تركب الملفوف واقت لا تنف من البطاطا .

٢٠٣٤٨ - **فَاسِيَاءُ زَمْرَدِيَّةُ** \*  
*Palomena prasina* (S). *Palomane verte* (F).  
حشرة من الفاسياء طولها يراوح ١٢ م . وعرضها ٧ م . ثوبها الى انضمار الزمردية تملو عثرة سطحية خفيفة وستار خري يراوح عرضه بين ١ و ٢ م || اطليها تشل جميع البلاد الحارة الجافة . تركب معظم انواع الاشجار باستثناء الصنوبريات . وتركب التبغ وغيره من نباتات الصناعية كالخروع والكتان .

٢٠٣٤٩ - **فَاسِيَاكِيَاتُ**  
هي فصيلة خاسيات القبول ، اطليها .

٢٠٣٥٠ - **فَاسِيَاءُ العَلَبِ** \*  
*Pentastoma rufipes* (S). *Punaise des bois* (F).  
حشرة مثلية من فصيلة الفاسياليات . جسمها مفلطح ، عيني الشكل بطول نحو ١٤ م . ثوبها احمر اللون ، كثيف التيجير الاسمر . بطها احمر مجذع بالاسود ، وهو خاصي التسلق عثر الذريرة ، سابعه عثر الاش . رأسها غروطي . عليها مستطيل المك . ميناها صفراء ماصتات . زياتها سطلان ، اسمران ، كوسها قليل العرض ، مقرن الجابنيين . حشيتها حمراء الطرف . ظهورها حشلي اللون ، احمر الخنجر . قشراتها شفافة . قواشها الى الحشرة القرمزية الباحة || تركب اوراق الاشجار الحرجية باستثناء الصنوبريات || رانحتها كرمية .

٢٠٣٥١ - **فَاشُ** \*  
*Dermanyssus* (S). *Dermanyssa* (F).  
جنس قردان من فصيلة النشليات انواعها عديدة جميعها حمراء ، صغيرة القذ ، يعضية الشكل ، مبطلة ، طولها نحو مليون واحد . اثارها الى الرتبة ، ظهورها مزركشة بالاسمر والجوي . تركب الخبز والخفافيش ولا تنف من الانسان .

٢٠٣٥٢ - **فَاشَرَا** ، **فَاشَرَا** ، **فَاشَرَا** ، **فَاشَرَا** ، **فَاشَرَا** \*  
*Bryonia* (S). *Bryone* (F). *Bryony* (E).  
جنس نباتات عشبية حولية من فصيلة القرصيات . انواعها المروقة ١٢ جميعها طيبة منها الماددة والمباشرة . اوراقها متطابقة كبيرة القذ . نصلها مفروض الصفحة ، انزب البشرة ، كرمية القزامة . انماها الى البيضاء الاثير . ثمارها نورية ، صغيرة القذ ، صفراء اللون او حمراء او سوداء . جلورها نشوية التركيب ، جامدورية او دوفضية الشكل . اما ثمارها فيقارب بموتها نشا الحبوب وقد يستعمل استعمال وذلك بعد استزاف ما فيه من خواص مرة مسهلة في نصلها واستغناها بولسة الماء . بزورها زيقية ، زبها اصفر اللون . يصنع الصناعة || اشهر انواعها الفاشرا البيضاء والسوداء والحبشية والهندية .



فَاسِيَاءُ المَلْفُوفِ الحَمْرَاءِ



فَاسِيَاءُ زَمْرَدِيَّةُ



فَاشُ



فَاشَرَا سَوْدَاءُ

جالة رضية ، بزوها صغرة || انزمارها يشتر طوال شهر آب .

### ٢٠٣٥٥ - فاصولياء ليمّا

*Phaseolus lunatus* (S). Haricot de Lima (F).  
نوع من الفاصوليا الزراعية المصرة . بزوها كثيرة العدد .  
سوقها حارشة طولها من ١٥٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها كبيرة  
القد وورقتها اعطليجية ، مستطيلة الزايم الاخير الذروب  
المذهب . انزمارها صغرة الحصى ، يفضاء اللون ، خضرها  
المواج . عناقيدها الزهرية صغرة . سفاتها منجلية الشكل  
تطول من ٣ الى ٥ سم . بزوها كلوية ياروح طولها من  
١٥ الى ٢٥ سم .



فاشرشين مبدول

### ٢٠٣٥٦ - فاصولياء معروفة

*Phaseolus vulgaris* (S). Haricot commun (F). French beans, Kidney beans (E). Gartenbohne, Bohnen (D). Fagiolo, Fagiolino (I).  
هي الفاصوليا الزراعية الفلانية المشهورة . بزوها  
المعروفة نحو ٥٠٠ . جميعها شامة الاستعمال منتشرة في معظم  
اصقاع العالم || سوقها متباينة القد مختلفة الاشكال تلو  
من ٣٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضيه متعممة النصل  
المذهب القصصه || انزمارها ليلكية او يفضاء اللون ، عناقيدها  
كثيرة . سفاتها لاصلية الشكل تلوها من ١٠ الى ٣٠ سم ،  
بزوها مختلفة الاشكال والاصجام ، خبة بالمواد الفلانية ،  
زكيتها الوعلي يشعل :



فاصولياء امريكية

١٧،٤٥ ٪ من المواد الاوتية .

١٥،٣٩ ٪ من المواد البعنية .

٩،٦٩ ٪ من هيدرات الكربون .

اما متوسط ما تشكله القرون الحضر المفعة الطبخ فهو

١٨،٥ ٪ من المواد الاوتية .

٥،٢٠ ٪ من المواد البعنية .

١٤،١٧ ٪ من المواد الاستخلاصية .

### ٢٠٣٥٧ - فاصولياء مبدولة

في البنية ، اطلبها .



فاصولياء

### ٢٠٣٥٨ - فاصولياء

*Phaseolus* (F).  
بجارة من فصيلة القرنيات اجناسها وانواعها عديدة معظمها  
من نباتات المناطق الحارة والمعتدلة شهريا فاصوليا .

### ٢٠٣٥٨١ - فاصول ، فاصول ، قش

Excedent de compte (F). Excess account (E).

### ٢٠٣٥٩ - فاصول

Surdent (F). Irregular tooth, Wolf's tooth, (in horses) (E).

سن زائلة .

### ٢٠٣٦٠ - فاصول

Anemophile (F).  
Anemophilous (E).

نمت ترميني يعلق على كل نبات تثر الرياح طلع ازهاره .

### ٢٠٣٦١ - فاصول

Fongicide, Anticryptogamique (F). Fungicide, Anticryptogamic (E).

اسم شامل يطلق على جميع المواد والسوائل المركبة للحصنة  
في مكافحة الفطور الفطرية .



فاصولياء معروفة

### ٢٠٣٦٢ - قاطوس

قال الجاسط والقاطوس مكة عطية تكسر البطن واللاصون  
يعرفونها فينتظون غرق الحيفس ويلقونها على السفينة فانها  
تهرب ، وقال القزويني هذا هو صوت الحيفس .

شديدة الخضار || انزماره صغرة الحجم فستقية اللون .  
ثمارة حصية القد وبشكل لونها الى الاحمر الوردي تملوه  
ماجة صفراء . جلده سحالي ، غروي ، اسود اللون ،  
جانبه الاياب يتصل بجميع الحاصلات الطيبة المائدة الى  
الفاشرشين المبدول .

### ٢٠٣٦٢ - فاشرشين مبدول ، انبلس مكليسا

بالميمون ، بين ميمون

*Tamus communis* (S). Tamier commun, Taminier, Tame, Tamne, Herbe aux femmes battues, Sceau de Notre-Dame (F).

نوع من الفاشرشين موطنه حوض البحر المتوسط . ساقه  
غبراء تطول نحو ٣٠٠ سم . اوراقه ملينة وبيضة لؤلؤ وهي  
قلبية الشكل مدببة الطرف . نصلها خاسي او سباعي  
البرق مالى البصرة الخضراء الازم . ثمارة حصية القد ،  
حمراء اللون . جلده حزائي الشكل ، اسود اللون ، جامد  
الهاب ، يستعمل استعمال الفاشر .

### ٢٠٣٦٨ - فاصول

*Synchrone* (F). Synchronous (E).

نمت ترميني يطلق على التواتر التزامني زينا وقاسا .

### ٢٠٣٦٩ - فاصول

*Clôture* (F). Enclosure (E).  
هو كل ما يفصل ارضين متلاصقتين . لذلك قد يكون  
حائطا او سياجا او خندقا ، الخ .

### ٢٠٣٧٠ - فاصول ، صلاصية

*Mérithalle, Entre-nœud* (F). Internode (E).

هي الجزء من الساق النباتية الكائن بين عقدتين متتاليتين .

### ٢٠٣٧١ - فاصول ، فاصول

كل جزء من الأجزاء المتشابهة المتتالية في العضو المركب .

### ٢٠٣٧٢ - فاصولياء ، فاصولياء ، فاصولياء ، حبش

*Phaseolus* (S). Haricot (F). Kidney-bean (E).

جنس نباتات زراعية حرلية او معمرة من فصيلة القرنيات  
القرشاية . انواعها المعروفة نحو ٦٠ اصنافها فسيمة الارباع  
تشمل جميع المناطق الحارة والمعتدلة . معظمها غذائي يزود  
لبن ثماره لقرنية الخضراء او لاستثمار حبوبه الجافة .  
وبعضها زراعي يزرع لجأ زهره او لكثرة وكثافة غفرته  
وسرع نمو || سوقها ملينة ، حارشة . اوراقها معتقة ،  
مركبة ، ثلاثية الورقيات . ازهارها عقيدية . ثمارها  
قرنية . بزوها مستطيلة الشكل ، ثنائية الفلق ، عديدة  
الالوان || اشهر انواعها ما يتبع .

### ٢٠٣٧٣ - فاصولياء إسبانية

*Phaseolus multiflorus* (S). Haricot-fleur, H. d'Espagne (F). Scarlet runner (E).

نوع من الفاصوليا البهرية الزهرية المصرة . ساقها  
حارشة تطول من ٣ الى ٤ أمتار . اوراقها شديدة الخضار .  
عناقيدها الزهرية كثيرة العدد والازهار . الزوايا مختلفة  
تختلف مع القسور منها الابيض والبنائي والابيض والبنائي والبنائي  
الاقوان || انزمارها يشتر من حزيران الى ايلول .

### ٢٠٣٧٤ - فاصولياء حزنوية

*Phaseolus caracalla* (S). Haricot caracalla, H. limaçon (F).

نوع من الفاصوليا البهرية الزهرية المصرة . ساقها  
حارشة تطول نحو اربعة اذراع . اوراقها كبيرة . وورقتها  
فستقية اللون . انزمارها عطرية الرائحة ، سحزوية الشكل ،  
ليلكية اللون الاصفر المواج . عناقيدها بحاسة . سفاتها



٢٠٣٨٩ - **فَالِدَة حَقَّة** (F). Intérêt de droit.

Vested Interest (E). هي التي تحسب اما على اساس القانون او على ما اتفق عليه المتعاقدون.

٢٠٣٩٠ - **فَالِدَة خَاصَّة** (F). Advantage particulier.

Particular advantage (E). هي هي عقد الشركة عناية أحد الشركاء دون الآخرين بنسبه حقوق اوفر من حقوقهم. وقد لا يكون ذلك الا بموافقة الجمعية التأسيسية.

٢٠٣٩١ - **فَالِدَة رِبَوِيَّة** (F). Intérêt usuraire.

Usurious interest (E). هي التي تتجاوز الحد الذي عينه القانون لسر الفائدة.

٢٠٣٩٢ - **فَالِدَة غَيْر مُبَاشَرَة** (F). Advantage indirect.

Indirect advantage (E). هي التبرع بطريقة غير مباشرة. او اخفاء حصة وراء عقد معاوضة. او الاراء من دين. او التنازل عن حق الانتفاع. الخ.

٢٠٣٩٣ - **فَالِدَة قَانُونِيَّة** (F). Intérêt légal.

Lawful interest (E). هي التي يحدد القانون سعرها اذا ما فات للمتعاقدون تعيينه في العقد.

٢٠٣٩٤ - **فَالِدَة قَضَائِيَّة** (F). Intérêt judiciaire.

Judiciary interest (E). هي التي تسري منذ اعلان صحيفة الدعوى او اقرار دعي.

٢٠٣٩٥ - **فَالِدَة مُعَدَّة** (F). Intérêt Rise.

Set Interest (E). هي الفائدة الواجب تسديدها حتى لو لم تحقق الشركة اي ربح.

٢٠٣٩٦ - **فَالِدَة مُرَكَّبَة** (F). Intérêt composé.

Compound interest (E). هي التي تحسب على مبلغ اصلي مضاعفا اليه فوائد مراكمة.

٢٠٣٩٧ - **فَالِدَة مُتَعَدِّدَة** (F). Intérêt échel.

Due interest (E). هي التي اجل دفعها يتقابلها غير المتسقة.

٢٠٣٩٨ - **فَالِي** (F). Axis (E).

الفالق هو قطب دورة القُرس المحورية وهو الفقرة الثانية من السمت تأتي بعد الفقرة وهي اول فقرة تلي الرأس. ويختلف الفالق عن غيره من الفقرات المتبقية ببنونه المتعدي للواضح.

٢٠٣٩٩ - **فَابِيَانَه** (F). Fabiana (E).

جنية معمرة، ابيدة، واثنية، اترجة من فصيلة الباذنجانيات. معقودة التبريد على اسم الحاكم ولبانياته. ساقها صلبة تفلو من متر الى مترين. اوراقها لائقة، بيضيه الشكل، متصبية كالغرايش. ازهارها عذرية الاوتكاز، يضاء اللون، قطرها نحو ٤ سم. طولها نحو ٣ سم. تنموها يستمر من ايار الى محرم.

سرقها تعيش على اوراق الستيان || جسمها كبير لينة يطول من ٢٤ الى ٢٦ سم. يسطها تراوح من ٦٠ الى ٦٤ سم. رأسها اصفر صفاني المواج. حينها كيرتان. زباناها مشطيان مزويجان عند الذكر، عيطيان عند الانثى. مرفشها مكد الطول. جوشها وبطنها الى الصفرة الخنطية المواج || روشناها الامانيات الى الزينة البنياء تملوها خطوط متزينة بنية وبقعة طرفية صفراء. روشناها السليمان الى البياض الماجي تملوه مابة تينية. تزنيها حنطلي. اهدابها تينية || لها جلولان في الخول. تظهر فراشة الجبل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجبل الثاني في تموز. تسرح في الليل، تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتحتسح المكان ليلتها على الصفحات الغفل من نصال الاوراق || السرعة تطول من ٥٢ الى ٥٥ سم. جسمها شبه اسطواني الشكل، كثيف الحلب، مستطيل البطن، مدبب الثرج. ثوبها الى الصفار الجليل يطول عند ثلاثي السكم خطوط سود وبقعة حراء وتقط ييش. رأسها كسفي اللون يطول عند اصفر قطب ينطق عند الاثنيان. منها الى الصفرة السمراء. رواجها سود. هليها كبريتي || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما يتفشي غسن صلبة، تحبكها السرعة في شقوق الماء او تحت القشور.

٢٠٣٨١ - **فَامِنِي** (F). Famenian (E).

نسبة الى منطقة فامن البلجيكية. تمت تعريفها يطلق في الجيولوجية على السات الاعبر اي الاصل من الاراضي الديفونية المائلة الى الحنية الثالثة من الاباج التقدم. جميع متحجرات هذا السات من ضفديات الارجل وفضلة الكجاليات.

٢٠٣٨٢ - **فَانِيَّو** (F). Fongivore (E).

نمت تعريفها يطلق على كل حشرة او دودية تعيش على للفظور.

٢٠٣٨٣ - **فَانِيْد** (F). Pénide (E).

نوع من سكر اثبات كان يستخرج في الماضي من القرموس وقد بطل استخراجه الآن.

٢٠٣٨٤ - **فَانِيَّوَة** (F). Sambucée (E).

نمت تعريفها يطلق على النباتات التابعة الى فصيلة القويبات او القرية التي منها || وهو سبط من فصيلة القويبات يشغل بعض الاجناس والاناوع.

٢٠٣٨٥ - **فَانِيَّوَة** (F). قسم من الارض بين مرتفعين ج. فوائج.

٢٠٣٨٦ - **فَالِدَة، مُرَكَّبَة** (F). Intérêt (E).

الفائدة هي المرء اي ربح الاموال المقرضة.

٢٠٣٨٧ - **فَالِدَة اِتِّصَافِيَّة** (F). Conventional interest (E).

هي الفائدة المشعورة صريحا في عقد الاقراض على ان لا تزيد على ما يحدده القانون.

٢٠٣٨٨ - **فَالِدَة بَسِيْطَة** (F). Simple interest (E).

هي التي تسري على اصل الدين فقط وتقابلها الفائدة المركبة.





فيسر مع التسع ويستقر في فصل الاوراق || مظهره الخارجي ارتقاء في التسل يفتح شوب في الخشب ثم زوال اللون الاخضر من اطراف التسل واستبداله بالاحمر البنفسجي الذي يتحول فيما بعد نحو الاصفر الغليبي وينتهي بالبلون والبياس .



فَسَّة

٢٠٤٣٤ - **فَتِيخِيَّات (F).**  
 عبارة تطور مجهرية من فصيلة الفتيخيات . تشمل عدة اجناس اهمها اصنافاً الاربعة التالية : السهاد ، الشبكة ، الفتيخة ، والفتينة .

٢٠٤٣٥ - **فَتِيخِيَّات (S).**  
 Ampullariidae (F). Ampullariidae (E).

فصيلة من الرخويات مفويات الاربيل امانيات الخياطين المشطية . اجناسها وانواعها متوسطة العدد اصنافها اثير البلاد الحارة وجنوبها وينامبيا وانغصبا افريقية || اصنافها متجانسة الاشكال والاحجام ، منها افرونية والكروية والمستديرة والمبطنة || اعرف انواعها واشهرها الفتيخة .



فَتِيخَة

٢٠٤٣٦ - **فَسَّة**  
 لفث نبات يختبئ حبه ويؤكل في الجذب وتكون خبثته غليظة || قليل هو المبيد || قليل هو شجر ينبت في السهول والاكام وله حطب كالمشمس .

٢٠٤٣٧ - **فَتَاغِيَّة (S).**  
 Helogale (F). Helogale (E).

حيوان لاحس مفترس من فصيلة الزبديات . موطنه بعض مناطق السودان والحليقة . يكثر وجوده قرب بحيرة نيل . ملجئه الحليقي جاحي ، جاحته تعد من ٣ الى ٦ ازواج || جسمه صغير القد ، بطول نحو ٤٠ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ١٥ سم . رأسه مخروطي الشكل ، ذائق الحليم . عيناه واذاؤه صغيرتان ، مستديرتان . سباله كثيف الحلب الطويل . قوائمه قصيرة خامة الاصابع . ثوبه الى الزبدية السوداء || يعيش في اوسيار يحضرها في التربة . قوة الافاعي والجربان والقرآن والمالجم .



فَتَاغِيَّة شَاخَا

٢٠٤٣٨ - **فَتَاغَاة (F).**  
 Cleistogamie (E).

الفاتاة حالة كل نبات لا تنفتح اكام ازهاره بل تتصلب الى اجربة منفصلة تظم السليل واللحقة .

٢٠٤٣٩ - **فَقَرْجِيل (S).**  
 Fothergilla (F). Fothergilla (E).

جنس شجيرات برية وتزيينية من فصيلة المشتركات . سيقانها منتصبية تملو من متر الى ستة امتار . اوراقها عابدة ، متناقبة ، بسيطة ، كاملة ، ملتوية الاطراف . ازهارها سنبل التجميع ، طرفي الارتكاز || انواعها المعروفة قليلة العدد ، اشهرها التالية :

٢٠٤٤٠ - **فَقَرْجِيل مُلَانِي**  
 Fothergilla involucrata (S). Fothergilla à involucra (F).

نوع من الفقرجيل . موطنه يمتد من الممت الى ايران . ساقه شائعة ترتفع نحو ستة امتار . اوراقه الحليجية التصل طول من ١٢ الى ١٨ سم . وتقرض من ٥ الى ٨ سم . ازهاره سنبل التجميع . ازهاره وريسية ، كثيرة الاعدية

٢٠٤٤١ - **فَسَّة \* ياسمين هندي**

Plumeria (S). Frangipanter (F). Frangipant, Pogodorium, Temple-tree (E). Jaminzunge (D). Frangipana, Plumeria (I).

جنس اشجار وشجيرات برية وزراعية تزيينية من فصيلة الفتيقات . مهدا البلاد الحارة . انواعها نحو ٤٠ مظهرها بري وبعضها تزييني . سيقانها حشة الخشب . اوراقها متناقبة متفنة . نصلها اعلمليجي الشكل ، جامد المنصف ، عابق الخضار . ازهارها كبيرة القد ، حيلة الشكل منتصب ، معقودية التجميع ، تاجية الارتكاز ، صطرية الرائحة ، متعددة الالوان ازهارها من الالبيس البلق الى الاحمر القرمزي عصارها سامة يذلل انها تقضي على الثمل .

٢٠٤٤٢ - **فُتُوح (S).**  
 Griffes (F). Claws, Clutches (E).

في الخالب ومنهم من قال برأى الاسم .

٢٠٤٤٨ - **فَتِيخَة**  
 في الابراروتوم ، نبات تزييني ، اطله .

٢٠٤٤٩ - **فَتِيخَة (S).**  
 Ampullaria (F). Ampullaria (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مفويات الاربيل واصلية الفتيخيات . انواعها المعروفة قليلة العدد نحو ١٢ اصنافها اثير وجنوبها البلاد الحارة || اصنافها متجانسة الاشكال والاحجام منها الكبيرة والكثيرة ومنها الصغيرة جميعها بطينة غليظة متبرقة الفوهات ، دقيقة الاضباب .

٢٠٤٤٠ - **فَتِيخَة (S).**  
 Verticillium (S). Verticillium (E).

جنس ططور مجهرية من الفتيخيات واصلية البوليات . جرابه الكندي جالس القاعدة ، منتصب القوام ، لاقباسي الشكل . كنانته قائمة ، قاصدية ، عديدة للفروع الهدية للفتاسية الارتكاز || انواعها المؤذية قليلة ، اهمها ما يلي :

٢٠٤٤١ - **فَتِيخَة الرُتُقَال (S).**  
 Verticillium heterochadum (S).

نظر مجهرى ركب ثمار الرتقال الناضجة على الشجرة والخرطوف في اماكن رطبة يفسدونها ويغلبها || مظهرها خارجي بقعة رصاصية اللون تركيب القشرة عند غام اللزعة فضفاضا . بد ان تقضي على جيوب الكحول والادمان الاثيرية .

٢٠٤٤٢ - **فَتِيخَة الثُوت (S).**  
 Verticillium mori (S). Feu volant (F).

نظر مجهرى ركب الثوت في جميع اصفائه من الجنود الى الاوراق . شبيهه سيال شبيه الميوعة يسير في الاوعية ويتغلغل على التسع الحليوية فيطغيا || مظهره الخارجي ذبول فجائي يحل بالاوراق والقوامي فيلويها ويسبب يباسها .

٢٠٤٤٣ - **فَتِيخَة شَاخَا (S).**  
 Verticillium albo-atrum (S). Verticilliosis, Maladie laune (F). Potato wilt (E). Welkekrankheit der Kartoffel (D).

نظر مجهرى عديم الانتشار يسبب عدة نباتات مختلفة



فَتَاغَة

وتدية غليظة مأكولة إنما يزرع خاصة من أجل خربلاته البغلة المأكولة التي تجنى كالقوياء الخضراء قبل دخولها في طور الإزهار.

### ٢٠٤٥٣ - شجل برّي \* ، شجيرة

Raphanus raphanistrum (S). Radis sauvage, Ravanelle (F). Wild radish, White charlock (E). Hedrich Retsch, Wilder Retsch (D). Rafano ravanistro, Rafano salvatico (I).

نوع من القليل البري الملبول ينبت في جميع الأربطة والأماكن وهو، إذا كثر في الزروع والخفول، ويكثر من النباتات الضارة الواجب إزالتها، وهو أيضاً من النباتات المرحوة التي تنتشر أثاره.

### ٢٠٤٥٤ - شجل حار ، شجل أسود

Raphanus niger (S). Radis noir, Rave noire (F). Black radish (E). Schwarzer Retsch (D). Rafanistro negro (I).

نوع من القليل شروبه عديدة بعضها زراعي شائع الاستعمال جالوره غليظة مستطيلة حرة الطعم قشورها أل الجلوة البنفسجية السوداء. وهي مفيدة لآفة الحفر || زيت بزوره يتحل بمحلول زيت القليل نفسه.

### ٢٠٤٥٥ - شجل زراعي \*

Raphanus sativus (S). Radis cultivé (F). Common cultivated radish (E). Garten Retsch, Rettig, Radies (D). Rafano, Ramolaccio, Ravanello (I).

نوع من القليل شروبه كثيرة العدد. جميعها مأكولة الجذور المختلفة الأشكال والأحجام والألوان. وهو من النباتات السريعة النمو، بعض شروبه تدرك بعدة ثلاثة أسابيع من بزرها || يرغب في الأربطة العادية، للذئبة، القليلة الانتاج || وهو مشهور بمقاومة التآفة. جلوره وإزهاره تقوي المعدة وتدر البول وتطش لبن المرصعات وتزيد قدره. زيت بزوره يدهي تخمجة وهو ينفع من حصوات المرارة.

### ٢٠٤٥٦ - شجل ياباني \* ، ديكون

Raphanus acanthiformis, R. macropoda (S). Daikons (F). Daikons (E).

نوع من القليل الزراعي المأكول. مهد اليابان. شروبه كثيرة العدد مختلفة الأشكال والأحجام والألوان. تكثر فيها الاستطالة. جلوره بعض شروبه تطول من ٥٠ إلى ١٠٠ سم. وزونها يراوح بين ٤ و ١٥ كيلو.

### ٢٠٤٥٧ - فيجوا \* ، فيجوا

Feijoa (S).

Fejoe (F). Feijoa (E).

شجيرة معمرة من فصيلة الآسيات. مهدها بعض مناطق البرازيل. ساقها غراء فاتح، ترتفع من ٣ إلى ٦ أمتار. أزهارها أبيض، صغيرة القد، أشبه الشكل، لامة الصفحات العليا، باحة السفلى. أزهارها محورية الإزهار فردية. فصلها وبذلتها وأسدتها حراء اللون. ثمارها عنية بيضية الشكل، فسنتية اللون، حامية الب، مأكولة. نكهتها قريب الشبه بالشليك (الفريز) || تنموها صفي،

Vacule

### ٢٠٤٥٨ - فجوة

النزعة في الورقة أي البروتوبلازم.

### ٢٠٤٥٩ - شجيرة الشط \* ، بيئاس الشط ، رشاد البحر

Bunias cakilis (S).

Bunlade cakilis, Roquettes de mer (F). Common sea

ناشئة، نحو ١٥، تطوقها خمس أو ست قنابات احليجية الشكل، باحة الخضراء.

### ٢٠٤٤١ - قنجيل مفتي الورق \*

Fochargilla alnifolia (S).

Fochargille à feuilles d'aune (F).

نوع من القنجيل. منه بعض مناطق أمريكا الشمالية. ساقه ترتفع من متر إلى مترين. أوراقه قريبة الشبه بأوراق اللث تطول من ٤ إلى ٨ سم. وتعرض من ٢ إلى ٥ سم. تصالها كثيفة الزغب على الصفحات العليا، خلية الصفحات السفلى. ساقها الأزهرية تطول نحو ٣ سم. أزهارها يضاء اللون، عطرية البرق، سرعة لا طوق لها.

### ٢٠٤٤٢ - قنيدة \*

Cleistogame (F).

Cleistogamous (E).

نمت شمر في يطلق على الزهرة التي بدلاً من أن يفتح كما للانصبا، يتحول إلى جراب أبيض ملق يضم الملقح والملقحة أميناً للانصبا.

### ٢٠٤٤٣ - قنح

Gorge (F).

النح هو حق كاس الزهرة ج. فنجاب.

### ٢٠٤٤٤ - قنح

النح من الثمار، ما لم يفتح. الثمار كلها فيه من حين قطعها حتى نضجها.

### ٢٠٤٤٥ - قنح

Mutation

كل تبدل نمطي يحصل في الانتقال الوراثي لصفات نوع أو ضرب من النبات.

### ٢٠٤٤٦ - قنجر قطبي

Aurore boréale, A. australe (F). Polar light (E).

### ٢٠٤٤٧ - قنجر

Noix (F). Walnut (E).

القنجر: الجوز الذي يؤكل.

### ٢٠٤٤٨ - قنجل

Raphanus (S).

Radis (F). Radish (E).

جنس نباتات عشبية من الهضبات وضلعة الصليبيات أنواعه المروفة ستة منها المناطق المعتدلة. منها البرية والزراعية والحولية والحرولة. جلورها غليظة عديدة الأشكال. ساقها مستقيمة غراء. أزهارها متعاقبة مستطيلة حسنة الحافة. السفلية منها مشبهة التفريص والتشريح. أزهارها صفدية للتجميع منها أو تاجية الإزهار، صفدية القد، يضاء اللون أو صفراء أو بنفسجية. ثمارها خربيات مستطيلة منقطة. بزورها كروية || أشهر أنواعها ما يتبع.

### ٢٠٤٤٩ - شجل أسود

هو القليل الحار، الحلي.

### ٢٠٤٥٠ - شجل الجمل

هو السبابة، الحلي.

### ٢٠٤٥١ - شجل الليل

هو الحلي، الحلي.

### ٢٠٤٥٢ - شجل الحنط \* ، شجل جوكاء ، صفري \*

Raphanus caudatus (S). Radis serpent, Mougri (F).

Snake radish, Mougri (E).

نوع من القليل الزراعي البيضي مهد جابا والهند. أقاليمه يعد من شامل البرس حتى ارتفاع ٥٠٠٠ م || جلوره



قنجيل مفتي الورق



قنجل الحنط



قنجل بري



قنجل زراعي



قنجل ياباني



قنجلة الشط

Charbon de bois (F).  
Charcoal (E).

الفحم النباتي أو فحم الخشب هو الخشب المحروق بمعدل من الهواء . ثم ذلك بالشجرة .



فحمية مرجانية

Erwinia ardisae

وصم بكتيري شديد الانحسار يلحق فروعيه عسقلية ،  
الطبا .

Sphacelotheca

جنس تطور مجهرية طفيلية من فصيلة الراعيويات تتميز  
بجلو حبيها المائل من الأورقات البارزة || أنواعه عديدة  
جميعها مؤذية تسبب التيجليات اشهرها ما يليق .



فحمية الدخن

٢٠٤٧٤ - فحمية الدخن

Sphacelotheca holci-sorghii, S. reiliana, Ustilago holci-sorghii, U. reiliana, Sorosporium reilianum (S).  
فطر مجهرى يصيب ازهار اللوز والقمح على اختلاف  
انواعها || مظهره الخارجي كتل خيطية بيضية تنش  
التشكل من زراعاته دون ان تقرب من الاغذية  
الزهرية . صفة البيوي سريع الانقراض . يربطه من اللون ،  
كروية الشكل ، خشكة البشرة ، قطرها يراوح بين ٨ و  
١٢ مم . || يكالغ مكافئة فحمية اللوز .

٢٠٤٧٥ - فحمية الذرة

Sphacelotheca sorghii, Ustilago sorghii, Sporisorium sorghii (S). Charbon couvert du sorgho (F). Covered smut of sorghum (E).

فطر طفيل مجهرى يصيب الحنظل والشكل فيزيائيا ويطلب  
الازهار وينشأ من المعد || مظهره الخارجي ينثر بويضة  
لونها الى القلوة ، يبيض القاعدة ، حنطية القمة ، لساء  
البشرة تنطلق من غيرات كروية لونها الى السرة القائمة .  
يكالغ بتغير البذار بمسوحة كربونات النحاس او  
ملفات النحاس .



فحمية الذرة

٢٠٤٧٦ - فحمية الزهر

Sphacelotheca cruenta, Ustilago cruenta (S).  
فطر مجهرى يصيب الزهر فيقيض عليه . ينشأ أولاً بصفته  
البيوي الكوكبي الشكل السريع الانقراض . ثانياً بفرويه  
الفحمية المستطيلة التي تتركب جميع اغشية الزهر من زراعات  
وراثات وسمايل المتكون . ثالثاً بأورقاته المتعددة القائمة  
على سن البويضات بعد تحويلها الى بؤر بويضة || وهو  
من الاوصاف المتعددة الانتشار كثره اذاها لانها تتطلب  
العديد من العوامل البيئية المواتية || يكالغ مكافئة فحمية  
الذرة .

Symptôme (F).  
Symptom (E).

ج فوئمن وأعراض .

٢٠٤٧٨ - فحمية

في الشفران الاسود ، وصم فطرى يصيب الكروية .

٢٠٤٧٩ - فحج

فحج الانسى : صوباً من فيها وكثيش الانسى صوباً  
من جلدها .

rocket (E). Echter Meersalz (D). Baccheroni,  
Ravazzello marittimo (I).

نوع من البلياس وهي عشية برية حولية يقال انها طيبة  
منها ربال الشطوط البحرية والبرية . جنوباً حجازية  
وتدية . سوقها وفروعها زباد . اورقاتها خلية البشرة . ازهارها  
صغيرة القد ، يبيض اللون . وهي عشية مرعوية متوسطة  
المادة الغذائية تنشط الدر .

Spadice (F). Spadix (E).

هو ذكر النخل خاصة ينبغ به حولها . ج . فصاحيل .

Symptomatologie (F).

Symptomatology (E).  
الشفاعة علم يبحث في امراض الامراض .

Test

٢٠٤٧٢ - فحص

Analysa du sol (F).

٢٠٤٧٣ - فحص التربة  
راجع تحليل التربة .

Fossette (F). Small cavity (E).

٢٠٤٧٤ - فحمية  
الفحمية نفرة صغيرة تكون في بعض الحبوب والبذور .  
والثقرة الموجودة عند رباط الاصداف البحرية من فوات  
المصارعين تسمى ايضاً فحمية . ج . فساس .

٢٠٤٧٥ - فحمية مرجانية

Embothrium coccineum (S). Embothrie écarlate (F).

جنبة زرقانية معمرة من فصيلة الفصيات . ساقها متصصة  
فراء تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . اثنائها حشوية اللحم .  
اورقاتها بسيطة ، متعاقبة ، متعقبة ، قصيرة الزناد . نصلها  
اطليبي الشكل لامع الفصية العليا باحت السفل .  
ازهارها متفوية التجميع ، ثنائية التزويج ، ناجية  
الارتكاز ، حواء اللون || ازهارها يشتر من تموز  
الى آب .

Etalon (F). Stallion (E).

٢٠٤٧٦ - فحل  
الاكر من كل حيوان . ج . فحول والفحل وفحال وفصالة  
وفصول .

Carboniser (F). To carbonize (E).

٢٠٤٧٧ - فحم  
حول الشيء الى فحم .

Charbon (F). Coal (E).

٢٠٤٧٨ - فحم  
اسم شامل يطلق على بعض مركبات الكربون غير المتبلور .  
اشهر انواعه الحجري والنباتي .

٢٠٤٧٩ - فحم العظام

Noir animal, Charbon d'os (F). Bone-black, Animal charcoal (E).

سماد فسفوري يحصل من حرق العظام بطريقة خاصة .

Houille (F).

٢٠٤٧٠ - فحم حجري  
Coal, Pit-coal (E).

مادة معدنية سوداء اللون تستخرج من الارض تستعمل  
وقوداً . انواعها متعددة تختلف باختلاف نسبة الكربون  
التي تحويها .



فحمية الزهر

۲۰۴۹۲ - فِدَادُكَ كَالِحَةٌ \* Ulula nebulosa (S).

Chouette nébuleuse (F).  
طائر من الفئاد كبير الجفّة طوله نحو ٦٠ سم. موطنه  
أمريكا الشمالية. يأوى إلى الأسراج الكثيفة. يصيد الجرذ  
والقار والأرانب والسناجب والفصّادع والأسماك.

۲۰۴۹۴ - فِدَادُكَ Grenouille (F).  
هي الضفدع، أطلبه.

۲۰۴۹۵ - فِدَادُكَ يَت Ululens (F).  
عمارة من فصيلة الببويات تشمل ثمانية اجناس: الخُم  
والخيل والصدى والضوء والفداد والتهام والهرنق والهرذ.

۲۰۴۹۶ - فِدَاكِر Concasseur (F). Breaker (E).

۲۰۴۹۷ - فِدَاكِر Pratin (S).  
Pratin (F). Pratin (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة الوريبيليات. سورها  
متنصبة أو مستقيمة. أوراقها متعقبة، متعاقبة. أزهارها  
محورية الارتكاز، فردية، مستقيمة المالمين، ثمارها  
عنقية متباعدة الخصب يكثر ثمرها الآخر || أنواعها  
المعروفة قليلة البدء، أشهرها التالية.

۲۰۴۹۸ - فِدَاكِر ضِعْمَةُ التَسْنِين Pratin (S). Pratin à grosses dents (F).

نوع من الفداد. ساقها قصيرة متنصبة فراء. أوراقها  
صغيرة مسطوية الشكل، شبه لحمية النصال، غسفة  
الكسنة اختاري. أزهارها حلزونية العرف، قصيرة المالمين،  
صفراء اللون، قطرها نحو ٣ سم. || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف.

۲۰۴۹۹ - فِدَاكِر قُرْصَةٌ Pratin perpusilla (S).

Pratin nana (F).  
نوع من الفداد. ساقها جذعة. أوراقها شديدة الصغر.  
أزهارها مستطيلة المالمين، صغيرة القد، بيضاء اللون،  
تخلية التويجات || تنويرها من حزيران إلى تموز.

۲۰۵۰۰ - فِدَاكِر مُحَرَّسَةٌ Pratin angulata (S). Pratin anguleuse (F).

نوع من الفداد. ساقها محرّسة فراء تملأ من ٢٠ إلى  
٣٠ سم. أوراقها متعقبة، بيضية الشكل، نصلها مزرق  
البشرة. أزهارها مستطيلة المالمين، بيضاء اللون، مرققة  
بالاحمر. ثمارها عنقية حراء اللون || تنويرها يستمر طوال  
فصل الصيف.

۲۰۵۰۱ - فِدَاكِر صَدَاكَةُ Pratin repena (S).

Pratin rampante (F).  
نوع من الفداد. ساقها مدادة زائفة. أوراقها مستطيلة  
الاعتك التي يتجاوز طولها طول النصال، نصلها شبه  
قلبية الشكل، عادمة الكسنة. أزهارها مستطيلة المالمين،  
بيضاء اللون، مشبعة بالبنفسجي. ثمارها عنقية مرجانية ||  
تنويرها يستمر من حزيران إلى تشرين الأول.

۲۰۵۰۲ - فِدَاكِم Chausse (F). Filter (E).  
مصفاة تمر بها السوائل لتنقي.

۲۰۵۰۳ - فِدَاكِن Bœufs de travail, Bœufs de labour (F). Oxen (E).

القدان هما الثوران اللذان يقدن عليهما. ج. قدن وأندنة.

۲۰۴۹۰ - فِجِيل Racour (F). Thorough (E).

نمت تعريف يطلق على الحيوان الذي يطبع في القتل صفاته  
ذكراً كان أو أنثى.

۲۰۴۹۱ - فِغ Happeau (F). Snare (E).  
أداة تصاد بها الطيور والقوامس.

۲۰۴۹۲ - فِغَار الطين الطويخ. وقيل الطيخ هو غزف وصلصال.

۲۰۴۹۳ - فِغَت Claré de la lune (F).  
الغيت هو ضوء القمر. Light of the moon (E).

۲۰۴۹۴ - فِغْدَ Culsa (F). Thigh (E).  
عضو من اعضاء الجسم الحيواني. وما فخذان. ج. اخفاذ.

۲۰۴۹۵ - فِغْدُ الدَبِّ نجم من كوكبة الدب الأكبر.

۲۰۴۹۶ - فِغْرُ الثَّلُوج هي الثيرونوكا. اطلبا.

۲۰۴۹۷ - فِدَام Volume  
الداء: حجم الشيء.

۲۰۴۹۸ - فِدَام Oton  
الافدام حيوب المصط لا تزال حسانتها حائلة بها وتكون  
غالباً محبوب نجيله أو صفيغة.

۲۰۴۹۹ - فِدَام Grenier (F). Grenary,  
Score-house (E).  
هو الإبتار، أطلبه.

۲۰۴۹۰ - فِدَاد Chouettes (F).

Screech-owls, Barn-owls (E).  
جنس طير من الببويات وحمار الفداديات. انواعه عديدة  
جميعها من الرؤاس الكواسر. كبيرة القد، خفيفة الرأس،  
حريفة الحسر المستدير، قوية للفسر. القوا إلى البصرة  
الموضحة تعلوها رقعة صغيرة البنية وبعض التندابع.  
قوته القارتي على اختلافها والضفادع والظالم ... ين  
في تجلويث الأشجار القديمة العهد أو في الأكرار الكبيرة  
المزروكة. أناته تبيض مرة واحدة في العام. حشنتها  
تراوح بين ٤ و ٦ يبيضات || أشهر انواعه الثلاثة  
التالية.

۲۰۴۹۱ - فِدَادُكَ الشَّرِقُ \* Ulula noctua (S).

Chouette chevêche (F).  
طائر من الفداد اسطانه فسيحة الاجزاء تمتد من الصين إلى  
أطراف أوروبا ومن حضايا افريقية الشرقية وبرقعات  
التونسية إلى تمام مراكشي الاطلسية || وهو آبد، متوسط  
القد، طوله نحو ٤٥ سم. يأوى إلى الأسراج والخرائب.  
سرسره يدوم من القسق إلى الفجر. يصيد الجرذ والقار  
والظلم والضفادع وجميع أنواع الحشرات والديدان.

۲۰۴۹۲ - فِدَادُكَ الشَّيَالُ \* Ulula isponica (S).

Chouette lapone (F).  
طائر من الفداد كبير الجفّة طوله نحو ٧٠ سم. يأوى  
إلى أسراج البلاد الباردة اخصها الشمالية || وهو بلي  
الطيران لا يصف من شيء يمكن منه وقد يقتصر السناجب  
والقوار.



فِدَادَةُ الشَّرِقِ.



فِدَادَةُ الشَّيَالِ



فِدَادَةُ كَالِحَةٍ

## ٢٠٥١٤ - قرأ التبت \* ، هَمِينِيْد

Equus hemionus (S). Hémione (F). Klang (E).  
نوع من الأفراس موطنه التبت ويصنف في ثاني أسية الوسطى .  
وهو كبير الجثة يملو نحو ١٢٠ سم . ويطول ٢١٠ سم .  
يما في ذلك الذنب الذي يبلغ ٥٠ سم || رمله يراوح  
بين ٨ و ٢٠ .



فلس الساكن

Eques indicus (S). قرأ الهند ، قُولَان  
Onagre de l'Inde, O. de Britson, Koulan, Ghour,  
Ghor-Khur (F).  
نوع من الفراء موطنه الهند والافغان والصين وباكستان ويران  
وهو متوسط القد جسمه حبي الفراء الاسودى الا انه افتح  
ثوباً وأعرض ثوباً وأطول أذنأ || عدد رمله يراوح  
بين ٨ و ١٥ .

٢٠٥١٦ - قُرَاكَل ما في كوش الحيوان من القوت .

٢٠٥١٧ - قُرَاكَج هو القرد نبات مثقي ، اطلبه .



فراء آسودي

٢٠٥١٨ - قُرَاكَج ، قُرَاكَل  
Cépe (F).  
Tult of shoots (E).  
جاء القراسي الي تفرخ حول اودية الشجرة المغطاة .

٢٠٥١٩ - قُرَاكَل هي العائقة ، اطلبه .

٢٠٥٢٠ - قُرَاكَل ، قُرَاكَل ولد النجسة والاعز وبقرة .

## ٢٠٥٢١ - قُرَاكَلَة \*

Ferraria (S).  
Ferraria (F). Tiger flower (E). Tigerblume (D).  
Gladole indiano (I).

جنس نباتات دوفسية من فصيلة السوسنيات انواعه قليلة  
جميعها زينة. بعضها ظارية . اوراقها لاسعة زاهية الخضار  
مشربة اخضر بالاحمر والي . انهارها جميلة الشكل كبيرة  
القد نورة ووشحة لكنها سرية القبول اما سديتها فتعنف  
ومعناها كبيرة ويهدية || يستخرج من دوائها مادة  
صمغية حريفة تستعمل في الطب || اشهر الوراها مايلي .

٢٠٥٢٢ - قُرَاكَلَة سوداك  
Ferraria atrata (S).  
Ferraria noirte (F).

نوع من القراوية السورية ساقها تملو نحو ١٥ سم .  
انهارها الى الحيرة الابريانية التبرع للوشحة بالاحمر  
والاصفر || انهارها يشتر من آذار الى نيسان .

## ٢٠٥٢٣ - قُرَاكَلَة مَحْمَاكَلَة

Ferraria undulata (S). Ferraria ondulée (F).

نوع من القراوية البروتية . ساقها تملو من ٢٠ الى ٣٠ سم .  
انهارها الى الخضار الاسمر تملو رشفة جردية .  
بتلاتها مكوية النصل ، منقطعة الاطراف || انهارها  
يشتر من آذار الى نيسان .

٢٠٥٢٤ - قُرَاكَل  
Ecrémousse (F). Sepsator (E).  
آلة تفرز الكتانة من الحليب مع بديل القوة التابذة .

٢٠٥٢٥ - قُرَاكَلَة قُرَاكَلَة  
Equitation (F).  
Horsemanship, Riding (E).  
هو فن استقاء الخيل .

٢٠٥٢٦ - قُرَاكَلَة الجَو  
Prévision du temps (F).  
Prevision from time (E).  
هو تشخيص الجو .

٢٠٥٢٧ - قُرَاكَلِيْكِن هو العيون المحتدي ، اطلبه .



قُرَاكَلَة

٢٠٥٠٤ - قُدَر Chamois (F).

الفند والفند هو النموة . ج قندور وفند .

٢٠٥٠٥ - قُدَر Concasor (F).

To bruise, To crush (E).  
قُدَر الحبيابة : كسرها صافراً .

٢٠٥٠٦ - قُدَس Araignée (F).

هو العنكبوت . ج قسة .

٢٠٥٠٧ - قُدَس المساكين \* ، عَنَكَبُوتُ الْفَارِل

Tegenaria domestica (S). Tégénurie domestique,  
Araignée domestique (F). House-spider (E).

نوع من العناكب الساعية المربصة الفانسة ثنائية الروايا  
سداسية المشاان ينتمي الى فصيلة العنكبوتات || جسمه  
صغير القد بطول نحو ٨ سم . عند الذكر ونحو ١٤ سم .  
عند الانثى . صدره مثل الجرم لونه ال الصفرة الخضراء  
المزاج . صباه زهيتان . خيشام صبريان ذريان . تكاه  
تقيدان صعبان . جرابه نعلية كثيفة الحلب . بطة اثير  
الكون تملو بعض الزواكش واللفظ || يأنف المساكين  
الأمولة والغراب . كته الحشرات الصغيرة والذباب والحمل .  
يربص لها في حبه ويسعى اليها ركضاً وقفزاً . حبه كبير  
القد ، اقل السطح ، قوي المركز ، يقينه في الزوايا  
يلجأ اليه في التبار ويسرح في الليل || ياله الشتوي  
يشتر نحو ١٧ اسبوعاً يقضيها في مكانة بطولية الشكل  
ينسجها في شقوق الخواش او تحت الاغصان ويبيتا ||  
يمشي نحو ثلاث سنوات . ملجئه الحيالي لا يختلف من  
ملجئ غيره من العناكب || يعتبر من الدواب النافعة  
اللاذنية .

٢٠٥٠٨ - قُدَش Araignée (female) (F).

الدش انثى العناكب (كراغ) . Spider (female) (E).

٢٠٥٠٩ - قُدَح Distorsion (F). Distorsion (E).

القُدَح النواء يطرأ على عضو من الجسم او على قسم منه .

٢٠٥١٠ - قُدَحَم القندم : البقل الكثير الماء .

٢٠٥١١ - قُدَحَن ، مَهْدَن Mivier (F). To level (E).

يسد الارض ويصلاها .

٢٠٥١٢ - قُرَا \* قُرَاكَل Onagre (F). Onager (E).

شرة من الحمر الوحشية حديثة الانواع تتميز باذنانها الدقيقة  
واذنانها الصغيرة وأعرافها القصيرة السبب المنصب  
وسوارها القليلة الاستدارة || اصطناعها بعض فياني وجبال  
العالم القديم . تميل جمادات . ارباعها لاجسية يراوح  
عدد افرادها بين ٥ و ٢٠ رأس الرجل فصل يقوده ويحميه  
ال ان ينطلق على امر فيتنس . اعرف انواعه فراء التبت  
واحدة والفراء الاسودى .

٢٠٥١٣ - قُرَا آسودِي \* ، قُرَا الشام

Equus hemippus (S). Hémippe, Onagre de Mésopotamie (F). Syrian wild as (E).

نوع من الفراء ثوبه انيس اللون موطنه يمتد من جبال ايران  
الى العراق السورية حتى تدمر . وهو متوسط القد يملو نحو  
١١٥ سم . ويطول ٢٠٠ سم . يما في ذلك الذنب الذي يبلغ  
٤٥ سم . رمله يراوح بين ٥ و ١٢ .

**٢٠٥٣٣ - قراغة** (F). Butterfly, Moth (E).  
اسم شامل يطلق حل جميع الحشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة. وبهم من خصص الاسم بحشرات القمصيلة القراغية دون سواها.

**٢٠٥٣٤ - قراغة الحصيد** (F).  
هي غصية الحصيد، اطليا.

**٢٠٥٣٥ - قراغة الحنطة** (F).  
هي غصية القمح، اطليا.

**٢٠٥٣٦ - قراغة الزعرور**  
هي كرنية الزعرور، اطليا.

**٢٠٥٣٧ - قراغة السمسم**  
راجع دودة السمسم.

**٢٠٥٣٨ - قراغة المتناقيد** (S).  
هي حلوظ الكربة، اطليا.

**٢٠٥٣٩ - قراغة القلت**  
هي كرنية القلت، اطليا.

**٢٠٥٤٠ - قراغة المثلثوف** (F).  
هي كرنية المثلثوف، اطليا.

**٢٠٥٤١ - قراغة جوارك القطن** (F).  
هي دودة القطن الشوكية، اطليا.

**٢٠٥٤٢ - قراشيات** (S).  
**Papilionidae (F). Papilionidae, Swallowtails (E).**  
Ritter (D).

فصيلة حشرات من رتبة حرشفيات الاجنحة، صولجانايات القرن. اجنحتها والاولاهما كثيرة الممد منتشرة في جميع اصقاع العالم.

**٢٠٥٤٣ - قراشية** (S).  
**Papilionaceae (F). Papilionaceae (E).**

سبط من فصيلة القرنيات اجنحة نحو ٣٠٠ سببا الاثمار والجنبايات والمثلثات والاصباب الحولية والمعمرة. معظمها زراعي غذائي او طبي وصناعي.

**٢٠٥٤٤ - قراط** (S).  
**Coregonus fers (S).**  
Féra, Férat, Ferrat (F).

سمكة ثورية من السلموليات. اطليانها بمجرات صوبيرا وايطاليا الشمالية وقد انتشرت تربيتها في الاخوار والاضواض المصنعية المبيعة النور. جسمها بطول نحو ٥٠ سم. ثورجها الى السمرة الخطية الخضراء المولج. يطها الى الثيرة البيضاء. لحمها جيد الصنف مرغوب فيه كسالم القور.

**٢٠٥٤٥ - قراغ، قنطرة، قنطرة** (F).  
**Lacuna, Alr-cell (E).**

كل فراغ في النسيج النباتية.

**٢٠٥٤٦ - قراغ حجووي**  
هو في النسيج الحية جيوب دقيقة خالية من الهواء.

**٢٠٥٤٧ - قراغي** (F).  
**Lacuneux (F). Lacuneux (E).**  
نصت ترميضي يطلق على النسيج النباتية التي يتخلل خلاياها فراغات ملية بالهواء او بغيره من السوائل المختلفة. يقال نسيج قراغي.

**٢٠٥٤٨ - قراسيون، بياذ كورود** (S).  
**Marrubium (F). Horehound (E).**

جنس نباتات عشبية برية طيبة مسرة من فصيلة الشفويات. اناوله عديدة جميعا طرية تتميز برعها الضواغ القريب الشبه من المسك. سيقانها فراء عشوية مزينة. اورقها متعابله متقابلة بيضا. فصلها كثيرة الفروق، متجمعة الصفحة الحولية البشرة، مسنة الخار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع. محورية الارتكاز || اعرف اناوله مائل.

**٢٠٥٤٩ - قراسيون ابيض، حشيشة الكلب، قلبية، مقل الصنف**

**Marrubium vulgare (S). Marrube commun, M. blanc (F). Common white horehound (E). Marandom, Welsch Androm (D). Marrubio comune, Marrobio, Mentastro, Erba apiola, Prasline (I).**

نوع من القراسيون وهو ضمية مبلولة تثبت في الاراضي الجور وتل جوانب الطرقات. تطلو من ٣٠ الى ٨٠ سم. ساقها فراء كثيفة الزغب الابيض. اورقها صغيرة الله، بيضا الشكل، سمكة التصل الحشن. اناولها الى البيضاء الاخر || وهو قوي الرائحة الزصية، مر، حريف، لاذع وقايش. يدر البول ويخفف الحرارة وينفي التشنج ويعمل حالات السعال.

**٢٠٥٥٠ - قراسيون اسود، بكتوط الارض**

**Ballota nigra (S). Ballote fétide, B. noire, Marrube noir (F). Fétid-horehound, Black horehound (E). Schwarze Bulte, Fenweibel, Zahntosa (D). Marrobio bastardo, M. nero, Ballota fetida (I).**

نبات عشبي طوي يري من فصيلة الشفويات طري الرائحة القوية، يدر البول ويبرد التورم ويذلل الحامض البولي وينفي التشنج || ساقه فراء. اورقها متعابله، اهلالية، صغيرة الله || فصلها شخن الصفحة، مسن الحافة. اناولها دقيقة مستطيلة ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى الجلوة.

**٢٠٥٥١ - قراسيون القلب، بكلة الامهات**

**Leonurus cardiaca (S). Léonure cardiaque, Agripaume, Cardique (F). Common mother-wort (E). Echtes Herzsgepann (D). Cardica, Leonuro, Melissa salvatica (I).**

عشبة برية طيبة مبلولة من فصيلة الشفويات. ساقها تطلو نحو ١٠٠ سم. اورقها متعابله متعابله، فصلها طرس الصفحة شديد الخشار. اناولها صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز لونها الى المسرة تملوها رقة بيضاء || كان ولا يزال يستعمل في علاج امراض القلب عند الاطفال وبهم من قال ان مثل نقيه يثني الكلب.

**٢٠٥٥٢ - قراسيون مائي**

**Lycopus (S). Lycopo, Marrube aquatique, Pied-de-loup (F). Gipswort, Water horehound (E). Gemeiner Wolfstrapp (D). Lycopo, Marrubio aquatico, Erba sega (I).**

نبات عشبي طوي يري مسر من فصيلة الشفويات يكثر في المناطق والمواقع الرطبة. ساقه فراء. اورقها متعابله، لاذعة، سانية || فصلها متشاري الخار، خلي البشرة. اناولها بيضاء اللون، صغيرة الله، ضمية التجميع، محورية الارتكاز || يقال انه يظهر الجرح ويعملها وهو حريف لاذع يستعمل في التخفيف الاسود.



قراسيون ابيض



قراسيون اسود



قراسيون القلب



قراسيون مائي



قراغ

ايض الحار || ازهاره خيمي الشكل ثلاثي الاكرام  
يستمر من ايار الى تشرين الاول .

## ٢٠٥٥٩ - فريون الالديين \* ، يتفرع هندي فريون هندي

*Euphorbia antiquorum* (S). *Euphorbe des anciens* (F). *Ancient milk-wort* (E). *Wolfsmilch der alten* (D). *Euforbio indiano*, *E. triangolato* (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمّر كان يستعمل في الماضي لعلاج امراضه الانسداد والصلابة وهو يستعمل الآن في الطب البشري لانه سهل حثيف لا يتخلو من السموم القاتلة .

## ٢٠٥٦٠ - فريون السمكاسين

*Euphorbia piscatoria* (S). *Euphorbe des pêcheurs* (F). نوع من الفريون البري للممر . ساقه فروعاً خفيفة ، قطرها نحو ٢٠ سم . يصلها ثلاثة اثمار . فريه خرايب مستطيلة قطرها نحو ١٠ سم . اوراقه خفية طويلة نحو ٥ سم . وتعرض ٦ سم . لونها الى الخضار البصري . ازهاره خيمي المتجميع ، خاسي او سبالي الاطراف . صارته فريون المادّة الجسالية القاتلة تستعمل في صيد الاسماك .

## ٢٠٥٦١ - فريون السمكاسين \* ، يتفرع السمكاسين فريون السمكاسين

*Euphorbia helioscopia* (S). *Euphorbe héliscopie*, *Néveil matin*, *Herbe aux verrues* (F). *Sun spurge*, *Wort-grass*, *Wort-Wort* (E). *Sonnenwolfsmilch* (D). *Euforbio mirasole*, *Rogna*, *Titimalo elioscopio* (I).

نوع من الفريون البري الطبي المعمّر . يقال ان ضياء اوراقه او صلاته يقتضي حل التآليل .

## ٢٠٥٦٢ - فريون افريقي ، فريون لانياسي الورق ، يتفرع المكسيك

*Euphorbia heterophylla* (S). *Euphorbe hétérophylle*, *Poinsetta d'Amérique* (F). *Mexican fire-plant* (E). *Poinsettia* (D). *Poinsettia d'America* (I).

نوع من الفريون المحبب . ساقه منتصبة تنمو الى ٣٠ الى ١٠٠ سم . اوراقه معتقة ، السفلى منها بيضيه الشكل مدببة المنقصة ، تصلها سنن الحافة على الصفحة السفلى . اما الاوراق العليا فانها لا تقياسية الشكل والجمع منها البسيطة والمنقصية والقرصية والمقرصية . ازهاره قليلة العدد ، ثنائياتها حرة التجميع ، ولبنية الانسان لثقة التبرّي ، و ازهاره يستمر طوال فصل الصيف .

## ٢٠٥٦٣ - فريون بهي هو الاكليل الشوكي ، اطله .

## ٢٠٥٦٤ - فريون رانج Euphorbia fulgens (S). Euphorbe éclatante (F).

نوع من الفريون البري المعمّر . ساقه خشوية نجيلية تنمو نحو ١٢٥ سم . اوراقه متعاقبة ، معتقة ، متدلية ، تصلها خيوط المنقصة بطول من ١٠ الى ١٥ سم . ويعرض نحو ٢ ، و ازهاره عذرية الاذنكاز كبيرة اللبد البتلية الشكل ، للمفرد اللون || ازهاره يستمر طوال الربيع .

**٢٠٥٦٥ - فراغية \* .** *Vaccinium* (F). *Vaccum* (E). الفراغية ملتح فلسي حكيم قديم العهد يقول بان الفراغ مروي في الطبعية .

## ٢٠٥٦٩ - فراغية شجر تمبل منه الرجال (السان) .

**٢٠٥٧٠ - فراغية \* ، عوسج ريد ، عوسج حوي**  
*Rubus idaeus* (S). *Framboisier* (F). *Red raspberry*, *Raspberry-bush* (E). *Echter Himbeersruch* (D). *Lampine*, *Lampone*, *Rovo idae*, *Mora prugnola* (I). جنبة مشعرة من جنس العليق وفضيلة الورديات . ارضها ممتدة . ساقها متعقبة ممتدة شائكة . اوراقها مركبة متعاقبة . وريقاتها لانياسية الممد الذي يراوح من ٢ الى ٥ نصالها بارزة الفروق سفنة الحافة ، مزينة المنقصة السفلى . ازهارها متعددية التجميع ، عذرية الاذنكاز ، مستطيلة المالبق ، يضاء اللون . ثمارها شاميل جزوية اللون او بنفسجية مائلة . وهي مأكولة مستعينة العلم تجبر من المرتبات اللينيات || زراعتها تنمو في الخريف نفسه من ١٠ الى ١٢ سنة . تتكاثر بالابلاخ التي تنفس على ابعاد ينيّة تراوح بين ١٠٠ و ١٢٠ سم . وابعاد مستطلة تراوح بين ١٢٠ و ٢٤٠ سم . وهي رطب في الاربة الحربية القليلة الانتاج وفي المواقف الظليلة الرطبة .

## ٢٠٥٧١ - فراغية ، صمغية Framboise (F). Raspberry (E).

ثمرة الفراغية وهي خفية بالفراغية \* ث \* لثة غرام من لبها المأكول تحوي من ٢٠ الى ٢٥ مغ . فيضين \* ث \* .

## ٢٠٥٧٢ - فراغية Fournier (F).

هو الفراغ من البلور الامريكية ، اطله .

## ٢٠٥٧٣ - فراغية Tigre (F).

هو الجبر ، اطله .

## ٢٠٥٧٤ - فراغية Fraie (F).

هي الشبك ، اطله .

## ٢٠٥٧٥ - فراغية سبط من فصيلة الورديات يعرف بالشيليكيات .

## ٢٠٥٧٦ - فراغية Caille (F). Quail (E).

واحدة الفري اي الساق .

## ٢٠٥٧٧ - فريون ، يتفرع ، تاكوت ، عنجيد Euphorbia(S). Euphorbe(F). Spurge, Devil's milk(E). Wolfsmilch (D). Euforbio, Titimalo (I).

جنس نباتات برية وريونية من فصيلة الفريونيات . انواعه نحو ١٦٠٠ منها الحولية والمعمرة ومنها المشية والقيعية والخشوية والحمية الاوراق كالمسبار || اصطناعها البلاد الحارة . جميعها دامة لبنة المعصرة . معظمها طبي جمالي للمادة || اعرف انواعه ما يتبع .

## ٢٠٥٧٨ - فريون ابيض الحولي Euphorbia marginata, E. variegata (S). Euphorbe marginée (F).

نوع من الفريون الحولي . ساقه متعقبة مزينة تنمو من ٦٠ الى ٩٠ سم . اوراقه الجذعية متعاقبة اما العليا والجمالية فصالبة وهي لائقة ، تصلها بيضيه الشكل ، ساقه المنقصة ،



فراغية



فريون الاقسين



فريون الفجر

٢٠٥٧٧ - قَرْجِي، عَكَلِي، أَصْلِي

Congénital (F). Congenital (E).

نمت تمرقي رادف الصفة الوراثية حسنة كانت أو سيئة .

٢٠٥٧٨ - قَرْجَانَكَة، قَطْر الحَقْل

جس فلور بأكله من فصيلة الفاريقونات . أشهر أنواعه الفاريقون المري .

٢٠٥٧٩ - قَرْج

ولد الطائر هذا الأصل وقد استعمل في كل صغير من الحيوانات والنبات والاشجار فربما وجد القلة افرخ وأفرخ والكثرة فرخ .

٢٠٥٨٠ - قَرْج، بِقَيْمَكَة، وَكَزَرَة، وَدَة، هَنْب

Rajet, Rajetan (F). مَوْش .

Young shoot, Sprout, Offshoot (E). الفرخ والنبلة وفكرزة والركل والطبق والمروش قصبان تتشأ من براعم عرضية على موضع ما من ساق الشجرة ولا سبل الاولية المقطوعة .

٢٠٥٨١ - قَرْج، Pärca (S). Pärche (F). Pärch (E).

جس اسمك من فصيلة القرشيات وربة الطغيات الشاكتات الزعانف . أنواعه عديدة جميعها من اسمك المياه العذبة تعيش في الأنهر والبحيرات والأحواض . طولها يراوح بين ٢٥ و ٤٠ سم . ألوانها تختلف مع فصول السنة ، يكثر فيها اللون الأخضر المذهب يطوق بتجميع مفرغ اسمر يحزم الطور والايائل وينتهي عند البطن || أعرف أنواعه وأشهرها :

الفرخ المذول

Perca fluviatilis (S). Perche

Commune (F). Common perch, European perch (E).

الفرخ الإيطالي

Perca italica (S). Perche d'Italie (F).

الفرخ التركستاني

Perca schrencki (S).

Perche du Turkestan (F).

الفرخ الكندي

Perca gracilis (S).

Perche du Canada (F).

٢٠٥٨٢ - قَرْج لَيْلِي

هو لاس الليل ، اطلبه .

٢٠٥٨٣ - قَرْج البَط

Caneton (F).

Duckling, Young duck (E).

الذكر من صغير البط .

٢٠٥٨٤ - قَرْج النَحْل، فَرْج النَحْل

Essaim d'abeilles (F). Bee-swarm (E).

ثول من النحل هجر غايته لتسير غليظة جديدة . والفرخ يتألف من ملكة وذكر ورمايلات .

٢٠٥٨٥ - قَرْجَة البَط

Canette (F). Small duck (E).

الانثى من صغير البط .

٢٠٥٨٦ - قَرْجَة خَصِيَة

Poularde (F).

Fat pullet (E).

فرخة تخصى وتسمن . وتلقى ايضاً مطبوخة .

٢٠٥٨٧ - قَرْجَة سُلْطَانِيَة

Poule sultane (F).

هي البهتان السلطاني ، اطلبه .

٢٠٥٨٥ - قَرْيُون لَيْسَرَس، عَرْيُون

مَنْصَلَب، حَبَّ المَلَكَة

Euphorbia lachryis (S). Euphorbe épurge, Epurge, Catapuce, Catharinece (F). Cape-spurge, Myrde spurge, Wild caper (E). Springwölmlich (D). Catapuzza, Euforbio latiride, Gomitaria (I).

نوع من الفريون وهو نبات ليلى يري حول يكثر في المراتع الرطبة ويصبر من النباتات الضارة || ساقه تملو من ٦٠ الى ١٥٠ سم . أوراقه متطابقة متصالية رباعية ، نصلها سناني الشكل وحيد النسل . عادم القرون ، بحري اللون ، يطول من ٦ الى ١٢ سم . ويمرض نحو ٢ سم . انزهاره غشي الشكل ، وباهي الاطراف الفرقة ، يستمر من حزيران الى تموز .

٢٠٥٨٦ - قَرْيُون مَعْرُوسِي، شَعْرُوسِي، عَمَق

Euphorbia officinarum (S). Euphorbe officinale, E. des apothicaires, E. de juifs (F). Poisonous gumthistle (E). Gehräuchliche wolfmilch (D). Euforbio officinale, E. del speziale (I).

نوع من الفريون البري الطبي للممر . ساقه منتصب . عراحيبه متصلة تطل نحو ٨ سم . لونها الى الخضار الباهت . حار خلوصها قرني للمادة غير اللون || صغاره غزيرة للمادة الجسالية الثالثة الاستعمال الطبي .

٢٠٥٨٧ - قَرْيُون مَدَلِي

Euphorbia pendula (S).

Euphorbe pendante (F).

نوع من الفريون السروي للممر . ساقه منتصب . فروه عراحيب اسطوانية دقيقة اسلية الشكل ، متدلية . نواصلها تطول نحو ٥ سم . أوراقه عراشف لحمية مظلة لونها ، بحرية الخضار ، متطابقة الاينكار .

٢٠٥٨٨ - قَرْيُونِيَّات، يَتْرُوسِيَّات

Euphorbiaceae (S). Euphorbiacées (F).

Euphorbiaceae (E).

فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين . أنواعها نحو ٣٥٠٠ تنتمي الى ٢١٠ اجناس . جميعها من النباتات السامة للبيئة الصارة || اصطناعها البلاد الحارة . معظمها بري وذيبي وبعضها طبي وصناعي .

٢٠٥٨٩ - قَرْث السَّجِين ما دام في كرش الحيوان .

٢٠٥٩٠ - قَرْج، لُغْر

Vulva (F). Vulva (E).

هو مجسمة الأعضاء التناسلية الخارجية في انثى الحيوان يشمل الشفرين والثرنية وبالطارة والكنية .

٢٠٥٩١ - قَرْج الأَرْض هو سورنجان الجبل ، اطلبه .

٢٠٥٩٢ - فَرْجَك

Compes

هو البركار ، اطلبه .

٢٠٥٩٣ - فَرْجَكُورِي

En cercle (F). As circle (E).

لعت تمرقي توصف به المخلوط الدائرية .

٢٠٥٩٤ - فَرْجَكَة

Orifice (F).

أطب فحة .

٢٠٥٩٥ - قَرْجَكَة

Panage (F). Grooming (E).

تنظيف جلد الحيوان بما عليه من اوساخ والظار وفبار ...

٢٠٥٩٦ - فَرْجُون، مَيْحَكَة

Etrille (F).

Curry-comb (E).

إداة من حديد تستعمل لتنظيف جلد الحيوان .



فريون ليسرس



فريون مدلي



فرخ



Individuallité (F). **فَرْدِيَّة ، شَخْصِيَّة**

Individuality (E).

جَماع الصفات التي يَتميز بها الفرد عن سائر المجموع .

Imparité (F). **فَرْدِيَّة ، وَتَرِيَّة**

Imparity (E).

كون الشيء عَلاً أو فَرْداً .

Troupeau de moutons (F). **فَرْد ، فَرْد**

Flock of sheep (E).

طَبع الفَرَس الكَثير المَند .

Ecrémage (F). Skimming (E). **فَرْد الكَفَاة**

فَرز الكَفَاة من الحَلِيب وَهَ يَمَ أما أَلْيَا بِاستِعمال الفَرَاة

وَأما طَبيعاً يَترك الحَلِيب بِمَض لَوَقت لَظفر الكَفَاة تَفتش .

Graines de coton (F). **فَرْدُوع**

Cottonseed (E).

حَب القُطن ؟ الوَاسِدة فَرُوعَة .

Interspécifique (F). **فَرْدِي**

Interspecific (E).

بَنت وَبَتل هُو التَمَاقُص وَالبرُوق وَالجن .

Jument, Cavale (F). **فَرَس ، حُجُور**

Mare, Brood-mare (E).

أُمُّ الحِصَان .

Equus caballus (S). **فَرَس**

Cheval (F). Horse (E).

الذَكَر وَالأنثى . ج. أَفراس . وَجِاعة الأَفراس تَدعى أَخِيل

جَمعها خِيول وَوَأَحدُها خَئَل . وَالذَكَر في أَخِيل يَدعى

حَصان . ج. أَحصَة وَحصَن وَالأنثى تَدعى حَجر . ج. حُجُور

وَحُجُورها وَحِجَار . وَكُتِبة الفَرَس أَبْر شِباع وَأَبْر طَالِب

وَأَبْر مَدَك وَأَبْر المَشار وَأَبْر النَجي وَأَبْر مَضى .

وَالفَرَس حَيوان داجِن وَوَحشي مِن فَصيلة الحَليجات ، ضُروب

وَسَلالاته عَديدة تَختلف بِاختلاف أَشكالها وَرَشاة أَوْ ضَمَامَة

أَجسامها وَسرعة حَركتها وَبَلى نَشاطها الخ . أَشهر ضُروب

وَسَلالاتها ما يَليخ .

٢٠٦٧ - **فَرَس تَرِي ، فَرَس أَسِيَّي**

Equus caballus aryanus, E. caballus asiaticus (S).

Cheval aryan (F). Aryan horse (E).

ضُرب من الحَيول الأَريَّة أَوْ الأَسيوَّة . أَصلُها عَديدة

أَشهرها الأَري وَالأَسي وَالتَقفازي .

٢٠٦٨ - **فَرَس أَعْظَم**

Pégase (F). **فَرَس أَعْظَم**

Pegasus, Flying horse (E).

الفَرَس الأَعْظَم كَوَكِبة نَجوم ضَامِية المَيع لا تَبد كثيراً

عَن الدب الأَكْبَر . مَرَكِزها بِد كَوَكِبة ذَات الكَرسي ||

بَنيوها النَيرَة وَالخالِفة عَديدة . وَالبرَب تَدعى النَجم الذي

عَلِ السَرة « سَرة الفَرَس » . وَتَدعى الأَربعة أَثَرَة أَثَى عَلِ

المَرع « مَن الفَرَس » وَ« مَنكَب الفَرَس » وَ« هَتِ الفَرَس »

وَ« جَناب الفَرَس » . وَ« لَدي عَلِ جَيفَلَه » أَنف الفَرَس .

وَتَدعى الأَثنين المُتَظَمِّين « المَرُوقَة » وَالأَثنين الأَدين فِي الدَين

« التَمام وَالكَرَب » . وَالأَثنين الأَدين عَلِ الرَأْس « سَد

الهُام » . وَالأَثنين الأَدين عَلى البَنت « سَد المَمام » .

وَالأَثنين المُتَظَمِّين بَين الأَدين فِي الصُور « سَد البارِج » .

وَالأَثنين الأَدين عَلِ الرَكة البَين « سَد المَطر » .

٢٠٥٨٨ - **فَرَسِيَّات**

Percidés (S).

Percidés (F). Percidés (E).

فَصيلَة أسماك من الفَصيلات الشائِكات الرَماثف . أَجسامها

وَأَنواعها عَديدة ، أَشهرها الفَرَس .

٢٠٥٨٩ - **فَرْد**

Farad

وَسَدَة قَياسَة كَهرَبائِية .

٢٠٥٩٠ - **فَرْد**

Individu (F). Individual (E).

كُل سَي لهُ وَجُود مُستَقِل وَشَكل نَوعي مَعيَن وَصفات خاصَة

تَميزُه عَن أُخَر .

٢٠٥٩١ - **فَرْد**

الفَرْد نَجم بَين مَن كَوَكِبة جَماع أَثَى . مَرَكِزهُ فِي أَثَر المَنتَق .

وَه سَي فَرْداً لِأَن لَها عَن أَشباه .

٢٠٥٩٢ - **فَرْدُوع**

Anaspis (S).

Anaspis (F). Anaspis (E).

جَنس حُشرات من فَصيلة الفَرْدِيَّات وَرَبِيَّة عُذَيَات

الابِنة . أَنواعها المَعروفة عَديدة مُنتَشرة فِي جَميع مَناطِق

البلاد الحَارَة وَالْمُعتَدلة الحَارَة || أَجسامها صَغيرة ، عَفاء ،

مُعتَدلة التَطييط ، طَولُها مِن ٣ أَل ٥ م . وَرُؤُوسها صَغيرة ،

قَلِيلَة النُشُور ، عَيونها صَاحَة . تَأثيرُها وَبَلاؤها نَظامِيَّة .

فَرُوعُها الاستِشارِيَّة عَظِيمة . كَواسِلُها مَعيَنة الشَكل .

الحامِدا مُستَطيبة ، لَاحِظَة . قَوائِمُها نَشيطة . أَثَولُها ثَلاثِيَّة

الزَون || الحَاشِيَة الجَملانَة وَاشِعة مَرَمَها أَزْمار الحَليجات .

أَبرقَة خَاصَة .

٢٠٥٩٣ - **فَرْدُوسِيَّات**

Anaspididae (S).

Anaspididae (F). Anaspididae (E).

فَصيلَة حُشرات من عُذَيَات الابِنة . أَجسامها وَأَنواعها

المَعروفة كَثيرَة العَدد مُنتَشرة فِي مَناطِق البلاد المُعتَدلة

الحَارَة || أَجسامها صَغيرة القَدم ، مُستَطيبة الشَكل ،

مُعتَدلة التَطييط ، طَولُها مِن ٣ أَل ٧ م . وَرُؤُوسها صَغيرة ،

قَلِيلَة البرُوز . عَيونها صَاحَة . تَأثيرُها وَبَلاؤها نَظامِيَّة .

فَرُوعُها الاستِشارِيَّة عَظِيمة ، مَرَكِبة مِن ١١ فَصلة . كَواسِلُها

نَصف دَائِرِيَّة الشَكل ، الحامِدا لَاحِظَة . قَوائِمُها نَشيطة .

أَرساغُها دَرباعِيَّة المُقل فِي الزَوج الخَلْفِي ، خَاصِيَّتُها فِي

الزَوجين الأَمامِي وَالأَوسط . أَثَولُها مَملُوءَة || جَميعها خَاصَة

وَوَاشِعة . تَعيش خاصَة عَلِ أَوراق وَأَثمار الحَليجات ||

أَشهر أَجسامها الفَرْدُوع .

٢٠٥٩٤ - **فَرْدُود**

الفَرْدُود كَوَاكِب مُستَطيبة خَلْف الأَريَا .

٢٠٥٩٥ - **فَرْدُوس**

Jardin (F).

هُو البَستان ، الحَظِيَّة .

٢٠٥٩٦ - **فَرْدُوسِيَّات**

Parasitoidae (S).

Parasitiers (F). Parasitoidae (E).

فَصيلَة من رَبِيَّة الجَواثِم تُشَمل طَيور الفَرْدُوس .

٢٠٥٩٧ - **فَرْدِي النَظَظُش**

Haploide (F).

Haploid (E).

صَفَة الحَليجات الحَويانيَّة وَالخَلَيَايا النَباتِيَّة الرَبيدة المُتَظَمِّين .



فَرُوح

والسنتية بين الكواكب . وهو يبادل المسافة التي يجتازها النور بمدة ٣٢٥٠٠٠٠ سنة .

**Perée (F).** - ٢٠٦٢٥ - **فرسكوس**  
كوكبة نجوم شمالية المقي تدعى سيوس .

**Lieu, Parasange (F).**  
**Laqus, Parasang (E).**

الفرسخ وحدة قياسية مسافة لدعما كانت تساوي في الماضي نحو ٤٠٠٠ م. وتقادي الآن نحو ٥٢٥٠ م.

**Parsec (F).** **Parsec (E).** - ٢٠٦٢٢ - **فرسخ فلكي**  
الفرسخ الفلكي وحدة قياسية اصطلاحية تستعمل لقياس المسافات الفلكية . طولها نحو ٣,٢٥٦ سنة ضوئية .

**Actinostemma (S).**  
**Actinostemma (F).**

جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة القرقيات . منها بعض مناطق الشرق . سوقها عارية ، جملتها مدرة . أوراقها كفية الشكل . أزهارها وحبها المسكن ، المشكبة منها عشقودية التجميع أما الملقحة لفردية أو ضمية التجميع . ثمارها أصبغة الشكل ، ناعمة الطعم ، تستعمل كحللوات || لها ثوبان مخروطان .

**Actinostemma (S).**  
**Actinostemma paniculatum (F).**

نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو أربعة أمتار . أوراقها كفية ثنائية أو حاسية القصص تطول نحو ١٠ سم وتعرض نحو ٧ سم . أزهارها عشقودية التجميع . أزهارها صفراء اللون . ثمارها أصبغة الشكل مائة تطول نحو ٧ سم .

**Actinostemma (S).**  
**Actinostemma lobé (F).**

نوع من الفرس . ساقها عارية تطول نحو أربعة أمتار . أوراقها كفية ثلاثية أو حاسية القصص تطول نحو ٦ إلى ١٢ سم . وتعرض من ٤ إلى ٨ سم . تصالها خلية المروك على الصلصتين . ثمارها أصبغة الشكل ، صغيرة القدة ، تطول من ٣ إلى ٤ سم . وتعرض من ١٥ إلى ٢٠ سم .

**Pécher (F).** - ٢٠٦٢٦ - **فرسك**  
هو الفرائس ، الطلح .

**٢٠٦٢٧ - فرسين**  
الفرسين : طرف خف البعير وللشاة . ج فراسن .

**٢٠٦٢٨ - قرش**  
هو الثفنين الصجور ، اطلح .

**٢٠٦٢٩ - قرش الصبغ**  
هو الصبغة الخشنة ، اطلحها .

**٢٠٦٣٠ - فرشح**  
الأرض الواسعة العريضة وقيل السحاب الذي لا مطر فيه .

**٢٠٦٣١ - فرشة**  
**Litière (F).**  
**Stable-litter, Straw (E).**

فراش من حشيش أو قش أو تبن وغيرها من المواد النباتية يفرش تحت الدواب في الاستبلات لراحة عليه .

**٢٠٦٣١ - فرس البحر ، بركيق**  
**Hippopotamus (S).**  
**Hippopotame (F).** **Hippopotamus (E).**

جنس حيوانات لبونة من ذوات الحوافر عطية القدة ، سفينة الجلد ، ليس في جسمها شيء يشبه الفرس . رأسها وتوابعها مشبه الغنظة والكب . جسمها بالغ النضامة ، عظمها وقوائمها وذنبها قصيرة || مهنها البلاد الإفريقية الحارة . تعيش في مياه الأنهار وتل سفانها . قبحا الاعشاب .

**٢٠٦٣١ - فرس السباق الانكليزي**  
**Pur sang anglais (F).** **English blood-horse (E).**

هو الفرس الانكليزي الاصيل يعتبر أجود سلالات خيول السباق .

**٢٠٦٣١ - فرس المغرب**  
**Cheval berbe (F).**  
**African horse (E).**

مصر من الجياد القوية اللينة . مهنها بلاد المغرب . يقال انها سلالات مختلفة نتجت من تصالب الخيول العرب مع خيول المغرب الاصلية وذلك على اثر الفتح العربي .

**٢٠٦٣٢ - فرس القوي**  
**Mante religieuse (F).**  
هي السروقة ، اطلحها .

**٢٠٦٣٢ - فرس السباق اصيل ، فرس السباق الانكليزي**  
**Pur sang anglais (F).**  
**English blood-horse (E).**

الفرس الانكليزي الاصيل او الخقيق او الكرم هو اسبق الخيل كلفة . نشأ من اب عربي وام انكليزية واصبح صرماً صريحاً معروفا له كتب انسابه المفضية وله شهرة عالمية التي تقى عن كل تعريف .

**٢٠٦٣٤ - فرس بوني ، بونكي**  
**Poney, Ponet (F).**  
**Pony (E).**

نعت تعريفي يطلق على كل جياد صغير القدة خفيف الوزن .

**٢٠٦٣٥ - فرس محتاب**  
**Cheval trotteur (F).**  
**Trotter horse (E).**

كل فرس ركض الخيب . والخيول الحيازة سلالات تميزت بهذا النوع من السير السريع الخاص .

**٢٠٦٣٦ - فرس صغير**  
**Petit cheval (F).**  
**Equuleus (E).**

الفرس الصغير كوكبة نجوم شمالية المقي مشهورة باسم قطرة الفرس ، اطلحها .

**٢٠٦٣٧ - فرس عربي اصيل**  
**Pur sang arabe (F).** **Arabian blood-horse (E).**

هو الفرس العربي الخقيق الكرم وهو اصيل الخيل واجلها واصلحها الركوب || سلالاته المشهورة عديدة اشخاصا كحيالات السجور والمقلديات وام عرب وباشراوات والنبات والمعتيات وهذه ابيات والمجلف .

**٢٠٦٣٨ - فرساح**  
الفرساح : الأرض العريضة الواسعة . ج فراسح .

**٢٠٦٣٩ - فرساح**  
**Mégaparsec (F).**  
**Megaparsec (E).**

الفرساح وحدة قياسية تستعمل في تحديد الأبعاد الفضائية



فرس البحر



فرس عربي اصيل

انتار. هيكلها هيكَل الدار. اوراقها مدقة مستطيلة الزناد تطول من ١٠ الى ١٥ سم. وتعرض من ٢ الى ٣. نصلها اعلياني الشكل، ذلق الزنم الانخير || ازهارها وردية او غريزة اللون. حناقيها لبدة قريية من الاستدارة. ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Noyaux de basamés (F).  
Stone of bdellium tree (E).  
الفرس : نوى اللؤلؤ .

٢٠٦٤٥ - **فَرْصَاخ كَثِير الزَّهَر** (F).  
Haben florida (S).  
Vaubier multiflora (F).  
نوع من الفرباخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٥٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها صغيرة خفيفة . نصلها عديم اللون. مسن الحافة ، مدبب العقصة || ازهارها صغيرة عطرية القرب ، بيضاء اللون . حناقيها كثيرة المدد ، متوسطة الحجم || ازهارها يستمر من ايار الى آب.

Mürir (F).  
٢٠٦٣٣ - **فَرْصَاد**  
هو الثوت ، اطلبه .

Müriforme (F).  
٢٠٦٣٤ - **فَرْصَادِي**  
نمت وصني تعرف به الاشكال الشجيرة شاميل الثوت .

Pépin de raisin (F).  
Grape-stone (E).  
٢٠٦٣٥ - **فَرْصِيد** ، **فَرْصِيد**  
الفرمند والفرسيد : حجم المنب والفربيب .

Acineux (F).  
Acinose, Acinuous (E).  
٢٠٦٣٦ - **فَرْصِيدِي** ٥  
ما كان شكله شكل الفرصد .

Haben acicularis (S).  
Vaubier à aiguilles (F).  
٢٠٦٤٦ - **فَرْصَاخ مُهَدَّب**  
نوع من الفرباخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم. اوراقها خفيفة خضراء المسطحة السفل ، شاذلة القصبة المدنية || ازهارها خضراء اللون ، عطرية التجميع . ثمارها جرابية عديمة ، ثنائية التلويس الطرية . ازهارها يستمر من تموز الى آب.

Arbres à pépins (F).  
Stone-trees (E).  
٢٠٦٣٧ - **فَرْصِيدِيَات**  
هي الاشجار القرصية البذور كالكمرة والشلح والاجاس والفرجل الخ ...

Acinélique (F). Acinetic (E).  
٢٠٦٣٨ - **فَرْصُوسِي** ٥  
نمت تمريني يظل كل ما يقف حركة القلب .  
النجيتمال الانبواني نبات فرسي .

٢٠٦٣٩ - **فَرْصُوس** الفرص : فر اللوم ما دام اجر.

Imposition  
٢٠٦٤٠ - **فَرْصُوس الصَّبِيكَة**  
هو اتباع نظام تقني لاجل تقدير الاموال وما يكتبها ان تحصل من الضرائب .

Haben (S). Vaubier (F).  
٢٠٦٤١ - **فَرْصَاخ**  
جنى اشجار وجنات برية وزراعية تربية من نصيلة للفضيات ، ازولها عديدة ، اقلها اقليم الزيتون . سيقا فرما . اوراقها متعالية ، جلدية النصل . ازهارها صغيرة لثقة ، عطرية التجميع ، بشارنة الاسدية المنحرفة . اشهر ازولها ما يتبع .

Haben saligna (S). Vaubier à feuilles de saule (F).  
٢٠٦٤٢ - **فَرْصَاخ صَفْصَافِي لَوْرِي**  
نوع من الفرباخ وهو جنية تربية سرورية تملو من ٢٥٠ الى ٣٥٠ سم. اوراقها وحيدة النصل ، عديمة اللقروك تطول من ١٠ الى ١٢ سم. وتعرض من ١ الى ٢ . نصلها مائل البيرة ، بحري اللون ، ابري العقصة || ازهارها خضراء اللون مقنطرة التجميع ، صورية الايزكان || ازهارها يستمر من نيسان الى تموز.

Haben suaveolens (S).  
Vaubier à odeur suave (F).  
٢٠٦٤٣ - **فَرْصَاخ عَطِطَر**  
نوع من الفرباخ ، وهو جنية تربية سرورية تملو من ١٠٠ الى ٣٠٠ سم. فروعها خلية اللحاء ، فضية اللون. اوراقها مفترسة ، غيبطية التفرج ، نصلها جامد التجميع ، شاذل الاطراف المدنية || ازهارها بيضاء اللون ، صغيرة اللث ، فواحة القرب العطري || ازهارها يستمر من ايار الى تموز .

Haben laurina (S).  
Vaubier laurier (F).  
٢٠٦٤٤ - **فَرْصَاخ عَطَارِي**  
نوع من الفرباخ وهو شجرة تربية تملو من ٤ الى ١٥

Hypermétamorphose (F).  
Hypermetamorphosis (E).  
٢٠٦٤٥ - **فَرْطُ التَطَوُّر**

Biano-estec (F).  
Thrust (E).  
٢٠٦٤٦ - **فَرْطُ التَقَطُّل**  
هو قطع الشجر الحربي بارساف .

Pénis de l'éléphant et du porc (F). Penis of the elephant and pig (E).  
٢٠٦٤٧ - **فَرْطُوس**  
هو تقطيع القليل والخزير .



فرع الشواطي

Phryganidae (S). \* فَرْطُوسِيَّات ٢٠٦٦٤

Phryganidés (F). Phryganoides (E).

فصيلة حشرات من رتبة جملونيات الاجنحة. اجناسها واولادها المعروفة عديدة منتشرة في جميع مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة. تعيش قرب مجاري الماء || اجسامها لاقامية الشكل والخضراء ، طولها من ٢ الى ٦ سم. اولادها مزركفة || اشهر اجناسها الفَرْطُون .

٢٠٦٦٥ - فَرْقَار

شجر صبور على النار تنطفئ منه السماس والقصاص .

٢٠٦٦٦ - فَرْقَارَة ، دِيك الرِيح (F). Girouette

هي الدرة جهاز يدل على جهة مهب الريح .

Tussilage (F).

٢٠٦٦٧ - فَرْقَارَة

هي حشيشة السعال ، اطليه .

Pourprie (F).

٢٠٦٦٨ - فَرْقَرِين

هو القطة الحقة ، اطليه .

٢٠٦٦٩ - فَرْقَرِين \* ، فَرْقَرِين \* ، حَتِينَا

Euphorbia papius (S). Euphorbe des vignes, Eaulé (F). Wild purslane, Purple spurge (E). Gartenwolfsmilch (D). Euforbio delle vite, Calenzuola piccola, Papilo (I).

نوع من الفربيون وهو نبات حشيش بري طيب سمر . يرغب في الاراضي المملحة وفي الآخرة الرملية . يكثر في الكروم وعلى جوانب الطرقات . ساقه فروع تملو من ٥٠ الى ١٠٠ سم . عصارته لينة ، لزجة ، يصفاء اللون ، حريفة ، لاذقة ، تستعمل في القضاء على التآكل . اوواله متناقبة ، رعيه الشكل ، صغيرة القذ ، مذبة المقصة . ازهاره عثكولية التجميع وردية اللون .

Poule d'eau (F).

٢٠٦٧٠ - فَرْفَر

هو برهان فرفور ، اطليه .

Guttier (F).

٢٠٦٧١ - فَرْفَرَان

هو الجندم الحدي ، اطليه .

٢٠٦٧٢ - فَرْفَرُون

هو الميراء الزياء ، اطليه .

٢٠٦٧٣ - فَرْفَرُون \* ، فَرْفَرُون \*

Purpura (S). Pourpre (F). Purpura (E). جنس اصداف بحرية كثير الانواع جميعها متشابهة الاشكال متباينة الاحجام يستخرج منها الابرون . احطائها بحار البلاد الحارة والمعتدلة يكثر ويروج في المتوسط .

٢٠٦٧٤ - فَرْفَرُون

سكة بحرية تدعى طرستج اسمر ، اطليه .

٢٠٦٧٥ - فَرْق (F). Delta Céphée, Alfirk

Alfirk, Alphirk (E).

الفَرْقُ نجم من كوكبة قيفاوس يدعى ايضاً « دلتا قيفاوس » وهو من النجوم النابضة للاستسفرة البويع . يبدو ان حجمه يفتق حسب الشمس نحو عشرة آلاف مرة .

٢٠٦٧٦ - فَرْق \* Dichotome (F).

Dichotomous (E).

نمت وصي يستعمل دلالة على الفرق المزدوجة والانصاف والافاندا ؛ تقول ساق فرقة وفن فرق .

٢٠٦٥٤ - فَرْطُوسَة ، فَرْطُوسَة (F). Grolin

هو غظم الخنزير ويصوف بالفتلية ؛ Snout (E).

Sparassie (S).

جنس ضرور من فصيلة الفربيونات . انواعه قليلة تتميز بقصر وفلاظة سمها ، يصفخانة نكمتها القارضة الخدعة التي يبلغ طولها نحو ٤٠ سم . ويصنعيها للترابك الموج . لوها الى العيان التبي وبها الى الصفرة ، لحينها يصفاء القطع خافتة القرب || تركيب جلوح الضنور قشيب عن الحب وانغراف لونه نحو الجوزة المابقة ثم انقراض وانحطت الحواجز الخلووية التي تنتهي دقيقة كالليبار .

٢٠٦٥٦ - فَرْق (F). Branche

Branch, Bough, Limb (E).

كل ضمن غلط وحل انصافاً حلت اقنفاً .

٢٠٦٥٧ - فَرْق ، عَكَب ، سَكِيل

Descendant (F). Descending (E).

هو كل من ولد من اصل في حبل القشب للنسور . الاولاد هم القروم والاباء هم الاصول .

٢٠٦٥٨ - فَرْقَة \* ، قَمَلَة الرَأْس

Pediculus capitis (S). Pou de tête (F). Louse (E).

حشرة من الفربيان ، طولها يراوح من ٢ الى ٣ م . تركيب الرأس . مكها يلى عشان وهو ابيض اللون تنحه الاثني على الشعر فيقتف به ستة او سبعة ايام . والفرد تعيش نحو ٧ اسابيع وتبيض نحو ٣٠٠ مكته .

٢٠٦٥٩ - فَرْقَل (F). Hyenon (F). Young hyena

صغير الفصح ويصلى بهذا ؛ والاثنى فرملة . ج فرامل وفراصلة .

٢٠٦٦٠ - فَرْقَرِيَّات

Pediculidae (S). Pediculidés (F).

فصيلة من القشليات ، اجناسها وانواعها عديدة جميعها صغيرة لينة مغلطلة الجسم المبطط ، صغيرة الرأس ، كبيرة المويينات ، ثوبها الى القطة المابقة || اشهر اجناسها الفرقة والقمة والبطور .

٢٠٦٦١ - فَرْق اَوَّل

الفرغ الاول او فرغ الدلو المقدم منزل من منازل القمر الثانية . دلو اربعة كوكب ، اثنتان منها هما الفرغ الاول ، واثنان الفرغ الاخر || وقب الفرغ الاول يدعى الصرفة .

٢٠٦٦٢ - فَرْق ثان

الفرغ الثاني او فرغ الدلو المؤخر منزل من منازل القمر الثانية . وما لقطر المؤخر من الدلو || وقب الفرغ الثاني يدعى الدلو .

٢٠٦٦٣ - فَرْغُون \* Phryganea (S).

Phrigane, Phrygane (F). Phryganea (E).

جنس حشرات من فصيلة الفَرْغُونِيَّات ورتبة جملونيات الاجنحة . انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم اقطار البلاد . المعتدلة الحارة والحارة || حشرات الجملانة تعيش على اليابسة . اساريها تعيش في الماء لمتلطفة بجلايين متباينة الاشكال مصنوعة بالريال وسحات الاصداغ وقعات المواد الخشبية وغيرها .



فرمة



فرفون



فرفن



فرفورة (صدفة)

٢٠٦٧٧ - **فَرْقَى** (F). Purgative flux (E).  
هو الكتان المسهل .

٢٠٦٧٨ - **فَرْقَى النحل** ، **فَرْقَى النحل**  
Essaim d'abeilles (F). Bee-Swarm (E).  
ثيل من النحل هجر خليته لتسير علياً جديدة .

٢٠٦٧٩ - **فَرْقَاء**  
في الشاة والتمز البعيدة ما بين العينين .

٢٠٦٨٠ - **فَرْقَد**  
الفرقة نجم من كوكبة قنذوس قريب من القطب الشمالي  
يمتدح به . وما فرقدان .

٢٠٦٨١ - **فَرْقَد**  
الفرقد : ولد البقرة وقيل ولد البقرة الوحشية . والفرقد  
كلك .

٢٠٦٨٢ - **فَرْقَع لَوْزٌ** \*  
Agrypnus notodonta (S).  
فرع لوز هو الاسم المصري لشجرة من الساليويات كثيرة  
القد ، طولها نحو ٤٠ سم . فربما الى الحظي الاسمر .  
زبانها متوسطة الطول ، متشاربة الشكل . ارسافها  
خلفية الملل في رفاقها سلكية الجسم ، مستطيلة ، صفراء  
اللون ، تعيش على جلود الثبات وقد تركب البطاطا .  
اغصانها زينة لا تستوي المكافحة .

٢٠٦٨٣ - **فَرْقِيَّة** (F). Dichomyia (E).  
الفرقية ، في علم النبات ، طريقة انقسام جزلي مفرق .  
وفي علم الفلك ، حالة القمر عندما يكون نصفه فقط  
مضاء .

٢٠٦٨٤ - **فَرْقَل**  
الفرق هو المتفرق تشبه من الجسم وما اشبه . يقال لوز  
فرق وجوز فرق ...

٢٠٦٨٥ - **فَرْقَل**  
Baobab acuminé (F).  
هو البوباب الزنقة ، اطبخا .

٢٠٦٨٦ - **فَرْقُولَة**  
Virachola livia (S).  
شجرة من الحرف ، ديدانها تركب القروان . اطبخ حرض  
الربان .

٢٠٦٨٧ - **فَرْقُولَة** \*  
Froloids (S).  
Froloids (F). Froloids (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مهدبات الارجل  
ضمنية القريات . انزاعها المعروفة قليلة المدد متشعبة  
في بحار البلاد المعتدلة الحرارة - اجسامها صغيرة شبه  
اطليجية الشوزن ، حلابة المادة ، شفافة ، صامدة  
الاصداف ، قليلة النفاخات المبهوسة مع سائر الاشياء في  
جراب صغير مركزه تحت البطن .

٢٠٦٨٨ - **فَرْقُولَة مَرْبُكَة** \*  
Vertulia quadrata (S).  
Vertulæ carré (F).

شجرة غاصلة من فصيلة الكورسيات ورتبة عثقات  
الاجنحة . جسمها معتدل التطيط ، مربع البطن ، يطلي  
نحو ١٢ سم . ثوبها الى الحظي المنضب الملوخ . رأسها  
شبه مربع الشكل . غصنها مستطيل . انزاعها ناشز . عيناها  
صغيرتان ، بارزتان . زبانها مستطيلات ، اسودا الطرف .

الفصحة السفل من بطنها تيرة اللون . فوائدها مستطيلة  
الانضاد والفتايب || مرتعها اشباب البراري والحراج .

٢٠٦٨٩ - **قَرْم** ، **قَرْم**  
Hachage (F).  
Chopping (E).  
هو قطع او تجزئة البلف الطويل او الكثير الحجم قبل  
تقديمه الى اللشاة .

٢٠٦٩٠ - **قَرْمَل** ، **قَرْمَلَة** ، **قَرْمَلَة**  
Frein (F). Braka (E).  
اداة الكبح . اشكالها عديدة وظلقة أما اشدائها واحدة .  
ج فرامل .

٢٠٦٩١ - **قَرْمَلْدِيد** ، **قَرْمَلْدِيد**  
Formaldéhyde (F). Formalde-  
hyde (E).  
اطلب فورميد .

٢٠٦٩٢ - **قَرْمَلِين** ، **قَرْمَلِين**  
Formaline (F).  
Formalin (E).  
اطلب فورمالين .

٢٠٦٩٣ - **قَرْمُول**  
Formol  
هو الفورمول ، اطبخه .

٢٠٦٩٤ - **قَرْمُوم** (F). Phormium (S).  
Phormium (S).  
جنس نباتات عشوية معمرة من فصيلة الزنبقيات . انزاعه  
قليلة مغطيا بري . اوراقها قرصية الاكشاف ، ثنائية  
الترتيب ، مستطيلة الجرم . نصلها خطي الصفحة ، جامد  
اللسج البني التركيب . انزاعها كبيرة القند عشوية  
التسبيح ترتكز على شراخض منقصب غليظ || احرف انزاعه  
واشهرها سالي .

٢٠٦٩٥ - **قَرْمُوم كُوك**  
Phormium cookianum (S).  
Phormium de Cook (F).  
نوع من القرميوم الزنبقي . اوراقه تطول من ٦٠ الى  
١٠٠ سم . نصلها قدي الشكل ، بارز الحد ، جامد  
الصفحة ، اخضر اللون ، احمر الكظر . شراخض يعلو  
من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . انزاعها كبيرة القند منقصب ، لونها  
الى الصفرة يعلوها ملوح اخضر || انزاعها يستمر طوال  
فصل الصيف .

٢٠٦٩٦ - **قَرْمُوم مُتَصَلِب** \* ، **قَرْمُوم زَيْلَنْدَة**  
Phormium tenax (S). Phormium tenax, Lin de la  
Nouvelle-Zélande (F). Flax tity, New Zealand flax (E).  
Neuseelandflachs, Zähle Fischlilie (D). Formio  
tigioso, Lino della nuova Zelanda (I).

نوع من القرميوم الزراعي الصناعي . يزرع لاوراقه  
الليفية الشائكة الاستعمال في حق الصناعات النسيجية .  
اوراقه جامدة النصل تطول من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم .  
وتنمض من ٤ الى ٦ نصلها اخضر اللون اسمر الملوخ  
يعلو على كامل استطالته كظر احمر . شراخض الزمري  
يعلو من ٣ الى ٤ انتار . انزاعها كبيرة القند منقصب صفراء  
اللون او حراء .

٢٠٦٩٧ - **قَرْوَن**  
Four (F).  
Oven, Bakehouse, Kiln (E).  
بناء خاص بخلف الاشكال والاصحام ويولد البناء والقيود  
يستعمل في تدبير الحرارة اللازمة لتقادم بعض الاعمال  
الصناعية .



فرع لوز



فرودة



قرميوم متصلب

**٢٠٧٠٣ - فَرْتَجْمَشَكْ Basilic sauvage (F).**

هو الریحان البري ، اطبخه .

**٢٠٧٠٤ - فَرْتَد Rose rouge (F). Red rose (E).**

الفرتد : الوردة الاحمر ويبنى الحرج . والفرتد هو ايضاً حسب الرسنان .

**٢٠٧٠٥ - فَرْتَدَا\* Lagerstromia (S).****Lagerströmia (F).**

شجرة تزيينية من فصيلة الحثائيات . مهدبا الهند . ساقها منتصبة فروعها تملو من ٥ الى ٨ امتار . اوراقها لاطلة ، متقابلة ، يضيئة ؛ نصلها مغزب البشرة يطول نحو ٧ سم . ويبرش ٤ سم . ازهارها متكونية التجميع ، تاجية الاوتكار ، مسطيلة الشكل ، مجمدة البتلات ، وردية اللون . ازهارها يستمر من آب الى تشرين الاوّل .

**٢٠٧٠٦ - فَرْتَدَل Lythrum (S). Salicaria (F).****Loosestrife (E). Blutweiderich (D). Salicaria (I).**

جلس نباتات عريية مسمرة من فصيلة الحثائيات . ازهاره عديدة معظمها بري رموي وبعضها تزييني . سوقها لينة او خشوية . اوراقها لا قياسية الاوتكار منها المتماثلة والمتعابلة والنسية . ازهارها لا نظامية التجميع || اعرف انوعه واشهرها ما يلي .

**٢٠٧٠٧ - فَرْتَدَلْ غَرْفَر Lythrum graefferi, L. meonanum (S). Salicaria de Graeff (F).**

نوع من الفرتدل التزييني . ساقه فروع تملو من ٣٠ الى ٨٠ سم . اوراقه السفلى متعابلة والعليا متماثلة ؛ نصلها مالى البشرة ، صغير اللد ، يطول نحو ٢٥ سم . ويبرش نحو ٥ سم . ازهاره محورية الاوتكار ، فردية التجميع ، بنفسجية اللون . ازهاره يستمر من حزيران الى ايلول .

**٢٠٧٠٨ - فَرْتَدَلْ صَبْدَلْ\* Lythrum salicaria (S). Salicaria commune, Lysimache rouge (F). Purple loosestrife, Willow weed (E). Purpur-Weiderich (D). Salicaria comune, Lysimachia rossa, Varga rossa (I).**

نوع من الفرتدل البري المبلبل . ساقه مغزبة ، فروعها منتصبة ، طولها من ٥٠ الى ٢٠٠ سم . اوراقه قليلة القامة تطول نحو ١٢ سم . وتبرش نحو ٣ . نصلها خلى البشرة على صحنيتها . ازهاره سنبلية التجميع ، حامية الاوتكار ، سفلية البتلات ، لونها اللى الحسرة القرمزية || ازهاره يستمر من تموز الى ايلول .

**٢٠٧٠٩ - فَرْتَدَلْ صُجْجَن Lythrum alazum (S).****Salicaria alida (F).**

نوع من الفرتدل التزييني . ساقه فروع تملو من ١٠٠ الى ١٥٠ سم . فروعها دقيقة فضلة . اوراقه قليلة القامة تطول نحو ٣ سم . وتبرش نحو ١ سم ؛ ازهاره ارجوانية اللون . ازهاره يستمر من تموز الى آب .

**٢٠٧١٠ - فَرْتَدَلْ حُسْتَقْ\* Lythrum virgatum (S). Salicaria effilée (F).**

نوع من الفرتدل التزييني . ساقه منتصبة فروعها تملو من ٥٠ الى ١٢٠ سم . اوراقه متعابلة ، ضيقة ، ثلاثية ؛ نصلها سنانى الشكل ، ذك الاوتكار والطرف ، يطول نحو ١٢ سم . ويبرش نحو ٢ سم . ازهاره سنبلية التجميع ، حامية

**٢٠٦٩٨ - فَرْتَار\* Furnarius (S).****Fournier (F). Oven-bird (E).**

الاسم العلمي والفرتسي والانكليزي يدل على كنية الطائر المألما الى الركة الشبية بالفردن التي يشيها في زمن التزاوج . لغنى بيضه || والفرتار طائر من فصيلة الفرتاريات . موطنه بعض مناطق امريكا الوسطى والجنوبية . يأكل العنايات الكثيفة الاشجار وانحصا الرياش || جسمه مستدل اللد يطول نحو ١٨ سم . ثوبه الى الشفحة الخطية التي لا تختلف من لون القربة . زوره ابيض . متقاده جالس ، مستدل الطرف . حلقة عينه حطية اللون . جناحه مستدل الطول . ساقه دقيقة ، رفيعة ، سمراء اللون || قوته جمع انواع الحشرات وانحصا النمل . يسى على الارض برشفة ويلتقط البزور البرية المختلفة الاجسام || وكنته كالفرن المستدير المسقوف . مدخلها من الجنوب . يشيها بالطين الفرج ، الساف تلو الساف ، على غصن افقي الاستعداد . الذكر والاني يشتركان في العمل . اما طول الركة من الداخل فنحو ٢٥ سم . وعرضها نحو ١٥ سم . وارتفاعها نحو ١٧ سم . ومدخلها على ارتفاع ٦ سم . ويطنانها بالخشيش الناعم والريش والزغب . الانثى تضع ٣ الى ٤ بيضات تحضنها بمناوة الذكر نحو اسبوعين .

**٢٠٦٩٩ - فَرْتَارِيَا\* Furnariidae (S).****Furnariidae (F). Furnariidae (E).**

فصيلة طير من الجوارم لاقتات النمل وبقايات المنكثير . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من طور امريكا الجنوبية والوسطى || اجسامها صغيرة او متوسطة القد . منقشها جاملة قوية ، طولها يعادل طول الرأس . اجنحتها متوسطة الطول ، اطول قوامها الثالثة . اذنانها قصيرة ، وبالم قليلة الصلابة شبه متباعدة . ارسالها رفيعة . اجسامها قوية تم من مناسبتها للسوق على الارض || اعرف انواعها واشهرها الفرتار والجزوزيت والسيتين .

**٢٠٧٠٠ - فَرْتَب Elomys (S).****Lérot (F). Dormouse (E).**

جنس حيوانات لينة قاضية من فصيلة الفرتديات . انواعه قليلة ، موطنها العالم القديم . تتميز بروعها الاسفنية واذاها الكثيرة واذاها الاسطوانية الدقيقة الثالثة اللون . قوتها اللآر وبعض الحشرات . يباتها اللثوي يدم نحو ٦ اشهر .

**٢٠٧٠١ - فَرْتَب شَاكْ\* Elomys quercinus (S). Lérot commun, Lait des jardins (F). Common dormouse, Garden dormouse (E).**

نوع من الفرتب ، طولها ١٤ سم . وذنبه ١٥ ، رأسه وطوره وذنبه الى الصلبة السمراء . صدره وظهره وصفحة ذنبه السفلى بيض . حمار عينيه واذانيه وشيخ ذنبه الى البواد الفحمي || موطنه بعض مناطق الشرق الاوسط والاربية والافريقية . يألف الادغال والحدايق والجناز . يتسلق الاشجار والحدود بغفة مسحة . قوته اللآر على اعتلافت اجنتها . يدخل البيوت المأهولة فيهب الزبدة والحليب والقشع والبيض || جسمه ولكن يديره اينا استطاع . انشاء تقع من ٤ الى ٦ ادراس تسمرك وتكسى بعد اسبوعين لكها وضع نحو ١٥ اسابيع .

**٢٠٧٠٢ - فَرْتَجْمَشَكْ Basilic velu (F).**

هو الحق البري ، اطبخه .



فرتار



فرتب شائع



فرتدال



فرتدل مبفرل

الإرتكاز، سداسية التيلات، لها إلى الحرة النسيجية .  
أزهاره يستمر من حزيران إلى أيلول .

٢٠٧٢٢ - فُرُوجِيَّة

Poulette (F).

Young hen, Pullet (E).

أنثى الفروج وهي الفتية من النسلج .

٢٠٧١١ - فُرُتْسَعُ الأَرَبِ \*

Haemodipus ventricosus (S). Pou du lapin (F).  
Louse of rabbit (E)

حشرة صغيرة من القزليات، طولها يراوح من ملليمتر إلى ملليمترين، جسمها اغبر اللون، يضيء الشكل مفلطح. تركب الأرباب وتزيد.

٢٠٧٢٤ - فُرُوعُ

Orion

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار أو الجوزاء .

٢٠٧١٢ - فُرُتْسَعُ البَقَرِ \* ، دَبَا البَقَرِ

Haemastopinus erythrocephala (S). Grand pou du bœuf (F). Big louse of ox (E).

حشرة من القزليات. طولها نحو ٦ سم. جسمها اكعب اللون، احليجي الشكل عذب الظهر || تركب الأبقار وتؤذيها .

٢٠٧١٣ - فُرُتْسَعُ الجُرَذِ \*

Polyphax spinulosa (S). Pou des rats (F). Louse of rats (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ١ سم. لها إلى الربة القهراء || تركب الجرذ والقار .

٢٠٧١٤ - فُرُتْسَعُ الحَمِيرِ \* ، دَبَا الحَمِيرِ

Haemastopinus asinus (S). Pou de l'âne (F). Louse of ass (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ٤ سم. جسمها يضيء الشكل، غمر اللون || تركب الحمير والبقال والسحل .

٢٠٧١٥ - فُرُتْسَعُ الخنزيرِ \* ، دَبَا الخنزيرِ

Haemastopinus suis (S). Pou du porc (F). Louse of swine (E).

حشرة صغيرة من القزليات، طولها نحو ٥ سم. جسمها مبطل الشكل، اغبر اللون، رأسها عرطوي مستطيل، قرونها الاستعمارية خاسية المقل. عليها دقيق قصير. تركب الخنزير وتؤذيها .

٢٠٧١٦ - فُرُتْسَعِيَّات

Haemastopinidae (S).

Haemastopinidae (F). Haemastopinidae (E).

فصيلة حشرات جليدية من القممقيات. اجناسها نحو ٢٠ جميعها صغيرة الجسم، مفلطحة الشكل، مبطة، كثرة اغلب. قرونها الاستعمارية ثلاثية او خلية البطن. مقامها اوساها حادة وقوية || تركب الحيوانات اللبونة والبق والحامير والالاب والخنزير .

٢٠٧١٧ - فُرُتْسَعُ \* هو الشفنين المعروف ، اطلبه .

٢٠٧١٨ - فُرُتْسَعِيَّة

Vernonia (F).

هي السراغل، اطلبه .

٢٠٧١٩ - فُرُتْسَعُ

الفردود ولد البطل . في فراheid . ومن ثم قال القزاهيم: صدار الغم .

٢٠٧٢٠ - فُرُوجُ ، فُرُوجِيَّة

Fournure (F). Fur (E).

كل جلد يذرى به . ج. فراه .

٢٠٧٢١ - فُرُوج

Poulet (F). Chicken (E).

القي من اللدجاج . ج. فراريج .



فرع الأرب



فرع البقر



فرع الحمير



فرع الخنزير



فرويلة حقلية



فريدي شائع



فريدي شائع

٢٠٧٢٣ - فُرُوجُ هَيْكَلِيَّة

Branches charpentières (F). Carpenter branches (E).

نسيم من دعاما فروع شجرية . هي القزليات التي تعمل الإغصان ويتألف منها هيكل الشجرة الرئيسي .

٢٠٧٢٤ - فُرُوج

Orion

الفروع كوكبة نجوم تدعى الجبار أو الجوزاء .

٢٠٧٢٥ - فُرُوجِيَّة عُسْقُولِيَّة \* ، قَحْمَكُ السَّاقِ

Erwinia asotidea (S). Maladie de la jambe noire (F). Black leg (E).

وصم تشبه بكتيريته من الكرويات . يصير أنواع كثيرة من النبات اصعبا التبع والمفلطح والجذر والبطاطا الخ ... نماز شديد الحق مع القيق يركب الساق فيسم بعض اقسامها به ان يسبب امرداها ولها وقد يمتد إلى السنتج والجذور فيبدو كيقم مسطيلة متشابكة سواء اللون تحوها حالات صر تقضي حل اغشية الساق ثم تحمر السنتج وتلفها. الجروح والحامض ولا تقتك الا في ظروف متاعية معينة اغصبا الرطوبية المستمرة وكثرة القوم او قلة الفصح . اما انتقاله من القرية إلى النبات فيم بواسطة الاوراق السحل التي تلامس القرية .

٢٠٧٢٦ - فُرُوجِيَّه هي السلف ، اطلبه .

٢٠٧٢٧ - فُرُتْسَعُ

Achéridae (F).

هي القزلة من الاسماك الصغيرة الدقيقة ، اطلبه .

٢٠٧٢٨ - فُرُتْسَعِيَّة

Fritillaire (F).

هي المرار نبات من الزيليات ، اطلبه .

٢٠٧٢٩ - فُرَيْدِيَّه هَيْكَلِيَّة

Pagellus (S). Pagel, Pagelle, Pageau, Pageul (F). Bratze, Red porgy (E).

جنس اسماك بحرية من فصيلة الاسبريات ودية شالكت الزعانف . انماها سمكة ، اصحابها مياه المناطق الحارة والمعتدلة . سكة منها تعيش في المتوسط . اجسامها احليجية الشكل طولها يراوح من ٢٠ الى ٧٥ سم . رؤوسها كبيرة القدد . زعانفها الظهرية مسطحة شالكة . انثىها كبيرة الحسرة الممرانية تزود وتزيد وتتوسع بالبيض والاصفر والخطي والاسمر . جميعها مأكلة للذية اللحم . امرها واشهرها الفريدي الشائع .

٢٠٧٣٠ - فُرَيْدِيَّه شَائِع

Pagellus erythrinus (S). Pagel commun (F). Common bratze (E).

نوع من الفريدي كبير القدد ، مرجاني الثوب ، طوله يراوح . عند اكباله يولدونه الاربع سنوات ، من ٦٠ الى ٧٥ سم . وهو من الاسماك المشهورة المستعملة للمزلة في المتوسط .

٢٠٧٣١ - فُرَيْدِيَّه مُسْتَج \* ، فُرُتْسَعُ

Pagellus mormyrus (S).

Pagel marbré, Mourme (F). Mormyrus (E).

نوع من سمك الفريدي . موطنها البحر الايفس المتوسط .

**Physopoda du tabac (F).** ٢٠٧٤٣ - **فُوبِدُ التَبَاقِ** \*  
سحرة من التريسي تركيب اوراقه التبغ تنقطع الخشب  
وتقتصر صناعة الخلابا والتبغ الناضج . اغلب فريز التبغ .

**Sidérite (F).** ٢٠٧٤٤ - **فُوزِر**  
هو الفخاخ نبات طبي من الشفويات .

**Vaseline (F).** ٢٠٧٤٥ - **فُولِغِين**  
هو الزولين ، اطليا .

٢٠٧٤٦ - **فُوسَاةُ الصَّنَوِيرِ** \*  
**Chlorothroa pinicola (S).** **Puasée des pins (F).**  
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيات ، جسمها مفلطح ،  
اعليها الشكل ، يطول نحو ١٢ سم . ثوبها الى الخضار  
الاسمر المولج . يبتلى الى الخطي الاسفر يطول في جانبيه  
تجميع دقيق اسود || ولها شبه عثري ، قطرم الطوف .  
عظمها مثل الطول . صناعا صفراوان . زباناها مستطيلان  
اسمران . كوسها اثير الخطار الخارجي . حشيتها خفاء  
الطوف . ظهرها اريد اللون ، اخضر الخشب . قشرها  
شفاف . قوائمها الى الانقسام اللامس || تركيب اهداب  
الصنوبر || راحتها كرية .

**Ameérine féde (F).** ٢٠٧٤٧ - **فُوسَاةُ الكَلْبِ**  
عثة كرية قرائحة تسمى منة ، اطليا .

**Putréfaction (F).** ٢٠٧٤٨ - **فُوسَاةُ ، فُوسَاةُ**  
**Putrefaction (E).** اضمحلال المواد العضوية بتأثير الجراثيم .

٢٠٧٤٩ - **فُوسَاةُ الكرم ، فُوسَاةُ الكرم**  
**Aubernage, Cabuchage, Court-noué, Roncat (F).**  
مرض فيزيولوجي يجهول الاسباب يصطب الكرم بأكمل  
اصنافها فئول .

٢٠٧٥٠ - **فُوسْتَقِي** \*  
**Pistacia vers (S).** **Pistachier, Pistachio du Levant (F).** **Pistachio tree (E).** **Echte Pistazie, Pistazienbaum (D).** **Pistachio, P. verde (I).**

شجرة زراعية معمرة تعيش من قرنين الى ثلاثة قرون . وهي  
من سبط الفستقيات واسيلة الطيحات . صروبها واصرارها  
عديدة ، منها حوش البحر المشط ، اشهرها الفستق الحلبي  
يختلف اصرامه كالمشوري والمراسي والبائوري والعلمي  
ونساب الجمل . ثم الفستق التريسي والمفرقي والصقل  
والقريسي والاراني . اقلها واسع الانتشار وهو انسج  
من اقليم الزيت لانها تتحمل الصقيع حتى بعض درجيات  
تحت الصفر . غير انها ترفع في الموامع النادرة من الرياح  
تجود وفي المراض الفرية والفرية الشالية || وهي  
تجود في جميع الارابة الخفيفة القليلة الاندماج ، والرافة  
للادة الكلسية ، البادمة الرطوبة المستحكة || تلو  
٤ م الى ٨ امتار وقطر دوحها يراوح بين ٣ و ٧ امتار .  
جلوبها متصبة بكتبة تنور في الارض على اعماق عمدة .  
ساقها متصبة عقدية فراء . اوراقها مركبة ورية . وريقاتها  
اعليها اوبضية الشكل . تصلها مستمس الصفة  
الجامدة الكبيرة الفروع النقيقة المتزاوية . ازهارها ثنائية  
المسكن ، حادمة البتلات ، محورية الارتكاز ، تلتأ على  
الفروع الهولة . الذكرية منها قدية التجميع ، خنسية  
الاسدية ، اما الانثوية مضغوطة وهي وسيدة المبيض  
والغدر . ثمارها زيتونة الشكل تتكون عند اكتمال نفسها

مسرعا قرب الشوط || جسمها اعليها الشكل يطول  
نحو ٦٠ سم . ثوبها الى الشبة الوردية الغضية المولج  
يطولها في جانبيها تسليج اسود والجلل || لحمها جيد  
الصنف في الربيع والصيف ، متوسط في الخريف والشتاء .

٢٠٧٧٢ - **فُورِز**  
**Fraise (F).** **Strawberry (E).**  
هي ثمرة الشيك وتسمى شيل فريز وشيل شيك .

٢٠٧٧٣ - **فُورِزَة** \*  
**Froese (S).** **Frösle (F).** **Frosta (E).** **Kaickschwarte (D).** **Frosta (I).**

نبات طعسي تريسي من فصيلة السوليات . وحيد الجلس  
والنوع ، عديد الفروب والهمين . اوراقه قرصية الانتشاب ،  
سفية الشكل ، ثنائية الصف . ازهاره بريق الشكل ،  
سداسية الاقسام ، صطرية العرف ، منها الابيض والاصفر  
والبرتقالي والوردي الخ ... وهي متباينة الارتكاز من  
جهة واحدة يصعب تفرع تحمل يطول نحو ٣٠ سم . ثم  
يرجح تحت صبه الازهار || ازهاره يستمر طوال  
فصل الربيع .

٢٠٧٧٤ - **فُورِزَة** \*  
**Farysle (S).**  
جلس بطور جمهورية طفيلة من فصيلة الفراخويات تتميز  
بطولها البسيط التركيب ثم بيضا الفسي التجميع  
وبوبتها القرية الانقسام وبكثرة || يصيب السمنيات  
على اختلاف انواعها النباتية .

٢٠٧٧٥ - **فُورِزَة**  
**Prole (F).** **Prey (E).**  
كل ما استعمل عليه الحيوان الفاري لفته .

٢٠٧٧٦ - **فُورِزَة ، فُورِزَة**  
**Acaule (F).** **Acaulous, Stemless (E).**  
الفريز والمقر هو من النباتات ما ينبت على ربة الارض  
ولم يبق على ساق ج . فرائش .

٢٠٧٧٧ - **فُورِزَة**  
**Calocera (S).** **Calocera (E).**  
الفريش : الفريش يمد نتاجها بقسم ليال وهو غير اوقات  
الزهر عليها || والفريش ايضا الثور الذي لا سنام له .

٢٠٧٧٨ - **فُورِزَة** \*  
**Calocera (S).** **Calocera (E).**  
جلس بطور فشاكية من فصيلة البوسيات . الزواة قليلة  
العديد كثيرة الانتشار الذي يم معظم مناطق الشرق الاوسط  
واروية واسريكة الشالية || تعيش على المواد النباتية  
والخشبية المتحللة . اشهر انواعها واصرها الفرية الفرية .

٢٠٧٧٩ - **فُورِزَة لُزْجَة** \*  
**Calocera viscom (S).** **Calocera visqueuse (F).**  
نوع من الفرية . اطليا اقليم الصنوبر في معظم اقطار  
الدالم . تعيش على النبات المتطورة المضة || تحتها غشوي  
الحسية الجاملة . وتنبها متشعبة ، لزجة ، تلو نحو  
٥ سم . ثوبها الى الاصفر القاري .

٢٠٧٨٠ - **فُورِزَة**  
**Fénugrec (F).**  
هي الحلبة الرومية . اطليا .

٢٠٧٨١ - **فُورِزَة**  
هو ولد البقرة الوحشية .

٢٠٧٨٢ - **فُورِزَة**  
**Tigrasse (F).** **Tigress (E).**  
انثى البير وتسمى فزرة ويقال اولها الفز .



فريزة



فريزة لوزجة



فستق



من غلاف خارجي مثل الفستق لونه الى الخضرة يملوها  
تؤشج ربادي . من غلاف داخل خشبي المادة مؤلف  
من مصراعين يتشقان عن صلب أصفر اللون مأكول لمنحه  
قشرة رقيقة لونها الى الخضرة || يتكاثر الفستق بالبذر  
و بالتطعيم . فالفستق بالبذر يكون في شتات خاصة  
تتركز على طبق من الحصى مهمتها استنفاد الماء . وقد  
يم عادة في شهر شباط ويكون ذلك اما نثرًا على كامل  
المثلث او علىخط متوازي يبعد الواحد منها عن الآخر  
من ٣٠ الى ٣٥ سم . ويبقى الفستق في المثلث من سنتين  
الى ثلاث سنوات قبل ان تنقل الى مستقرا || اما الفستق  
بالتطعيم فيجوز على الطير اي الفستق والبط والاعصر  
والمصطكا وعلى مائر اجناس سيد الفستقيات . والتطعيم  
يشر به خمس سنوات في حين ان الفترة لا تشر قبل  
تسع او عشر سنوات || وفيغرة الفستق تبلغ كلال ثمرها  
بسر ٣٠ سنة وتستقر على حالها نحو ١٥٠ سنة قبل ان  
تدخل في طور الانحطاط الذي يدوم نحو نصف قرن .



فستق حبيبه

## ٢٠٧٥٢ - فستق متغاضي \* ، حصص بمسجلة

*Voandzeia subterranea* (S). **فونديزيه**  
*Voandzeia, Pistache malgache, Pois bambara* (F).

نبات عشبي حولي زراعي وحيد الجنس والنوع من  
القرنات الفرافية . هذه البذور الافريقية افراية . ساقه  
معداة . اوراقه مركبة ، مستطيلة الزناد القائم ، ثلاثية  
الورقات الطرفية السانبة المتصال . ازهارها ابوية الارتكاز  
تتشعب على السوق للمادة وهي صغيرة القند ترتكز  
مسائل لغية التسج تغط بالازهار ، به تأييدها وتكوين  
الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعناق تراوح من ٥ الى  
٨ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو الثمار وبفسجها . اما  
الثمار فهي غالبا فردية الحبة واندرًا مزدوجة وهي تحوي  
على البوب غزير المواد الغذائية المروية التي تعتبر من اكل  
الافلاية التي تنتجها المملكة البانائية || يقبل « بوانام »  
وفيره من حلاوة حبوب الفستق المتغاضي انها تحوي العناصر  
الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	١٨,٦٨ %
مواد دهنية	١٦,١٤ %
مواد هيدروكربونية	٧,٠٧ %

زراعتها لا تختلف عن زراعة الفستق حبيبه وانتاج الثمر  
يرواح من ١٥٠ الى ٢٥٠ كيلو من الحبوب المملفة .  
اما شتمه فيحصل كلف فائض اخصها الاقبال لانه  
يكثر الدر ويشط في المواد الزبدية .

## ٢٠٧٥٣ - فستق

*Pistache* (F).  
*Pistachio, Pistachio-nut* (E).  
ثمره الفستق . لياها جامد المكسر . فستق اللون ، لذيذ  
الطعم الخاص واللذكية المشبعة . متوسط تركيبه العنصري  
ما يلي :

مواد آسية	٢٢,٧ %
مواد دهنية	١١,٩١ %
معدلات الكربون	١٣,٠١ %

## ٢٠٧٥٤ - فستقيات (F). Pistacien (E).

سبط من فصيلة البساتيات يشمل ثمانية أنواع منها بعض  
مناطق حوض البحر المتوسط . جميعها اشجار وحميرات  
برية وزراعية وافرة المادة الزرئية القلوة العرف الثامنة  
الاستعمال الصناعي || اشهر انواعها الفستق .

## ٢٠٧٥٥ - فستوجة \* Physostegia (S). Physostégia (F).

جنس نباتات عشبية مسخرة من فصيلة الشفويات . اوراقها  
اعطالية او سنائية مسنة الخشن . ازهارها مثل التجميع  
كازهارها صغيرة وريدة اللون او بقصبية || انواعها المعروفة  
قليلة العدد ، اشهرها التالية .

## ٢٠٧٥٦ - فستق عيّد \* ، قبل سوداكي

*Arachis hypogaea* (S). **Arachide, Pistachier de terre, Pois de terre, Cacahouette** (F). **Earth nut, Ground nut, Pea nut** (E). **Echte Erdnuss, Erdmandel** (D). **Arachide, Pistacchio di terra, Mani** (I).

لبات عشبي حولي زراعي سنائي من فصيلة القرنيات .  
غروبه واسراده عديدة تقسم الى قسمين : الافريقية  
وهي معداة قليلة الزغب والاسيوية وهي متصببة السوق  
زبدية الاصا . جلوره كثيفة متشعبة . سيقه فراء  
مراكية ، اصلا اسطوانية ، اطرافها مفصلة . اوراقه  
متناوبة مركبة لاقامية التجميع يكثر فيها العدد الشفي  
للمركب من زوجين . وريقاتها يفضية الشكل تصلي  
يختلف باختلاف الاصرام منه مالى الصلصة العليا خلي  
السلي كما في الاصرام الافريقية ومنه مذهب الفسفيتين  
كما في الاصرام الاسيوية || ازهارها ابوية تشعب عنه  
قواعد الفروع بين الالدين سمينتين وهي صغيرة القند صفراء  
اللون تتركز على مسائل لغية التسج تشعب بالازهار ،  
به تأييدها وتكوين الثمار ، نحو التربة فتدخلها على اعناق  
تراوح بين ٦ و ١٠ سم . حيث تستقر الى ان يتم نمو  
الثمار وبفسجها || اما ثماره فزبدية ، اسطوانية ، عذوة ،  
مقبضة الوسط . علوها يراوح بالاسية الى غروبها بين  
٢ و ٤ سم . وهي تحوي على البوب او البروين في الاصرام  
الافريقية وعلى ثلاثة الايبب في الاصرام الاسيوية .  
اما البوبها فهو غزير المواد الغذائية المروية التي تتركب  
من العناصر الرئيسية التالية :

مواد ازوتية	٢١,٨٠ %
مواد دهنية	١٠,٧٥ %
مواد هيدروكربونية	١٧,٦٦ %

زراعتها منتشرة في جميع البلاد الحارة اخصها البرازيل  
والكسيك وبعض مناطق امريكا الشمالية وكندا واليونان  
وبصر ولانته . وهو مزروع على الشواطئ البانائية السورية  
الروية الممتدة من حكار الى اللاذقية || يبيد في جميع  
الآربة الزراعية لكاملة التركيب الممكن رجاء . بأصا  
يفضل الزبدية المتوسطة او القليلة الاتساج الدنية بالمواد  
الضوية وبعنصري اليوايس والفسفور || يبلو في  
قديم الواحد من ٦ الى ٧ كيلو من الحبوب المملفة او نحو  
٣ كيلو من الالوبب اي الحب المادم التلاف . وذلك  
في اوامر شهر نيسان . فينتش الحب وتظهر يوارضه به  
البذر بثلاثة اسابيع . معتد يشار بالري ويدوم عليه



فستق ملتاني

٢٠٧٠٦ - فُسْتُوجَة صَغِيرَة الزَّهَر  
Physostegia parviflora (S).  
Physostégia à petites fleurs (F).  
نوع من الفستوجة . ساقها نحيلة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم.  
اوراقها لامعة سنائية الشكل . نصالها منشورية الحار .  
ساقها الزهرية تطول نحو ١٠ سم . ازهارها لينة بنفسجية  
اللون صغيرة القد . تطول من ١٠ الى ١٥ سم . لوفا الى  
الوردي في تنويرها . يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧٠٧ - فُسْتُوجَة مُسَنَّكَ  
Physostegia denticulata (S).  
Physostégia denticulée (F).  
نوع من الفستوجة . ساقها قوية مستدلة الصلبة تملو من  
٢٠ الى ٦٠ سم . اوراقها اطيالية تطول نحو ٨ سم .  
نصالها غشراء اللون القاتم ، مستندة الحار . ازهارها وردية  
اللون ، مستدلة القد ، تطول نحو ٣ سم . تنويرها  
يستمر من حزيران الى آب .

٢٠٧١٤ - فُسْفَات الكِلْس  
Phosphate de chaux, Ph. de calcium (F). Calcium  
phosphate (E).  
مركب فسفوري يستعمل في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٥ - فُسْفَات الكِلْس الطَبِيعِي ، فُسْفَات  
مُعَدَّنِي  
Phosphate de chaux naturel, Ph. minéral (F).  
Natural calcium phosphate, Mineral phosphate (E).  
مركب فسفوري طبيعي يستعمل اما مباشرة في تسميد  
التربة او في تحضير السورفسفات .

٢٠٧١٦ - فُسْفُس  
Peribals (S). Péribals (F).  
فسفس ج . فسفس جيس حشرات شديدة النتن من فصيلة  
الفاصيليات . انواحه عديدة بعضها صغيرة القد ، محببة  
الشكل ، مبطقة . طويلا يراوح بين ٧ و ١٠ مم . اولياها  
مخططة الالوان منها الاخضر الباهت والرمادي والمخضر  
والسج والمزركش . وهي شديدة الافى تركب الاحشاب  
البرية والزراعية وسها البقول والنباتات الصناعية كالتمغ  
والخرنوب .

٢٠٧١٧ - فُسْفُسَة مُنْتَطَلِقَة  
Brachynema cinctum (S). Brachynème cinct (F).  
حشرة مؤذية من فصيلة الفاسيليات . جسمها كثيف  
الحمل القصير ، مفلطح ، مبطط ، يطول نحو ١١ مم .  
لوفا الى الخضار الالسي . رأسها شبه مخروطي . خطها  
ستليل الثلث . عينها ناشزتان . زياتها اخضران .  
كولها احر الحار . صفيها مخروطية الشكل ، يضاء  
الطرف . ظهورها وردي اللون ، اخضر الخنجر . يطها  
الى الخضار الباهت بمخطط حار احر . قشرها شفافة .  
تفرغها الى الخضار الاسفر الاسمر . تركب جميع انواع  
السورفات فتمتص عصارة الارواق والنواهي .  
كروية .

٢٠٧١٨ - فُسْفُطَة  
Phosphatage (F).  
تسميد التربة بالفوسفات . ومنهم من كتبها فسفطة .

٢٠٧١٩ - فُسْفُور ، فُسْفُور ، فُسْفُور  
Phosphore (F). Phosphorus (E).  
جسم بسيط لا يوجد في الطبيعة الا متحدا مع غيره من  
الاناسر . وهو اهم الاغذية الباقية بعد الآزوت . يوجد في

٢٠٧٥٨ - فُسْتُوجَة  
Fistulana (S).  
Fistulana (F). Fistulana (E).  
جنس سيولئات بحرية من الرغويات صفيحيات الغلاف  
وفصيلة الفستوجيات .  
انواعها الفابرة كثيرة البدن بعضها  
من متحبرات الطبقة الطباشيرية ، اما الانواع الماصرة  
فثلاثة بعضها من دويبات امث الصنينة . تمويش قرب  
الشواطئ مدفونة في الرمال المغمورة بالماء . اصداها  
ابوية طليقة .

٢٠٧٦٠ - فُسْخ ، فُسْخ  
Réailliation (F).  
Cancelling (E).  
هو ابطال مدفول عقد بالتفاهل للتعاقد .

٢٠٧٦١ - فُسْجَة  
Eclat (F). Shiver, Splinder (E).  
في الملوحة ، فسج يفسخ عن جلد له .

٢٠٧٦٢ - فُسْدِيَلَا  
Phacidiella (S).  
جنس فطور مجهرية يعرف بالربخ ، اطليه .

٢٠٧٦٣ - فُسْفَات ، فُسْفَات ، فُسْفَات  
Phosphate  
ملح يحصل من امتزاج حامض الفسفوريك بالحق  
الفرامد من معادن او ظلال او غيرها كالبيوتاس والكلس  
والحديد الخ . وهو من الاسماء الزراعية الجزئية للتع  
الي تعد التبايت بمضخ الفسفور . مصادوه عديدة تقسم  
الى خمس فئات :

١ - فُسْفَات الفسفور الطبيعي وهي تشمل الابيت والبرال  
الفوسفاتية والطباشير الفوسفاتية والفوسفات الحجر  
والفسفوريوت ...  
٢ - فُسْفَات الفسفور الصناعي وهي تشمل مختلف مساحيق  
النظام وبياد النظام .  
٣ - فُسْفَات المستخرجة من التدين وهي تشمل  
التريال اي السكوري حل اختلاف انواحه .  
٤ - فُسْفَات التي حولت حكما وكيمياويا وهي  
تشمل البازوفسفات والفوسفات الراسب ...



لسعة

في نصل حادٍ الخضر ثم تصفر وتبيس، فتذبل الأوراق وتعيها وتيت النبات. راجع سرج.

٢٠٧٧٨ - **فُشَيْكَة** *Cisticola ornithina* (F).  
هي الكروان الليل طائر من الشبليات. اطلبه.

٢٠٧٧٩ - **فُشَيْكَة** *Rejston* (F), *Shoot* (E).  
كل رلة أو قصب ينمو على ارضية تغطي مساح الأتربة.  
ج. فائتل. والفائتل صغار النخل تنزل تنزل تنضم قصير نخلة.

٢٠٧٨٠ - **فُشَيْكَة، فُشَيْكَة، فُشَيْكَة**

*Physiologie* (F), *Physiology* (E).  
علم يبحث عن ظواهر الحياة في الياهي ومن وظائف أعضاء الخلقة.

٢٠٧٨١ - **فُشَيْكَة** *Bryone* (F).  
هو الفانرا، اطلبه.

٢٠٧٨٢ - **فُشَاغٌ، فُشَاغٌ** *Smilax* (S).  
*Salsaparella*, *Smilax* (F), *Sarsaparella* (E).

جس نباتات ليفية معمرة من فصيلة الزنبقيات. أنواعه المعروفة نحو ٢٠٠٠ صيها جنات سريعة، معظمها بري وبضها زراعي. أوراقها ابيضاء، معققة، متعاقبة، لاتناسية الشكل، كثيفة العروق. أنواعها صغيرة القد ثلاثية أو خماسية البلات. انفرها صبراني أو صخوي، التجميع، ابطي الايزنكار. ثمارها عتيبة. أفرع أنواعه وأشهرها ما يلي.

٢٠٧٨٣ - **فُشَاغٌ أَمْرِيكِي**  
هو الأرابية الفارسية، اطلبه. *Salsaparella d'Amérique*

٢٠٧٨٤ - **فُشَاغٌ صِينِي، فُشَاغٌ قاسم**  
*Smilax aspers* (S), *Smilax ruda*, *Salsaparella d'Europe*, *Lisaron épineux* (F), *Prickly ivy*, *Rough bindweed* (E), *Stachwind* (D), *Smilax*, *Smilaclo*, *Rovo cervino* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري المبدول. ساقه ليفية سريعة مضطعة تملو من ١٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه قلبية القامة، نصلها جامد التسيج الأخضر اللامع الشائك الحافة. ثماره خر || أنثراره يستمر من آب إلى تشرين الأول.

٢٠٧٨٥ - **فُشَاغٌ شَالِك**  
*Smilax bona-nox* (S), *Smilax épineux*, *Salsaparella bonne-nuit* (F), *Rough bindweed* (E), *Rauhe Stachwind* (D), *Smilax spinosa* (I).

نوع من الفشاغ الطبي البري والزراعي. ساقه ليفية سريعة تملو من ٢٠٠ إلى ٣٠٠ سم. أوراقه اطيحية الشكل. نصلها متينض الوسط، جامد التسيج، سامي العروق، شائك الحافة || أنثراره يستمر من نيسان إلى تموز.

٢٠٧٨٦ - **فُشَاغٌ صِينِي**  
*Smilax china* (S).  
*Smilax de Chine*, *Salsaparella squina*, *Squina* (F), *China smilax*, *Chinese root* (E), *Chinastachwind*, *Chinaswurzel* (D), *China carnos*, *Salsapariglia della China*, *icina* (I).

نوع من الفشاغ الزراعي مهدد الهين. جدو وبذو الشكل تكتنه بعض البساتين المستصلحة اشمراء اللين. ساقه ليفية قليلة الشوك. أوراقه بيضية الشكل، قلبية القامة، مدينة المعققة، نصلها جامد التسيج الأخضر اللامع،

الأربة الزراعية وفي التيج النباتية والحيوانية لاسيا في النظام || والفشور اخر جسم صلب، شفاف، كوري اللين، كربة الرائحة، نضبط للملدة البامة القفظة. يتألف من الفلام، يستعمل في الهواة ولا يلوب في الماء. ريز (فر) ثقلة النضي ١٨٤ و١٩٨ و٢٠٩٨ و٣٠٩٨ ينصر بمزارة ٢٠٢، ٤٤ سم حيث يناع كالزيت ويصل ٢٩٠ سم || ويوجد ايضا الفشور الاخر الذي يحضر من الكوري بالتسجين المائي، وهو اخر اللين عادم المم والرائحة لا يتألف في الفلام ولا يستعمل الا عند ٢٦٠ سم. يستعمل في عدة صناعات انصها صناعة القباب.

٢٠٧٧٠ - **فُشُورِيَت** *Phosphorus*  
نوع من فسلات الكلن الطبي للتصير للشعبي الطول. يستعمل في تحضير الفشور والسوريفانات.

٢٠٧٧١ - **فُشُكُلٌ، فُشُكُلٌ، فُشُكُلٌ** *Dernier* (F), *Loat* (E).

الفرس الذي يبي في الحلية آخر الحمل.

٢٠٧٧٢ - **فُشُكُلٌ** *Plançon*, *Plantard* (F), *Sapling* (E).  
هو كل قصب كبير من الخور والصفصاف وما شبه شارب وحضر للفرس ان في الهندلة او في المستقر.

٢٠٧٧٣ - **فُشُكُلٌ** *Bouture* (F), *Slip* (E).  
هي البقلة كما انزمت قبل ثقلها وتحضرها للفرس.

٢٠٧٧٤ - **فُشُكُلٌ** *Phasma* (S).

*Phasma* (F), *Phasma* (E).  
جس حشرات من فصيلة الفسيدات. أنواعها المعروفة عديدة اطلبها غابات البلاد الاستوائية والحارة || اجسامها اسطوانية ثنية القفبان طولى من ٦ إلى ٤٠ سم. تعلوها مناس حادة. رؤوسها صغيرة. قربها الاستعمارية دقيقة مستطيلة. اجنتها، عند بعض الانواع، نسيقة، شائعة مستطيلة الطول، وعند البعض الآخر جداد لا عمل لها. قوائمها مستنة الانخاذ والسفان والارباع || ألويها تمانى البيئة وهي غالباً بلون الاثان والقفبان.

٢٠٧٧٥ - **فُشُكُلِيَت** *Phasmidæ* (S).  
*Phasmidæ* (F), *Phasmidæ* (E).

فصيلة حشرات من مستقيبات الاجنحة. اجناسها وانواعها كثيرة المدن معظمها من احقير العصر البليستوساني المالك الى اوائل الابراج الرابع. اما الحاضر فيها فلا يقل من ٢٠٠ نوع معظمها من حشرات الغابات الاستوائية والحارة || من ميئات حشراتنا انها جبانة الاشكال والاحجام تمانى المواعف التي تقم فيها. بضها يشبه القفبان والبعض الآخر يشبه الأوراق || افرع اجناسها واشهرها القسمة والقليلة.

٢٠٧٧٦ - **فُشُكُلِيَت** *Rachitisme* (F).  
هي الخرامة، اطلبه.

٢٠٧٧٧ - **فُشُكُلِيَت، مَرَكَج** *Mosaïque* (F).  
*Mosaic* (E).

مرض يكبري يصيب بعض النباتات انصها التبغ والبطاطا والخس. يقال انه ينتشر بواسطة بعض انواع الارق. مظهره الخارجي يقع سريحية الشكل والرتيب، لاقباسة المدم، تركب فسج الأوراق قصب مطلة اللين



س

Stace (F). ٢٠٧٩٥ - **فُشَاغَش** - **فُشَاغَش**  
هو الأربيل وأحدته نشفاشة .

٢٠٧٩٦ - **فُشَق** - **فُشَق** : تباد ما بين القرنين .

Roncet (F). ٢٠٧٩٧ - **فُشَل الكَرَم**  
هو فسالة الكرم ، اطليا .

Synchronisme (F). ٢٠٧٩٨ - **فُشَن** ٥  
Synchronism (E). الشن والإفشان وأسد .

Synchronique (F). ٢٠٧٩٩ - **فُشَنِي** ٥  
Synchronistic (E).

Carposcene (S). ٢٠٨٠٠ - **فُشَيْغِيَّات**  
Carposcées (F). Carposcées (E).  
مرتبة فطور مجهرية من رتبة الزقيات . تتميز بأوراقها  
المحفولة في الإصان . فصائلها أربع الإردادات  
والخساريات والمفشيقات والزقيات .

Dicranocère (F). ٢٠٨٠١ - **فُشَيْغ** ٥  
Dicranoceros (E).

لعت قمريني يطلق على كل حيوان منشعب القرن وعلى  
كل حشرة منشعبة الأربان .

Smilacina (S). ٢٠٨٠٢ - **فُشَيْغَة** ٥

Smilacine (F). Smilacina (E).  
جنس نباتات عشبية ممررة من فصيلة الزقيات قريبة  
الشيء من الفُشَاغ . سيقانها مدادة كاسية . أوراقها متعاقبة  
خلفية الصفحات السفل . أزهارها عنقودي التجميع  
طولي . ثمارها عنية ٥ تزرع القرنين في معظم الموام  
لاتها لا تنضج البرد . تروث في الإترية المعدلة الانساج  
الوافرة المواد الغذائية من عضوية وبمعدنية ٥ أنواعها  
المعروفة قليلة أشهرها التالية :

٢٠٨٠٣ - **فُشَيْغَة بَكَلِيَّة** ٥

Smilacina oleracea (S). Smilacina légumière (F).  
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا جيل الهند والافغان .  
ساقها تطول نحو ١٢ سم . أوراقها متصلة البد ، سنانية  
الشكل ، تطول من ١٥ إلى ١٨ سم . أزهارها عنقودي  
التجميع . أزهارها وردية اللون ، جلبة الشكل . ثمارها  
عنينة أرجوانية ملوفا موج ودي ٥ تنويرها يستمر  
طوال شهر ايار .

٢٠٨٠٤ - **فُشَيْغَة عُنُقُودِيَّة** ٥

Smilacina racemosa (S). Smilacine à grappes (F).  
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا بعض مناطق أمريكا الشمالية .  
ساقها تطول من ٦٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقها سنانية الشكل  
تطول من ٨ إلى ١٥ سم . وتعرض من ٣ إلى ٧ سم .  
أزهارها عنقودي التجميع ، كثير العدد ، يطول نحو  
١٠ سم . أزهارها بياض اللون . ثمارها عنية ، بنسجية ،  
حرة ٥ تنويرها يستمر من ايار إلى حزيران .

٢٠٨٠٥ - **فُشَيْغَة تَجْمِيَّة** ٥

Smilacina stellata (S). Smilacine étoilée (F).  
نوع من الفُشَيْغَة . مهدا الشرق الأدنى . ساقها متبادعة  
الأوراق ، تطول من ٤٠ إلى ٦٠ سم . أوراقها قليلة العدد ،

عادم الفوك ٥ حائله مأكولة وهي لا تتحلل من بعض  
الناصر الطبية الناقمة .

٢٠٧٩٧ - **فُشَاغ مَعْرُوفِي** ٥ ، **صَبْرِين**  
Smilax officinalis (S). Salepareille officinale (F).  
Sarsaparilla (E). Salsaparilla (D). Salsaparilla offi-  
cinalis (I).

نوع من الفُشَاغ الطبي البري والزراعي . حائله اهليلجية  
الشكل ، جوية اللون ، شائكة الاستعمال الطبي . ساقه  
ليفية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم . أوراقه بيضيه الشكل ،  
نصلها جامد النسيج عابن الحفرة اللامعة ، شائك الحافة .

٢٠٧٨٨ - **فُشَا**  
Gousse d'anagry (F).  
Shell of bean-traufol (E).

هي حنبله ألبون تطول نحو ١٥ سم . وقمرن نحو ٢ سم .  
زورها مستديرة ، مفلطحة ، قلبية ، بنسجية اللون ،  
جسمانية المادة الخشبية . ج نش .

٢٠٧٨٩ - **فُشَرَا**  
Bryone (F).  
هي الفشار ، اطليا .

٢٠٧٩٠ - **فُشَع**  
فُشَع النبات . يست اطراشه . وفُشَع الأرة : يست اطرافها  
فُشَان قلفها .

٢٠٧٩١ - **فُشَع** ٥ ، **مِيَالِيَّة**  
Podocarpus (S).

Podocarpe (F). Chinese yew tree (E). Podocarpus,  
Steineib (D). Podocarpus, Lauro del Giapone (I).  
جنس أشجار سربية وزينية من فصيلة السنوبريات  
الطقسويات . أولاه نحو ٤٠ سم . جميعها من أشجار المناطق  
الحارة والمعتدلة . سيقانها مستقيمة تملو ، حسب الأنواع ، من  
مترين إلى ٢٥ م . أوراقها متعاقبة ضيقة النصل السيك .  
أزهارها الأكرية قدية الشكل اما الإثوية فضلية التجميع  
وهي عمودية أو طرفية الإرتكاز ٥ أغصانها ضلحة لا  
يتفرعها فساد ٥ أشهر أنواعها ما يلي .

٢٠٧٩٢ - **فُشَع قَلْبِي الرَّقْز**

Podocarpus nerifolia (S). Podocarpe à feuilles de  
laurier rose (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سر روية تملو من ١٥  
إلى ٢٠ م . أغصانها غارشة لا متدلة . ثنائيات سيبانية الشكل .  
أوراقها مستقيمة الإرتكاز ، منجلية الشكل ، تطول  
من ١٥ إلى ٢٠ سم . وتعرض من ١ إلى ٢ سم .  
زورها أرجوانية اللون ، بحرية المراج .

٢٠٧٩٣ - **فُشَع كَبِير الرَّقْز**

Podocarpus macrophylla (S). Podocarpe à grandes  
feuilles (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية وزينية جميلة الشكل تملو  
من ١٥ إلى ٢٠ م . ثنائيات غارشة لا متدلة . أغصانها انقية الإرتكاز  
متدلة الأطراف . أوراقها جالسة تطول نحو ١٢ سم .  
وتعرض نحو ١ سم . زورها سنوبرية الشكل ، جوية  
اللون تطول نحو ٢ سم .

٢٠٧٩٤ - **فُشَع نَاجَمِي**

Podocarpus nageia (S).  
Podocarpe Negi (F).

نوع من الفُشَع وهو شجرة سربية سر روية تملو من ١٥  
إلى ٢٥ م . أغصانها غارشة متدلة الأطراف . أوراقها  
بيضية سنانية تطول نحو ٩ سم وتعرض نحو ٤ . نصلها  
أخضر الصفحة العليا ، أصفر السفلى . زورها تكبر  
نحو ٢ سم . وهي جوية اللون . بنسجية المراج .



فُشَاغ عَرُوفِي



فُشَع

ملونة || معظمها يعيش تحت الحجارة وبعضها في قرى النسل. قوتها المواد العشوية والنباتية المنحلة || أشهر أجناسها **الفصّاع**.

### ٢٠٨١٧ - فصّة ، فصصّة ، رطبة ، قصب

Medicago (S), Luzerna, Lupulina (F), Lucerne (E).  
جنس نباتات عشبية معمرة من فصيلة البقوليات. أنواعه عديدة منها البرية والزراعية جميعها مرموقة طبية. جلودها رتيبة قليلة الانقسام تنور نحو ٢٠٠ سم. موطنها مستنقبة فرسا. اورقها مركبة ثلاثية الورديات، زنادية الرصل اي العليا. ازهارها عقدوية التجميع فيها الالبيس والازرق والبنفسجي. ثمارها حنابل سطولية تلتفت بالزور. يزورها خفيرة ، دليقة ، لوتيا الى الجوزة يملأها مواج اغصر او اسفر || احرف انواعها واشهرها ما يلي .



فصّة مزروعة

### ٢٠٨١٨ - فصّة برية ، قتب

Medicago ciliaris (S), Luzerna sauvage (F), Sea hedgehog medick (E), Hornigal, Dornenkron (D), Medica salvatica, Trifoglio tarpeterra (I).  
نوع من الفصّة البرية تكثر في المواقع المتفلة الرطوبة اغصها الجبال. وهي من اسود النباتات المرموقة الطبية. تتميز بكثافة زيتها ويذهب حار وريقتها. ازهارها الى الزرة المايقة .

### ٢٠٨١٩ - فصّة مزروعة ، فصصّة مغروكة ، برسيم حجازي

Medicago sativa (S), Luzerna cultivée, Trèfle de Bourgne (F), Lucern, Alfalfa, Common medick (E), Luzerna, Blauer Schneckenklee (D), Luzerna, Medica, Marica, Lupinella (I).  
هي الفصّة الزراعية الكثيرة المشهورة بما تحويه من مواد غذائية منبهة (رابع حلف) || فروها دقيقة مستنقة قليلة الحبل. وريقتها قليلة الانقسام للموت. ازهارها بنفسجية اللون || تزرع في جميع البلاد المعتدلة الحارة. تقم في الخيف الواحد نحو ١٢ سم. ترطب في الازرة الميعقة النور، المعتدلة الانقسام ، اللينة يناسر الكلس والفسفور والبوتاس. وهي تحشى الازرة الطينية والطبية الجسيمة || تحشى في العام الواحد من اربع الى ثمان مرات. اما سبب هذا التفرق فيميد الى الاكلم وموقع الزراعة واسكانية الري || اما متوسط انتاج الدقم في الحقل الواحد فتراوح بين ٣٥٠٠ و ٤٠٠٠ كيلو حطب اغصر. واذنا قسنا لانتاج بالكامل الجفاف الى العلف فيكون متوسط محصول الدقم السنوي من ٧٥٠ الى ١٢٠٠ كيلو .



فصّة مشجرة

### ٢٠٨٢٠ - فصّة مشجرة ، قصاص

Medicago arborea (S), Luzerna en arbre (F), Tree medick, Moon trefoil (E), Baumartiger Schneckenklee (D), Erbs medica arborescente, Medica citro (I).  
نوع من الفصّة البرية وهي جنبة فرسا تطل من ١٠٠ الى ٢٥٠ سم. وريقتها بيضية الشكل ، جبلة اغصان البصري . ازهارها متجمجمة مسحية العرف الخابت. يقال انها طيبة ازهارها تقيد الاسه .



فصحاء

### ٢٠٨٢١ - قصصّ

Déplétion (F), Depletion (E).

### ٢٠٨٢٢ - قصصاء ، قارة الصحرعاء

Mus barbarus (S), Souris de Barbarie, S. du desert (F).  
نوع من الجرذ صغيرة القد موطنها فصيح الاربعاء يمتد من افريقية لثيالة الى الصحراء وغنية. طولها نحو ١٠ سم.

سنانة الشكل ، لاطقة ، طول من ١٥ الى ١٠ سم. وتعرض من ٢ الى ٤ سم. ازهارها شكولي التجميع . ازهارها منبسطة البتلات ، نجمة الشكل ، غصراء اللون ، يفس الحفاف . ثمارها عتية شديدة الحمرة القائمة || تنويرها يستمر من ايار الى حزيران .

### ٢٠٨٠٦ - قصصّ

Caeux, Cayew (F).  
من التوية وانباحها .

### ٢٠٨٠٧ - قصصّ ، قلك

Lobe  
كل جزء من الورقة او الزرة بالغ التفرير مستدير .

### ٢٠٨٠٨ - قصصّ لجمكار

هو الاقسن ، اطبله .

### ٢٠٨٠٩ - قصصّ التلك

Loge pollinique (F).  
Pollinic call (E).  
غشاء يلف جدرات الطلع في تلك الزرة .

### ٢٠٨١٠ - قصصّ حيدكري

Lobe parétal (F).  
Parietal lobe (E).

### ٢٠٨١١ - قصصّ ككي

Lobe maxillaire (F).  
Maxillary lobe (E).

### ٢٠٨١٢ - قصاصة

القص حب الزبيب . الواحدة قصاصة .

### ٢٠٨١٣ - قصاص ، قصصّ

Saignée (F), Bleeding (E).  
فتح عرق الدم .

### ٢٠٨١٤ - قصاع

Syrinx, Siringe (F), Syrinx (E).  
الفصاع عضو الصوت في الطير . مركزه عند انقسام القصبة الرئوية .

### ٢٠٨١٥ - قصاع

Thoricetus (S).  
Thoricet (F), Thoricetus (E).  
جنس حشرات من فصيلة الفصاعيات ورتبة غفجات الاجنحة . انواعه المرموقة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط ، اغصها المعتدلة من لبنان الى اليونان || اجسامها صغيرة ، معتدلة الانحداب ، طولها نحو ٣ م. وروسها غروبية . حيوها بارزة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قوتها الاستثنائية دويبة الاطراف ، جانبية الارتكاز . كواسلها قصرة ، معدبة . الحامدا مائلة ، لاطقة . قوائمها نشطة . ازواجها وسيدة اللون ، تكثر لها الشفحة السوداء فالدبة فالجوزة || تمش تحت الحجارة . سرعها دجوي . قوتها المواد العشوية والنباتية المنحلة .

### ٢٠٨١٦ - قصاعيات

Thoricetidae (S).  
Thoricetidae (F), Thoricetidae (E).

فصيلة حشرات من غفديات الاجنحة . اجسامها واثرها المرموقة قليلة العدد ، اصطلها بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اجسامها صغيرة ، معتدلة التطيط ، طولها من ٢ الى ٤ م. وروسها غروبية الشكل . حيوها بارزة . تأثيرها وبلاستها نظامية . قوتها الاستثنائية دويبة ، مركبة من ١١ فصلة . كواسلها معدبة . الحامدا لاطقة . قوائمها نشطة . اسرارها لحسية القمل . الواجا

Sépale (F). Sepal (E).

٢٠٨٣٣ - فصيلة

ورقة كأس الزهرة. ومنهم من سماها كأسية.

Métacarpe (F).

٢٠٨٣٤ - فصيلة الرُسع الأوتى

Metacarum (E).

هي فرسغ، أطليه.

Phasmoptera (S).

٢٠٨٣٥ - فصليات

Phasmoptères (F). Phasmoptera (E).

رتبة حشرات من طبقة مستقيبات الجناح. فصائلها وأجناسها وانواعها كثيرة البلد معظمها كبير القد لاقيا الشكل والون || وهي تتميز بتضيقها الصغيرة وبسيفانها القصيرة التي لا يمكنها من القفز، يمكن أثنائها كبير الحجم يشبه بر الحنطة.

٢٠٨٣٦ - فصيلة هي الفاصوليا، أطليه.

Cisticole (F).

٢٠٨٣٧ - فصيلة

هي الكروان طائر من الخلدات، أطليه.

٢٠٨٣٨ - فصيص

صوت الجنادب.

Lobula

٢٠٨٣٩ - فصيص

٢٠٨٤٠ - فصيصي، فليبي

Lobulaire, Lobulé (F). Lobular (E).

ما كان شكله أو تفريره يشبه الفص أو اللقطة.

Polystigma (S).

٢٠٨٤١ - فصيلة

جنس فطور مجهرية من السناخيات وفصيلة المشويات تتميز بوليصة مدلية جامدة القصر الآخر. أصانها كثيفة. يونها بسيط التركيب، أحليبي الشكل، ثماني العدد، تتجمع تكات يفضية لونها إلى السرة الفاتحة || له نوزان مؤذان هما فصيلة الخوخ وفصيلة الوز.

٢٠٨٤٢ - فصيلة الخوخ

Polystigma rubrum, Libarsetta rubra, Polystigmia rubra (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق الخوخ فيذبلها ويؤذي الشجر. مظهره الخارجي يقع لاقية الشكل والحجم تملو نصل الاورق فتبدو صفراء اللون ثم حراء ينفسجها خلايا النسيج تتسحب ذبل الاورق وأحيانها الباكر ثم ازهار الشجرة في تشرن بعد أن تفقد عليها دورتها الحولية الطبيعية. يكاثف بأشكال سائل يورود الحلو ١ ٪ ثم يؤد المقعد. ومن الأنفلل إعادة النسيج مرة ثانية تكون بعد الأولى بثلاثة أسابيع.

٢٠٨٤٣ - فصيلة اللوز

Polystigma ochraceum, Polystigmia (S).

فطر مجهرى يصيب أوراق اللوز وهو شديد الشبه بقصبة الخوخ || مظهره الخارجي يقع لاقية تملو نصل الاورق لونها إلى الجؤوة الباقية تسحب خلايا النسيج وتسبب الاحمال الباكر الذي يفسد الشجرة بعد أن يفقد عليها أركان دورتها الحولية || يكاثف كالمخوخ باستمال سائل يورود الحلو ١ ٪

٢٠٨٤٤ - فصيل

الفصيل: ولد الهيبة إذا فصل عن رضاع امه.

وذئها ١٢ سم. ثوبها إلى الصبغة الصنايية، يملو ظهرها عشرة خطوط سم قاطبة. بطنها وخولها جرمزها بيض. جرحها سرداب قسيح حديد الانفاق والمناظ تحزن فيه ما تكثره من حيوب وجبور.

Coprinus (S).

٢٠٨٢٢ - فصيلة

Coprini (F). Coprinus (E).

جنس فطور من فصيلة الشارقيات. انواعه المعروفة قليلة البلد أطالها بعض مناطق الشرق الأوسط وأروية. تعيش في التربة على الدبال ومل المواد النباتية المنحلة في المراتق المنحلة الرطبة. معظم انواعها سريع الطيب والازوال. بعض انواعها كثيف التجميع، كشته تد من ١٥ إلى ٢٥ ذوباً || أشهر انواعها الفصيلة القرفة والفصيلة السوداء.

٢٠٨٢٤ - فصيلة سوداء

Coprinus stramentarius (S).

Coprini noir d'encr (F).

نوع من الفصيلة المأكولة. لحيتها متحطة الصنف. اوسيتها قمية الشكل، معتدلة الحجم، سمراد اللون، يطوها موج أريد اسود. ساقها معتدلة الطول، ريداء اللون، يكتنفها طرق شتالي المادة لاقيا الارتكاز.

٢٠٨٢٥ - فصيلة قرفة

Coprinus comatus (S). Coprin chevelu (F).

نوع من الفصيلة المأكولة. لحيتها جيدة الصنف في أول مدها ثم ليفة عند الإدراك التام. اوسيتها كبيرة القد، ككتانية الشكل، لونها إلى الريدة المروحة بالاسر المالح. ساقها معتدلة الطول، حطاه اللون، يكتنفها طرق كالسول لاقيا الارتكاز يكثر ويؤده في القسم الأعل.

٢٠٨٢٦ - فصيل

نوع من المغرب ويقل ولدا الصغير.

Cresels (S).

٢٠٨٢٧ - فصيلة

Créséls (F). Cresels (E).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات مجنحات الاريل وفصيلة اللتانيات. انواعها المعروفة عديدة منتشرة في جميع بحار البلاد الباردة والمعتدلة الحرارة بما فيها البحر الأبيض المتوسط. جميعها مية تعيش بعيداً عن الشطوط. اسرارها وافرعة العدد || اجسامها صفيرة. اديتها أو زعانفها قليلة الانفلاق. اصداها خروزة اللون، مسقة الأطراف، شائلة، سريعة الطيب.

Phosphore (F).

٢٠٨٢٨ - فصفور

هو الفسفور، أطليه.

٢٠٨٢٩ - فصيلة هي الفصة، أطليه.

Sevrer (F). To wean (E).

٢٠٨٣٠ - فصل، فقم

فصل الحليب من الرضغ.

Saison (F). Saison (E).

٢٠٨٣١ - فصل

الفصل زين من زينة السنة الاربية وفي الربيع والصيف والخريف والشتاء.

Disjonction (F).

٢٠٨٣٢ - فصل

Severance of causes (E).

هو في قانون المرافعات الفصل بين قضيتين كانتا متصلتين حتى تنظر كل منها على حدة.



فصيلة سوداء



فصيلة قرفة



فصيلة



فصيلة الخوخ



فصيلة اللوز

## ٢٠٨٥٢ - فضية

Protas (S).  
Protée (F). Silver tree (E). Protéusstrauch,  
Silberbaum (D). Prosea, Legno argentino (I).  
جنس نباتات جنبية ممرنة من فصيلة الفصيات. أنوارها  
حليمة مغطىها بري وبضها زبرني. أوراقها صغيرة  
الحجم، كاملة النصل الفضي، أنوارها زرقية، طرفية،  
ترشح الرقيق بنزارة وهي كبيرة القند، إرسوانية اللون  
أو تستقي أو للكية. أحشائها خفيفة تنبت تسعمل في  
عدة صناعات || أشهر أنوارها ما يلي.

## ٢٠٨٥٣ - فضية بهية

Protas speciosa (S).  
Protée superba (F).  
نوع من الفضية وهي جنبية زرقية تملو نحو ٢٠٠ سم.  
أوراقها معتقة قصيرة الزنادة، نصلها بيضي الشكل يطول  
من ٨ إلى ١٢ سم || أنوارها زرقية، خضرة، كبيرة  
القند، يضاء اللون، حراء الزهر، قنابها ملعنة  
الصفحة، كثيفة الإهاب المزينة، سود الحنار.

## ٢٠٨٥٤ - فضية حرسكية

Protas cynaroides (S).  
Protée arduant (F).  
نوع من الفضية وهي بملة زرقية مرسوية تملو من ٥٠  
إلى ٦٠ سم. أوراقها معتقة مستطيلة الزنادة، نصلها بيضي  
الشكل يطول من ٨ إلى ١٢ سم. صفحت خلية البشرة  
الفضية || أنوارها زرقية، خضرة، حراء اللون أو  
وردية، حجمها حجم كوز الأرضي شوكي الكبير القند.

## ٢٠٨٥٥ - فضية مستطيلة لوزق

Protas longifolia (S). Protée à longues feuilles (F).  
نوع من الفضية وهي بملة زرقية تملو نحو ١٠٠ سم.  
أوراقها سنانة مستطيلة طويلا يراوح بين ١٥ و ٢٥ سم.  
أنوارها بنفسجة عاقبة. قنابها بحرية الخضار يطولها  
تشيح لوزق || أنوارها يستمر من أيار إلى آب.

## ٢٠٨٥٦ - فضية مئثرية

Protas mellifera (S).  
Protée mellifère (F).  
نوع من الفضية وهي جنبية زرقية تملو من ٢٠٠ إلى  
٣٠٠ سم. أوراقها خلية تملو من ٨ إلى ١٢ سم. وترفض  
من ١٠ إلى ١٥ سم. نصلها مائل البشرة، ذلق الزنم  
الأخضر || أنوارها وردية أو يضاء اللون، كبيرة القند،  
غزيرة الرقيق الفشري، قنابها دقة الصفحة الداخلية  
وهي حراء اللون مجتمعة بالاسود || أنوارها يستمر من  
كانون الثاني إلى نيسان.

## ٢٠٨٥٧ - فضية

Jus de raisin (F).  
Juce de grapes (E).  
عصير العنب يتم ويحفظ في القناني المحكمة البعد فلا  
يغترس.

## ٢٠٨٥٨ - فطاح

Pollination (F). Pollinastion (E).  
الفتح زبن ظهور الطلع وانتشاره عند النبات.

## ٢٠٨٥٩ - فطاحة

Autogamia (F).  
Autogamy (E).  
هي الإخصاب الذاتي الذي يرتكز على تأثير ملقة الزهرة  
من وليح أسيها.

## ٢٠٨٦٠ - فطارة

Mycétogenesis (F).  
Mycetogenesis (E).  
الانطارة علم يبحث في إثبات الفطور ونوجها.

## ٢٠٨٥٥ - فضية

Famille (F). Family (E).  
الفصيلة في تصنيف الاسماء هي جماع اجناس لما صفات  
مشتركة. أو جماع الاجناس التي تتشابه بتفاصيل البناء  
المشتركة. وترتيب الفصيلة يأتي بعد الرتبة وقبل الجنس.  
راجع تصنيف.

## ٢٠٨٥٦ - فضاء أوسط

Mésosphère (F).  
Mesosphere (E).  
الفضاء الأوسط أو الوسطي طبقة من الجو تقع بين الفضاء  
السديمي والفضاء الشاردي. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع  
٣٠ كيلومتر من سطح الأرض، لما سماكتها فتراوح من  
٨٠٠ إلى ٨٠٠ كيلومتر وذلك لانها تتغير مع فصول السنة  
ومع المواقع نظرا لامتدادها المكسي بالعوامل الحركية والحارة  
وسرعة الصوت.

## ٢٠٨٥٧ - فضاء سدديمي

Stratosphère (F).  
Stratosphere (E).  
الفضاء السديمي طبقة من الجو تقع بين الفضاء الكندي  
والفضاء الأوسط. تبدأ هذه الطبقة من ارتفاع ١٢ كيلومتر  
من سطح الأرض. سماكتها نحو ٢٥ كيلومتر. تتميز  
بكثرة مجاري الهواء وبالحارة القليلة الفروقات إذ أنها  
تراوح من ٥٠ إلى ٦٠ درجة ستيفراد تحت الصفر.

## ٢٠٨٥٨ - فضاء شاردي

Ionosphere (F).  
Ionosphere (E).  
الفضاء الشاردي أو البالي طبقة من الجو الخارجي تقع  
بمد الفضاء الأوسط وتمتد عمقا إلى حيث تنقطع العوامل  
الشاردية.

## ٢٠٨٥٩ - فضاء كندي

Troposphere (F).  
Troposphere (E).  
الفضاء الكندي أو الجو الأرضي طبقة من الجو تغلف الكرة  
الأرضية. تبدأ من سطح الأرض حتى ارتفاع ١٠ و ١٢  
كيلومتر. تتميز بكثافة الهواء وبالحنار وباللزات  
المختلفة وبالزوايح واليوم واللاسلار.

## ٢٠٨٥٠ - فضة

Argent (F). Silver (E).  
معدن أبيض اللون يراى لا يتأثر بالماء ولما. يفوق جميع  
المعادن في دفع الحرارة والتزوي وبإسالية الكهرية.  
رمزها (ف- Ag) وزنها الذري ١٠٧.٨٨ ثقلها الذري  
١٠٧.٥ تنصهر في نحو ١٠٠٠ مع || وهي  
متوصلة الفوية قابلة للتشديد والطرق والسقل. مرضها  
الإنسان واستخدمها منذ أقدم العصور. توجد في الطبيعة  
أما شيء نقية بصورة بولورات أو ذرات مختلفة الأحجام  
مرصقة داخل يمد الصخور، أو مزوجة ينتشر مختلفة  
كالكبريت والزرنيخ والألمد والبروم والكلور || أم  
مصادر استخلاصها في العالم كبريتة الفضة الذي يحوي  
نحو ٨٦٪ من أفضة العرف وكلوريد الفضة الذي  
يحوي نحو ٧٥٪

## ٢٠٨٥١ - فضيات

Protaceae (F). Protaceae (E).  
فصيلة نباتية من نباتيات الفلقة، عديدات التمامة،  
مرتقات المبيض. أنوارها زعاع ١٠٠٠ متنبها البلاد  
الحارة. فيها الأشجار والشجيرات والجنينات والأعشاب.  
أوراقها متعاقبة مسننة. أنوارها خضوية زياية الأجزاء،  
سليبية أو متقوية التجميع. ثمارها مختلفة الاشكال  
والأحجام والخواص بعضها ما كويل.

**Cryptogamique (F).** - ٢٠٨٧٥ **فِطِيرِي**  
Cryptogamic (E).  
نعت تعريفي توصف به الاصنام المتأدية عن الفطور .

**Fongiforme, Fongoide (F).** - ٢٠٨٧٦ **فِطِيرِي**  
Fungiform, Fungoid (E).  
ما كان على شكل الفطر او هيشته .

**Champignons (F).** **Fungus (E).** - ٢٠٨٧٧ **فِطِيرِيَّات**  
شعبة من النباتات الدنيا تنتمي الى صف المشريات . تشمل اربع رقب وهي البويضيات والنعاميات والزقيات وانعاميات وفي كل منها مراتب وفصائل واجناس وانواع عديدة .

**Baie de myrte (F).** - ٢٠٨٧٨ **فِطِيَّة**  
Barry of myrtle (E).  
هي حبة الاس . ج. فطس .

**Hyménomycètes** - ٢٠٨٧٩ **فِطُور فِطِيَّاتِيَّة**  
هي الفشائيات فطور من رتبة النعاميات منها الداريقون واجناس اخرى عديدة .

**٢٠٨٨٠ فِطُور مَعْدِيَّة**  
هي الفشائيات فطيرة فطور من النعاميات .

**Adénophore (F).** - ٢٠٨٨١ **فِطِيَّة**  
هي الاسفورة ، اطليا .

**Autogame (F).** - ٢٠٨٨٢ **فِطِيح**  
Autogamous (E).  
نعت تعريفي يوصف به كل نبات اخضابه فطاحة .

**Sanderling** - ٢٠٨٨٣ **فِطِيرَة**  
هي الدرجة ، اطليا .

**٢٠٨٨٤ فِطِيرَة**  
مفرد ذوات انثى .

**Prion (S).** **Prion (F).** - ٢٠٨٨٥ **فِطِيمَة \***  
Prion (E).  
جنس طير من كليات القدم وقصيلة جليديات الماء .

انواعها المعروفة قليلة العدد . اصلها تحت من بحار القطب الجنوبي الى المحيط الاطلسي حتى تقوم اوروبية || اجسامها مستقلة القدر . اجنحتها مستطيلة ، لاحفة ، ذلقة . اذنانها غروبية الشكل تتألف من ١٢ رفة . رفة . متناظرة ضلعية ، مستقلة الطول ، متعقبة البكرة ، تعمل سطوح الماكها العليا بعض الطياف || اذنانها تختلط مع الاقنوع . اعرف انواعها فطيمة اريال وفطيمة مجعدة .

**Prion ariel (S).** - ٢٠٨٨٦ **فِطِيمَة اُريال**  
Prion ariel (F).  
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرق الشبه المراج .

صدورها وبطنها واغنيكتها الى اللباس الماسجى || اصلها المحيط الاطلسي . يكثر ويوجد في زمن التناهد والخصانة على المجاذع الافريقية والاسبانية .

**Prion vittatus (S).** - ٢٠٨٨٧ **فِطِيمَة مُجَدَّة عَمَة**  
Prion orné (F).  
نوع من الفطيمة . ثوبها الملوي الى الزرق الزرادية المراج .

يلعوا في جناحها وذنبها جميع اسود . صدورها وبطنها الى اللباس الاغبر || اصلها القطب الجنوبي وجواره .

**Sevrage (F).** **Weaning (E).** - ٢٠٨٩١ **فِطَام**  
انتقال لولاد الحيوانات من دور الرضاعة الى دور الانضواء بغير الحليب .

**٢٠٨٩٢ فِطَح**  
عرض في وسط الرأس .

**Polliniser (F).** - ٢٠٨٩٣ **فِطَح ، نَبَع**  
eo pollinate (E).  
فعل وزرع وأبر : نقل شارب الطلع من متك زهرة الى ميسمها او ميسم غيرها من الازهار .

**٢٠٨٩٤ فِطَمَل**  
قيل الفِطَمَل " دهر " لم يُفَطَّر فيه الناس بعد . وقال ابو حنيفة " هو زمن كانت الحيازة فيه رطبة " . الفراق بين المتحدين يفتر عيلارات السنين لان الزمن التي كانت الحيازة فيه رطبة يعود الى اوائل الحقبة السحيقة من اباح ما قبل الكمبري . راجع حياة .

**٢٠٨٩٥ فِطَمَل**  
وضع مصري للدلالة على الوفاة .

**Chamignon (F).** - ٢٠٨٩٦ **فِطَر**  
Mushroom, Fungus (E).  
كل نبات من غشيات الريح ينتمي الى شعبة الفطريات . ج. فطور .

**Ophiobolus (S).** - ٢٠٨٩٧ **فِطَر الساق**  
فطر مجهرى من افرزات ركب الحطبة وغيرها في اسافل سقها فيصيب لها مرض الساق .

**٢٠٨٩٨ فِطَر الصُوقَان**  
هو الصوقان فطر من السميات ، اطليه .

**Acrospore (F).** - ٢٠٨٩٩ **فِطَر اَلِيمَة**  
Acrospore (E).  
جنس فطور مجهرية تركب قم التيجليات ، اى اطرافها النامية ، فطيلها .

**Fistuline (F).** - ٢٠٩٠٠ **فِطَر الكَيْد**  
هو الفطيرتينا فطر مأكلى من السميات . يعيش على جذوع بعض الاشجار الخرجية في المواعظ القليلة الرطبة . وهو كبير القدر ، كبدي الشكل ، حشفي القود ، حابى القاعدة .

**٢٠٩٠١ فِطَر المَرْجَان**  
هو الدبوسية ، اطليا .

**٢٠٩٠٢ فِطَر ساقِ الرُّزْج**  
Ophiobolus graminis (S).  
نوع من فطور الساق يركب سوق التيجليات فطيلها .

**٢٠٩٠٣ فِطَر مَالِطَة**  
Chamignon de Malto (F).  
هو الطريث ، اطليه .

**٢٠٩٠٤ فِطَر مَرْجَانِي**  
Clavaria corall (F).  
هو الدبوسية المرجانية ، اطليا .



فطيمة



٢٠٨٩٥ - قَعْرِيَّةٌ شَعْرَاءُ \*

*Dasyllirion acrotrichum* (S). *Dasyllire cheveli* (F).  
نوع من القعريّة الزيّنية . ساقها قصيرة . أوراقها كثيفة  
التجميع طول نحو ١٠٥ سم . وتعرض نحو ١ سم . نصلها  
جميل أخضر الزاوي ، شاك الحافة ، أصفر الشوك .  
يلهي بضلة من الألف الأصفر النقي . أزهارها إلى  
الخضار البستني . تنورها يستمر طوال الصيف .



فقط

٢٠٨٩٦ - قَعْرِيَّةٌ مُشْأَرِيَّةٌ

*Dasyllirion serratifolium* (S). *Dasyllire denté* on  
sle (F).

نوع من القعريّة الزيّنية . ساقها تلو نحو ٣ أمتار .  
أوراقها لينة متراكبة طول من ٧٥ إلى ١٠٠ سم . وتعرض  
نحو ٣ سم . نصلها أخضر اللون ، أزرق المواج ، مشفاري  
الحافة ، تسنيت نحو ٢ سم . سبلها الزهرية متباعدة ،  
أزهارها إلى الخضار الباقى اللامع . تنورها يستمر طوال  
فصل الصيف .



نفر

٢٠٨٩٧ - قَعْرِيَّةٌ تَجِيلِيَّةٌ

*Dasyllirion graminifolium* (S). *Dasyllire graminoides* (F).

نوع من القعريّة الزيّنية . ساقها تلو من ١٥٠ إلى  
٢٥٠ سم . أوراقها لينة متراكبة طول نحو ١٠٥ سم .  
نصلها حصي الشكل ، جميل الخضار اللامع ، قصير  
الشوك المبرش ، يلهي بضلة صغيرة من الألف الأصفر .  
أزهارها إلى الخضار الباقى العادم اللمة . تنورها يستمر  
طوال فصل الصيف .

٢٠٨٩٨ - قَعْمٌ ، زَهْرَةُ الْعَنْكَبُوتِ

*Anthericum Phalangium* (S). *Phalangère*, *Anthérie* (F).  
*Spider-wort* (E). *Kleine Graelille* (D). *Antico* (I).  
جنس نباتات عشبية جذمورية معمرة من فصيلة الزيفقيات .  
أنواعه قليلة العدد تتميز بأوراقها القرصية الانتشاب  
الميزابية للنصل || أحرف أنواعه الزيمية الزيّنية ما يلي .



قعريّة شعراء

٢٠٨٩٩ - قَعْمٌ زَلْبَكِيٌّ الزَّهْرُ \*

*Anthericum liliago*, *Phalangium liliago* (S). *Phalan-*  
*gère à fleur de lis* (F).

نوع من القمم ، شعريه ثلاثة . سيقه شمراكية مرسعة تلو من  
٣٠ إلى ١٠٠ سم . أوراقه قرصية الميزابية النصل  
تطول من ٣٠ إلى ٦٠ سم . وتعرض نحو ٦ سم . أزهار  
حامية الانتشاب حامية اللورث ، يضاء اللون تطول نحو  
٢ سم . أسنيتها مقصوة || أزهاره يستمر من أيار إلى  
حزيران .

٢٠٩٠٠ - قَعْمٌ مُتَشَعِّبٌ

*Anthericum ramosum*, *Phalangium ramosum* (S).  
*Phalangère rameuse* (F).

نوع من القمم . ساقه شمراكية فرعاء تلو من ٣٠ إلى ٦٠  
سم . أوراقه قرصية الانتشاب ميزابية النصل تطول من  
٢٠ إلى ٣٠ سم . وتعرض نحو ٤ سم . أزهارها تاجية حامية  
المرق يضاء اللون تطول نحو ١ سم . أسنيتها جالسة .  
أزهاره يستمر من حزيران إلى تموز .



قعم زنبقي الزهر

٢٠٩٠١ - فَنَاءٌ ، قَعْمٌ ، قَعْمٌ ، فَنَاءٌ

*Epanouissement* (F). *قَعْمٌ* ، *قَعْمٌ* ، *فَنَاءٌ* ، *فَنَاءٌ* (E).  
فنا وأقنى الشجر : تفتح نوره . ولقناه هو ساحة الانزهار  
المتخسعة .

٢٠٨٨٨ - قَطْ ، \* ، فَيْسَلُ الْبَحْرِ

*Tricheus* (S). *Morse*, *Eléphant de mer*, *Cheval marin* (F).  
*Walrus* (E).

جنس حيوانات بحرية لينة من فصيلة الفيليات أو فيلة  
البحر . له نواحل القظ الشائع والقظ البليط أو القظ  
يشبه القطة لكنه أكبر جثة وأقبح منظراً . طول الذكر  
نحو ٦ أمتار وله نابان مستطيلان متدليان من فكه الأعل .  
أصنائه مناطق الجليد الباقم . يعيش أسراباً متوسطة العدد .  
قوته الإصماك والأصداد .

٢٠٨٨٩ - قَطَبَاتٌ ، فَيْسَلَةُ الْبَحْرِ

*Trichocidae* (S). *Trichocidae* (F). *Trichocidae* (E).  
فصيلة حيوانات بحرية لينة من رتبة زفصيات الافدام ،  
وهي وحيدة الجنس ثنائية النوع فيلها تتجبر من سباع  
البحر .

٢٠٨٩٠ - قَعَالِيَّةٌ

*Efficacité* (F). *Efficacy*, *Effectiveness* (E).

٢٠٨٩١ - قَعْرٌ ، \* ، زَلْبَكِيٌّ إِيْرِيْقِيَّةٌ ، زَهْرَةُ مَحْبُوبَةٍ

*Agapanthus* (S). *Agapanthe*, *La africain*, *Tubéreuse*  
*bleue* (F). *Blue african lily*, *Blue lily of the Nile* (E).  
*Africanische Liebesblume*, *Blaue Tuberosa* (D).  
*Tuberosa turchino* (I).

نبات عشبي جذموري معمور وسيد الجنس والتروع من  
فصيلة الزيفقيات . شعريه عديدة . أوراقه صفية الشكل  
تطول من ٢٥ إلى ٣٥ سم . وتعرض من ١٢ إلى ١٨ سم .  
شراخه يعلو من ٤٥ إلى ٨٥ سم . يلهي بقرص من الزهر  
صيوالي التجميع يمد من ١٥ إلى ٣٠ زهرة حامية اللورث  
تطول من ٣ إلى ٤ سم . ألوانها تختلف مع الشعريه بكثر  
فيها الأزرق والأبيض || أزهاره يستمر من تموز إلى  
آب .

٢٠٨٩٢ - قَعْرِيَّةٌ

*Dasyllirion*, *Bonsperas* (S). *Dasyllire* (F).

جنس نباتات برية وزيّنية من فصيلة الزيفقيات . أنواعها  
عديدة جميعها من نباتات المناطق الحارة . أوراقها وسقيها  
لبنية التركيب . أوراقها ضيقة النصل ، مستطيلة ،  
متراكبة ، متدلية . أزهارها سفلي التجميع يرتكر حل  
شمراخ متصعب مستطيل || تعيش في جميع الأترية أما  
تفشي كثرة الكلس والرطوبة والممارس الضالية الباردة .  
أحرف أنواعها وأشهرها ما يلي .

٢٠٨٩٣ - قَعْرِيَّةٌ بَحْرِيَّةٌ

*Dasyllirion glaucophyllum* (S). *Dasyllire glauque* (F).

نوع من القعريّة الزيّنية . ساقها تلو نحو ٤ أمتار .  
أوراقها متراكبة لينة تطول من ٦٠ إلى ١٠٥ سم . وتعرض  
من ١٥ إلى ٢٥ سم . نصلها بحري اللون ، شاك الحافة  
المسنة . أصفر التئين . سبلها كبيرة القند منطفة الزام  
الاعير . أزهارها إلى الخضار الأزرق المواج . تنورها  
يستمر طوال الصيف .

٢٠٨٩٤ - قَعْرِيَّةٌ تَرْغُونِيَّةٌ

*Dasyllirion longistimum* (S). *Dasyllire tétragone* (F).

نوع من القعريّة الزيّنية . ساقها تلو نحو ٢٠٠ سم .  
أوراقها متراكبة لينة تطول من ١٢٠ إلى ١٨٠ سم . نصلها  
وباعي الزوايا يعرض نحو ٦ سم . لون إلى الخضار الباقم .  
سبلها الزهرية كبيرة القند . أزهارها إلى الخضار الباقم .  
تنورها يستمر طوال الصيف .

Vertèbrés (F).

٢٠٩١٥ - **فَقَارِيَّات**

هي الفقاريات ، أظلمها .

٢٠٩١٦ - **فَقَاشُ البُنْدُقِي**

Casse-noix vulgaire (F).

طائر يلقى الحشاش ، أظلمها .

Bulle (F). Bubble (E).

٢٠٩١٧ - **فَقَاعَة**

Tétrodon (F). Puffier (E).

٢٠٩١٨ - **فَقَاقَة**

هي الفمقة ، سمكة بحرية تكثر في النيل والتيجير . وقيل الفمقة طائر (كلا) .

Eucinetus (S).

٢٠٩١٩ - **فَقَاعِدَة**

Eucinéte (F). Eucinetus (E).

جنس حشرات من فصيلة الفمقيات ورتبة غمديات الاجنحة . أنواعها المعروفة ١٢ أصلها معظم المناطق الشمالية وجبال المناطق المعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، مبطلة ، شبه أحليجية الشكل ، تطول ٣ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة الجرم ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية عجيبة أو قلابية . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة ، رباعية الاضاديد التحيلة القاطية . قوائمها نشيطة . أظلمها ملونة يكثر فيها البني || الجملانة منها والبرقة تعيش في الجلالة وفي الاشجار النشرة على المواد النباتية المنحلة .

Eucinetidae (S).

٢٠٩٢٠ - **فَقَاعِيَّات**

Eucinetidés (F). Eucinetidae (E).

فصيلة حشرات من غمديات الاجنحة . أجسامها وأنواعها المعروفة بمصطبة العدد ، منتشرة في معظم حراج البلاد الباردة والمعتدلة الحارة || أجسامها صغيرة ، شبه أحليجية الشكل ، مبطلة ، تطول ٣ الى ٧ م . رؤوسها صغيرة ، مستعرضة القطن . عيونها صغيرة ، بارزة . تأثيرها وفكوكها نظامية . قرونها الاستشعارية تساعية . الفصل . كواسلها شبه مربعة . الحامدا لاسفة . قوائمها نشيطة . أرساغها خماسية المقل . أظلمها ملونة || جميعها دائمة تعيش على المواد النباتية المنحلة || أشهر أجناسها الفمقالة .

٢٠٩٢١ - **فَقَح** قح الجرو : فتح صيله .٢٠٩٢٢ - **فَقَح**

قح الشجر : أشقت عيون رقه وبدت اطرافه .

٢٠٩٢٣ - **فَقَحَة** هي حلقة الدبر .

Cuscuta à odeur suave (F).

٢٠٩٢٤ - **فَقَد**

هو انكشوت اللعل ، أظلمها .

٢٠٩٢٥ - **فَقْد البَصَر** ، **فَقْد كَان البَصَر**

Caligatio

Creuser (F). To hollow (E).

٢٠٩٢٦ - **فَقَر**

قَر الأرض : قهرها . والفقرة : الحفرة . ج قفر .

Anémie (F). Anæmia (E).

٢٠٩٢٧ - **فَقَر الدَّم**

عدم كفاية الدم إما من حيث تركيبه أو من حيث مقداره . أسبابه عديدة أشيعها اللل والنود في المدة أو الاماء .

Epanthe (F). Epanthous (E).

٢٠٩٠٢ - **فَقَار**

نمت تعريفي يطلق على كل ما يعيش طفيلياً على الاثمار .

٢٠٩٠٣ - **فَقَر ، قَعَم**

الفقر والقعم : ازوار الورد عندما تفتح .

٢٠٩٠٤ - **فَقُو** هو الياس ، أظلمها .٢٠٩٠٥ - **فَقْرَة**

هي قرعانة المستحية ، يقال فقرة الطيب .

Inflorescence (F).

٢٠٩٠٦ - **فَقَاح**

فقاخ وفقحة كل نبت : زهره .

٢٠٩٠٧ - **فَقَاح** هو ذرة الربيع ، أظلمها .

Sideritis (S).

٢٠٩٠٨ - **فَقَاح ، فِرْز**

Sideritide, Siderite, Crapaudine (F). Iron wort (E). Gledkraut (D). Basilica salvatica (I).

وأحد فقاخ . جنس نباتات عشبية برية طيبة من فصيلة الفمقيات . مهدد المناطق الاسيوية والاروبية المعتدلة الحارة .

Spondyliidae (S).

٢٠٩٠٩ - **فَقَاحِيَّات**

Spondyliidés (EF). Spondyliidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم الرباعية ، عاداتها الخاضع . أجسامها وأنواعها عديدة معظمها من المحيط الاراضي الثالثية || انتشارها يعم معظم بحار العالم أعصها بحار البلاد الحارة || أعرف أجناسها المعاصرة وأشهرها الفقاخ والفمقينة .

Spondylus (S).

٢٠٩١٠ - **فَقَاحَة**

Spondyia (F). Spondylus (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات صفحيات الخياشيم الرباعية ، عاداتها الخاضع . وفصيلة الفقاخات . أنواعها المعاصرة المعروفة قليلة العدد منتشرة في معظم بحار البلاد الحارة || أسدانها شبه بيضية اللون ، لاستسارية المصاريع الشائكة تملأها زعمات متباعدة الاصطالة ، دقيقة الأطراف الدرة || تعيش لاسفة بالصخور المتوسطة التور .

٢٠٩١١ - **فَقَار الجَوْزَاء**

Baudrier d'orion (F). فقار الجوزاء كواكبها ، وهي الثلاثة المستعرضة للرباسة في وسط الجوزاء . تسحبها العرب النظم وتسحبها أيضاً نطاق الجوزاء وسطلة الجوزاء ويد الجوزاء . وهي مثل في الانتظام والالتزام .

٢٠٩١٢ - **فَقَار الفُجَاع**

فقار الفجاع كواكب .

Vertèbre (F).

٢٠٩١٣ - **فَقَارَة ، فَقْرَة**

Vertebra (E).

هي الفقرة ، اسطوانة عظمية صغيرة يتألف منها السند الفقري الحيواني .

Rachidian (F).

٢٠٩١٤ - **فَقَارِيَّ**

Rachidian. Spinal (E).

نمت تعريفي يوصف به ما هو مخصص بسلسلة الفقار .



فَقَاة

## ٢٠٩٥٨ - فُلٌّ \* ، يَسْمِين زَيْتِي

Jasminum sambac, Mogorium sambac (S). Jasin sambac, J. d'Arable (F). Arabian Jasmine, Double Jasmine (E). Arabischer Jasin, Sambac Jasin (D). Mugarino doppio, Gelsomino d'Arabia (I).

جنس نباتات زينة - سبوتية ، معمرة من سبل الياسمينات وصيلة الزيتونيات . انولاه اربعة جميعها جنات فراه صغيرة القند تملو من ٥٠ الى ١٥٠ سم . اوراقها كاملة متقابلة بيضبة الشكل . فصلها جاسه الصفه ، مالم البشرة شديد المطر القويح || ازهارها بيضاء اللون ، ذكية العرف البطر القويح || اشهر انولاه القفل المكسب الذي يتميز بازهاره الكبيرة المتراكبة البتلات العديدة المستعرضة . ثم القفل الطويق وهو صغير الازهار ، خالي البتلات المنذغة || والقفل يتكاثر بالتصلب وزراعته لا تتطلب عناية خاصة .

## ٢٠٩٥٩ - فُلٌّ \* ، فليل

Faille, Barle, Géoclase, Paraclose (F). Fault (E). تصدع في الصخور يسبب انشقاقها .

٢٠٩٦٠ - فُلٌّ حَوْصِي \*  
Fosse d'affondrement (F). Trough fault (E).٢٠٩٦١ - فُلٌّ عَادِي  
Faille normale (F). Normal fault (E).٢٠٩٦٢ - فُلٌّ قَافِر  
Faille béante (F). Open fault (E). تصدع واسع القف .٢٠٩٦٣ - فُلٌّ مَدْرُج  
Faille à gradins (F). Step fault (E). تصدع متتابع الشقوق .٢٠٩٦٤ - فِلَاة ، فِلَيْتَاة ، سُهْب  
Steppe ج. فلوات ريفاني وسهوب . سهول مَرَامِيَة الاطراف شاسعة المدى صحراوية التبو.٢٠٩٦٥ - فِلَافِي  
Steppique (F). Steppical (E). ما هو غصص بالفلاة كالسط والنبت .٢٠٩٦٦ - فِلَايَاة  
Charrue fossoyeuse, Charrue rigoleuse (F).٢٠٩٦٧ - فِلَايَاة  
Laboureur, Cultivateur (F). Husbandman, Cultivator (E). من ماث حرت التربة وزرعها .٢٠٩٦٨ - فِلَايَاة ، حَرَاة  
Labourage (F). Tillage, Ploughing (E). شق التربة وقلبها بالحرث .٢٠٩٦٩ - فِلَايَاة  
Phalaris (F). فو البشته نبات عشبي علي من النجيليات .٢٠٩٧٠ - فِلَايَاة مُعْتَدَّة  
Phalaris noueux (F). فو البشته العتيدة ، نبات عشبي علي من النجيليات .٢٠٩٧١ - فِلَايَاة  
Pallas (F). Pallas (E). اسم علم لسطوري لسيار بين المشتري والمريخ اكتشفه ١٨٠٢ عام .٢٠٩٧٢ - فِلَايَاة  
Voltmètre (F). Voltmeter (E). مقياس الفلط .

## ٢٠٩٤٩ - فِلَيْحُ الْمَتَاعِ \*

Géopape, Colombi-Caille (F). طائر من الفقى فضيلة الحاميات طوله نحو ٢٤ سم . صغير المتقار ، قصير الجناح المستدير ، مستطيل الاصراف . لونه ثوب الفقي للسمى لكنه مادم الكشكة ومال من ليفة الحمره . وهو قريب الشبه من السبا في يالفت المتاع والرامي . يفتن الصوصه في التربة بين الاذلال والاحشاب الكثيفة .

## ٢٠٩٥٠ - فِلَيْحُ عَدَاة \* ، يَصْمُومُ

Phaps lophote, Colombe polgarde (F). طائر من الفقى فضيلة الحاميات . طوله نحو ٣٣ سم . يتميز بكشكة مستطيلة تملو مؤخر الرأس . رأسه وصنقه ومصره وبلته الى الرتبة الراددية . يملو مقدم صدره بقمة حمره كالمها صقعة من المم . ظهوره زيتوني ، اجنته الى الخضار النحاسي المؤذن بالابيض . منقار اسود . قوامه حمر || يالفت ضفاف الانهار والمنتعات . قوته الجيوب . يفتن في الاشجار والشجيرات الكثيفة . اناته تفيض يفتين .

٢٠٩٥١ - فِلَيْتَاة \* ، جَوَزُ الْاَنَى  
Févilée, Avila, Noix de serpent (F). Nhandroba (E).

جنس نباتات جنية عارفة ، ثنائية المسكن من فصيلة الفريجات . انولها المعروفة سمية ممتها معظم مناطق البلاد الحارة والاستوائية || سيقانها عارفة مستطيلة . اوراقها معتقة ، كفية الشكل ، خاسية التفصيص . ازهارها متبدي الصنيع . ازهارها خاسية البتلات الصفرة . ثمارها تلمى جوز الثعبان وهي بطيئة الشكل ، صفيرة لثة ، مالة السط ، تقلب بطن البثور المركزة عل محور الثمرة الثلاثي الاصل . || يستخرج من بزورها مادة زيتية لها استعمالها الطبي .

٢٠٩٥٢ - فِلَكْ  
Méchrois (F). Jaw (E). احد جزئي الفم حيث فرزت الانسان وما فكان علوي وغلي .٢٠٩٥٣ - فِلَكْ  
Mandile (F). Maxilla (E). هما في الحشرات فكان عريضان متساويان ، مركزهما في مقلة الرأس بين التآخير ، يحصلان الملاصق الفكية .٢٠٩٥٤ - فِلَكَاة  
من الانماط الزراعية . واسع تمرية .٢٠٩٥٥ - فِلَكَاة ، اِكْتِيلُ شَمَكِي  
Couronne bordel (F). Corona boronalis (E).

الفكة او الاكليل الشامي كوكبة نجوم شمالية الميق مركزها بين السمور والسمان والجماني . عدد نجومها ثمانية وهي مستديرة الشكل وفي استدارتها ثلثة لذلك يقال لها ايضا « قسمة السالكين » . ومن نجومها البانية المزدوجة نجم ، من المرتبة الرابعة ، يدعى « ثير الفكة » . ونجم من المرتبة السادسة يدعى « ثير القسمة » .

٢٠٩٥٦ - فِلَكْش  
Entorse (F). Sprain (E). زوغ للمفاصل وريها من مواضعها .٢٠٩٥٧ - فِلَكِي  
Maxillaire (F). Maxillary (E). ما هو غصص بالفلك .

فقيح المتاع



فيلة



فل



فُلُحُوسُ الْإِبَاحِصِ

Philepizus (S).  
Philépizus (F).

مَاطَرٌ وَسِيدٌ الْجَنَسُ وَالنَّوْعُ مِنَ الْجَوَاهِرِ شُرُوبَاتِ الْغَائِقِرِ وَصِلَةُ النَّجَاحِيَّاتِ. أَصْلَانِ بِضَى مَاطَرٍ اْمْرِيقِيَّةِ الشَّرْقِيَّةِ وَبِزِيْرَةِ مَسْفَرٍ ۥ ثَوْبُهُ إِلَى الشَّعْمَةِ السَّرَاةِ. رَأْسُهُ وَزَوْرُهُ وَاحِلٌ صَدْرُهُ إِلَى السَّمَرَةِ الْبَاقِيَةِ. يَطْلُقُ رَأْسَهُ وَأَبَاهِرُهُ مَرْقِيَةً ۥ حُمُوهُ الْحَشْرَاتِ الصَّغِيرَةِ وَالنَّمْلَ وَالْبِلُورَ. يَنْثَنُ عَشَهُ فِي الشَّجَرَاتِ الْكَثْلَةِ. الْأَشْيُ خَمْسُنُ نَحْوِ ٥. يَبْغِيثُ مِنَ مَرْثِيْنِ إِلَى ثَلَاثِ مَرَّاتٍ فِي الْحَبْلِ. الْذَكَرُ يَبْغِيثُ لَهَا الْغَنَاءَ.

٢٠٩٨١ - فُلُكَاكَا

مَاطَرٌ زَعْمُو أَنَّهُ يَصِيدُ الْقِرْدَةَ (الْإِنْسَانِ).



فُلُحُوسُ الْبَيْتَرِ

Répärir (F).  
To divide, To distribute (E).

فُلُجُ الْاَرْضِ الزَّرَاعَةُ : قَسَمَهَا ۥ فُلُجُ الْمَالِ يَبْغِيهِمْ : قَسَمَهُ بِالْمَتَلَسُّوِي.

Molté (F). Half (E).

٢٠٩٨٣ - فُلُجُ

فُلُجُ كُلِّ شَيْءٍ : نَصَلُهُ.



فُلُحُوسُ الْإِبَاحِصِ

Fente branchiale (F).  
Branchial fissure (E).

٢٠٩٨٥ - فُلُجَّةٌ الْفُلُجِيَّةُ : سَاقِيَةُ الزَّرْعِ. ج. فُلُجَانِ.

٢٠٩٨٦ - فُلُجَّةٌ Blatomère (F). Blatomère (E).  
اسْمُ لَعْرَيْنِ يَطْلُقُ عَلَى كُلِّ بَاسْتِيْدَةٍ أَوْ بُوَيْسَةٍ مِنَ الْبُوَيْسِيَّاتِ الْخَاسِيَّةِ عَلَى تَكْسِيمِ الْبَيْضَةِ فِي طَوْرِ نَحْوَةِ الْخَنَازِيْرِ الْعَادِي.



فُلُحُوسُ نَفْثِي

Labourer (F).  
To plough, To till (E).

٢٠٩٨٧ - فُلُجُجُ حَرَّثَ شَرَّحَ الْأَرْضَ أَوْ قَلَّبَهَا بِالْمَحْرَاثِ.

٢٠٩٨٨ - فُلُحُوسُ الْكَلْبِ الْمَسْنُ وَالْبَغِيْلُ أَيْضًا.

٢٠٩٨٩ - فُلُحُوسٌ Hemigalea (S).  
Hémigale (F).  
جَلَسَ حَيَوَاتَانِ لِاحَةٍ مَفْرُوسَةٍ مِنَ فَصِيلَةِ الْفَزِيَادِيَّاتِ. مَوْطِنُهَا مَلَقَّةٌ وَصَوْتُهَا وَبُورُودِيُو. ثَأْلَفُ الْإِحْرَاجِ وَالْقَابَاتِ. سَرَسُهَا دَجُورِي. مَلْبَسُهَا الْحَيَاتِي فَرْدِي لَا يَجْمَعُ إِلَّا فِي زَيْنِ الْوَدَاقِ وَالْكُومِ ۥ أَجْسَامُهَا مُسَطَّلَةٌ الشَّكْلُ ۥ حَيْفَاهُ تَطْلُقُ مِنَ ٨٠ إِلَى ٩٠ سَم. بِمَا لَهُ الْقَنْبُ. دُرُوسُهُو زَائِلَةٌ. إِحْطَامُهَا ذَائِلَةٌ. عَيْنُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا دَقِيقَةٌ جَالِسَةٌ. قَوَائِمُهَا صَغِيرَةٌ. أَذْنَاهَا مُسَطَّلَةٌ جَلَّةٌ. وَبَرَاهَا صَغِيرٌ ۥ مَتَوَسِّطُ النَّمْرِ. الْوُجَاهُ إِلَى الشَّهْبِ الْفَقْرَارُ يَلْبُوهُمَا تَجْلِيْعٌ مَتَرَفٌ أَسَدٌ أَوْ تَجْلِيْعٌ كَسَنِي وَفَقَّ الْبَاقِيَةُ إِلَى النَّوْعِ ۥ قَوَائِمُهَا مُسَطَّلَةٌ إِلَيْهِ سَيْلًا مِنَ الْحَيَوَانِ وَالطَّيْرِ وَالْإِنْسَانِ وَالزَّرْعِ. نَوَاعِلُهَا الْمَرْوُودَانُ :

٢٠٩٩٠ - فُلُحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hoesi (S). Hémigale de Hoes (E).  
سَرَسُهُ جَبَالُ بُولِيُوِي.

٢٠٩٩١ - فُلُحُوسٌ مُجَدِّعٌ

Hemigalea Hardwicki (S). Hémigale zébrée (F).  
سَرَسُهُ مَلَقَّةٌ وَصَوْتُهَا وَبُورُودِيُو.



فُلُجُ



فُلُحُوسُ

Polycotylédon (F).  
Polycotylédon (E).

٢٠٩٧٣ - فُلُكَاكَا  
مَتَدَدُ الْفُلُكِ.

٢٠٩٧٤ - فُلُكَاكَا Astronomie (F). Astronomy (E).  
يُحِي عِلْمُ الْفُلُكِ ۥ عِلْمٌ يَبْغِيثُ فِي الْأَجْرَامِ الْبَلَوْرِيَّةِ أَوْ اْمِخْتِلَافِهَا كَالنَّجْمِ وَالْكَوْكَبِ وَالْمَلَذَاتِ الْخَفِ. وَفِي ذَلِكَ مِنْ حَيْثُ نَظَرُ دُرُوبُهَا وَإِبَاعِدُهَا وَزَوَاكِبُهَا الْمُقَدَّرَةُ وَالْقَوَائِنُ الَّتِي تَقْسَمُ ظَوَاهِرُهَا الْمُنْتَظَرَةُ.

Phyllobius (S).  
Phyllobie, Coupe-bourgeois (F).

٢٠٩٧٥ - فُلُيْبُوسُ  
جَلَسَ حَشْرَاتٌ ثَالِثَةٌ مِنَ فَصِيلَةِ الْبُوَيْسِيَّاتِ. أَنْوَالُهُ عَدِيدَةٌ تَرْكِبُ مَعْظَرِ الْإِبَاحِصِ الْمَشْرَةِ وَالْمَرْجِيَّةِ. جَمِيعُهَا صَغِيرَةٌ اَلْقَدُّ طَوِيلًا يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٧ سَم. أَجْسَامُهَا سَهِيْفَةٌ اَلنَّشَارُ سَهِيْفَةٌ لِلْمَاجَةِ. اَمْتَاكُهَا غِلْظَةٌ الشَّكْلُ صَغِيرَةٌ اَلْقَدُّ مُسْتَقْبِيَّةُ الْاِنتِشَابِ. يَكْثُرُ وَجْهِيهَا فِي الرَّيْعِ. يَرْقَاتُهَا تَبْشِي فِي الْأَرْضِ عَلَى الْمَوَادِّ الْعَصْوِيَّةِ حَتَّى اَكْتِمَالِ طَوْرِهَا الْبَرِّي. اَعْرَاسُهَا مَحْصُورَةٌ بِمَا تَقْتَرِفُهُ ۥ الْحَشْرَاتُ الْكَامِلَةُ ۥ مِنْ أَشْيُ قَرَضَ الْبَرَامِ وَأَطْرَافُ الْأَوْرَاقِ.

٢٠٩٧٦ - فُلُيْبُوسُ الْإِبَاحِصِ  
Phyllobius pyri (S). Phyllobie du poirier (F).

٢٠٩٧٧ - فُلُيْبُوسُ Large green weevil, Pear leaf eating weevil (E).  
Breiter Birnengrünrüssler, Grünrüssler (D).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلُيْبُوسِ. مَرْتَهُ الْإِبَاحِصِ الْمَشْرَةِ اَحْصَاهَا الْإِبَاحِصُ. طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٥ وَ ٧ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى اَلْخُضَارِ الْمَلْهَبِ. ظَهْرَانُهُ كَثِيرُ النَّمَطِطِ. مَذْبُهُ اَمْرُ اَلْخُضَارِ بِأَمْتِ الْمَاجَةِ. مَتَكُهُ صَغِيرٌ اَلْقَدُّ بَالِغُ اَلتَّخْدِيدِ. زَبَانُهُ إِلَى الشَّعْرَةِ اَلْحَمْلِيَّةِ. يَسْرَحُ فِي الْبَارِ ۥ يَكْثُرُ فِي اَوَّلَاتِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ اطْرَافِ الْأَوْرَاقِ اَلْقَتِيَّةِ لَا يَبْغِي مِنَ الْبَرَامِ.

٢٠٩٧٧ - فُلُيْبُوسُ الْبَيْتَرِ  
Phyllobius betulae (S). Phyllobie du bouleau (F).

نَوْعٌ مِنَ الْفُلُيْبُوسِ. مَرْتَهُ الْإِبَاحِصِ اَلْمَرْجِيَّةِ اَحْصَاهَا الْبَيْتَرُ. طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٤ وَ ٦ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى اَلْخُضَارِ اَللَّامِ. ظَهْرَانُهُ مَبْمَرٌ اَلْهَيْفُ وَالْمَلْبُ اَلْمَتَصَبِّ اَلْفَقِيْقُ. زَبَانُهُ وَسِيْقَانُهُ وَارِسَاهُ إِلَى اَلصُّلْبِ اَلْحَمْلِي. مَتَكُهُ ضَيْقٌ اَلْمَرْثِ. اَعْدَامُ اَلتَّخْدِيدِ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي اَوَّلَاتِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ اَلْاَوْرَاقِ اَلْقَتِيَّةِ.

٢٠٩٧٨ - فُلُيْبُوسُ اَلْإِبَاحِصِ  
Phyllobius oblongus (S). Phyllobie oblongue (F).

٢٠٩٧٩ - فُلُيْبُوسُ اَلْفِي  
Phyllobius argentatus (S). Phyllobie argentée (F).  
نَوْعٌ مِنَ الْفُلُيْبُوسِ مَرْتَهُ الْإِبَاحِصِ اَلْمَرْجِيَّةِ عَلَى اَلتَّخْلُفِ اَنْوَالُهَا طَوْلُهُ يَرَاوِجُ بَيْنَ ٣ وَ ٥ سَم. ثَوْبُهُ إِلَى اَلسَّمَرَةِ اَلْفَقْرَارِ يَلْبُوهُمَا مَوَاجُ قَفْصِي. زَبَانُهُ وَسِيْقَانُهُ وَارِسَاهُ مَحْلِيَّةُ الْوَرْنِ. مَتَكُهُ عُرْوَلِي الشَّكْلُ غِلْظُ اَلنَّاعْمَةِ ۥ يَسْرَحُ فِي الْبَارِ. يَكْثُرُ فِي اَوَّلَاتِ الرَّيْعِ. قُوَّةُ الْبَرَامِ وَالْاَوْرَاقِ اَلْقَتِيَّةِ.

٢١٠٠٥ - **فِلْتِي** (F). Voltaique (F). Voltaique (E).  
نمت توصف به الكهرباء. الفلطة المصدر .

٢١٠٠٦ - **فِلْتِيَة** (F). Voltage (F).  
هو فرق الجهد بين طرفي السلك الموصل . وهو مقدار  
الفلط اللازم لتشغيل آلة ما .

٢١٠٠٧ - **فِلْتَت** (S). Valvata (S). Valvate (F).  
جنس حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل  
وصفيلة الغلفيات. أنشائه المعروفة قليلة المدد منتشرة  
في بعض بحار البلاد الباردة || أصدانها حلزونة ، مبطنة ،  
شبه مستديرة الشكل يكثر فيها اللون الأبيض .

٢١٠٠٨ - **فِلْتِيَّات** (S). Valvatidae (S). Valvatides (F). Valvatides (E).  
نفسية حيوانات بحرية من الرخويات مديات الأبريل  
أصانها الحلزونية . أجناسها وأنواعها المعاصرة المعروفة  
قليلة المدد منتشرة في معظم بحار البلاد الباردة والنسبة  
نحو الباردة || أصدانها متباينة الانحناء يكثر فيها  
التخطيط والاستدارة || أعرف أجناسها الفلست .

٢١٠٠٩ - **فِيلِل** (S). Piper (S).  
Poirier (F). Pepper (E). Pfeffer (D). Pepe (I).  
جنس نباتات مختلفة الإحجام معمرة من فصيلة الفلفلليات.  
أنواعه نحو ٦٠٠ أصنافها المناطق الحارة من المالين القديم  
والجديد . معظمها شجيرات ونباتات برية متسلقة وريشها  
زراعي وتربني . أوراقها متقنة متعاقبة ، نصلها جلدي  
الصفحة . إزهارها محورية الإرتكاز ، قدية التجميع ،  
متدلية . ثمارها كروية الشكل ، صغيرة القدر يكثر فيها  
اللون الكحلي ثم الجاوي || أشهر أنواعه ما يتبع .

٢١٠١٠ - **فِيلِل أَحْمَر** هو الفليفلة ، أظلم .

٢١٠١١ - **فِيلِل أَسْوَد** ، **فِيلِل عَطِر**  
Piper nigrum, P. aromaticum (S). Poirier noir (F).  
Black pepper plant (E). Schwarzer Pfeffer, Gemeiner  
Pfeffer (D). Pepe nero, P. aromatico, Pevare (I).  
نوع من الفلفل وهو شجيرة زراعية متسلقة ، حوائقها غليظة  
تنبها حل الارتقاء والتثبث || ثمارها حارة مشهورة  
تستعمل في الطعام .

٢١٠١٢ - **فِيلِل الصكالية** (S). Agnus castus (S).  
هو الأذنة والسرمد وكف مريم ، النج .

٢١٠١٣ - **فِيلِل الماء** \* ، **زَجَجِيل الكلاب**  
Polygonum hydropiper (S). Cusage, Poivre d'eau,  
Piment d'eau (F). Water pepper, Lake weed, Biting  
persicaria, Cusage (E). Pfeffer-Knöterich (D). Polli-  
gono piperino, Pepe d'asino, Polygono acre (I).  
نبات عشبي بري من فصيلة البيلطليات . يعيش في  
المتنق . ساقه مقعدة . أوراقه وجلودره سريفة الطعم كانت  
تستعمل قديماً في الطب .

٢١٠١٤ - **فِيلِل حُلُو** \* ، **فِيلِل إفرنجي**  
Pimenta (S). Pimenta, Piment des angais, Poivre  
de la Jamaïque, Tousse-épice (F). Allspice, Pimento  
(E). Pimentbaum, Pimentmyrte (D). Pimento (I).  
شجرة برية وزراعية من فصيلة الأسيات . مهدا البلاد

٢٠٩٩٢ - **فِلْدَة** (F). Phyllode (F).  
ورقة عرضية ناتجة من شلوة جسوري . ج فلد .

٢٠٩٩٣ - **فِلْدَة سَبَاة** ، **فِلْدَة سِكِر** (F). Feldspath (F). Feldspar (E).  
هي صوانات الألبين مع إحدى القواعد القلوية كالبوتاس  
والصوديوم والكلس والميزا ... || يكثر وجودها في الصخور  
الأصلية والبركانية . وهي تتألف مع الطلق والمرو مواد  
الأميل البلورية .

٢٠٩٩٤ - **فِلْدُوس** ، **فِلْدُوس** (F). Phyllozoa (S). Phyllozoa (F). Phyllozoa (E).  
فيلة صغيرة معمرة من فصيلة الفلتيات . مهدا بعض  
جبال حوض البحر الأبيض المتوسط . ساقها فرعاء تملأ  
من ٣٠ إلى ٥٠ سم . أوراقها كثيرة المدد ، صغيرة القدر ،  
تطويل نحو ١٠ م . وتفرس نحو ٢ م . نصلها مائلة ،  
خضراء اللون ، مستندة الخمار . أزهارها صوانية التجميع .  
أزهارها كبيرة جلجلة الشكل ، مستطيلة المالبين الخلية  
الانقسام . لنوا إلى الزهرة البيفسجية . توبجاتها خاسية  
الاستان . كما برها خاسية المصارع || تنويرها يستمر  
من حزيران إلى آب .

٢٠٩٩٥ - **فِلْدَر** ، **فِلْدَر** (F). Métal (F).  
هو المعدن ، أظلم .

٢٠٩٩٦ - **فِلْدَر التواليس** (F). Bronze de cloche (F). Bell-metal (E).  
مزيج من نحاس ووزنك وأحمد وقصدير يستعمل في صناعة  
الاجراس والتواليس .

٢٠٩٩٧ - **فِلْدَرَات قَلْبِيَة** (F). Métaux alcalins (F). Alkaline metals (E).  
٢٠٩٩٨ - **فِلْس** (F). Squamula (F). Squamula (E).  
فلس ج فلوس هي الحراشف الصغيرة التي تغطي جلود بعض  
الاسماك أو رواشن بعض الحشرات .

٢٠٩٩٩ - **فِلْسَا** (S). Vais (S).  
نظر مجبري من اللبليات يدعى ذلعب ، أظلم .

٢١٠٠٠ - **فِلْسِي** (F). Lépidote (F). Lapidot (E).  
نمت تعريفي وهي يطلق على الإغشية النباتية الحراشفية  
البشرة .

٢١٠٠١ - **فِلْسِي** (F). Felistic (F). Felistic (E).  
نمت تعريفي يطلق على الآربة والصخور الفلستية التركيب .

٢١٠٠٢ - **فِلْسِيَة** (F). Felisio, Pétrosilex (F). Felisio (E).  
طبقات صخرية ثوارة نحيضة متجانسة لا قياسية السمك .

٢١٠٠٣ - **فِلْسِيَة** ، **فِلْسِي** (F). Felistique (F). Felistic (E).  
يقال ضرور فليسية وربة فلدا .

٢١٠٠٤ - **فِلْط** (F). Volt (F).  
هو رعدة هيدرو الجهد ، يمر حته بفرق الجهد بين نقطتين  
من سلك موصل إذا كان الجهد الذي يؤديه الكولوم بين  
هاتين النقطتين يساوي جولاً واحداً . ج فلطام .



فلت



لفل أسود



نفل الماء



نفل حلو



فلك البروج بأقسامه وأرقامه وعلاماته وأسمائه وصوره وشهوره





فلفل عرق الذهب



فلفل كيباية



فلفل



فلفل



فلكية

الشمس الظاهر بما فيه النجوم وتلقى الثوابت. وهو منطقة سماوية عرضها نحو ١٨ درجة تطلو الفضاء بموازاة مدار الشمس. وتقسّم إلى قسمين، البروج الصاعدة والبروج الهابطة. فالصاعدة تتألف من ستة بزرج والمهابطة كذلك. وهي باسماؤها من القرب إلى البُعد: الحمل، الثور، القنطورين، السرطان، الأسد، العقول، الميزان، المقرب، الرامي، الجدي، القدر، الحوت، اسبا البروج الصاعدة فهي الجدي والقدر والحوت والقنطورين والثور والحمل. والبروج الهابطة هي السرطان والأسد والعقور والميزان والمقرب والرامي.

٢١-٢٤ - فلك - اطلب مدلو.

٢١-٢٥ - فلك - Arché (F). هي أم الخلول، اطلبها.

٢١-٢٦ - فلكوس \* - صبار وركبي

Phyllocactus (S). Phyllocactus (S). جنس نباتات لحية مبرمة من الصباريات. أنواعه عديدة أصلها البلاد الاستوائية. سيقانها أوراق تتناوب مفصصة وغنضة. أزهارها كبيرة القند مستطيلة البتلات البيضاء. ثمراتها تختلف مع أنواعها منها الأبيض والوردي والبرتقالي والقرمزي. ثمارها حامضة الطعم مأكولة. أشهر أنواعه الأريزية:

Ph. à grandes fleurs (F). فلكوس كبير الزهر  
Ph. cratéré (F). فلكوس مقرص  
Ph. anguleux (F). فلكوس مضلع

٢١-٢٧ - فلكي - Sideral (F). Sideral (E). نمت تصريفي يطلق على مجرى النجوم والكواكب السيارية. فالبرم الفلكي هو دوران الأرض اليومي. والسة الفلكية هي دوران الأرض السنوي.

٢١-٢٨ - فلكي \* - مداري - Orbital (F). Orbital (E). نمت وصفي خاص بمدار الكواكب، أي كوكب كان.

٢١-٢٩ - فلكيات \* - Arcades (S). Arcades (F). Arcades (E). فصيلة حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الجاهض اجناسها وأنواعها المروعة حلقة منتشرة في معظم بحار العالم. أصلها متباينة الأشكال والأحجام والألوان. فصلها منسفة. صلابتها انطوائية منها القنطورية ومنها المتناولة. اجسامها صامصة الخاضع، مستطيلة الأريل. أحرف اجسامها وأشهرها الفلكية والحويلة والفرطية.

٢١-٣٠ - فلكية \* - Arca (S). Archa (F). Arca, Ark, Ark shell (E). وتلقى أم الخلول وفلك. جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفيحات الخياض وفصيلة الفلكيات. أنواعها المروعة كثيرة العدد. معظمها من متحبرات الحقة السيارية، أي أنه يبدو في القدم التكوين الجيولوجية. أما الأنواع المفسدة فتنتشر في جميع بحار العالم اعصها اكتسبت. أصلها شبه ييشية الشكل أو أخيلية متصلة اللحم أو صغيرة، محززة الأسفاد الملونة. تعيش لاصقة بالصخور المنورة المتوسطة النور.

أحمارا حمية اللقد والشكل، فمزينة اللون، صلبة، يستخرج منها حطر يحل على حطر القزطن. أما مسطحها فيصنع استعمال بعض القويات في عدة مأكول.

٢١-١٥ - فلفل رومي - هو الفلفيلة، اطلبها.

٢١-١٦ - فلفل عرق الذهب \* - Piper longum (S). Polvrit long (F). Long pepper (E). Langer Pfeffer (D). Pepe longo, Albaro del pepe (I). نوع من الفلفل وهو شجرة كزينة حيلة الشكل. أوردها موزعة بالأصفر ثمارها متناقة مستطيلة متدلية، حبرها كروية صغيرة أرجوانية اللون ذهبية للمالح.

٢١-١٧ - فلفل كيباية \* - حب العروس، كيباية - Piper cubeba (S). Polvrit cubéba, Polvre à queue, Cubéba (F). Cubeb pepper (E). Cubebenpfeffer, Cubebenstrauch (D). Cubeba, Pepe a coda (I). نوع من الفلفل الأبيض وهو شجرة حيلة الشكل والمحام. أزهارها حثانية مستطيلة مرجالية أو أرجوانية اللون.

٢١-١٨ - فلفليات - Piperaceae (S). Piperaceae (F). Piperaceae (E). فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين حديبات القمامة، مرتفعات الميخ. أنواعها زهاء ١٠٠٠ تنحسب إلى عشرة اجناس معظمها جنات وأصايب. أوردها لأقباسية الانضمام فيها المتناقلة والصلابة والشمسية. أزهارها ثدية الشكل، حلية التجميع، لأقباسية الارتكاز، منها المحورية والتاجية والمتناقلة مع الأوراق. ثمارها حثية كروية صغيرة القند غثلفة الألال.

٢١-١٩ - فلكية، زبارة - Cotyledon (F). Cotyledon (E). صفحة ورقية تلصق جبين البزرة، رابع زبارة.

٢١-٢٠ - فلكية، فلفل، فلفل - Lobe (F). Lobe, Lobus (E). كل جزء من الورقة أو الزهرة بالغ التضرب من مستديره.

٢١-٢١ - فلفوس \*، شبيكة - Valgus hemipterus (S). Valgus hemipterus (F). شجرة من فصيلة الجمليات ورقية مقدمات الاجنحة. موطنها يشمل معظم مناطق البلاد المتناقلة الحارة من العالم القديم. جسمها صغير القند يطول نحو ٨ م. عند الذكر وقصو ١٠ م. عند الأنثى. ثمرها إلى السمرة السوداء تلوها زغاريت للبية يبيض اللون عند الذكر. ثمراتها يلفس ستة اعشار الجسم. قصيدة الاثني تنتهي برمز مستن مستطيل يركبها من متبع المكن حتى في الخشب اليابس. تظهر من نيسان إلى أواخر حزيران. مسرحتها يستمر طوال الشتاء. مرقها الانحار. يربتها حثلية اللون، سودا الرأس، تنقب الخشب وقشره اثنيا بانحاء القلب فيبدو كك سلبا في حين انه لا يحتل أية صفة.

٢١-٢٢ - فلفي، فلفي - Lobulaire (F). Lobular (E).

٢١-٢٣ - فلك، فلك البروج - le Zodiaque (F). the Zodiac (E). فلك البروج وبرزج الاطلاق واسه. هو مجرى



قوائمها خاصة الاصابع ، حادة الاظفار . اصولها ناعمة لينة || انثاها مجهزة بجرباب في اسفل البطن تقيم فيه الرضيع حتى للطماع || اشهر اجناسها الفكتنجير ولبهتوان ولفكتولج والكوذور .

٢١٠٣٨ - **فلتوكه** \* (F). Eupleres

فلتوكه هو الاسم للملغاشي . حيوان لين مقترن وسيد الجلس والنوع من فصيلة الزباديات . موطنه جزيرة مدغشقر . يألف للقبائل الساحلية . يسرح في النهار . قوته الحشرات والودويات واللبدان || جسمه مستطيل الشكل ، كثيف الفوبر المستطيل الناعم . طوله نحو ٨٥ سم . بما فيه الذنب الذي يبلغ نحو ٢٣ سم . ارتفاعه الى الحاروك لا يتجاوز ١٨ سم . راسه صغير الحجم ، غريب الشكل وافر السبال . عيناه صغيرتان واذا كان كذلك . قوامه خفيف الاصابع الصغيرة النعيلة . غلابة رقيقة عجمية اطرافه . ثوبه الى انشفحة السمراء ، صدره وبعده الى الغشية البرتقالية المائج .

٢١٠٣٩ - **فلتيم** \* (F). Vagin d'insecta

Vagina of the insect (E). ضوض من شوار اثنى الحشرات وهو القناة التي توصل للفرج بحسب الزكة .

٢١٠٤٠ - **فلو** \* (F). Poulain

الفلو والفلو والمهر هو ولد الفرس قبل بروز ثنيتيه اثنتين . ج . الفلاء .

٢١٠٤١ - **فلوت** \* (F). Voluta

الفلوت حيوان بحري من الرخويات يدعى غطوخة ، اطلها .

٢١٠٤٢ - **فلوكة** \* (F). Pouliche

الفلوكة والفلوكة هي اثنى الفلر .

٢١٠٤٣ - **فلوتوكه** \* (F). Vallota

مشية دوطسية وسيدة الجنس كيرة النوع كيرة المروب من فصيلة الترجسات . مهدا افريقية الجنوبية . دوطسها مستديرة الشكل . اورثها جلدية الانشباب ثنائية التصنيف المتقابل ، نصلها بطول من ٤٠ الى ٨٠ سم . ويعرض نحو ٣ سم . فوه الى الخصار المايق . شرعاها الزهري الجوف القصبية بطول من ٦٠ الى ١٠٠ سم . ازهارها متعاقبة الارتكاز ، كيرة الله ، بطول من ٨ الى ١٠ سم . الزوايا تختلف باختلاف القشروب منها الاحمر والكرزي والوردي والابيض والموشح . تنورها يستمر من ايار الى آب . ترغب في المواتع الرطبة والمناوش الجنوبية . تعيش في المراكب ولا تخفى سوى البرد .

٢١٠٤٤ - **فلوچية** \* (F). Fallugia

Fallugia (E). جنبة تزيينية مسمرة من فصيلة الودديات . منبتها بعض اسماق امريكة الشمالية . سلقها متعصبة الحمراء تملو من ٨٠ الى ١٠٠ سم . افنادها الحلوية مزينة الاخر وارتقاها متعاقبة صغيرة الحجم ، ثلاثية الفلق . نصلها خضر الصفحات العليا ، يفض السفلى . ازهارها عاجية اللون ممتحة بالوردي ، طهرها نحو ٣ سم . || تنورها يستمر طوال شهر حزيران .

٢١٠٣١ - **فلنمكر** \* (F). Fulmar

طائر من الرغاء يدعى رغاء الجبلية ، اطله .

٢١٠٣٢ - **فلننجر** \* \* (F). Phalanger

Phalanger (S). Phalanger, Couscous (F). Phalanger, Couscous (E).

جنس حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . وفصيلة الفلتنجريات . قوائمها المرفوعة اربعة موطنها استراليا وفيها الجديدة . تألف للقبائل الباسقة الانجبار . قوتها الاوراق والازهار والثر والسمكسور ويضها والحشرات . تروث في النهار في قن الانجبار الرقيقة ويسرح في الليل في طلب القوت وتقتل بين الانجبار تحليفا في الغشاء || اجسادها قريبة اليه من السنور . رؤوسها شبه غرولوية الشكل . آذانها صغيرة . قوائمها خاصة الاصابع . احشيتها الجناحية تمتد من الزور الى رؤوس الاغذاء . انثاها مستطيلة اعلاحة . اولهاا مبقية ومبيلة || انثاها ربابية الاعلاف .

٢١٠٣٣ - **فلننجر ابلتق** \* \* (F). Phalanger

Phalanger maculatus (S). Phalanger maculé, Couscous tacheté (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه بعض مناطق استراليا ، اعصها الشمالية وجزر فينيان الجديدة واسيون وسيام وبينا . ثوبه الى الرينة السمراء الملققة بالابيض الابهر . يتنيز بكبر عليه ويصغر اذنيه .

٢١٠٣٤ - **فلننجر السالب** \* \* (F). Phalanger

Phalanger Colobensis (S). Phalanger de Célèbes, Couscous de Célèbes (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور . موطنه يمتد من القسم الشرقي الى الجنوبي من جزيرة السالب . ثوبه الى الرينة الشهاب الغشية المائج .

٢١٠٣٥ - **فلننجر دوبي** \* \* (F). Phalanger

Phalanger ursinus (S). Phalanger ourson, Couscous ourson (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور لكنه مكروم الشكل . موطنه القسم الشمالي من جزيرة السالب . يتنيز بخلافة الرأس الذي يقه رأس السلب . ثوبه الى الرينة السمراء السوية ، يمتد الى الثيرة .

٢١٠٣٦ - **فلننجر شرقي** \* \* (F). Phalanger

Phalanger orientalis (S). Phalanger oriental, Couscous oriental (F).

نوع من الفلتنجر . قده قد السنور الاجل . موطنه فينيان الجديدة وتيمور واسيون وسيام وسلا وأرو... ثوبه الى الرينة السوية يمتد بعض ثوبه في الظهر . ويتنيز ايضا بكبر العين ويصغر الاذن .

٢١٠٣٧ - **فلننجرية** \* (F). Phalangeridae

Phalangeridae (F). Phalangeridae (E).

فصيلة حيوانات لبونة من الجرابيات الشاهيرات . اجناسها وانواعها المرفوعة عديدة . مسطها من حيوانات استراليا وبعضها من الجزر القريبة منها || تألف للقبائل والرايح ، تساق الانجبار بصفة ممتعة وبها انواع مجهزة بنشاء جناحي الشكل يمكنها حدة انتشاره من الانتقال بين الانجبار تحليفا في الغشاء || جميعها رقيقة ثامرة وبعضها مبدارة || اجسادها صغيرة او متوسطة القد . تتنيز باسطالة الاذناناب .



فكتنجير



فلو

٢١٠٥٤ - **فليرة** \* ، **كلبيكار** \* Equula (S).  
Equule (F). Equula (E).

كلبيكار هو الاسم المحلي. جنس اسماك بحرية من فصيلة الفليديات. أنواعها المعروفة نحو ٢٠. اصطناعا المحيط الهندي والبحر الاحمر || اجسامها شبه بيضية الشكل ، مبطلة ، صغيرة القدة او متوسطة ، تطيل من ١٢ الى ٢٤ سم. رؤوسها مستدلة الحميم ، ناشرة الاشعاع الثلاثة. اشداقها صغيرة. صفيها كبيرة جاسطة. زعانفها الظهرية والشرجية مسطيلة ، متقابلة يتقاطعا بعضا البعض الخالص الحادة. زعانفها الذيلية غارقة || لحومها جيدة الصنف ، مرغوب لها .

٢١٠٥٥ - **فلوكس** Phlox (F).  
هو الشوفاة جنس نباتات زربية ثنائية الشتلة الاستعمال ، اطباها .

٢١٠٥٦ - **فلوميس** Phlomis (F).  
هو البزارة ، اطباها .

٢١٠٥٧ - **فلوميس شرقي** Phlomis visqueuse (F).  
هو الاذينة ، اطباها .

٢١٠٥٨ - **فلوميس فلسطيني** Phlomis de Palestine (F).  
هو البزارة المشوية ، اطباها .

٢١٠٥٩ - **فلبة** Marrube blanc (F).  
هي القراشيد ، الايض ، اطباها .

٢١٠٦٠ - **فلبة** Poulot (F).  
هي القوتج البري ، نبات عشبي صخري ، اطباها .

٢١٠٦١ - **فليجييات** \* Schizomycetes (F).  
Schizomycophyta (E).  
فئة من النباتات وسيدات الخلية عذبات الخصب تتكاثر بانقسام الخلية الى فليجين متساويين .

٢١٠٦٢ - **فليدكة** \* Phyllidis (S).  
Phyllidie (F). Phyllidis (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم وفضيلة الفليديات . انواعها المعروفة قليلة العدد جميعها من صغر المحيط الهندي والبحر الاحمر تعيش على حضور التوتالي || اصداها اطليجية ، صغيرة القدة ، مسطيلة ، مدنية المقدم والمؤخر ، جلدية القشار الملون البقع بالاسود والابيض . غشايبها كثيرة العدد ، حناوية الارتكاز . لواسها رباعية ، منها زوج علوي شبه اتوبي الشكل وزوج سفلي مخروطي مكره قرب الفم . اذنيها لحية مستدلة الاعطاط الطولي .

٢١٠٦٣ - **فليديات** \* Phyllididae (S).  
Phyllidides (F). Phyllididae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل اماميات الخياشيم . اجناسها وانواعها المعروفة قليلة العدد اكثرها من متحجرات الاذينة القارية . المعاصر منها يعيش على شواطئ بحار البلاد الحارة || اصداها حناوية التركيب والاحجام منها وسيدات المسامير ومنها عذبات . جميعها تستنشق الماء . غشايبها حناوية الارتكاز || اعرف اجناسها المعاصرة القليلة .

٢١٠٤٥ - **فلور** \* Phylliroe (S).  
Phyllirrhoë (F). Phyllirroe (E).

جنس حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غشقيات الخياشيم وفضيلة الفلوريات . انواعها المعروفة قليلة العدد ، اصطناعا بعض مناطق المحيط الاطلسي والبحر الابيض المتوسط . جميعها مية تسرح في الليل || اجسامها حلالية شفافة مبطلة لا تخلو من المواد الفسفورية المضيئة . رؤوسها ثنائية القابس التي تبدو كقرون الثيران .

٢١٠٤٦ - **فليرويات** \* Phyllirrhoidae (S).  
Phyllirrhoides (F). Phyllirrhoidae (E).

فصيلة حيوانات بحرية من الرغويات مديات الارجل غشقيات الخياشيم || انواعها قليلة العدد جميعها جنس واحد الفلور . جميعها مية لا تقرب الشاطئ . تسرح في الليل . اجسامها شفافة تحمل بعض المواد الفسفورية المضيئة .

٢١٠٤٧ - **فلوريد** Fluorure (F). Fluoride (E).  
ملح الحامض الفلوريدينيكي .

٢١٠٤٨ - **فلوريد الباريوم** Fluorure de baryum (F).  
Barium fluoride (E).  
مركب الفلور مع الباريوم .

٢١٠٤٩ - **فلورين ، فلورور ، فلور** ، **لاصف** Fluor (F). Fluorine (E).  
غاز اصفر اللون ، كبريه الرائحة ، شيط التفاعل . ثقله الذري ١٩,٣١ رقه الانوي ٩ .

٢١٠٥٠ - **فلويس** \* ، **زب الكرم** ، **ستير** Phallus, Ph. impudicus (S). Phallie, Phallus impudique, Satire (F). Phallus, Devil's horn, Steink horn (E).  
Gichtschwamm (D). Spugnolo (I).

فطر دصامي من فصيلة الفلوريات شائع الانتشار يبيض في جميع المواقع الرطبة من الاقاليم الحارة والمعتدلة || شكله ما حركه الجسم . مله اسفنجية ، اوسسته مخروطية . لنها الى الخفسار التام || يؤكل في اول عهد ، عند انقلاق الكلاف ، قبل استطائه وتصلب خلاياه || اعرف انواعه الصبي والكليبي .

٢١٠٥١ - **فلويس صيني** Phallus molusini (S).  
Phallus de Chine (F).  
نوع من الفلوس صين القه والساق ، سنطلي اللون ، اخر الاروسة النعومة الشكل .

٢١٠٥٢ - **فلويس كنيني** Phallus canis (S).  
Phallus de chien (F).  
نوع من الفلوس . مله دقيقة ، مسطيلة ، جزوية اللون ، سنطلي الملمع . ارضوته خفيفة ، بلوطية الشكل ، خرية اللون .

٢١٠٥٣ - **فلويسيات** Phalloaceae (S).  
Phalloaceae (F). Phalloaceae (E).

فصيلة الفطور القلورية من رتبة الدصاميات . اجناسها وانواعها مديدة يكثر وجودها في المناطق الحارة والاعتدالية. اعرف اجناسها واشهرها الفلوس ثم الديكتوفوره الذي يركب الصان في المواقع الرطبة فيقحم ويؤذنه .



فلور



فلوس



فليرة



فليرة

## Tribolites (F).

٢١٠٧٣ - فليبيات

نقطة من القشريات تسمى ثلاثيات الفلين ، أطلها .

## Navicella (S).

٢١٠٧٤ - فليكة

## Navicella (F). Navicella (E).

جنس حيوانات مائية من الرخويات مميزات الايريس  
وفصيلة المزيقيات . انواعها المرونة قليلة البدن مواطنها  
انهر المنة || اصداها كبيرة اللد ، شبه بيشية الشوزن ،  
فصيلة التجويف المقعر ، جهورية اللون او بنية ||  
اجسامها كبيرة . رؤوسها حلالية الشكل ، ثنائية القواس  
للحيزة المستطيلة الجاحة || جميع انواعها مأكولة .

## Pébrine, Gactine, Echse (F).

٢١٠٧٥ - فليفل

القليل او مرض الطفيل او المرض الطفيل او ندوة دودة  
الحرير . مرض طفلي يصيب دود القز فيفقدونها شهوة  
الاكل ويسقطون نحو الموت || مظهره الخارجي نقط سود  
مبهمة تركب الجسم من الرأس الى الفرج || يميز من  
الامراض المميتة اذا حل بالود من طوره الثاني . اما اذا  
اخرها من الطور الرابع فاسابه تكون قلبية الانى وغير  
ميتة .

## Phyllum (S).

٢١٠٧٦ - فليكة

## Phyllite (F). Phyllium (E).

جنس حشرات من مستحبات الاجنحة وفصيلة الفسيات .  
انواعها المرونة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد  
الحارة والاشترالية من العالم القديم || اجسامها مستطيلة  
القد طول من ٥ الى ١٠ سم . بطونها مبطلة بيشية الشوزن .  
رؤوسها مكورة صغيرة . قرونها الاستحسان دقيقة  
وقصيرة . اجنتها كثيرة الاصاب الفقية ، قصيرة ،  
لا تلتصق كمثل البيل . قرونها معتدلة الطول ، مستعرضة  
الاغصان والساقان يبدوا كأنها جمنة || وهي من الحشرات  
التي تقاتل البنية التي تعيش فيها . يرقاتها يرتقالية القرون  
او حراء .

## Crinière du lion (F).

٢١٠٧٧ - فليكة

## Manc de lion (E).

شعر زهرة الاليد .

## Liège, Suber (F).

٢١٠٧٨ - فليفل ، فليفل

## Cork, Suber (E).

مادة دسقة ، مطاطة ، خفيفة ، تسمى من لحاء البش اي سديان  
ولا تفسدها الرطوبة ، تقطع من لحاء البش اي سديان  
القليل .

## Bouchar (F). Bush (E).

٢١٠٧٩ - فليكة

في السادة ، أطلها .

٢١٠٨٠ - فليبي ، بيهني

## Liègeux, Subéreux (F). Like cork, Suberous (E).

نمت تمرني يملئ على التسج النباتية الفليبية التركيب  
او الشبيهة بالفلين

## Phellogène (F) Phellogenetic (E).

٢١٠٨١ - فليبي

نمت تمرني توصف به النباتات التي تلج الفلين .

## Subérine (F). Suberin (E).

٢١٠٨٢ - فليبين

للمادة البشورية التي يتركب منها الفلين .

## Tuff (F). Tuff, Tufa (E).

٢١٠٧٤ - فليس

اسم نبي يطلق على تكوينين مختلفين من طبقات الارض .  
التكوين الرسوبي والتكوين التوراني .

## Tuffeau, Tufeau (F).

٢١٠٧٥ - فليكة

## Micaeous chalk (E).

صفائح متفردة بلاتيزية التركيب ميكية تكون مهلة  
الحفر لينة المكسر عند استخراجها من الارض ثم تتصلب  
وريدا وريدا مع تعرضها للهواء .

## Géll (F).

٢١٠٦٦ - فليغ ، صدع

## Frost-cleft (E).

نمت حال توصف به الاشياء المفلوكة او القابلة للانصدام  
والقلع من تأثير فصل الصقيع فيها .

## Capsicum (S).

٢١٠٦٧ - فليكة

## Piment (F). Pepper (E).

جنس نباتات زراعية حولية ومعمرة من فصيلة  
الباذنجانيات . منها المناطق الحارة والمعتدلة . انواعها  
قليلة . فرووها كثيرة البدن . اوراقها بسيطة متعاقبة  
ازهارها غشوية بيضاء اللون . ثمارها قرون خضلة الاشكال  
والاجسام والالوان . بزورها مستديرة ، مبطلة ، رقيقة ،  
منقبضة المنشئ || اعرف انواعها واشهرها ما يلي .

## ٢١٠٦٨ - فليكة زركية ، فليفل زكي ،

## فلفل أحمر

## Capsicum annuum (S).

Piment annuel, Poivre long, P. de Guinée, Poivron,  
Corail des jardins, Capsique (F). Capsicum, Red pepper (E). Echo Belaboera (D). Paporona, Pimento (I).  
نوع من الفليكة فرووها واصرارها كثيرة اللد شاملة  
الزراعة والاشترال . جميعها نباتات حولية ومعمرة تزرع  
لثمارها المأكولة الحارة او غير الحارة .

## ٢١٠٦٩ - فليكة لبيبة

## Capsicum frutescens (S). Piment frutescens (F).

نوع من الفليكة الخشوشة التي تعيش من ٤ الى ٦ سنوات.  
ساقها فرواه تلو من ٩٠ الى ١٨٠ سم . فرووها دقيقة ،  
منسقة مرتفعة الاطراف . اوراقها بيشية الشكل مدنية  
الزاج الاخير . نصلها مالى الصفحة الخضراء يطول من  
٧ الى ١٠ سم . ويروى من ٥ الى ٨ سم || ثمارها  
بيشية الشكل ، كبيرة اللد تلو خضراء اللون ثم تتحول  
الى الحمرة وتشتقر عليها .

## ٢١٠٧٠ - فليفل

## Schistocarpe (F).

## Schistocarpos (E).

نمت تمرني يطلق على كل نبات تتفاد ثماره عند الامداد .

## Lobule (F).

٢١٠٧١ - فليكة ، فليبي

## Lobule, Lobulus (E).

الفلق الصغيرة القدر .

## Otidæ onetia (S).

٢١٠٧٢ - فليكة

## Otidæ oreille de lièvre (F).

ضفر من فصيلة الحشرات وريبة الزليات . يكثر وجوده  
في الحراج الطيلة اغصانها حراج السديان . يمشي مجتمعات  
على الدبال والمواد النباتية المنسقة . مجتمعة تد من زوايين  
الى حصة ازواج . سيقانها جيدة . نكاحها مستطيلة الشكل  
مفلقة ، جوفاء ، تبدو كأذان القراع ، لونها الى الصغار  
الذهبي ، قواعدها بيض الداغل || تنصير من القشور  
الكعبة الصنف اللامأكولة .



فليكة زراعية (١)



فليكة زراعية (٢)



فليكة لبيبة



فليكة



فليكة



فليكة



فليوت أخضر



فليوت المشعر



فليوت مغلب



فليوت مخمض



فليوت مرن



فليوت بخر



فند

Fluor

٢١٠٩٠ - فليور

هو الفلور أو اللاسف .

Fomalheur (F).

٢١٠٩١ - فَم الحوت

Fomalhut (E).

فم الحوت نجم نير من كوكبة الحوت الجنوبي . مركزه على النجم . يبعد عن الأرض نحو ٢٤ سنة ضوئية .

Pylote (F).

٢١٠٩٢ - فَم الصلدة ، بوقب

Pylorus (E).

Stomatopoda (S).

٢١٠٩٣ - فُصَيَات الأرجل

Stomatopodes (F). Stomatopoda (E).

رنية حيوانات من القشريات .

Cour de ferme (F).

٢١٠٩٤ - فَنكه

Farm-yard (E).

مساحة تحيط بِنَما إبلية المستغل .

Branchue (F).

٢١٠٩٥ - فَنكاه

Forked, Ramifying (E).

فَنكه وفنكاه : شجرة كثيرة الأفران واسعة النمل .

٢١٠٩٦ - فَنكاه

بقرة القطيع لا عمل ولا دَرَج فَنكات .

٢١٠٩٧ - فَنكاه \* ، عَنَب العُصْب

Paris incompleta (S). Parisetia, Raisin de renard (F). Fox grape, Herb Paris (E). Einbeer, Parisbeere (D). Paride, Uva di volpe (I).

لبات عشبي بري طيب من الحليوانات فضلية الزنبقيات . يكثر في المراعي الطبيعية وفي بعض الأجرار . جلوره مخفية . أوراقه مهيبة ونيقة .

Ramure (F).

٢١٠٩٨ - فَنكاهة

Branches, Boughs (E).

جمرع الحصان وفناد وفنات الشيرة .

Vanadium

٢١٠٩٩ - فَنكاهيوم ، فَنكاهم

معدن أبيض اللون مثيلور . ثقله النوعي ٥.٥ وزنه الذري ٥١.٣ . يتحد مع الأكسجين والكبريت والأزوت . يذوب في المحالض المائية باستثناء المحالض الكلورية ويك . ألاحه حديدية تستعمل في قش الصناعات والمسابقات .

Scyphozoaires (F).

٢١١٠٠ - فَنجَنَيات

Scyphozoa (E).

رنية حيوانات بحرية ملامية من شعبة الحريات . فصائلها وأجناسها وأنواعها عديدة . أشهرها المصوبات .

Lynx pardé (F).

٢١١٠١ - فَنجَل

هو الفوش الفندي ، الظب .

Gastrell communis (F).

٢١١٠٢ - فَنجَنَكُفَت

هو الأرنه جنية طيبة ممرمة ، الظب .

Fongique (F). Fungic (E).

٢١١٠٣ - فَنجِي

ما كان فطري الطبيعة أو الصفة .

Ramess (F). Bough (E).

٢١١٠٤ - فَنكده

هو النصن الصلور أو الصلة بين النصن والأفنان .

Pholiota (S).

٢١٠٨٣ - فُليُوت \*

Pholiota (F). Pholiota (E).

جنس فطور كاملة التركيب من فصيلة الفاريقيات . أنواعها المعروفة عديدة أصالتها بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة . يكثر ويوجد في الغابات والمساب والمجال . معظمها يعيش على المواد النباتية المتحللة . تتميز بيوتها الأصغر اللون وبوترة عدد مجموعاتها || أحرف أنواعه وأنها السكة التالية .

٢١٠٨٤ - فُليُوت أسمر \*

Pholiota picra (S). Pholios brune (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات المستور . ساه جزلة ، مبطلة ، عوياء ، صلبة ، شبه فخرطية . نكهته قبيحة الشكل ، قطرها نحو ٣ سم . لونها إلى الصفرة الصلواء المراج . يفرغ منها رائحة لا مألوفة || لحيته حاضرة العلم ، كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٥ - فُليُوت المشعر \*

Pholiota carbonaria (S). Pholios des charbonnières (F).

نوع من الفليوت . يتكاثر في مواقع المشعر . مجموعته وثرية المعد الذي يتألف من ٣ أو ٥ أو ٧ وسادات ، ساه دقيقة ، صفراء اللون . نكهته لزجة ، صابغة الشكل ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصلبة السوداء || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٦ - فُليُوت مُنَكَب \*

Pholiota mutabilis (S). Pholios changeante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الأجار المعوية . مجموعته وثرية المعد تتألف من ٥ أو ٧ أو ٩ وسادات ، ساه دقيقة ، عوياء ، مفلطية حتى الزام الثالث . نكهته صابغة ، عادمة الزخابة ، قطرها نحو ٢ سم . لونها إلى الصلبة البرتقالية وفي مستحبة الرائحة عند المس || لحيته جيدة الصنف ، مأكلية .

٢١٠٨٧ - فُليُوت مُعَرَشَف \*

Pholiota squarrosa (S). Pholios écaillée (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الفم والستيدان . ساه مفلطية مخروشة الأطوار حتى أوائل الزام الرابع . نكهته مغلية الشكل ، صفراء اللون ، مدروية والخراف السمر . قطرها نحو ٥ سم . أطرافها إلى الصلواء الأخضر المراج || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

٢١٠٨٨ - فُليُوت صَر \* ٥

Pholiota lenta (S). Pholios flexible (F).

نوع من الفليوت . يعيش على الببال في المواقع الظليلة . ساه معتدلة الجرم والارتفاع ، خيزاء اللون يملؤها زغب أصفر . نكهته صابغة الشكل ، قطرها نحو ٥ سم . لونها إلى البقرة الصلواء . أطرافها إلى الصلواء الباهت || لحيته جيدة الصنف ، مأكلية .

٢١٠٨٩ - فُليُوت خَضر \*

Pholiota flammula (S). Pholios éclatante (F).

نوع من الفليوت . يعيش على أرويات الصنوبريات . مجموعاته وثرية المعد . ساه معتدلة الجرم ، مخروشة حتى أواسط الزام الرابع . نكهته صابغة الشكل ، صفراء اللون ، خفية المراج . قطرها نحو ٢ سم . رائحتها رائحة الفت || لحيته كافة الصنف ، غير مرغوب فيها .

كيرتان ، مستديرتان ، حولتا الارزكاز . زعنفتها الظهريّة الاولى ثلاثية الشعب المستطيلة المنحصر النوبة || لحبها حصوص الصف ، مأكلي ، يعض فصول السنة ، سام في فصل الربيع .

### ٢١١١٥ - فنكربات **Balistidae (S).** **Balistidae (F).** **Balistidae (E).**

فصيلة اصملا بحرية من ملحويات الفك شاككات الزمانف . اجناسها وانواعها عديدة اطالها بحار البلاد الحارة والمعتدلة الحرارة . سرسها حشاف المهاد . قوتها الرخويات ونواحي الرجان والمرجان || اجناسها شبه يضيي الشكل ، مبطلة الجسم ، مائدة الاعتاق ، طولها من ٤٠ الى ١٠٠ سم . قشورها مراكب القلوس الحرفية . رؤوسها مسلحة بزنانف مهازية مدنية حادة تمسخر وتقتصب عند الحاجة . اسنانها صلبة قوية تمكئها من سحق صدف الحمار والرخويات ومن هرس نواحي الرجان والمرجان || ألوانها ملوكة فيها الأزرق والاصفر والبني والاسود والبرتقالي والاحمر القويدي والبي والارصاعي والاسود || لحبها جسيمة الصف ، مأكولة في بعض فصول السنة ، سامة في فصل الربيع من اواخر آذار الى اواخر حزيران || اشهر اجناسها الفنكسر أو صر الماء .

### ٢١١١٦ - فنكس **Phoenix (S).**

**Phénix (F).** **Phoenix (E).**  
طائر عراني ورد ذكره في اساطير الاولين . اما اليوم فلام يطلق على ديك من الفروسيات هو الديك الياباني القويدي التيكس الزواحي الاوان .

### ٢١١١٧ - فنكل **Funicula (F).** **Funicle (E).**

هو من الزباني سوقيها التليقي الذي يحمل في نهايته الصق الصرمان .

### ٢١١١٨ - فنكلي **Funifère (F).** **Funifer (E).**

لمت تعريفي يطلق في علم الاحياء على كل عضو مجهز بزوائله عجيلية الشكل دقيقة شبيهة بالفنكل .

### ٢١١١٩ - فنك **Fennec (S).**

**Fennec, Fenec (F).** **Fennec (E).**  
نوع من الثعالب صغير الجفة ، لاهم الور ، وذيق القلوم ، يتميز بكبر اذنيه وبامتداده وشحالة ذليه || قوته الصانير والورويات والحشرات والزحافات واليرابع ... مسرحه من القروب الى الشرق ، ويبر نفق مستطيل ويحد المدخل . اتناه تقع من ٣ الى ٤ جراه || موطنه فسح الاربياء ويشمل القارة الافريقية مع الجزيرة العربية وجزائرها || ضروره المرفوعة اربعة :

### ٢١١٢٠ - فنك اعهر **Fennecus pallipes (S).**

**Fennec pala (F).**  
غرب من الفنك موطنه افريقية الشرقية والغربية وبلاد التوبة وكردفان . ثوبه دلي اللون ، ظهره احمر المالح ، اذنيه اسود الطرف . جسمه يطول نحو ٥٠ سم . منه الذنب الذي يبلغ ٢٥ سم .

### ٢١١٢١ - فنك البوكادي **Fennecus famelicus (S).**

**Fennec sabora, Sabora (F).** **Sabora fennec (E).**  
ضرب من الفنك موطنه التوبة وصاري الجزائر وتونس بصورية والصوم والافغان . ثوبه بلون الزيل الاسمر . ظهره

### ٢١١٢٠ - فنكاف **Facture (F).** **Invoice (E).**

في الفاتورة أي قائمة الحساب .

### ٢١١٢٦ - فنده **Vanda (S).**

**Vanda (F).** **Vanda (E).**  
جنس نباتات اسيمة من السطحيات . انواعها المرفوعة نحو ٣٥ اصلها بلاد الحارة . جميعها يرية وتزيينية . ازهارها كبيرة متباينة الاشكال الجميلة . ألوانها زاهرة زلمية || تزور في المراكب : تحشى الصنح || اشهر انواعها واعها زرواة الثلاثة التالية :

### ٢١١٢٧ - فنده البتغال **Vanda courtes (S).**

نوع من الفنده . مهدا البنغال وقد انتشرت زراعتها في معظم اقطار المسكونة || ازهارها كبيرة جميلة زرواء اللون .

### ٢١١٢٨ - فنده التيمور **Vanda insignis (S).**

نوع من الفنده . مهدا بلاد التيمور وقد انتشرت زراعتها في كل مكان || ازهارها متصلة الفنده ، سحلية اللون مبقية بالاربعوني .

### ٢١١٢٩ - فنده الجزر **Vanda Indeni (S).**

نوع من الفنده . مهدا جزر الزايح ، ازهارها عتقوية التجميع لونا الى الصلار الكبريتي اللامع الجميل .

### ٢١١٣٠ - فنندود **Ramaria botrytis (S).**

**Ramaria chou-fleur (F).**  
فطر من فصيلة الذبويات . اطالها غابات جبال البلاد المعتدلة الحرارة . يمش على المواد النباتية المتسلة . ساقه شديدة القصر متفجرة مع التكملة . نكته تحت لحمي تتكون قشبه فيه مجموعات من المراجين الصغيرة تبدو كزهره الانابيب ظهرا يراوح من ١٠ الى ٢٠ سم . لونها الى البيرة الصفراء المالح ، مارجنها الى الصفرة السوداء السقاء || لحبها جميلة الصف ، ليلية الطعم ، مرغوب فيها .

### ٢١١٣١ - فنندي الزهر **Raniflore (F).**

لمت تعريفي يطلق على كل نبات ازهاره فندية الانتكاش .

### ٢١١٣٢ - فنطاسيات **Pterythians (F).**

في الحيوانات مجسومة قريد العالم الجديد .

### ٢١١٣٣ - فنطيس **Groin (F).** **Snout (E).**

في القروطة والقروطية أي علم الحزير .

### ٢١١٣٤ - فنقر المتوسط \* **عثر لاء المتون**

**Balistes capricus (S).** **Balistes capricus (F).**  
**Trigger-fish, Balistes (E).**

نوع من الفنك . سمكة بحرية يهوض من فصيلة الفنكيات وربة ملحويات الفك شاككات الزمانف . اطالها بعض اقالم البحر الابيض المتوسط . سرسها حشاف المهاد . قوتها القشريات والرخويات ونواحي الرجان والمرجان || جسمها يضيي الشكل ، مبط الجرم ، عديم الفتق ، يطول من ٤٠ الى ٦٠ سم . سرائها جامدة حرة . ثوبها متداخل الالوان يغلب فيه البنفسجي للفتات المايات يملو بتيج ازرقة واجر وقصير اصفر وبرتقالي وكسفي ويظوي || رأسها خلروفي الثوزن صغير النظم والقلم والشلق . اسنانها قوية ، حادة ، ثنائية الصف . عيناها



فنده



فندود



فنقر المتوسط

فَنَكِي الون بطول من ١٠ الى ٢٥ سم. ويبيض من ٨ الى ١٥ سم. || شرانها الزهري بطول من ٣٠ الى ٤٥ سم. عقوده يمد من ٩ الى ١٥ زهرة طول نحو ٤ سم. لونها الى البياض الناصع، عرجها فلعج الرائحة الجميلة. ازهارها يستمر من محو الى ايلول.



فَنَك زَرْدَة

٢١١٧٩ - فَنَكِي، هُفَنَة، هُفِين  
Ramilla (F). Twig (E).  
هو ما استبق من ثقبان الاغصان بلغ الحبل او لم يبله.

٢١١٢٠ - فَنَكِي  
Funtinea (S). Funtinea (F).  
طائر وحيد الجنس ولون من البياض وفصيلة الحمايات. موطنه افريقية الشرقية وبزيرة مدسكر. ملجته الحياطي جامي. سره يمد بعض المئات || جسم متوسط القد، بجسم اليامة. رأسه صغير. كشته قصيرة. جناحه ذاتي الطرف. ذيله مثل الطول، مقطوع. ثوبه ازرق واجر متناوب الماحبات || قوته البلور والحروب يحوي البلاد في طليها || الاثني تدنن عشها في الاجابة الفخلة حضنتها يستان، لتناوب عل الترخيم مع الذكر.

٢١١٢١ - فَنَكِي  
Branches fruitières (F).  
Fruit-boughs (E).  
هي الاغصان الصغيرة التي تحمل الثمر بدون سيط.



فَنَك فَنِي

٢١١٢٢ - فَنَكِي  
Aphanomyces (S).  
جنس فطور مجهرية من الفيشيات انزلها عديدة تنقل على الحيران والنبات، اشهرها واعمرها ما يتبع.

٢١١٢٣ - فَنَكِي لاييس  
Aphanomyces Levis, A. cochlioides (S).  
فطر مجهرية من الفيشيات يسبب يزور الشفيرة عند انتشارها فيقضي عليها واذا اصابتها بعد الانتاش في زين الفصوح والاداس اوقع بها الاضرار الجسيمة. اما اذا اصابت الفشول يمد غيبا فلها تقاويه ولكنها تكاثر وينفلس انتابها || مظهره عل الاوراق اخضرار زيتوني المزاج يمتد ذيل النسل في البهار وتصلبه في الليل. وهو في الجلود عند قطعها عروق سود مجهرية || يكافح باجتناب الزرارة في الملقح المروية وبطويرة البذار والبرية.

٢١١٢٤ - فَنَكِي  
Aphanomyces Magnulii (S).  
نوع من الفيشيات يتغلغل على السلاطين البهرية فيؤذي ويسبب هلاكها.



فَنَكِي لاييس

٢١١٢٥ - فَنَكِي  
Flacherie (F). Flaccidity (E).  
ويسمى «فلاخري» مرض ميكروبي فلك يسبب دود الفز في جهازها الهضمي عند انسانها الرابع.

٢١١٢٦ - فَنَكِي  
Vanidium (S). Vénidie (F).  
جنس نباتات عشية حولة من فصيلة المركبات. انولاه نحو ٢٠ مظهره بري ويضربا ترابي. اوراقه متناوبة وبابية الشكل، ملتوية || نصلها كبري القد خلى البشرة. وروسلها الزهرية كثيفة التجميع ظهرها نحو ٦ سم. لسانها مسنة الطول، برنقالية اللون. طليها مفرع الشكل قنانيه متناوبة مرصعة، ثلاثية او رباعية الصغوف. اشهر انواعها ما يلي.

الى الحرة، بلمة الى البياض. جسمه بطول نحو ٤٨ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٢٢ سم.

٢١١٢٢ - فَنَك زَرْدَة  
Fennecus zarda (S). Fennec zarda, Renard du Sahara (F). Zarda fennec, True fennec, Sahara fox, Fennec of bruce (E).

شرب من الفلك موطنه الصحاري الافريقية ووادي النيل والنوبة وسائر ويزان والجزيرة حتى سيناء وسورية. وهو اصفر شرب الفلك واحسها شكك واقرها لقة. ثوبه بلون الرمال يميل مع اقترابه من ثوب الفلك. جسمه بطول نحو ٤٠ سم. منه الذنب الذي يبلغ ١٨ سم.

٢١١٢٣ - فَنَك فَنِي  
Fennecus chama (S). Fennec chama, Chama, Asse (F). Caama, Asse (E).

شرب من الفلك موطنه شفاف نهر الارباع من افريقية الجنوبية. جسمه بطول نحو ٦٣ سم. منه الذنب الذي يبلغ ٣٠ سم. ثوبه الى الصبغة الرملية المواج. ظهره فضي اللون. طرف خلفه وذنبه الى السرة السوداء.

٢١١٢٤ - فَنَكِي  
Funkia, Hosta (S). Funkie (F). Plantain lily, Japanese day lily (E). Herzillie, Hosta, Tagillie (D). Funkia, Hosta, Giglio plantagine (I).

جنس نباتات عشية بجمورية معمرة من فصيلة الزنبقيات. انواعها قليلة بهذا الصين واليابان. سوكها شرانها الانتاش. ازهارها عشوية التجميع. اوراقها مسنة قسبة قاعية. احرف واشهر انواعها الزنبقية ما يلي.

٢١١٢٥ - فَنَكِي  
Funkia lancifolia, Hosta lancifolia (S). Funkie lancifolia (F).

نوع من الفلك اوراقها متناوية النسل جميلة اخضرار طول من ١٠ الى ١٢ سم. وعرضه من ٤ الى ٥ سم. || شرانها الزهري يرتفع من ٢٠ الى ٢٥ سم. عقوده يمد من ٦ الى ١٠ ازهارها طول نحو ٣ سم. لونها الى البياض الناصع. ازهارها يستمر من محو الى آب.

٢١١٢٦ - فَنَكِي  
Funkia Sieboldiana, Hosta Sieboldiana (S). Funkie de Siebold (F).

نوع من الفلك اوراقها بيضية الشكل، نصلها عديد العروق بطول من ٢٥ الى ٣٠ سم. ويبيض من ١٧ الى ٢٣ طول الى اخضرار الازرق المسحب || شرانها الزهري بطول من ٣٠ الى ٤٠ سم. عقوده يمد من ٥ الى ٨ ازهارها طول من ٥ الى ٧ سم. لونها الى الزرق البنفسجية الزاوية. ازهارها يستمر من حزيران الى آب.

٢١١٢٧ - فَنَكِي  
Funkia ovata, Hosta coerules (S). Funkie bleue (F).

نوع من الفلك اوراقها قلبية الشكل، نصلها مائل البشرة، بارز العروق، جميل اخضرار تعلوه زرقه يضاء || شرانها الزهري بطول من ٣٠ الى ٥٠ سم. عقوده يمد من ٦ الى ٩ ازهارها طول من ٣ الى ٥ سم. لونها الى الزرق الجميلة. ازهارها يستمر من ايار الى حزيران.

٢١١٢٨ - فَنَكِي  
Funkia subcordata, Hosta japonica (S). Funkie du Japon (F).

نوع من الفلك اوراقها بيضية الشكل، نصلها مائل البشرة

٢١١٣٧ - قيدوم آذربايجاني الزهره

*Vanidium calendulaceum* (S). *Vénidie à fleurs de souci* (F).

عشبة حولية سرقية زينة زغبية الساق والفروع تملو نحو ٣٠ سم. فروعها انيقة الاكتشاف. اوراقها مائلة الصفحة العليا الخضراء اللون. اما السفلى زغبية خضرة. ورياساتها الزهرية تشبه ورياسات الاذريون. طباها حشلي اللون، لسنتها برتقالية || انزهارها يستمر من حزيران الى تشرين الاول.

٢١١٣٨ - قيدوم مهدب

*Vanidium vyleyi* (S). *Vénidie hirsute* (F).

عشبة حولية زينة سرقية زغبية الساق والفروع المتضبة. تملو نحو ٢٠ سم. اوراقها غبراء اللون حناكية النصل حل صفحتيها || ورياساتها الزهرية متضبة اللد، طباها جلوي اللون، لسنتها حشلي لزام الال، ملحية الكاني، والرائحة، برتقالية لزام الاخضر || انزهارها يستمر طوال فصل الصيف.

٢١١٣٩ - قيقق

القيقق نجم لير من كوكبة برج الثور.

٢١١٤٠ - قيقق

الفصل الكرم من الابل الذي لا يركب ولا يان.

٢١١٤١ - قيققة

هي القيقلة، اطباها.

٢١١٤٢ - قيققة

*Anémophilie* (F). *Anemophily, Anemogamy* (E).

التهارة التأثير الطبيعي الذي كونه الرياح يتغلغلها الريح اي جذرات الطلع من الاسدية الذكرية الى الملقحات الانثوية.



نهد ارقل



نهد ارقل



نهد اور



نهدة



نهدة سامة

نحو ١٣٥ سم. ويصلو ٧٥، اما طول ذنبه فلا يقل عن ٧٥ سم. وهو اجلس واكمل شكله من الاعرف. ثوبه كثيف الور القصير. كبير الرقعة السوداء.

**٢١١٤٥ - قهد اعرف \*** *Cynillurus jubatus* (S). *Guépard à crinière* (F). *Hunting leopard, Chatah* (E). *Tschitah, Gemähne gepard* (D).

نوع من القهد اصلاته نسيمة الارباء تمتد من الهند الى بلاد العرب وافريقية الشرقية والغربية والتهالية || جسمه يطول نحو ١٣٠ سم. ويصلو ٧٥ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٧٠ وهو رقيق القولم صغير الرأس مستدير. عيوط الاذن اعرف العنق. ثوبه قصير الور، صغير الرقعة.

**٢١١٤٦ - قهد اوير \*** *Cynillurus lanus* (S). *Guépard lalieux* (F).

نوع من القهد اصلاته تشبه بلاد افريقية الجنوبية. جسمه يطول نحو ١٠٥ سم. ويصلو ٦٠ سم. اما ذنبه فلا يقل عن ٥٥ سم || ثوبه كثيف الور المستطيل، رصقته الى الجفوة السوداء.

**٢١١٤٧ - قهدكة** *Barbus perince* (S). سمكة نهريه من الشبوطيات تعرف باسم بني دجلة. يكثر وجودها في دجلة والفرات.

**٢١١٤٨ - فينومة نباتية** *Phytonymie* (F). *Phytonymy* (E).

الفهرسة نباتية مجموعة الانفاظ والمصلطحات الخاصة المألدة الى النبات.

**٢١١٤٩ - قهدكة** *Atlas, Vertèbre atlas* (F). *the first cervical vertebra* (E).

القفقة هي اول فقرة من العنق تلي الرأس. وهي موصل العنق بالرأس او مركب الرأس في العنق.

٢١١٥٠ - قهدكة \* ، قهدكة ، قهدكة

*Promecoccephalus* (S). *Tétrodon* (F). *Globe fish, Puffer* (E).

جئس اسماك بحرية من فصيلة القهقيات. انواعها عديدة بعضها من اسماك بحار البلاد الحارة. تتميز بقرابة اجسامها المتضفة التي تبهر كأنها خالية من الرأس.

٢١١٥١ - قهدكة سامة \*

*Canthigaster valentini* (S). *Tétrodon venimeux* (F). *Venomous Globe-fish* (E).

نوع من القهدكة. سمكة بحرية يمرض اصلاتها بعض مناطق البحر الاحمر والمحيط الهندي. سطحها الحياتي جعبي، اسراجها كثيرة العدد || جسمها يطول من ٢٤ الى ٣٠ سم. رأسها يرمي الشكل. عيناها كبيرتان، جاحضتان، رطبنا الارزكاز. ثوبها الى الطفلة القفصية المرقشة بالبي ويملوها اربع جذات سود متعرجة، الازل عند عتق الرأس والاخرة عند قاعدة الزعنفة الذيلية || لها سام لا يترك.

**٢١١٥٢ - قهدكيات** *Tetrodontidae* (S). *Tétronodontidae* (F). *Tetrodontidae* (E).

فصيلة اسماك من رتبة مسليات الفكوك حريات الانسان. اجسامها وانواعها كثيرة العدد. اصلاتها بحار البلاد الحارة. بعضها من الاسماك المتضفة الغربية الاشكال والانواع.

**٢١١٥٣ - قهدكة** *Arnéele* (F). هي الاطن، اطبا.

**٢١١٤٤ - قهد اوقط \*** *Cynillurus guttatus* (S). *Guépard moucheté* (F). *Chita* (E). *Fahhad* (D).

نوع من القهد اصلاته نسيمة الارباء تشبه الهند والانفاظ وارباب وحوض بحر قزوين والبلاد العربية وافريقية الشرقية والتهالية مع اصغرها الكبرى والسلتان || جسمه يطول



فوشية



فوشة



فوشية



فوشة

٢١١٦٥ - فوشومتر ، مقياس

Photomètre (F). Photometer (E).

٢١١٦٦ - فوشومترية ، مقياس

Photométrie (F). Photometry (E).

علم يقيس فيزياء الاضوية وشدها ويصلها .

٢١١٦٧ - فوتون ، فوتون

Photon (F). Photon (E).

الفوتون او الفوتون حزمة من الطاقة الفوتونية في نظرية

الكهليتيات .

٢١١٦٨ - فوشيتية ، لاصحة

Photinia (S). Photinia (F).

جنس اشجار من فصيلة الوردية . انواعها ثلثة ، اكثرها

بري ويضفي زخاري زينة في وسطها حالة متسبة

اوراقها ابيضه ، نصلها جلد الصفرة ، جبل الخضار اللامع .

ازهارها مختلفة الالوان يكثر فيها الابيض .

٢١١٦٩ - فوشة

Tempe (F). Temple (E).

هو في الحضرات الجزء الجانبى الخلفى من درع الراس

المعروف باليشق . وما فوقه واليسع اقواد .

٢١١٧٠ - فوشنج ، فوشنج

هو الصمغ الشائع ، اطبخه .

٢١١٧١ - فوشيل

Photodius (S). Photidie (F).

جنس طير من الرواس الكواس وفصيلة البويديات .

انواعه المروفة قليلة العدد اطلالها تمتد من الافان الى

المند ورجاوا في اجسامها صغيرة تطول من ٣٣ الى ٣٧ سم .

وزونها مذكورة . اجسامها لاصحة . اكلها ثمانية الين .

تتميز بلذاته ريشها الشديد النعومة في ملابها الحياتي

جامعي . تألف القابات والحراج . قوتها الفئران والزماعات

والصفاد وكل ما ليس لها .

٢١١٧٢ - فوشان

Effervescence (F).

الغليان الذي يحصل عند اتلاص الغاز وانفلاصه من السائل

الذي كان متحدا به .

٢١١٧٣ - فوشان

Folseonnement (F).

ازدياد حجم الكلس والارثية الكلسية بتأثير الماء .

٢١١٧٤ - فوشالديد

هو الفوشالديد ، راجعه .

٢١١٧٥ - فوشول

Formol

مطهر قوي يستخدم في تطهير الاماكن الموبوءة وبكافة

الامراض الفطرية ويحرق بعض انبثات الزراعة .

٢١١٧٦ - فوشيدوم

Fusidium

هو السداع ، راجعه .

٢١١٧٧ - فوشيا ، جميل

Fuchsia (S).

Fuchsia (F). Garden fuchsia (E). Fuchsia, Tape-

penblume (D). Fuchsia (A).

جنس نباتات زينة معمرة من فصيلة الازهاريات .

انواعها المروفة نحو ٥٠ اما غرضها زدها ٥٠٠ سقها

وفروعها خشبية . اوراقها متعابلة ثنائية او ثلاثية

٢١١٥٤ - فوشة

Clavagella (S). Clavagella (F).

جنس حيوانات بحرية من الرخويات صفحيات الخياشيم

وفصيلة الفوشريات . انواعها المنتشرة المتسيرة توجد في

الطبقة البسيانية . انواعها الماصرة قليلة اطلالها البحر

الابيض المتوسط والمحيط الهادي في اسدانها ثنائية

المصاريع ، شبه انبوية الشكل مستطيلة تنتهي بكمة

متقوية .

٢١١٥٥ - فوشة

هو ناردين الحداثق ، اطبخه .

٢١١٥٦ - فوشاكة

Xylozma (S). Xylozma (F).

شجرة برية زينة من فصيلة النضيات . مهدا الصين

سالتها منتسبة رسمة ، اغصانها وانفادها شاككة . اوراقها

ابيضه متعابلة معتقة . نصلها يضي الشكل ، مذيب القمصنة

جاءد الصفرة ، لامع البشرة . ازهارها وريشة الشق صغيرة

القد ، مضاد اللون ، فواصة العرف الطري . ازهارها

متقوية التجميع يحوي الايتكار . ثمارها متينة الشكل

والقد ، بتلصجية اللون يملوا مواج اسود . ثمرها يستر

من آب الى اليلول .

٢١١٥٧ - فوشاكة

Métophiles (F).

جنس طير من فصيلة الخياشيم . انواعه قليلة منتشرة في

مغرب اصقاع العالم . تتميز برشاتها وارتفاع ارجائها

واستل اجسامها وطول اذنانها في اشهر انواعه القاحلة

الشرقية ، اطبخا .

٢١١٥٨ - فوشيا

Pivoine (F).

هي الزيج ، اطبخه .

٢١١٥٩ - فوشيس

Cardiosperme (F).

هو البكتس ، اطبخه .

٢١١٦٠ - فوشة

F.O.B.

خالص الى السفينة . صفة اشتراط تجوب حل البائع

تسلم المبيع ، دون اجرة نقل ، حل ظهر السفينة للشاحنة .

٢١١٦١ - فوشة ، فوشة الصباني

Rubia tinctoria (S). Garance, Garance tinctoriale

(F). Madder, Dyer's madder (E). Fieberrose,

Röte (D). Garanza, Rubbia, Robbia dei tintori (I).

نبات جذموري صباهي معمر من فصيلة الفويات .

جذموره مادة حمراء اللون مستطيلة العروش الكيفية

التجميع . ساقه رباعية الاصغر شاككة الحروف ، تلجو

نحو ٢٠٠ سم . اوراقها متعابلة ، ضمية ، رباعية او

سداسية التجميع ونصلها سناني الشكل ، انقب الصفة

الصل ، مهدب الخاد . ازدها خالية التركيب لونها

الصفرة يملوا مواج اخضر في جذموره غنية بالمواد

الخصية الحمراء وهي لا تخلو من النائق الطبية اغصانها

در البول .

٢١١٦٢ - فوشة الماء

Menhe aquatique (F).

هو نمنع الماء ، اطبخه .

٢١١٦٣ - فوشة بري

Poultice (F).

هو نمنع الحقل ، اطبخه .

٢١١٦٤ - فوشة مصري

Véronique d'eau (F).

هو فيرونيكا سبق الي ، اطبخا .



**Fuchsiae** ٢١١٨٤ - **فوشين**  
صياغ آخر يستعمل في تلون الانسجة الضوية لتسكين من درهما المهري . وهو يستعمل من تأكيد الانثيين بالنيروبزين .

**Foussa (F).** ٢١١٨٥ - **فوشة**  
الفوشة حيوان لاسم مفترس يسمى صاس ، اطله .

**Anarchisme (F).** ٢١١٨٦ - **فوشية**  
**Anarchism (E).**  
الفوشية ملعب سياسي قوله ابدال اعمال السلطة الحاكمة بالمبادأة القروية .

**Virulence (F).** ٢١١٨٧ - **فوشة**  
**Virulence, Malignity (E).**  
خاصة في بعض الميكروبات تجعلها اذا دخلت جسماً تكررت فيه بسرعة وخلفت الفلزات وبيلة تحدث اوجم الموراث .

**Pelticula d'un noyau (F).** ٢١١٨٨ - **فوشة**  
**Peltic of the stone (E).**  
الفوشة فوش . هي شفاء للتواء .

**Nauclea (S), Nauclee (F).** ٢١١٨٩ - **فوشل**  
**Nauclea (E), Morgenstern (D), Nauclea (I).**  
جنس نباتات برية من فصيلة الفويات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ اصلها المناطق الحارة من القارتين الاسيوية والافريقية . مظهرها اشجار شاذكة السوق والفروع وبهضها جنات مسقلة . اوراقها معتقة ، متعاقبة ، بيضوية الشكل ، لصلها جامد الصلابة ، مائل البشرة كثير المروق . ازهارها ابطية شعاعية ملونة || اشهر انواعها القوقل الهندي .

**Nauclea (S), Nauclee (F).** ٢١١٩٠ - **فوشل هندي ، فوشل سرح**  
**Nauclea inermis (S), Nauclee inermis (F).**  
نوع من القوقل وهو جنبة مسقلة سرعة تلو من ٣ الى ٥ اسيار . ساقها قليلة الفروع ، سميكة القشور الطيبة النافذة . تستعمل ضد الحميات .

**Dividivi (F).** ٢١١٩١ - **فوشة**  
هي المسمى السابق ، اطله .

**Méthanumain (F).** ٢١١٩٢ - **فوشل بختري**  
نمت تعريفه يطلق على ما هو فوق التفكير البشري وادراكه .

**Fucū, Varech** ٢١١٩٣ - **فوشس**  
هو الفروع جلس نباتات بحرية من فصيلة الفوشيات .

**Fucaceae (S).** ٢١١٩٤ - **فوشيات**  
**Fucacées (F), Fucaceae (E).**  
فصيلة نباتات مائية من رتبة الخفيات السمر . اجناسها وانواعها كثيرة العدد معظمها بحري المنيث .

**Vochysiacae (S).** ٢١١٩٥ - **فوشيات**  
**Vochysiacées (F), Vochysiacaceae (E).**  
فصيلة نباتية من ذوات الفلقتين مستقلة العائلات . اجناسها وانواعها للمروفة قليلة العدد اصنافها منظم اصقاع امريكة الاستوائية || جميع نباتاتها معمرة ، بعضها شجيرة

التجميع . ازهارها جميلة الشكل ملونة الكزوين ، رباعية الفصل والبيصلات ، ثمانية الاسبعة || ترطب في الاربة المتوسطة الانسجام والربوطة ، الثنية بالمواد الضوية والتماسر المعدنية . غير انها تخشى المراض الطليقة الكثيرة الاشخاص || اشهر انواعها ما يتبع .

**Fuchsia fulgens (S).** ٢١١٧٨ - **فوشيا بهية**  
**Fuchsia elaeagnae (F).**  
نوع من الفوشيا وهي جملة زهرة تلو من ١٠٠ الى ١٨٠ سم . اوراقها مسطحة ساقها وفروعها كثيفة . اوراقها غصراء اللون ، بيضية الشكل ، مفترقة الفصل ، تلو من ١٠ الى ٢٠ سم . وتعرض من ٥ الى ١٢ سم . ازهارها عنقودية التجميع متدلية . كزوها وصلها مستطيلة مرجانية . يتلاتها الى الحفرة الاربوجانية الساطعة || ازهارها يستمر طوال الصيف .

**Fuchsia triphylla (S), Fuchsia à feuilles ternées (F).** ٢١١٧٩ - **فوشيا ثلاثية الأوراق**  
نوع من الفوشيا وهي جملة سرطوية صغيرة لثة تلو من ٢٥ الى ٤٥ سم . اوراقها غصية ، ثلاثية ، حنانية الشكل تلو من ٨ الى ٨ سم . فصلها اخر اللون ، لمع المراج ، خلي المروق . ازهارها عنقودية التجميع متدلية ، لونها الى الحفرة القرمزية || ازهارها يستمر طوال السنة .

**Fuchsia magellanica, F. macrostemma, F. coccinea, F. corallina (S), Fuchsia commun (F), Common fuchsia (E).** ٢١١٨٠ - **فوشيا شاذكة**  
نوع من الفوشيا وهي جملة سرطوية تلو نحو ١٠٠ سم . فروعها مجتمعة حراء اللون . اوراقها معتقة احليجية . ازهارها متدلية جرسية الشكل . كزوها وصلها اربوجانية اللون . يتلاتها الى القرقة البنفسجية الموراج || ازهارها يستمر من تموز الى تشرين الثاني .

**Fuchsia corymbiflora (S), Fuchsia an corymb (F).** ٢١١٨١ - **فوشيا صليبية**  
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة تلو من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . فروعها دقيقة كسكنية اللون . اوراقها احليجية ذلقة تلو من ٢٠ الى ٣٢ سم . فصلها خلي البشرة اخر الصلابة . ازهارها كثيرة لثة صليبية التجميع . كزوها ويتلاتها الى البياض الاخير ، فصلها اربوجانية عاقبة الموراج . ازهارها يستمر طوال الصيف والخريف .

**Fuchsia splendens (S).** ٢١١٨٢ - **فوشيا لامعة**  
**Fuchsia brilliant (F).**  
نوع من الفوشيا وهي جملة سرطوية تلو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . فروعها جزئية اللون لزجة . اوراقها الى الخضار الزاهي . ازهارها فردية ، ابطية ، مستطيلة المالحق ، متدلية . كزوها وصلها اربوجانية اللون . يتلاتها عنقودية . ازهارها يستمر طوال الصيف .

**Fuchsia arborescens (S), Fuchsia arborescent (F).** ٢١١٨٣ - **فوشيا شجيرة**  
نوع من الفوشيا وهي جنبة جادسة فروع مهدا المكسك . تلو من ٢٠٠ الى ٣٠٠ سم . اوراقها بيضية الشكل ، ذلقة الزام الاخير . تلو نحو ٣٠ سم . فصلها خلي البشرة جزوي اللون . ازهارها عنقودية التجميع ، طرفية الاوتكاز ، متصلة لثة ، وردية اللون ، متصبية . ازهارها يستمر من الخريف الى الربيع .



فوشيا بهية



فوشل

والبيض الآخر جنسي. أولادها كاملة ، متقابلة او ضمية. انزاعها خشوية ، متدعة الإزيمات. ثمارها جرد مستطيلة تحسن بعض البذور المديدة الآح .



فول (١)

٢١٢٠٣ - فول هندي *Pois d'Inde (F).*  
هو القنول الباتر ، اطليه .

٢١٢٠٤ - فول هندي مسهل *Strychnos ignator.*  
هو ستر يكتوس اينياس ، اطليه .

٢١٢٠٥ - قوتع *وفاطر احمر الرجلين* كان رأسه شيب مصعوب ونها ما يكن اسود الرأس وشار خلفه اغير *ابن سيده* .

٢١٢٠٦ - قوتف *Enveloppe (F), Wrapper (E).*  
القوتف : طباق كل شي .

٢١٢٠٧ - قوم *All (F).*  
هو القوم للزراعي ، اطليه .

٢١٢٠٨ - فومارين *Fumarine (F), Fumaric (E).*  
مادة قلوية فعالة تستخرج من الشاترج الحزني .



فول (٢)

٢١٢٠٩ - فومالكه *Fumara (S).*  
جنس نباتات عشبية مجعولة من فصيلة الاذنيات .

انواعها المعروفة قليلة المدد جميعها برية . منتجاتها غابات وجراج وادغال بعض مناطق حوض البحر الابيض المتوسط || اولادها وانواعها عطرية العرف || اعرف انواعها واشهرها الثلاثة التالية :

٢١٢١٠ - فومالكه حرثية *Fumana arabica (S).*  
*Fumana arabique (F).*

نوع من الفصانة . فرومها منتصب . اولادها مراكية ، صميرة الاذنيات ، عطية الاتصال المستطيلة المنطقة الرؤوس . انزاعها صميرة صفراء اللون || تنويرها يبي .

٢١٢١١ - فومالكه لرجية *Fumana glutinosa (S).*  
*Fumana glutineuse (F).*

نوع من الفصانة . فرومها منتصب . اولادها متقابلة ، عضالية ، لزجة . نصالها ضيقة ، مستطيلة . انزاعها ال الصفار الباهت . تنويرها دقيقي .

٢١٢١٢ - فومالكه متحنبة *Fumana procumbens (S).*  
*Fumana penchée (F).*

نوع من الفصانة . فرومها متحنبة . اولادها مترافقة ، جلالة ، عطية . انزاعها ابطي الارتكاز . انزاعها صميرة صفراء اللون . تنويرها صلي .

٢١٢١٣ - فومكة *Phoma (S).*  
جنس ظفود مجعولة من الصنبيات . بكتيدات كروية الشكل او بيضية مفلطحة تنشا تحت الاذمة ثم ترق الى السطح . مقه يتركز على حلويات دقيقة . شغيراته قصيرة ، بيوفاته مستطيلة ، بسيطة ، شائعة || انواعها عديدة تركب تخلف اعضاء النبات . اشهرها :

٢١٢١٤ - فومكة البطاطا *Phoma solanicola (S).*  
فطر مجعري يصيب سوق البطاطا ومرتقيا نقيضها ويثير نموا || مظهره الحاربي لطح مستطيلة ، ييش او صفر .

٢١٢١٥ - فول هندي *Pois d'Inde (F).*  
هو القنول الباتر ، اطليه .

٢١٢١٦ - فول هندي مسهل *Strychnos ignator.*  
هو ستر يكتوس اينياس ، اطليه .

٢١٢١٧ - قوتع *وفاطر احمر الرجلين* كان رأسه شيب مصعوب ونها ما يكن اسود الرأس وشار خلفه اغير *ابن سيده* .

٢١٢١٨ - قوتف *Enveloppe (F), Wrapper (E).*  
القوتف : طباق كل شي .

٢١٢١٩ - قوم *All (F).*  
هو القوم للزراعي ، اطليه .

٢١٢٢٠ - فومارين *Fumarine (F), Fumaric (E).*  
مادة قلوية فعالة تستخرج من الشاترج الحزني .

والبيض الآخر جنسي. أولادها كاملة ، متقابلة او ضمية. انزاعها خشوية ، متدعة الإزيمات. ثمارها جرد مستطيلة تحسن بعض البذور المديدة الآح .

٢١١٩٦ - فول *فول هندي* ، *باللي* ، *بالفلا* ، *جمنى* *Vicia faba, Faba vulgaris (S).* *Fève (F).* *Broad bean (E).* *Buffbohnen (D).* *Fava (I).*

نبات عشبي حولي زراعي من فصيلة البقوليات القرشاية . وهو نوع عديد الصوروب والاصرام فوارقها اعتدلت علو السوق ولون الانزاع وشمم القرون وشكل الحبوب . والقول نبات غليظ الجلود المخورة القليلة الانشباب ساقه منتصب ، مرمة ، جواء ، محزوزة ، حاملة الفروع تعلمو من ٤٠ الى ١٢٠ سم . اولادها متقابلة مركبة . ورقها شحمية الترتيب ، بيضية النصل البحري اللون . انزاع كبرية القند ، متقوية التجميع ، ابطية الارتكاز ، يضاء اللون او حراء تملوا رقة بنفسجية سوداء الموج . ثمار قرون مفلطحة مستطيلة تلفت الحبوب التي يراوح عددا بين ٣ و ٨ . وحويوه هذه التي تعتبر من اش وانشط للماكل الزراعية تحوي نحو ٨١٪ من الوحدات المللكية ، ترميها :

مواد ازوتية ٢١.٠١٪  
مواد دهنية ١٥.٤٣٪  
مواد هيدروكربونية ٥.٢٥٪

والقول يرغب في الارابة المتدعة ويفضل منها الطليبة الزلية ثم الطليبة الكلدية الزلية ثم الطليبة . وهو قليل الجودة ولانتاج في ابل ، يفضل الري الذي يلائم مزاجه ويضاهت انتاجه || حاجته الى الاسمدة المعدنية تقصر على الحامض الكفوري والبوتاس . لزوم الدم الواحد يقدر بنحو ٥٠ كيلو منها ٣٠ كيلو سوبرففات و ٢٠ كيلو كلورير البوتاس تدر على التربة وتطمر جيذاً .

٢١١٩٧ - فول الخفيل *Fève de cheval (F).*  
هو الفول المصري ، اطليه .

٢١١٩٨ - فول إينياس *Strychnos ignator (F).*  
هو ستر يكتوس اينياس ، اطليه .

٢١١٩٩ - فول مسيبي *Haricot-caisra (F).*  
هو القنول الباتر ، اطليه .

٢١٢٠٠ - فول صوفه كتي *Anachide (F).*  
شائع باسم فست صبيد ، اطليه .

٢١٢٠١ - فول كلباس *Physostigma venenosum (S).* *Physostigma vénéneux, Fève de Calabar (F).* *Calabar bean (E).* *Kalabarbohne (D).* *Fava del Calabara (I).*

نبات عارض مسمر من فصيلة القرنيات . اولادها متقابلة انزاعه اربوسية . يزود سامة لكنها لا تملو من اللتاع الطبية وقد تستعمل في علاجات العين .

٢١٢٠٢ - فول مضري *فول هندي* ، *فول الخفيل* *Vicia faba equina, Faba equina (S).* *Féverolle, Fève de cheval (F).* *Horse bean, Tick bean (E).* *Pierdefoene (D).* *Fava cavallina, Favetta cavallina (I).*

ضرب من القنول زراعت واسعة الانتشار تكثر في مصر والسودان . ساقه رقيقة تعلمو نحو ١٠٠ سم . نصل ورقهاة عابق الخضار . ثماره قرون صميرة اسطوانية منتصب .



فول كلباس



فول مصري



فوية البطاطا

للمفوف والقنيط واللفت والسلم والخردل || مظهره الخارجي يقع مستعرضة تملأ اطراف التصل . تبدو قمرية اللون ثم حمراء حنطية المواج تقرح التسح المتضاربة وتنفسي عليها || يركب الثبات في مختلف ادوار له يعيش في التربة || يكالغ اولاً باجتناب تكرار زراعة الصليبيات في نفس الموضع . ثانياً يظهر البذار ، قبل نوره ، بمعدل بيكلوريوز اقريب المركز ٪

**Phoma linicola (S).** \* قُوْمَةُ الكَتَانِ \*  
ظهر مجهري يصيب سوق الكتان فيلوجيا . مظهره الخارجي يقع سفيرة مستطيلة حنطية اللون يركب التسح في الساق في زامة الاول من التربة وصاعداً فتقرح اللحاء والبشرة وتذبل الثبات . يكالغ يظهر التربة والثبات .

**Phoma apicola (S).** \* قُوْمَةُ الكَرَسِ \*  
**Gale du céleri (F).**  
ظهر مجهري يصيب الكرّس والبقندوس في اجنتائها وازداد اوراقها || مظهره الخارجي يقع حنطية تقرح البشرة ورفقها تقسب رخاوة وذبول الاعضاء الموصومة || يكالغ يظهر التربة والبذار .

**Phoma citricarpa (S).** \* قُوْمَةُ الجَدُورِ \* ، \* قُثْدُور \*  
**Hymenochaete noxia, Fomes lamsensis, Fomes noxius (S). Hymenochaete (F).**  
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة . يركب جلور عدة نباتات انحصا القشقة والبن والشاي والفلن || مظهره الخارجي انكاش فيفبات فذبول في الارواق يعقبها جثم الجبرم في الانسان والنبات || وهو على الجلود خيوط سفيرة مَرَامَة حنطية اللون تملق الجلود وقد تغلفها قشطب الجراوة والالاث || اما الفطر فهو كاتبة من دملة زياء الجبرم ، شيرانية التكمه المستدرة الخطيط الجلوية اللون || ليس له علاجات شافية سوى الآن .

**Phoma lignous, Fomes semitostus, Rigidoporus microporus, Polyporus zonalis (S). Polypore zonale, Maladie des « racines blanches » (F). White rot (E).**  
ظهر من السميات موطنه البلاد الحارة يركب جلور عدة نباتات انحصا الكاكار والقشقة والمانا والتفصيل . مظهره الخارجي انكاش جزئي على بعض اقسام الشجرة يسبب جفاف الارواق والالاثان بعد هجوم التولاي . وهو على الجلود خيوط متوازية جسمية العقد المرسوفة كعب السبحة . تبدو يضاء اللون ثم تبتية وتنتهي بالوردي . شبيهه كيف الحيف يقضم الجراوة فيطبعها مع اوبعها لا علاج له ، اما اجنتائه فهوور وذلك بالانضاد من اربابت الانجار الحمضية القايمة المتروكة في التربة . او باقتلاع هذه الارومات قبل المباشرة بالكرس .

**Phomopsis (S).** \* قُوْمُوْسِيْسِ \*  
جفس ظهور مجهري من فصيلة السنيبات . يتميز بكنيتاته الاقايمة الشكل . شيراته خرزوية او خيطية . بويغاته بسيطة ، شفاقة ، مستطيلة ، جالسة او منقطة . لعرف انواحه ما يتبع .

**Phomopsis abietina (S).** \* قُوْمُوْسِيْسِ التَّنَوُّبِ \*  
ظهر مجهري يصيب اثناد التنوب في نوايبها . مظهره الخارجي اطار يحيط التولاي على حدود زامها الاخير

تركب الساق والمروق قسبب جفاف التسح وانصداع البشرة || يكالغ يظهر التربة .

**Phoma umbilicaris (S).** \* قُوْمَةُ التَّفَاحِ \*  
ظهر مجهري يصيب ثمار التفاح والاجاص في ابان تمها . مظهره الخارجي بقعة حنطية تركب القشرة عند عاتجها ثم تمتد قليلاً بعد ان تنفي البشرة ويطلع من الشجج رفقها ويصلها || يتميز من الاوصام الملوثة الانتشار والاذى الي لا تستوجب المكافاة .

**Phoma sanguinolenta, Ph. rostrupii (S).** \* قُوْمَةُ الجَزَرِ \*  
ظهر مجهري يصيب الجزر في قرص جنته وقد يمتد الى الارواق || مظهره الخارجي يقع خطوطه اللون تبدو مسمرة ثم تتسح وتتشابك تقرح الامة والبشرة وتطليها . ينشط في الارربة النهائية الرملية ويلاشي بقدر ما يزداد انتماج التربة .

**Phoma citricarpa (S).** \* قُوْمَةُ الحَمْضِيَّاتِ \*  
ظهر مجهري يصيب اوراق وثمار الحمضيات . مظهره الخارجي ، على الارواق ، يقع سفيرة مستدرة سمراء اللون تركب التصل على سفحات العليا || وهو على الثمار يقع مستدرة قطرها من ١ الى ٥ سم . تبدو مسمرة ثم تمتد وتتشابك ضلع مساحتها نحو ٢ سم ٢ . تكون في اول مهادها غبراء اللون ثم تتصرف نحو المعطي وتنتهي بسلاسر . بكنيتاته فردية او سفية للتصميم ، حنطية او حمراء اللون ، قطرها من ١٥٠ الى ١٢٥ ميكرون . بويغاته احليلبية او مريدية الشكل ، قياسها نحو ٤×٢ ميكرون . يصيب الثمار ويقتصر مدة حنطتها || يكالغ ينضج الانجار بسائل يورود الملول ٪١ على ثلاث او اربع مرات ، الاول بعد اكبال الاجزاء يامبرح والثانية بعد الاول ثلاثة اسابيع والثالثة بعد الثانية باربعة اسابيع والرابعة بعد الثالثة بمسعة اسابيع || ومنهم من استعمل الفوطاير غير المركزة على التماسا وقد يكونوا مسميين .

**Phoma lavandulae (S).** \* قُوْمَةُ الخَرْقَمِيِّ \*  
ظهر مجهري يصيب الخرقاس في قروصا الحمرة والجلدية فيلوجيا || مظهره الخارجي ذبول على بالفروع القديمة والجلدية سبب انتشار القوس بين الارواق والبشرة التي تسر قفيس || بكنيتاته كروية قطرها يراوح بين ٨٥ و ١٥٥ ميكرون . بويغاته اسطوانية قياسها نحو ٢×٤ ميكرون || يكالغ يظهر التربة بالكلس الحراق بعد اقتلاص مرقق النباتات المصابة .

**Phoma insidiaria (S).** \* قُوْمَةُ الدَّرَةِ \*  
ظهر مجهري يصيب اوراق الدرة فيلوجيا . مظهره الخارجي يقع لاجلية الشكل والحجم تركب نصل الارواق . تبدو حنطية ثم تنصرف الى الربادي بعد ان يكتنفها اطار اصعب مابق || بكنيتاته مستدرة قطرها يراوح بين ٧٥ و ٨٥ ميكرون . بويغاته احليلبية قياسها ٢×٢ ميكرون .

**Phoma lingam (S).** \* قُوْمَةُ الصَلْبِيَّاتِ \*  
ظهر مجهري يصيب بعض نباتات الفصيلة الصليبية انحصا



قوة التفاح



قوة الحمضيات



قوة الدرة



فوس الجلود



موت الصيصان الحديثة التفت . مصادره عديدة اشهرها :  
زيت رشم الحنطة ، رشم الذروع ، الكبد اليء ، زيت  
فستق البية ، زيت القطن ، زيت التفل ، زيت التفل ، زيت  
الصويا ، الخس ، الرشا ، القرء ، عضلات البقر ،  
دهن الخنزير ، زيت الزيتون ، زيت الجوز ، الزبدء ،  
الحلب الكامل .

Vitamines (F).

٢١٢٥٠ - فيتامينات

انظر الجدول في الصفحة المقابلة .

٢١٢٥١ - فيتين زيتي\* ، فيتودكتة زيتية\* ،

نجان زيتي (Phytodecta olivaceus (S).  
Phytodecta olivacea (F). Phytodecta olivaceus (E).

حشرة غاضلة من فصيلة النصاريات ورتبة مفدمات  
الاجنحة . تألف البراري والارحاج اللذلة . غناصها  
ويرقاتها تعيش على نباتات القرنيات القرشية واصحها الزوال  
والقنول || جسمها صغير اللقء يطول من ٤ الى ٥ سم .  
لونها الى الصغار الزيتي الاسمر المالح يملوء في الظهور  
توضيح قائم وصالان اسودان قاطبان . رأسها كبير الحجم .  
عينها صغيرتان . زانباها غيطيان . ظهرها مستدق  
الاجنبداب ، مستدير الطرف اللامع . مخدما متتاها  
التنظيف الخفيف . ارسافها رابعية العقل الظاهرة || لها  
جبل واحد في الحول . تظهر الحشرة الجملانة في ايار  
وتبقى حتى ايلول . تسرح في النهار . تساءل بعد ظهورها  
باربعة اسابيع . تجتمع المكان رزنا لاقامية الحجم ضمن  
شفاة غروي المادة يلتصق بضال الازراق ويشرة البعء ||  
البرقة تتد بلوطها الادراك التام تطول نحو ٨ سم . جسمها  
ونشي الشكل ، سداسي الرؤوب . لونها الى الصغار  
القائم يطوء تنظيق اسمر . رأسها وشربها ورواجها الى  
السمة || طور الكمال الذي يستمر نحو اربعة اسابيع  
يتغذى في القرية تحت الحجارة ضمن جراب من القراب  
والمواد النباتية .

٢١٢٥٢ - فيتوثونس الاجاص

Phytopte du poirier . حور غاشية الاجاص ، اطبا .

٢١٢٥٣ - فيتوثونس الكرمة

Phytopte de la vigne . حور غاشية الكرمة ، اطبا .

٢١٢٥٤ - فيتوثومة

Phytotoma (S).  
Phytotoma (F).

جنس طير من الجولم سنات المناقير وفصيلة الفطنجيات .  
انواعه المعروفة قليلة العدد جميعها من طمر امركة الجنوبية  
اجسامها متوسطة القد تطول من ١٨ الى ٢٠ سم . مناقبها  
قصيرة ، مستعرجة الاشفاق . اولياها متراكبة الالوان  
الجميلة . اطراف اجنحتها واذاهاها تنتهي دائما بالاسود  
الاسفع . صغورها وطلونها يرض || ملجئها الحياتي حامي .  
تألف الغابات والاشجار القرية من مجاري الماء . قوتها  
البذور والثمار البائعة وبعض الحشرات والديدان .

٢١٢٥٥ - فيتوثومية ، متحاجة

Phytotomie (F). Phytotomy (E).

الفيتوتومية علم يبحث في قريع النبات .

خوخ مجفف ، حبوب القرنيات ، مشش مجفف ،  
كستناء ، بزيلا خضراء ، نياض البيض ، اسبانغ ،  
ورق النجل ، حبش ، طرخشقون ، حبوب الذروع ،  
ملفوف ، قرء ، بقونس ، غيض الحليب ، رشم  
الذروع ، محار .

٢١٢٥٥ - فيتامين ث

Vitamin C (F).  
Vitamin C (E).

يستر من اليء الفيتامينات وازمها للجسم . نقشه يسبب  
ضمت اليئة والصداع وسوء الهضم واين الفاسل وكأكل  
الانسان والحفر المروف بقاء الاستقريب || مصدوره  
الرئيسي النبات حيث يكثر في بعض الثمار والاوراق كما  
هو مين في التصنيف التابع . وقد جاء ترتيب المصادور الواردة  
بالنسبة الى غناها فالاولية للاشي :

اعرف مصادور فيتامين ث || ثمالولة : ثمرة الترسن ،  
ثمره الزعرور ، ثمره الاكدينيا ، بقونس ، قليفه ،  
ملفوف ، قرء ، حبش ، ورق النجل ، بزيلا خضراء ،  
برقتال ، ليون ، كريغروت (ليون الجنة) ، يوسبي ،  
اسبانغ ، سلق ، سمء ، كستناء ، طرخشقون ، كبد فيء ،  
فراشكين ، باذخان ، عتباء ، قوم ، كرات ، بتتوره ،  
كرلس ، بطاطا ، فبل .

٢١٢٤٦ - فيتامين ج

Vitamin G. Vitamin P.P. (F). Vitamin G. (E).

يسامه ويلفظ حول الشيمرات القوية فيزبدها سانة  
ويسميها من سرء الازراق || مصادوره عديدة اعصها اليون  
والبرتقال ثم الخوخ والمشمش ثم الاسبانغ والبقونس والخس .

٢١٢٤٧ - فيتامين د

Vitamin D (F).  
Vitamin D (E).

هو ما يعنونه فيتامين اشعة الشمس لانه يتكون في الجسم  
هناك يتحول لاشعة الشمس وذلك لان الازرقيرول الموجد  
في المادة المعنية التي يفرزها الجسم يتحول بملء الاشعة  
وراء البنفسجية الى فيتامين د || والفيتامين د د  
يؤن توازن وتقبل الكليوم والفسفور في الدم والنظام .  
خلوه من الجسم يسبب خواية النظام وليها وانقافها وتشويه  
شكلها ما يؤدي الى الكسح || مصدوره زيت كبد القداس  
المعروف بزيت السمك .

٢١٢٤٨ - فيتامين ك

Vitamin K (F).  
Vitamin K (E).

يمتج الزيف ويصاحبه حل تجليل الدم تجليما طبييا لذلك  
فهر من الضروريات لان نقشه في الجسم سيء المواقب .  
والفيتامين ك ك يقسم الى ثلات اشهرها ك ك و ك ٢ .  
ومصادور الفيتامين ك ك هي الاسبانغ والملفوف والقنيط  
واشبال البحر وهو يستخرج ، للاستهال العلاجي ،  
من دقيق القصة || اما الفيتامين ك ٢ فيستخرج  
من دقيق السلك .

٢١٢٤٩ - فيتامين هـ

Vitamin E (F).  
Vitamin E (E).

هو ما يعنونه فيتامين التماسل او الفيتامين المانع العقم وهو  
المسال الرئيسي في نمو الحجيرات التناسلية وبين الزرم  
شروديات التنوء الجنيني ونسجه المولدة || وهو ذو علاقة  
كبرى بانتاج يرض السباج لان نقشه في الغذاء يؤدي  
اولا الى انقفاض عدد البيض . ثانيا الى تدني نسبة المبوك  
الصالح للتقيس . ثالثا الى ارتفاع نسبة التفتلة ثم الى



فيت زني

جدول بأشهر الآثار الفنية يختلف الفيتامينات مع المقدار النوعي والموسمي والتلويحي والطاقة الحرارية الخ...

Tableau des Vitamines, teneur en glucides et valeur calorique des principaux fruits

الموضوع	مقدار الفيتامينات الموجودة في كل ١٠٠ غرام من سوطي الثمار المأكولى									
	التصير عن المقدار بالوحدات الدولية					التصير بالمليغرام عن الحامض الاسقروطي				
	فيتامين «أ»			فيتامين «ب»		فيتامين «ث»				
	الحد الأقصى	المتوسط	الحد الأدنى	الحد الأقصى	الحد الأدنى	الحد الأقصى	المتوسط	الحد الأدنى	حليص بالسكر	للملح القلبي
									بالغرام	بالسكر
									%	مقدار الطاقة الحرارية
أجاص	١٠٠	—	١٢	—	٣٠	—	٥	—	٢٠٢٦	٢,٤٦
أكينايا	—	—	—	—	—	—	—	—	١٠١٥	٢٣
أنناس	١٦٠	—	١٠٠	—	٢٥	—	٢٠	—	—	—
برباريس	—	—	—	—	—	—	٢٠	—	١٥	—
برتقال	٤٠٠	٣٠٠	٩٠	—	١٠٠	—	٥٠	—	٠,٩٦	٦,٠٠
بنش	—	—	—	—	٢٠٠	—	٣٠	—	—	—
بيلسان	—	—	—	—	—	—	١٠	—	—	—
تفاح	—	—	—	—	—	—	٢	—	٠,٦٤	١٦
تمر	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٣٦	٧٢
تين أخضر	—	١٠٠	—	—	٣٥	—	٤	—	—	—
تين ناشف	—	٥٠	—	—	٢٥	—	—	—	١,٠٥٥	٥٨,٥٨
جوز طازج	—	—	—	٤٥٠	—	—	٣٠	—	١,٠٥	٢٨,٣٥
خوخ	١٥٠٠	—	١٠٠	—	٤٠	—	١٠	—	٠,٩٥	٦,٣٤
خوخ جفف	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٧٢	٢٢,٢٥
دراق	٢٠٠٠	—	٧١٠	—	٩	—	١٠	—	٠,٨١	٦,٥٦
زبيب	—	—	—	—	—	—	—	—	١,٥٢	٢١,٨٥
سفرجل	—	—	—	—	—	—	١٥	—	٠,٩٣	١٧
شوك القصار	—	—	—	—	—	٦٥٠	—	٤٥٠	—	—
عنب	—	٥٠	—	٧٥	—	٣٠	٣	٢	٠,٧٧	٥,٢٦
عوج	٨٠٠	—	٢٨٠	—	٣٠٠	—	١٤	—	١٠	—
خيزاء الخليلين	—	—	—	—	—	—	٨٠	—	٢٠	—
خيزاء برية	—	—	—	—	—	—	٢٥	—	—	—
فراز (فراولة)	—	٦٠	—	—	١٠٠	—	٥٠	—	٢٥	٨
فراوليس	—	—	—	—	—	—	٤٥	—	—	—
قام	—	٢	—	—	—	—	١٥	—	١,٩٨	٣,١٢
قام آسي	١٠٠٠	—	١٠٠	—	١٠٠	—	١٠	—	٠,٨٥	١١
كرز	٦٠٠	—	٥٠٠	—	—	—	٥	—	٠,٦٨	٢,٧٤
كستناء	—	—	—	٩٠	—	—	٣٠	—	—	—
كشمش	—	—	—	—	—	٣٠	—	٢٥	٢,٣٥	٦,٩٢
كشمش احمر	—	—	—	—	—	٥٠	—	٢٠	١,٩٠	٤,٣٨
كشمش اسود	٥٠٠	٣٠٠	١٢	—	١٢	٢٢٠	١٥٠	—	٢,٠٠	١٠,٧٤
لوز	—	—	—	—	—	—	٥	—	—	—
ليون	—	٩٠	—	—	—	—	٥٠	—	٢,٤٦	٧
مشمش	٢٠٠٠	—	٧٦٠	—	٩	٢	١٠	—	١,٢٧	٧,٥٠
مصمة (فرايبواز)	—	—	—	—	—	٢٥	—	٢٠	١,٦٤	٩,٥
موز	٢٨٠	—	٢٥٠	—	٥٠	—	١٠	—	٠,٢٦	٧,٥٨
نسرين	—	٥٠٠٠	—	—	—	١٠٠٠	—	٤٠٠	—	—
يوسى (مستدين)	—	—	—	١٠٠	—	٣٠	—	٢٠	—	—

٨٠ م. ثوبها متناخل الا لوان . راسها وصلرها الى الشقار الحظي . بطها الى الياس التي . روشنها الاماميان بلون سدوها يترسها توضيح وتظليل ويكسر كل واحد منها فيجف قضي مستطيل . روشنها الخلفيان بلون بطها . تظهر في لبنان من ايار الى آب . اجبالها الحولية اربعة . روقاتها حمة تركب غنفل اوراق التيساتات الزرافية والريانية . اغبرها قليلة لا تستويب الكامفة .

### ٢١٢٧٢ - فيثوميترا شحابية \*

*Phytometra chalcites, Plusia chalcites* (S).  
*Phytometra cuivré* (F). *Phytometra chalcites* (E).  
حشرة مؤذية من فصيلة الشفويات حشرقيات الاجتحة . موطنها بعض اقاليم حوض البحر الابيض المتوسط . فراشها جارية قشياً رقيق الازهار . روقها غاسلة تموش على اوراق النباتات البرية اغصها الباذنجانيات وسها البتوية || جسمها شبه مدني الشكل بطول نحو ١٥ م . يسطها تراوح من ٣٦ الى ٤٠ م . راسها معتدل الجرم ، سطي الين ، اقشر الموج . مينها زيتان ، نازشزان زباناها غليظان . ملابسها صغيرة . مرقفها معتدل اللون . جوشها ويطها الى الصخرة الخطيئة الموج || روشنها الاماميان الى الصخرة تملوها زركشة سمراء وبقتجان متلاصفتان نحاسيتان اللون . روشنها الخلفيان الى الصخرة الخطيئة السوية . اعلاها الى الحظي الاكثف || لها ثلاثة ابيال في الحيل . تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان || الطور البرقي في اجيل الاول والثاني يستمر نحو ٣٨ يوم ويستمر في اجيل الثالث نحو ٢٠ اسبوعاً || السرعة في لبنان اذداها الكمال الجسودي طول نحو ٤٠ م . جسمها شبه اسطواني الشكل ، زني اللون . سطي الموج تملو ثلاثة غسوط لبيبة قاطية رسلان جانبياها جميعها متناخله الاغص والاصفر . راسها شديد السرة . مدنها ورواجيها الى الحظي الاصفر || طور الكمال الذي يستمر في الجبلين الاول والثاني نحو ١٥ يوم ، يستمر في الجبل الثالث نحو ثلاثة اسابيع ويتقضي ضمن سلجة لتسبب السرعة بين قصبان النبات العالي او تحت الاوراق الساقطة التي تلصق التربة .

### ٢١٢٧٤ - فيثوميترا \* فوئوما

*Phyteuma* (S). *Raiponce, Raponce* (F). *Rampion* (E). *Lange Tenfelskralle* (D). *Raponzolo* (I).  
جنس نباتات حشوية مسمر من فصيلة الجريسيات . انواعها عديدة معظمها بري وبعضها زراعي بقلي وتريسي . جلورها وشية الشكل . اوراقها زرقاء بقلية وقرصية منها مستطيلة الزائد ، كبيرة التصل اما الجلهية فصغيرة . اثارها حالية ، لاقامية التجميع ، يكثر فيها اللون الازرق . اشهر انواعها ما يلي .

### ٢١٢٧٥ - فيثوميترا ديمية الورق

*Phyteuma scorzoneraefolium, Ph. betonicosifolium, Ph. Micheli* (S). *Raiponce de Micheli* (F).  
نوع من الفيثوميترا وهي حبة بقلية سبريتية تملو من ٤٠ الى ٧٠ م . جلورها ولقي الشكل جامد للمادة الحسية لماكورة اليضاح اللون . اوراقها القرصية ضيقة التصل ، قلبية القاعدة ، تشبه اوراق اللبغ . اذواها ليلكية اللون ، سلبية التجميع ، اسطوانية الترتوب ، ثنائية او ثلاثية السات .

### ٢١٢٧٦ - فيثوميترا سلبكية ، عصا يعقوب

*Phyteuma spicatum* (S). *Raiponce en épi* (F).  
نوع من الفيثوميترا وهي حبة بقلية سبريتية عديدة القربوب .

٢١٢٧٦ - فيثوميترا \*  
*Phytoclea* (S). *Phytoclea* (F).  
جنس حشرات من فصيلة التريتيات انواعها عديدة جميعها صغيرة القند ، مستطيلة الشكل والزبان . طول اجسامها يراوح بين ٨ و ١٥ م . اثارها غتلفة الا لوان يكثر فيها الاصفر والاصفر || وهي تموش على اذوا الحشويات دون ان تلتظا . اما روقها فتركب السوق وتنسرها عند حمام التربة .

### ٢١٢٧٧ - فيثوميترا حية

*Phytologie* (F).  
*Phytology* (E).  
الفيتولوجية علم يبحث في النبات ، راجع علم النبات .

### ٢١٢٧٨ - فيثوميترا \*

*Phytometra, Plusia* (S).  
*Phytometra* (F).  
جنس سفرات فراشية من فصيلة الليات . انواعها عديدة . اجسامها غتلفة القند والا لوان . قرنها الاستحارية غميلة . روقها الامامية زركشة || انثاها اكبر حسيماً من ذكورها تمتع مكها افرادياً على نصل الاوراق . روقها قليلة تسطر على حقة نباتات بقلية وصناعية وتريسية . بطها من الفراشات القاطنة التي تجوب البلاد في طلب البيت والنبات العالي || اجبالها الحولية عديدة تراوح بين ٣ و ٥ م . اشهر انواعها ما يلي .

### ٢١٢٧٩ - فيثوميترا اختنات \*

*Phytometra pulchra* (S).  
نوع من الفيثوميترا الاءة . متوسطة القند ، بطها نحو ٥ م . صدوها الى الجورة الزرافية . بطها الى السرة الخطيئة الصفراء الموج . روقها سمر الحنار || تظهر في لبنان من ايار الى حزيران بين آب الى ايلول ، اجبالها الحولية اربعة || روقها تركب اوراق نباتات الفصيلة النجالية دون ان توضح بها شديدة الالذ .

### ٢١٢٨٠ - فيثوميترا الكرش \*

*Phytometra festuca, Plusia festuca* (S).  
نوع من الفيثوميترا الاءة . متوسطة القند . يسطها نحو ٤٠ م . ثوبها الى السرة الخطيئة . صدوها احيق من بطها . روشنها الاماميان جملها بخطوط عابقة مستطيلة || تظهر في لبنان من حزيران الى ايلول . اجبالها الحولية اربعة . تموش روقها على النباتات النجيلية اغصها المكش والبط والسادي .

### ٢١٢٨١ - فيثوميترا حمة \*

*Phytometra gamma, Plusia gamma* (S). *Gamma, Noctuelle gamma* (F). *Silver y moth* (E). *Lammseele, Ypsioneule* (D).  
نوع من الفيثوميترا القاطنة . متوسطة القند طولا نحو ١٧ م . وبسطها ٤٠ م . ثوبها الى السرة البنية . صدوها احيق من بطها . روشنها الاماميان بلون صدوها تترسها غسوط سمر ويوجد على كل واحد منها عند اواخر زامه الثاني علامة خازة ييضاه اللون تشبه سرف غا ثلاث اسرف الانجليزية اليونانية || تظهر في لبنان من نيسان الى تشرين . اجبالها الحولية عديدة تراوح بين ٤ و ٥ م . روقها حمة تشبه دودة غا . تركب اوراق غنفل البقول والنباتات الصناعية والتريسية .

### ٢١٢٨٢ - فيثوميترا سلبكية \*

*Phytometra ni, Plusia ni* (S).  
نوع من الفيثوميترا القاطنة . كبيرة القند ، يسطها نحو



فيثوميترا



فيثوميترا الخانجات



فيثوميترا المكش



فيثوميترا غا



فيثوميترا مبقجة



فيثوميترا حمة



فيثوميترا

## \* ٢١٢٧٢ - فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَّاءِ \*

*Phytonomus nigristrois* (S). *Phytonome à rostre noir* (F).

حشرة صغيرة اللون من فصيلة السويبات طولها نحو ٤ مم. لونها إلى الخضار الداكن. غطتها إلى السرة القاتمة. رجليها تركب برام وأزهار واوراق الثاقبات على اختلاف أنواعها خنثية.



فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ

## \* ٢١٢٧٤ - فَيْتُونُمَا الْكَمَلِ \*

*Phytonomus zollus*, Ph. punctatus (S). *Phytonome du trèfle* (F). *Clover bud weevil*, *Lasser clover leaf weevil* (E). *Schwarzrüsseliger*, *Blattnager*, *Kleeblattnager* (D).

حشرة من فصيلة السويبات. طولها براوح من ٧ إلى ١٢ مم. رجليها خضراء اللون يغطيها من الرأس إلى الشرج غط أبيض كالتلج. وهي تركب مع رجليها اوراق النفل لتفسدها وتضع بها الانثى.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَّاءِ

## \* ٢١٢٧٥ - فَيْتُونِيَّات \*

*Phaetonidae* (S).

*Phaetonidés*, *Phaetonidés* (F) *Phaetonidae* (E).

مركبة طير من كليات القدم، شملت الكف، مركزها المرمي بين الجبع والتطارين. اصحابها اقربها من الجبع وتقترب ببيضها من القنطارس. طيراتها سفيف مستدل الانتفاخ يمد للشرط. قتيها الاسماك تصطادها بالمطش الى الماء كما يقلل القائق. انواعها المعروفة اربعة تنتمي الى جنس واحد يدعى فيتون.

Erection

## \* ٢١٢٧٦ - قَيْجَ \*

هو الانتشار.

## \* ٢١٢٧٧ - قَيْجَرَكَة مَخْتَوِيَة \*

*Pygara curtula* (S). *Pygare circoncé* (F). *Pygara curtula* (E).

حشرة من فصيلة الشوطيات ورتبة حوشيات الاجنسة. موطنها المناطق المعتدلة الحارة من الشرق الاوسط الى اوروبا. فراشتها جارية قوتها رقيق الازهار. سرتها قمش على اوراق الحور والصفصاف. جسمها متوسط القد بطول نحو ١٦ مم. يسقط نحو ٣٦ مم. رأسها شهب اللون. ميناءها صفيرتان. زباناها مشطبان مزدوجتان عند الذكر، عظيمات عند الانثى. جوشنها ويطعا الى الشبه. وريشها الاماميان الى الشبه يملو تحفح حنطي وبقية بنية تتألفها اخرى طرفية الى الرتبة القلبية. ريشها الخلفيان الى البياض الشبي المالح. اهدابها تنية. لها جيلان في الحول. تظهر فراشة الجيل الاول في نيسان وتظهر فراشة الجيل الثاني في تموز. تسرح في الليل. تماثل بعد ظهورها بنحو اربعة اسابيع وتتح للكن على الصفصاف السفلى من نصال الاوراق. البقرة تطول نحو ٣٤ مم. جسمها شبه اسطواني الشكل، قروي القبول السككية الجانبية. نوبها الى الخطي الاسمر يملو غط لبيبي فاقب اسود وسمعة غطوط مسطرة تنتمي بالمطابق حر ترزير التبول. مدها ورواجها الى القطة السراء. لها طور الاكمال الذي يسمر نحو ١٥ يوما يتقضي ضمن صليبة تحبها للرق في شقوق حلاه الحور او الصفصاف.



فَيْتُونُمَا أَسْوَدُ الْغُطَّاءِ



فَيْجَرَة مَخْتَوِيَة

Rue (F).

## \* ٢١٢٧٨ - فَيْجَن \*

هو الذئب، اطلبه.

جندرها وشي الشكل، كبير القد، جامد المادة الحبة للأكل للبيضاء اللون. ساقها قوية تنصب جواء نمل من ٥٠ الى ١٠٠ سم. اوراقها القرمزية يضيء الشكل، قليلة القاحلة، كبيرة التصل، مأكولة، طعمها يشبه طعم البندق. انزعاجها سبيلة التجميع، كبيرة القد. لونها غشيت بخلط الصفروب فيها الاخير والسستوني والازرق على اختلاف مجامع. جميعها ثنائية السات.

## \* ٢١٢٧٩ - فَيْتُونُمَا مَدَوَكَا \*

*Phyteuma orbiculare* (S). *Ralponce orbiculaire* (F).

نوع من الفينيه وهي شبيه رية ورتيانية نمل من ١٥ الى ٥٠ سم. اوراقها القرمزية مستطيلة الزناد، يضيء النصل الدلق الزام الاخير. انزعاجها حلقية التجميع، ثلاثية السات. لونها الى الزرقه الداكنة. انزعاجها يسمر من ايار الى تشرين الاول.

## \* ٢١٢٨٠ - فَيْتُونُمَا وَهِيْمَكَة ، لَفَت بَرِّي \*

*Phyteuma humile* (S). *Ralponce naine* (F).

نوع من الفينيه وهي عذبة رية ورتيانية صغيرة القد نمل من ٥ الى ١٥ سم. اوراقها القرمزية مصفية الشكل. انزعاجها حلقية التجميع، بنفسجية اللون، حلقية يملد من ١٢ الى ١٥ ذرة. انزعاجها يسمر من تموز الى آب.

## \* ٢١٢٩١ - فَيْتُونُمَا الْبَهْش \*

هي لائحة البهشية، اطلبه.

## \* ٢١٢٩٠ - فَيْتُونُمَا قَرْنَاء \*

هي لائحة الكرنيم، اطلبه.

*Phaeton* (S). *Phaeton*, *Oiseau des tropiques*, *Paille-en-queue* (F). *Phaeton* (E).

جنس طير من فصيلة الفيتونيات. انواعه المعروفة اربعة. اصطناعها مجامع البلاد الاستوائية والحارة. اجسامها متصلة القد. مناقيد جالسة، مسنة الخاطار. اجنتها كبيرة، ذلقة. اذنانها مستطيلة المزال. ارسائها قصيرة. خطاب اصحابها شامل الكفاف. اعراف انواعه واشهرها الفيتون الاخر الذئب.

## \* ٢١٢٧٢ - فَيْتُون أَحْمَرُ الذَّنَبِ \*

*Phaeton rubricauda* (S). *Phaeton à queue rouge* (F).

طائر من الفيتون. طول الكمال نحو ٩٠ سم. منها نحو ٥٠ سم. للزنان. ثوبه متراكب الاوان الهلعة والمرفوشة، فيها الابيض والرودي والمرباني والاخر والاسود. ذنبه احر اللون. منقاد مرجاني. حلقه عيشة كستية. رساء واصابه حر. خطابه احر الانتشاب وزوا الادل، اسود اباني. اعطانه تشمل منط مجامع البلاد الاستوائية من المالم القديم. يالفت المواتع الاسفريفة التالية. قوته الاسماك يتغذى عليها. كالسم ويطن في طلبها على غق عدة اقدام. يلدن عشه، غالباً، في اضموس يديره بين الصغور وقد يدنث ايضا في الاشجار القلبية. اثناء قمع بيضة واحدة تحضنها بتناوبة للذكر نحو اربعة اسابيع.



٢١٢٨٨ - **فِيرُونُز** ، **فِيرُونُز** (F). Turquoise (F).

حبر عَيْنِ أَزْرَقُ الْهِنِّ .

٢١٢٨٩ - **فِيرُونُس** Virus

هو القيرس ، اطليه .

٢١٢٩٠ - **فِيرُونِيَّة** ، **مِيْرُول** ٥

Férolite, Mésolite (F).

سليكات مركب من الالومنيوم والكسيوم والصوديوم ونحو ٤٤٪ من السيليوس .

٢١٢٩١ - **فِيرُونِيَّة** ، **نُفَاحُ الْفِيل**

Feronia (S). Féronie, F. de l'Inde (F). Wood apple, Elephant apple tree (E). Elephananaphel (D). Feronia, Pomo d'elefanta (I).

جنس اشجار برية مشرة من فصيلة البرتقاليات . الزواحة قليلة العدد حينها ثمرات شاذكة . اطمانها الهند وبنديب والاندوس . ثمارها كروية الشكل حجمها حبر البرتقال . قشورها غليظة ليفية جامدة . لباها وردي اللون ، طعمه مزيج من الحلاوة والحامضة الحامضة .

٢١٢٩٢ - **فِيرُونِيكَا** Veronica (S). Véronique (F).

جنس نباتات برية وتربينية من فصيلة الخنازيريات . انواعها عديدة منها العشبية الحولية والمعمرة ومنها المنجيات الليفية والحشوية ومنها الاشجار التي يبلغ قطرها نحو ١٠٠ سم . اوراقها واغصانها لاقامية الاشكال والارتكاز || اءرف انواعها واشهرها ما يلي .

٢١٢٩٣ - **فِيرُونِيكَا أَنْثَى** ، **لِينَارِيَّةُ حَرْشَاءَ**

Veronica tauricum, V. chamaedrys (S). Véronique germandrée, V. femelle, V. bilcardé (F). Germander-speedwell, Wild germander (E). Gemander-Ehrenpreis (D). Veronica piccola quercia, V. femina (I).

نوع من القيرونيكاه وهي عشبة ترينية معمرة تملو من ٢٠ الى ٤٠ سم . ساقها منتصبة . اوراقها متفكة متقابلة ، نصلها سناني الشكل ، ضيق الصفحة الزباء . انوعها عشوية التجميع ، عمودية الارتكاز ، رزاق اللون || انوعها يستمر من حيزان الى تموز .

٢١٢٩٤ - **فِيرُونِيكَا بَهْشِيَّةُ الْوَرَق** ٥

Veronica buxifolia (S). Véronique à feuilles de buis (F).

نوع من القيرونيكاه وهي جينة ترينية معمرة تملو من ١٠٠ الى ٢٠٠ سم . ساقها منتصبة ، فرونها دقيقة جالسة ، اوراقها بهشية الشكل ، نصلها جامد الصفحة الاعمدة . انوعها سلبية التجميع ، كاجية الارتكاز ، بضاء اللون او وردية || انوعها يستمر طوال الصيف .

٢١٢٩٥ - **فِيرُونِيكَا حَبِيقُ الْحَمَى** ، **فُونْتَجُ مَعْصَرِي**

Veronica anagallis aquatica (S). Véronique d'eau (F). Water speedwell (E). Wasser Ehrenpreis (D). Veronica aquatica (I).

نوع من القيرونيكاه وهي عشبة برية طيبة معمرة تعيش في النظم وصل جوانب الاودية وبجاري الماء ، تملو من ٤٠ الى ٧٠ سم . اوراقها متقابلة لسنة ، نصلها خلي البشرة تباعد التسعين المستدير المستدير الى الزرقة . القليكية .

٢١٢٧٩ - **فِيَجَن حَلْبِي** Rue d'Alep (F).

هو السذاب السوري ، اطليه .

٢١٢٨٠ - **فِيَجَن لَعْن** Rue officinale (F).

هو السذاب افريقي ، اطليه .

٢١٢٨١ - **فِيَجَنِين** Rutine (F). Rutin (E).

الفينجين او الحامض الفينجي ، غلوكونيد تربتي اللون يوجد في القيقين اي السذاب وفي عدة نباتات اخرى انحصا الكبر والورد .

٢١٢٨٢ - **فِيْد** Feuilles de safran (F).

هو ورق الزعفران .

٢١٢٨٣ - **فِيْدُ الْهَلِيَّة**

هي بنت الهلية الكردنالية ، اطليه .

٢١٢٨٤ - **فِيْدُ الْهَلِيَّة كَرْدِيْنِيَّة**

Novius cardinal (F).

حشرة تسمى نفيروس كاردنالي ، اطليه .

٢١٢٨٥ - **فِيْدُ الْهَلِيَّة عَمْدِيْكَة** ، **بِيْكِرَة**

عَمْدِيْكَة ٥

Fidonia famula, Bichroma famula (S).

Fidonia servante (F). Bichroma famula (E).

حشرة من فصيلة الايفيات ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى اوروبا المعتدلة الحارة . فراشها واثمة قوتها مفر الاضرار . موطنها تموش حل اوراق الزوال وانواعها || جسمها نحيل ضيق بطول نحو ١٠ م . بسطتها نحو ٣١ م . رأسها اكعب اللون اصعب اللون . حينها صليتان . زباناها شطيان من الذكر ، عظيمات من الانثى . جوشها ويصلها الى الكعبة || وراثتها من القيقين الى الكعبة الصفراء الملوحة يطولها في الزوج الاسامي تبليج وتجميع وزرقة وزرقة كستية اللون . ويملوها في الزوج الخلفي شفحة متطيلة وضلعان متفرعان مقوكان كستية اللون . اهدابها الى الحشوي الاثني || لها جيل واحد في الجيل . تظهر الفرائشة ايار وتبقى حتى اواخر حزيران . تسرح في الليل . تماثل بعد ظهورها بستة اسابيع وتضع المكن ميساديا على الفصحات السبل من نصال الادران || السرقة تطول نحو ٢٤ م . جسمها رمدي الشكل مستطيل الرأس والمقدم . ثوبها ياتن لبيضة التي تبش فيها وهو يراوح بين الاخضر والاصفر . رأسها الى القمة . رواجها البطينة القوسية مائصة ما يحيطها تقويس عند الانتقال || طور الاكمال الذي يستمر نحو ١٥ يوما ينتهي في الجفالة اوبوين فروع النبات ضمن صلجة مثيلة الحيك .

٢١٢٨٦ - **فِيرُونُس** ، **فِيرُونُس** ، **فِيرُونُس** ، **فِيرُونُس** Virus

ج. فيروس ويلزس ، هي اصول بعض الامراض او الاوصام الجرثوية التي لم يتسكن العلم ، حتى الآن ، من تحييده الاشكالها الا بواسطة المجر الالكتروني . وهي كائنات حية ميكروية الجسم اي متناهية الصغر ، عديدة الاشكال القضيية ، كثيرة الانثى ، مستصبة على كل علاج .

٢١٢٨٧ - **فِيرُونِي** Viral (F).

نعت تعريفي يطلق على كل ما هو منسوب الى القيرس .



فيريونية عديّة



فيريونية



فيريونيكاه



فيريونيكاه بهشية الورق



فيريونيكاه حبيق الحامى

## ٢١٣٠٣ - فيرونيكا صغرى \* ولباب البحر

*Veronica officinalis* (S). *Véronique officinale*, *V. mla*, *Thé d'Europe* (F). Common speedwell, *Medicinal tea speedwell* (E). *Echta Ehrenpreis*, *Speedwell* (D). *Veronica officinale*, *Thé d'Europe*, *Quedernuz* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية مصرية تملو من ٦٠ إلى ١٥٠ سم. تألف الإبراج والسيقان القليلة للزهر. أوراقها لينة مستديرة الطرف تستعمل استعمال الشاي وهي حديدية المنافع الصحية، تنقي الصدر والقلب || أنوارها سلبية التجميع || زرقاء اللون || مثابها مستطلة الحجم، كثيفة الأجزاء.

## ٢١٣٠٤ - فيرونيكا التبغ \* و فيز بود التبغ

*Physopis nicotiana* (S). *Physopis du tabac* (F). نوع من التريسي، حشرته تملو نحو ٣ م. لها ألسنة البصرة الخشبية السوداء الموح. تركب تنضج الخشب ويمنس التبغ وصارة أخلايا ينسب ما يعونه مرض الرق الأبيض || الأكر حامد الأجنبية. البركة صفراء اللون تملو من ١ إلى ٢ م. راجع تريسي يترك أبيض.

## ٢١٣٠٥ - فيزود \* و فيزود

*Physa* (S). *Physa* (F). *Physa* (E).

جنس حيوانات مائية من الغزويات مملات الإبريل وبصيلة الفيزيات. أنواعها المروعة الماهرة العدد منتشرة في سائر أنهر العالم وينتقله وينتقله. نوعها النباتات المائية || أصنافها مختلفة، صغيرة، رقيقة، مائة، شائعة، شفافة، ألب، أجسامها أطيحية لينة. رؤوسها واضحة. لوامسها مستطيلة مبطنة. أرجلها وحيدة، مستديرة المقدم، ذلقة المؤخر، حادة السطاح.

## ٢١٣٠٦ - فيزود

*Imperméable* (F). *Imperméable, Impervious* (E).

أرض خثولة : سريمة السيل إذا أصابها الخث.

## ٢١٣٠٧ - فيزود

*Physalis* (S). *Physalis* (F).

جنس ضياء من المشيبات وفضيلة الفيزليات. أنواعها المعروفة ثلاثة منتشرة في معظم مجار العالم || مستمراتها تبدو كشكة من الألياف بخصبية اللون ويتبعها خلافاً قابل للتهدية، أوسوي الشكل عند الانتفاخ فوق سطح الماء حيث يتوسع مع الرقع أبناً يشاء.

## ٢١٣٠٨ - فيزود

*Physalis* (S). *Physalis* (F). *Physalis* (E).

فضيلة من الضحايا المشيبات البسوة. أنوارها المروعة خثة تجتمع إلى جنين الفيزليوس ويطرود.

## ٢١٣٠٩ - فيزود

*Physocarpus* (S). *Physocarpus* (F). *Physocarpus* (E).

جنس مغيرات مصرية من فضيلة الورديات. سؤفا متصبية تملو من متر إلى ثلاثة أمتار. أوراقها متعاقبة، معققة، عابدة، مفصصة ومنسدة الأطراف. أنوارها عتيقة التجميع، مختلفة الألوان || تزود الزرين في الخلال. ترطب في الأتربة المتعددة الانتماع، المنسوبة التركيب المنصري، الفلورة المواد الخفائية || أنواعها المعروفة قليلة العدد، أشهرها التالية :

## ٢١٣١١ - فيرونيكا سرّوية

*Veronica cupressoides* (S). *Véronique cyprès* (F). نوع من الفيرونيكا وهي عشية سرّوية مصرية تملو من ١٠٠ إلى ٢٠٠ سم. ساقها متصبية. فرونها دقيقة. أوراقها حشرقية تملو نحو ٢ م. أنوارها سلبية التجميع، حادة الارتكاز، صفراء، لينة، لينة اللون || أنوارها يستمر طوال الصيف.

## ٢١٣١٢ - فيرونيكا سبيلية

*Veronica spicata* (S). *Véronique en épi* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية مصرية تملو من ٢٠ إلى ٥٠ سم. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها أهليجي الشكل، مسن الحافة، حديد المقص. نورها سلبية التجميع مستطيلة السلة الوسيلة. أنوارها كبيرة الله وردية اللون || أنوارها يستمر من سريان إلى آب.

## ٢١٣١٣ - فيرونيكا شرقية

*Veronica orientalis* (S). *Véronique orientale* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية تريينية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. ساقها ملتوية الطرف. أوراقها خفيفة النصل المفروض والمسن. أنوارها لينة أو وردية اللون، صفراء التجميع، عويوة الارتكاز، كوروسا حادة النصل. أنوارها يستمر من تموز إلى آب.

## ٢١٣١٤ - فيرونيكا صفراء

*Veronica lutea* (S). *Véronique jaune* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية تريينية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. أوراقها بيضية الشكل. نصلها مسن الحافة ذات الزام الأسير. أنوارها صفراء التجميع، صفراء اللون، مسنحة البلات العليا || أنوارها يستمر من أيار إلى سريان.

## ٢١٣١٥ - فيرونيكا عيسى

*Veronica anagallifolia* (S). *Véronique des sables* (F). *Speedwell* (E). *Ehrenpreis* (D). *Veronica mucronata* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية طيبة متنبها الأتربة الرملية. ساقها خشبية خفيفة. أوراقها صغيرة التجميع، أهليجية الشكل، زبد النصل. أنوارها صفراء اللون، زرقاء اللون، بحرية اللوح.

## ٢١٣١٦ - فيرونيكا شجرية

*Veronica incana* (S). *Véronique blanchâtre* (F).

نوع من الفيرونيكا وهي بجملة تريينية مصرية تملو من ٢٠ إلى ٧٠ سم. فرونها مزينة اللحم. أوراقها متعاقبة متعاقبة، نصلها ساني الشكل، مسن الحافة، خلي للشرة حل صفحتها، يبدو كأنه أشجار اللون || أنوارها سلبية التجميع، زرقاء اللون. أنوارها وسيد السلة يستمر من سريان إلى تموز.

## ٢١٣١٧ - فيرونيكا قرّة العين

*Veronica beccabunga* (S). *Véronique cressonnée*, *Beccabunga*, *Cressonnière*, *Cresson de cheval* (F). *Brooklime*, *Water pimpernel* (E). *Bachbunge*, *Ehrenpreis* (D). *Baccabunga*, *Veronica cressone* (I).

نوع من الفيرونيكا وهي عشية برية مصرية تملو نحو ٢٠ سم. تعيش في المناء وعلى جوانب مجاري الماء. أوراقها صغيرة الله، بيضية الشكل، نصلها مائل البشرة، شديد الخضار. أنوارها صفراء الله لينة اللون، سبيلية التجميع || أوراقها مأكولة غشراء ويطرودة.



فيزود

## ٢١٣١٠ - فيزوكرب الفلومي الورق

Physocarpus opulifolia (S).

Physocarpus à feuilles d'obier (F).

نوع من الفيزوكرب . موطنه بعض مناطق أمريكا الشمالية . ساقه تملو من ستر الى ثلاثة امتار . اوراقه ثلاثية او خمسية القصوص ، خلية الصفحات العليا ، مزلاء السفلى . ازهاره عتيق تتجمع . ازهاره يضاء اللون او ودية || تنموه يستمر من حزيران الى تموز

Physique (F). Physica (E).

## ٢١٣١١ - فيزيما

علم الطبيعة أو الفيزياء .

Physides (S).

Physidés (F). Physidae (E).

فصيلة حيوانات مائية من الرغويات معنيات الارابل ودية الرغويات المائية . اجناسها وانواعها المعروفة متصلة الدم معظمها من مستحشرات الطبقة الجبورية . اما الانواع المعاصرة فنشرة في معظم انهر العالم وبحيراته وسنائه . قوتها النباتات المائية || اجناسها صغيرة ، رقيقة ، لامة ، شفافة ، حلزونة . شفاه الوب || اعرف اجناسها المعاصرة الفرية .

Biophysique (F).

## ٢١٣١٢ - فيزيياحية

علم يبحث في علاقة الفيزياء بالحياة . راجع فيزيويات .

Physiologie (F).

## ٢١٣١٤ - فيزيولوجية

في الفيزيولوجية ، الحياه .

٢١٣١٥ - فيستولينا ، فطر الكبد

Fistulina hepatica (S). Fistuline, Fistule hépatique, Foie de bœuf (F).

فطر مأكول من فصيلة السميات يركب جلود بعض الاشجار الحرجية في الموطن الغظلية الرطبة . وهو كبير القد ، كبدى الشكل والحمى ، حشلى اللون ، اسمر القاعدة ، جابك الركيزة المتبقية . اغراس زهيدة لا تستحق الاهتمام .

## ٢١٣١٦ - فيسجة باهرية

Phycita splendide (S).

Phycita splendide (F). Phycita splendide (E).

حشرة من فصيلة التارايات ودية حشرقيات الاجنحة . موطنها يمتد من الشرق الاوسط الى معظم مناطق اوروبية المعتدلة الحارة . فرشتها واحة قوتها رقيق الازهار وطلوها . سرقتها قرضابة تموش تحت طلاء الصنوبر وتقلع الشكير قسب سيلان القرائج || جسمها يطول نحو ١٢ م . يسطها تراوح من ٣٠ الى ٣٢ م . رأسها صغير الجرم والظهر . عيناها يمتدات ، ماصحات ، زباناها غطيلان . ملابسها دقيقة . مرشفها مستدل الطول . جوشنها ويطنها الى الكسني الاكثر المراج || ورشها الاناميان الى السرة الكسنية يطولها تقيح ابيض وزراش فراء . ورشها الخلفيان الى الطلعة يطولها شمشيح كسني يكتشف الاصاب وقاعدة الحنجر الخاربي || لها جيل واحد في الحول . تظهر الفرائشة في اواسط نيسان تسرح في الليل وتستن في النهار || الانثى تلقي المكن مباحيا بين شقوق السماء وتحت القشور . البور الاسروية يستمر نحو عشرة اشهر والسرقة منه يلونها الادراك تطول نحو ١٥ م . جسمها بين التقسيم السكي ، بني اللون تملوه



فيزولينا



فيسمة

خسة خطوط جوية قاطبة . رأسها اسود . منها وراجهيا الى الخليل || طور الاكمال الذي يستمر من اسبوعين الى ثلاثة اسابيع يتقفي ضمن صلبة تسجها السرقة بين قشور الصنوبر .

Fischeria (S).

Fischérie (F). Fischæria (E).

جنس حيوانات مائية من الرغويات صفحيات الخياشيم والاربل ومن فصيلة البيرينات . انواعها المعروفة قليلة العدد اعطائها جميع بحيرات وانهر افريقية الشمالية || اصنافها صغيرة القد ، شبه قلدوسية الشكل ، متساوية المصاريخ ، لامشادية الاضلاع . متاعها ثنائية ، طبقة صغيرة || تعيش في الاسمال . طويها مأكولة مبتلة الصفت .

Gul (F).

## ٢١٣١٨ - فيشكة

في الحدال ، ج . فيائل .

Sporobolus (S). Sporobole (F).

جنس نباتات عشبية ، برية ، مرعوية ، معمرة من فصيلة النجيليات . انواعها المعروفة نحو ٥٠ منتشرة في معظم اصقاع البلاد المعتدلة الحارة .

Nemestrina (S).

Némestrina (F). Nemastrina (E).

جنس حشرات من فصيلة القيصيات ودية ذوات الجناحين انواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم المناطق الانريقية || اجسامها كبيرة تطول من ٢٠ الى ٣٦ م . رؤوسها مستقيمة . عيونها كبيرة ، فارقة عنه الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . ملابسها نحيلة . اعطائها شديدة الطول . كواسلها كثيفة الخمل . بطونها بارزة الحيد السكي . اثوابها مربعة . رواشها شفافة . قوتها نحيلة || جميعها واحة تألف الغابات والمروج التي تكثر فيها الازهار . يرقاتها واحة او طفيلية . تتطفل على المصليات .

Nemestrinidae (S).

Némestrinidés (F). Nemastrinidae (E).

فصيلة حشرات من رتبة ذوات الجناحين . اجناسها وانواعها المعروفة عديدة منتشرة في معظم مناطق البلاد الحارة والمعتدلة الحارة . تألف الغابات والمروج في زن الازهار || اجسامها ضخمة ، شبه يضيعة الشكل ، تطول من ٧ الى ٣٦ م . رؤوسها مستقيمة . عيونها كبيرة ، فارقة عنه الشقين . قرونها الاستشعارية صغيرة ، ثلاثية الفصل . اعطائها متباينة الجرم منها الصغيرة ومنها الكبيرة المستطيلة . ملابسها نحيلة او خامرة . كواسلها كثيفة الملب . بطونها بيضاء اسطوانية ، مقنطرة الخشور . رواشها شفافة || يرقاتها غامضة ، حديدية الشكل || اشهر اجناسها الفيصمة والولانة .

Plus-value (F).

Increase in value, Increment (E).

هو الفرق الناتج عن ارتفاع ثمن الشيء بين تقديرين يختلف زمانها . وهو ايضا زيادة ما يتصفه الشيء من الثمن يما او تقديراً .

Débordement, Crue (F). Overflowing, Rising (E).

هو ازدياد المياه في الانهر وارتفاعها عن مستواها المألوف .

## ٢١٣١٣ - فيض ، طفق

## ٢١٣٢١ - فَيْصَان

Inondation (F).

Inundation, Flood (E).

غمر المياه الطافية لبلاد أو مكان ما .

## ٢١٣٢٥ - فَيْصَرَج

Leptodermis (S).

Leptoderme (F).

جنس نباتات جنية معمرة من فصيلة الفقيويات ، أنوارها المروقة قليلة . سوقها منتصبة تعلو من ١٠٠ الى ٢٥٠ م . فروصها مفصلة متقابلة الإرتكاز . أوراقها أبيضه معتقة متقابلة ، نصلها ساني الشكل خالي البشرة على سطحه . إزهارها الأنبوبية التويج ، روئسية التجميع ، يضاء القرن أو زرقاء أو بنفسجية .

## ٢١٣٢٦ - فَيْقَنْ ، قَرْقَل

Gloissement (F).

Clucking, Cluck (of hen) (E).

القيق : صوت الدجاج .

## ٢١٣٢٧ - فَيْقَل \* ٥

Figulus (S). Figule (F).

جنس خنافس من ذبذبات الاجنحة صغريات القرن وصيلة المتظويات . أنوارها المروقة نحو ٢٠ اصطلاها البلاد الحارة والاعتوائية من العالم القديم || جميعها حربية تعيش في الغابات على الاشجار أشيرة ألوانها الى الشقة السوداء أو الكهية السوداء السوداء . ريقاتها صغيرة ، اسطوانية الشكل ، صلبة ، كستنية اللون . قوتها المواد الخشبية السائرة الى الاخلال .

## ٢١٣٢٨ - فَيْكوريا رَجِيَا \* ٥ ذُرَّةُ الْمَاءِ

Victoria regia (S). Victoria (F). Giant water lily (E). Seekönigin (D). Victoria (F).

جنس نباتات مائية من فصيلة النيلوفاريات . اصطلاها مياه بحيرات البلاد الحارة والاعتوائية || أوراقها مستديرة ، نصلها جلد الصلصة ، صافي الشكل ، مكثف الخلة ، قطرها يراوح من ١٥٠ الى ٢٥٠ سم . وهو يطفو على وجه الماء رباه زناد ليلي النسيج اسطواني الشكل يطول من ٤٠٠ الى ٤٠٠ سم . || أنوارها كبيرة الحجم ، عديدة البتلات . بتلاتها بنفسجية الفاضة ، قرمزية الزام الاو ، ريقالية الثاني ، يبيض الثالث والرابع . ثمارها كروية ضخمة شاذكة . بزورها لشوية مأكولة ولذا يصعبها ذرة الماء .

## ٢١٣٢٩ - فَيْكُس ، فَيْكُون

Ficus

هو البقيع ، أطله .

## ٢١٣٣٠ - فَيْكَل

Elephas (S).

Elephant (F). Elephant (E).

ج . انيال وفيل وفيلة . كنيته ابر الحجاج وأبر الحريان وأبر خذل وأبر كلفوم وأبر مزاس . الاقنية فيلة ومجسم كنيتهام أم شبل || الفيل جنس سبوانات ضخمة لينة من فصيلة الفيليات وربة الخرطوميات || جسمه معتدل الطول مغطى البشانة يرتكز على اربع قوائم خليقة عمودية الشكل . رأسه كبير ضخم . صيانه صغيرتان . اذنان كبيرتان مرسيتان . خرطوميه جرم اللد ، بالغ الطول يلبس الرية . ناباه مستطيلتان نخيتان مقوستان || والفيل يعيش نحو ١٥٠ سنة وهو يبلغ كامل نضجه بمر ٢٥ سنة . محبل الاقنى يدم ٢٢ شهراً تنقص في نهاية دخلا وأسدأ وزنه نحو ١٠٠ كيلو . قوته اصطانه البلاد الحارة يألف الاحراج والمناطق الرطبة . قوته الاشجار والجبلور والرايز ليقطعها بخرطوميه ويدخلها الى

له تيشنها ويطنها || والفيل يسرح في طلب القوت من الساحة الثالثة صباحاً الى الساعة الثالثة ثم يرقع على الخفيض كسائر الحيوانات حتى الساعة الثالثة بعد الظهر فيقوم ويسرح عن جديد حتى انتصاف الليل حيث يرقع من جديد الى الساعة الثالثة صباحاً . وهو يتررب مرتين في اليوم ، الاول عند شروق الشمس والثانية قبل الغيب اما وجبهه البنية من القوت فتراوح من ٣٠٠ الى ٣٥٠ كيلو || أنوارها ثنائان الأفريقي .

## ٢١٣٣١ - فَيْكَل إَفْرِيقِي \* ٥

Elephas africanus (S).

Eléphant d'Afrique (F). African elephant (E).

لوح من الفيل موطنه يمتد من غربي وجنوبي الصحراء الكبرى الى بلاد الحبشة . وهو اكبر وأضخم حيوان ارضي يعيش الآن . يطول من ٣ الى ٤ امتار . محيط بطنه يراوح بين ٦ و ٧ امتار وطول جمعه مع الخرطوم والذنب يراوح بين ٨ و ١٠ امتار . وزنه يراوح بين ٤٥٠٠ و ٥٥٠٠ كيلو اما ناباه فتران من ٧٠ الى ٩٠ كيلو .

## ٢١٣٣٢ - فَيْكَل الْبَحْر

Elephant de mer (F).

هو الفيل ، أطله .

## ٢١٣٣٣ - فَيْكَل هِنْدِي \* ٥

Elephas indicus (S).

Eléphant d'Asie, E.de l'Inde (F). Indian elephant (E).

نوع من الفيل موطنه اسراج الهند والاصام وبناليه والسيام والكوششين وبلق ... وهو حليم الجلة جسمها يطول من ٢٧٠ الى ٣٦٠ سم . طوله يراوح من ٧ الى ٨ امتار بما فيه الخرطوم والذنب . وزنه يراوح من ٢٠٠٠ الى ٣٠٠٠ كيلو وكل واحدة من نابيه تزن من ٢٠ الى ٤٠ كيلو . والفيل الهندي مشهور بحسن الخلق واتقاس القمل . وهو يستخدم في القح الاعمال واستكشاف يقوم بها غير قيام اما الفيل الايش فهو من ذات النوع انما اصيب بالاحساب اي باندغام المادة اللينة في الجلة .

## ٢١٣٣٤ - فَيْلَادَلْفُوس

Philadelphus

نبات من السرفسيات يعرف بالسرجة ، أطله .

## ٢١٣٣٥ - فَيْلَادِيَه

Filare (F).

هي الهادية ، أطله .

## ٢١٣٣٦ - فَيْلَارِيُونُز

Filarion (F). Filaris (E).

دريدات تصيب نسيج الانسان والحريان سبها وصول يورضات الهذاب الى الجسم اما بطريق القم أو عن طريق الجرح وما اشبه .

## ٢١٣٣٧ - فَيْكَل الْبَحْر

هو الفيل ، أطله .

## ٢١٣٣٨ - فَيْكَلْمَكَة

Cacon (F).

هي الصلصة ، أطله .

## ٢١٣٣٩ - فَيْكَلْجُونُ

Arum (F).

هو القرياق الايش ، أطله .

## ٢١٣٤٠ - فَيْلَكُور

Phyllachora (F).

هي البتيكة ، أطله .

## ٢١٣٤١ - فَيْلُو ذَرَاة

Aklia des crucifères (F).

هي الكدوش ، أطله .

## ٢١٣٤٢ - فَيْلُولُوكَيْت

هو كهدب الزينج ، أطله .



فيل



فيكتوريا ريجيا



فيل افريقي



فيل هندي

٢١٢٤٨ - فيلوكس الوزال \* *Phylus genista* (S).*Phylus des genêts* (F).

حشرة غاشلة من فصيلة الفصيفيات . جسمها صغير يطول نحو ٥ م. ثوبها كثيف اللون يطول تمسح أبيض وتتقيد اسمر . رأسها عريض ، صغير غطتها مثل الطول . عينها صغيرتان ، بارزتان . زباناها دقيقان . كسيتان . كسلها عريسي الشكل . حجبها صغيرة . ظهراتها لاحف ، مستطيلة الخنجية الدققة . بطنها وبذنها الى الخلف الاسمر || تألف البراري والمواقع الدققة . يكثر وجودها على الوزال .

٢١٢٤٩ - فيلوكسيرة ، فيلوكسيرة *Phylloxera* (S).*Phylloxera* (F). *Phylloxera* (E).

جنس حشرات صغيرة القد وبمضها بجرية من فصيلة الارقيات ورتبة متجانسات الاجنحة || انواعها عديدة جميعها مؤذية انما اضرها واشدها اذى فيلوكسيرة الكرمة .

٢١٢٥٠ - فيلوكسيرة السندبان *Phylloxera quercus*, *Ph. coccinea* (S). *Phylloxéra du chêne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة حمار اللون صغيرة القد تطول نحو ١ م. تركب اوراق السندبان فتؤذيها . مظهرها الخارجي بقع صفر لاقياسية الانتظام تملو نصل الارقاق فتؤذيها وتقتفي عليها .

٢١٢٥١ - فيلوكسيرة الصنم *Phylloxera salicis* (S). *Phylloxéra des saules* (F).

نوع من الفيلوكسيرة صغيرة القد تطول نحو ١ م. لونها الى السرة تمشي ضمن جوارح شجيرة المادة ندية الشكل كاللغز وتكثر عند ابط الانسان والبرام والارقاق . تنصص النسخ من الاربعة الشبكية وتؤدي النبات وتضيقه .

٢١٢٥٢ - فيلوكسيرة الكرمة \* *Phylloxera vastatrix*, *Rhizaphis vastatrix*, *Peritymbia vitifolia*, *Pemphigus vitifolii*, *Xerampelus vastator*, *Dactylospira vitifoliae* (S). *Phylloxéra de la vigne* (F).

نوع من الفيلوكسيرة وهي حشرة صغيرة القد ، رباعية الاشكال تتميز بالفوارق التالية : الشكل الاول يشبه الفيلوكسيرة الفصية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك القالب تعيش على الارقاق || الشكل الثاني يشبه الفيلوكسيرة الجردية وهي معارة ، لاشقية ، مستطيلة المنك القالب تعيش على الجذور || الشكل الثالث يشبه الفيلوكسيرة الخنجة وهي لاشقية مستطيلة المنك القالب تعيش على الارقاق وفي التربة حتى اسلخها الاخير ثم تخرج وتطير || الشكل الرابع يشبه الفيلوكسيرة الشقية ذات الاعضاء التناسلية الكاملة وهي عادمة الجناح والمنك .

كيفية تطور الحشرة - ينبت بالاتي الشكل التي تنبع من اوسع في ايلول تدمي مكة مكة الشتاء تموت على ارضها . ومنكتها هذه اسطوانية الشكل زيتونية اللون ، تكاد لا تكون منظورة ، طولا ٢٥٠ م. وعرضها ١٢٠ م. لتلقاها من عقبها في احدى طبقات القشرة تنبت على حافة حتى الربيع حيث يتحول لونها الى الاصفر ثم يعقبه اللون الذي يتم في نيسان . فالحشرة اذا تقضي الشتاء ككتنه ثم تنبت في الربيع ينبت منها اما الفصية التي تتلاقى الساق والفروع الى ان تستقر على الارقاق او الجردية التي تدور في التربة حتى تسوي الجذور والجذيرات .

٢١٢٤٧ - فيلوكس الادغال \* *Philaenus spumarius* (S). *Philaenus des buissons* (F).

حشرة من فصيلة السركويات . جسمها صغير القد يطول من ٥ الى ٦ م. ثوبها غطت السرة السوداء والصفراء || رأسها نصف دائري الشكل ، اسفر اللون . غطتها ثلاثي الاجزاء . عيناها كبيرتان . زباناها قصيران . كسلها اسفر اللون ، اسوده في الزام الاخير . حجبها مزوانية . ظهراتها كامل الخنجية ، لاحف ، اسود اللون ، اسفر الحمار . وريثها عشائين ، شفافان . بطنها شديد السرة ، اسفر الحامد . قوائمها الى السرة || يكثر وجودها في البراري الدققة وعلى السابجات الحية . قريبا نغ الاوراق .



فيلوكس السناير

٢١٢٤٨ - فيلوكس *Phyllanthus* (S).*Phyllanthus* (F). *Phyllanthus*, *Tipsey-wood* (E). *Blatzblume* (D). *Flanto* (I).

جنس اشجار وجنبات برية ورتبية من فصيلة السويديات . لورائها معقدة متعاقبة ، نصلها بضيء الشكل جامد الصفرة . افرعها صغيرة القد ، فردية التجميع ، ابطية الارتكاز ، سداسية البتلات ، ثلاثية الفصل والامدية || انوعه المعروفة نحو ٤٠٠ جميعها استوائية المنبت ، مظهرها بري وبمضها تربس وبسبب انواع طيبة تلبد السيلان وبغيرها تنفر الاصباح لتستعمل في تنوير المسك لاصطياده .

٢١٢٤٥ - فيلوكس السناير \* ، أمثج *Phyllanthus emblica* (S). *Emblique officinale*, *Grane myrobalane*, *Myrobalanenbaum* (D). *Mirobalano emblica* (I).

شجرة برية من البجيات قريبة الشبه من الفيلوكس متنبية لند ، تستعمل في الطب لمعالجة الزنقة .



فيلوكس

٢١٢٤٦ - فيلوكس الاميات \* *Philopotamidae* (S).*Philopotamidae* (F). *Philopotamidae* (E).

فصيلة حشرات من رتبة حلوقيات الاجنحة . اجنتها وانواعها المعروفة قليلة العدد منتشرة في بعض مناطق البلاد المعتدلة الحرارة اخصها الجبال حيث الغابات وجداول الماء . اجسامها متباينة الحجم ، منها الصغيرة والوسطى والكبيرة . بسطة اجنتها تقارب من ١٥ الى ٣٦ م. اجنتها شديدة السرة يطولها تقطيع ملهب . جميعها سوداء اللون . رؤوسها وصغورها مشاة حلب اسفر تطير في النهار . طيراتها قصير الشوط ، سريع الحركة || اساريها مفترسة ، طليقة ، تعيش في المياه الجارية . تصنع شبكا قمية الشكل تلتقط فيها فرائسها .

اشهر اجنتها :

*Philopotamus* (S).*Chimarra* (S).

الفيلوپاتاموس

الشمار

٢١٢٤٧ - فيلوكس *Phyllonix* (S).*Phyllonix* (F).

جنس طير من الجوارح شرويات المتأخرات وفصيلة الكيميتيات . انوعه المعروفة قليلة العدد اسطوانات تنبت من الخد الى جزر الزايج || اجسامها تشبه البليل بهامته وشكله . اثوابها ملونة زاهرة الخضاب || جميعها غريبة ، تألف حياة الاسر وتقتبس الاغان وترددها .



فيلوكسيرة الكرمة



فيلمين

**٢١٣٥٤ - فيليمون \* Philémon, Phylédon (F).**  
جنس طير من الجواثم ربيقات المنقاريات وعضلة الفشريات .  
أنواعه المعروفة قليلة العدد أصلاً جزء الزواج ويرتدب ||  
أجسامها متوسطة الحجم قدما قد الشجور . رؤوسها  
صغيرة . مناقبها مغطاة بقلوب القشور . أذنابها مستطيلة ،  
مغطاة الأطراف . أنوارها متباينة الألوان يسود فيها  
الأخضر اللامع أما بطونها فبنية اللون أبيضاء || تدن  
في الانجرار الرقيقة . حشمتها من ٤ إلى ٦ يمشات ترزها  
وسدا دون الذكر الذي يئذن لها الغناء .

**٢١٣٥٥ - فيلوتريكيم Phylotrichum (S).**  
هو النسيجة جنس ظفر بجيرة ، أحلبا .

**٢١٣٥٦ - فينته Gyps de Ruppell (F).**  
هي قشمان الارش ، أحلبا .

**٢١٣٥٧ - فينولوجية Phénologie (F).**  
Phenology (E).  
هي علم الظواهر ، علم يبحث في الوقت الذي تحصل فيه  
دورياً للظواهر الخاصة بالدورة الحياتية النباتية وتأثير  
حوائل البيئة في هذه الظواهر أهمها البردة والارتفاعات  
واردك الشر والاحبال .

**٢١٣٥٨ - فينج Vin (vieux) (F).**  
هو الخمر العتيقة الصافية .

**٢١٣٥٩ - فيم Sigle (F). Sigle, Outline (E).**  
الفهم الحرف الرئيسي المفتاح المصطلح التعبير عن كلمة .  
وهو أيضاً مجموعة من الحرف الأولية تشمل التعبير عن  
مجموعة كلمات . ج . فيم .

**٢١٣٦٠ - فينته Spizæus bellinæus (S).**  
Spizæus bellinæus, Grifflard (F).

طائر من الالاه ينتمي الى عائلة الفصيات وعضلة الفشريات .  
أصنافه البلاد الحارة الأفريقية أحصاها جبال الحبشة . طوله  
نحو ١٠٠ سم . وهو لهيف القوام ، عنق الرأس ، قصير  
السطح ، سطيح اللب . ظهره ورأسه الى الكهبة تتخللها  
سرة فضية . سقفاها الى السرة المنسقة المرقشة يترزها  
خط أبيض . يملكه ويحولها الى البياض الأزرق المزاج .  
ذنبه الى الكهبة الرمادية تترزها ٦ خطوط عابطة شديدة  
السمرة || وهو من الأوباد يعيش ذكراً وإناثاً لا يفترقا  
سوى الموت . قوته الغناء والقنوع الطير . يئن ذكره في  
قوة الشجرة الرقيقة او في بعض أوقات الصخور النائية  
الشابة || أثناء قنوع وقتين مستمرتين قطر الواحدة  
يرأوح بين ٨ و ٩ سم . تحضها وسدا نحو ٥ أسابيع .



كينة

الجلوة - أصغر قدماً من الفصية طولها نحو ١٠٠٠ م .  
لونها الى الصفار الكبير وهي شديدة الاذى . أجسامها  
الموسمية تراوح بين ٦ و ٨ ويملك حشرات الجمل الأخير  
بقضي ياله الشري تحت قشور الجفود || ضررها  
محصور بلفظ تناسلها لان نزعها الجفود والجفود ، التي  
تميش عليها وفيها ، قد يبلغ بعض القروا .

الخنجة - هي من حيث الأصل حشرة فضية دخلت  
الربة بعد انسلخها الثالث فتحوورت لها بعد انسلخ  
تكميل رابع الى عذراء ثم الى حشرة خنجة طولها نحو ٢  
م . أي ٢٠٠٠ م . وهي لا شقة الجلس ، صفراء اللون .  
رمانية الاجنحة الشفافة . تقص من ٤ الى ٨ مكثات  
مختلفة الاحجام تقص مكن الصف . الصغرى منها وقد  
تطول نحو ٢٦٠ م . تنقف من الذكور . والذكور  
تطول نحو ٤٠٠ م . تنقف من الاناث .

الشفقة - هي الكاملة الأعضاء التناسلية تنقف من مكن  
الصف المائل الى الحشرة الخنجة . وهي صفراء اللون حادة  
الملك والاجنحة والاذى . الذكر منها يطول من ٢٦٠ الى  
٣٨٠ م . والانثى من ٤٠٠ الى ٤٦٠ م . || سفادها  
يبتنى بعد النقف بيوم أو يومين تقص الانثى بعده مكنة  
واحدة تعرف بمكنة الشتاء التي جنبها على ذكرها في اول  
هذا الجث .

الضراوة الحشرة - أضراسها جسمية لانها تميت الكومة بعد  
ان تقضي على الجفود والاوراق .  
مكافحتها - طرق مكافحتها متعددة منها القنص بالاد نحو  
٢٥ يوماً او استعمال الموشير النشطة القمالة السامة التي  
يصطب القيام بها تفكراً لباقة اكلافها وما قد تسببه من  
عواقب . لذلك يحسن استعمال الصلح على كورة امريكية  
بنية وهو ما مكن اربعة من تجديد كرومها بعد ان  
نفت عليها الفيلكسرة .

**٢١٣٥٣ - فيلانتيدس Elephantidae (S).**  
Elephantidae (E).

لفيلة الفيلة من رتبة الخرطوبيات .

أنجزت « المطبعة الكاثوليكية ش.م.ل. »  
في عاريا - لبنان  
طباعة الجزء الثاني من « الموسوعة في علوم الطبيعة »  
في العام ١٩٨٨





*L'Encyclopédie des Sciences de la Nature  
se compose de quatre volumes, dont le dernier  
comprend les lexiques des termes  
allemands,  
anglais,  
français,  
grecs,  
italiens et  
latins.*



Edouard Ghaleb  
Ingénieur agronome

---

# **ENCYCLOPEDIE DES SCIENCES DE LA NATURE**

## **ENCYCLOPEDIA OF NATURAL SCIENCES**

---

Agriculture, Botanique, Zoologie, Ornithologie,  
Ichtyologie, Entomologie, Parasitologie, Bactériologie,  
Microbiologie, Affections animales et végétales.

**Termes techniques:**

(Physique, Chimie, Mathématiques, Géologie, Astronomie, Droit)

**Volume II**  
2ème ÉDITION REVUE ET AUGMENTÉE



**Dar el-Machreq sarl**  
Beyrouth



**ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**







**Der al-Machreq east**  
Boîte Postale 946 Beyrouth, Liban

Distribution :



**Librairie Orientale** - Boîte Postale 1986  
Beyrouth, Liban





ARTICLES ET INDEX  
en arabe, anglais, français  
allemand, italien, latin et grec

Edouard Ghaleb **ENCYCLOPEDIE DES  
SCIENCES DE LA NATURE**

Agriculture • Botanique • Zoologie • Géologie

**ENCYCLOPEDIA  
OF NATURAL SCIENCES**

2420 pages • 31464 articles  
6962 illustrations • 24 planches en couleurs

Agriculture • Botany • Zoology • Geology



**DAR EL-MACHREQ**  
BEYROUTH